


SCHRODER J.
PHARMACOPOEIA
MEDICO-CHYM
1669







99
213 10



63188 / B


The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine


MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

SCHROEDER, J.





XI

PHARMACOPOEIA
MEDICO-CHYMICA,

SIVE

THESAURUS PHARMACOLOGICUS,

Quo composita quæque celebriora; hinc
Mineralia, Vegetabilia & Animalia Chymico Medicè
describuntur, atque insuper Principia Physicæ Hermetico
Hippocraticæ candidè exhibentur.

O P U S

Non minùs utile Physicis, quàm Medicis:

EDITIONE SEXTA correctum, à mendis purgatum & indice morborum auctum,

AVTHORE,

JOANNE SCHRÖDERO, M.D.

Reip. Moeno-Francof. Phys. Ord.



S. Cæs. Maj.

FRANCOFURTI,

Sumptibus Viduæ JOAN. GÖRLINI, Bibliop. Ulm.

Typis JOAN. GÖRLINI, 1669.

1512

1512

1512

PR



pro p
sider
sam,
tam,
anno
sub ta
pasch
lata,
ficta
nobis
T.C.
Eran



Augustæ Reipubl. Francofurtensis
PRÆTORI, CONSUL. SCABINIS ET
CÆTERIS SENATORIBUS.

Dominis nostris gratiosiss.

Efferimus Vobis, Viri Nobiliss. Strenui & Prudentissimi, Patres Conscripti Observandi, quod jam vestrum est, Pharmacopœiam nempe p. d. Schröderi Archiatri Vestri per multos annos meritisimi, atq; Collegæ nostri desideratissimi. Jure autem meritoq; eam nunc hic recusam, & à mendis innumerabilibus labore nostro purgatam, ad pedes vestros deponimus, quod olim jam ante annos XXVII. ab Autore Vobis sacra facta, & quod sub tutela Vestra in & extra Germaniam multoties passim typis descripta, atq; etiam in alias linguas translata, hac verò editione nitida, insigniter limata & perfecta fuerit. Recipite modo sereno vultu & favere nobis pergite. Supremus Archiater D. O. M. Vos, P. C. Venerandi, Patriæ & nobis diutissimè servet. Francofurti ad Mœnum Kal. Augusti, 1668.

JO. DANIEL HORSTIUS, D.
JO. LUDOVICUS WIZELIUS, D.



Autoris Præfatio

AD

AD INCL. SENATUM
FRANCOFURTENSEM.

*Magnificis, Nobilissimis, Amplissimis,
Consultissimis, & Prudentissimis*

DNN. PRÆTORI, CON-
sulibus ac Senatoribus Inclytæ Imperialis
Reip. Francofurtanæ.

Dnn. ac Fautoribus meis honorandis, Salutem & Observ.



EUS ELOHIM, *Viri Magnifici,
Nobilissimi, Amplissimi, Consultissimi, Pruden-
tissimi*, rei quidem nullius indiguit, quæ ad
perfectionem suam facere quoquo modo
posset: nihilominus pro liberrimo suo bene-
placito sui existere voluit speculum visibile,
quo invisibilis sua *Deus noster noster* (Roman. I.)
id est *Essentia ac potentia* visibiliter patesce-
rent, hisque cognitus celebraretur, adeoque
lætaretur. Speculum id *Natura* est, Mundus universus, & in hoc
præcipuè *Homo*, velut universitatis complementum. Nimirum hoc
speculum DEI eminentissimum, peculiariterque Spiritu ELO-
HIM inflatus est, electus scil. ante omnia in Filio dilecto, ut esset
sanctus,

EPISTOLA DEDICATORIA.

sanctus, perfectionisque capax supernaturalis. Quare ut *Triunus* est JEHOVA: ita *Naturam* & evidentissimè *humanam triumam* existere voluit: *Spiritum*, quem insitum vulgo vocant; *Corpus*, quod ejus subiectum; & *animam* quæ veluti ignis utrumque illud actuat, animat, vitalique flamma perfundit. Idem JEHOVA, ut *potentiis* instructus, imò ipsamet potentia est operosissima: ita etiam *Natura*, maximæque *homini facultates* inditas voluit operosas, easque ad imaginem divinam tum *internas*, tum *externas*. Prioribus res quæque se semet respicit, atque actutum ac esse res incipit, *Spiritus anima* accensus *subiectum* sibi generat, & ordinat, (in *Natura* corpus vocatum:) Hinc procedunt subinde radii aliorum servitio destinati, fonsque potentiarum *externarum*. Posterioribus igitur his res quæque res extra se positas concernit, harum servitio prona, magis, minus, prout res cognatæ invicem, tum quoque prout rerum conditio cultusque exegerit. Idem JEHOVA ut *affectibus* affici dicitur, *voluptate* scil. vel *dolore* & *tristitia*: Ita pro re nata *Natura* & evidentissimè *homini affectus* indidit, quibus tum delectatus stimuletur, tum molestatus deterreatur. Cæterum ut *bonus* JEHOVA in se est, imò ter Optimus Maximus, adeoque *Essentiam* optimam possidet, *potentiam* optimè administrat, & hinc affectu optimo fruitur, id est, *Voluptate* ineffabili: Simili modo *Naturam* & pro renata *humanam* optimam voluit, optimam scil. dispositionem *principiorum Essentia-
lium*, optimam *facultatem* inditarum administrationem, & hinc *affectum* optimum, videlicet *in deum* seu *voluptatem*. En finis Naturæ propositus *felicitas* scil. sive *summum* illud *Bonum* mundanum, Cœlestis illius summi Boni antitypus & speculum. Hujus ergo ut gradus certisunt: ita & illius, atque idcirco *Naturam* & præ aliis *humanam* JEHOVA existere voluit perfectam quidem, verum in gradu non statim ac origine suprema, sed initiali, è quo subinde cultura accedente ad *deum* ascenderet, perinde scil. uti & ipsemet JEHOVA, licet in se omnino immutabilis; attamen ex *Natura* creata, hujusque conformitate ac obedientia voluptatem capeffere constituit. Vo-
luit

EPISTOLA DEDICATORIA.

luit autem J E H O V A omnia hæc, prout ipsemet liberrimus existit, cum libera hominis voluntate & arbitrio, ad bonum tamen inclinate. Quare ut propositum hoc D E I consisteret, oportuit Mundum, cum non esset produci; cum esset, conservari; cum depravatus, redintegrari. Hinc *Creatio*, ea quoque continuata *Generatio*, hinc & *Conservatio* seu *Gubernatio*: hinc demum corruptionis *restauratio*; ceu media ad felicitatem dictam collimantia. Et hæc omnia eò avidius D E U S expetit, cunctorum administrationem legitimam non solum lege innata scriptaque cavet, sed & ministris visibilibus coërcet & gubernat. Ministri hi præcipuè sunt *Magistratus Dii* propterea dictus, & hinc vel solo hoc nomine arctè obligatus voluntati divinæ studere, felicitatemque D E O propositam masculè promovere. Quare cum *Sanitas* non minima Felicitatis dictæ portio sit; nec postrema *Magistratus* functio erit, de illa ipsa esse sollicitum & idcirco de *Medicina* rite adhibenda. Nimirum Medicina administrata legitimè sanitatis tutela; perverse, ejusdem ruina. Hinc digna olim reputata Medicina, quæ à Regibus ipsis, aliisque Magistratibus, virisque celeberrimis addisceretur, excoleretur, propagaretur; digna quæ honoribus, privilegiis & immunitatibus donaretur, digna quæ non nisi testimonio publico dignis repertis committeretur exercenda. Duobus autem præcipuè exercitatio hæc nititur, directione scil. & elaboratione. Directionem dico, qua media sanitatis præscribuntur; Elaborationem, qua eadem elaborantur & administrantur. In utraque non possum non extollere, *Viri Magnifici, Nobilissimi, Amplissimi, nec non Consultissimi*, providam vestram curam, quippe quâ ad prius non admittitis, nisi publico testimonio comprobatos; ad posterius, non nisi vestro examine exploratos, & utrosque non nisi stipulatâ manu Jureve Jurando vobis devinctos. Verum enim vero: ut hostis vitæ *Diabolus* haud quiequam intermittit, quod tum ad molestandum, tum ad abrumpendum fatum videtur: ita citra Providentiam vestram prò dolor! gliscant agit, quorum inscitia, ne dicam malitiâ, vitæ civium non
opinan-

EPISTOLA DE DICATORIA.

opinantium impunè derogetur. Choræam in his ducunt *Iudæi*, utpote quibus *subjectum* ad id aptius invenire vix licuit (*Keckerm. in Polit.*) His enim regulis suis occultis permissum novit *Gojim*, id est, *Christianos* impunè & citra homicidii notam, adeoque citra conscientiam interimere. Hos notatos comperis, ut nævo malitiæ forma scil. deformi, (quæ nota malitiæ à Natura ipsa impressa:) ita quoque fronte impudicâ, garrulâ Suadâ, mendacique linguâ, mediis dicto scopo aptissimis, adeo quidem, ut quoque malitiæ, inscitæ, ruditatisque per examen convicti & eapropter per *Senatus consultum* Medicina abacti, nihilominus calleant animos fascinare, leges eludere, libertatemque captare, de corio *Christiano-rum*, grandiloquis loquaculis nimis credulorum, impunè ludendi, Miseret me, quoties cernere datur, datur autem sæpissimè, Recepta, quæ vocant, inepta, heterogenea, ne dicam noxia, incautis præscripta. Miseret, quoties audire contingit, contingit autem & hoc frequenter, affectus scil. leves, præter rei veritatem persuaderi periculosos, idque ut credulorum bursa emulgeatur, medicafterque audiat magnus. Miseret, quoties causam morbi, speciemque ridiculè audio enarratam. Sed cur miseret? Mundus vult decipi; decipiatur. Vestræ interim uti curæ est, *Viri Prudentissimi, prudentiâ vestrâ incautis succurrere, stolidis consulere, insciis præesse, imprudentibus providere*: ita Medicorum vestrorum & hinc mei quoque officii de abusu hoc Medicinæ *vestram Prudentiam* ad graviora retractam, submonere. Quod non minus expeto in bonam partem suscipi, quam spero probatum vobis iri, si hoc operis, itidem ad legitimum Medicinæ exercitium collimantis, ad imitationem Pharmacopœiæ Augustanæ & Noribergensis *nomine vestro* divulgem. Continet nimirum celeberrima quamplurima, à Medicis vestris, quos celebriores quovis tempore aluisse studetis, profecta, & idcirco vobis solis meritò consecranda. Continet quamplurima quibus officinæ vestræ, quarum non minimam curam geritis, & hinc instructissimas possidetis, præ aliis elucet. His

acce-

EPISTOLA DEDICATORIA.


accedit vester in me favor, quod annis retro abhinc aliquot peregrinum civitate donastis, in Medicorum numerum adoptastis, privilegiis frui dedistis, aliaque favoris indicia in me cumulastis sufficientissimè. Eodem igitur favore fretus confido, hanc meam gratitudinis tesseram, æqua mente iri susceptum, qua ulteriori vestro favori me commendo, sanaque consilia Reipubl. ruinam arcenia temporibus hisce ruinam minitantibus corde tenus precor. Francofurti ad Mœnum è Musæo ipsis Nundinis autumnalibus, Anno 1641.

Magnif.^z Ampl.^{is} & Prud.^z V.^z

Observantis.

JOANNES SCHRÖDERUS, D.

INCL.



INCL. REIP.

Mœno - Francofurtanæ

Pharmacopœis

Salut.

Parmacopœiam quam Schröderus
b.m. Collega noster desideratissimus
vobis, parentibusve & antecessori-
bus vestris dedicavit, Vobis pari mo-
do offerimus, ad quod & virtus & hu-
manitas vestra quibus illis neutiquam ceditis, sti-
mulum dedit. Tu enim SALZVEDELI in se vio-
constitutus non remisisti hactenus, nec ad cygneum
usque cantum remittes quicquam de industria &
cura quoad legitimam pharmacorum præparatio-
nem, multò minus de cultu & favore erga illorum
autores; Et tu DAUTI vestigia diligenter legis
Exercitissimi BANSÆ, hujusq; Successoris MÜL-
LERI piè defuncti Pharmacopœiorum antehac emi-
nentium & præclarorum, ut illis te parem ostendas.

b

Nec

Nec paucos GRASERE paternarum virtutum spargis radios, quin ut totus illis corrusces, elabores sedulò. In te verò SPARRI genitoris tui Pharmacopœi & Chymici experientissimi p. m. & vultus viget & animus. Vos autem, HOLTZAPPELIANI Hæredes, quod Pharmacopolii Paterni curam habeatis solidam faventes gratulamur. DEUS Vos omnes & singulos diutissimè servet incolumes. Francofurti Calend. Augusti A°. 1668.

JOANNES DANIEL HORSTIUS, D.
JOANNES LUDOVICUS Bizel/ D.

Autoris



AUTORIS PRÆFATIO

AD

Pharmacopœios Francofurtenses.

Rodit jam partus Pharmacopœiæ meæ secundus, quem eo alacrius maturavi, quod cognovi partum priorem avidissimè fuisse susceptum, adeo ut Exemplaria intra biennium non solum omnino sint distracta, sed & adhuc undique crebro perquirantur, partusque secundi editio sollicitè urgeatur. Quare ne desim perquirentibus, gratificerque partum secundum urgentibus, auctiorem hunc modo communico, syllabisque diversis ac synopsi brevissima adornatum. Vobis autem, Viri eximii ac peritissimi, eundem quod consecrem, causa me impulerunt varia. 1. Favor vester, quem hætenus à vobis expertus sum, nimirum hunc non possum non reponere reciprocum. 2. Candor, quo vellea, quæ pro arcanis vendita fuerunt, contribuistis. Hinc gratitudinis tesseram dare fas fuit. 3. Stimulus, quo ad opus hoc tum divulgandum authores gnavi extitistis, ac postmodum partum hunc secundum monitis vestris, literisque ea de re hinc inde ad vos transmissis urgere non destitistis. His scil. non parere inhumanum duxi. Prætereo peritiâ & dexteritatem vestram singularem, qua Officinas præ aliis celeberrimas, Chymicusque medicamentis instructissimas fovetis, adeoque Momorum obtrectationi occurrere polletis. Consecro igitur vobis partum hunc secundum, quem animo benevolo iri susceptum spero, quod sciam partum priorem admodum arrisisse. His valete. Dabam è Museo Francofurti, Nundinis vernalibus, Anno 1661.



V I R O

Clarissimo & Excellentissimo

DN. JOHANNI SCHRÖDERO,
Medic. D. & Reip. Francofurtensis ad Mœnum Medico ordinario,
Cognato suo Dilectissimo,

PHARMACOPOEIAM
MEDICO-CHYMICAM

Tertium edendi.

Congratulatur

JOHANNES Barcehausen / J. U. D.
Consiliarius Lippiacus.

Q Uos Patriæ & Sophiæ studium commune, Schrödere,
Et Sanguinis cognatio conjunxerat:
Diversum studium jam separat; & fabricavit
Apollo Te Medicum bonum & Botanicum:
Nam quas herbarum virtutes Theſſalus olim
Chiron ſuo labore magno repperit,
Quasque Dioſcorides doctiſſimus, Hippocratesque
Acurus, & Galenus expertiſſimus.
Excoluere ſuo ſtudio, atque Ægyptius Hermes
Extraxit acriore diligentia,
Quasque Theophrastus gelidis in Teutonis oris
Reſuſcitavit maximis laboribus,
Hæc, Cognate, tuo complecteris omnia Libro,
Tuæque mentis expolis acumine,
Sed me legiferi ſpacioſa volumina juris
Mea manu Fortuna juffit volvere.

Hinc

Hinc almæ miserum me pacis nescia turba
Ferè indies (eheu) vexat, atterit, enecat.
Principum in Excelsis aulis quàm turpiter alter
Me criminatur, atque mox vult perditum:
Alter me laudat, scriptis & voce celebrat
Meum laborem, meque servatum cupit.
Hæc cæferenda mihi fors est: nam multat uterque
Pro honore maximo me onere gravissimo.
Cunctorum tibi conciliat decus atque favorem
Phœbus, sibi que te collocat proximum.
Gratulor ergo Tibi, Phœbi doctissima proles,
Et ego meam sortem feram placidissimè,
Atque tuum librum si carpet Zoilus ore
Suo maligno, Tu feras quoque placidè.
Nam cum carpit ^{ov} G, non est onus hoc, sed honos est,
Et magna res est ab optimis laudari.

Fossile, Planta, Animal, quæ sint adhibenda fugandis
Morbis, fasciculo, Docte Schrödere, doces,
Namque Metallifera hac quicquid producit alitque
Quicquid & abscondit terra benigna, refers.
Atque adeò luces noctesque laboribus urges,
Tradas qua populo, qua bona grata Deo.
Maeste ergo, maeste agri perge juvare salutem:
Gratus es hinc agris: gratus es hinc Medicis.

Gratulatur

PETRUS de Spina, Doct.
Phys. Ord. Reip. FF.

Antandemprodittua, mi SCHRÖDERE, tot annis
Optata a tantis, PHARMACOPOEA, viris?
Antandemprodit, qua trux Libitina tenetur,
Quà levioze Charon cogitur ire rate?
Obene! in humano stabulantia corpore monstra
Nunc digito poterunt liberioze premi.
Nunc quod Arabs-Grajus, Gallusq, Iber atq, Latinus
Continet, hoc uni vis tuo inesse libro.
Perge Machaonia modo sic prodesse palestra.
Æternum nomen Phœbus Apollo dicat.

Cl. Dn. Affini suo gratulabundus
deproperabat

LUDOV. von Hörnigt / U.J. Med.
& Phil.D. simulque Com. Pal. Cæs. &
Phys. Ordinar. Francof.

Excellentissimo Viro, Medico Experientissimo
D. D. JOANNI SCHRÖDERO,
Amico & Fautori magno.

ECce! Machaonias quicunque fideliter artes
Exercet, studiis amplificatque suis:
Ille mihi gemino condignus honore videtur,
Laurea cui duplex impediatur caput.
Hoc, Schrödere, facis! Nostram tu perficis artem
Ufu, tu Scriptis condecorasque bonis,
Ergo mihi geminis venerandus honoribus exis,
Cum duplicique tuus laude triumphus erit.
Perge novis partam Scriptis extendere famam &
Non amat ignavos gloria magna viros.
Præmia sunt gnavis, & certa laboribus. Hæc te,
Ut celebrî clarus laude ferire, juvent.
Fallor? an ut Medicis jam proderit usibus, auctam
Sic reddet famam, quem dabis, ille liber.

Egre-

Egregius labor iste tuus? Tu dignus es autor,
Quem Medicus, quem nunc Pharmacopœus amet.

Francofurt. in Nundinis Autumn. M. DC. XLI.

Novi & elegantis operis Editionem,
cum affectu, congratulabatur

Joh. Petrus Lotichius, D. Medicus,
Acad. Marburg. Prof. P. L.

Encomium Medicinæ Sacrum.

Deus ipse, ait Sirachus,
Medicum creavit; axe
Medicina traxit ortum:
Nebuloque, non honestus
Sapiensque temnit illam.
Macrocosmus iste totus
Medica officina IOVÆ est;
Chymica officina mundi
Polydadala officina est.
Medicina nota Adamo
Fuit, idque teste Mose;
Quia nomina ipse cunctis
Dedit apta rebus, atque
Medicum fuisse Moſen
Tibi testis arbor, à qua
Aqua amara facta dulcis.
Locus ipse Marateſtis.
Medicos ſua Joſephum
Habuiſſe conſtat aula.
Salomonidique Regi
Medicina nota tota
Medicina tota nota.
Animantia illa cuncta.

Vegetabilesque plantas
Bene novus! annotavit,
Meminitque cuncta ad unguem,
Docuitque cuncta ad hilum.
Medicum fuiſſe Eliſam
Sale facta aqua ſalubres;
Colocynthides agreſtes,
Colocynthides amara
Quia dulcuere, Eliſa
Tibi teſtis eſt farina.
Medicum fuiſſe Elaiam
Palatha illa teſtis; ulcus
Quia ſanat Ezechia.
Medicum fuiſſe Paulum
Tibi teſtis ipſe Paulus;
Stomacho hicc languenti
Modico mero medetur.
Medicum fuiſſe Lucam
Tibi teſtis ipſe Paulus.
Genius comes Tobia
Medicus fuit Raphaël.
Oculos Patris Tobia
Quia ſelle piſcis ungit.

Medi-

*Medicatur atq; corde &
Fugat hepate Asmodaem.
Nihil honore majus
Sacra prodidere quicquam;
Nihil hoc honore majus
Quoq; continent profana:
Medicum quod Iſtaëlis
Vocat ipſe ſe JEHOVA:
Medicum quod haudq; JESUS
Dubitat vocare ſeſe.
Nihil hoc honore majus
Sacra prodidere quicquam;*

*Nihil hoc honore majus
Quoque continent profana.
Tibi gratulor proinde,
Mihi gaudeo, quod edis
Lepidum novum huncce librum,
Medicum novum huncce librum,
Chymicum novum huncce librum, ô!
Cerebellulum Minervæ es,
Eres oſculum Suade,
Es Apolliniq; myſta!
Tibi gratulor proinde,
Mihi gaudeo, Joannes.*

EPIGRAMMA AD EVNDEM.

FOſſilia & Plantas, Animalia denique cuncta
Uſu pro Medico digeris & Chymico,
Ut ſtudii immenſi eſt infinitique laboris:
Sic opus immenſæ hoc utilitatis erit.

Ita cenſeo, ita auguror

Joann. Sebastianus Bloſius, Phil. & Med. D.
Reipubl. Ulmenſ. poliar. & P. P.

*AD EXCELLENTISSIMUM AUTOREM,
Amicum plurimum Honorandum.*

TROCAHICI.

DÆdalæ Scrutator indefeſſe rerum plurium,
Millies formantis ac verſantis actus Scenicos
Artis, orbis cui miniſtrat cuncta totus largiter,
Morbidis ſalubritatem quò afferas mortalibus:
Unicum quem clamat eſſe civium gratiſſimum.
Pergamus cum Co, ſuos poſt maximos Antitiſtes,
Quem ſimul ſuo cupit tenere contubernio
Africæ gens Maura terræ non medentium ultima,
Et ſimul ſuo gregi adſcribit Senex Ægyptius,
Quemq; Teuto, Gallus, Anglus cum Trionis ſeptimæ
Subdito, certante voto, deperibant, Finnone

Docte

Docte Vir, Schrödere, quem non tangit incantatio,
Seculi abhorrentis illa, Trismegistus quæ senex,
Quæ vel accuratior recentium ætas addidit
Spargyrum, eruditiori diffecandi pharmaca
Arte, mactæ perge, non de more proletarii
Ordinis medentium, Soli Tharicho, carnibus
Post procul mensam abjici jussis, petentes pascier,
Et bonam artem qui ligant cum circinationibus
Obsitæ subscudibus rotæ molari polline.
Cumque crateis valiscis, farri condisque alveis.
Hoc enim nisu accipis Viri Sophi præconium;
Hoc adempto perfstrepis ceu naufragæ navis leve
Undiquaque aplustre, cantilena Salgamarium es.

Anton. Boxbarterus, D.

Phys. Ord. Ulm.

Est locus in pratis, quâ se Tithonia Conjux
Mane novo roseis explicuit radiis.
Atque ubi se multum Scarabæa propago recepit
Ludere ad apricum Solis, ab axe iubar.
Lusus erat varius, viridi nec inutilis herba,
Qua solet hoc semper crescere multa loco.
Huc etiam horrifero sese Phlegethontis ab Antro
(Credere quis posset?) Turba ministra tulit.
Prima hic Gorgoneis Alecto infecta venenis
Venit, Tisiphone quam comitata fuit.
Tertia non segnis venit properantibus alis
Dira Megæra gravi congeminata malo.
Ventosa incipiunt subito crepitacula lingua
Exerere, & de se non nisi magna loqui.
Gloria prima fuit Furiarum, & Gloria summa,
De vitiis magnum tollere laudis opus.

*Quomodo Myriadas morborum eduxerit Orco
 Qualibet, inque homines fuderit omne malum:
 Pestiferam hac jactat tabem, immedicabile damnum,
 Hydropem dirum hac, horriferamque febrim.
 Horriferam febrim, qui morbos ab orbe creato
 Corpus in humanum se viosusque furit.
 His & Erysipelas, Phagedæna, Elephantiasisque.
 Atque dysenterix fluxus, & hexis atrox.
 Arthritis, raptæque Epilepsia Mentis, & horror
 Cordis, pleuritis, cœliacusque dolor.
 Cuncta hac Eumenidum diffusa è pyxide damna
 Humanum incipiunt sollicitare genus.
 Gloria quam vana hac, jactantiæque improba multos
 Strinxerit, inferni lurida turba probant.
 Et phlegetontæ gaudent his dotibus undæ:
 Gaudete in nihilum gaudia vestra cadent.
 Ille Berillæo tandem miserabile Tauro
 Mugiat, Eumenidum cui fera dona placent.
 Tandem ubi jam morbos alios, & plura malorum
 Pergebant Furix commemorare truces.
 Ecce, novus subito per apertas sibilus auras,
 Per nemus & virides spontè susurrat agros.
 Anne volucris erat? sed cur fera cornua frontem
 Armabant? Taurus non erat, ales erat.
 Num tibi cervina sunt cornua cognita frontis?
 Hoc etiam huic cernis cornua acuta modo.
 Hoc monstro viso, Furias stupor omnis habebat,
 Corripiunt celere per nemus omne fugam.
 Cervus at elatus naturæ viribus audax,
 Cæleste aggreditur nobilis Artis opus.
 Humana at consent illustria commoda vite,
 Corpus & ut possit, mensque valere diu:*

Pharma-

Pharmaca componit grata & Medicamina Divis,
Et quibus è Mundo damna fugare queat,
Corporis è latebris Pestem depellere tentant?
Protinus è venis pestile virus abit.
Sic age, si Schrödere tibi hinc nomenque decusque
Crescit, & aternum fama superstes erit.
Et verè inceptis volitare per ora virorum,
Portior & stygius pauper inopsque jacet;

Hoc honoris & amoris ergò votum accinit

Johann. Tilemannus, D. & Med.
Prof. Ord. Marpurg.

Ad Doctissimum Virum

D N. JOHANNEM SCHROEDERUM,
Medicinæ Doctorem, fratris filium.

Ingenii profers dotes, ostendis & artem,
Herbarum Vires tradere quando studes.
Dumq; Metallorum naturas ordine tractas,
Abdita quæ multis multa patere facis.
Hinc poterunt rectè varios sanare dolores,
Hinc herbas morbis rectè adhibere scient.
Hoc Agnate modo clarissime perge, sequentur
Perdulces fructus, pramia, fama, decus.
Non inhonorus eris, non deficiente crumenâ
Assiduâ passim dote celebris eris.

Georgius Schroëderus, Reip. Salis
Ufflenianæ Consul, Authoris Patruus.

EX scriptis Schrædere tuis, cùm vidit Apollo
Ingenii dotes, mentis miratus acumen,
Dixit, æternâ jubeo dignissima cedro;

Quicquid enim occultuere alii, hoc ipsum omne revelat,
Naturæque aperit mirâ brevitate recessus,
Conclusumque tenet recto rerum ordine junctim.
Quicquid habent Arabum clarissima lumina, Crinas,
Almanfor, Mesues, Avicenna, Salemnia, Zocha.
Quicquid & Hippocrates, Mithridates, quicquid & Hermes,
Quicquid & Eûclides, quid Chiron, quidque Machaon,
Quicquid & Hartmannus, quicquid Sennertus acutus,
Crollius, ac alii Chymico splendore corulci,
Quorum indefessos est admirata labores,
Hoc nostro sæcunda parens Germania seclo,
Quicquid habent, inquit, sparsim, congestit in unum.
Atque suas Lahhesi leges indagine mentis
Solerti sanxit, pulsâ formidine fati:
Hæc fando, æterno ditavit marmore nomen.
Ergò mihi vivas nostræ pars altera vitæ
Faucibus ex orci quam tu, Schrödere, reduxit,
Vive tibi que tuis, totumque viresce per orbem.

*Merita gratitudinis & amoris monumentum posuit
Mæno-Francofurti*

Joannes Guilielmus Hochstatt/D.
Phys. ord. ibidem.

Ad Clarissimum & Doctissimum

D. N. JOHANNEM SCHRÖDERUM,
Med. D. præstantissimum, denuò suam Pharmacopœiam
edentem

Anagrammatatitia.

I.

Ὁ Ἰωάννης Σχρόδερ.

Ἀναγραμματικῶς:

Ἄνθρ' οὖν χαίς ἐγγύω.

NΑί σε τὸν ἱατρὸν πολυίδεα ΣΧΡΟΪΔΕΡΕ, εἶναι
 Σε τοδὶ μαρτυρεῖ, βίβλιον ἀτρεκέως.
 Ἄνθον γὰρ χόρτων καὶ κάρπων, ἠδὲ μετάλλων
 Ἰατροῖς φαίνει φάρμακα πάντα σοφοῖς.
 ΔΗΝ δ' ἐν ΝΟΪΣ ΕἸΡΡΩΣΟ ΧΟΪΣ, ἠδ' εὐτυχεῖ αἶεν,
 Ὅπως ἰαῖσθαι αἰσθενῇ ἀνδρα δύνῃ.

II.

Joannes Schröderus Uflenienſis Medicinæ Doct̃or.

Ἀνάγρ.

Chare doct̃is medicis, anne venis? Visn? odore flores.

CHARE vir, & DOCTIS MEDICIS celeberrime Doct̃or
 ANNE VENIS cl̃arus Martis & artis ope?
 Mars medicum te coluit quondam? at nobilis ars nunc
 Te laudis titulo nobiliore beat.
 Idque opus hoc medicum probat: En UNUS Ne peritè
 Omnia, quæ medicis sunt meditanda viris?
 Hinc celebris medicus meritò nunc plaudis & audis,
 Et scripti FLORES hujus ODORE tui.

III.

Johannes Schröderus Uflenianus Medicinæ Doct̃or.

Ἀνάγρ.

En es sicut rosa odora, nunc in medica flores: indue.

EN de roſis dum ſcribis, atque floribus,
 Schrødere Doct̃or, cæteris,
ES Literatis omnibus SICUT ROSA
 ODORA in horto florido.
ET NUNC IN arte MEDICA ubique nomine
 FLORES tuo clarissimo.
 Sic perge libros ſcribere, & ſic INDUE
 Scriptis tuis doct̃issimis.
 Celebre nomen atque talem gloriam,
 Quæ apud futuros poſteros

Florebit & tibi virebit splendide,
Dum terra picta gramine
Virebit, atque floribus vernalibus
Onabit hortos fertiles.

Joannes Loofherus Florimontanus,
Pastor Uffeniensis, & Superintendens Genera-
lis in Comitatu Lippiaco F.

Herbis; non verbis, Medicorum est, pellere morbos.
Verbis; non herbis, stolidorum est, credere corpus
Curandum! ergo abeant, abeant procul atque faceessant,
Et vetulæ, & lamix, & varium genus impostorum
Vanidicum, indoctum, quos pro medicamine verba
Protrussisse juvat, credo, Cacodæmone fretos,
Aut Erebi furiis comitatos, pellere morbos
Carminibus Circes tentantes, murmure cantus
Thessalici, orantes Erebonque Hecatenque Chaontaque:
Absint, longè absint, procul hinc: procul inde faceessant!
Herbis; non verbis curantur corporis artus:
Herbis; non verbis fiunt medicamina vita:
Herbis; non verbis fiunt unguenta saluti:
Herbis; non verbis redeunt in corpora vires.
Ergo hinc longè abeant, procul hinc; procul inde faceessant.
Verbis; non herbis qui curant corporis artus:
Verbis; non herbis quarunt medicamina vita:
Verbis; non herbis faciunt unguenta saluti:
Verbis; non herbis reparant in pristina vires.
Ergo suis cessent verbis Medicafter Apella!
Clamosus Stentor! cesset furiosus Agyrtes!
Herbis! non verbis cunctis propino salutem

M. Antonius Itterus, Gymnas.
Francofurt, P.t. Pr. Pimarius.

Ana-

Anagrammatismus.

Joannes Schröderus Medicinæ Doctor.

ERIS COUS, SIC ORNANTE DEO IN RE MEDICA.

ALter ERIS Schrödere COUS, SIC nomina reddunt,
Scripta probant ORNANTE DEO (quæ gloria major
Esse potest?) te IN RE Medica. Concertet hirundo
Cygno, aut hædus equo, si conentur tua scripta
Rodere LIVOR edax, Momusve asinus, sua nôrint
Crimina fœda prius; quid enim concertet hirundo
Cygnis, aut facere tremulis forte artibus hædus
Consimile in cursu poterit quam fortis equi vis?

*Pharmacopœam Medico-Chymicam Excellentissimi & Ex-
perientissimi Viri Dn. D. Schröderi anagrammate hoc
ex temporaneo condecorare lubens & meritis volui Fran-
cof. 8. (18.) Sept. Anno 1641.*

Balthasar Stutenius,
Medicus Bilsfeld.

Non nobis solum nati sumus (optimus inter
Romanos Cicero monuit). sed vindicat ortus de off. l. i.
Patria mox nostri partem, partemque Parentes
Partem fidus amor quos nobis junxit, Amici.
Et velut in terris, qua progignuntur, ad usum
Proveniunt hominum; sic magnus Conditor orbis
Ob genus humanum mortales condidit ipsos,
Alter ut alterius posset relevare labores.
Quò nos ergo parens ducit natura, sequamur.
Omnibus officiis mutuo prodesse, hominumque
Inter nos homines studium, nunc artibus ipsis,
Nunc operâ, nostrisque bonis vincere parati.
Hoc monitum observans, Clarissimus arte medendi
Schröderus, verbis, factis, scriptisque saluti

Prospici-

*Prospicit agrorum: testatur id optima praxis,
 Testatur medicum, quod nobis arte volumen
 Conscriptum dederat magna: nunc auctius ipsum
 Cum videat lucem, merito latamur & illi
 Qui dedit, immensas pro tanto munere grates
 Solvimus, atque suam multos producat ad annos
 Nestoris, optamus vitam, quo premia digna
 Accipiat studio, multumque salubria dictans,
 Pluribus auxilium praestet, vel praebeat Orbi
 Exemplum, mutuo potius vigiletur ut agris
 Consensu, in partes quam divellamur inique.*

f.

Joann. Pfautz, D.



CHA-

Qui in Pharmacopœia Medico-Chymica

✠	Chalybs
✠	Cineres
XX	Cinnabaris
○	Cornu cervi
✠	Crucibulum
āāā	Cuprum
ā ā ā	Destillare
8	Dies
▽	Drachma
∇	Ferrum
∇	Gemini
↘	Hora
✠	Ignis
☾	Jupiter
♂	Leo
∇	Libra
○	Libra
○	Luna
○	Mars
B.	Mercurius
MB	Mercurius sublimatus
VB	Mercurius precipitatus
C.	Mensis
☿	Nurum
☿	Oleum
♄	Oppositio
♓	Pisces

A Cetum
Acetum destillatum.
Alembicus
Alumen
Amphora
Amalgama
Ana
Antimonium
Aqua
Aqua fortis.
Aqua Regia, Sizzia
Arcitenens
Arena
Argentum.
Argentum Vivum
Aries
Arsenicum
Auripigmentum
Aurum.
Balneum
Balneum Maria, s. Maris
Balneum Vaporis, s. Roris
Calx
Calx viva
Cancer
Caper
Caput mortuum.

Plumbum

Plumbum
Pulvis
Præcipitare
Quadratus
Quinta Essentia
Retorta
Sal Armoniacum
Sal commune
Sal Gemma
Sal Nitrum
Saturnus
Scorpius
Sextilis
Sol

☉(o)☉

H Spiritus
 ☿ Spiritus Vini
 ♀ Stannum
 □ Stratum superstratum
 Q. E. Sublimare
 ♀ Talcum
 * Taurus
 ☿ Trigonus
 ♀ Venus
 ☿ Vinum
 H Virgo
 ♀ Virid. Aeris
 * Vitriolum
 ☉ Urina

☿ Sp.
 ♀
 S. S. S.
 ♀
 X
 ☿
 Δ
 ♀
 V.
 ♀
 ☉
 ☉
 ☉



Synō.

SYNOPSIS PHARMACOPOEIAE MEDICO-CHYMICÆ.

Pharmacopœia { 1. *Isagoge*. agit de Rebus medicinalibus in genere.
Medico-Chy- { 2. *Officina*. R. medicinalium classes officinales exhibet.
mica habet li- { 3. *Mineralogia*. de Mineralibus tractat.
bros 5. quorū { 4. *Phytologia*. de Vegetabilibus.
 { 5. *Zoologia*. de Animalibus.

Liber I. de Isagoge.

Isagoge ex- { *Objectum* { c. 2. *Nativa*. Acetum, Acini, Adeps, Alabaſtri, Anthera,
hibet ge- { quod Res { Apices, Aqua, Arbor, Aroma, Arilli, Axungia, Bacca,
neraliter { medica- { Bitumen. Cacumen, Calyx, &c.
Pharmac. { tum { 3. *Preparata*. Aceta, Alcohol, Amalgama, Anacollema,
 { { Apozema, Apophlegmatismus, Arcanum. Bacilli,
 { { Balani, Balneum, Balsamus, Bolus. Calx, &c.

Modum tractandi. qui est I. *Conſtitutio*. II. *Uſurpatio*. III. *Signatio*.

I. <i>Conſtitutionis</i> membra ſunt.	1. <i>Pro- du- ctio</i> .	Nativa Cujus	Circumſtantia 7.	5. <i>Principia Eſſentialia</i> : Spiritus. Corpus. Vita, 6. { 2. <i>Intern. Natura Universalis & Particularis</i> , { i.e. innata Inclination & facultas emergendi. { <i>Primaria</i> . Natura operatrix. { <i>Secundaria</i> { <i>Elementales</i> . cal. frig. hum. ſiccit. { ſc. media { ad produ- 8. <i>Salina</i> . { ctionē fa- 9. <i>Peculia-</i> { <i>Universalio-</i> { <i>Plane-</i> { ciantia: in- res proprie- ris in quib. tarum, { his excel- tates. ſcil. excellunt Aſteri- { lunt Qua- Sympa- Influentiæ ſmorū. { litates ſeu thia & An- { Facultates. tipathia. 10. <i>Particulares</i> .			
					11. 3. <i>Materia</i> : Semen & Nutrimētum.		
					12. 4. <i>Tempus</i> .		
					13. 5. <i>Locus, Terra & Aqua</i> . (rare, &c.		
					Artifi- cialis cujus	Circumſtantia 4.	14. <i>Species</i> . Acuere, amalgamare, calcinare, candiſare, cemen-
							1. 15. <i>Principia Chymica</i> . ⊖. Sulph. ☿. ♀. ♀. & ☿.
							2. 16. { <i>Intern. Materia</i> aptitudo & facultas operativa.
							3. 17. <i>Ex-</i> { <i>Primaria</i> Pharmacopœus { <i>Secun-</i> { <i>Elementales</i> . Calor { <i>daria</i> { Qualitates { 18. <i>Salina</i> . 20. { 21. <i>Mat.</i> { 19. <i>Instrumenta</i> ad quæ & Fornax. { 22. <i>Tempus & Locus</i> . { 2. Col-

				Ætatis			
		Rei colligendæ aptitudine idque ratione		Turgescen- & periodicæ			
2. Col- lectio- nis	Tem- pus sumi- tur à	Constitutione Macrocosmi- ca secundum	Qualitates Ele- mentares, sic optimum col- ligendi tempus.	1. Moderate frigidum & siccum: serenum. 2. Balsamicum 3. Lunæ decrescens 4. Matutinum 5. Autumnale.			
			Influentias, sic optimum col- lig. tempus.	1. Fortificatum fortitudinib. Planetæ sympathi- ci vel hujus amici ☉ is aut ☾ 2. Fortific. fortitudine signi Zodiaci, quod præ- est membro medicando.			
			Modus colli- gendi qui	Tractione sursum deorsumve. Situs colligentis ad Meridiem Orientem, Septentrionem, &c.			
			Tempus sumitur à	Duratione: Hinc Res ne ultra terminum durationis asservantur.			
3. Af- serva- tionis.	Locus qui	in genere	Domicili ratione,	eligatur purus, sublimis, siccus, pervius, spectans septen- trionem vel meridiem, &c.			
		in specie ratione vaforum. Hæc adhibentor pro rei, exigentia, ut faciant ad rei inte- gritatem tuendam.					
		Modus adaptandi. Hinc Res asservatur ut corruptio quantum potest arceatur.					
		Vires, Sic Medic. est Astringens. Adur. Alexiter. &c.					
II Vurpationis circum- stantiæ sunt	Modus Vrendi	Intern.	fit potando, lingendo, masticando, deglutendo.				
		Extern.	fit inungendo, emplassando, catapl. irrigando, lavando vel simplici impositione fovendo.				
		Formula.	Intern.	Liquidiores Apoz. Emuls. infus. Julap. Potiones. Paulo crassiores: Syrupi. Eclegm. Elect. Boli Solidiores; Troch. Pulver. Rotul. Morful. Pilulæ, &c.			
			Extern.	Liquid. ∇. ○. Epithm. Clyster. Crass. Linimenta (Balsami) Unguenta. Durius. cerota, Empl. catapl. sacculi, &c.			
	Dosis	Alterantium. Purgantium.					
III: Signa- tionis.	Fon- tes	Inherentia Antecedent. Consequent.	caq; con- side- rata sunt	Sim- plici- ter & sunt	Qualitates sensiles, & Figura: Ætas Sexus Antec. 1. Agens. 2. Object. 3. Actio. 4. Locus. 5. Tem- pus. Conseq. 1. Nom. 2. Testimon. 3. Effect. 4. Factiones. Experi- (entia: Comparativè & est Similitudo rerum.		
	Appli- catio ad in- vestig. Ren.	Bonitatem. Hinc Res bonæ censentur quarum sapor, odor, color, crassities, tenuitas, soliditas, raritas, durities, mollities, gravitas, levitas, &c. sin. sese habent: qua- rumque productio, collectio, asservatio rite perfecta est.	Vires	Manifestiores; Occultiores.			



L I B E R II.
DE
O F F I C I N A.
Officinalia sunt tum Nativa tum Preparata.
Nativa sunt.

- c. 2. Terra.
3. Aqua.
11. Mineral. { 4. Lapidēs.
5. Metalla.
6. Salia.
7. Sulphurea.
8. Aromata.
9. Cortices.
10. Flores.
11. Folia s. Herba.
12. Fructus.
13. Fungi.
14. Ligna & Viscā.
15. Radices.
16. Semina.
17. Succi.
18. Olea & Balsama.
19. Resina.
20. Gummi-Resina.
21. Gummata.
22. Integra.
23. Partes carnosae.
24. Membranosae.
25. Cornua.
26. Ossa.
27. Crustacea s. Testacea.
28. Lapilli.
2. Vegetabil. {
3. Animal. {

29. *Lac & Serum.*
 30. *Fella.*
 31. *Medulla.*
 32. *Pinguedines.*
 33. *Sanguis.*
 34. *Seva.*
 35. *Stercora & Urina.*
 36. *Ungues & coagula.*

Preparata.

37. *Aceta.* 1. Alexiac. 2. Bezoardic. 3. Prophylastic. 4. Rutac.
 Simplic.
 Compos. 1. Anhalt. 2. Aperbiv. 3. 4. Apoplect. 5. Asthmatic. 6. Ca-
 ritunc. 7. Carminativ. 8. 9. Cephal. 10. Ophthal. 11. Cord. H.S.
 38. *Aqua still.* calid. 12. frig. 13. Damascen. 14. Diuretica. 15. Febrif. 16.
 Hyster. 17. Lavend. 18. Magnanimit. 19. Nephrit. 20. Philo-
 soph. 21. 22. Pectoral. 23. Picar. 24. Salv. 25. Splenet. 26. contra
 Trem. 27. 28. Theriacal. 29. de Trib. 30. Tristantis. 31. vitæ Mul.
 32. Virtutum. 33. Vomitiva.
 39. *Aq. mixt.* 1. 2. 3. 4. 5. Ophthalmic. 6. Perlar. 7. Lac. virg. 8. caustica.
 40. *Balsami odorifer.* 1. 2. 3. Apoplect.
 41. *Balsam.* destill. 1. B. vitæ. 2. nervinus. 3. anthiarthriticus. 4. Saxonis.
 42. *Boli.*
 43. *Calces.*
 44. *Caraplastm.* 1. Resolutiv. 2. cont. Cruorem. 3. de nido hirund. 4. Anacollem;
 5. Sinapism. 6. vesicator.
 45. *Clysteres.*
 46. *Condit.*
 47. *Confection.*
 48. *Conserv.*
 49. *Decoct.* 1. Alterans. 2. Epatic. 3. Epatis vituli. 4. Hysteric. 5. Majal. 9. Pur-
 gans. 7. Splenis bovis.
 50. *Loch.* 1. de Cassia. 2. Passulatum.
 51. *Electuar.* *Alter.* 1. Pseudo acori. 2. alexiph. 3. de Gicon. 4. de allio. 5. Cam-
 phor. 6. Chalyb. 7. Corrob. 8. Cordial. 9. de Croco. 10. Nu-
 cum. 11. Regum. 12. Scorbatic.
 Purg. 1. Diasar. Fern. 2. Gale. 3.

52. *Elyxir*. 1. Citri. 2. Camphoræ. 3. 4. 5. Epilept. 6. Pestilential. 7. Nephritic.
53. *Emplastr*. 1. Arthrit. 2. Cephal. 3. Diaphor. 4. ad Fontic. 5. Gummat. 6. Magnetic. 7. Mundificat. 8. 9. Opodeld. 9. 10. 11. 12. Splen. & cerer. 14. Dialuph. 15. de Tacamahac. 16. vesicator. 17. Dropac.
54. *Emulsion*.
55. *Errhina*. 1. Cratonis. 2. Montan. 3. de Spina.
56. *Epihemata*. 1. cordial. 2. Epatic. 3. febrile.
57. *Extract.* { *Alterant*. 1. Bezoard. 2. Pestilent. 3. pulmon. 4. Theriacæ. 5. Ther. benedict. 6. Th. coelest. *Purgant*. 1. Benedict. 2. 3. 4. Catholic. 5. 6. Panchymag.
58. *Farina*.
59. *Fecula*.
60. *Flores*.
61. *Gargarismi*. Diaclysmata. Dentifricia.
62. *Gelatina*.
63. *Infusiones*. 1. Vina. 2. arthrit. 3. splenet. 4. matricale. 5. purgans. 6. claret. laxat. 7. Hippocrat. & iale.
64. *Lulebi*. Moreti. 1. pro ditiorib. 2. pro pauperib.
65. *Lapides*. 1. Corrosiv. 2. O-Olis. 3. 4. 5. 6. salutis. 7. mirabilis. 8. rubeus.
66. *Liquores*. Liquor lithontripticus.
67. *Magisteria*.
68. *Masticatoria*.
69. *Morselli*. 1. de Citro. 2. Pectorales. 3. Rotulæ.
70. *Olea stillat.*
71. *Olea express.*
72. *Olea cocta*. 1. simplicia. 2. composita.
73. *Potiones*. 1. 2. Purgant. 3. 4. sudorif.
74. *Pilula*. { *Alterant*. 1. Febril. 2. Narcor. 3. cont. Tuss. *Purgant*. 1. de Ammon. 2. Bened. 3. Cholag. 4. de Esula. 5. de Euphorb. 6. 7. Febril. 8. Hydrop. 9. Iliac. 10. de Ladano. 11. Marocost. 12. Panchymag. 13. de Sagap. 14. de Succin. 15. 16. 17. Tartareæ.
75. *Poma Ambra*. 1. 2. 3. 4.
76. *Preparata*.
77. *Pulv. & Spec.* { *Alter*. 1. 2. Bezoard. 3. Cachect. 4. de Cypr. 5. Dentifr. 6. contra dest. 7. Dysenter. 8. 9. Antiopil. 10. Febril. 11. Fortis. 12. Grossus. 13. Hepatic. 14. Hyster. 15. Nephrit. 16. Spertiolæ. 17. Stomach. 18. Tritheim. 19. Spec.

19. Spec. Cephal. 20. Diacubeb. 21. Sal. philos. 22. Sacerd.
Purg. 1. Arthet. 2. Cholag. 3. Cornach. 4. Melanog. 5. Pan-
 chym. 6. Passav. 7. 8. Phlegmag.
78. *Sacculi.* 1. stomach. 2. cordial. 3. nephritic. 4. cephalic.
79. *Salia.* 1. Alkali. 2. Alembrot. Anatron. 4. Borrax.
80. *Sapo.* 1. Sapo moschatus. 2. alius.
81. *Spiritus.* 1. Minerales. 2. Vegetabiles. 3. Animales. (qui minus usitati.)
82. *Succi.* 1. Liquidi. 2. inspissati. Huc, *Rob.* & *Mella simplicia.*
83. *Suppositor.* Pelli.
84. *Syrup. Mella. Rob.* { *Alterant.* 1. Syr. anis. 2. antepil. 3. de Artem. 4. cardias. 5. corall. 6. de Erysim. 7. 8. Nicot. 9. de Hispid. 10. de Testudin.
Purgant. 1. Helleb. min. 2. cholag. 3. vomit. 4. Oxyf. vomit.
85. *Tinctura.* 1. è mineral. 2. & vegetab. 3. ex animalib.
86. *Trochisci* { *Alter.* 1. Alexic. 2. 3. profumo. 4. Moschard. 5. pectoral. 6. pro-
 phylactici. Huc collyria.
Purg.
87. *Bals. linim. ung.* 1. B. Hisp. 2. 3. vulner. 4. uter. 5. lin. 6. ni. 6. de Amiant. 7. Den-
 tifr. 8. Errhin. 9. ung. Podagr. 10. cardiac. 11. cordial. 12. ophthalm.
 13. splenet. 14. Sympath. 15. Terebiath.

LIBER III. DE MINERALOGIA.

*Mineralia medicamentalia sunt I. Terra II. Aqua. III. Lapides.
 IV. Mercurialia. V. Salina. VI. Sulphurea.*

I [cap. 1. 2.] TERRIS competit; 1. *Lotio.* 2. *Preparatio.* 3. *Præcipitatio.* 4. *De-
 stillatio.* Hinc officinalis.

1. *Terra sigillat.* { *Nativa specie,* Hæc 1. Terr. Turcica. 2. Melitea. 3. Germanica.
 sc. Lignicensis, Strigenfis, Labacensis.
in *Prepar.* Quæ 1. Terr. sigill. præparat. 2. Magist. 3. —, simplex.
 2. cum Vino. 3. alcalisatus.

2. *Boli.* { *Nat.* 1. Bolus Armen. ver. 2. Germanic.
Pr. Bol. præparat. 2. Magist.

Hinc 3. *Creta.* 4. *Marga.* 5. *Ochra.* 6. *Rubrica.* 7. *Tripolis.*

II. [c. 3.] AQUIS: Purificatio. 2. Destillatio. 3. Inspissatio. Hinc.

1. aqua

1. *Aquarum simplic.* { N. 1. ∇ font. 2. puteal. 3. fluvial. 4. palustr. 5. pluv. 6. nivea.
7. Ros.
P. 1. ∇ destillat. 2. f. Essentia. 3. Sal.

2. *Aque minerales.*

III. [c. 4.] *LAPIDIBUS* 1. Pulverisatio. 2. Calcinatio. 3. Solutio. 4. Li-
quatio. 5. Volatilisatio. 6. Syrupisatio.

Hinc 1. Gemmæ præparat. 2. \ominus 3. Magist. 4. ol. f. liquor. 5. Tinctura f. Ess. 6.
ol. destillat. 7. Syrup.

[c. 5.] Hinc usuales Gemmæ videlicet.

1. *Chrysolithus.*

2. *Granat.* 1. præpar. 2. Magist.

3. *Hyacinth.* 1. præpar. 2. Sal. 3. Magist.

4. *Lap. Nephriticus.*

5. *Rubin.* præpar.

6. *Sapphirus* 1. præpar. 2. Sal. 3. Liquor. 4. Ess. f. Tinctura.

7. *Sard.* præpar.

8. *Smaragd.* 1. præpar. 2. \ominus 3. Tinct.

{ N. 1. Rubr. 2. Alb.

[c. 6.] *Corall.* { P. 1. præpar. 2. \ominus 3. Magist. [3.] 4. ol. f. Liq. 5. Ess. f. Tinct.
[N^o. 12.] 6. Flores. 7. Spiritus. f. olea. [N. 4.] 8. Syrup.

[c. 7.] *Margarit.* præpar. 1. ext. 2. Sal. 3. Mag. [N. 3.] 4. ol. f. liquor. 5. Ess. f.
Tinct. [3.] 5. Flor. 6. Syrup.

[c. 8.] *LAPIDES MINUS PRECIOSI. videlicet.*

1. *Ætites.*

2. *Alabastrites.* in Ung. Alabastrino.

3. *Amianth.* præpar. 1. Ung. Citrin. 2. Liniment. ad Tin.

4. *Lap. Armenus.* præpar. 1. Lap. totus. 2. pilul. de L. A. 3. Magist.

5. *L. Calcarius.* præpar. 1. calx viva. 2. c. lota. 3. Lixivium. 4. spir. 5. spir. alcali-
lisat.

6. *L. Calaminar.* præpar. emplastr. è lap. calam.

7. *Calculus human.* præpar. 1. sal. 2. ol. f. Liq. 3. Elixyr.

8. *CrySTALL.* præpar. 1. Cryst. præparat. 2. \ominus 3. Mag. 4. ol. p. d. 5. Elix. 6. El-
sent.

9. *Hematit.* præpar. Hæm. præparat.

10. *L. Judaic.* præpar. 1. L. Jud. præparat. 2. \ominus 3. Mag. 4. Elixyr. 5. ol. p. d.

11. *L. Lazuli.* præpar. 1. L. L. totus. 2. Mag. 3. Elixyr. 4. El. 5. ol. p. d. 6. Essent.

12. *L. Lyncis.*

13. *Magnes.* præpar. Ung. magnetic.

14. *Marmor.*

15. *Ostiocolla.* PP. Ostioc. ppt.

16. *Pumex.* præpar. Pumex ustus.

17. *L. Specularis.* præpar. calx & liquor.

18. *Silex.* præpar. 1. \ominus . 2. Ol. p. d.

19. *L. Spongia.* præpar. Sal.

20. *Talcum.* præpar. 1. Ol. dest. 2. ol. camphoræ talcat. 3. Liq. 4. Tinct.

21. *Unicornis fossile.*

IV. Mercurialia sunt. 1. *Metalla.* 2. *Metallis finitima.* 3. *Metallica Excrementa.*

I. METALLA sunt.

1. *Purgat.* 1. per Calcin. 2. per Fusion. cum δ vel H 4. per Cement.
2. *Calcinat.* 1. per Immerf. unde \odot sclop. & diaph. 2. Vapor. 3. ãã . 4. Cement. 5. Reverb.
3. *Volatilif.* unde \odot spiritualis.
4. *Extract.* unde \odot potab. f. Tinct. (Nº. 16.)
5. *Sublimat.* unde Flor. \odot is.
6. *Salificat.* unde \ominus . \odot is (Nº. 3.)
7. *Mercurific.* unde δ .
1. *Purgat.* 1. per calc. 2. per Fus. c. H . 3. per \odot .
2. *Calcinat.* 1. Immerf. 2. per ãã . 3. Reverb.
3. *Extract.* f. solut. unde C & potab. & Tinct. (Nº. 5.)
4. *Salificat.* \ominus .
1. *Purgat.* unde Chalybs.
2. *Calcin.* 1. Reverb. Croc. δ obstr. 2. Fus. Cr. δ aper. 3. Cem. H . 4. Immerf. unde Crystall. 5. Vapor. 6. Illinit.
3. *Volatilif.* ac destill. unde 1. ∇ δ 2. Spir. 3. ol. rubr. 4. ol. Sulph
5. Spir. H i \odot is.
4. *Extract.* unde Tinct. (Nº. 10.)
5. *Sublimat.* Hinc Flores. (Nº. 2.)
6. *Salific.* \ominus vel H -m. (Nº. 5.)
7. *Liquat.*
1. *Purific.*
2. *Calcin.* 1. Reverb. 2. Immerf. 3. Vapor. 4. Illinit. 5. Cement. (è quibus singulis Croc. δ is.
3. *Extract.* unde Tinct. (Nº. 3.)
4. *Salif.* unde \ominus . (Nº. 3.)
1. *Purif.*

2. *Calci.*

H
Plumb.
(c.13.)

2. *Calcin.* 1. Inciner. 2. Reverb. (unde Minium) 3. Cement. (in H usto.)
4. Immerf. (1. Sacchar. f. \ominus H. 2. Mag. 3. Lac H i) (4. Vaporof. unde cerufa.
3. *Destill.* unde 1. Sp. ardens. 2. ol. flav. 3. rub. 4. Balf.
4. *Extract.* unde 1. Sulph. 2. 3. 4. 5. Tinctur.
5. *Mercurific.* unde \otimes H i 1. 2. 3.
6. *Salificat.* unde \ominus verum.
7. Huc. *Liquatio.*

Z
Stann.
(c.14.)

1. *Purgat.*
2. *Calcinat.* 1. Inciner. 2. Reverb. 3. Immerf. unde \ominus & Mag. 4. Vapor.
3. *Destillat.* unde 1. \mathbb{Z} Diaphoreticus. 2. Sulph. seu ol.
4. *Sublimat.* unde Flores f. \mathbb{Z} depuratus.
5. *Extract.* unde Tinct.
6. *Salificat.* unde \ominus verum.

METALLIS FINITIMA SUNT.

☿
I. Merc.
(c.15.)

1. *Purgat.* 1. Expressione. 2. Lotione. 3. \mathcal{Q} uone.
2. *Calcinatio* f. precipitat. unde precipit.

<p><i>Sine Metallis.</i> 1. per se 2. per filices. 3. per Sulph. 4. per ol. Sulph. 5. per ol. \oplus i. 6. per sp. \oplus i. (\otimes ius corollatus) 7. per ∇ ovor. 8. per Smirid. (\mathcal{Q} i. miraculosus.) 9. in ∇. (\mathcal{Q} ius communis.) 10. \mathcal{Q} i. incarnatus. 11. \mathcal{Q} i. lutus. 12. \mathcal{Q} i. fixus. 13. \mathcal{Q} i. egregius.</p>	<p><i>Cum Metallis.</i> 1. \mathcal{Q} i. \ominus ris. 2. regulinus f. diaphoret. 3. Hercules Bovii. 4. f. Aurum vitæ. 6. \mathcal{Q} i. viridis. 7. vitrum \mathcal{Q} ii \mathcal{Q} x. 8. Succinum \mathcal{Q} ii.</p>
---	---
3. *Sublimat.* unde 1. \otimes \mathcal{Q} i. officinar. 2. aliter. 3. \mathcal{Q} i. regulinus. 4. \otimes dulcis (Draco mitigatus.) 5. alius. 6. \otimes \mathcal{Q} i. rubeus (Arc. corallinum) 7. Laudanum \otimes iale. 8. Manna \otimes ii (\otimes dulc. \ominus ris) 9. cinnabaris offic.

4. Destill. unde

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Butyrum \otimes ii f. oleum \otimes ii glaciale è quo 2. Ol. \otimes alb. diaphor. 3. rubrum. 4. diaphor. | <ol style="list-style-type: none"> 1. \otimes vitæ qui correctus. 1. \otimes vitæ corr. 2. \otimes vit. cathart. 3. Laxativ. minerale. 2. Bezoardica miner. 1. Bezoart. min. simplex. 2. \ominus re compos. 3. \ominus re croll. 4. \ominus re verum 5. 6. 7. 8. Bez. \mathcal{Q} ria. 9. B. \otimes reum. 10. B. \otimes le. 11. B. \mathcal{Q} iale. 12. B. H num. 13. B. \otimes iale. |
|---|---|

5. *Extract.* unde 1. Sulph. C. Tinct. [Aquila cœlest.] 2. alia. 3. ol. ☿ ii ☿ ialis.
 6. *Liquat.* unde 1. 2. 3. Liquor. 4. ☿ ☿. diaph. dulce. 5. liq. Jovialis.
 7. *Salificat.* unde ☉.

II. *Cinnabaris. Præcipitata diaphoretica.*

[c.16.]

1. *Viura.* 1. Hyacinth. 2. è Minera. 3. flav.
 4. rubr. 5. alb. 6. diaphoret. 7. Regul.
 8. ☉. 9. Regulin. Hinc corre-
 ction. N. 5.
 Sicc. unde
 2. *Croci.* 1. vulg. 2. Ruland. 3. Brendel.
 3. *Diaphoretic.* 1. vulgar. 2. Flores dicti fixi.
 3. Diaph. Tartarifat. 4. *Reguli.* 1. simpl. 2. ☿ alis. 3. ☿ alis. 4. ☉ ris.
 5. cerusa. 6. cerusa ☉ ris.

Humid. unde *Præcipitata.* 1. ☿. Rub. fix. 2. ☿ vitrum.
 3. ☿ diaphoret. 4. ☿ Regul.

5. *Sublimat.* unde Flores. 1. è Minera. 2. Reguli. 3. Compos. 4.
 Sulph. ☿ ii. 5. Fl. ☉ ati. 6. Fl. ☉. ☿. 7. diaphoret. 8. fixi. [cheiri] 9.
 cinnabaris.

3. *Destill.* unde
 ☿ ii. 2. 3. ☿ per se. 4. 5. 6. 7. Saccharat. 8. ☿ melli-
 tum. 9. Magist. ☿ ii. 10. 11. ol. Glaciale. 12. de crystall.
 13. 14. ol. ad vulnera. 15. Balf. ☿ ii. 16. Balf. vuln. 17.
 ☿ ex Reg. 18. ☿. antepil. 19. ☿ stimmi Sulph. 20.
 ☿ ft. Tartarea.

III. *Antimon.*

[c.17.]

7. *Liquat.* unde 1. Balsamus è scoriis Reg. 2. Liq. ex Sale vitri.
 Sulphura 1. 2. è minera. 3. 4. ex ☿. calc. 5. ex croc. 6. è
 scoriis Reg. (Sulph. auratum.
 Tincturæ. 1. ex ☿ crud. 2. 3. Balf. vitæ. 4. Manna. 5. Mag.
 ☿ ii. ol. vitri. 6. 7. 8. ex vitro. 9. 10. ex croco. 11.
 ☿ Tartarifat. 12. Rubin. ☿ ☿ lis. 13. ex Reg.
 Antid. pantagogus. 14. Balf. Reguli. 15. 16. ex ☿
 c. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. è florib. 24. ex ol. ☿. 25.
 26. 27. 28. è Sulph. ☿ ii. 29. è ☿ ☿ ii. 30. è ☉ ☿.
 31. Lapis Δ is.

6. *Infus.* 1. ☿. crudi. 2. 3. vitri. 4. 5. croci. 6. ☿ ophthalm. 7. Syrup.
 vomit. 8. Vin. Hippocr. 9. oxyfacchar. vom. 10. spir. vitæ au-
 reus.

7. *Salific.* unde ☉ 1. 2. 3.

8. *Mercurif.* unde ☿ ius.

RECRE-

RECREMENTA METALLICA

sunt Naturalia & Artificialia.

Naturalia sunt.

1. Cobaltum.
2. Chalcitis.
3. Misy.
4. Sory.
5. Marcassia f. { 1. Calcin. unde Magist.
Bismuthum { 2. Destillat & Sublimat. unde ol. ☉ Flor. ∇.

Recrementa Metallorum artificialia sunt.

- [c.19.] { Nativ. { Metallica V. cobaltum.
I. Cadmia { Metall. experts V. Lap. calaminaris.
Factit. quæ Botritis, capnitis, calamitis. præp. 1. Tutra 2. collyr. alb.
3. Ung. 4. Empl. de Lap. calaminari.
2. Diphryges.
3. Lithargyrium. præp. 1. ☉. 2. Magist. 3. ol. rub. 4. Tinct. 5. Bals. 6. Liquor.
4. Molybdana. f. Plumbago.
5. Tutia f. Pompholyx & Spodium. præp. 1. Tutia lota. 2. Ung. nihili. 3. ad oculos.
4. Diapompholyg. 5. de Tutia.

V. SALINA.

- [c.20.] Salib. competit. 1. Purificatio. 2. Calcinatio. 3. Destillatio. 4. Sublimatio. 5. Fixatio. 6. Liquatio.

- [c.21.] { 1. Purific.
I. Sal. com. { 2. Calcinat.
3. Destillat. unde 1. Sp. ☉ is. 2. Sp. ☉ comp. 3. Sp. ☉ virid. 4. Corallat.
[c.22.] { 5. 6. dulcis. 7. dulc. com. 8. Cryst. ☉ dulc. f. Sp. ☉ coagulat.
9. Flores. 10. Cryst. dulc. 11. ☉ ☉ ☉ rubr.
4. Extract. unde Tinctura.
- II. Sal. fossit. præparat. 1. Spirit. 2. Balsamus.

- III. Sal. Nit. ☉ { 1. Purificat.
2. Calcinat. unde 1. Lapis Prunellæ. 2. 3. ☉ fixum. 4. Cryst. miner. faccharat. 5. ☉ perlat. 6. ☉ corallat.
3. Destillat. 1. 2. Spir. 3. cum O. 4. cum Sulph. 5. sp. ☉ bezoard. 6. ∇ caust. 7. ∇. 8. 9. ∇.
4. Extract. unde Tinctura.
- III. Alum. { 1. Purific. seu CrySTALLISAT.
O. { 2. Calcinat. seu ust.

[c. 23.] III. Alum. } 3. Salificat.
O. } 4. Destillat. unde 1. phlegma ac spiritus. 2. m̄ dulcis. 3. Magist. 4. Saccharum.

[c. 24.] IV. Ammoniac. } 1. Crystallif.
* } 2. Sublimat. unde Flores.
* } 3. Calcinat. & Fixat.
* } 4. Destillat. unde 1. 2. 3. 4. sp. *
* } 5. Liguat. unde Liquor s. oleum.

V. Vitriol. } 1. Purific. unde ⊕-m alb. vomit. 2. ⊕-m Hemetico. purg.
* } 2. Calcinat. unde Colchotar.
* } 3. Destillat. 1. Ros ⊕-i. ∇ ⊕-i 3. Phlegma ⊕-i. 4. sp. ⊕-i. volatil. 5. sp. ⊕-i vulgar. 6. 7. dulc. 8. Philosophicus. (cohob. & ii) 9. Liquor Dianæ. 10. ∇ aperiens. 11. sp. ⊕-i mellifatus. 12. diaphoretic. 13. 14. 15. 16. 17. sp. ⊕-i antepilept. 18. 19. sp. ⊕-i coagulat. Olea No. 6.
* } 4. Sublimat. unde Flores No. 3.
* } 5. Precipitat. unde 1. Terra ⊕-i. 2. Sulph. dulc. 3. Sulph. purg. 4. Sulph. (fixum).
* } 6. Salificat. unde ⊕-i.
* } 7. Exiract. 1. Extr. ⊕-i narcotic. 2. Ess. Sulphuris ⊕-i. 3. Manna ⊕-i. 4. Tinct. 5. 6. 7. 8. Magisteria.

VI. Sulphurea sunt.

I. Arsenic. } 1. Sublimat. unde ○-○ dulc. 2. Rubinus ○-○ diaphor. 3. ○-○ m̄.
[c. 27.] } 2. Fixat. s. calcinat. unde 1. ○-○ fixum & ○-○ 2. ○-○ fixum sudorif.
* } 3. Liguat. ○-○ anod. Butyrum ○-○ N°2.

II. Sulphur. } 1. Sublimat. 1. Flor. simpl. 2. ⊕-ti 3. gummati. 4. Saccharat. 5. alb. 6. corallat.
[c. 28.] } 2. Precipit. Lac Sulphuris.
* } 3. Destillat. 1. spirit. s. ol. per C. 2. ∇ acida. 3. Ens Balsami Sulphuris. 4. ol. Sulphuris. 4. ol. Sulphuris Balf. 5. ol. Sulphuris linat. 6. ol. Sulphuris pestilent. 7. ol. aur. 8. ol. rubr.
* } 4. Infus. Balf. Sulph. 2. B. vitæ. 3. B. Sulph. ad exter. 4. Tinct. Sulph.
* } 5. Ess. Sulph.

[c. 29.] III. Ambra. præparat. 1. Ess. Ambr. 2. spec. Diamb. 3. Pom. Ambr.

IV. Succin. } 1. Preparat.
* } 2. Solut. & præcip. unde Magist. Extr. Tinct
* } 3. Destill. unde ol. Phlegma. spir. ⊕-.
* } 4. Balsam.

V. Sperma Cet.

VI. Af-

71. { *Asphaltus.*
Naphtha.
Petroleum.
 71. { *Carbo Petra.*
Gagates præpar. oleum.

LIBER IV.

DE.

PHYTOLOGIA.

Class. I. de Alterantib. primariis.

1. *Abiet. alb. & rubr.* 1. Cortex. 2. Coni. 3. Resina.
2. *Alyotan.* { *Nativ. Folia.*
Præpar. 1. ∇ . still. 2. Vinum. 3. Conserv. 4. ol. infus. 5. ol. stillat.
N. 1. Folia ac 2. summitates.
3. *Absynthii.* { *P.* 1. ∇ still. 2. spir. 3. succus. 4. Vinum. 5. Tinctura. 6. conserv. 7.
vulgaris. { syr. com. 8. Troch. 9. ol. infusi 10. ol. still. 11. \odot fixum. 12.
 \odot volat.
4. *Absynth. pontic. conserv.*
5. *Acacie vera. succus.*
6. *Acacie Germanic.* { *N.* 1. Flor. 2. Fol. 3. Cort. radicum.
P. 1. ∇ stil. 2. syrup. 3. Succ. f. Rob. 4. vinum. 5. Fr. condit.
7. *Acetosa* { *N.* 1. Fol. 2. rad. 3. sem.
P. 1. ∇ ft. 2. succ. 3. syr. 4. conf.
8. *Acetosella* { *N.* Fol.
P. 1. ∇ ft. 2. syr. 3. conf.
9. *Acori veri* { *N.* 1. Rad. 2. Fol. (raro.)
P. 1. ∇ ft. è rad. 2. condit. 3. ol. ft. 4. El. Diac. 5. Extr.
10. *Acori adulter* { *N.* Rad.
P. Elect.
11. *Adiant.* { *N.* Fol.
P. 1. ∇ . 2. syr. simpl. 3. syr. comp.
12. *Adianthi aurei caulis cum foliis ac flor.*
13. *Agalloch.* { *N.* Lignum.
P. 1. Extr. 2. spec.
14. *Agerat.* { *N.* Fol. & Fl.
P. 1. syr. de Eupat. 2. Pil. 3. Troch.
15. *Agnicasti semina*

16. *Agri.*

16. *Agrimoni.* { N. Fol. & summ. it.
P. 1. ▽ still. 2. succ. 3. syr. 4. ☉.
17. *Alchimill.* { N. Folia c. caule.
P. ▽.
18. *Alkekeng.* { N. Baccæ.
P. 1. ▽ still. 2. Tinctur. 3. Troch.
19. *Allij.* { N. Radix.
P. Elect.
20. *Alfines.* Folia vel integra herba.
21. *Althæa.* { N. 1. Fol. 2. Rad. 3. Sem.
P. 1. ▽. 2. mucilag. 3. syr. Fernel. 4. Ung. simpl. 5. Ung. comp.
25. *Amaranth.* Flores.
23. *Ammeos* veri semen.
24. *Amomi* semen.
25. *Amygdal.* { N. 1. fruct. dulc. 2. nucl. amar.
P. 1. conf. dulc. 2. conf. amar. 3. ol. { dulc.
amar.
26. *Anacard.* { N. Fruct.
P. 1. Elect. f. confect. 2. mel. 3. ol. expr.
27. *Anagall.* { N. Fol. c. flor.
terrestr. { P. 1. ▽. 2. Succ.
28. *Anagall.* { N. Fol. vel integra planta.
aquat. { P. 1. ▽ 2. Succ.
29. *Aneeth.* { N. 1. Fol. 2. El. 3. Sem.
P. 1. ▽. 2. ol. infol. 3. ol. still.
30. *Angelic.* { N. Rad.
P. 1. ▽. 2. Succ. 3. Extr. 4. Condit. 5. ol. still. 6. Bals. 7. ☉.
- { N. Sem. raro herba.
31. *Anisi.* { P. 1. conf. 2. conf. laxat. simp. 3. conf. laxat. comp. 4. ▽ st. 5. ▽ vitæ. 6.
ol. still. 7. ☉. 8. spec.
32. *Anserin.* { N. Fol. vel integra planta.
P. 1. ▽ è planta 2. ▽. è fl. 3. conf.
33. *Anthora* radix.
34. *Antirrhini.* caulis cum foliis ac florib.
35. *Apij.* { N. 1. Rad. 2. Sem.
P. ▽.
36. *Aquileg.* { N. 1. Sem. 2. Fl. 3. Herb.

36. *Aquileg.* { P. 1. ▽ 2. conf. 3. Acet.

37. { *Aristoloch. rotundæ* radix.
 Aristol. long. { N. 1. Rad. 2. Fol.
 { P. ▽.

38. *Armoracia.* radix.

39. *Arnica* caulis cum florib.

40. *Artemis.* { N. summit. vel herba integra.
 { P. 1. ▽. 2. ol. still. 3. syr. C. 4. Θ.

41. *Ari.* { N. Radix.
 { P. 1. Rad. præparat. 2. Fecula. 3. pulvis stomach.

42. *Asparag.* { N. Radix.
 { P. ▽.

43. *Atriplicis* Folia.

44. *Avena.* 1. Semen. 2. Farina.

45. *Aurantia.* { N. 1. poma. 2. cort.
 { P. 1. ▽. 1. Nampha. 2. Succ. expr. 3. Syr. 4. Condit. cort. 5. cont.
 6. Elect. 7. ol. still. 8. Balf. 9. Ung.

46. *Auricul.* { N. integra planta.
 muris. { P. ▽.

B.

47. *Balani myreplicæ.* { N. Nuclei.
 { P. Oleum de Been.

48. *Balsam.* 1. fr. carpobalsamum. 2. Ramusc. Xylobalsamum. 3. ol. (opobalsamum).

49. *Bardana* major. 1. Rad. 2. Fol. 3. Sem.

50. *Bardan.* minor.

51. *Basilic.* { N. 1. Fol. 2. Sem.
 { P. ▽.

52. *Behen* album. Behen rubrum.

53. *Bellis.* { N. Herba cum flor.
 { P. ▽.

54. *Berber.* { N. Fruct. Berberes.

 { P. 1. Condit. 2. succ. liquid. 3. Syr. de f. Berb. 4. Rotul. 5. Trochisc.
 6. Rob. comp.

55. *Bet.* { N. 1. Rad. 2. Fol. 3. Sem.
 { P. Succus.

56. *Beta.*

56. *Betonic.* { N. 1. Fol. Flores.
 P. 1. ∇ . 2. conserv. 3. syr. simpl. 4. syr. comp. 5. Empl. ex Bet. 6. Θ .
57. *Betul.* { N. 1. Fol. 2. cort.
 P. Succus.
58. *Bistort.* { N. 1. Rad. 2. Fungus.
 P. ∇ .
59. *Bombac.* 1. semen. 2. Lanugo (Gossipium.
60. *Borrag.* { N. 1. Rad. 2. fol. 3. Flor.
 P. 1. ∇ extoto. 2. ∇ ex flor. 3. conserv. 4. syr. 5. succ. inspissat.
61. *Branc. urfin.* Folia.
62. *Brassic.* { N. 1. Folia. 2. jus Foliorum. 3. semen.
 P. loch. de caule.
63. *Bagloss.* { N. 1. flor. 2. Rad. 3. Fol.
 P. 1. ∇ extor. 2. ∇ de flor. 3. conserv. 4. syr.
64. *Burs. Pastor.* { N. Folia.
 P. ∇ .
62. *Buxi.* 1. oleum. 2. Extract.
66. *Calami aromatic.* folia.
67. *Calaminib.* { N. Folia.
 P. 1. ∇ . 2. Θ . 3. syr. comp. 4. spec. Diacal.
68. *Calcatripp.* { N. 1. Herba. 2. Flores.
 P. 1. ∇ . 2. Conserv.
96. *Calib.* { N. Flores.
 P. 1. ∇ . 2. 4. 3. Conserv.
70. *Cannab.* 1. semen. 2. Herba (sed raro.
71. *Cappar.* { N. Cortex. (inprimis radicis.
 P. 1. cond. flor. 2. ol. comp. 3. Troch. de capp. 4. Extr.
72. *Caprifol.* { N. Flor.
 P. ∇ .
73. *Cardamom.* { N. 1. Cardamomum. 2. Grana Paradisi.
 P. ol. still.
74. *Cardiac.* { N. Folia.
 P. 1. ∇ . 2. Unguent.
- (N. 1. Folia. 2. semen.
75. *Card. bened.* { P. 1. pulvis. 2. ∇ . 3. spir. 4. succ. 5. Θ . 6. ol. st. 7. conserv. 8.
 syr. de f. 9. Extract.
76. *Card. Maria.* { N. 1. semen. 2. Folia 3. Radix,
 P. ∇ .

77. *Carlin*, radix.

77. *Cari*. { N. Semen.
p. 1. Confect. sem. 2. condit. rad. 3. ∇ . 4. ol. still.

79. *Caryophyll*. { N. Flores.
hortens. { p. 1. Succ. 2. conserv. 3. ∇ . 4. Syr. 5. Φ .

80. *Caryophyll*. { N. Flor. 1. minores. (caryoph.) 2. majores, Antophylli.
aromat. { p. 1. Confect. 2. ∇ . 3. ol. 4. Extr. 5. Θ . 6. Balf. 7. spec. diacaryoph.

81. *Caryophyllat*. Rad.

82. *Castan*. membran.

83. *Centaurei minor*. { N. planta cum flor. 1. summitates.
p. 1. ∇ . 2. Extr. 3. Θ .

84. *Cepa* radix.

{ N. Fruct. Cerasa 1. subacida rub. (Amarenz.) 2. dulcia, nigra. 3. Nu-
clei. 4. Gummi.

85. *Cerasi*. { p. 1. Condit. 2. Rob. 3. Syr. 4. ∇ . 5. spir. 6. ∇ diuret. 7. Tinct. 8.
Diamarenat. simpl. 9. Diam. comp. 10. oleum.

86. *Carefol*. { N. 1. Folia. 2. Semen.
p. 1. ∇ . 2. Θ .

87. *Chamadr*. { N. 1. Folia. 2. Flores.
p. 1. ∇ . 2. Conserv.

88. *Chamepyl*. { N. Herba cum fol. ac flor.
p. Pilul. de iva arthetica.

{ N. Flores. vulgares & Roman.

89. *Chamomill*. { p. 1. ∇ è vulg. 2. ∇ è Rom. 3. ol. st. è vulg. 4. ol. st. è Rom. 5.
ol. inf. 6. Θ .

90. *Chelidon maj*. { N. 1. Folia c. flor. 2. Radix.
p. 1. succ. 2. ∇ . 3. Θ .

91. *Chelidon. min.* { N. 1. Rad. 2. Folia.
p. 1. ∇ . still.

92. *Chermes*. { N. Grana.
p. 1. Confect. 2. Extr. 3. Essent.

93. *Cheyri*. { N. 1. Flor. 2. Semen.
p. 1. Conserv. 2. ∇ . 3. ol.

94. *Chin*. { N. Radix.
p. Extr.

95. *Cicer*. 1. rubrum. 2. album.

96. *Cichor*. { N. 1. Flor. 2. Fol. 3. Rad.
p. 1. conserv. 2. Condit. 3. Syr. simp. 4. Syr. comp. 5. Syr. de Cich.
c. Rhab. 6. ∇ . 7. ∇ . ophthalm. 8. Θ . f 2 97.

97. *Cicut.* { N. Folia.
 P. Emplastr. splenetic.
68. *Cinamom.* { N. Cortex.
 P. 1. ∇ . 2. Tinct. 3. Elyxir. 4. ol. 5. Θ . 6. Balsam. 7. Syr. 8. Ma-
 gist. 9. spec. Diacinam.
99. *Citri.* { N. 1. poma. 2. cort. 3. Sem. 4. Flor.
 P. 1. condit. poma. 2. cond. cort. 2. conserv. ex flor. 4. conf. ex Medull.
 5. ∇ E cort. 6. ol. st. 7. succ. 8. syr. acor. c. 9. syr. citri simpl. 10.
 syr. comp. 11. Morfuli Citri. 12. Morf. citri laxat. 13. Balsam. 14.
 Elect. de Cit. solut.
100. *Citrulli.* semen.
101. *Cochlear.* { N. Folia.
 P. 1. conserv. 2. ∇ . 3. spirit. 4. syrup. 5. Θ .
102. *Colubrini.* { N. Lignum.
 ligni. P. Extract.
103. *Contrayerva.* radix.
104. *Consolid. media* Herba.
105. *Corallina* caules. f. ipsa corallina.
106. *Coriandr.* { N. Semen.
 P. 1. Sem. prap. 2. Confect. 3. ∇ . 4. ol. still.
107. *Corn.* { N. 1. poma. 2. Folia.
 P. 1. condit. 2. Rob. dec.
108. *Coryli.* { N. 1. Lignum. 2. Nuces (Avellanz.) 3. cortex nuc. 4. membra-
 nulæ.
 P. { Ex ligno. 1. spir. 2. ol. still.
 Ex Nucib. ol. express.
109. *Costi.* { N. Cort. 1. dulcis. 2. amarus.
 P. 1. ol. cost. 1. Pilul. marocost. 3. El. caryocostin.
110. *Croc.* { N. Flores.
 P. 1. spec. Diacureum. 2. Tinct. 3. Extr. 4. ol. com. 5. ol. still. 6. Troch.
 7. El. de ovo. 8. Empl. oxycroc.
111. *Cubeb.* { N. Fructus.
 P. Confect. Diacub. 2. ol. still.
112. *Cucumer.* 1. Semen. 2. Fructus.
113. *Cucurbit.* { N. 1. Semen. 2. Folia.
 P. ∇ still.
114. *Cumin.* { N. Semen.
 P. 1. ∇ . 2. ol. still. 3. spec. Diacum.

115. *Cupress.*

115. *Cupress. arboris* 1. Lignum. 2. Coni. 3. Folia.

116. *Cupress. herbæ* summitates.

117. *Curcuma.* { N. Radix.
P. Spec. Diacurc.

118. *Cuscut.* { N. integra planta cum florib.
P. ∇. still.

119. *Cyan.* { N. Flores.
P. ∇.

120. *Cyclam.* { N. Radix.
P. 1. Succus. 2. Ung. de Arthan. majus. 3. Ung. de Arthan. min.

121. *Cynogloss.* { N. 1. Flor. 2. Folia. 3. radix.
P. 1. Pil. de cynogl. 2. Unguent.

122. *Cynosbat.* { N. 1. Flor. 2. Fruct. 3. Spongia. 4. Radix.
P. 1. condit. fruct. 2. Rob. 3. Spir. simpl. 4. Spir. alcalisatus.

123. *Cyper.* { N. Radix.
P. Variæ sunt.

124. *Cydonij.* { N. 1. Mala. 2. Semen.
P. 1. Condit. 2. Vinum. 3. Rob. Diacydon. 5. Marmelata.

125. *Danci.* Semen.

126. *Distamni Cretici.* Folia.

127. *Dipsaci.* 1. Radix. 2. Vermiculi.

128. *Doronici.* Radix.

129. *Ebeni.* Lignum.

130. *Ebuli.* { N. 1. Flor. 2. Folia. 3. Cortex inter. 4. Semen. 5. Baccæ.
P. 1. ∇. 2. Spir. 3. Rob. 4. Tinct.

131. *Endiv.* { N. 1. Fol. 2. Sem. 3. Radix.
P. 1. ∇. 2. succ. 3. syr. simpl. 4. syr. comp. 5. syr. Byzant. 6. syr. Dia-
fer. 7. Θ.

132. *Epatic.* { N. 1. Folia. 2. Flores.
P. ∇.

133. *Epatic. stellat.* { N. Herba cum florib.
P. ∇.

134. *Equisetum.* { N. caules cum foliis.
P. ∇.

135. *Erucæ* Semen.

136. *Eryng.* { N. Radix.
P. Condit. Radix.

137. *Erysimi*. { N. 1. Semen. 2. Herba.
P. Syr. de Erysimi.
138. *Eupatorii*. { N. 1. Flores. 2. Folia.
P. ▽.
139. *Enfragia*. { N. Herb. c. Florib.
P. 1. conserv. 2. ▽.
140. *Faba*. { N. Farina fabarum.
P. 1. ▽. è flor. 2. cinis. 3. ☉.
141. *Fabaria*. { N. Folia.
P. △.
142. *Ficus*. Fructus 1. Grossæ. 2. Caricæ.
143. *Filipendula*. 1. Folia. 2. Radix.
144. *Filicu* radix sc. fœminæ.
145. *Fœnicul*. { N. 1. Herba. Summitates. 2. Radix. 3. Semen.
P. 1. Confect. Sem. 2. ▽. ex herba. 3. ▽. è sem. 4. oll. still. 5. ☉.
146. *Fœnugr*. { N. Semen.
P. Mucilago.
147. *Fragar*. { N. 1. Folia. 2. Fructus.
P. 1. ▽ ex herb. 2. ▽ è fructib. 3. Syr. 4. Spir.
148. *Fraxin*. { N. 1. Cortex. 2. Lignum. 3. Semen.
P. 1. Extr. 2. ol. st. 3. ☉.
149. *Fraxinella* radix.
150. *Fumaria*. { N. Herba c. florib.
P. 1. ▽. 2. ol. st. 3. Succ. inspiss. 4. Conserv. 5. Syr. s. 6. Syr. comp.
7. pilul. de fum. 8. ☉.
151. *Fumaria bulbosa*. 1. Radix. 2. Herba c. florib. [rarò.]
152. *Galang*. { N. Radix.
P. Spec. Diagal.
153. *Galeg*. { N. Herba.
P. ▽
154. *Gallii* herba c. florib.
155. *Genist*. { N. Flores. 2. Semen.
P. 1. ▽. 2. Conserv. 3. ☉ 4. Condit.
156. *Gentian*. { N. Radix.
P. 1. Succ. 2. Extr.
157. *Gerani*. { N. Folia s. summit.
P. ▽.

158. *Glycyrrhiz.* { N. Radix.
P. 1. Succus. 2. Syr. comp.
159. *Gramin.* { N. 1. Rad. 2. caulis cum foliis. 3. semen.
P. 7.
160. *Granat.* { N. 1. Poma. 2. Fl. Balauft. 3. Cortex. 4. Nucl.
P. 1. succ. 2. syr. dulc. 3. syr. acid.
160. *Guajac.* { N. 1. Lignum. 2. Cortex.
P. 1. Decoct. 2. Extr. 3. ol. 4. spli. 5. Θ .
162. *Hedera terr.* { N. Herba cum flor.
P. 1. 7. 2. conserv. 3. syr. f. 4. S. comp.
163. *Hed. arbor.* { N. 1. Fol. 2. Baccæ. 3. Gum.
P. ol. still.
164. *Helenii.* { N. Rad.
P. 1. cond. rad. 2. 7. 3. conf. 4. extr. 5. Vinum Enular.
165. *Herniar.* { N. Herba.
P. 7.
166. *Hispidul.* { N. Herb. cum flor.
P. 1. 7. 2. syr. simpl. 3. f. comp.
167. *Hordei.* { N. 1. Semen. 2. Farina.
P. 1. 7 ft. 2. cocta.
168. *Hormini.* Folia cum flor.
169. *Hyoscyam.* { N. 1. Rad. 2. Sem. 3. Fol.
P. 1. 7. 2. ol. expr. 3. Extr.
170. *Hyperici.* { N. 1. Fol. 2. Flor.
P. 1. 7. 2. ol. coct. 3. Θ . 4. Tinctura.
171. *Hyssop.* { N. Folia cum flor.
P. 1. 7. 2. ol. ft. 3. conf. 4. spec. diaph. 5. syr. f. 6. S. comp.
172. *Jacea* { N. Herba cum flor.
P. 7.
173. *Jasmin.* Oleum infus.
174. *Imperator.* { N. Radix.
P. 7 still.
175. *Iridis nostr.* { N. Radix.
P. 1. Succ. 2. Fecula. 3. ol. infus.
176. *Ireos Flor.* { N. Radix.
& Illyr. { P. 1. Extr. 2. Spec. Diaph. simpl. 3. comp. Salom.
N. 1. Nuces. 2. Putam. 3. Cort. 4. Juli. 5. membranula.
177. *Jugland.* { P. 1. Cond. nuc. 2. 7 Vomitor. 3. Rob. 4. ol. expr. 5. Elect.
178. *Jujub.*

178. *Jujub.* { N. Fructus.
P. Syrup. de Jujub.
179. *Juniper.* { N. 1. Lign. 2. Bacc. 3. Gum. 4. Fung.
P. 1. ∇ . è bacc. 2. spir. 3. ol. ex bacc. 4. ol. ex ligno. 5. Θ . 6.
Rob. 7. Extr. gummos. 8. Extr. è bac. 9. ∇ ophthalm.
è fung. 10. Elixyr.
180. *Lactuc.* { N. 1. Folia. 2. Semen.
P. 1. ∇ . 1. Succ. 3. condit. caul.
181. *Lagop.*
182. *Lapath.* { N. 1. Rad. 2. Semen.
P. ∇ . still.
183. *Laric.* 1. Resina. 2. Fungus.
184. *Lauri.* { N. Fol. 2. Baccæ.
P. 1. El. de b. 2. Empl 3. ol. expr. 4. ol. still. 5. spir. 6. Essent.
185. *Lens palustris.*
186. *Lentisc.* Gumm. vel Mastich.
187. *Levistic.* { N. 1. Fol. 2. Rad. 3. Semen.
P. 1. ∇ . 2. ol. 3. Θ .
188. *Lichen.* { N. Folia.
P. ∇ . st. è flor.
189. *Ligustr.* { N. 1. Fol. 2. Flor.
P. 1. ∇ . st. 2. ol. infus.
190. *Lilij.* { N. 1. Flor. 2. Rad. 3. stamina.
P. 1. ∇ . 2. ol. simpl. 3. ol. comp.
191. *Lil. convall.* { N. 1. Flores. 2. Rad. (sed raro).
P. 1. ∇ . 2. V. liliat. 3. spir. lil. 4. conf. 5. ol. inf. 6. ol. st. 7. pulv.
sternut.
192. *Limon.* { N. Poma.
P. 1. succ. 2. syr. def. 3. ∇ . ex flor.
193. *Linar.* { N. Fol.
P. ∇ . st.
194. *Lini.* { N. Semen.
P. 1. Mucilag. 2. Farin. 3. ol. expr.
195. *Lotus.*
196. *Lupul.* { N. 1. Flor. 2. Juli.
P. Syr.
197. *Majoran.* { N. Fol. 2. Sem.
P. 1. ∇ . 2. conf. 3. ol. st. 4. Balsam.

198. *Malabathr.* Folia.

199. *Malv.* { N. 1. Fol. 2. For. 3. Sem. 4. Radix.
P. ∇ . ft.

200. *Malv. arbor.* Flores.

201. *Mandragor.* { N. Cort. radices.
p. ol. coct.

202. *Marrub.* { N. Folia.
p. 1. ∇ . 2. syrup. de prass. 3. spec. diapr.

203. *Marj.* { N. Folia.
p. pilula marocost. Theriaca.

204. *Matricar.* { N. Fol. cum flor.
p. 1. ∇ . 2. Θ . 3. syr. 4. ol. ft.

205. *Matrisylv.*

206. *Melilot.* { N. 1. Flores. 2. Semen.
p. 1. ∇ . 2. Empl. de Mel.

207. *Meliss.* { N. 1. Herba. 2. Flor.
P. 1. ∇ . 2. ol. 3. Extr. 4. conf. 5. syr. f. 6. S. comp.

208. *Melon.* { N. Semen. f. nuclei.
P. Condit. poma.

209. *Menth.* { N. Herba cum flor.
P. 1. ∇ . 2. syr. de M. minor. 3. major. 4. conf. 5. ol. still. 6. ol. inf.
7. Balsam. 8. Θ .

210. *Menth. Sarracenic.* 1. Fol. 2. Radix.

211. *Mercurial.* { N. Folia.
p. 1. ∇ . 2. syr. 3. Mel.

212. *Mespil.* 1. Fruct. 2. offic. 3. Folia.

213. *Mei Radix.*

214. *Milij.* { N. 1. Semen. 2. Farina.
p. 1. ∇ still. 2. Dec.

215. *Milij Solis.* { N. 1. Semen. 2. Folia (raro.)
p. ∇ . ft.

216. *Millefol.* { N. Fol. cum flor.
p. ∇ .

217. *Momordic.* { N. 1. Folia. 2. poma.
p. ol. inf.

218. *Mori.* { N. 1. cort. radices. 2. fol. 3. fructus.
p. 1. ∇ . 2. Rob. Diam. f. 3. comp. 4. Nicol. 5. D. Cordi.

- N. 1. Nux. 2. Flor. (Macis.
219. *Moschat.* { P. 1. Cond. nux. 2. ▽. nuc. 3. ol. ft. 4. ol. expr. 5. 6. ol. macis
ft. 7. ol. expr. 8. Extr. 9. BalC. macis. 10. B. Nucistæ.
220. *Muscus arboreus* ipse.
221. *Muscus terrestris.*
222. *Myrtilli* baccæ.
223. *Myrt.* { N. 1. Folia. 2. Baccæ.
P. 1. syr. 2. ol. myrtillor. 3. ol. myrtin.
224. *Nap.* { N. Semen.
P. ol. expr.
225. *Nasturt. aq.* { N. Herba cum flor.
P. 1. succ. insp. 2. ▽. 3. spir.
226. *Nasturt. hort.* 1. Folia. 2. Semen.
227. *Nepeta* Herba.
228. *Nephriticum.* lignum & hujus infusio.
229. *Nicotian.* { N. 1. Folia. 2. Semen.
P. 1. ▽. 2. syr. 3. ol. ft. 4. ol. infus. 5. 6. Ung. 7. BalC.
230. *Nigell.* { N. Semen.
P. Sem. pp. 2. ▽. 3. ol. ft.
231. *Nimular.* { N. Herba.
P. ▽ ft.
232. *Nymph.* { N. 1. Rad. 2. Fol. 3. Sem. 4. Flor.
P. 1. ▽. è Fl. alb. 2. ▽. è lut. 3. Syr. f. 4. Syr. c. de Nenuph. 5.
conf. 6. ol. inf. 7. Unguent.
233. *Olea.* { N. Folia.
P. 1. cond. fr. 2. ol. comm. 3. ol. omphacin.
234. *Onon.* { N. Radix ac potissimum Cortex.
P. ▽ ft.
235. *Origan.* { N. Summitates.
P. 1. ▽. 2. ol. ft. 3. 4.
236. *Palma.* Dactyli, hinc Diaphœnicon.
237. *Papav. sat.* { N. 1. Fl. 2. Sem. alb. 3. Sem. nigr. 4. Capita cum & sine semine.
P. 1. Succ. insp. 2. Extr. 3. ▽. 4. syr. f. 5. G. 6. El. 1. Diac. f. 2.
Montan. 3. Actuar. 7. Loch. 8. ol. expr.
238. *Papav. err.* { N. Flores.
P. 1. ▽. 2. syr. 3. conf. 4. extr. 5. 6.
239. *Parietar.* { N. Folia.
P. ▽. ft.

240. *Paris herb.* { N. 1. Baccæ. 2. Folia.
P. Pulvis Saxonie.
241. *Pastinac.* { N. 1. Sem. 2. Herba (rarò.)
P. 1. ∇. 2. ol. st.
242. *Pastin. sylvestr.* Semen.
243. *Perfoliat.* { N. 1. Folia. 2. Semen.
P. ∇.
244. *Persic.* { N. 1. Folia. 2. Flor. 3. Nucl. 4. Fruct.
P. 1. Cond. 2. ∇ fl. 3. ∇ diur. 4. syr. fl. 5. conf. 6. ol. expr.
245. *Persicaria.* Folia.
246. *Petasit.* { N. Radix.
P. 1. ∇. 2. ol. st. 3. extr.
247. *Petrosel.* { N. 1. Rad. 2. Sem. 3. Fol.
P. ∇. still.
248. *Petrosel. montan.* 1. Rad. 2. Folia.
249. *Petrosel. Macedonic.* 1. Semen. 2. Radix (rarò.)
250. *Peucedan.* { N. 1. Rad. 2. Semen.
P. 1. ⊙. 2. ol. st.
251. *Pimpinell.* { N. 1. Rad. 2. Semen.
P. 1. Cond. rad. 2. conf. 3. conf. 4. ∇ fl. 5. ol. st. ⊙.
252. *Pinastr.* { N. 1. Cort. 2. Fol. 3. Nuc. 4. Resina.
P. ∇.
253. *Pini.* { N. 1. Nuces pineæ. 2. Cort. 3. Folia.
P. ol. expr.
254. *Piper.* { N. Semen. 1. albutn. 2. nigrum. 3. longum.
P. 1. Spec. Diatr. pip. 2. Trag. fort. 3. ol. st. 4. ol. inf.
255. *Pistac.* { N. Fruct.
P. ol. expr.
256. *Plant.* { N. 1. Sem. 2. Fol. 3. Radix.
P. 1. Succ. insp. 2. ∇. 3. syr.
257. *Pæon.* { N. 1. Rad. 2. Sem. 3. Flores.
P. 1. ∇. 2. syr. 3. extr. 4. conf. 5. ⊙. 6. Fecul. 7. ol. st.
258. *Polygon.* { N. Herba.
P. ∇.
259. *Polygonat.* { N. 1. Rad. 2. Fol. 3. Baccæ.
P. ∇.

260. *Pomi.* { N. Poma acida, duleia, subacida.
P. 1. succ. 2. syr. f. 3. syr. Reg. fab. 4. Extr. f. succ. inspiss. 5. Extr. rad.
261. *Popul.* { N. 1. cort. (albæ.) 2. Oculi, (nigræ.) 3. stilla.
P. 1. ol. inf. 2. Unguent.
262. *Porri.* 1. Rad. 2. Herb. 3. Sem.
263. *Portulac.* { N. 1. Folia. Semen.
P. 1. succ. insp. 2. ∇ . 3. syr. f. 4. syr. C.
264. *Primul. veris.* { N. 1. Flores. 2. Folia.
P. 2. ∇ . 2. conf.
263. *Prunell.* { N. 1. Folia. 2. Flor.
P. ∇ .
266. *Pruni.* { N. 1. Pruna. 2. Gummi.
P. 1. Pulpa. 2. El. diapr. simpl. 3. comp. 4. Diapr. non laxativum.
267. *Ptarmica* 1. Radix. 2. Folia.
268. *Puleg.* { N. Folia.
P. 1. ∇ 2. ∇ . bis destill. 3. ol. st.
296. *Pulmonaria* Folia.
270. *Pyrethr.* Radix.
271. *Pyrol.* Folia.
272. *Pyri fructus* (pyra.
273. *Quercus* { N. 1. Folia. 2. Gland. 3. Cupulæ. 4. Cort. 5. Viscum. 6. fung.
P. ∇ .
274. *Ranunculi.*
275. *Raphan.* { N. 1. Semen. 2. Radix.
P. ∇ .
276. *Raphan. marin.* Radix.
277. *Rapi.* Radix.
278. *Rhodia.* radix.
279. *Rhodium* lignum ejusque Extract.
280. *Rhapontic.* vulgaris radix.
281. *Rhapontic.* veri.
282. *Rhois.* { N. 1. Sem. 2. Folia.
P. Succus Sumach.
283. *Rib.* { N. Bacca.
P. 1. cond. bacc. 2. Rob. f. 3. Rob. comp.
284. *Rosa.* { N. 1. Flores. 2. Anthera.
P. 1. \star . 2. ∇ . 1. fl. rub. 2. pallid. 3. alb. 4. Bals. 5. conf. f. & ∇ ta, tum & conf. pallid. 6. Elect. rosat. 2. de f. rosat. 7. Morfell.

Rosa.

7. Morfell. 8. ol. still. & ol. infus. 1. vulgare. 2. omphac. 3. comp. 9. Pil. rofat. 10. spec. El. de f. rofat. it. spec. arom. rof. sp. Diarrh. h. Abl. sp. rofat. novell. 11. spirit. 12. syrup. 1. rofat. f. 2. solut. Muscharum. 3. laxat. comp. f. elleb. 4. sine elleb. 5. de rof. sicc. 6. luleb. 7. mel. rofat. Mes. f. m. citrat. m. laxat. 13. Tinctur. 14. Troch. Diarrh. 15. Ung. rofat.

257. *Rorell.* 1. Herba. 2. Succus.

286. *Rorismar.* { N. Folia. 2. Flor. (Anthos) 3. semen.
P. 1. ∇ . 2. ol. st. 3. Balf. 4. conf. 5. spec. dianth.

287. *Rubia radix.*

288. *Rub.* { N. 1. Fol. 2. Fl. (1. mora rubi. 2. Mora bati.) 3. Cymæ. 4. Rad.
P. 1. Rob. Diam. f. c. 3. Diam. Nicol.

289. *Rub. idai.* { N. Fructus.
P. 1. syr. è f. 2. \times .

290. *Rusc. Radix.*

291. *Rut. hortens.* { N. 1. Herb. f. summit. 2. semen.
P. 1. ∇ . 2. ol. st. 3. ol. inf. 4. \ominus . 5. \times . 6. Balf.

292. *Rut. murar.*

293. *Sabin.* { N. Folia.
P. 1. ∇ .

294. *Salic.* 1. Fol. 2. juli.

295. *Salvia.* { N. 1. Folia. 2. Flor.
P. 1. ∇ . 2. ol. stil. 3. \ominus . 4. conserv.

296. *Sambuc.* { N. 1. Flor. 2. Bacc. 3. Cort. 4. Spong. 5. Turiones.
P. à florib. 1. ∇ . 2. spir. 3. vin. 4. ol. stil. 5. ol. infus.
è baccis. 1. Rob. 2. Tinct. 3. Spir. 4. ol. expr. 5. Tragea.

297. *Sanguisorb.* { N. 1. Herb. cum flor. 2. Rad.
P. 1. ∇ . 2. syr. 3. conserv.

298. *Sanicul.* { N. 1. Folia. 2. Radix.
P. ∇ .

299. *Santal.* { N. Lignum. 1. alb. 2. rubr. 3. citrin.
P. 1. Extr. gummos. 2. spec. Diatr. sant. 3. Ung. 4. Cerotum.
N. Semen.

300. *Santonie.* { P. 1. Semen ppt. 2. Conf. Cinæ.

301. *Saponar.* 1. Radix. 2. Folia.

302. *Sarsaparilla.* radix.

303. *Sassafr.* { N. 1. Lignum. 2. Cortex.
P. 1. Extr. 2. ol. still.

304. *Satureja*. { N. Herba cum flor.
P. 1. ∇ . 2. ol. still.
305. *Satyryj*. { N. Radix.
P. 1. condit. rad. 2. Elect. diasc. 3. extr. sang.
306. *Saxifr*. { N. 1. Fol. cum Fl. 2. Rad. (semen dicta.
P. ∇ .
307. *Scabios*. { N. 1. rad. 2. Fol. 3. Flor.
P. 1. ∇ . 2. syr. 2. conf. 4. Θ .
308. *Schenanthi* 1. Culmi. 2. Flor. 3. Radix.
309. *Scolopendr*. { N. Folia.
ver. { P. Syrup.
310. *Scolopendr*. { N. Folia.
vulgar. { P. ∇ .
311. *Scord*. { N. Folia.
P. 1. ∇ . 2. succ. insp. 3. syr. f. 4. syr. c. f. El. Diascord. Fra.
312. *Scorzoner*. { N. Radix.
P. 1. Extr. 2. Cond. radix.
313. *Scrophul*. { N. Radix.
P. ∇ .
314. *Scyll*. { N. Radix.
P. 1. rad. ppt. 2. oxymel. f. & c. 3. loch. 4. \star . 5. Fecula. 6. Extr.
315. *Sebesten*. { N. Fruct. Sebesten.
P. Elect. de Seb.
316. *Secal*. { N. 1. Farin. 2. Furf.
P. 1. panis. 2. ∇ . panis. 3. ∇ . gram.
317. *Sedi*. { N. Folia.
P. 1. ∇ . 2. succ.
318. *Senecionis*. { N. Caulis cum Fol. ac Flor.
P. ∇ . st.
319. *Serpill*. { N. Herb. cum Flor.
P. ∇ .
320. *Sesam*. { N. Semen.
P. ol. expr.
321. *Sesel*. massiliotic. semen.
322. *Sesel*. officinar. 1. Radix. 2. Semen.
323. *Sesel*. Cretic. semen.
324. *Siderit*. Herba.

325. *Siliqua* fructus. f. succus melligineus.
326. *Sinap.* { N. Semen.
P. ol. expr.
327. *Sisar.* Radix.
328. *Solan.* { N. 1. Herba. 2. Baccæ,
P. v. still.
329. *Sorbi* fructus (Sorbum.
330. *Spica.* { N. 1. Fol. 2. Flor. Lavend. 3. Sem. Lavend.
P. Conf. 2. v. 3. ol. ft.
331. *Spic. celtic.* radícula cum adnatis.
332. *Spic. Indic.* { N. Radix.
P. 1. ol. nardin. f. 2. comp.
333. *Spinachia* Herba.
334. *Staphisagr.* Semen.
335. *Stachad.* { N. Flores f. spicæ compressæ.
P. 1. Syr. f. 2. Syr. c. 3. Syr. Fernelii.
336. *Stachad.* Citr. Flores.
337. *Succif.* { N. 1. Rad. 2. Flor. 3. Folia,
P. v.
338. *Symphyt.* { N. 1. Rad. 2. Fol. 3. Flores.
P. 1. v. 2. Conf. 3. Cond. rad. 4. Syr. 5. Extr. 6. Extr. sanguine-
um. 7. ol. ft.
339. *Tamarisc.* { N. 1. Lignum. 2. Rad. 3. Cort. (in primis radicis.)
P. Extr.
340. *Tanac.* { N. 1. Herb. cum Fl. 2. Sem.
P. 1. v. 2. ol. still.
341. *Taps.* barb.
342. *Taraxac.* { N. 1. Rad. 2. Folia.
P. v.
343. *Thlassi.* 1. Semen. 2. Herba.
344. *Tencry* Herba cum Flor.
345. *Thym.* { N. 1. Herba. 2. Semen.
P. 1. v. 2. spir. 3. ol. still.
346. *Thimiama.* Cortex.
347. *Tilia.* { N. 1. Flor. 2. Fol. 3. Cort. 4. Sem. 5. Lignum.
P. 1. v. 2. conf.
348. *Tormentill.* { N. Radix,
P. v.

349. Tri-

349. *Tritic.* { N. 1. Semen. 2. Farina. 3. Furtures.
P. 1. ▽. 2. ol.
350. *Tussilag.* { N. 1. Folia. 2. Radix.
P. 1. syr. de farfara. 2. conf. 3. ▽.
351. *Valer.* { N. 1. Radix. 2. Herba (Phaveri).
P. 1. ▽. 2. Extr.
352. *Verbas.* { N. 1. Fol. 2. Fl. 3. Rad. (rard.)
P. 1. ▽. 2. ol. inf.
353. *Verben.* { N. Herba f. summit.
P. 1. ▽. 2. Ung.
353. *Vermicularis folia cum florib.*
355. *Veronic.* { N. 1. Folia 2. Flores.
P. 1. ▽. syr. 3. ⊖.
356. *Victorial. radix.*
357. *Vinca perv.* { N. Folia.
P. ▽.
358. *Vincetoxic.* { N. 1. Radix. 2. Semen. (sed rard.)
P. 1. ▽. 2. Extr.
359. *Viol. purpur.* { N. 1. Flor. 2. Fol. 3. semen.
P. 1. syr. fol. 2. syr. violar. f. 3. f. viol. comp. 4. juleb. 5. conf. 6.
✱ 7. ol. inf. 8. ▽. still. è. flor. tum extota. 9. Tinct. 10.
Extr. 11. Troch. sc.
360. *Vitis.* { N. 1. Folia. 2. lachryma. 3. Uvæ. 1. immatur. 2. maturæ. 3. passæ ma-
xime, (Zibebæ.) majoret & minores. 4. Vinacea.
P. 1. Cinisfarment. 2. loch. passulat 3. mel. pass. 4. passulæ laxa-
riv.
361. *Virg. Aur.* { N. 1. Fol. 2. Flor.
P. ▽.
362. *Virg. aurea. consolid. dictæ Folia.*
363. *Ulmæ.* { N. 1. Folia cum flor. 2. Radix. (rard.)
P. 1. ▽. 2. Extr.
364. *Urtic.* { N. 1. Rad. (maximæ) 2. semen. 3. Fol. (minoris) & Romanæ 4.
semen.
P. ▽.
365. *Urtic. mortua.* { N. Herba cum Flor.
P. Conserv.
366. *Zedoar.* { N. Radix longa rotunda.
P. 1. Cond. 2. conf. 3. Extr. 4. ol. st. 5. ▽

N. Radix.

367. Zinzib. { P. Cond. in China. 2. cond. nostrat. 3. conf. 4. Zz. laxativ. 5. spec.
Diaz. 6. ol. still.

Classis 2. de Alterantib. secundariis

{ N. 1. Vinacea 2. cerevisiaria 3. pomacea.

368. Acet. { P. 1. ✱. dest. com. 2. & ex fecib. 3. ✱. radicat. 4. ✱. mellit. 5. ✱.
Terebinth. 6. Crystalli.

{ N. 1. ῥαϊσμα 2. φύγαμα.

369. G. Ammoniac. { P. 1. Amm. depurat. 2. ol. st. 3. pil. 4. Extr. resinof. 5. Extr.
viscos.

370. G. Anime. P. Ol. st.

371. G. Arabic. P. 1. pulvis, 2. depuratum.

Asafetid. { N. ipsa asa.

{ P. 1. Pilulæ foetidæ 2. Pil. de Asaf.

372. Balsamum verum.

373. Balsamum de Tolu.

374. Balsamum Indicum & ejus spiritus.

375. Bdellium. Gummi (lachryma) & P. Pilulæ.

376. Benzoin. & P. 1. Magist. 2. Flores. 3. Liqueor. 4. oleum still.

377. Camphora. & P. 1. oleum 2. ol. 3. liqueor. 4. Essent. alexiteria.

378. Cancanum.

379. Caranna.

380. Colophonia.

381. Copal Resina & P. ol. still.

382. Elemi & P. ol. st.

383. Fuligo & P. 1. spir. 2. ol. 3. ☉.

384. Galbanum & P. 1. depurat. 2. ol. st. 3. Galbanetum 4. Cerot. de G.

385. Hypocistis & P. depurat.

386. Lacca & P. 1. lota 2. Trochisc.

387. Ladanum & P. ol. st.

388. Liquidambrâ & P. 1. ol. expr. 2. coctum.

389. Lycium.

390. Mastiche & P. 1. ol. st. Bals. 2. ol. per del. 3. ol. coct. 4. spir. 5. V. mastich.

6. ▽. 7. Pilulæ.

391. Myrrha & P. 1. depurat. 2. Extract. 3. ol. still. 4. Liqueor.

392. Omphacimum & P. syrupus de Agresta.

{ N. 1. Exoticum (Thebaic.) 2. Nostrat.

393. Opium { P. 1. Extr. Querc. 2. aliud. 3. Extr. Salæ. 4. Extr. Croll. 5. Lau-
danum

Opium } danum opiat. 5. L. op. Querc. 6. aliud. majus. 7. L. op. f. Anody-
num specificum Parac. 8. Nepenth. aureum Salæ. 8. L. op. Croll.
9. L. op. Senn.

394. *Opopanax.*

395. *Pissasphaltos.*

396. *Picus* } N. 1. Pix liquida. 2. P. sicca (palimpissa.)
P. ol. still.

397. *Resin.* } N. 1. Vera. 2. Vulgaris.

Terebinth. } P. 1. Spir. 2. ol. 3. Bals. 4. Colophonia.

398. *Sacchar.* } N. a loc. 1. Sacch. Madar. 2. Canar. 3. Thomæum. 4. Meliss. (cia-
bale.) 5. Valent. ab elaborat. 1. Sacch. non finum. 2. fi-
num. 3. candil. 4. Penidiat.

399. *Sagapenum.* & P. 1. depurat. 2. Pilul. comm. 3. Pil. Camilli. 4. Pil. fœtida.
5. ol. still.

400. *Sanguis Draconis.*

401. *Sarcocolla.* & P. Pilul. de Sarcocoll.

402. *Succolata.*

403. *Storax calamit.* & P. 1. ol. still. 2. ol. coct.

404. *Styrax liquidus.*

405. *Tacamahaca* & P. 1. ol. still. 2. Emplast.

406. *Tartari* } 1. Depurat. unde cremor, crystall. Acidum Tartari.
Prap. } 2. Destillat. unde 1. Spir. & ol. 2. Spir. comp. 3. Spir. Tartari
Θ-latus.
3. Salificat. 1. Θ Tart. 2. Magist. 3. Mag. purg. 4. Tinctur. 5.
Tarr. Θ-latus. 6. Tart. Θ-latus crystallifatus.

407. *Thuris* } N. 1. Thus. 2. Cortex. 3. Manna.
P. 1. 2. Liquor. Elect. Diaolib.

408. *Tragacantha.* & P. 1. Spec. Diatrag. calid. 2. frigid.

409. *Vini.* P. 1. V. 2. V subtiliss. 3. V alcalifat. 4. V Tartarifat. 5. V Tart.
alcalifat. 6. V philosophica 7. V microcosmic. 8. V Θ-latus 9. Mag.
Vini, 10. V temperata. 11. Θ philosophor.

Class. 3. de Purgantib. primariis.

412. *Agarici* } N. Fungus 1. Mas. 2. Fœm.
P. 1. Extr. 2. Trochiscat. 3. Trochisci. 4. Pil.

413. *Asari* } N. 1. Radix. 2. Folia.
P. 1. Extr. Coagulum 2. El. Diasar.

414. *Bryon*

414. *Bryon.* { N. Radix.
P. 1. Fecula. 2. Ung. Agrippæ.
415. *Cartham.* { N. Semen.
P. 1. Extr. Diacarth. 2. Syrup. 3. El. Diac. 4. Spec. Diac.
416. *Cast.* { N. Siliquæ & Medulla.
P. 1. Flos f. pulpa. 2. C. Extracta pro clyst. 3. El. Diacass. c. Mann. 4.
C. Extr. sine foliis senæ. 5. c. fl. senæ. 6. Extr.
417. *Cataputiæ minor.* 1. Semen f. grana. 2. Folia rarissimè.
N. Cataputiæ major. v. Ricinus.
418. *Colocynthid.* { N. Poma.
P. 1. Troch. 2. Alhandal. 2. inf. Trochisc. 3. Extr. coloc.
419. *Ebul.* { N. 1. Cortex 2. Acini f. seminula,
P. ol. expr.
420. *Ellebori nigri* { N. Rad. Cort.
P. 1. præpar. Offic. 2. præp. Recentior. 3. Extr. 4. Extr. Querc.
5. aliud Extr. 6. Extr. Salæ 7. Syrup. 8. Oxymel.
421. *Ellebor. alb.* Radix.
422. *Epihym.* { N. Integra planta.
P. Syrup.
423. *Esula.* { N. 1. Cort. 2. Fol. 3. Succus.
P. 1. Extr. Salæ. 2. Extr. Ruland. 3. 4. Extr. Querc.
424. *Frangula* Cortex interior.
425. *Gratiola* { N. Folia.
P. Extr. f. Succus.
426. *Hermodactyl.* { N. Rad.
P. P. lulæ.
427. *Jalap.* { N. Radix.
P. 1. Extr. 2. Magist. f. Resina.
428. *Mechoacann.* { N. Radix.
P. 1. Extr. simpl. 2. Extr. comp.
429. *Mezerej.* { N. 1. Cort. 2. Fol. 3. Grana.
P. 1. Pil.
430. *Myrobalan.* { N. Fruct. 1. chebul. 2. citrin. 3. Belliric. 4. Ind. 5. Emblic.
P. 1. Pil. de 2. generib. 3. Extr.
431. *Polypodij* Radix.
432. *Psyllij* { N. Semen.
P. Elect.

433. *Rhabarbar.* { N. Radix.
P. 1. Condit. 2. Syrup. de Cich. cum Rhabarb. 3. Syrup. de
R. solut. 4. Syrup. Diafer. 5. Troch. de R. 6. Pil.
de R. 7. Extr.
434. *Ricini* { N. Semen seu nuclei.
P. ol. de Kerva.
435. *Ricini Americ.* grana f. Grana Tiglia.
N. 1. Folia 2. Folliculi (rarò.)
436. *Senna* { P. 1. pulvis f. Montagn. 2. syr. Fol. f. 3. syr. de pomis Reg. Sab. 4.
El. Diabelzem. 5. passul. laxat. 6. Extr.
437. *Staphid. agria* semen.
438. *Soldanell.* { N. Herba f. Folia.
P. Succus inspissatus.
439. *Spina infector.* { N. Baccæ.
P. 1. succ. inspiss. 2. Syrup.
440. *Turpetib.* { N. Cortex,
P. 1. Spec. Diaturb. cum Rhabarb. 2. pulv. Stockstaldi. 3. pil. de
Turb. 4. ✕ de turb. 5. Extr.
441. *Tamarind.* { N. Fructus (Dactylus.)
P. 1. Pulpa T. 2. El. Diaphæn.

Class. 4. de Purgantib. secundariis.

442. *Aloes* { N. Succus sc. Aloe. 1. Lucida. 2. Succotrina. 3. Epatica 4. cabal-
lina.
P. 1. lota 2. Balsam. f. Extr. 3. Violata. 4. Viol. Tartarea 5. Rosata.
6. Rosata. Aquæ pend.
443. *Elaterium* { N. Succus Elaterium.
p. 1. Depuratum 2. Correctum.
444. *Euphorbium* { N. 1. Flavum 2. candicans.
(Succus) { p. 1 2. 3. 4. correct. 5. Extract. 6. ol. inf. 7. Pilulæ.
445. *Ghitta femou.* { N. Succus.
p. 1. Correct. 2. Extr. f. Magist.
446. *Manna.* { N. ipsa Manna.
p. 1. Elect. Diacass. c. M. 2. El. lenit. de M. 3. M. Tartarifat. 4.
Spirit. 5. ▽.
447. *Opoponax* { N.
p. 1. op. depuratum 2. Extr. 3. Pilul. 4. ol. still.

448. *Scammon.* { N Succus.
 P. 1. Correct. Diagryd. 2. Defecat. 3. Extr. Resina 4. Extr. a-
 romatisat. 5. Elixyr. Pilul. 6. Gum. 6 Sulphurisatum.
 8. Rosat. 9. Inf. 1. Spirit. purgans. 10. Diacydon. lucid.
 11. Gelatina laxat.
 Hinc Conf. anis. laxat. El. bened. laxat. El. de Citro. sol. Diacydonit, la-
 xat. &c.

LIBER. V.

DE

ZOOLOGIA.

1. *Classis de Animalibus Terrestrib. perfectiorib.*

1. *Agni* 1. Pulmones (cum recentestum siccati.) 2. Fel. 3. Lana 4. Ossa incin 5. coagulum.
2. *Alca.* { N. 1. Ungula 2. Nervi.
 P. 1. Ung. pp. 2. Magist. 3. ∇ cerebri. 4. ol. 5. Θ .
3. *Apri.* { N. 1. Adeps. 2. Dens 3. Genitale. 4. Fel. 5. Stercus. 6. Urina.
 P. 1. Dens præp. 2. Magist. 3. ∇ Sanguin.
4. *Asin.* 1. Ungul. 2. Sang. 3. Lac. 4. Urin. 5. Sterc. 6. Adeps 7. pellis.
 { N. 1. Cornu. 2. Fel. 3. Iecur. 4. Splen. 5. Sanguis 6. Medull. 7. Sevum.
 8. Axung. 9. Ung. 10. Urin. 11. Sterc. 12. Lapill. 13. Lac. 14. Bu-
 tyr. 15. Caf. 16. Priapus.
5. *Bovin.* { P. 1. ∇ stercor. (omnium florum.) 2. ∇ sang. 3. Dec. splen. 4. Extr.
 splen. & épat. 5. ol. butyr. 6. Tinct. fellis.
6. *Bubul.* { N. 1. Cornu & Ungulæ 2. sevum 3. stercus.
 P. Extr. Epat.
7. *Bufon.* { N. 1. Buf. exiccat. 2. Lapis Bufonites.
 P. 1. Amulet. 2. Pulvis. 3. Sal. 4. oleum.
8. *Canis* 1. Integer. 2. Caput. 3. Axung 4. Fel. 5. Sang. 6. Sterc. 7. Urina. 8. Dens.
 9. Pellis 10. Pilus.
 { N. 1. Corn. 2. Sang. 3. Lien 4. Medulla 5. Sevum 6. Lac. 7. Lapilli 8.
 Sterc. 9. Urina 10. Vesica 11. Oment. 12. Pellis.
 { P. Sang. 1. Spiritus 2. ol. 3. Θ 4. Balf. antipodagr.
10. *Capra alpina* 1. Sang. 2. Sev. 3. Iecur 4. Fel. 5. Sterc. 6. Lapis.
11. *Capricervæ orient.* Lap. Bezoar. orient.
12. *Capracervæ occid.* Lap. Bez. occident.

h 3

13. *Capre-*

13. *Capreoli* 1. Caro 2. Coagul. 3. Iecur 4. Fel 5. Lien 6. Stercus.

14. *Castor.* { N. 1. Axung. 2. Testic. (castorium) 3. Pellis.
P. 1. ol. infus. 2. ol. still. 3. El. diacast. 4. Extr.

15. *Cati domest.* 1. Axung. 2. Sang. 3. Caput 4. Sterc. 5. Pellis.

16. *Cati Zibethini Excrementum* (Zibethum.)

{ N. 1. Cornu 2. Corium 3. Os de Corde 4. Genitale 5. Testicul. 6.
Sang. 7. Lachrym. 8. Medull. 9. Sev. 10. Talus (Astragalus)
11. Lapis.

17. *Cervi* { P. *Ex cornu* 1. C. C. ust. 2. ppt. 3. C. B. phil. calc. 4. Magist. 5. Galreda
6. Liquor. 7. oleum 8. \ominus vel. 9. ∇ è tiphis.
Ex sang. Balsam. antipodagr.
Ex Sevo. ol. still.

18. *Cochl.* { N. 1. Integræ 2. Testæ 3. Pinguedo 4. Mucus,
P. 1. ∇ . 2. Cinis.

19. *Cunicul.* 1. Integer ustus 2. Axung. 3. Cerebrum.

20. *Elephant.* { N. Dens (Ebur.
P. 1. Ebur ustum 2. Trochisc. de spodio.

21. *Equi* { N. 1. Sang. 2. Coagul. 3. Lac. 4. Sterc. 5. Lichenes 6. Testes 7.
Pinguedo Jubæ. 8. Ungul. 9. Pili 10. Saliva 11. Dens
12. Lapis.
P. Extr. Lichen.

22. *Erimaceus* 1. Integr. 2. Iecur 3. Axungia.

{ *Vivi* 1. capilli & horum ∇ . 2. Ungues & inde P. mucilago 3. Saliva
4. Cerimen 5. Sudor 6. Lac & ex hoc P. 1. ∇ & a 2. Buty-
rum 7. Sang. menstr. 8. Secundina 9. Urin. ejusque P. sc. 1.
2. 3. 4. *Spiritus* 5. *Magist.* 6. *oleum ludi* 10. Stercus ejus P.
1. ∇ & *oleum* 11. Semen 12. Sanguis & P. 1. ∇ . 2. 3.
ol. 4. *Balsam. antipod.* 5. *Spir. antiepilept.* 13. Calculus & P. 1. \ominus
2. ol. 3. *Essentia.*

23. *Hominis*

{ *Interempti* 1. Mumia & P. prater vulgaria 1. 2. 3. *Tinctura* 4. ol. mu-
miat. 5. ∇ divina. 2. Cutis 3. Pinguedo & P. *Linimen-*
tum 4. Ossa & P. 1. *Pulvis* 2. ppt. 3. *Magist.* 4. Ol. & 5.
 \ominus volat. &c. 5. Cranium & P. 2. *Calx* 2. ppt. 3. *Magist.* 4.
Spir. 5. ol. 6. \ominus volat. 7. Extr. 8. Galreda 6. Ulsnea 7. Ce-
rebrum & P. 1. *Spir. f.* ∇ aurea 2. ol. 3. ∇ antiepilept. 8. Fellis
Extr. 9. Cor,

24. *Leporis* 1. Cinis 2. Caput 3. Oculus 4. Sanguis 5. Pulmo 6. Cerebr. 7. Cor. 8. Jecur 9. Fel 10. Renes 11. Testiculi 12. Uterus 13. Coagul. 14. Talus 15. Axung. 16. Sterc. 17. Pili.
25. *Lupi* { N. 1. Dens 2. Cor 3. Hepar. 4. Intestin. 5. Axung. 9. Offa. 7. Sterc.
P. 1. ol. coct. 2. Essentia Sang.
26. *Lyncis*. f. Axung. 2. Unguis.
N. Excrementum Moschus.
27. *Moschi* { P. 1. Spec. diam. dulc. 2. Spec. diam. amar. 3. Confect. Moschard.
1. Trochisc. 5. ol. Moschellin.
28. *Muli* 1. Ungul. 2. Urin. 3. Sterc. 4. Cor 5. Epar, Renes, Uterus, Testes, spua
maoris.
29. *Muris* 1. Musipse 2. Stercus.
29. *Mus ataneus* f. forex ustus.
29. *Muris alpini* Adeps.
29. *Muris majoris* Stercus.
30. *Ovis* 1. Cerebrum 2. Fel 3. æsypus. 4. Lana succida 5. Sevum 6. Pulm. 7. Oment. 8. Sterc. 9. Urina 10. Vesica 11. Caput & Pedes.
31. *Ranunculus viridis* 1. ipse ran. 2. Sanguis.
32. *Rhinocerotis* Cornu.
33. *Serpentis* { N. 1. Cinis 2. Pinguedo 3. Exuviaz 4. Fel.
P. 1. Bezoardic. animale simpl. 2. comp.
34. *Suis* { N. 1. Fel 2. Pulm. 3. Pinguedo 4. Offa 5. Talus 6. Stercus 7. Vesica.
P. 1. Unguenta 2. ∇ ad atrophiam.
35. *Talpa* 1. Cinis 2. Cor 3. Sanguis.
36. *Taxi* 1. Cinis 2. Sanguis 3. Adeps.
37. *Vipera* P. 1. oleum coct. 2. Trochisc.
38. *Vituli* { N. 1. Medulla 2. Stercus.
P. pectoralis.
39. *Unicorn*. Cornu.
40. *Ursus* 1. Pinguedo 2. Fel. 3. Oculus.
41. *Vulpis* { N. 1. Pingued 2. Pulm. 3. Jecur 4. Fel 5. Lien 6. Pellis 7. Sang. 8.
Cinis 9. Sterc.
P. 1. Ol. 2. Loch, de Pulm. 3. Pulm. ppt.

Classis 2.

Classis 2. de Avibus.

42. *Accipiter*. 1. ol. coct. 2. Adeps. 3. Excrementa.
43. *Alanda* 1. Cor vel integra al. 2. Sang.
44. *Alcedin*. Cor.
45. *Anat.* 1. Ipsa anas viva 2. Adeps. 3. Sang. 4. Fimus.
46. *Anser*. 1. Pingued. 2. Sang. 3. Sterc. 4. Cutis pedum.
47. *Ardea Axungia*.
48. *Ciconia* { N. 1. Integra, 2. sterc. 3. Ventic. 4. Axung. 5. Fel.
P. 1. ∇ antepilept. 2. Arcan. alexiph.
49. *Columb*. 1. Integra viva 2. Sanguis 3. Tunica Ventic. 4. Fimus.
50. *Cornic*. Fimus.
51. *Corvi* 1. Pulli 2. Cerebr. 3. Pingued. & Sang. 4. Stercus.
52. *Coturnic*. 1. Ping. 2. Excrement.
53. *Cucul*. 1. Ustus 2. Fimus.
54. *Ficedula comesta*.
55. *Gall*. 1. Integra viva & P. 1. Gelatina 2. Contusum 2. Cerebr. 3. Tunica Ventic. 4. Testicul. 5. Fel 6. Ping. 7. Guttur. 8. Sterc. 9. Ova eorumque testæ, membranula, albumen, vitellum & P. oleum.
56. *Grus*. 1. Integ. 2. Ping. 3. Fel 4. Caput. 5. oculi. Ventic. 6. Medulla tibiae.
57. *Hirund*. { N. 1. Integ. 2. Cor 3. Sang. 4. Lapill. 5. Nidus 6. Stercus.
P. ∇ still.
58. *Milv*. 1. Cinis 2. Caput 3. Epar 4. Sang. 5. Fel 6. Sterc. 6. Ping. Hinc, P. Ung.
59. *Motacilla* pulvis.
60. *Noctua* 1. Caro 2. Fel 3. Pinguedo.
61. *Olor*. 1. Pulli 2. Adeps 3. Pellis.
62. *Palumb*. plumæ ustæ tum Sang. Fimus, &c.
63. *Pari* Cinis.
64. *Passer Troglotites comestus* vel in cinere assumpt.
65. *Pavon*. 1. Jus 2. Adeps 3. Fel 4. Sterc. 6. Pennæ 6. Ova.
66. *Perdic*. 1. Caro 2. Medull. 3. Sang. 4. Iecur 5. Fel 6. Pennæ.
67. *Pic*. 1. Substantia 2. Cinis P. ∇ antepil.
68. *Struthion*. 1. Tunica Ventic. 2. Adeps.
69. *Turtur* 1. P. Cinis & Extr. 2. Pinguedo.
70. *Upup*. 1. Caro 2. Pennæ.
71. *Vultur* 1. Caro 2. Ping. 3. Cerebr. 4. Fel 5. Pennæ 6. Fimus.

Class. 3. de Piscibus.

72. *Anguill*. 1. Ping. 2. Caput 3. Sang.
73. *Barb*. Ova.

74. *Blatta bizantia* i. e. conchylium.

75. *Cancr.* { N. 1. Substantia 2. Oculi 3. Putamen.
P. 1. ppt. ocul. 2. Mag. oc. 3. ∇ cancr. 4. ol. s. liquor oculor.

76. *Carpiou*. 1. Fel. 2. Axung. 3. Lap. triangularis. 4. Lapilli oblongi.

77. *Ceti* Axungia.

78. *Conch.* { N. 1. Testæ 2. Caro 3. Margaritæ.

P. Testæ calcin. ppt. Hinc antiëpilept.

79. *Dentalij* & *Entalij* substantia.

80. *Halec*. 1. Animæ 2. Substantia 3. Muria.

81. *Huson*. Ichthiocolla.

82. *Lucij* { N. 1. Fel 2. Cor 3. Mandib. 4. Offic. cruciforme 5. Axungia,

6. Ova.

P. ∇ fellis.

83. *Matris perlar*. 1. Cinis 2. ppt. & Antifebrile.

84. *Mustel*. 1. Epar 2. Ventric. 3. Spina.

85. *Ostrea* 1. Substantia 2. Testæ.

86. *Percar*. Lapides.

87. *Ranar*. { N. 1. Substantia 2. Cor 3. Epar 4. Fel 5. Pingued. 6. Sperma.

P. 1. ∇ è ranis 2. ∇ è sperm. 3. ol. 4. Pulvis spermiolæ compos.

88. *Sepia* 1. Os 2. Humor ater 3. Ova.

89. *Sturion*. Offa.

90. *Testudin*. 1. Crura 2. Sang. 3. Fel.

91. *Thymall*. Axungia.

92. *Tinc*. 1. Substant. 2. Fel. 3. Lapill.

93. *Trut*. Pinguedo.

Classis 4. de Insectis.

94. *Apis* { 1. Substantia,
1. Mel. & PP. Mel depurat. 2. M. destill. unde 1. spir. 2. ol. comp. 3
✱ 4. Tinct. 5. Essent. Q. 6. Elixyr. (Clyffus.
3. Cera & P. ol. still.
4. Propolis.

95. *Araneor*. 1. Substant. 2. Tela.

96. *Asellor*. Pulvis.

97. *Bombyc*. 1. Subst. 2. Sericum 3. Folliculi sericei.

98. *Cambarid*. Substantia.

99. *Cicaq*. Pulvis.

i. 100. *Cicin*-

100. *Cicindela*.

101. *Cimices*.

102. *Eruca*.

103. *Formica* { N. 1. Substant. 2. Ova 3. acervus.
P. 1. oleum 2. ∇ Magnan. 3. Liqueor.

104. *Grylli* 1. Cinis 2. Succus.

105. *Hirudines*.

106. *Lacertus* { N. impositus.
P. oleum.

107. *Locust.* 1. in suffitu 2. in amulet.

108. *Lumbric.* { N. 1. Conquassat.
P. 1. ∇ . 2. ol. 3. Liqueor 4. Pulvis.

109. *Lumbric.* intestin.

110. *Musca.* { N. Substant. s. Capita.
P. ∇ .

111. *Pediculus*.

112. *Ricinus*.


113. *Salamandra*.

114. { *Scarabai* { N. Cornua.
P. ol.
Scarabai pilular. pulvis.
Scarab. Unctuosus.

115. *Scinci* 1. Integr. 2. Pinguedo.

116. *Scorpion.* { N. 1. Cinis.
P. 1. ol. simpl. 2. comp. 3. magn.

117. *Teredin.* farina.



HAR.



D



denfer

N.

mediu

latu.

I

laga

menta

N.

ciali,

Res

res qu

piabili



PHARMACOPOEIAE
MEDICO-CHYMICÆ,

LIBER I.

DE ISAGOGE.

CAPUT I.

De Definitione ac distributione Pharmacologia.



Parmacopœja est descriptio rerum medicinalium ad bene medicandum. Seu est doctrina medicamentorum adeoque & Pharmacologia eodem sensu dicitur.

N. Medici officium tribus nititur mediis, remediis medicè dictis: alimentariis; chirurgicis, ac pharmaceuticis

illa suppeditat Culina, ista Chirurgia, hæc Pharmacologia.

Objectum pharmacologiæ est res naturalis medicinalis. Descriptio est ejusdem rei pharmacologica Constitutio, Usurpatio atque Signatio.

De his agetur generaliter in Isagoge lib. 1. In Officina lib. 2. Specialiter, in Mineralogia lib. 3. Phytologia lib. 4. ac Zoologia lib. 5.

CAPUT II.

De rebus medicinalibus nativis.

Isagoge est pars Pharmacologiæ, quæ agit de rebus naturalibus medicinalibus in genere.

N. Res naturalis non opponitur artificiali, sed supernaturali.

Res naturalis medicinalis est res quæcunque ad medicandum adaptabilis, siue figuram ea obtineat na-

tivam, id est naturâ inditam, siue elaborationem aliquam officinalem sustinuerit; Illæ communiter veniunt nomine simplicium, materialium, nativorum; hæ preparatorum. Utamque seriem generaliore videre licet lib. 2. Verum enim vero, quia in utrisque nomina plurima occurrunt,

A

quæ

quæ vel minus vulgaria, vel æquivo-
ca, vel uni alicui classi minimè sub-
jungi queunt, operæ præcium duxi,
pharmacopœjas tyronibus synopsi
breui inservire & utrarumque nomina
alphabetica serie exhibere.

*Sunt itaque Nativorum Nomina
generalia:*

A.

Acetum. Acetum in genere liquo-
rem quemcunque acidum notare pot-
est, unde nonnullis spiritus O-li &
simil. acetum dicuntur: Veruntamen
in Officinis liquorem solum acidum
denotat, ex potulentis succis factum,
& κατ' ἐξοχὴν ex vino seu uvis. Et hoc
recipiendum est quoties aceti simplici-
ter fit mentio. N. *Aceta in infusione para-
ta Vide in lib. 2.*

Acini sunt granula minutiora sive
per se crescant. ut acini, i. e. baccæ
sambuci, sive aliis inclusa, ut acini u-
varum, quin & ipsas uvas integras so-
nant.

Adeps, idem quod pinguedo gene-
raliterque tam axungiam quam sebum
denotat, usitatus tamen pro axungia
usurpatur, atque absolute pro adipe
sullo. Vid. lib. 2.

Alabastri, sunt folia illa viridia her-
bacea, quæ flores sepiunt. In Minera-
logia: Alabaster seu alabastrices lapi-
dem certum denotat.

Anthera, i. e. summitates seu cacu-
minula in florum medietate capilla-
mentis incumbentia.

Apices, idem quod anthera.

Aqua quid sit nemini ignotum est.
Pharmacopœjam subit, tum nativa,
tum preparata. Vid. l. 2. & 3.

Arbor, est planta lignea frutice gra-
dior, Baum.

Aroma, Gewürk. Vid. l. 2.

Arilli, idem quod acini seu lapilli in
fructibus.

Axungia est pinguedo sevo mol-
lior, idemque cum adipe, Schmeer/
Schmalz.

B.

Bacca, Beeren. Vocantur fructus
quicunque parvo-rotundi.

Bitumen, est genus è mineralibus,
Vid. l. 2.

C.

Cacumen. Cacumina sunt idem
quod summitates.

Calix. Calices sunt oculi sive gem-
mæ, florum prodromi. Ut oculi po-
puli arboris: vel est folliculus quo
flos primum, mox seminis foetus clau-
ditur.

Capillamenta sunt filamenta illa te-
nuia in florum medietate surgentia.

Capita in Zoologia quid sint, notum
est, id phytologia rotunda illa semina,
aut florum receptacula referunt, ut ca-
put papaveris, &c.

Capreoli, sunt ligamenta contorta,
quibus plantæ nonnullæ dotata sunt,
ut aliis sese annectant.

Caro in Zoologia vox notissima est,
in Phytologia substantiam illam mol-
liorem fructuum succulentorum no-

rat, quam alias pulpam vocamus, ut pulpa seu caro cassiæ, caro prunorum.

Caulis, est truncus herbæ inter ramos & radicem.

Caudex, idem est in arboribus & fruticibus, quod caulis in herbis.

Coma in Phytologia idem quod summitates sonat.

Cor, idem quod medulla vegetabilium.

Cornu, Cornua non nisi in Zoologia locum habent. Vid. l. 2.

Cortex, est tegumentum seu cutis vegetabilium. Vid. lib. 2.

Corymbi, i. e. summitates.

Cyma, Cyma sunt teneri calculi Juli, die Sprossen.

E.

Echinus est quicquid numerosa congerie aculeorum stipatur, sive regimen, sive caput, sive cacumen fuerit.

F.

Fibra, i. e. filamenta, sive villi i. sunt veluti stamina rebus nonnullis intexta, v. g. arboribus, foliis, &c. 2. Sunt capillamenta extrinsecus adnascentia, e. g. radicibus & similibus. Die Härlein an den Bürgeln.

Flores. Florum nomen æquivocum est, locumque habet tum inter nativa, tum inter præparata. Vid. l. 2.

Folium, Folia in phytologia notissima sunt, in Mineralogia sunt folia. ☉ & ☽, i. e. ☉ & ☽ in tenuissimas laminas redacta.

Folliculus est theca tenuis, quæ granum vel semen continet involutum.

Fructus sunt grandiores illi ac succulenti plantarum fœtus seminum receptacula. Ut poma, pyra, pruna, &c.

Frutex est planta, naturæ inter herbas ac arbores mediæ; ad ligneam tamen naturam quam proxime accedens.

Fungus est excrementum arboribus fruticibusve quibusdam adnascentis, vel immediatè è terra prodians.

G

Gemma in Mineralogia sunt lapides pretiosi: in Phytologia, gemmæ idem denotant quod oculi.

Geniculum est internodatio quarundam plantarum.

Granum in nativis semina sonat minutiora, sive rotunda ea sint, sive alius alicujus figuræ. Sic sunt grana piperis, hordei, tritici.

Gummi, Gummi: liquor est concretus ex arboribus diffusus. Vid. l. 1.

N. *Gummi vox est indeclinabile sit, placuit tamen in Plurali efferre gummata, &c.*

H.

Herba est planta frutice minor: seu est quod à radice foliatum, sine caudice provenit, sæpiusque semen in caule fert. In praxi tamen, pro foliis solis ut plurimum usurpatur, e. g. &. Herb. ceterach, i. e. folia.

I.

Inba est arundinacea coma effusa, qualis in milio est.

A 2

Julius.

Julus. Juli sunt folia primum erumpentia, die erste Schößling oder Blätter. Strictè notat Juglandis arboris flores longiusculos, cum foliis prioribus apparentes. Die Drateln oder Musblut.

L.

Lacryma est humor è plantis tum sponte effluens (sive is concreascit, v.g. in oleum, resinam, gummi, sive non) tum facta incisione, erumpens.

Lanugo in Phytologia, sunt filamenta tenella, cuticulæ extimæ instar pilorum seu lanæ adnascentia, v.g. in Verbasco.

Lapides in singulis tribus mundi regnis locum sibi vendicant. In Mineralogia. Vid. lib. 3. Phytologia, cortices duriore, nucleum includentes quandoque lapides referunt. In Zoologia manet significatio mineralogica, calculosque exhibet in animalibus repletos.

Lignum. Vid. l. 2.

Loculamenta sunt seminum involucria, quæ veluti parvæ capsulæ ea occludunt.

Locusta, idem quod oculi, in Zoologia autem certa animalcula referunt.

M.

Matrix in phytologia idem est quod medulla aut cor.

Medulla in Mineralogia partem molliusculam denotat, quæ in saxis nonnunquam reperitur. German. *Steinmark.* In Phytologia mediam cujuslibet partem molliorem ac præ-

stantiorem refert, quam & Cor matricemve appellant. In Zoologia adipem significat in ossium medietate contentam; vel molliorem illam substantiam, quæ in spina ac cranio est.

Minera est terra sive materia ex qua mineralia & maximè metallica fiunt. Sic *minera* ☉is, & ☿ij.

Mineralia. Vid. l. 3.

Musculus est excrementum herbaceum instar lanuginis corticibus arborum, vel ossibus aëri expositis adnascentis. Dicitur & *Ulsnea*; interdum tamen certis plantis attribuitur. Vid. lib. 4.

N.

Nucleus est semen nucibus vel fructibus inclusum.

Nux fructus quosdam denotat cortice lapideo nucleum occludentes.

O.

Oculi, sunt florum prodromi, inque flores explicabiles.

Olea, sunt pinguedines fluidæ. Vide in præparat. Nam omnia ferè præparata sunt.

Ossa Zoologicè notissima sunt, phythologicè ossiculi vocabulum imponitur lapideis corticibus, qui nucleos circumdant.

P.

Pediculus, petiolus est, quo folium, fructus aut flos dependet.

Pinguedo idem est quod adeps, interdum tamen generalius sumitur, ut omnia pingua comprehendat.

Planta est vegetabile integrum, si-

ve at-

ve arborem velis, sive fruticem, sive herbam.

Pulpa est caro, seu substantia fructuum succulenta, inter corticem ac nucleum comprehensa, v. g. pomorum, cerasorum & simil. referturque ad præparata.

R.

Radix est infima pars plantæ, terræ infixæ.

Ramus est velut brachium plantæ.

Resina in classe nativorum, est concreta lacryma certarum arborum, naturæ oleagineæ, ut Terebinthina, &c. In præparatorum classe quid sit. Vide infra.

S.

Salia, quid sint. Vid. c. 3. & l. 2. c. 79.

Semen in Officina minutiores plantarum fructus denotat, ex quibus simile nasci potest.

Sevum est pinguedo duriuscula, sumiturque à folis quadrupedibus cornutis.

Spica. Spicæ sunt summitates in longum deductæ, ut spica lavendulæ.

Stercus est excrementum animalium per anum excretum.

Stipes est pars plantæ inter radicem & ramos, idemque quod caulis.

Stipula folia sunt culmum ambiens.

Succus. Vid. in præparatis.

Summitates, sunt cacuminula herbarum, dicunturque de herbis foliorum

minutiorum. Ut absinthii, Rutæ.

Surculus est, quod ex ramis simplex oritur, estque velut germen quoddam ex ipso trunco vel caudice productum.

T.

Terra. Terræ & in nativis locum habent, & in præparatis; nativarum seriem. Vid. l. 2. c. 3. Terræ significationem in præparatis. Vid. cap. seq.

Testa, ovorum cortex externus appellatur.

Turio. Turiones sunt teneritates summatum ipsarum arborum, quæ singulis annis crescunt.

V.

Vena sunt quæ in plantarum foliis apparent, fibræ, in ramulos divisæ.

Villi. Vide fibræ.

Viscum, (aliis viscus) est frutex peculiaris in arborum quarundam ramis enatus, semper virens.

Umbella sunt summitates plantarum sinuosæ, instar nidi avis formatæ.

Ungues sunt extremitates corneæ digitorum. In Phytologia, Unguiculi interdum idem sunt quod alabastrum.

Ungula. Ungulæ sunt cornea tegumenta, quibus pedes nonnullorum animalium conteguntur.

Urina. Vid. l. 2. c. 5.

Usnea idem quod muscus ossibus vel arboribus adnascens.

De Rebus medicinalibus preparatis.

Preparatorum nomina generalia sunt.

A.

A Ceta preparata. Vid. lib. 2.
Alcohol significat pulverem subtilissimum ac inpalabilem, interdum S. vini rectificatissimum.

Amalgama est mixtura metallicum & vivo. Vid. l. 3.

Amuletum idem est quod Periamma.

Anacollema ἀνακόλλημα (ἀπό τῆς κολλῆς à glutino sic dictum) glutinamentum in genere significat, in praxi autem medica propriè medicamentum dicitur, quod fronti applicatur, ut sanguinis fluxum ad nares vel oculos intercipiat: Fit ferè semper forma capitalismatis, de quo lib. 2.

Apozema ἀπόζωμα. Vid. Decoctum.

Apophlegmatismus est medicamentum pollens facultate pituitam à cerebro eliciendi, perque os excernendi. Fit forma Gargarismi, Masticatorii & Unguenti. Vid. l. 2.

Aqua destillata seu stillatitia est lymphæ destillatione elicta, constans ex parte aquea & spirituosâ, ita tamen ut propius ad naturam aqueam accedat. Vid lib. 2.

N. **Aquarum stillatitiarum** nomine veniunt (quamvis minus accuratè) nonnulli spiritus, ut ex mineral. R, V &

simil. Ex vegetabilibus omnes ferè aquæ compositæ. Vid. ibid. l. 2.

N. II. Imponitur iisdem singularibus quibusdam præparationibus, ut sunt ▽ benedicta, &c. vide infusionem & ij.

Arcanum Theophrasto est Quinta rei essentia summè exaltata, sed ut ait idem: Est virtus rei millecupla exaltatione emendata. Quatuor enim inprimis arcana jactitat. 1. Arcanum primæ materiæ. 2. Lapidis philosophorum. 3. & ij. vitæ. 4. Tincturæ. Lib. 5. Archidox.

N. **Arcanum aliis est Extractum in specie sic dictum.**

B.

Bacilli nomen imponitur medicamentis figurâ bacillorum, i.e. teretiformatis; ut bacilli fumales, bacilli pectorales.

Balani, Βάλανοι idem sonant quod glandes seu suppositoria.

Balneum, propriè totius corporis lotio est, fitque vel liquore naturali, v. g. aquâ dulci, thermis, vel artificiali, Non rarè tamen & pro lotionè partium solummodo inferiorum sumitur, quas infusus & semicupia vulgò vocant.

Balsamus vel Balsamum. Balsami vocabulum pluribus in Officina usurpatur significationibus. (1.) Denotat genus quoddam odoramenti Crassiusculi

fusculi instar unguenti, vel linimenti, Et hæc significatio usitatissima est. E. g. Balsamus rosarum, Apoplecticus & simil. (2.) Solent quoque ex gummi, resinisque cum spiritu Vini *liquores destillari*, qui extrinsecus illinuntur, balsamique nomine veniunt; ut balsamus nervinus, sciaticus & simil. (3.) *Inunctorium liquorem* significat, eumque oleo crassiores, linimento liquidiores: Balsamum ros inunctorium appellabimus. Vid. l. 2. de unguentis. (4.) Balsami nomen sibi vindicarunt *Salia fusa & liquata*, ut Balsamus 8. Tandem (5.) sunt *singulares* quædam *preparationes*, quibus balsami nomen imponunt, ut balsamus Sulph. sanguinis humani. De quibus sigillatim suo loco.

Bolus medicamentum est consistentia magis duriuscula quam Eleotuarium. sic dictum quod bucca capiatur.

C.

Calx proprie dicitur quod calcinando vel in alcohol conversum, ut calx Ois Dnæ, &c. vel saltem friabile factum est, ut C. C. & simil.

Caput mortuum est residua illa materia crassa ac sicca, quæ in destillationibus, præcipue mineralium remanet, communissimè autem remanentiam 9. li notat.

Cataplasma. Medicamentum est topicum pulvis consistentia.

Cauterium à viribus sic dicitur, quod cutem carnemque subjectam adurat.

sive id fiat igne actuali v. g. ferro candenti? sive potenciali, i. e. medicamentis. Possunt autem cauterisantia formulis fieri variis, nempe forma lapidum, vid. 2. Spiritum, v. g. olei 8. ij butyracei; lixivorum. v. g. è cineribus sarmentorum.

Cementum est pulvis, cujus ope calcinatio cementatoria peragitur.

Ceratum vel Ceratum à cera sic dictum, Medicamentum est, topicum, inter Emplastrum ac unguentem consistentiæ mediæ: seu, est Emplastrum molliusculum. Vid. l. 2.

Cinis. est pulvis ille griseus ex combustionem rerum crematiliū residuus. Constatque ex sale (qui elixivari potest) atque terra mortua.

Clareum Vinum est aromatatum infusione imprægnatum atque cum saccharo dulcoratum. Dicitur alias vinum seu potus Hippocraticus.

Clyster, Clyisma, Enema, Medicamentum liquidum est, quod ano vel utero per Siphonem intruditur. Vid. lib. 2.

Collutiones oris *σκληρόματα*, sunt liquores medicamentosi, qui in ore continentur, beneficioque linguæ hinc inde agitantur.

Collyrium medicamentum est, quod oculis immittitur, sive liquidum id sit, sive solidum. Liquida veniunt ferè titulo aquarum, tum quoque unguenti: Sicca pulverem vel Trochiscorum; Hos nomine peculiari *Sief* appellant.

Colo-

Colophonia est pars resinarum crassior ex harum destillationibus coctionibusve residua. Vid. lib. 4.

Conditura dicuntur quæ conditura, i. e. condiendo facta sunt *eingemachte Saften*. Vid. lib. 2.

Confecta, id est saccharo obducta & incrustata, eodemque sensu dicuntur & confectiones. Vid. lib. 2.

N. I. *Confectionis nomen datum est & speciebus nonnullis cum saccharo mixtis: Unde confectiones aromatica, &c. dici solent. Verum præstat nomine specierum eas nominare.*

N. II. *Est & Confectio Hamech, id est Electuarium.*

Conserve sunt medicamenta ex floribus, foliis, radicibus, cum saccharo conquassatis, facta. Vulgo *Zucker* / ut conserva rosarum *Rosen Zucker*.

Corrosivum idem est quod causticum. Vide *Cauterium*.

Crocus est calx pulvereæ ad croceum vergens colorem, paratur autem vel ex S° io, vel S° te, vel S° re.

Cucupha est Caputium medicamentis cephalicis repletum. Vid. l. 2. *Sacculus*.

D.

Decoctum: Decocta sunt brodia liquida, constantia ex conveniente liquore, viribus medicamentosis, interveniente debita coctione, imprægnato. In specie autem dicitur de potionibus intrinsecus assumendis, ex decocto brodio paratis, quas alias *συνζεμαται* vocant.

Diachysma, i. e. Collutio oris. Vid. de Gargarismis, lib. 2.

Dentifricium medicamentum est dentibus, vel gingivis fricandis destinatum, sive id liquor sit. Vid. l. 2. de Gargarismis. sive linimentum, sive pulvis. Vid. lib. 2. suis locis.

Dropax, $\Delta\rho\acute{o}\pi\alpha\zeta$, Picatio ($\pi\iota\tau\omega\mu\alpha$) medicamentum est emplasticum Cui fortiter adhærens, sic dictum à pice qua sola olim reliqua ingredientia suscipiebantur. Vid. l. 2. *Empl.*

E.

Eclegma est medicamentum internum, pulmonibus dicatum syrupo crassius, quod in ore detinetur, ut paulatim per guttur in pulmones delabatur. Dicitur & *Linctus*, *Lambile*, *Loch*, *Lohoh*.

Electuarium est medicamentum syrupo & eclegmate crassius, constans ex medicamentis durioribus pulverisatis, melli, syrupo, saccharo syrupisato, vel alii alicui convenienti liquori melligeno, (id est mellis consistentiæ) accuratè mixtis.

N. *Sunt & nonnulla species hoc nomine insignita, scil. quia olim (ut nonnulli volunt) cum saccharo in Electuarii formam redigebantur. Sic dicitur Electuarium Ducis, Eldegemmis, &c. Verum quia mos ille abolevit, præstat Specierum nomen usurpare.*

Eleosaccharum nihil est aliud quàm oleum destillatum cum saccharo mixtum. E. g. olei Sj . sacchar. ℥j . vel circiter.

Elixyr-

CAPUT III.

Elixir est species tincturarum, quas Elixiris nomine appellare placuit. Ut Elixir proprietatis, Elix. vitæ, &c.

Embrocha ἰμῆροχῆ irrigatio, instillatio, stillicidium. Fomentationis genus est, cum liquor fomentans stillatim seu guttatim in partem fomentandam funditur.

Emplastrum est topicum medicamentum notissimum. Germ. *Plaster*.

Emulsio medicamentum est liquidum lacteum, i. e. lac mentiens. Vid. lib. 2.

Epithema est medicamentum liquidum parti alicui imponendum. Vid. lib. 2.

Errhina sunt medicamenta, quæ naribus immittuntur, adeoque & ptarmica comprehendunt. Specialiùs tamen plerumque sumitur errhinum, quatenus pituitam sine sternutatione prolicat. Vid. lib. 2.

Essentia Essentiæ vocabulum significat accuratè loquendo balsamicam rei partem à crassiori separatam. Quare cum exactissima rei separatio beneficio extractionis peragatur, sit ut pars illa balsamica à crassiore corpore extracta Essentia κατ' ἐξοχὴν dicatur, alias à modo fiendi Extractum.

N. I. Nonnunquam attribuitur quoque Essentia vocabulum succis expressis ac spissatis. Perum præstaret hos proprio suo nomine, quod minus confusio briatur, nominare.

N. II. Sunt & qui Eleosacchara Essentia vocant, sed abusive.

Extractum Essentia rei est vi liquoris alicujus, è corpore crassiore separata ad consistentiam justam inspissata. Vid. lib. 2.

N. I. Extractum quoque generaliter nonnunquam sumitur, ut & succos sub se comprehendat non secus ac Essentia.

F.

Farina est pulvis molendo contritus.

Fecula sunt pulveres in certis vegetabilium expressionibus subsidentes. Vid. lib. 2.

Flores in præparatis qui sint. Vid. lib. 2.

Frontale, Epithema denotat, fronti applicandum.

G.

Galreda. Succus est inspissatus viscosus, lucidus, fitque plerumque ex coctis partibus animalium cartilagineis, v. g. ex pedibus vituli, &c. Galrey.

Gelatina ferè idem est cum Galreda, nisi quod generalius usurpetur, & pro quocunque succo pellucido lento glutinosoque sumatur, qui tamen in primis fieri consuevit ex succis fructuum. E. g. pomorum, &c. ut Gelatina Cytoniorum, CC.

Gargarismus, liquorem denotat, quos faucesque gargarizando colluuntur. Vid. lib. 2.

Glandes idem sunt cum supposito-riis.

Gummi in classe, præparatorum, nihil

B

hil

hil aliud est, quam Extractum resinofum, Vid. lib. 2.

H.

Holippe sunt placentulæ ex infusione medicamentali farinæque triticea, addito insuper tantillo sacchari, subactæ.

I.

Infusum, Infusio est liquor qualitatibus medicamentosis, sola maceratione imprægnatus. Parum itaque differt à decocto, quippe quod huic coquendo accedit, accedenteque interdum maceratione, id ferè illi, sola maceratione. Usitatiùs tamen de potionibus dicitur ac imprimis de quibusdam purgantibus ex Vino, cerevisia vel simili liquore, dicta ratione paratis. Vid. lib. 2.

Juleb, nomen Persicum est, idemque sonat quod potio dulcis. Arabibus vox Julebi à syrupis non distinguitur. Notratibus autem Julebi seu Julapia, (Græc. ζυλάπια) potiones sunt in praxi usitatissimæ syrupis dilutiores, constantque ex liquoribus clarioribus, saccharo vel syrupo convenienti ad gratum saporem dulcoratis.

L.

Lapis. Lapidis nomen nonnullis imponitur medicamentis, quæ ad duritiem lapideam vel terrestrem excocta sunt. Vid. lib. 2.

Lapis vegetabilis Medicamenti species est constans ex sale, Tinctura, oleoque ad duritiem ferè lapidis excoctis. Vid. lib. 2.

Laudanum. dicitur de solo medicamento ex opio confecto, idque vocant Laudanum opiatum. de quo vid. lib. 4.

Linctus, i. e. Eclegma.

Linimentum medicamentum est topicum pingue, oleo crassius, unguendo liquidius, corporis illinitioni dicatum. Vid. 2. lib. Ung.

Liquor quamvis de quolibet humore dici possit, in specie tamen humorem denotat per deliquium paratum, quem oleum alias, nonnunquam Balsamum dicere solent.

N. Nonnunquam & pro destillato liquore usurpatur. E. g. liquor cranii, liquor C. C. liquor seu spiritus L. Guajaci.

Lobob, i. e. Eclegma.

Lorio, fumitur pro balneo. Lavantur itidem nonnulla simplicia, ut Terræ, Metalla, & sim. de quibus spectatim.

Lozonga sunt idem quod Morsali.

M.

Magisterium, Magisterii nomen diversimodè usurpatur. I. Datur pulveribus solutione ac præcipitatione paratis, ut Mag. C. C. Corallorum. II. Tribuitur resinis seu extractis resinosis, ut sunt magisterium scammonii, Jalappæ, &c. Accurate tamen loquendo magisterium vocari volunt, ubi nonnihil menstrui cum essentia extracta conjunctum mansit.

Malagma idem majoribus sonat quod cataplasma.

Martius panis, Marcipanis, Maza-panis,

panis, Pasta regia, Panis dulciarius, sunt placentæ ex amygdalis dulcibus excort. & saccharo (quod sumitur duplum, triplum, nonnunquam ana) accedente aqua rosarum subactæ & pistæ.

N. Addi possunt & alia. E. g. nuclei pini, pistacia, avellana, cortices citri conditi, aromata & simil.

Marmelata est Gelatina cottoniorum. Vid. lib. 2.

Massa ex officina pistoria ad pharmacenticam translata est, denotatque subactam illam materiam tum pastæ regiz, tum pillulis inde formandis destinatam.

Masticatorium, est medicamentum apophlegmatizans, quod in ore detentum dentibusque masticatum pituitam liquat, èque cerebro ad palatum derivat. Vid. lib. 2.

Mel. Mellis nomen Pharmacopæis nonnunquam denotat succum simplicem ad mellis consistentiam inspissatum, melque sapore æmulantem. Sic convenit cum sapa sive Rohob; ut Mel passulatum, Juniperinum. Vid. lib. 2. Nonnunquam refert syrupum cum melle paratum. Vid. lib. 2. de Syrupis.

Mensurum dicitur liquor, qui ad Tincturas extrahendas adhibetur, de quo vid. lib. 2. tit. de Extractis.

Mixtura, generaliter de quibuscunque mixtis dici potest, in praxi tamen medica usurpatur communiter pro Electuario, quod ex tempore

misceri solet. Sic dicitur F. Mixtura, i. e. Electuarium. Vid. lib. 2. de Electuariis.

Morsuli seu Morselli, Tabula: medicamenta sunt quadrata ut plurimum, parata ex pulveribus & similibus saccharo soluto susceptis, superque tabulam ligneam, lapideam cupreamve effusis, ut consolidentur.

Moretus mulierculis nostratibus usitatissimum potionis genus est, quod parari faciunt, ubi præsumptio imprægnationis adest, persuasum nimirum sibi habent, falsam imprægnationem eo exturbari, veram corroborari. Vid. lib. 2.

N.

Nasale idem quod Errhinum.

Nasale idem est quod Pessus.

O.

Odoramenta sunt medicamenta odoris gratia adhibenda, Odorem sive per se habent, sive accedente incensione. Fiunt autem formularum variarum. Sine accensione quæ in usum veniunt, fiunt ferè forma pulverum, sacculorum, linimentorum, balsamorum, massarum odoratarum (quas poma ambræ vocant) aquarum saponum & simil. Accedente accensione vel liquefactione quæ odorem halant, parantur usitatus forma pulverum, trochiscorum, candelarum & bacillorum massarumve fumalium.

Oleum proprie liquor est pinguis, balsamo tenuior.

B 2

N. I.

N. I. Nonnunquam tamen Balsamo crassior est, ut oleum anisi, nucisæ express.

N. II. Imponitur quoque olei nomen quamvis minus accurate, nonnullis spirituosus liquoribus, vel destillatione peractis: sic dicitur oleum Oli Sal. Com. & simil. Vid. spiritus, vel per deliquium dissolutis, ut oleum Tart. vid. liquor.

Opiatum. Confectio opiata: Hoc nominis Electuariis nonnullis (quamvis minus apte) imponitur, non quod necessarium opium contineant, sed quod medicamentis veterum, quæ opium continent, consistentia respondeant.

Oxyrrhodynon (ὀξύρρυδιον & ὀξύρρυδιον, sic dictum) medicamentum in genere sonat ex aceto rosisque factum ad dolorem leniendum. Practici verò selecta hac significatione generali, soli capiti, fronti, collove id dicarunt, atque ex olei rosar. part. iij. acet. parte j. concinnarunt, nostrates loco olei rosar. sumunt & alia. E. g. violaceum, papav. myrtin. de Nymph.

P.

Pandaleum medicamentum est internum à rotulis morsulisve non nisi sola forma differens: fitque quando materia medicamentosa saccharo soluto suscepta in pyxidem effunditur, ut inibi indureseat.

Pasta Regia. Vid. Martius panis

Pastilli. idem quod Trochisci.

Pessi. Pessaria (Barbaris nasalia) sunt medicamenta solida, uteri collo intruenda.

Periamma, Periapron, Amuletum, Xenechion. Medicamentum est quod de collo suspensum morbum arcere creditur, ac præcipue pestem.

Phlegma liquor est destillatus aquosus spirituosus liquori contradistinctus. Vid. aq. destillata.

Phenigmus mitior ac lenior est sinapismus scil. qui solam cutem rubificat.

Pilula, i. e. parvæ pilæ, sunt medicamenta rotunda deglutitioni aptata.

Pineatum seu Pineolatum fit ex pineis saccharo & aqua rosarum, ad modum scil. quo Diamygdalatum seu Marcius panis ex amygdalis saccharo & ∇ rosarum fieri solet.

Pomum ambra, odoramenti genus est, ex medicamentis odoriferis in massam redactis.

Potio in genere liquorem denotat potulentum, in præxi autem ferè de purgante potu intelligitur. Vid. lib. 2.

Preparata i. e. præparatione (specialiter sic dicta) elaborata: ut C. C. præparatum. Vid. lib. 2.

Pulvis. Pulveris nomen etsi generaliter minutissima quæque denoter, quocumque modo facta: attamen communiter pulverisatis hoc nomen imponitur, siue simplicia illa sint, siue composita. Inter compositos autem pulveres, sunt qui species vocantur, sunt & qui Trageæ. Præstaret tamen omnes pulveres compositos, ad differentiam simplicium, species nominare.

Quin-

Q.

Quinta essentia propriè spiritum denotat, destillatum ex succis fermentatione exaltatis. De quo in spirituum classe. l. 2.

R.

Resina est substantia oleaginosa naturæ, sive in forma molliori illa sit, sive in duriori. Sunt autem Resinæ vel nativæ de quibus l. 4. vel extractio-
ne Chymica paratæ. Ut Resina Diagy-
dii & simil. De quibus in Extractis l. 2.
ac l. 4.

Rob, Rohob, Sapa, est succus fru-
ctuum, ad mellis consistentiam ut plu-
rimum per se, interdum quoque cum
saccharo inspissatus. Priores simplices
appellare licet. dabunturque l. 2. de suc-
cis. Posteriores compositos, dantur-
que l. 2. sub Symplicis.

Rotula, sunt Tabulæ orbiculorum
instar, constantes ex medicamentis
susceptis saccharo in conveniente li-
quore soluto inque orbiculos supra ta-
bulam effuso.

S.

Sacculus medicamentosus fomento-
rum genus est, constans ex convenien-
tibus medicamentis siccis, sacculo insu-
tis.

*N. Est & sacculus odoriferus i. e. odo-
riferis completus, ut naribus admoveatur.*

Sal accuratè loquendo est substan-
tia in aqua solubilis, concretescibilis seu
crystallifabilis. Communiter tamen
dicuntur & salia (sed minus aptè,) la-
pides vel metalla nonnulla acido li-

quore corrosa, atque iterum coagu-
lata; Ut Sal corallorum, Sal H i & si-
mil.

Sapa idem quod *Roob*. *kal' i' ex' ur*
autem dicitur de musto inspissato & ad
tertiās cocto.

Saponea i. e. linctus ex amygdalis.

Sief. i. e. Collyrium siccum, vid. l. 2.

Sinapismus est cataplasma, vel mas-
sa, vim habens cuti ruborem, vel ar-
dorem, vesicasve inducendi; adeoque
continet sub se phænigmium & vesica-
toria.

Smegma odoratum, Sapo odoratus,
fit ex sapone (Veneto imprimis) cui
pulveres odorati convenientes im-
miscentur, ac impastando cum ∇
fragranti, v. g. rosarum subiguntur. Vid.
lib. 2.

Sparadrapus est Linteum Emplastro
ad ignem fluenti immersum, extensum
& refrigeratum. Dicitur & *tela empla-
stica*.

Species dicuntur in Officinis sim-
plicia (ingredientia) pro compositis
inde conficiendis coordinata. Sic di-
cuntur Species. Theriaca i. e. ex qui-
bus theriaca compilatur, sic sunt &
Species decoctorum usualium. Præ
reliquis tamen hoc nomen sibi ven-
dicant pulveres nonnulli, tum aro-
matici tum cathartici. Forsan, quia
ordinati fuerint olim, ut inde con-
ficerentur electuaria, morsuli vel ro-
tulæ. Sic sunt species aromaticæ ro-
sarum. Species Diaturbith cum Rhabar-
baro, &c.

Spiritus est liquor destillatus naturæ magis spirituosæ, non secus ac e contra aquæ destillatæ magis ad naturam aquæ simplices accedunt.

N. *Spiritus* nomen abusive sibi vendicant quoque olea nonnulla subtiliora, ut *Spiritus Terebinthina & simil.*

Stymma est spissamentum seu crassamentum rerum, (florum rerumque aliarum) quod remanet dum in oleis macerata, exprimuntur.

Succus. Succus qui in officinis vocantur, expressiones sunt, seu expressæ essentia, aquæ naturæ, i. e. aquæ permiscibiles, ausgepreste Säfte.

N. *Solis vegetabilibus competit, vide suo loco lib. 2.*

Suffusus, Suffumigium, Stupula est Vapor suave olens, ex refragante accensa vel carbonibus vivis injecta excitatus, Variarum autem res suffumigans potest fieri formularum: pulverum, candelarum, bacillorum, trochiscorum, &c.

Suppositorium est medicamentum solidum, teres ac pyramidale, instar digiti, intrusioni in anum destinatum.

Syrupus, est liquor medicamentosis qualitatibus imprægnatus, additoque saccharo aut melle, ad mellis consistentiam excoctus.

T.

Tabula vid. morsuli.

Tartarus, terrestris sal est. Vid. l. 4.

Terra morina, est terra ex elixivia-

tione residua, omnibus facultatibus efficitur destituta.

Tinctura vox diversimodè usurpatur, usitatissimè tamen potissimam rei partem denotat, sub colore certo infusionis beneficio, extractam, sive cum menstruo adhuc conjuncta illa sit (quæ vulgarissima est significatio) sive ab eodem separata; quo sensu Extractum communiter effertur.

N. Sumitur quoque nonnunquam *Tinctura* pro *Essentia* rei ulterius elaborata. Vide *Tincturas* § ij, quas tamen *Tincturas magisteriales* appellare commodius est.

Tragea, Tragema, bellaria, est pulvis introassumendus ex speciebus & simil. pulveribus simplicibus, cum saccharo confectisve ad saporem gratum commixtis, vide l. 2. sub pulver. & spec.

Trochiscus, Trochisci sunt species seu pulveres mucilagine, e. g. tragacanthæ, althææ & simil. ut eo melius ad tempus durare possint, suscepti, incorporati, inque orbiculos parvos formati. Trochisci sublinguales, i. e. qui sub lingua detinentur, ut dissolvantur & per guttur in pulmones defluant.

V.

Vinum medicatum, Vina medicata sunt infusiones in vino factæ vid. l. 2.

Unguentum est medicamentum topicum pingue linimento durius, emplastro mollius, Germ. Salb.

De Speciebus productionum nativarum.

Descriptio rei medicinalis pharmacologica, est enodatio constitutionis, usurpationis ac signationis, (quantum scilicet hæc spectant ad bene medicandum.)

Constitutio est rei medicinalis productio, collectio & asservatio.

Productio est quæ res fit. Est igitur productionis descriptio, deductio specierum & circumstantiarum ad productionem requisitarum, (in quantum scilicet faciunt ad pharmacologicam rei productionem.)

Estque rerum tum *Nativarum* tum *Preparatarum*.

Nativarum productio primæva est creatio, cui subinde successerunt tum generatio, quasi generatio, nutritio, quæ nutritio; tum operationes seu motus utrisque illis subijuncti: quales in Vegetabilium productione, solicultura, satio, insitio, amputatio; in animalium, conceptio, natiuitas, educatio, &c.

N. *Species productionis nativæ*, uti & harum circumstantia imprimis ac primario ad physicam pertinent: attamen quia intentioni pharmacologica non parum inserviunt, breviter eas delibare libet. Itaque.

Creatio est ortus rerum naturalium ex nihilo, i.e. quo rerum principia informia primum ex nihilo condita, blando motu externo in lucem seu vitam emerferunt, inque membra sese extendere, adeoque curriculum destinatum

absolvere, iussa, i.e. apta reddita sunt.

N. In creatione macrocosmi supervenit Terra, aqua, i.e. liquido siccum informi & vacuo blandus focus spiritus Elohim, superficiei aquarum incubantis, cuius scilicet auxilio accedente benedictione divina lux seu vita fuit introducta. In Vegetabilium ac Animalium creatione simili ratione principia materialia in macrocosmi generatorio seu in tenebris acabyssu (orco Hippocratis nocte Orphei) sopita, coagulataque fori matricis, vel si majoris spiritus ejusdem Elohim, sic jubente Creatore, in lucem seu vitam (diem Orphei) prodierunt; exceptio solo homine, qui peculiariter ex adamæ vapore fecundata fuit conditus, seorsimque spiraculo vitæ afflatus.

Generatio est ortus rerum naturalium ex semine, i.e. quo principia rerum (quæ proximè in semine existunt) ex præexistente materia parantur, ac subinde fori matricis in actum, secundum speciem suam emergunt. Membra itaque Generationis sunt, tum seminis præparatio, tum ejusdem emissio. Et hic modus oriendi proprius est rebus nativis primariis, videlicet vegetabilibus & animalibus horumque membris genuinis.

N. Generatio est rerum innovatio; mirum res postquam curriculum suum absolverint, vel in eodem interrupta fuerint reverteruntur paulatim in naturam primordiale chaoticam, unde postmo-

dum ab aliis deprompta tum in materiam seminalem, tum nutritivam adoptantur, adeoque aliarum rerum dominio subiecta peregrinantur. Et hac est rerum vicissitudo, toties à majoribus decantata.

Macrocosmus in se consideratus quia perenni duratione durat, à renovatione generatoria excusatur, adeoque semine destitutus est, quo nova ejus fiat productio: nihilominus tamen laudabile quoddam exhibet peritoma, lacti in animalibus respondens, quod infundit in generatorium suum, globum scilicet hunc inferiorem, liberis suis nutrimentum suffecturus. Vegetabilium ac Animalium species, quia individuorum novorum successione conservari destinata sunt, semina nova requirunt, seu si majoris seminales rationes. Hæ vel manifeste per speciem propagantur, unde exurgit generatio univoca: vel citra manifestam rationem seminalem producuntur, unde generatio aquivoca.

Nutritio est productio rei genitæ ex nutrimento, i. e. qua res genita perfectione elaborati nutrimenti curriculum destinatum peragitur. Membra ejus sunt tum Materię nutritivæ elaboratio, tum susfectio seu assimilatio. Competit itidem solis rebus primariis.

N. Nutritio est rerum progressio: Nimirum rei cuique naturali curriculum destinatum est, quod ab ortu ad ætatem auferendo & inde ad interitum descendendo habet peragendum. Peractio hæc fit beneficio materia nutri-

tiva, unde subrogatur, quod actu vitali deperit, simulac accedit, quo ad ætatem res augeat. Materia illa, quia respectu rei nutritanda universalior, impurior, indegestior existit, elaboratur subinde vi illius nutritiva, hujusque ministris, i. e. depuratur ab heterogeneis, evahitur ad maturitatem, adeoque indolem rei nutritanda induit. Rem exemplis declarabimus. Vegetabilium & animalium nutritio notissima est: Ex utraque itaque non difficile erit & Macrocosmi nutritionem metiri. Materia, qua Macrocosmus nutritur, sunt ipsamet vegetabilia & animalia in chaos seu principia sua reducta, seu, si majoris, sunt res particulares quacunque. Fidelicet hæc ut & macrocosmo nutriuntur, ita vicissim eidem nutrimentum exhibent, adeoque omnia per circuitum quasi voluntantur. Modus hic est: Res defuncta progredique nescientes resolvuntur, digerunturque quodammodo in globo inferiori seu macrocosmi ventriculo; hinc sequestratur quod maturius est, in quo ærem seu mesaraicas attollitur, ulteriori subjiciendum digestioni. Inde ad C seu macrocosmi Epar rapitur, concoctionem secundam subiturum. Ex C ad ultiores deducitur elaborationes. Nimirum pars utilior ad solem rapitur, seu macrocosmi officinam vitalem cordi microcosmico respondentem. Inibi vi lucida seu si majoris vitali facultate perfusa sub specie macularum facularumve exprimitur, universitatique communicatur, adeoque cuilibet membro universalis surrogatur unde vivat,

atque

atque nutriatur. Reliquum cen peritoma quod redundat, deorsum vergit, inferiorique globo communicatur, ubi partim nutrimentum rebus exhibet, partim impragnatum astralibus influentiis in seminales rationes rerum particularium migrat, idque vi facultatum productivarum i.e. generaliarum, nutritivarum, fermentativarum, quibus globus hic inferior vi benedictionis divinae perfusus est; Et hac nutritio videtur macrocosmica, quae non minus ac animalium & vegetabilium excrementa sua exhibet. In terra remanent crassiora, ibidem cen in prima digestionis officina sequestrata; in aëre cen mesaraicis secernuntur liquidiora, unde pluvia, nix & sim. viscosiora, unde mucilago illa decidens (Sternschos.) &c. Luna separat excrementa tum crassiora, quae detrūdūt ad maculosum sui locum, cen macrocosmi vesicam biliariam in Epate sitam, tum liquidiora exhibet, eaque ad globum inferiorem, & potissimum ad mare cen renes & vesicam urinariam transmittit, ut inibi vi sua salina ac acri generationem globi inferioris promoveant. Mirahac scio novaque videbuntur, quibus rerum analogia fuerit peregrina: Verum nullus dubito, quin diligenti scrutatione omnia futura sint perspicua; sin minus, quisque suo sensu abundet: Nec enim hac sunt, super quibus proderit litem tantopere movisse, utpote qua cūtra salutis iacturam sciri ignorarive non nequeunt. Id quod ut de his, ita & de aliis ejusdem farinae quamplu-

rimis moneo, quae inter modernos tanto tamē astu aguantur, ut vel legis divinae respectum postponatur, fama proximi detrahatur, sanuati propria noceatur, lectoriq; legendi fastidium procreetur.

Quasi generatio est ortus rerum naturalium secundariorum, ex materia quasi semine, i.e. quo principia rerum in primariorum productione redundantia, in speciem aliam, secundariam scil. transmutantur.

Quasi Nutritio est, quae eadem illa materia successu ē maturefcit.

N. Rerum secundariorum productio paulo secus sese habet quam primariorum. Fiunt enim non per generationem, quae seminale principium in membra diversa secernitur, neque per nutritionem, quae membra in sinuatione ac assimilatione nutrimenti secundum dimensiones augefcunt, sed per solam alterationem, appositionem, accretionem. Nimirum Excrementa quae in nutritione primariorum suppetunt, vel alterantur levi saltem alteratione, condensatione, mixtione, & sim. vel concursu ac conspiratione causarum aliarum transmutantur. Sic fiunt meteora aquea separatione vaporum aqueorum, qui condensati sub forma pluviae, nivis, grandinis, decidunt: Sic fiunt meteora ignea, separatione scil. materia inflammabilis, qualem refert in inferioribus nitrum, sulphur, aurum sclopetans, & sim. Sic fit & mucilago illa viscosa instar stellae cadentis decidens (Sternschos.) His annumeranda & mineralia, ē quibus tamen nonnulla

in formam transplantantur, quâ etiam cum primariis certare videntur. In regno vegetabili, hac ratione suppetunt, succi exudantes, lacryma, melligo florum, resina, gummi, quin & fungi. In animalibus, Urina, sudor, lacryma, ster-

cora, Zibetum, moschus, salia, arenula, calculi, & sim.

Et hi modi sunt principaliores productionum nativarum ad quos reliqui ceu ministri referri facile possunt.

CAPUT V.

De Principiis Essentialibus rerum nativarum.

Circumstantiæ ad nativarum productionem, requisitæ præcipuè sunt; Principia constitutiva Efficiens, Materia, Tempus & Locus.

Principia constitutiva voto quæ ipsam rem constituunt.

N. Principiorum horum consideratio duplex est, tum quid dativa, i.e. quoad esse suum; tum causalis, i.e. quoad causari. Priori consideratione hoc capite veniunt, posteriori capp. sequentibus. Quid ditas res compilata est è substantiali & accidentali. Substantiale est ipsamet rei & oia accidentali suo primum & per se substrata: Accidentale est facultas seu qualitas substantia dicta proximè primum & per se inherens.

Principia constitutiva rerum naturalium sunt Spiritus & Corpus, quibus additur vita ceu principium tertium.

N. Decantata sunt apud Hermeticos principia cognitionis, Lumen scil. Natura & Gratia, de quibus data hac de principiis occasione parum differere libet. Natura creator Deus ut in se bonus existit; ita & bonitatis pro arbi-

trio tamen & beneplacito suo communicativus. Hinc creaturarum exordium ac bonitas, tum supranaturalium ac invisibilium; tum naturalium & visibilium. Vereque enim oriuntur ex bonitate divina, scilicet sunt à Deo condita, quibus ad eum vehemur. Eapropter quoniam bonitas perfectissima absolutissimæ, in Deo concentrata est, adeo ut nihil boni dari possit, quod à bonitate illa alienum sit (quippe imperfectum id foret) creaturarum bonitatem creatoris analogam esse oportuit. Siquidem ergo res cunctæ analogæ sunt ad Dei bonitatem relatæ, & inter se eas analogas esse, necessum est. Hinc liquet rerum naturalium analogiam, ad iumentum esse cognoscenda nature non postremum, nimirum ex notiori ad ignotius per analogiam pervenire licet. En principium cognitionis, quod lumen Natura nonnullis cluit, cuius sc. splendore creato, divina accedente institutione, (quam lumen Gratia vocant) in rerum penetralia penetrari potuit. Verum enim vero, quia Natura, quæ benedictione divina speculum creata erat

puris-

purissimum, nitidissimum, pellucidissimum, maledictione evasit umbrosum, obscurum, maculosum; unde & cognitio illa obscurata & depravata fuit adeo, ut vix quicquam solidi sine hallucinatione cognoscere liceret, ingenia nonnunquam excitavit excitatque creator excellentiora, quorum opera cognitio illa observationibus eruatur, emendetur, adeoque innotescat: simul ac institutionem suam literis consignari fecit, quibus scilicet cognitio illa acquisita dirigatur, examinetur, confirmetur. En Lumen Naturae uti & Gratia Lumen principia cognitionis multoties decantata: sed ad principia essentialia.

Spiritus est principium primum, instructum facultatibus peragendi curriculum sibi natura commissum.

Seu, Spiritus est substantia subtilissima vi creationis primum producta, ac postmodum vi benedictionis propagata, pollens facultatibus quibus curriculum secundum suam speciem peragat.

N. Spiritus hic nihil aliud est, quam principium cuiuscunque rei formale, actionum omnium scaturigo, Philosophis nonnullis dicitur Sulph. quod tamen diversum quid esse scias, ab oleo vel spirituosissima illa ac inflammabili substantia materiali, cui isdem sulphuris nomen imponi solet.

Corpus est alterum principium, spiritus illius adaptatum subiectum, cum & in quo curriculum destinatum peragat, imbutum qualitatibus, quibus

spiritus sui facultatibus corresponsdeant & obediant.

N. Dicitur principium materiale, compactumque est ex liquido & arido, quae ut in existentia primordiali sunt simplicissima, unitissimaque; ita seceruntur incrassanturque subinde in progressionem suam, ac explicantur, in liquidum, aridum, uti & in liquido aridum, (i.e. in salinam naturam) Et haec singula in existentia propria exhiberi artificio possunt. De quibus infra. Accidentia igitur corporis essentialia sunt liquida; liquiditas; humiditas; arida; ariditas, siccitas, utriusque frigiditas, salina natura sapor, vis penetrabilis, fermentabilis, &c.

Ignis (actus) est principium tertium, prioribus superveniens, stipatum calore, cuius vi illa in actum traducuntur.

N. Principia duo priora uniuntur, non ut otiosa sint, sed uti Deus est actus perfectissimus, vitaeque, vitarum; ita & cunctas creaturas in actum collocavit, i.e. in vitam. Vitam puta non strictiore significatione solum, qua motum vegetativis operationibus prodit, sed latiore, qua rei cuiuscunque actum seu intellectum refert, etiam si obscurior illa, minusque conspicua sit; qualis in stellis, metallis, & sim. Sunt itaque in rebus naturalibus vitalibus, ac utat' & ex rebus primariis, Spiritus, Corpus & Vita, quae adeo arte in statu vitali unita sunt, difficulter invicem distinguantur. Res exemplo ignis ardentis quodammodo illustrari potest, quippe

hic cœu res vulgarissima ad presentandam vitam ad omnium oculos positus videtur. Ignis ardens tria exhibet 1. substantiam spirituosam flagrabilem, 2. corpoream aliquatim effumabilem, spiritus scil. illius subiectum, ac denique 3. igneam flammam: quæ tria non modo ipsum ignem flamma comprehensum referunt, sed effluuium spirant, ejusdem cum illo natura. Simili ratione sese res habet in actu seu igne vitali. Adest nimirum inibi spiritus aptus natus ignem vitalem suscipere, facultatesque suas pro re nata exercere. Simili sane modo, quo oleum accensum pro natura illius olei, odoremhalat. Illum si insitum cuiusque spiritum, appellare libuerit, per me licet. Adest & corporea substantia, spiritus illius subiectum lychno in lampade, re-

spondens. Adest tertio & ignis seu flamma vitalis, qua duo illa vivunt. En essentiam rei naturalis in vitâ constituta ex qua insuper effluvia procedunt, quæ rebus exteris pro re nata eunt in servitum. Est porro ignis idem illud, quod in creationis historia $\gamma\iota\alpha$, i. e. lucis voce venit, quippe hac igni essentialis est, unde & in lingua sancta $\gamma\iota\alpha$, i. e. lux, & $\gamma\iota\alpha$, i. e. ignis, sola puncti mutatione differunt. Sennert. hypomnem. physic. c. 3. per vitam essentialem innuere videtur, dum vitam ex Aristotele duplicem facit; essentialem seu substantialem, a quo ut fonte, vitales actiones prodiant; & accidentalem, qua fit operatio vitalis aut certe potentia vitales actiones exercendi. Hippocrati ignis vocatur.

CAPUT VI.

De Causa Efficiente interna.

Efficiens productionis nativæ, tum interna est, tum externa.

Interna est ipsemet rei natura, i. e. inclinatio & facultas (activa) qua non modo apta nata & proclivis est ad emergendum, sed in actum emergit, ulteriusque progrediendo curriculum destinatum secundum speciem suam conficit.

N. Natura habet sese instar reipublicæ, quæ ad nutum principalis sui domini, auxilio officialium ac ministrorum, administratur. Nimirum prout administratio illa peragitur, ita refutat inde

commodum, vel damnum, non solum sibi, sed & vicinis quoque populis. Simili modo Natura est comprehensio omnigenarum facultatum, sub domino alicujus certa dominatricis, adhibitis facultatibus ministris gubernata, ut inde non tantum rei propria perfectio redundet, sed & proximo subveniat. Res naturales enim siquidem bona create sunt, ad imitationem creatoris bonitatis communicæ esse debuerunt.

Interna est tum principalis, tum ministra.

Principalis, quæ reliquis cœu fundamentum

damentum existit. E.g. facultas vitalis, stipata calore vivifico. Ministrae sunt, quae principali adiunguntur, e.g. facultas nutritiva, generativa, &c.

N. Utraque est totuplex, quotuplex species creaturarum. Universalis scilicet, qua universitati seu macrocosmo competit; Particularis, qua creaturis particularibus. At ais secundum Hippocratem, unum est in omnibus & omnia in uno, atque ita Natura universalis &

particularis in omnibus & singulis errunt. Resp. Sunt utique sed diversimodè: videlicet, Natura universalis praest particularibus naturis in macrocosmica administratione, easque ceu materiam sibi subiectam dispensat. In particularibus autem eadem particularium creaturarum naturis ceu materia subest, iisque gubernatur, dirigitur, dispensatur. Viceversa de naturis particularibus iudica.

CAPVT VII.

De Qualitatibus primis seu Elementalibus.

Causae efficientes externae sunt, quae extrinsecus accedentes internis operem ferunt.

Suntque tum primaria tum secundaria.

Primaria est ipsamet natura ceu operatrix sagacissima, cuiuslibet rei naturalis de debitis mediis prospiciens, seu si mavis, est ipsamet Iehova Elohim per naturam, i.e. naturales leges omnia sapientissimè prudentissimèque dirigens & gubernans.

Secundariae sunt media ad productionem quoquo modo facientia.

Haec etsi variè dari possunt, quippe, quaecunque ad efficientiam rei faciunt, eis accensentur: adeoque & instrumenta rustica, & sim. attamen excellunt hic qualitates facultatesve naturales. 1. Elementales, 2. salinae, 3. oculae.

N. Res naturalis uti extrinsecus or-

tum adepta est, & per hunc, naturam internam, qua apta nata est in lucem seu vitam emergere, aconomiam mundanam administratur: ita quoque alius opus habet, quo natura illa interna in actum deducatur. Etsi autem omnia à Deo dependeant, tamen quia is ipse media sibi ordinavit ordinaria (qua collectim Naturam vocamus) iis hoc loco intentos esse oportet. Sunt itaque qualitates seu facultates naturales, pro triplicato principio triplices, Spirituales (formales) corporeae (materiales, & modales (privativa vel vitales.) Spirituales sunt quae parti spirituali primò ac per se acceptae ferenda sunt, quales sunt proprietates cuiuslibet creature indita. Corporeae sunt quae materiali parti per se inharent uti. 1. liquiditas & ariditas, 2. durities Hippocratica, quam acumen dicere licet, nos salinam facultatem appellabimus. Modales

sunt, quæ cum modo existendi sunt conjuncta, ut frigiditas quæ competit principiis constitutis in privatione & quiete; & caliditas, quæ propria est principiis in actu seu motu constitutis. Verum enim vero placet adhibuisse ordinem datum, quo facultates ad productionem facientes triplici classi includimus. Elementalium, salinarum & occultarum.

Singulæ hæc, tum universaliore sunt, i.e. in macrocosmo collocatæ, vel particulariores, i.e. in rebus particularibus determinatæ.

Elementales qualitates, quas primas communiter dicunt, sunt calor, frigiditas, humiditas, siccitas.

Calor facit ad productionem naturalem, quatenus causam internam frigore condensatam, materięque ad frigiditatem propendenti immixtam, adeoque quieti deditam, suscitatur, fovetur: frigiditas, caloris æstum moderatur: humidum; humori interno sese insinuat, adeoque humidum ariditate victum liberat, nutrit, &c. ariditas, liquiditatem terminat, humorique admixtum simul nutrit.

N. Calor macrocosmicus partim est insitus & radicalis, partim influens. Nimirum macrocosmus sese habet instar animalis, quod calido tum innato, tum influente calefcit. Innatum calidum toti universitati indicium est, quippe aquę latere patet calor ac ipse ignis vitalis, cujus Achaies est fidelissimus. Eapropter cum totus macrocosmus actuali suo igne perfusus sit nec calore eum esse destitutum,

necesse est. Hinc Hippocrates in principio lib. de carnib. Calidi pars maxima, inquit, cum omnia perturbata essent, in supremum ambitum secessit, quod veteres videntur atheia appellasse: altera pars locum infimum sortita, terra quidem appellatur, frigida, sicca, multasq; motiones habens & in qua multum sanè calidi inest. Tertia vero pars medium aëris locum nata est, calidum quid existens, Quarta pars terra proximum locum obtinens, humidissima & crassissima, &c. Verum quid opus est pluribus calorem hunc terra demonstrare? Etenim, præterquam quod scimus, terram ante creatas stellas, (quibus alias calor acceptus refertur) vi caloris germinasse, calor sese exerit sensibiliter non modo in scaptensulis ac cuniculis subterraneis, sed & in puteis profundis; quinimo fontana, quæ brumali tempore scatuit, scilicet quo terræ superficies frigore nitet, calorem vaporibus balantibus manifestò probat. Ad do quod nec verisimile videatur, calorem stellarum, absque vi magnetica, quæ calidum in terra, ceu magnetem trahentem præsupponit, in terra profundiora penetrare.

Calor influens macrocosmicus diffunditur ex astris & præcipue ex Sole: hinc & ex ♄, ☿, & asterismisque igneis & aëreis, quinimo & ex stellis quibusdam fixis calidam naturam sortitis.

N. Sol ad macrocosmum sese habet, uti ad animal ipsum cor. Videlicet sedes est, ubi. Natura residentiam fixit vitalem,

lem, ex qua velut ex scaturigine, spiritus suos vitales. Et cum his calorem macrocosmo, rebusq; hinc particularibus elargitur, adeoque mediantibus illis calidum macrocosmi insitum suscitatur, fovetur, nutritur; particularium iridem vitam caloremque sustentat. Fundit Sol calorem, inquit author Ecclesiasticus cap. 39. sicut clypeus. Et hinc est, quod Chamah à calore Hebrais Sol dictus sit. Sole porro calidiores statuuntur ☿ ☿ ♄, ille intensius; hic benignius: reliqui econtra frigidiores habentur, non simpliciter sed ad solem collati. Caterum augmentari calorem contingit, ubi radij congregantur, reflectuntur, roborantur. Congregantur radij, si dissipatio denegetur: reflectuntur, si recta in corpus solidum inciderint: multiplicantur ☿ roborantur, si in fortitudinibus stella calorem radiantem extiterint.

Calor particularis est qui à re particulari procedit. Talis est in animalibus calor matricis, calor gallinæ ovis incubantis, &c.

Humiditas etsi itidem per totam universitatem sit diffusa, inque certos confluxus inferius hicce colle-

cta, undè elevati vapores sat copiose levantur, inque pluviam, rorem, nivem, imbrem, & sim. condensantur, subindeque delabuntur; atramen in confesso est apud Astronomos, præterquam quod certæ constellationes dictorum meteororum generationem, juvant, esse quoque stellas, humiditati, radiandæ consecratas, quales ☿, ♀, ♄, asterismique aquei, stellæque nonnullæ fixæ. hyades, arcturus, &c. & hinc augmentatur humiditas eadem ratione, qua de calore dictum: adde quod Luna prout accreverit & decreverit, humiditatem quoque largius vel copiosius radiat.

Humiditas particularis est quæ in rebus particularibus deprehenditur, eaq; determinata: Hæc rei producendæ tanto conducibilior est, quanto res inter se similiores fuerint.

Frigiditatem influere censentur è planetis ☿ & ♀, utraque moderatè, hinc & ♄ sed intensissime: Ex astris signa præcipue terreæ.

Siccitatem radiant è planetis ☉, ☿, ♄, ex astris, Signea terreæ & ignea.

CAPVT VIII.

De Salinis facultatibus.

Is salina facit ad productionem nativam, quatenus humiditatem dictam acuit, efficaciorē ac penetrantiorē reddit, crassitiem incidit, fermentationem juvat, &c.

adde quod & in nutrimentum facessat, &c.

N. Per vim salinam non solum intellige salsedinem, sed quancunque facultatem primis potentiorē, quæ Hippocra-

res salibus accenset, plurimasque esse docet. In homine, inquit, lib. de prisc. medic. text. 30. inest & amarum, & salsum, & dulce, & acidum, & acerbum, & insipidum, aliæque sexcenta, quæ pro copia & viribus, varias habent facultates.

Salina hæc facultas universalior residet potissimum in globo inferiori, ceu generatorio macrocomisco, adeoque immixta est aquæ & terræ. Aquam salina scatere facultate, qui negat, adeat mare: calorivæ exponat aquas simplices, meteoricasve, ut exhalent. Et ex hoc fundamento populi maritimi, ut in Normandia non citra jucunditatem observavi, terram salina facultate per maris fluxum imprægnatam fodere, eaque agros imprægnare solent. Terram facultatibus illis imprægnatam esse tradit Hippocrates, lib. 4. de humorib. t. 4. Terra, inquit, in se varias & innumeras facultates habet. Idem edocet elixivatio salis nitri; cui SS. Scriptura adstipu-

latur, innuens, quod sulphure & sale adurentibus universam terram comburat Deus, quo minus fructum ferre habilis fiat, Deut. 29.

Particularior est in singulis rebus particularibus. Et hinc res particulares aptæ sunt aliarum productionem promovere, maximè si mutua similitudo affinitasque inter utrasque intercedat. Oportet autem salinam hanc facultatem compede suo, quo vi mixtionis ligata erat, prius vi dissolutionis, esse liberatam. E.g. putrefactione, incineratione, &c. Et hac ratione agricolis usitatissimum comperimus, agros stercorebus utpote sale imprægnatis, impinguare. Quinimò videre licet quibusdam in locis, myricas, fruticeta vel & sylvas comburi, inque terram hanc cinere fecundatam semina conseri, uti id ipsum admodum usitatum vidi in Suecia & Finlandia, regionibus sc. nemorosis, &c.

CAPUT IX.

De Influentiis Stellarum.

Non parum conferunt & proprietates, i.e. facultates specialiores ad nativorum scil. productionem accelerandam, retardandam, facilitandam, transplantandam, adeoque ad vires rerum intendendas, imminuendas, transplantandas. In his excellunt Sympathiæ & Antipathiæ: illis res

promoventur: his, retardantur.

Utræque sunt tum *macrocosmica*, seu *universales*, tum *particulares*.

Macrocosmica sunt quibus ipse macrocosmus resp. particulares respicit, i.e. productionem promover, impedit vel quoquo modo mutat.

Particulares sunt, quibus res particulæ

ticulares rem sibi sympathicam juvant, antipathicam debilitant.

Proprietates macrocosmicæ toti macrocosmo & consequenter globo inferiori sunt inditæ, qua ratione terram hanc aptiorem plantis his cernimus, aliam aliis: verum hoc loco considerabimus solum, quæ globo superiori, & in hoc stellis acceptæ feruntur, peculiarique nomine influentiæ dicuntur.

Influentiæ stellarum sunt effluvia peculiaribus facultatibus prædita, quibus res sibi familiares (si robustæ & in vigore stellæ fuerint) roborant, prosperant, promovent, e contra res sibi contrarias debilitant, depravant, impediunt.

N. Familiaritas stellarum cum sublunariis ex mente Platonis & Paracelsi, inter stellas singulas & singula sublunarium genera constituenda quidem foret; videlicet stellas singulas, singulis sublunarium speciebus præesse voluit, & iisdem peculiariter influentias suas influere. Plat. in Tim. Paracels. l. 3. Philosoph. tr. 4. Verum cum singularum specierum stellas cognoscere impossibile sit, viam plerique sequuntur aliam, certasque classes majorum imitatione faciunt, ad quas cæu fontes generales sublunaria quæquereferunt. Classes has tum secundum planetas disponunt, tum secundum stellas fixas, maxime secundum asterismos Zodiaci. Rectius tamen meo iudicio fecissent, si stellas singulas singulis facultatibus præfēcissent, adeoque pro facultatibus varietate, & varietates stellarum numerassent universaliores, particulariores, &c. Et hac via non rebus singulis singula stella, sed uni eidemque rei, prout facultatibus ea dotata est, ita & variæ stellæ forent consecrandæ. E. g. Solem facultate cordis celebrarent, eaque tum universaliori calefaciente, tum specialiori, ut patebit infra.

Res stellis familiares sunt primariò, quæ stellis illis immediatè subsunt; secundariò, quæ per stellas amicas, id est, planetas amicos vel asterismos horumque affectiones stellas respiciunt. V. g. Lunæ primariò subest Lunaria herba. Secundariò, cuscuta res scil. Saturnina: fabaria, utpotè res Venerea: althæa, utpote res Mercurialis. Simili ratione Lunæ subest secundariò res tauro, cancro subjecta Nimirum ♄, ♀ & ☿ sunt amici Lunæ. Taurus est ejusdem exaltatio; ☿, domus. Res stellis contrariantes sunt, quæ subsunt planetis inimicis vel asterismis dissentientibus.

Influentiæ stellarum sunt tum planetarum, tum stellarum fixarum, quas ordine lustrabimus.

De influentiis Planetarum.

SOL.

Sol est Planeta benevolus, moderatè calidus & siccus, amicus ♊ & ♋, reliquis inimicus, cordis vice in macrocosmo fungens, ideoque generatorium est spirituum vitalium macrocosmi, id est, radiorum calidorum,

D ——— qui-

quibus tota universitas fovetur, scaturigoque peculiariam effluviolorum, quibus peculiariter juvat res sibi familiares, impedit sibi contrariantes.

N. *Effluvium Solis scriptura appellare videtur מְהֵבֵּחַ הַבּוֹחַ מֵנֶר Methebuiho* s. hemesch, pinguedinem seu florem stillantem Solis, Deut. 33. v. 14.

Res Solares sunt.

1. *E Mineralibus*: Aurum, terra solaris, (figillata) ☿ solare, ætites, carbunculus, chrysolithus, hyacinthus, rubinus, ambra.

2. *E Vegetabilibus*: Aromata omnia, acetosa, acetosella, althæa, borrago, buglossa, calendula, chelidonia, citraria, corona regis, crocus, dictamnus, fraxinus, gentiana, granatus, hederæ, helenium, heliotropium, hypericum, lavendula, laurus, olea, majorana, malva, melissa, mentha, palma, pœonia, poma aurantia, poma citria, rosmarinus, ros solis, thymus, verbenæ, vitis, xylaloe, zedoaria. Item mastiche, thus, mel, myrrha.

3. *Ex animalibus*: Ea videlicet quæ generosa & hilaria sunt: ut aries, caper, equus, leo, taurus. *Avis*: aquila, cygnus, corvus, gallus, vultur. *Insecta*: cantharides, scarabæus pilaris.

Res Soli contrariantes sunt res Lunares, Saturninæ, Martiales &c.

LUNA.

Luna est Planeta inter bonitatem & malitiam mediocris, moderatè fri-

gidus ac humidus, amicus ♀♂, ♀♂♂, ♀♂♂♂, reliquis duobus inimicus, cerebro correspondens, adeoque sympathicus nervosis partibus ac spiritibus animalibus. Vel si mavis: Luna est generatorium humiditatis, qua tota universitas irroratur, scaturigoque peculiariam effluviolorum, quibus primariò & peculiariter afficit res sibi familiares, secundariò, res familiares ♀♂, ♀♂♂, ♀♂♂♂, utpote cum quibus ☾ amicitiam colit.

N. Majorum de Luna opinio, non sine ratione culpam dubia esse posset, quippe Luna macrocosmi Epar potius presentare videtur quam cerebrum, humiditatibus siquidem macrocosmicis præfere deprehenditur, non secus ac Epar microcosmicum, humiditati microcosmica, qua in sanguine viget. Mare macrocosmicum turgescit, fluit ac refluit ad Luna cursum sanguis seu mare microcosmicum, eadem ratione turgescit, attestante turgescencia sanguinis menstrui mulieris. Similiter in creaturis particularibus humiditas crudior, cum Luna cremento augeri cernitur, è contractu decremento, minui; quod idem Plinius appetit quoque testatur de sanguine humano. Morbi idem in sanguine fundati, ad Luna cursum moventur, crisesque suas exhibent. His addi poterit, quod substantia Luna, quia terra ac propterea terrestri natura propinquior, adeoque crassior, potius Epar substantia subtiliori respondet. Lacertarum quoque Epar crescere perhibetur crescente Luna, decre-

scere

scere eadem decreſcente. Nec eſt quod au-
geſcentiam ac decreſcentiam cerebri ac
medulle in offibus quiſ obſiciat, Luna cre-
mentum decrementumque imitantes: ex
humiditate enim ſanguinis illas potius eſſe
colligitur, quam ſpirituum animalium, id
quod & de Epilepſia ad Lunam periodica
ſentiendum.

Res Lunares.

I. Mineralia. Terra ſigill. alba, alu-
men, marcaſita ꝙ ea, & omnia alba ac
viridia, corallia alba, cryſtallus, magari-
ta, mater perlarum, ſuccinum, campho-
ra ſperma ceti.

II. Vegetabilia. Agnus caſtus, alke-
hengi, allium, arundo, becabunga, braſ-
ſica, caulis capitatus, cæpa, chamæm.
fabaria, fungi, hyſſopus, lactuca: lenti-
ſcus, lilium convalium, lilium, lunaria,
mandragora, naſturtium, nymphæa,
nux muſchata, nux juglans, papaver,
plantago aquat, præon. porrum, portu-
laca, rapa, ſedum, tilia.

III. Animalia. Canis, capra, caſtor,
cerva, felis, lutra, perca, ſanguis men-
ſtruus. Aves: anas, anſer, ardea, mer-
guli, &c. Piſces: aurata, cancer, carpio,
cochlea, oſtrea, ranæ. Inſecta: aranea,
buſo.

Res Luna contrariantes ſunt res So-
lares & Martiales.

SATURNUS.

Saturnus eſt Planeta malignus, diu-
nus, maſculinus, ſummè frigidus, Mar-
tis amicus, reliquis inimicus, lieni mi-
crocoſmico correfpondens.

N. Mallem equidem Saturnum Io-

vem ac Mariem capiti adſcribere, non
ventri infimo. Etenim ut longius à terra
globo diſtant, ita & natura ſint oportet,
longius à terra diſtantis. Et hinc quoque
videtur veriſimile, deſtinatos eos eſſe in-
fluentiis ſubtilioribus, quam qua Epatis,
Lienis ac veſica fellis facultatibus corre-
ſpondeant.

Res Saturnina.

I. Mineralia: ꝙ, ꝙ, ꝙ, ꝙ, mar-
caſita, Saphyrus, magnes & omnia ter-
rea fulca ponderoſa.

II. Vegetabilia: Aconitum, agnus
caſtus, apium, arbor fœtida, aſphode-
lus, aſter, atriplex, buſa paſtoris, can-
nabis, capparis, cicuta, cuminum, cu-
preſſus, cuſcuta, epithymum, ficus a-
tra, filix, hyoſcyamus, helleborus ni-
ger, lappa major, mandragora, morus,
muſcus, myrica, opium herba paris,
pinus, polypodium, ſabina, ſalvia, ſcolo-
pendria, ſempervivum, ſena, ſerpenta-
ria, ſolanum, tamarifcus.

III. Animalia: (Solitaria, noctur-
na, triſtia.) Aſinus, buſo, camelus, ca-
tus, formicæ, lepus, lupus, mulus,
mus, muſca, ſcorpio, ſerpens, ſimia,
ſus, talpa, urſus, vermesque multipli-
ces. Aves, Bubo, corvus, grus, no-
ctua, pavo, ſtruthio, veſpertillio, u-
pupa.

JUPITER.

Jupiter eſt Planeta benevolus, mo-
deratè calidus, ſimiliterque humidus,
amicus præter Martem, reliquis omni-
bus, Epatis correfpondens, huiusque fa-
cultates influentiis ſuis fovens.

Res foviales sunt.

1. *Mineralia*: ♄, ☾, ☉, Corallium, hyacinthus, jaspis viridis, saphyrus, smaragdus, Tutia.

II. *Vegetabilia*: Amygdalæ, avellana, berberis, borrago, buglossa, calamentha, cerasa, cornus, corylus, cynoglossa, endivia, faba, fagus, ficus alba, fraga, fraxinus, fumaria, glycyrrhiza, hepatica nobilis, hordeum, ilex, lilium album, linium, lolium, macis, malus, mentha, morus, myrobalani, nuces, ocymum, oliva, origanum, passulæ, pinea, pistacia, rad. pæonia, populus, portulaca, prunus, prunella, pyrus, quercus, rhabarbarum, ribes, rubia tinctorum, sedum, sorbus, spica, symphytum, triticum, verbascum, viola, vitis. Huc manna, mastiche, styrax, sacharum, & omnia dulcia.

II. *Animalia*: Agnus, cervus, elephas, ovis, taurus. *Aves*: Aquila, ciconia, columba, gallina, hirundo, perdix, phasianus.

Res ♄i contrariantes sunt res ☉les.

MARS.

Mars est Planeta summè calidus atque siccus, amicus Veneri, inimicus reliquis, præsentans ac fovens vesicam fellis microsmicam.

Res martiales sunt.

1. *Mineralia*: ♂ omnia rubea ignea, sulphurea; Adamas, amethystus, magnes, osteocolla, sal armoniacum.

2. *Vegetabilia*: Arum, allium, ari-

stolochia, carduus, chamaeleon, cepa, cornus ebulus, esula, euphorbium, flammula, helleborus, lathyrus, laeocolla, mespila, napellus, plantago, porrum, prunus, quercus, ranunculus, raphanus, resta bovis, sinapi, tormentilla, urtica. Huc castoreum, euphorbium, scammonia & venenosa omnia.

3. *Animalia* Bellicosa, impetuosa, potentia, biliosa, rapacia: Canis, hircus, hædus, lupus, mulus, pardus, vulpes. *Aves*. Accipiter, aquila, cornix, corvus, falco, milvius, noctua, vultur. *Pisces*. Lucius, pastinaca, canis marinus, perca.

VENUS.

Venus est Planeta benevolus nocturnus, fœmininus, moderatè frigidus, paulo intensius humidus, amicus, ☉, ☿, ♀, ☾, inimicus ☿, influens in partes genitales & urinarias,

Res Venerea sunt.

1. *Mineralia*: ♀, ☾ Ambra, lapis ætides, berillus, chrysolithus, corallia, corneola, lapis lazuli, lapis calaminaris, sapphirus, smaragdus, Tutia.

2. *Vegetabilia*: Asphodelus, capillus veneris, coriandrum, cyclamen, eryngium, fabaria, faba, ficus, fragaria, hederæ terrestris, iris, lilia omnis generis, melilotus, milium solis, mala punica, narcissus, nymphæa, petroselinum, pyra dulcia, rosa, santala, satyrium, serpillum, thymus, H. Trinitatis, tunica, verberna, viola, laudanum, benzoin, muscus, ambra, ut & omnis generis thymiamata.

3. *An*

3. *Animalia* delitiosa, lascivia, mitia, blanda, jucunda, mansueta, &c. capulus, capra, cuniculus, hircus, stincus, taurus, vitulus. *Aves*. Aquila, columba, corvus, cygnus, gallus, hirundo, motacilla, passer, pavo, perdix, pica, turtur.

MERCURIUS.

Mercurius est planeta mutabilis, bonus cum bonis, malus cum malis, calidus cum calidis, frigidus cum frigidis, sicus cum sicis, humidus cum humidis, amicus ☿, ♀, ☾, inimicus ♂ & ♀, referens pulmones, quos & influentiis suis sympathice irradiat.

N. Virumque ventri medio dicarem praterquam enim quod Venus Mercurio sit superior, atque adeo pra Mercurio substantia subtilioris, uterque fidelissimus solis comes est, utpote ad quem cursum suum uterque dirigit, haud longè ab eodem recedendo. Verum enim verò, cuique ut in aliis ita & in his suum linquo arbitrium, opinionem meam saltem referens, nulli obtrudens.

Res Mercuriales sunt

1. *Mineralia*: ☿, ♀, ☾, marcasita, smaragdus.

2. *Vegetabilia*: Althæa, anisum, aquilegia, arthritica, bellis, chamemelum, corylus, cubeba, enula campana, faba, fumaria, glycyrrhiza, juglans, juniperus, majorana, marrubium, mercurialis, napus, numularia, pentaphyllum, petroselinum, petasites, pimpinella, prœonia, pulmonaria, sambucus,

satureia, scabiosa, serpentaria, serpillum, trifolium, tussilago, veronica.

3. *Animalia* ingeniosa, astuta, sagacia, abblandientia, loquacia: ur, Canis, cervus, lepus, mula, mustela, simia, serpens, vulpes. *Aves*, Alauda, carduelis, ficedula, hirundo, merula, pica, psittacus, lusciniæ, turdus, *Insecta*. Scarabæus, vesperilio. Huc apis, formica, gryllus, locusta.

De influentiis asterismorum.

Familiaritas quæ stellis fixis cum rebus medicinalibus intercedit, secundum numerum asterismorum in duodecim classes disponitur, quarum singulæ quatuor gradibus ad modum qualitatum primarum distinguuntur.

ARIES.

Aries est signum masculinum igneum, i. e. calidum & siccum, sympathicum capiti.

Gradus I. Artemisia rubra Betonica, cichorium, consolida regalis, ebulus, mentha, persicorum malorum nucleis, petasites, serpillum, tussilago, veronica.

M. Colligit Carrichteris in fine dierum canicularium post plenilunium.

Gradus II. Asparagus, ebulus, hypericum, millefolium, plantago, prœonia.

N. Colligit Carricht. ☉ & ☾ existentibus. in ☿.

Gradus III. Agaricum cataputia, chamælea; colocynthis, esula, farsara, gentiana, ligustrum, nucista, ricinus, sambucus, sarfa, parilla.

N. Colligit Carricht: inter Iacobum & Laurentium.

Gradus IV. Abortanum, calamintha, cappares, cinamomum, helleborus albus, majorana, marrubium, nasturtium sylvestre, rosmarinus, turbit. spica.

N. Colligit partim Aprili, partim Septembri.

II. TAURUS.

Taurus est signum foemininum terreste, frigidum ac siccum, sympathicum collo, acgutturii.

Gradus I. Betonica, ceterach, chamædrys, hedera terrestris, liliorum alborum radix, mentha, narcissus, polypodium, rosa, rosmarinus, valeriana, viola.

N. Emolliunt tumores faucium ac lienis.

Gradus II. Adiantum, alkekengi, aquilegia, hedera arborea, polygonatum, quercus, viscus quercinus, &c.

N. Vulneribus conferunt.

Gradus III. Anserina, buglossa, carduus Mariæ, cynoglossa, eupatorium, lippa minor, origanum, petroselinum, quercus, quinque folium, sanicula, scrophularia, tormentilla, vinca pervinca.

NB. Vulneraria sunt.

Gradus IV. Auricula muris, bardana major, betonica sylvest. chamæcis-

sus maj. chelidonium majus, fraxinus, malva, pulmonaria, scabiola, &c.

N. Antipathiam habent cum sublunariis qua libra ac scorpioni subsunt; sympathiam cum his qua cancro ac Sagittario.

III. GEMINI.

Gemini sunt signum masculinum, aëreum, calidum & humidum, possidens humeros.

Gradus I. Anisum, althæa, buglossa, borrago, feniculum, hyssopus, petroselinum, prunella, ruta muraria.

Gradus II. Bardana maj. buglossa, filix, tilia, alba, rapa, &c.

Gradus III. Alfine, arum, macis, rumex rotunda, urtica mortua &c.

Gradus IV. Acerosa, chamædrys, chamæmel, chelidonium, parthenium, rhabarb. &c.

N. Antipathiam habent cum sublunariis capricorni; sympathiam cum Libra ac Aquarii.

IV. CANCER.

Cancer est signum foemininum, aqueum, frigidum ac humidum, sympathicum pectori, pulmonibus, costis, lieni, quorum quoque affectibus medetur.

Gradus I. Alfine, brassica, carduus, fabarum flores, ac fructus, Gallium, rapæ, rapunculus, salvia, scrophularia.

Gradus II. Arbutus, coni abietis, pini, consolida, solanum, terebinthina, viscus.

Gradus III. Becabunga, crassula, digi-

digitalis, gnaphalium, juncus, nasturtium, petroselinum semen, portulaca, salix, saxifragia vermicularis.

Gradus IV. Conchæ, corallia alba, crySTALLUS, mater perlarum, nymphæa, oculi cancri, pæonia, sedum, lperniola, vitriolum. Hûc Cancer, Lepus, Serpens, &c.

N. Antipathica sunt sublunaribus Sagittarii, sympathica Tauri ac Libra.

V. LEO.

Leo est signum masculinum, igneum i. e. calidum & siccum, perfectum cordi ac stomacho.

Gradus I. Basilicum, crocus, cupressus, garyophilli, hyssopus, lavendula, plantago aquatica, ros solis, soldanella, thymus.

Gradus II. Angelica sylvest. bifolium, centaurea, galanga, gentiana, morsus diaboli.

Gradus III. Cotula fætida, pastinaca, mentha, nasturtium hortens. pulegium, ranunculus, urtica.

Gradus IV. Betula, buxus, genista, laurus.

N. *Gradus I.* Collig. ☉ existente in ♋ : ☾ in ☿.

Gr. 2. In principio Maij, antem ortum Solis, vel finiente Augusto vel ☉ existente in ♋, & ☾ in ♀ ante ortum Solis.

Gr. 3. Quando ☉ in ♋ & ☾ in ♀ ac ultima quadratura, vel ad refrigerationem; ☉ in ♋, & ☾ in ♀ versante, ante ortum Solis.

Gr. 4. ☉ in ♋, & ☾ in ♋, vel ☉ & ☾ in ♋.

VI. VIRGO.

Virgo est signum fœm. terreum, frigidum ac siccum, sympathic. Epatis intestinis ac Ventri.

Gradus I. Acetosa, acetosella, bardana, cihorea, plantago, pyrus, salvia sylvestr.

Gradus II. Beta alba, cynosbatus, mespilus sigillum Salomonis.

Gradus III. Aristolochia, consolida media, conyza, prunella, quercus.

Gradus IV. Carduus benedictus, centaurea min. frangula, ophioglossum, prunus sylvestris, cum omnibus suis partibus fructibus ac floribus, serpentaria, tormentilla, &c.

VII. LIBRA.

Libra est signum masculinum æreum, calidum & humidum, Renibus ac Vesicæ sympathicum.

Gradus I. Bellidis genera omnia, consolida media, parthenium, primula veris, sium, tragopogon.

Gradus II. Alcea, althæa, anserina, chamæmel. martagon, malva, verbena, viscum, tilia.

Gradus III. Antirrhinum, artemisia, corylus, ruta muraria.

Gradus IV. Alyssum, antirrhinum, alsine, chelidonium maj. menta nigra, scabiosa, scrophularia, senecium.

VIII. SCORPIUS.

Scorpio est signum fœm. aqueum, frigidum & humidum, sympathicum partibus genitalibus.

Gr.

Gradus I. Cruciata, oxyacantha, forbus sylvestr.

N. Huc pertinent omnia simplicia primi gradus ☿, si post lunium collecta sint mense Octobri in primis.

Gradus II. Fraxinus, poma omnis generis, prunus, conchæ, ostrea.

Gradus III. Berberis, buxus, erva, parthenium, saponaria.

N. Huc pertinent omnes herba 2. gradus, ☿, collecta ☉ in ☿ existente.

Gradus IV. Atriplicis species omnes, beta rubra, mercurialis, narcissus, ribes.

IX. SAGITTARIUS.

Sagittarius est signum masculinum igneum, calidum & siccum, sympathicum coxis, lumbis, & sim.

Gradus I. Consolida major, cepa, raphanus, scrophularia, sesamum, tilia flores, verbena lutea.

Gradus II. Allium, angelica sylvest. hyoscyamus, levisticum, salicis folia.

Gradus III. Asarum, beta rubra, chelidonium, crocus, curcuma, filix, hedera terrestris, hirundinaria, juglans, rubia tinctorum, succisa.

Gradus IV. Antimonium, momordica, euphorbium, nasturtium, vitis alba.

X. CAPRICORNUS.

Capricornus est signum fœm. terrestre, frigidum & siccum, sympath. genibus ac nervis.

Gradus I. Calendula, cerasa nigra, enula, morus, rubus, vaccinia.

Gradus II. Mora nigra, scarlea, verbascum.

Gradus III. Acorus officin. arum, bursa pastoris, consolida maj. cucurbita, galanga, malva hortensis, sonchi omnis generis.

Gradus IV. Helleborus, hyoscyamus, mandragora, napellus, herba paris, labina, solanum, staphis agria.

XI. AQUARIUS.

Aquarius est signum masc. æreum, calidum & humidum, sympath. tibiis ac cruribus.

Gradus I. Angelica, daucus, ficus, fraxini flores, hedera terrestr. juglans, melilotus, sanicula, sigillum Salom. vinca pervinca.

Gradus II. Consolida regalis, cuminum, epithymum, geranium, lappa, radix rhodia, ruta muraria, salvia sylv. urtica alba.

Gradus III. Agrimonia, auricula maris, horminum, mercurialis, saxifraga. serpentaria.

Gradus IV. Asari fol. cardiaca, cicuta, mespila.

XII. PISCES.

Pisces sunt signum fœm. aqueum, frigidum & humidum, sympathicum pedibus.

Gradus I. Aristolochia l. caulis capit. cucurbita, enula, fagus, momordica, myrobalan. napus, nymphaea, portulaca, rapa.

Gradus II. Articocus, antirrhinum, cyanus, stachas citrin.

Gra-

CAPVT X.

33

Gradus III. Nigella, papav. fativ. papav. erraticum, sonchus.

Gradus IV. Cicuta, hyosciamus, napellus, papav. cornutum, solanum alb. uva in vers. Serpens.

N. Non ignorare te volo, amice Lector, me mihi met hisce jam recensitis non satisfecisse, multo minus tibi. Recensui ut apud authores reperi fundamenta peritiora, ut ingenuè fatear, nondum affectus. Namq; signa quæ perhibent, sum-

pta à sapore, colore, odore, motu sequaci, figura, &c. æque dubia sunt: nec enim constat cur signa talia, familiaritatem talem indubitato arguant. Attamen, cum nullum dubium sit, quin inter res cælestes, & sublunares certas, amicitia inimicitiaeve intercedat, series à majoribus collectas recensere placuit, si quæ tibi daretur in fundamenta penetrare. Dona nimirum Dei diversimode imperiuntur.

CAPVT X.

De proprietatibus particularibus.

Sunt & proprietates particulares, i. e. in rebus particularibus fundatæ, quibus productio alterius, si scil. conspiraverint, juvatur, sin dissenserint, impeditur, retardatur. E.g. crescit felicius polypodium super quercu: sic cuscuta lino adnascens, felicius exurgit: fanicula quercuum viciniâ gaudet; vitis oleæ; orobanche inter legumina crescere avert, quæ tamen

ipsa strangulat. Econtra sese mutuò offendunt, brassica & vitis, adeo ut si in agris brassica viti assita exurgit, vel vitis ipsa confestim emarcescat, vel certè sarmenta ejus elanguescentia contabescant: sic odit & vitis corylum; quercus consita juxta juglandem contabescit; hederæ omnibus arboribus, maximè verò viti infensa est.

CAPVT XI.

De materia nativorum.

Materia ex qua res nativæ sunt, sunt semen ac nutrimentum, aut his analogum quasi semen & nutrimentum.

N. Materia in nativarum constitutione denotat 1. partem materiale seu corpoream, quatenus spirituali, i. e. formali opponitur. Et est pars illa corporea

ex liquido & arido coagmentata, spiritualis illius partis Subjectum vide c. 5. In macrocosmo est corporea substantia totius universitatis spiritui universali substrata, crassior in terra, tenuior in aqua, magis adhuc tenuis in aëre, tenuissima in stellis. In vegetabilibus & animalibus est corporea itidem substan-

E

tia

ta spiritibus seu animabus eorum subiecta: crassiorq; existit in membris his, e.g. in ligno, ossibus, & sim. tenuior in aliis, v.g. in medullis, cerebro, & sim. prout natura naturanti primitus fuit visum. In rebus secundariis similiter sese res habet, ubi tamen consistentiam homogeneam ferè nata est. 2. Refert subjectum praexistens, è quo res nativata quam ex materia proxime praexistente fit, quo sensu Aristoteles materiam videtur descripsisse subjectum è quo res fit primum, per se & non per accidens. Et hac ratione opponitur forma, i.e. actui, seu vita, quae res producta vivit & actuatur. Est autem non mera pars materialis, sensu priori, sed subjectum ex principio materiali ac formali, cum quod idem est, ex corporeo ac spiritali compositum, tametsi spiritalis illa pars sopita quasi ac in tenebris fere deliteat, imò materialis partis vices non raro retinere videatur, praecipuè in nutrimento.

Semen est materia humido spirituo-
sa, (i.e. aqua ac spiritus, seu si mavis,
aqua & ignis) in creaturam certam
proximè ac naturâ suâ emergere deter-
minata.

N. Severino Dano est vitale princi-
pium, in se continens spiritus mechanicos
& tincturas universae anatomiae propriae
speciei, quibus suum sibi fabricant cor-
pus colores, sapes, qualitates, magnitu-
dines, figuras & reliquas signaturas con-
sentaneas officiis & praedestinationibus
praedictorum spirituum & rei producen-
dae. Exemplis respatebit: Macrocosmi
materia praexistens, quae seminis vices re-

praesentat (strictè enim semendi dici nequit)
à Mose dicitur Terra informis & inanis,
à Poëtis chaos. Huic respondet chaotica
macrocosmi dispositio, è qua cum materia
prima rerum renovatio dependet. Vege-
tabilium ac animalium semen utpluri-
mū in sua specie fundatur, nonnunquam
tamen in materia universaliori: unde Ge-
neratio, univoca, aequivoca, cagastrica, i-
liastrica.

Nutritimentum est materia humido
spirituosa, quae vi & facultate rei nu-
triciandae preparatur, subindeque al-
terata, mutata, determinata, mem-
bris incorporatur. Universalior enim
est initio & à natura rei nutriandae
diversa, unde paulatim alteratur in-
que naturam rei nutriendae transplan-
tatur.

N. Macrocosmi nutritimentum idem
illud chaos est, seu res particulares in
chaoticam dispositionem redactae. Vide
supra. Nutritimentum vegetabilium ac
animalium per se fere innotescit. Ve-
getabilia nutriuntur terra succo, naturâ
macrocosmicâ, i.e. effluvis elementor-
um impragnato. Hinc formatur bene-
dictio divina, Deuteron. 33.v.13. & 14.

מְנוּחָה יְהוָה אֱרֶצוֹ מִמֶּנּוּ

שָׁמַיִם מָטָל וּמַתְחֹס וּבְצֵד חַתָּח

וּמִמֶּנּוּ תְבוּאָת שָׂמֶשׁ וּמִמֶּנּוּ גֶשֶׁם

יְרֵחַ &c.

i.e. benedictione: Iehova terra tua in
Effluvio (ubertate communicata, Me-
ged)

ged) coelorum, in rore in abyſſo jacente infra. Et in effluvio vegetabilis ſolis, & in effluvio vegetabili Luna, & in effluvio montium, & in effluvio collium, æternum.

Animalibus tum ipſemet macrocoſmus cibis exiſtit, tum vegetabilia, tum animalia in vicem, Vide ſuprac. 4.

Quaſi ſemen & nutrimentum materiam exhibent rebus ſecundariis, ſuntque excrementum in nutritione rerum primariarum, à parte utiliſſima (rubino Paracelſi) ſeparatum. Hoc nimirum præterquam quod faciſſit in materiam ſeminalem, unde creaturæ exurgunt, quæ non rarò cum primariis dignitate certant, in nutrimentum quoque earundem vergit.

N. Res ſecundaria ſunt & nutriuntur ex Excrementis aqueis, terreis & viſcoſis, ſalinis, &c. Hæc enim cum in ſubſtantiam rei primaria abire nequeunt, ſecernuntur à parte utiliſſima nutriti-

ua, inq̃, peculiaria genera nonnunquam mutantur pro diverſitate matricum concurſuque cauſarum requiſitarum, differentia. Varia namq̃, ſunt Excrementa, non ſolum ratione trinorum mundi regnorum, ſed & ratione officinarum in quibus ea redundant. Nimirum, quia materia nutritiva diverſarum officinarum elaborationes, diverſoq̃, maturatio- nis gradus percurrere deſtinata eſt, quorum ſinguli ſibi reſpondentia exhibent excrementa, utique diverſitatem excrementorum oriri neceſſum eſt. Imo cum omnia in menſura, numero ac pondere ſint diſpoſita, ſuperabundat nonnunquam etiam nutritiva illa materia, ut & hac ratione peritoma ſuppetat excrementitium. V. g. lac in animalibus, melligines reſinæ in arboribus, &c. Hinc ſunt in macrocoſmo meteora & mineralia; in vegetabilibus, ſucci, reſina, gummi, &c. in animalibus, ſtercus, urina, lapides, ærenula, & ſim.

CAPVT XII.

De Tempore productionum nativarum.

Tempus ad productionem rerum nativarum faciens eſt, quo vigent, quorum beneficio productio perficitur, & maximè qualitates facultatesve ſub cauſa efficiente deſcriptæ.

N. Tempus eſt meſuratio curriculum quorumcunque per certa puncta. Nimirum creavit quidem Deus omnia in perfectione, verum in gradu infimo, non ſummo, quippe hunc aſſidua cultura

acquirere ſubinde debebant, ab infimo ſcil. gradu ſenſim ad æternum aſcendendo. Inſuper, quia Deus naturam finitam ac temporalem, non ſempiternam ac ævum perennem voluit, terminum quoque ac finem præſignire oportuit, adeoq̃, deſcenſum ab æternum ad interitum. Intervallum igitur inter rei cujuſque ortum ac interitum, conſtituit cujuſque curriculum, diſtinctionis punctis non raris notabile.

Distinctio hujus fundamentum est mutatio, quam res quaeque curriculo suo subire est destinata, qua scilicet res modo sic, modo aliter, nunc hujus, nunc alius natura ac proprietatis deprehenditur, adeoque medicationi nunc aptior, nunc ineptior.

Tempus mensuratur potissimum ad curriculum cœli, cursumque seu motum stellarum & in primis Solis & Luna, seu luminarium naturæ, dictorum, tum quoque ad motum planetarum reliquorum.

N. *Et si res qualibet, eo quod curriculum peragit, mutationes diversas subit, ac memorabilibus in semet distinguitur, v.g. aetate juvenili, virili, senili, periodicae revolutione, &c. attamen numeratur tempus maxime ad cursum Solis & Luna, utpote, quorum curricula sunt magis conspicua, universaliora, distinctiora; unde & esse in tempora jubentur, Gen. 1.*

Cursum Solis exhibet, 1. annum, 2. anni quadraturas, ver, æstatem, autumnum & hyemem, 3. menses Solares, 4. Dies & noctes, 5. partes dierum. Videlicet, tempus matutinum, antemeridianum, meridianum, pomeridianum, vespertinum, nocturnum 6. horas.

Luna cursum exhibet, annum lunarem, i.e. menses lunares, 2. Lunæ quadraturas: novilunium, tempus crescentiæ, in quo excellit prima quadratura, plenilunium & denique tempus decrecentiæ, ubi occurrit ultima

quadratura. E dictis temporum articulis eligendi sunt, qui secum vehunt qualitates ad productionem nativorum facientes, sive manifestiores eas velis, seu universaliores, sive occultiores & specialiores.

Sic tempus sationi eligitur, 1. quod ad humiditatem inclinat modicam, nimirum humiditate semen in terram projectum resolvitur suscitaturque. 2. Tempus Lunæ crescentis. In hoc tamen sunt qui monent, si satio flores intendat copiosos, fieri eam debere quadratura secunda, ac præcipue tribus diebus ante plenilunium, lunaque existente in virgine; fin folia exspectantur, sationem instituere jubent post novilunium. Eadem ratio est & insitionis.

Similem curam in animalium educatione rusticos habere deprehendimus: vitulos crescente ☾ natos educationi aptiores judicant: ineptiores, qui sine ☾, i.e. in novilunio, vel ☾ decrecente in lucem prognati fuerint.

Quinimo nec è re erit, ad sationem id temporis eligere, quo saltem luminare alterum, (videlicet quod Planetam semini seminando familiarem amicitia prosequitur) fuerit in fortitudinibus ejusdem illius familiaris planetæ, vel planeta ipsemet familiaris fortitudines suas obtinuerit. Vide infra c. 25.

N. Agripp. phil. l. 1. c. 12. *Individuorum singulares dotes plurimis insunt.*

tana

tam mirabiles, quàm in speciebus etiam à figura cœlestium sinque stellarum. Omne enim individuum, quando incipit esse sub determinato horoscopo, constellatione cœli, contrahit eum esse, mirabilem quandam virtutem operandi & patiendi rem mirabilem; etiam præter eam, quam habet à sua specie, cum per influxum cœlestium, tum per obedientiam materie generabilium, ad animam mundi, &c. Hæc Agrippa, cui subscribunt quam plurimi alii, inter quos Michael Toxites in præfat. Herbarii Carichteriani, & ex hac Poppius in præ-

fat. sui herbarii. Quamquam plurimi sunt, inquiunt, qui parvi momenti astiment, loca, tempora, influentiasque observare, eo quod tempus hoc præ illo nihil prerogativa obtineat: attamen probat contrarium ipsa experientia. Hinc futilitates ejusce potius censenda sunt ignororum, quam veritatis indagatorum. Quippe convincunt nos non modo agricola, qui arando, serendo, &c. de tempore certo solliciti sunt, sed & hortulani, qui in putandis arboribus, surculis decerpendis, inferendis, tempora sua certa observant.

CAPVT XIII.

De Loco Productionum nativarum, & in primis de Terra & Aqua.

Locus producendorum nativorum tum locus natalis est, tum locus progressionis, i.e. ubi educantur, sustentantur, vivunt, &c.

N. Mineralia in terra gremio locum natalem in progressionis sortita sunt. Vegetabilia terræ ut plurimum nascuntur vivuntque: pauciora aquâ, rariora vegetabilibus aliis infixâ crescunt: Animalium matrices partim sunt uteri materni, partim ova, partim his analogâ loca terrena, & sim. Loca educationis sunt, terra, aqua, aer.

Locus ad productionem nativorum idoneus est, qui scatet qualitatibus, facultatibus, proprietatibus, materiaque ad productionem aptis. Excellit autem inter cætera globus in-

ferior, i.e. Terra & Aqua, utpote non modo mineralium & vegetabilium sed & animalium commune receptaculum.

N. Solum ad rerum productiones facit, non tantum quatenus hospitium præbet aptum ac conveniens, sed & præcipue quatenus calore suo semen inibi, seu in matrice locatum suscitât, humiditate sua resolvit vi salina fermentat, proprietate peculiari amat vel odit, adeoque obtinet rationem Efficientis, materiae, atque subiecti loci: Eapropter prout solum naturatum est facultatibus ac succis ad rei productionem juvandam vel retardandam facientibus, ita & ad productionem solum conveniens erit eligendum, videlicet calidum, humidum, frigidum, siccum, succis

suis idoneis dotatum, proprietatibus peculiaribus impragnatum. Nec enim ubi vis proventus aequè felix est.

Hic segetes, illic veniunt felicius uva, Arborei fetus alibi, atq; in jussa virescunt Gramina, &c.

Consideratur in solo præcipuè. 1. *ubi*, 2. *quomodo*. 3. *quale* Nimirum hæc tria non modo rerum variant productionem, sed & non raro rerum productionum qualitates.

I. *Ubi*, i. e. sub qua longitudine, latitudineve sit solum locatum. Hic occurrit soli distinctio. 1. In *Zonas* illas famosas quinque, binas frigidas, binas temperatas, & unam torridam. 2. In *Climata*, ratione latitudinis mensurata. 3. In *regiones*, quarum cœlestis constitutio si ad solem conferantur, ex Geographicis facile addisci poterit. Tales sunt Germania, Gallia, Italia, Hispania, India orientalis, occidentalis, &c. Nimirum singulæ regiones partim juxta sui cœli solique qualitates plantas peculiare producunt, partim iis, quas cum aliis communes habent, feliciorum infeliciorumque productionem, aliamve complexionem conciliant. Vinum Hispanicum aliud est à Gallico, Gallicanum à Germanico. Similiter & res unius regionis, v. g. Germaniæ non uniusmodi sunt. Sic radix ari in locis nostris frigidioribus adeo fervens ac mordax nascitur, ut os & fauces exurat, at quæ in Lydia prope Cyronem urbem. (teste Baptista Porta,) provenit, exteriori

forma nostræ plane respondens dulcis & grata esse dicitur, ut raparum instar homines in cibo sine nocumento eo uti possunt. Angelicæ radix in Finlandia acutiorem sapit saporem, quam hic nostras. Folia Senæ alia mittit Alexandria Egypti, alia Italia. Vitriolum Ungaricum præfertur reliquis. Sic variant & pro diversitate regionum *animalia*, adeo ut non modo peculiaria sibi nonnullæ regiones vendicent, sed quæ communia sunt felicius producant educantve, imo quoque nonnihil ab aliis differre faciant. Adde, quod *plantæ* vel *animalia* ex una regione ceu patria in aliam ceu peregrinam transplantata, cum hac loci mutatione, simul naturam mutant. Vid. Joh. Bapt. Porta, in phytogn. l. 2. c. 1. 2. 3. 4.

N. *Sunt qui regioni cuique data sua esse medicamenta volunt, morbis inibi grassantibus sufficientia, ideoque usum exoticorum, citra necessitatem ducunt. Verum enim vero, etsi prius non efficiat, attamen quia vernaculorum plurimorum naturam ac vires nondum satis compertas habemus, præstat exotica exhibere, quippe experientiâ comprobata, quam vernacula experientiâ difficili experiri. Hisce sublati, vernacula, utpote iisdem influentis cum incolis affusa, vernaculisq; succis educata, exoticis præferre non dubitamus.*

II. *Quomodo*, i. e. quo situ solum sit locatum: sive superficiem altitudinem spectes, qua solum refert montem-

tem, collem, planitiem, campum, vallem, & sim. siue cardines mundi, quatione solum situm dicitur versus ortum, occasum, meridiem aut Septentrionem: siue radios solares, unde solum sit apricum, umbrosum, nemorosum. Videlicet horum diversitate haut parva soli atq; inibi nascentium diversa productio ac natura suboritur. Hanc tamen diversitatem præcipuè qualitativis primis dimetitur, dando montibus, locis apricis, meridionalibus, caliditatem & siccitatem; vallibus, campis, locis septentrionalibus umbrosis, nemorosis, frigiditatem, &c. Et hinc montibus locisque siccis prognata, sunt validiora plerunque viribus quam reliqua, minora autem quoad staturam.

N. Hippoc. l. 2. de Diet. *Qua ad meridiem sita (regio) ea, quæ ad septentrionem spectat calidior & siccior quod ad solem magis accedat. In his autem regionibus homines & quæ terrâ producuntur, sicciora, calidiora & validiora esse necesse est, quam quæ in contrariis. Item: per se si loca spectes, ad hunc habent se modum. Alta loca & squalentia, quæque ad meridiem spectant, campestribus aqualiter sitis sunt sicciora, quod pauciores humiditates contineant.*

III. *Quale*, i. e. utrum solum macilentum, pingueve, siccum vel humi-

dum, arenosum & fabulosum, vel uliginosum ac limosum sit, vel & dulce, salsum; proprietatibus seminalibusve rationibus peculiariter dotatum.

De Aqua.

Aqua non minus ac terra ad productionem rerum nativarum concurrat: præbet enim rebus inibi nascentibus tum domicilium, tum & alimentum, idque non modo quatenus terræ permixta aridam constituit, sed & quatenus seorsum collecta, terræ supernatat.

considerari itaque iisdem poterit differentiis, quibus terra.

I. *Quoad Ubi*. idem est iudicium quod de terra. Nimirum secundum cæli regionumque differentiam non modo res ipsas, sed & rerum vires differre comperimus, hujusceque regionis aquis, has plantas, hæc animalia, alterius alias plantas, alia animalia esse propria.

II. *Quoad Quomodo* non magnifere est momenti, nisi profunditatem situmque in locis montanis, planis, profundisve spectes: vel & magnitudinem seu amplitudinem aquarum consideres.

III. *Quoad Quale* Aqua est dulcis, salsa, seu marina proprietatibusve peculiaribus insignita. Hûc: aqua lacustris, palustris, limosa, & sim.

CAPUT XIV.

De Preparationibus medicamentorum.

Preparatorum productio, dicitur præparatio, quæ est actio officinalis, qua medicamenta parantur.

Hujus species sunt.

A.

Acuere seu *acuare*, i.e. rem fortio-rem reddere, vel stimulum eidem addere. Sic acuuntur pilulæ grano 1. ac 2. Diagrydii, Trochisc. alhandal. Gummi. de Gamandra.

Amalgamare i.e. metalla per ☿ ij vi admixtionem calcinare. Calcinantur autem hoc modo sola metalla, excepto ☿. Vid. l. 3.

C.

Calcinare, i.e. in calcem redigere, vel friabile reddere. Fitque

- | | | | | |
|--------------------|---|--------------|---|-------------------------------------|
| 1. Per ignitionem | { | Incinerando | { | Hûc |
| | | Reverberando | | pertinet extinctio rei ignitæ in Δ. |
| 2. Per corrosionem | { | Amalgamando | { | Hûc calcinatio per illinitionem |
| | | Præcipitando | | |
| | | Fumigando | | |
| | | Vaporando | | liquoris |
| | | Cementando | | corrosivi. |

N. *Exempla singulorum horum modorum in metallis lib. 3. videre licet.*

Candifare. Candifari soli competit saccharo, quod in ∇ solutum, purificatum atq; quadantenus inspissatum, in crystallos concrefcit, idque candifari vocant. Imponunt autem solutioni

nonnunquam res medicamentales solidas, ut crySTALLIS illis saccharatis obducantur, easque confectionibus adnumerant. Vid. l. 2. c. 47.

Cementare idem est quod stratificare, i.e. corpus metallicum (huic enim soli competit) cemento stratificatum imposito, aliquandiu igni exponere. Vid. lib. 3. in ☉ c. 9.

Circularē, i.e. liquorem in digestionem collocare, ut volatilior ac spirituosior pars continuo elevari ac recidere possit, adeoque quasi circulum transeat, maturiorque evadat. Hujus rei gratia certa instrumenta in usu sunt, circularia dicta.

N. *Vices circulationis supplere potest iterata destillatio.*

Clarificare potissimum de decoctis ac succis dicitur, quæ cum crassis scatant excrementis, clarificatione, i.e. purgatione egent. Clarificationis hujus præcipui modi sunt 1. *per albumen ovi*, 2. *per digestionem*, tum 3. *per filtrationem*. Vide infra.

Per albumen hoc modo peragitur. Albumen ovi virgula agitur donec penitus in spumam abeat; Spuma hæc infunditur rebus clarificandis, coquanturque simul una ac altera ebullitione, ut crassiora albumini adhærescant. Hinc separantur despumando, colandoque, & sim.

Per

Per *digestionem*, quæ fit clarificatio, nihil peculiare habet à digestionem, quæ crassiora fecesve ad fundum paulatim secedunt, unde per decantationem à liquore separari possunt.

Coagulare. Coagulari dicitur id quod evaporando inspissatur.

Cohobare, i. e. liquorem destillatum materiæ in destillatorio residuæ, iterum affundere, ac denuo destillare.

Colare, i. e. per colum trajicere. Colus autem præcipuè pannus intelligitur, nonnunquam quoque linteus.

Condire eimnachem. Condire dicuntur quæ saccharo syrupisato, mellive (ut horum beneficio diutius conseruentur) calidè immerguntur, usuique sic immersa reponuntur. Vid. lib. 2. c. 46.

Conficere. Officinis est saccharo obducere ac incrustare. Vid. lib. 2. c. 47.

Conquassare. Conquassari dicuntur (vitidia maximè) quæ pistillo grosse tunduntur & sine pulverisatione presantur.

Conservare seu conservare, i. e. conservam facere.

Coquere, i. e. elixare.

Coquere in diplomate, i. e. in MB.

Cribrare, i. e. per cribrum transmittere.

Crystallizare, i. e. in crystallinas formas reducere.

N. I. *Proprium est salium, quibus Tart. saccharumque addere licet. Videlicet hac in liquore aqueo soluta, si in frigi-*

dum locum reposita fuerint, concreverint in crystallos. Vbi nota, si nimium liquoris adsit antequam reponantur, aliquantulum exhalandum esse.

N. II. *f. a. Crystallizare est Crystallisationes repetere, donec amplius colligi nequeant. Nimirum postquam prima vice Crystalli exempti fuerint, quia reliquis in liquore scil. restantibus Crystallis liquor disproportionatus est, exhalet nonnihil, hinc reponatur, &c.*

D.

Decantare, i. e. liquorem materiæ alicui supereminentem per inclinationem effundere. Germ. *abgießen*.

Decupelare idem est quod decantare.

Decrepitare de sale communi & similibus dicitur quæ cum ad ignem sine fusionem calcinantur, strepitum seu crepitum edunt, Vid. de Sal. com.

Deliquium. Per deliquium solvere, i. e. rem solvendam in locum humidum collocare ut per se in liquorem vertatur.

N. I. *Deliquium peragitur feliciter i. in cella seu loco humido, 2. mense Iunio, Julio, Augusto, quo tempore cellæ sunt frigidiores.*

N. II. *Nonnunquam promovetur deliquium instillando humorem convenientem.*

Dephlegmare, i. e. phlegma separare seu abstrahere, quod fit, si phlegma seorsim affectetur, destillando, sin minus, evaporando: competitque

Spiritibus mineralibus fixioribus, ut
Spir. ☉, Sal. nit. Sal. com. & sim.

Despumare, i. e. spumam demere.
Germ. abschäumen.

Destillare, i. e. Liquorem vi caloris
attenuatum in recipiens appositum
prolectare. Modi destillationis usitatissi-
mi sunt 1. ratione vasorum: per Alembicum,
per Retortam, ac per Vesicam, 2. ratione
graduum caloris: per Balneum ro-
ris, seu vaporis (VB) per balneum
Maris (MB) per cinerem, per arenam,
per ignem nudum.

Detonare, *verpuffen*. Detonari dicitur,
quod cum flagratione & strepitu calcinatur. Ut Crocus Metallorum.

Digerere, i. e. blando calore fovere.

Dissolvere, i. e. accedente aliquo humore
solvere. Germ. auflösen. Sic solvuntur salia,

N. Differt nonnullis dissolutio à li-
quatione, quod hac non nisi vi caloris fiat.
Es plerunque sine accedente humore, illa
affusum humorem semper requirat.

Dispensare. Dispensari dicitur com-
positum, dum simplicia, quæ compo-
situm ingrediuntur, seliguntur, & pro
composito inde parando adaptantur.

Dulcorare, *edulcorare*: Dulcorari di-
cuntur 1. calcinata sale gravida, dum
(ut plurimum calidâ) abluuntur, quæ
ablutione sal inibi contentum aquæ
immiscetur. 2. Dicuntur dulcorari Po-
tiones, addito saccharo, vel syrupo con-
venienti.

E.

Electuarisare, i. e. Electuarium fa-
cere:

Evaporare, i. e. liquorem calori ex-
ponere, ut exhalet humiditas.

Exaltare, i. e. Rei potentiam alte-
rando augere. Vid. fermentare.

Exacinaré, i. e. acinos eximere.

Excorticare, i. e. cortices detra-
here.

Exhalare, idem quod evaporare.

Exprimere, i. e. premendo vel pres-
sura elicere, sive id sola manu fiat, ut de-
cocta exprimi solent, sive certo instru-
mento, quod prælum dicunt.

Extrahere, i. e. beneficio debiti li-
quoris (quem menstruum vocant) pro-
portionaliter affusi, præcipuam rei eli-
cere partem. Vid. l. 2. c. 57.

N. Extrahere s. a. i. e. Extractionem
novis affusis menstruis reiterare, idque
toties quoties menstruum adhuc impre-
gnari sentitur.

F.

Fermentare *vergöhren*. Fermen-
tari res propriè dicitur, quando evi-
denter in se resolvitur, rarefcit, matu-
ratur.

N. Ratio Fermentationis hac est:
Contraria fermentabilia confusa, i. e.
nondum sub unum dominium ac potesta-
tem, mixtionemque exactam redacta, si
aliquatenus vi caloris externi resoluta
fuerint, vi potentioris facultatis alteran-
tur, atque inde in certam aliquam tempe-
riem, naturamq; spirituosorem evehun-
tur & exaltantur.

FILL

Filtrare. Filtratio fit beneficio vel chartæ bibulæ, vel panni lanei. Ex Charta fit pyramis, quæ tritorio inditur ne concidat. Hinc liquor pyramidi infunditur, ut paulatim per chartam in suppositum vasculum defluat.

Per pannum filtratio fit vel colando, de quo paulo antè, vel separando liquorem à pulveribus suis subsidentibus. At hoc duo itidem requiruntur vascula, alterum ex quo, alterum in quod liquor filtratur. Prius quod filtrandum continet, inclinatur ad latus, ei quæ imponitur frustulum panni, ut limbus alter extra vas dependeat: posterius supponitur, ut liquorem per panniculum paulatim defluentem suscipiat. Similem modum infra docemus oleum aquis separandi.

Fixare, i. e. quod volatile est fixum reddere. Fit vel per se, scilicet iteratis destillationibus, & sublimationibus, vel addita alia aliqua re, cujus vi fixatio perficitur.

Fumare, i. e. per fumum Mercurii vel Saturni calcinare, solorumque est metallorum.

N. Nimirum Mercurius vasi calcinatorio orificii angustii inditus apponitur igni nudo, ut fumus exhalet. Orificio imponitur Metallum calcinandum laminatum, ut fumo Mercurii transeunte friabile reddatur.

Fundere idem in Chymia est quod liquare, seu ad ignem liquefacere: proprieque de salibus ac metallis dicitur.

G.

Granulare, i. e. in grana reducere.

I.

Imbibere, i. e. rem humiditate per vices potare, seu liquore rem humectare.

Impastare, i. e. miscere ut fiat instar pastæ seu massæ.

Imprægnare, idem ferè est quod imbibere.

Inaurare, i. e. foliis auri obducere. Inaurari autem etiam de aliis quoque medicamentorum formis dici possit, E. g. de Martio pane, & sim. Tamen potissimum de pilulis dicitur, quæ in Scatula (torunda) clausa adjecto folio auri, circumagitantur, donec auro illo obducantur. Germ. vergulden.

Incerare, idem est quod imbibere.

Incidere. Inciduntur herbæ forcipe: duriora, ut ligna, radices duriores, cortices; cultro.

Incinerare, i. e. comburere ac in cinerem redigere.

Infundere, i. e. materiam liquoti immingere.

Insolare, i. e. macerare vel Solis, vel alio calore tepido.

Interpassare. Interpassari dicitur de sacculis seu fomentis siccis, idemque est quod intersuere, ne materia inclusa conglomeretur, cujus rei gratia quoque gossypio pulveres suscipi solent.

L.

Lavigare, i. e. super porphyretico lapide

lapide in tenuissimum pulverem (Alcohol) redigere.

Lavare, i. e. liquore (aquâ) abluere. ut res purgetur ab immunditie. Lotio-
ne autem opus habentiam ex minera-
libus, quam ex vegetabilibus & anima-
libus nonnulla. Ut patebit. l. 2.

N. *Instituitur nonnunquam lotio, ut res imbuatur qualitate aliqua.*

Limare, i. e. lima in scobem redige-
re, quam limaturam dicunt.

Liquare, i. e. vi caloris fluidum fa-
cere, Germ. *fließend machen*/ *schmelzen*. Competit Metallis, salibus, pin-
guedinibus, & sim. interdum tamen
idem est quod per deliquium dissol-
vere.

N. *Quomodo differat à dissolutione.*
Vide supra.

M.

Macerare, idem est quod digerere.

Malaxare, Malaxari dicuntur Em-
plastra dum in massam subiguntur, si-
ve id manu fiat, sive pilâ vel simili in-
strumento.

P.

Præcipitare. Præcipitari dicitur,
quod in liquore solutum, incrassatum-
que ad fundum secedit.

N. *Nonnullis denotat totum actum calcinationis per liquores corrosivos; si-
ve calx per se subsideat, sive exhalatione hu-
miditatis, sive instillatione alicujus rei
repercutientis. Vid. Beguinum.*

Preparare, pharmacopais est rem
minutissimè lævigare ac aqua aliqua
cordiali imbuere. Vid. l. 2.

N. *Dicitur idem de radicibus non-
nullis, &c. quæ in aceto macerata exsic-
cantur. E.g. Rad. Ari.*

Pulverisare, pulverare, i. e. in pulve-
rem redigere, sive terendo, sive lævi-
gando id fiat.

Purificare, i. e. à fordibus seu iniqui-
namentis (crassioribus) separare: fit-
que lavando, clarificando, filtrando,
digerendo. Vide clarificare.

Putrefacere idem est quod dige-
re.

R.

Radere, schaben/ fit instrumento a-
liquo acuto, E. g. cultello, vitro, lima,
& sim. quo res rationi subjecta in rasu-
ram redigitur.

Rectificare, i. e. denuo blando calo-
re destillare, ut pars magis spirituosâ ac
volatilis eliciatur, relicto phlegmate
seu parte aquosâ in fundo. Sic rectifi-
cantur aquæ stillatiæ, spiritus.

Refinare, idem est quod depurare,
competitq; potissimum saccharo. Vid.
l. 4. class. 4.

Reverberare, i. e. rem aliquam vi
flammæ cremare, quæ infra ac supra
illam ambiat.

Rotulare, i. e. Rotulas conficere.
Vid. l. 2. c. 69.

S.

Salificare, i. e. Sal conficere.

Secare, idem est quod incidere.

Separare, i. e. res heterogeneas mix-
tas & confusas segregare. Usitatissimū
autem est separare oleum ab aqua,
quod fit i. per *Tritorium* angusti ori-
ficii.

fieri in fundo; quod orificium aqueo liquori utpote graviori primumque defluenti aperitur, postmodumque obturatur, oleumque restans sigillatim colligitur. 2. Per *gossypium* seu lanam. Nimirum repletur vitrum angusti orificii, aqua & oleo confusis, ad summum usque, siniturque, ut oleum supernatet. Hinc apponitur vitrum humilius, *gossypium*que seu lana utrique imponitur, ut uno termino oleum tangat, altero in vas appositum dependeat. Sic delabitur oleum per *gossypium*, in appositum vasculum humilius. 3. Per *chartam bibulam*. Nimirum transit aqua restatque oleum.

Sigillare hermeticè, i. e. vitrum fufione claudere.

Stratificare. S.S.S. (i. e. Stratum super stratum) facere idem est ac Metallum laminatum & pulveres stratificando, alternatim struere. Nimirum primo sternendum est stratum pulveris, hinc imponenda lamina metallica, iterum pulvis & sic deinceps, donec pulvis stratum claudat.

N.I. Nonnunquam loco *laminae pulvis Metallicus* sumitur.

N.II. *Beguno stratificationis* vox totum calcinationis actum comprehendit, quo lamina stratificata in igne friabilis redditur, quod & *cementare* dicunt.

Sublimare, i. e. rem volatilem siccam in sublimi elevare, ut seorsim haberipossit. Res illa elevata vel sublimati nomine effertur, vel florum nomen adsciscit.

T.

Tabulare, i. e. Tabulas vel morsulos conficere. Vid. l. 2. c. 69.

Terere, *Conterere*, i. e. pila contundere.

Torrere. i. e. in patella vel sartagine ferrea igni exposita medicamenta continuo agitare, ut humiditas absumatur. Sic fit *Rhabarbarum tostum*.

Trochiscare, i. e. Trochiscos facere.

V.

Vitrificare, i. e. in vitrum redigere. Vid. Vitrum § ij. l. 3.

Volatilizare, i. e. Volatile reddere.

CAPVT XV.

De Principiis Chymicis.

Circumstantiæ præparationis itidem, ut in nativis productionibus sunt *Principia chymica*, causa Efficiens, Materia, Tempus, Locus.

Principia chymica voco, in quæ res naturalis arte chymica resolvitur, tanquam in simplicissima. (artificialia.)

Suntque *Oleum*, *Spiritus*, *Sal*, *Phlegma*, & *caput mortuum*, &c. quorum descriptiones aliunde petere licet.

N. Nihil tritius est apud chymicos quam sua asserere principia. *Sal. com.* *Tart. §*, quibus alii addunt ☿ ac *phlegma*, illa *cherionia* appellant, i. e. facultas

ribus, efficacioribus ac insignioribus praedita; hac relollacea, i.e. qualitatibus insignibus destituta. Verum enim vero ubi in rem exactius inquiritur, quid statuentum sit, nihil solidi fere invenitur. Quod enim nonnulli id, quod oleosum est, sulphuris titulo nominant, quod vaporosum, mercurius; quod concreione salis; id sagacioribus minime satisfacit. Nam sciunt dari & sulphureū quod nequaquam oleosum, ut Δ vita & sim. Similiter dari norunt & vaporosum, quod tamen à Φ rio distinctum, ut phlegma instillatis: quini-
mò quamplurima dantur, quae parte oleosa prorsus destituuntur, num ergo & Sulphure? Nec minorum difficultatum sunt, quae declarandi gratia adducuntur exempla desumpta à ligno combustili, è vegetabilium anatomia. Videlicet in primo exemplo Sulph. representari volum butyro; Φ m sero; Sal, Caseo in secundo; Sulph. vocant, id quod flagrat, mercurium, quod fumat, Sal quod in cinere remanet. In anatomia vegetabilium manifestari ajunt, oleum i.e. Sulph. aquam, i.e. Φ m, & cinerem sale gravidum. Verum, quis nescit? sero plus salis inesse, quam ipsimet caseo: fuliginem, (qua fumus congelatus) & oleum, & sal, & aquam spirituosam in se continere: E vegetabilibus esse, quae ne guttam olei exhibeant. Relinquuntur itaque intricate adhuc difficultates, è quibus ut nos extricemus, hanc nostram opinionem cordatis submittimus censendam. Materia praexistens rerum nativarum, sive semen velis, sive nutrimentum, est humidum quoddam spiri-

tuosum, Humidum intellige non humorem meracum sed coagulabilem, adeoque parium terrestrium participem. Confer Gen. I. En habes Spiritum, ignis ac sulphuris nomine, ob naturam qua ignem emulat, nonnullis dictum, aliis formale principium: habes Aquam, habes Terram. Haec tria in primordio rei informiter confusa quidem existunt, verum deinceps vi spiritus paulatim elaborantur, exaltantur, incrassantur, adeoque ex parte viscosam induunt consistentiam, salinam naturam gravidam, ex parte quoque in naturam secernunt, liquidam & aridam, qualitatibus materialibus solum praeditam. Salina illa natura, una cum portio-
nacula potiori viscosa illius materia exaltatur subinde ulterius, spiritualisaturque, i.e. spiritualem maturioremque paulatim induit naturam, viribus naturae rei correspondentibus, efficacem, idque substantia, prout natura ordinat diversam spirituosam scil. oleosam, & sim. En phlegma, terram mortuam, tartarum, sal & ex his spiritum vel oleum, aut aliquid his analogum. Si itaque liquidum spirituositate destitutum appellare libuerit mercurium, econtra spiritum vel oleum sulphur; modo de re constet, de nominibus nemini bellum indicam. Et haec mea est de principii Hermetici opinio; ad cuius assertionem etsi adducere queam, quomodo sal in spiritualem naturam evehatur. Spiritus econtra in salinam naturam figatur, (e.g. in servescencia & acescentia liquorum spirituosorum) attamen compendii studio iis supersedeo.

CAPVT XVI.

De causa Efficiente seu preparante interna:

Causa Efficiens preparationum itidem interna & externa dari potest, præcipuè tamen in his externa consideranda venit.

Interna est materiæ vel aptitudo, vel & facultas simul operativa.

Aptitudo est dispositio, qua materia habilis est ad sustinendam elaborationem suscipiendamve formulam medicamenti, quæ intenditur.

Facultas est internum aliquod agens, quo nonnullæ præparationes opus habent, ut perficiantur.

N. In præparationibus officinalibus a-

liæ sunt mere artificiales, ut pulverisatio, confectio, &c. alia cum naturalibus conjuncta, ut fermentatio, crystallisatio, &c. Illa non nisi aptitudinem requirunt; hæc insuper internum agens. Aptitudo illa nisi materiam præparationi subiectam committitur, in cassum præparationi res subijcitur. Modi autem preparationum ut varii sunt, ita varie quoque dictæ aptitudines: Singuli nimirum modi singulas præsupponunt aptitudines: crystallisatio scilicet sal crystallisabile, fermentatio materiam fermentabilem, destillatio materiam humore exhalabili prægnantem, &c.

CAPVT XVII.

De Qualitatibus Elementalibus & præcipue de calore.

Efficiens præparationum externa primaria est: Pharmacopœus arte præparandi instructus, de quo nihil in præsentiarum, nisi quod industrium diligentem & patientem eum esse oportet.

Secundaria sunt tum requisitæ qualitates, tum instrumenta.

Qualitates hic uti in productione nativæ considerantur, Elementales scilicet & proprietates peculiare. Verum cum ultimæ hæc origine eadem sint, quæ supra, descriptione illarum hic exousamur.

Inter qualitates elementales com-

munissimus est calor, hinc humiditas, tandem siccitas & frigiditas.

Calor facit ad calcinationem, confectionem, destillationem, digestionem, evaporationem, fermentationem, reverberationem, sublimationem: humiditas ad dissolutionem, extractionem: frigiditas ad candificationem, crystallisationem: siccitas ad exiccationem, trochiscationem, &c.

Ei qualitatibus dictis, quia solus calor præ reliquis artis directorio subijcitur, cum solum hic descripsisse sufficit.

Distin-

Distinguitur calor vel ratione *causarum*, quibus efficitur, vel ratione *modi adhibendi*, vel ratione *intensionis* vel *remissionis* ve.

Ratione *causarum* calor est {
 1. Solis,
 2. Fimi putrescentis,
 3. Ignis qui { Lampadis,
 Carbonum,
 Flammeus, &c.

Ratione *modorum* quibus ignis adhibetur, calor vel est:

I. *Balnei Roris* seu *vaporis*, i. e. qui fit beneficio vaporum, ab aqua calefcente elevatorum, ac Vasculum cum materia ambientium. *VB*.

II. *Balnei Maris* seu *Maria*, i. e. qui fit mediante aqua calefcente, cui Vasculum cum medicamento præparando impositum est. Hic mitis communiter censeretur ac gradus primi.

III. *Cineris*, qui fit calefcentia cinerum, fortiorque intelligitur, quam præcedens, estque gradus secundi.

IV. *Arena*; Fit mediante arena, notatque communiter adhuc fortiozem ac gradum tertium.

V. *Ignis nudi*; Fit sine interveniente medio, accensis prunis vel lignis flagrantibus. Huc pertinent.

VI. *Circularis*. Fit igne carbonum vas ambientium.

VII. *Reverberatorius*, quando flamma materiam undique ambit & lambit.

VIII. *Suppressionis*, quando infra ac supra ignis adhibetur.

Ratione *intensionis* vel *remissionis* Calore est vel

Gradus I. Mitis ac blandus.

II. Acrior ac intensior.

III. Fortior ac vehementior.

IV. Fortissimus.

N. I. Gradus 1. mensuratur communiter *MB*. 2. Calore cinerum. 3. *Arena*. 4. Igne nudo, non quod necessarium simpliciter sit gradus singulos, non nisi dictis modis administrare, quippe uno eodemque modo plures gradus peragi possunt. E.g. *MB* gradus 1. & 2. Cineribus & arena, gradus 1. 2. & 3. igne nudo gradus omnes: sed (ut dictum supra) per calorem *MB* intelligendus est, calor in gradu 1. i. e. mitis ac blandus; per calorem cinerum gradus 2. i. e. acrior ac intensior, &c.

N. II. Singuli gradus magnam obtinent latitudinem, quam communiter principio, medio ac fine cujuslibet gradus circumscribunt. Verum enim vero, cui volupe fuerit plurimas caloris differentias in singulis gradibus distinguere, certo instrumento id assequi poterit, facto ad imitationem instrumenti, quo aeris calor intensior ac remissior notari à nonnullis solet, perpetuum mobile vulgò vocant. s. urano scopium.

N. III. Moderamen ignis fit afflatu aeris, quem moderatur attractio per ostiola & præcipue exspiratio per spiracula. Hinc, quanto copiosior afflatus & exspiratio

piratio permittitur, tanto fortior evadit ignis ac calor, &c. His itaq; delibatis, adhibendus est gradus caloris præparationi conveniens. Intensiore enim calore, uti medicamentum comburendo corrumpi-

tur, ita remissiore minus commode tractatur. Præstat tamen in defectu caloris peccare, quam in excessu: illud quippe diuturniore igne resarciri potest, hoc neminiquam.

CAPVT XVIII.

De facultatibus fortioribus sive salinis.

Non parum utilitatis præparationibus conferunt facultates fortiores, quas salinas vocare libet, videlicet vis acida, amara, dulcis, stiptica, corrosiva, & ejusmodi sexcenta, quippe harum ope utimur in facilitandis fermentationibus, in peragendis corrosionibus, præcipitationibus. Quinimo earundem opera perficiuntur extractiones, digestiones & hujus generis operationes aliarum.

N. Dicimus salinas, 1. quia salis naturam referunt. 2. quia peculiari nomine adhuc destituta sunt. Etenim quòd à saporibus nomina ferè mutueant, mutuatiua illa non sunt genuina, idq; fit partim similitudine operationis, qua dictæ facultates materia præparanda sese insinuant, eamque afficiunt, non secus ac saporis linguam, spiritusq; gustatiles: partim fit idem quia saporis ferè comites habent.

Facultatum harum ratione celebrantur, salia, tartarum vini, feces vini

& cerevisia, saccharum, fermentum panis, &c.

Huc pertinent & menstrua dictaliquores scilicet, ob facultatem hanc apti rebus infusis sese insinuare, eas penetrare potioremq; illarum partem elicere & imbibere; de quibus lib. 2.

Hujus itidem farinae sunt aquæ canstica & corrosiva, dictæ aquæ fortes, regia, & sim. utpote, quæ pollent vi & facultate metalla corrodingi, inque limpidum liquorem solvendi, idq; non alia quam salina illa facultate.

Ejusdem quoque generis sunt pulveres cementarii uti & Mercurius vivus, quorum facultate eadem metalla reduntur friabilia.

Huc pertinent quoque aceta, aliiquetiquores minerales acidi, quorum auxilio magisteria fiunt. Verum, quia de his lib. 2. suis locis plenius agitur, sufficit hæc saltem hinc tetigisse.

CAPVT XIX.

De Instrumentis Pharmacopæticis.

Instrumenta medicamentorum præparationi inservientia varia sunt, dif-

feruntque non modo ratione officii, sed & materia, formaque inde dependentis

dentis diversitate.

Officii ratione alia medicamento-
rum præparationi, alia asservationi in-
serviunt.

Materia respectu, fiunt alia ex lapi-
dibus, alia ex terris, vitris, metallis, lignis,
corio, linteo, panno, &c.

Hinc Canon:

Instrumenta (maxime quibus im-
mediatè res attingitur) quatenus vari-
ant diversitate materiæ, eatenus faci-
unt quoque diversimodè ad medica-
menta aptiora ineptioraque constitu-
enda. Ergo.

I. *Vitrea* reliquis ferè omnibus soli-
ditate atque adeò convenientiâ præfe-
runtur. Corrosioni quippe æquè resi-
stunt ac penetrationi. Veruntamen
quia nonnunquam minus fortia sunt,
quam ut præparationi sufficere queant,
& reliquis uti cogimur.

II. *Terrea* succedunt vitreis magis
minus. Variant enim quàm maxime
soliditate, raritate, durabilitate, & sim.
unde aptiora vel ineptiora quoque æ-
stimantur. Eligenda itaque hæc pro re
nata. Nostratibus probantur inprimis
fictilia ex certa quadam terra Hassiæ,
quam Walburgicam vocant, cui ta-
men, nisi sit præstantior, minimè cedit
terræ genus in vicina Marpurgi fossa, ex
qua urcei usus ibidem creberrimi, for-
mari solent.

III. *Metallina*, solida quidem sunt,
ut penetrationem non admittant, attra-
men qui medicamenti spirituosos, aci-
dis, acribusve qualitates suas imperti-

re apta nata sunt, in horum præparatio-
nibus, nisi peculiariter intentioni infer-
viant, evitantur.

IV. *Stannum* tamen in hoc reliquis
præstat, unde quoque vesicas cupreas
eo obducere solent, quo minus qua-
litate sua vitriolata, quæ inibi destil-
lantur, spirituosas, inquinant. Sic ini-
donea quoque sunt instrumenta metal-
lina, præparationibus Mercurii, & si-
milibus.

Forma instrumentorum varia exi-
st, prout illorum officium requirit,
materiaque permittit. Nos usitatiora
synopsi damus. Suntque
Agitaculū, ein Agitacul/ i.e. ein Rühr-
pistill.

Ahenum, Kessel.

Alembicus, Alembic.

Ampulla, Krug.

Arcula, Lädlein.

Capsula, gedrehte Büchse/ darin man
die Gläser verwahret.

Catillus, Rost.

Catinus, Capell.

Circulatorium/ circulier Glas.

Hujus species sunt Pelicanus, & sim.

Cochleare, Löffel.

Colatorium, colus, Seichtuch.

Concha, Glasschale.

Cornuta, Retorta, Matratium, Re-
tort.

Cribrum, Sieb.

Crucibulum, Schmelzstiegel / Gold-
schmelzstiegel.

Cucurbita, Kolbe.

Diploma, i.e. MB

Exci-

Excipulum, Vorlag/Recipient.
 Fidile, Hafen.
Filtrum idem quod colus.
 Forceps, Zange.
 Infundibulum, Einguß.
 Lagena, Flasche/Krug.
 Lebes, Ziegel.
 Lima, Feile.
 Malleus, Hammer.
 Manica Hippocratis, spitziger Beu-
 fel.
Matratium, idem quod Retorta.
 Mortarium, Mörsel.
 Olla, ollula, Hafen/Häselein.
 Phiola, Phiol.
 Pila, pistillum, Stößer.
 Porphyrites, Reibstein.
 Prælum, Preß.

Pyramis, Eingieß/Gießpuckel.
 Pyxis, Büchse.
 Receptaculum, Recipient/Vorlag.
 Retorta, Retort/
 Rudicula, Rührsteck.
 Rutabulum, Rührhacke.
 Sacculus, Sack/Beutel.
 Scatula, Schachtel.
 Separatorium, Scheidetrechter.
 Setaceum, Haarenstieb.
 Spatula, Spattel.
 Tabula, Brett, Tabulierbrett.
 Tegula, Müssel.
 Torcular, i.e. prælum, Preß.
 Tritorium, Trechter.
 Vitrum, Glas.
 Urceus, urceolus, Krug/Krug-
 lein.

CAPVT XX.

De Fornacibus.

AD pharmaco-poëtica instrumenta
 pertinent quoque Fornaces.

Fornaces seu furni sunt instrumen-
 ta operationibus quæ Δ e peragun-
 tur, destinata, ut inibi calor coerceri
 gubernarique commodè possit. Sunt-
 que furni pro diversitate officiorum,
 formarumque, nominibus quoque
 diversis insigniti. Nimirum est *proba-*
torius, re-verberatorius, destillatorius, a-
nemius, seu *ventosus*, &c. Præ reliquis
 tamen maximè famosæ sunt *Fornax*
acida ut appellant, sive piger *Henri-*
cus (sauler Heing.) Item *Athanor*

Henrici Conradi, quarum constru-
 ctiones, alias satis innotuerunt. His
 non sine causa accendi poterunt,
 fornacum duogenera, quarum *altera*
Londini apud ingeniosissimum illum
Cornel. Trebellium (jam *en ayleus*) vi-
 dere contigit, adeo ingeniosè coa-
 gmentatum, ut pro diversitate ac in-
 tensione caloris, sponte aperiretur re-
 cludereturque; artificio, me hercle
 sagacissimo, cujus favore calor unius
 ejusdemque tenoris continuò con-
 servari exactissimè poterat. Hujus
 fornacis constructio, hoc fundamen-

tonitebatur. Vitrum adhibitum fuit, adimpletum aliquota parte cujusdam certæ materiæ, quæ apta fuit gradibus caloris intensioris attenuari ac ampliari, remissioris e contra condensari ac contrahi. Hæc itaque materia dum intensiore caloris gradu attenuaretur, ampliabatur aliquantulum, elevabaturque simul in altum bacillum, & hoc mediante in altum tollebat simul operculum, quod ostiolo fornacis interno superadditum fuit, ut calorem à prunis substratis ascendente moderaretur.

Altera fornax quam diximus destillatoria est, spiritibus mineralibus dicta. Nimirum hi sine Retorta solius illius fornacis beneficio eliciuntur.

R. minerale, quod spiritum halare aptum est, injicitur per vices super prunas per ostiolum fornacis, statim ab injectione occludendum. Hinc fumus seu vapor vi ignis nudi elevatur, qui in rostris longis firmiter fornacis summitati, (ut rostrum capitello inseritur) infixis, diutina mora ac frigiditate itineris condensatur in liquorem, inque appositum receptaculum delabitur. Apta sanè fornax spiritui Tartaris præparando, nec non & spiritui ☿. Reliquis autem, cum sine admixtione alieni mineralis vix perfici queant, non adeo comoda; compositi enim potius quam simplices spiritus inde resultant.

CAPUT XXI.

De Materia Preparatorum.

Materia præparandis medicamentis ipsæmet res naturales quęcunque existunt, sive nativæ adhuc sint, sive artificis manu jam antea elaboratæ; imò ipsæmet *medicamenta*, strictè sic dicta, aliorum medicamentorum materia suppetunt, adeoque materialium series coincidit cum rebus medicinalibus supra recensitis.

N. *Materia medicamentorum* æquè late patet ac ipsa *Natura*, resque naturales quęcunque comprehendit ab universali illa materia ad res particulares descendendo adeo, ut ipsa natura universalis, seu si mavis universale illud *Naturæ* subjectum insufflatum scil. adhuc tamen

in sua universalitate constitutum, industriam medici manum non aversetur. Verum nos particularibus contenti, Universalis illius competitoris, ad auctores remittimus, qui peculiaribus tractatibus modum docuerunt, Universale illud subjectum acquirendi, elaborandi, atque in naturam universalis medicamenti beneficio seminis solaris transplantandi, inter quos videtur præcipuus Hermes Trismegistus in sua Tabula smaragdina, & hujus velut interpres Lullus in Testamento, quibus ex Neotericis præcipuè Dionysius Zacharius Gallus, Sendivogius, Comes Trevisanus & similes subiungi possunt.

CAP.

CAPVT XXII.

De Tempore & Loco.

TEmpus in præparationibus conueniens eligere, non minus ac in nativarum productione, momenti est non parvi.

Convenientia hæc temporis spectanda itidem, tum in *qualitatibus manifestioribus*, tum in *occultioribus influentibus*.

Qualitatum manifestiorum ergo id temporis eligendum quo vigent, quæ ad præparationem quoquo modo faciunt, Sic eligendum tempus moderatè calido-humidum; ad resolutionem, attenuationem, fermentationem, digestionem: frigidum; ad condensationem, coagulationem: humidum; ad liquationem, humedationem, destillationem: siccum; ad exiccationem.

N. Hinc monet Crollius liquationi tempus eligere, quo per antiperistasin loci liquationis subterraneus humidior fuerit, idq; determinat lunium, lulium, Augustum. Sic inservit tempus pluviosum præparationi spiritus Tartari per camp. tempus serenum seu frigidum & siccum conuenit trochiscationi agarici, quippe trochiscos reddit candidos, quos tempus contrarium pallidos exhibet. Cerevisia.

fermentationem tempus moderatè calidum promouet, frigidum impedit, &c.

Occultiorum influentiarum ratione præparatio peragenda vel saltem incipienda est i. & in primis, cum luminare (☉ aut ☿) familiare videlicet seu amicum planetæ rei scil. præparandæ sympathico (vide c. 8.) fuerit in fortitudinibus, vel dicti planetæ sympathici vel propriis.

N. Luna præcipuè hic spectanda.

2. Cum planeta rei præparandæ familiaris fuerit in fortitudinibus.

E.g. Quicumque in Saturno feliciter laborare satagit, eo tempore laborem inchoet, quo ☿ (Saturno amica) fuerit in fortitudinibus Saturni, vel quo Saturnus ipse in propriis fortitudinibus constituitur. Et hinc tabulam suam transmutationum metallicarum compilavit Paracelsus lib. 4. Archidox. magic.

De Loco.

Locus præparationis, quem laboratorium dicimus, itidem conueniens eligendus est, calidus, humidus, siccus, perspirabilis, non perspirabilis, &c. prout res exegerit.

CAPVT XXIII.

De collectione nativorum, ac primum de tempore secundum ætatem & turgescientiam rerum.

Collectio rerum nativarum est, i. e. qua mineralia è suis mineris fodis, quæ è sua productione sumuntur, nisq; eruuntur; Vegetabilia eradi-

cantur, decerpuntur, &c. Animalia perimuntur.

N. *Non parum discriminis collectio nativis inferi, prout scil. illa decenter vel indecenter peracta fuerit.*

Res colligendæ sunt solæ nativæ: In præparatis enim à cura hac excusamur, nisi forte volupe sit laboriosarum ac diuturnarum operationum finem observare, eamque simili ratione, quam de nativis habemus, metiri.

Circumstantiæ collectionis præcipuæ sunt colligendi *Tempus ac Modus.*

Tempus convenientius nativa colligendi colligitur tum à rei colligendæ aptitudine, tum à constitutione macrocosmica aptitudinem inferente.

N. *Finem duplicem collectio respicit, videlicet asservationem & usurpationem. Prioris gratia res colligenda est eo temporis fluxu, quo vigent qualitates facientes ad durabilitatem, ut sunt siccitas, & caliditas, vel & moderata frigiditas, & sim. Posterioris ratione colligi vult, dum qualitates vigent, medicationi aptiores.*

Rei colligendæ aptitudo ab optimo suo statu dependet, sive is trutinetur atate, sive periodica turgescencia. E.g. animalium nonnullorum. Utraque hæc siquidem tempus statum fere obtinuit secundum 12. menses mensurabile, mensis in collectionis statuitur genuinus, in quem ætas illa, turgescentiæ vigorosa incidit.

Ætas collectioni convenientissi-

ma censetur ætas *consistentia* seu maturitatis, cui succedit ætas *acrescentia*, præcipuè si consistentiæ appropinquat. Verum enimverò non raro spectanda quoque est reissubstantia, & inde dependens aptitudo elaborandi.

Sic è *mineralibus*, optima quidem sunt metalla, quæ maturuerunt, verum tractabiliora, i.e. præparationi aptiora habentur, quæ minùs matura.

E *Vegetabilibus* colligendi sunt flores cum expliciti pulchritudine sua luxuriant, nec tamen marcescunt, de quibus peculiariter lib. 4.

N. *Excipe paucas, quæ in gemmis colligi volunt, ut sunt Rosa, & sim.*

2. *Herba seu folia*, cum odore, colore, sapore, cacumineque superbiunt, & florascentiæ appropinquant.

N. *Herba ut plurimum cum floribus asservantur, colligenda itaque hæc erunt, quando floribus triumphant: ut Calamentha centaurium, chamadrys, chamapitys, dancus, sumaria, majorana, origanum, polium, pulegium, serpillum, thymus, &c.*

3. *Semina*, cum matura bene sint, siccatique ceperint, nec tamen exciderint.

4. *Fructus*, ad medicinam cum bene maturuerunt, ad asservationem antequam omnino maturescant, ut neque omnino acerbi sint, neque ad justam maturitatem pervenerint. Baptist. Port. in Mag.

5. *Radicum* variat collectio. Quædam

dam quouis anni tempore excepta hyeme effodi possunt, ut radix acetosæ, althææ, angelicæ, apii, asari, buglossæ, cyclaminis, dracunculi, cichor, &c. quas tamen præstat vere colligere.

Aliæ colliguntur antequam in stolonem abierint, scilicet circiter finem Martii, ut rad. acoti, agrimon, alth. anon. aristoloch. ari, asparag. betonic. bistort. bryon. carlin. caryophyllat. centaur. chelidon, utr. Cyper. dictamn. alb. ellebor. nigr. enul. eryng. esul. farfar. filipend. filic. fœnic. gentian. gramin. hyoscym. imperator. Ireos, lili, mandrag. mei, nymph. orchid. pentaphyll. petasit. petrosel. maced. pimpinell. pæon. polypod. raphan. sylv. rubi. rusc. saxifrag. sigill. Salomonis, scrophular. symphyt. valerian. vincetoxic.

N. *Sunt qui præstare volunt, radices cunctas autumno colligere, ubi folia deciderint, viresque in radices recesserint: alii veris initio, priusquam in caulem ac folia eruperint: alii ubi planta in vigore ac maturitate fuerit, quippe ut integra planta ita & radicem cum maturitate vigorari censent, cui consentire videtur*

Dioscorides, ubi radices colligere docet incipiente foliorum defludio. Verum præstat intueri radicum naturam, & ex hac colligendi tempus metiri. Sunt nimirum qua maturitate lignosam adsciscunt substantiam, has præstat antequam maturuerint eradicare: sunt econtra qua citra mutationem dictam adolescunt, eas etiam effodere licet, postquam planta bene fuerit matura, foliaque inceperint defluere.

Animalium vigorratiōe ætatis, est cum ad virilitatem seu consistentiam pervenerint: sunt tamen rariora quæ puerili ætate in usum veniunt, de quibus singulis lib. 5.

Animalia, quæ periodicam turgescen-
tiam patiuntur eo ipso turgescen-
tiae tempore vigere censentur. E.g. Cervus
vigoris ratione convenientius per-
imitur circiter Ægidii festum, utpo-
te quo turgescit. Item circiter tem-
pus, videlicet, quod includitur duo-
bus festis Mariæ sacris, colligi solent
ova, per hyemem totam asservari
apta.

CAPUT XXIV.

De colligendi tempore secundum constitutionem

Macrocœmica constitutio rerum
nativarum colligendarum specta-
tur, partim qualitibus universalioribus
seu manifestioribus, partim influentibus
stellarum specialioribus seu occultioribus.

N. Qualitates generaliores spectant
potissimum rei durabilitatem: influentia
specialiorem potissimum vires concernunt.
Adde & hoc, quod prius illud tempus uni-
versalius seu communius sit, plurimæque
sub-

sublunaria, ne dicam cuncta, concernat. Posterius; particularius seu specialius, respiciensque solas res familiares.

Tempus colligendi nativa, qualitatium universalium ratione, censetur aptius, moderatè frigidum & siccum, serenūq; hinc tempus balsamicum luna decrescens, matutinum, autumnale; uti &c, quod Planetarum suū, frigidum ac siccum arguitur.

N. Paracels. tr. i. Philos. pag. (mihi) 309. De diversitate temporum, mutationibus virium (inde) crescentium, vel decrescens philosophari, primum scire refert tempora anni esse diversa & pro diversitate temporum vires quoque rerum omnium augeri minuique, &c. Et paulo post: Hac itaque cum sine contradictione vera sint, sequitur non semper bonum esse, argillam ac lutum fodere, lignum cadere, multo minus herbas colligere, fructus decerpere, radices eradicare, balsamos ac gummata deradere, cuncta hac peragi fas est, tempore balsamico, certis mensibus, certo aspectu luna ac aliorum signorum, certa que diei hora. Ut autem constet, quanam vera illa balsamica tempora sint, quibus vires integra conservari possint, ut mumia à putrefactione, primo inter tempora anni prestat autumnus & præcipuè September & October; luna decrescens & imprimis trini ultimi dies decrescens; tempus matutinum, quando luceat. Etenim quemadmodum homo interdum laborat, laborandoque lassatur, debilitaturque, noctem autem post labores absolutos quieti

somnoque inhiat: ita quoque omnia radices scilicet & herba, &c. Quippe cuncta huminascens operantur cum sole, quiescunt cum luna. Porro sicut homo post sufficientem somnum, sanus, fortis, vigorosusque exurgit: ita & fructus universi post noctem mediam (non ante nec interdiu.) Exemplum præbent fructus arborum: Poma si tempore decerpantur balsamico, durabiliora ac minus corruptibilia sunt secus ac aliàs: imò; singuli fructus decerpti post mediam noctem; vel saltem ante solis ortum maximè durabiles existunt. Similiter sese res habet, si id (collectio) fiat in signis terrenis &, &, &, ac luna decrescens ut dictum. Nam hisce temporibus non luxuriat superflua humiditas nascentium, qua corruptionis origo, viriumque prostratio, Et hac experiuntur quoque rustici sine errore.

Ut autem vera hac esse experiaris, fac periculum: Nimirum decide ligni frustulum de arbore terra adhuc infixa, tempore balsamico uti dictum. Cade itidem de eadem arbore ligni frustum, ejusdem cum priori magnitudinis, tempore scilicet contrario (videlicet in signo aliquo aereo humido (&, &, aut X.) vel Luna crescente novellave, interdum, post meridiem, aut sub crepusculum vespertinum, utroque ponderato videbis frustum illud balsamico tempore decisum, multo levius esse minusq; humiditatis obtinere, quam alterum.

Eadem ratio est omnis generis lignorum. Etenim lignum quodvis tempore dicto

dicto in signis balsamicis casum, si adhibeatur adficiis, vel rei alicui materiam prabeat, nec afficitur facile teredine, nec putrescit, vermiculatur vò facile, sed durabile quam diutissime est.

Idem sentiendum de luto, argilla, terrâque effodienda: quippe lutum, terraque tempore balsamico fossa, optima est, quæ in igne perduret, imò cuncta instrumen-

ta, crucibula fittiliave, ex hac terra confecta longæva in igne sunt durationis. Idem de aliis quam plurimis sentiendum, quavis mentio specialis nulla facta fuerit. Hæc Paracelsus, quæ digna iudicavi, ut latino idiomate translata huc infererentur; non obstante quod rythimi vulgares contrariantur.

Lunæ cimento tua capere poma memento,

Hæc cum decrescit, quod carperis, omne putrescit.

Testantur & rustici, quod simus si transferatur in agros tempore novilunii, mutetur facile in vermiculos, s. cochleas, qui arrodunt radices.

CAPUT XXV.

De colligendi tempore secundum influentias particulares.

TEmpus colligendi nativæ influentiarum siderearum ratione censetur aptius, quo Planeta rei colligendæ familiaris in suis fuerit fortitudinibus, idque tanto convenientius iudicatur, quanto plures fortitudines Planeta idem obtinuerit.

N. I. Plurimi non sine causa præferunt luminare planetæ familiari amicuz & præcipuè Lunam, utpote quæ non modo terris finitima, sed & receptaculum sit omnium cælestium influxuum. Ipsa scilicet uxor omnium stellarum fecundissima, Solis caterorumque planetarum &

stellarum radios & influxus dicitur suscipere, eosque quasi fœtum inferiori mundo edere. Et hinc præ cæteris illam observari volunt.

N. II. Alii procedunt paulo secus, eliguntq; tempus, quo signum Zodiaci, familiaræ scilicet membro humano, cui res colligenda adhiberi debet, fuerit forte, i.e. præsentia alterius luminaris fortificatum, (puta si virtus rei colligendæ intendi debeat.) Et hi colligunt Paoniam cum ♊. signum capiti lymphaticum Luna Soli vè præsentia forte fueris.

H

Habe.

Habetur Planeta.

Fortis & fortunatus.		Debilis & infortunatus.	
Essentialiter	1 In domo sua	1 In domus oppositione vel in domo planetæ	5
	2 In Exaltatione sua	4 In exaltationis opposit. (mali)	4
	3 In Triplicitate sua	3 In peregrinatione, i. e. cum nullam dignita-	3
	4 In Terminis suis	2 In terminis malorum. (tem possederit)	2
	5 In facie sua		
	6 In Hora sua		
	7 In Novena sua		
N. His addunt nonnulli in die sua			
Accidentaliter	8 in domicilio coeli 10. & 11.	5 In domo 12.	5
	7. 4. 11.	4	4
	1. 5.	3	3
	9.	2	2
	3.	1	1
	9 In gaudio.	1	1
	10 In cursu seu motu veloci	2 In cursu tardo vel vacuo	2
	directo	retrogrado	2
	ascendente	descendente	2
	11 In signo ejusdem sexus	2 In signo diversi sexus.	4
i. e. cum planeta masculinus fuerit in signo masculino			3
Accidentaliter	12 In gradu ejusdem sexus	In gradu diversi sexus.	3
	13 In gradu lucido vel augmentante	3 In gradu tenebroso vel Puteali.	3
	14 In aspectu & cum bonis (fortuna)	5 In aspectu & cum malis, vel cum retrog.	5
	& cum ☉ i. e. in coe de ☉ lis	5 - - - combustionis cum sole.	5
	* & △	3 - - - ☿	3
	□ cum bonis	3 - - - □ cum malis.	3
	15 In obsessione bonorum	2 In obsessione malorum.	2
	16 In apogeo	2 In hypogeo.	2
	17 In ortu sibi debito, i. e. cum Planeta gaudēs esse orientalis solē sequitur	1 In ortu minus debito.	2
	18 In hæmisphærio correspondente.	2 In hæmisphærio disconveniente.	2
Accidentaliter	19 In cap. draconis, vel in hujus vicini	3 In cauda draconis.	3
	20	In Eclipsi.	3
	21	In via combusta.	3
	22 ☾ lumine aucta	3 ☾ lumine imminuta.	3
	23 In mansione bona (cōpetit soli ☾ æ.	In mansione mala.	3

N. Non opus est omnia semper pensitare, sed saltem principaliora videlicet, 1. Dignis. essentialibus. 2. an in boni coeli loco. 3. an cursu sit directus vel velox. 4. an libera combustione. 5. an in bono aspectu ☿ vel ☿ is. 6. an in suo baysi. gaudio. 7. an liber à radiis solaribus. Et denique quod in primis observandum, quamvis alii id negligant, cum quibus stellis fixis sit junctus intra distantiam. 5. grad.

Tabula Terminorum secundum Ptolomeum.

♄	♂ 6	♀ 6	♀ 8	♂ 5	♂ 5
♃	♀ 8	♂ 6	♂ 8	♂ 5	♂ 3
♂	♀ 6	♂ 6	♀ 5	♂ 7	♂ 6
♂	♂ 7	♀ 6	♀ 6	♂ 7	♂ 4
♂	♂ 6	♀ 5	♂ 7	♀ 6	♂ 6
♂	♀ 7	♀ 10	♂ 4	♂ 7	♂ 2
♂	♂ 6	♀ 8	♂ 7	♀ 7	♂ 2
♂	♂ 7	♀ 4	♀ 8	♂ 5	♂ 6
♂	♂ 12	♀ 5	♀ 4	♂ 5	♂ 4
♂	♀ 7	♂ 7	♀ 8	♂ 4	♂ 4
♂	♀ 7	♀ 6	♂ 7	♂ 5	♂ 5
♂	♀ 12	♂ 4	♀ 3	♂ 9	♂ 2

Secundum Alkabitium.

♄	♂ 6	♀ 6	♀ 8	♂ 5	♂ 5
♃	♀ 8	♂ 3	♀ 6	♂ 8	♂ 5
♂	♀ 6	♂ 6	♂ 6	♀ 5	♂ 7
♂	♂ 6	♂ 4	♀ 6	♀ 6	♂ 7
♂	♂ 6	♂ 6	♀ 5	♂ 7	♀ 6
♂	♀ 7	♂ 2	♀ 10	♂ 4	♂ 7
♂	♂ 6	♂ 2	♀ 8	♂ 7	♀ 7
♂	♂ 7	♂ 6	♀ 4	♀ 8	♂ 5
♂	♂ 12	♂ 4	♀ 5	♀ 4	♂ 5
♂	♀ 7	♂ 4	♂ 7	♀ 8	♂ 4
♂	♀ 7	♂ 5	♀ 6	♂ 7	♂ 5
♂	♀ 12	♂ 2	♂ 4	♀ 3	♂ 9

Sic termini Jovis sunt sex gradus Arietis priores. Veneris sequentes sex:
 scil. ad 12. Mercurii 8. sequentes scil. à 13. ad 20. &c.

N. 1.

N. 1. Sol & Luna terminos quidem non obtinent, sed similes fortitudines dicuntur habere in duabus Zodiaci medietatibus.

☉ à principio ♄ ad finem usque ♄, (dicitur medietas maxima.) ☾ à principio ☿ ad finem ☿ usque.

N. 2. Ultimi gradus cuiusque signi sunt mali.

5. Tabula facierum.

♈	♂ 10	☉ 10	♀ 10
♉	♀ 10	☾ 10	♂ 10
♊	♂ 10	♂ 10	☉ 10
♋	♀ 10	♀ 10	☾ 10
♌	♂ 10	♂ 10	♂ 10
♍	♀ 10	♀ 10	☾ 10
♎	♂ 10	♂ 10	♂ 10
♏	♀ 10	♀ 10	☾ 10
♐	♂ 10	♂ 10	♂ 10
♑	♀ 10	♀ 10	☾ 10
♒	♂ 10	♂ 10	♂ 10
♓	♀ 10	♀ 10	☾ 10

Sic ♄ sibi vendicat Leonis gradus 10. priores. ♄ 10. sequentes scilicet usque ad 20. ☿ sequentes ad 3. & sic consequenter per omnia signa.

Hinc si ♄ sit in 10. gradibus prioribus ☾ dicitur in facie sua esse.

Tabula Horarum Planetariorum.

Hora diurna	H. nocturn.	Diei ♄	♄ ^s	♂ ^{is}	☉ ^s	♀ ^{is}	☿ ^{ij}	☾ ^æ
1 8	3 10	♄	♄	♂	☉	♀	☿	☾
2 9	4 11	♄	♂	☉	♀	☿	☾	♄
3 10	5 12	♂	☉	♀	☿	☾	♄	♄
4 11	6	☉	♀	☿	☾	♄	♄	♂
5 12	7	♀	☿	☾	♄	♄	♂	☉
6 1	8	☿	☾	♄	♄	♂	☉	♀
7 2	9	☾	♄	♄	♂	☉	♀	☿

Numerantur horæ Planetarum diurnæ ab ortu solis ad occasum 12. totidemque nocturnæ ab occasu ad ortum adeoque hora diurna 1. & 8. diei Saturni consecratur Saturno 2. & 9. Jovi. Nimirum in superiori columna numerantur dies, in priori descendente horæ

diurnæ, in altera descendente, horæ nocturnæ, quibus e regione correspondent planetæ illis horis huius diei, in suprema columna, exhibiti, dominantes e. g. die ☉ hora 4. diurna dominatur ☾ &c.

7. De-

7. De Novenis.

Sapientes Indi diviserunt quodlibet signum in partes 9. quas vocaverunt novenas, quasi nonas partes, continet igitur qualibet novena seu nona pars gradus $3\frac{1}{3}$.

Tabula Novenarum.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
♊	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♋	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♌	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♍	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♎	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♏	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♐	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♑	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♒	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♓	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♈	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♉	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♊	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♋	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♌	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♍	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♎	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♏	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♐	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♑	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♒	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂
♓	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	♂

Sic ♀ existens in ♊ novena prima (i. e. in gradu 1. 2. 3. & quarti gradus minut. 30.) dicitur in sua novena esse.

8. Domus seu domicilia cœlestia.



Do-

Domuum harum erectionem aliunde & præcipue ex Ephemeridibus addiscere oportet.

9. Gaudere dicuntur Planetæ vel ratione suæ domus, vel ratione domiciliorum cœlestium seu horoscopi. Suæ domus ratione gaudet Planeta, quando est in domo sua maximè familiari (ratione scil. temporis diurni nocturnive.) Sic gaudium H i (planetæ sc. diurni) est in III , (domo H i diurna:) Z in X . O in M : Q (planetæ nocturni) in V (domo ejus nocturna: Q in IX . Reliqui (O & D) quia domum unicam habent, & in ea gaudent. Quoad domos cœlestes gaudet H in domo 12. Z 11. O 6. O 9. Q 5. Q 1. C 3.

N. Sane & alii modi gaudiorum, & g. ratione triplicitatum. Sic O gaudet in triplic. Δ ea: sic & O quia complexionis est ignea: C in ∇ : Z & Q in Δ : H in Δ . 2. quando Planeta est in dignitate amici vel amica, tunc dicitur gaudere, &c.

10. Cursus Planetarum est 1. velox tardusve. 2. directus vel retrogradus. 3. ascendens vel descendens: Planeta motu velox dicitur, cum directo movetur, quippe tunc morusejus velocior est motu medio: Tardus e contra cum secundum successionem signorum fertur, in directi sui Epicycli circumvolutione; Retrogradus cum contra signorum successionem ratrovolutione sui Epicycli. Ascendens cum ab Ecliptica versus septentrionem declinat; unde & eodem modo septentrionalis dicitur: Descendens cum ad meridiem; unde Meridionalis dicitur. Cujus doctrina ex Ephemeridibus sumenda.

N. Sol quia caret Epicyclo, ab hac consideratione alienus est. Similiter & in

C . propter velocissimum motum, retrogressio non animadvertitur.

II. Natura Signi.

Signa { Masculin. diurna V, II, III , X , III ,
funt { Fœminin. nocturna. V , VI , IX , M , X , XII

Signa { Mobilia V, VI , III , X ,
Fixa V , VI , IX , M , X ,
Communi II, IX , X , III .

12. Natura graduum.

1. Tabula graduum masculinorum & foeminarum.

V	8. m.	1. f.	6. m.	7. f.	8. m.	
8	5. f.	6. m.	6. f.	4. m.	3. f.	6. m.
Π	5. f.	1. m.	6. f.	4. m.	4. f.	
⊙	2. m.	6. f.	2. f.	11. m.	7. f.	
Ω	5. m.	3. f.	7. m.	8. f.	7. m.	
η	8. m.	4. m.	8. f.	10. m.		
⌒	5. m.	10. m.	5. m.	7. f.	3. m.	
⌒	4. m.	10. f.	3. m.	8. f.	5. m.	
⌒	3. m.	3. f.	7. m.	12. f.	6. m.	
⌒	11. m.	8. f.	11. m.			
⌒	5. m.	10. f.	6. m.	4. f.	2. m.	3. f.
⌒	10. m.	10. f.	3. m.	5. f.	2. m.	

E. g. gradus priores 8. V. sunt masculini, sequens 1. (9. sc.) est foemininus, &c.

N. 1. Gradus masculini dicuntur, quod Planetam masculinam in eis existentem fortio-rem reddant: foeminini vice versa.

N. Alii aliter procedunt, primumque signorum gradum masculinum faciunt, secundum foemininum. 3. iterum masculinum & sic deinceps. Verum ratio prior quae Alkabitio adscribitur, communior est.

13. Tabula graduum tenebrosorum, lucidorum & vacuorum.

V	ten. 3.	luc. 5.	ten. 8.	luc. 4.	Vac. 4.	luc. 5.	Vac. 1.
8	ten. 3.	luc. 4.	Vac. 5.	luc. 3.	Vac. 5.	luc. 8.	ten. 2.
Π	luc. 4.	ten. 3.	luc. 5.	Vac. 4.	luc. 6.	ten. 5.	Vac. 3.
⊙	luc. 12.	ten. 2.	Vac. 4.	fum. 2.	luc. 8.	Vac. 2.	
Ω	ten. 10.	fum. 10.	Vac. 5.	luc. 5.			
η	ten. 5.	luc. 3.	Vac. 7.	luc. 6.	fum. 6.	Vac. 5.	ten. 3.
⌒	luc. 5.	ten. 5.	luc. 8.	ten. 3.	luc. 6.	Vac. 3.	
⌒	ten. 3.	luc. 5.	Vac. 6.	luc. 6.	fum. 7.	Vac. 5.	ten. 3.
⌒	luc. 9.	ten. 3.	luc. 7.	fum. 4.	luc. 7.		
⌒	ten. 7.	luc. 3.	fum. 5.	luc. 4.	ten. 3.	Vac. 3.	ten. 5.
⌒	fum. 4.	luc. 5.	ten. 4.	luc. 8.	Vac. 4.	luc. 5.	
⌒	ten. 6.	luc. 6.	ten. 6.	luc. 4.	Vac. 3.	luc. 3.	ten. 2.

E. g. gradus priores 12. Ω sunt tenebrosi, 10. sequentes fumosi, &c.

N. Lu-

*inchoantur, vacua ac irrita communiter
esse solent, vel si mavis, mediocres sunt in-
ter bonitatem & malitiam.*

1. *Tabula graduum putealium.*

V	6	11	19	23	29		19								
8	5	13	18	24	25	26	3	15	27	30	6	7	8	9	10
II	2	12	17	26	30		11	1							
9	12	17	23	26	30		1	3	14	15	7	9	mg	15	
Q	6	13	15	22	23	28	2	5	7	10	19	27		28	
m	8	13	16	21	25		3	13	20	30					
H	1	7	20	23	30		3	5	21	24					
M	9	10	17	22	27		7	12	18	20	19	29			
A	7	12	15	24	27	30	13	20			1	7	18	19	
B	2	7	17	24	28		13	14	20	24	16	27	28	29	
III	12	17	24	29			7	16	17	20	18	26			
X	4	9	24	27	28		13	20							

Sic puteales gradus arietis sunt 6tus 11mus &c. idem de

Puteales dicuntur, quod Planeta in eis est quasi in puteo, i. e. debilis influentiae, quoad calorem & quoad alia opera utilia: atque communiter quando Planetae superiores in iisdem existunt, frigus ac humiditas seu pluvia generatur.

Azemena, sunt gradus debilitationis
corporum, &c.

14. *Aspectus Planetarum.*

Conjunctio est cum duæ stellæ in eundem coincidunt gradum.

Esse in corde solis, i.e. esse unitum
cum sole intra minuta 16.

Esse in combustione solis, i.e. ver-
fari in intervallo quod est ultra minuta
illa 16. ad gradum usque 12. (alii ad 6.)
Et hoc idem sub radiis solis esse di-
cunt.

15. *Obsessio.*

Obsessus Planeta dicitur cum utrinque planetis binis clauditur, id est, cum inter duos planetas existit; ita tamen ut neuter sit in orbe seu ambitu radiorum alterius.

Ambitus autem radiorum non omnibus æqualis est. ☉ spargit radios utrinque ad gr. 15. i.e. antrorsum 15. & retrorsum 15. ☾ utrimque radios mittit ad grad. 12. ☿ ab 9. ♀ ad 9. ♂ ad 8. ♁ ad 6. ♄ ad 5.

16. *Apogeeum & hypogeeum.*

Apogeeum est punctum in Epicyclis vel Eccentricis, in quo planeta collocatus, longissimè à centro terræ distat. Hypogeeum e contra, quo proximè ad terram accedit.

17. Ortus planetarum ad Solem trutinatur; dicunturque Planetæ oriri ante solem cum ortum solis præcedunt, post solem cum post solis occasum apparere incipiunt: Hinc sunt

Planetæ { Orientales, i.e. orientali ortu
fortes ☿, ♀, ♂.
Occidentales, i.e. occid. ortu
fortes ♁, ♄, & ♅.

N. ☿, ♀ & ♂ sunt orientales à ☉ sua cum ☉ usque ad ♁. Occidentales ab ♁ ad ☉. ♁ & ♄ sunt orientales cum vespere apparere incipiunt. ☾ est occidentalis à ☉ ad ♁, i.e. aucta lumine, orientalis ab ♁ ad ☉, i.e. diminuta lumine.

18. Hamisphærium duplex est, diurnum quod est supra Horizontem; nocturnum quod est infra.

N. Dicitur Planeta in hamisphærio correspondere, cum planeta diurnus est de die in hamisphærio diurno & contra.

Planet. { diurni ☿, ♀, ☉, ♁.
nocturni ♂, ♄, ♅.

19. Caput & cauda Draconis, sunt intersectiones Eclipticæ ac orbis ☾, quarum loca ex Ephemeridibus citanda sunt. Caput Drac. bonum est cum bonis, malum cum malis estque masculinum. Cauda mala cum bonis est, bonaque cum malis, estque fœminina.

20. Via combusta est inter ☿ gr. 13. ad ♄ gr. 9.

21. Eclipsin patiuntur ☉ & ☾.

22. Mansiones tribuuntur soli ☾, earque numero 28. adeoque mansio quolibet determinatur vigesima octava parte totius circuli, scil. ☉. 12. m. 51. sec. 25 $\frac{1}{2}$. mensuratione scil. incepta à 1. gr. ♀, & secundum seriem signorum continuata. Hinc prima ☾ mansio est ab ♀, gr. 0. ad gr. 12. m. 51. sec. 25 $\frac{1}{2}$. mansio secunda, ad gr. 24. m. 42. sec. 52. &c. Ex his gradibus reputantur ut plurimum malæ esse influentiæ mans. 16. 18. & 26.

N. Alii mensurationem instituunt (non in sphaera nona, sed) in sphaera 8. id est æstivæ signata.

CAPVT XXVI.

De modo colligendi.

MOdum colligendi peculiarem in colligendis nativis nonnullis observari comperimus, eumque diversum tum ratione collectionis *sursum deorsumve*, tum quoque ratione *situs colligentis*.

Ratione collectionis deprehenduntur in nonnullis diversæ vires, pro diversa collectione *sursum deorsumve* facta. Sic helleborus si colligitur, inquit Marf. Ficinus (lib. de lanit. studiofor.) sive folium deorsum trahas sive sursum, hoc subito tactu fieri creditur, ut vel deorsum vel sursum humores ducat. Sic & sambuci radix si sursum evellatur, per superiora purgat; sin e contra deorsum per fossam lubrus factam trahatur, movet alvum; ejusdem sambuci juli quoque si sursum, cacumen versus decerpantur, movent vomitum; e contra, si deor-

sum eosdem decerpseris, alvum laxant.

De *situ colligentis* ait Agrippa Phil. lib. i. cap. 48. Collecturos herbam H ni vel O jubent ad orientem spectare, vel meridiem. Primum quia gaudent (H & O) esse orientales à Sole; alterum quia principalia eorum domicilia scilicet α , m , γ , signa sunt meridionalia. Similiter J & X . Collecturi vero rem Q ream, G lem vel T rem, spectare jubentur versus occidentem, quia gaudent esse occidentales: vel contra septentrionem, quia domicilia eorum principalia quæ sunt S , II , S , ny , signa sunt septentrionalia. Sic in opere solari spectandum est contra orientem vel meridiem, quin potius semper ad ipsum solare corpus atque lumen.

CAPVT XXVII.

De Asservatione, ac primum de tempore seu duratione asservationis.

Asservatio est qua res medicamentales usui repositæ asservantur.

N. Scopus asservationis est res medicamentales usui reservare: Circumstantia igitur eò dirigi debent, ut quantum fieri potest, res integra usuique idonea quovis tempore in promptu sint.

Res asservandæ sunt tum nativæ tum præparatæ.

Circumstantiæ Asservationis præcipuæ sunt *tempus, locus, & modus adapiandi*.

Tempus Asservationis, dico quam-

I 2 diu

diu res asservari potest. Unde Canones:

Tempus asservationis ne sit ultra terminum durationis; Etenim quia vires cum tempore evanescent, non nisi cadaver inutile tandem relinquitur. Accidit hæc evanescencia, in aliis citius, in aliis tardius, prout res solidioris vel minus solidæ sunt substantiæ. Nimirum sunt, quarumvis facile dissipatur, harum asservatio brevioris erit temporis: sunt e contra, quarum natura solidior, adeoque corruptioni magis resistit; earum itaque duratio erit quoque diuturnior, v. g. lignorum & sim. Hinc constituitur.

I. TEMPUS SEU DURATIO NATIVORUM.

Mineralia pleraque (exceptis sulphureis atq; aqueis quibusdam) quia solidioris ac durabilioris sunt naturæ, durationis quoque diuturnioris censenda sunt.

E *vegetabilibus*. I. Flores quamdiu odorem, colorem & saporem retinent, asservari possunt: Vix autem, (exceptis paucis) semestrem durant, mutandi igitur annuatim. Schænanthos flores decennium durabiles ajunt.

N. In genere de floribus notandum, eò commodius in usum medicum illos caprari, quo fuerint recentiores; puta, nisi humiditas absit, quæ ex nascentia est reliqua.

Herbæ diutius quidem asservari possunt, præstat tamen singulis annis mutationem instituere.

Semina quo calidiora, actiora magisque aromatica sunt, eò quoque durabiliora, ideoque pro re nata biennium ac triennium integra servari possunt, minutiora tamen ac frigida minora singulis annis mutare fas est, servandaque sunt diligenter, ne rancescant.

Fruktus quotannis mutandi sunt. Exotici tamen durioris cortice ac crusta vestiti, per duos tresve annos durant. v. g. Myrobalani.

Radices parvæ, tenues, raræ, anno quolibet mutantur, ut Afari, Asparagi & simil. Magnæ crassæ præditæ substantiæ biennium vel triennium integra manent, ut Aristolochia, bryonia, gentiana, rheum ponticum. Triennio servari potest uterque helleborus.

Cortices in annum perdurant & ultra.

Gummi & resina durabilioris sunt naturæ.

Animalia, horumque partes, vires suas vegetas obtinere creduntur, quamdiu incorrupta servantur; id quod rancido fœtore, sapore, situ atque coloris mutatione dignosci potest. Durabiliores autem sunt partes quæ sicciores ac solidiores: corruptibiliores, quæ molliores, & hæc singulis annis mutari solent.

II. TEMPUS SEU DURATIO PRÆPARATORIUM.

Aceta infusa quotannis mutare convenit, vel affuso novo aceto infusa.

infusisque novis materialibus renovare.

Aqua stillatitia phlegmaticæ singulis annis vel mutandæ vel renovandæ sunt. Renovationem dico, quâ aqua recentibus plantis superfunditur, de novoque destillatur. Aquæ spirituosæ diutius servari queunt.

Balsamica aromatica annos duos tresve durabilia sunt.

Cerota vix ad annum durant.

Clyster, quia ut reliqua decocta facile corrumpitur, nullus exstat paratus, sed ex tempore præparatur.

Collyria sicca, cum trochiscis conveniunt.

Conditæ fructuum, biennium durant.

Confecta, quia saccharo circumvalata sunt, diutius durant quam nativa.

Conserve unius sunt anni.

Decocta quia intra dies paucos corruptioni obnoxia sunt, nulla pro usu exstant, sed recenter parantur. Et huius rei gratia species certorum decoctorum officinis in promptu sunt v. g. decocta pectoralia. Vide lib. 2. c. 49.

Electuaria lenita intra annum ferè imbecilliora fiunt: solutivorum virtus ad sesquiennium perdurat.

N. *Renovens durationem hâc regula includit: quo Electuaria quavis gratiora sunt, eo citius hebescit illorum energia ac facultas.*

Elixir, quia spirituosum est, si benè

muniatur, quo minus exhalet, aliquot annos servari potest.

Emplastra vix ad sesquiannum durant, quin nimis sicca evadant.

Extracta duriora in plures annos perdurant, nec facile præter exsiccationem quid detrimenti contrahunt.

Fecula vegetabilium singulis annis renovari queunt, integræ tamen manent biennium & ultra.

Flores variant pro diversitate materiarum unde sublimantur.

Julebi ex præscriptionibus recenter parantur. Julebus enim rosatus ac violatus in consistentia Syrupi asservantur.

Loboch sive Eclegmata quæ amygdalas, pineas, & semina frigida rancori obnoxia recipiunt, vix ultra annum durant, reliqua ad biennium pertingere queunt.

Magisteria præcipitatione parata, quia ex rebus fiunt durioribus, ideoque nec facile corruptibilia sunt, asservari in annos tres pluresve poterunt.

Morselli etsi idem aliquamdiu integri manere apti sint, præstat tamen recentes adhibere, præcipue si fortè simplicia rancori obnoxia continuerint.

Olea expressa temperata, ut amygdalinum, sesaminum, ex pineis & sim. intus præsertim sumenda vix ultra mensem sine rancore servantur: frigida, unius sunt anni: calida per duos vel tres durant. Ex fructibus odorata-

doratis quæ exprimuntur, (ut è Nucifla,) semelstiservari possunt.

Destillata, diutius durant. *Insolata* quotannis fere vel biennii decursu mutari solent.

Pilula tum ob duriores compagem, tum ab aloen, quam pleræque recipiunt ad annos duos tresve pertinent, præsertim quæ opium continent.

Preparata in specie sic dicta, quia per se durioris ac minus volatilis sunt essentia, duos tresve annos integra manent.

Pulveres præstat adhibere recentes.

Rob singulis annis mutantur.

Rotula ex tempore fere fiunt.

Salia in annos aliquot durabilia sunt præsertim crystallisata.

Species aromaticæ singulis annis, vel sesquiennali periodo renovandæ sunt.

Spiritus si benè custoditi fuerint, quò minus exhalant, diu durare possunt.

Succi liquidi mutantur quotannis: Duriusculi ac inspissati diutius durant, scilicet in annos duos tres & ultra.

Syrupi simplices annuali periodo mutari volunt: Compositi ac aromatici biennali.

Tinctura in pulveribus durabiles sunt annis aliquot; tincturæ liquidæ durabiles sunt pro diversitate menstruum.

Trochisci & Collyria sicca annum durant unum. Excipe qui opium continent, seminaq; rancori obnoxia, nimium illi ad sexennium usque pertingere possunt; hi brevis sunt durationis, nec annum integri manent.

Unguenta ad annum vel sesquiennium ut plurimum servantur.

CAPUT XXVIII.

De Loco Asservationis.

Locus asservationis vel generatim consideratur vel speciatim.

Generatim consideratur locus, tum ratione domicilii, tum asservatoriorum, ubi scilicet nativa siccantur & asservantur.

Locus in genere eligendus est purus asservandoque medicamento conveniens, sublimis, siccus, pervius, septentrionem meridiemque spectans.

Vitandus e contra locus impurus, pulverulentus, subterraneus, uliginosus, insolatus, infumatus, &c. Custodiendæque sunt res ne à radiis solis urantur, neque squalore recti vel murorum madesiant. Quinimò, non abs re foret, in peculiari camera seu hypocausto, super scamnis ac asseribus, herbas rara stratificatione, blandi caloris beneficio siccare postmodumque

que vasis mundis asservare.

Speciatim consideratum locum exhibent *vasa asservatoria*, scil. ampulla, arcula, capsula, fœtile, lagena, olla, phiola, pyxis, sacculi, scatula, theca, vitra, vitra saccharina, urcei. Hæc talia adhibere oportet, qualia rerum asservatio exigit, ut integræ scil. manent, neque à vase saporem, aut qualitatem alienam contrahant.

E Mineralibus; Terra scatulis vel arculis ligneis asservari poterunt.

Salina ligneis custodiuntur vel vitreis non metallinis, reponunturque loco sicco.

Aquea vitris vel urceis vitreatis.

E Vegetabilibus: Flores siccantur in umbra reponunturque (maximè qui jucundum odorem halant) arculis ti-liaceis.

Herba siccantur in umbra, nisi quæ scapo sunt crassiore aut foliis humidioribus ac adeo proclives ad putrefactionem; nimirum hæ calore intensiore solis scil. vel similis exiccati possunt: Ubi probè siccata fuerint, includuntur sacculis lineis, vel quod melius est arculis ligneis, ut à pulvere turæ sint.

Semina asservantur loco sicco, vasisculis ligneis vel vitreatis, chartisque ut eo diutius & sine impuritate perdurent.

Fructus, scatulis, pyxidibus vel sportis continentur.

Radices asservandæ sunt in aëre sicco, ut exsiccentur: Minores, rariores,

& quarum vires solis vel ignis calore facile dissipari possunt, in umbra & vento exsiccandæ sunt, ut apii, fœnicul. &c. Crassiores igne, sole vel vento siccantur, ut Bryon. Gentian. mandrag. rheipontic.

Cortices arculis ligneis, locoque sicco asservantur.

Gummi ac resinæ siccæ, sicco loco atque ligneis vasis includuntur: liquidiores, urceis.

Ex Animalibus. Animalia horumque partes sicciore in pyxidibus ligneis reponuntur, ut ossa.

Adipes & medullas, vasis, urceis, vel figulinis vel vitreatis recondere convenit, locoque frigido ac sicco asservare.

PREPARATA.

Aceta ac aquæ stillatitiæ vitreis vasis lagenisvè, locoque temperato commodè servantur.

Balsama illa odorata pyxidibus stanneis (melius vitreis) benè occlusa servantur: liquidiora, stillatitia simili modo servanda sunt, quo oleo stillatitia & spiritus.

Cerata asservantur ut emplastra.

Condita & sim. figulina potius, quam stannea vasa expetunt.

Confectiones saccharo obductæ, ligneis arculis reconduntur, locoque moderatè calido ac sicco locantur.

Conserva, Eclegmata, Electuaria, Vasis figulinis vitreatis potius quam stanneis asservantur.

Emplastra ac *Cerata* vesica aut char-

ta quæ liquatam ceram imbibere, obvolvuntur, atque sic arculis vel pyxidibus siccis tenentur.

Extracta vasis figulinis vel vitreis amplioris orificii, ut spatula depromi possint, servantur; vel si sicciora fuerint, ut pilulæ reponuntur.

Fecula, Flores, &c. Vitris vel pro re nata servantur.

Morselli, ut confectiones custodiuntur.

Olea infusa atque expressa in vasis vitreis vel figulinis vitreatis reponuntur. *Destillata* in vitris angusti orificii.

Pilula involvuntur vesica vel charta cerata, recondunturque in thecis siccis, ligneis, vel stanneis loco siccioris.

Præparata vitris custodiuntur locoq; siccioris.

Rotula ut confectiones arculis ligneis servantur, locoque sicco.

Salia vitra postulant, locumque siccioris.

Species aromatica coriaceis sacculis probe confutis, vel in vitreis aut ligneis vasis optimè servantur.

Spiritus vitra benè obturata exigunt, adeoque angusti orificii, locumque temperatum vel frigidioris.

Succi liquidi in vitris angusti orificii asservantur, superfuso aliquantulo olei amygdalini, olivarum, ut à situ conserventur; inspissati succi cum Extractis conveniunt.

Syrupi non detinentur rectius quàm in figulinis vasis vitreatis, præsertim si qui per se acidi sunt, quos omnino in vasis figulinis vitreatis parare ac detinere oportet, quippe noxam mineralem ex metallinis vasis facile eliciunt.

Trochisci in pyxidibus ligneis commode reponuntur.

Unguenta ac Linimenta vasis figulinis, partim quoque pyxidibus stanneis conclusa tenentur.

C A P V T XXIX.

De Modo adaptandi ad asservationem.

Modus adaptandi variat, prout res integra in partes dissecta, repurgata vel secus asservari postulat, vel prout diverso situ est collocanda aliudve expetit, cujus auxilio à corruptione conservetur. V. g. *Succis* superfunditur oleum, camphora semini lini imponitur, &c.

Flores asservantur ut plurimum à caulibus ac foliis suis herbaceis segregati.

Herba seu folia si grandiora fuerint, caulibus crassioribus, seorsim à caulibus decerpta reponuntur: si caulibus sint tenuioribus, una cum iisdem asservantur nec raro una cum floribus.

Radices

Radices, alia servantur integræ, ut aristolochia, gentiana, hermodactylus, satyrium, &c. alia in taleolas dissectæ, ut bryonia, enula, iris, &c. Similiter adimitur nonnullis lignosa matrix, ut fœniculo, petroselino, &c.

Fructus E.g. Poma collocanda sunt ut pediculi deorsum, flores sursum spectent. Quinimo frumento v. g. hordei semini poma imposita diutius durant.

Carnosa animalium partes, lavantur primum pro libito, cum vino vel decocto convenienti, hinc exsiccantur in furno, siccataque foliis congruis, e.g. absinthii ne putrescant involuta asservantur. Sic *pulmones* parantur extractâ primum aspera arteria. Sic parantur & *Epata, Lienes*, &c.

Res pingues & oleosæ lavantur in aqua aliquoties donec puræ evaserint. Hinc lento igne liquantur, colantur, effundunturve super frigidam, ut sordes ad fundum secedant, vel in spumam colligantur; post reponun-

tur in locum frigidum quo servantur. Sic lavantur *axungia, seba, medulla*, &c.

N. Alii adipem solâ lotionem purgatum asservant, lotionemque malunt ex aqua frigida, scil. hac ratione adipem non modo solidioris substantia, sed & coloris candidioris manere autumant: Alii aquam balsam lotioni adhibent, dein dulcorant & ne rancescant aliquid salis pro asservatione admiscunt; Alii vino pinguedines abluunt, quò magis abstergantur.

Membranosa partes, ut intestina secundum longitudinem secantur abluuntur (vino vel decocto convenienti) in frusta dissecta exsiccantur (in clibano) ac servantur, involuta foliis convenientibus.

Sanguis repurgatur à sero, hinc exsiccatur in furno.

Fella detrahuntur à jecore præ ligatisque filo viis introitus & exitus; siccantur in suspensa.

Coagula exsiccata fumo aut sole asservantur.

CAPVT XXX.

De Vsurpatione.

VSurpatione est medicamenti administrationis ratio.

Circumstantiæ quas in usurpatione consideramus sunt: *Vires, Usus* seu modus utendi. *Formula* ac denique *Dosis* seu quantitas.

Virium ratione Medicamentum est.

Astringens contrahens, i.e. Oscula vasorum occludens. Talia sunt frigida, substantiæ crassæ, acerbæ, austera, &c. Oponitur appetentibus.

K

Ad.

Adurens, *pyroticum* quod adurit. Suntque 1. Vesicantia. 2. Escharotica. 3. Caustica.

Alexiterium, *Alexipharmacum*, i.e. Venenis resistens, cor ac Spiritus Vitales roborans, ne venenum facile admittant.

Anodynum, i.e. dolorem leniens, sive narcoticum id sit, sive paregoricum: Sæpius tamen de paregoricis dicitur.

Aperiens ἀνασomalικόν, i.e. vasa reserans. Talia sunt calida, (sed non ultra gr. 2.) substantiæ tenuis. Opp. στυνωτικοῖς adstringentibus.

Apophlegmatizans, quod excrementa è cerebro in palatum & os detrahit, sive id masticeretur, sive gargarisetur, sive palato illinatur. Talia sunt calida, acrida, vel tota substantia agentia.

Arthriticum arthriticum quod nervoso generi ac articulis familiare est.

Attenuans λεπυντικόν, i.e. crassos, viscidos, frigidos, humores incidens dissolvens. Talia sunt cal. gr. 3. substantiæ tenuis, ut mordicantia, salsa, amara, nitrosa: Opp. incrassantibus.

Attrahens ἰακτικόν, i.e. humores ac spiritus è corpore in superficiem alliciens. T. S. Calid. 2. 3. (4. *Vesicas vel ruborem inducunt*) tenuis substantiæ. His accense, quæ attrahunt tota substantiâ. Sic venenum attrahit venenum.

Bechicum quod leniendæ tussi comparatum, Specialiter tamen quod spiritum promover,

Calsaciens quod calorem excitare potest est.

Cardiacum, quod cordi familiare.

Carminativum, i.e. flatus discutiens. T. S. inprimis semina calida majora dicta.

Κατασomalικόν quod fractis ossibus solidandis convenit.

Catharticum, quod superfluum carnem cui adhibetur absument, ut acrida mordicantia.

Catharticum, i.e. purgans sive ἀνω sive κάτω id fiat, potissimum tamen de dejectoriis dicitur.

Cautericum causticum, cauterizans Escharoticum, quod non solum in cutem, sed in carnem subjectam adurendo agit.

Cephalicum, i.e. capiti familiare.

Cholagogum, quod bilem flavam purgat.

Cicatrizans ἐπιλωτικόν, cicatricem inducens. T. S. quæ non solum id quod influit sed humorem, qui in ipsa carne continetur, consumunt, ut hac ratione in cutem caro mutetur. Sunt vehementer siccantia crassæ S. adstrictoria.

κολλητικόν i.e. glutinatorium.

Condensans πυκνωτικόν, i.e. poros cutis contrahens. T. S. aquea ac frigida debilius contrahentia seu subadstringentia, subaustera, subacerba, (non adstr.) Opp. Rare facientibus.

Confortans, confortativum: quod proprietate quadam partem aliquam respicit, roborat & confortat.

Constringens, idem quod obstruens.

Corroborans, idem quod confortans.

Corrodens, corrosivum, καθαρῖσθαι quod excrecentem carnem tollit. T. S. Calida 4. gr. tenuis substantiæ, septicum, acrimordacia.

Dejectorium, id est per alvum purgans.

Densans idem quod condensans.

Detergens. Vide extergens.

Diaphoreticum est. 1. idem quod sudorificum [T. S. Eadem cum diureticis] 2. idem quod discutiens.

Discutiens, resolvens est, quod flatu discutit, hinc & humores.

Diureticum quod τὸ σῶσθαι & αὐτὸν sanguinis ad renes & vesicam deducit, ut inde ejiciatur. T. S. cal. 3. tenuium partium, incidentia.

Ἐμβόλια, i. e. scetum ac secundinas ejicientia.

Eccoproticum, i. e. alvum laxans fecesque tantummodo deturbans.

Emeticum, i. e. Vomitorium.

Ἐμμαναγορόν mentesciens.

Emolliens μαλακτικόν: quod humores concretos ac congelatos fundit. T. S. Cal. 2. nonnihil sicca & Emplastica.

Emplasticum, i. e. glutinosum quod parti cuiuspiam illitum tenaciter adhæ-

rescit ac poros implet. T. S. Sicca ac terrea circa acrimoniam.

Emphrastica, sunt Emplastica quæ poros suo lentore obstruunt & opplent. T. S. humida, tenacia; ut olea, Opp. Ecphrastico.

Ἐναιμὸν est κολλητικόν, quod cruentis vulneribus adhibetur sanguinem sistendi gratia.

Epaticum, quod Epati familiariter convenit.

Epuloticum vel *Synoloticum*, quod ulceri cicatricem inducit. Vide cicatrizans.

Erodens, idem quod corrodens.

Errhinum: quod pituitam (non è ventriculo cerebri sed) circa meningis hærentem ad nares prolicit, adeoque citra sternuationem. Talia S. Calida ac nitrosa.

Expectorans. Vide bechicum.

Extergens ἐκκαταλινόν, i. e. lentos & glutinosos humores cuti adhærescentes eluendo infarctu liberans. T. S. Siccantia tenuis substantiæ, nitrosa; amara.

Glutinosum, i. e. Emplasticum.

Glutinans, *Glutinatorium* κολλητικόν, quod agglutinat & conjungit solutas partes. T. S. quæ plus siccant quam Sarcotica, nihil detergunt, sed potius adstringunt.

Humectans, quod humidum reddit.

Hydragogum, quod serum seu aquas purget.

Hypnoticum; quod somnum conciliat, somniferum.

Hystericum; quod utero familiare est.

Incidens, idem est quod attenuans.

Incraffans παχυντικόν, i.e. tenniores & liquidiores succos reddens crassiores Talia S. frigida aut temperata citra acrimoniam crassæ & terreæ substantiæ. Oppi attenuantibus.

Indurans: σκληρωτικόν, quod quasi congelat & distendit. T.S. frigida gr. 2. 3.

Lac generans, quod sanguinem probum generat, attenuat & ad mammillas deducit.

Lac imminuens, quod lactis generationem impedit.

Laxans χαλαρικόν, i.e. materiam, quæ inflatus declinat tensionemque causat, attenuans & discutiens. T. S. modicè calfacientia, largius humectantia, substantiæ tenuioris.

Lithonripticum, quod calculum atterit & ejicit.

Maturans, πεπτικόν, εππουστικόν, id est, puris generationem juvans. T. S. Temperatè calida, humida & Emplastica.

Melanagogum, i.e. atram bilem educens.

Menses movens εμμεναγωγόν, quod stuporem infert, atque dolorem stupefaciendo lenit.

Nephriticum, quod renibus familiare est.

Nervinum, Νευρσικόν arthriticum quod nervoso generi convenit.

Obstruens, id est, oscula vasorum occludens. T. S. frigida & astringentia, substantiæ crassæ, austera, acerbata.

Ophthalmicum, quod oculis convenit.

Oticum, quod auribus familiare est.

Odontalgicum, quod dentium dolores sopit.

Paregoricum est anodynum, quod blando suo calore corporis calorem fovet, fovendoque meatus referat, laxat, emollit, discutit. T.S. temperata tenuis substantiæ.

Philtrum φίλτρον quod amorem conciliare creditur.

Phlegmagogum, i.e. pituitosum humorem purgans.

Polychrestum, quod multis viribus pollet.

Psilothrum ψιλωθρον, id est depilatorium.

Piarmicum: i.e. Sternutatorium.

Purgans: quod humores è corpore vel per os vel per anum educit.

Pus generans: Vide maturans.

Putrefaciens, Σηπτικόν, quod acrimoniâ, &c. calori nativo infensissimum, eumque vel fugat, vel ejus symmetriam destruit. Talia sunt mordicantia, acria, ut ρ.

Pulmonicum: quod pulmonibus familiare est.

Rara

Rarefaciens ἀπαλυνόν i. e. cutis me-
rus referans. T. S. calida moderatè,
sicca, substantiæ tenuis.

Refrigerans: quod frigus inducit.

Repellens, ἀπορριπτόν: i. e. quod
humores in membra irruentes, vel
nondum plane impactos repercutit.
T. S. vel frigida humida, quæ meatus
contrahunt, vel frigida sicca terrestria:
ut austera, adstringentia.

Reserans, i. e. infarctu liberans.

Resolvens, i. e. discutiens, scil. per
insensilem transpirationem, vel & in-
terdum idem quod attenuans.

Sarcoticum, i. e. carnem generans.
T. S. quæ extra morsum sordes vulne-
rum detergunt, ne consolidationem
impediant.

Semen generans, quod materiam
feminariam spiritu replet & statudiscē-
dit.

Semen imminuens: quod seminis ge-
nerationem & turgescētiā impedit.

Septicum: i. e. putrefaciens.

Siccans: quod siccitatem inducit.

Somniferum: i. e. hypnoticum.

Splenicum, sive *spleneticum*, quod lie-
ni familiariter convenit.

Sternutatorium, *ptarmicum*: quod
Sternutationem movet, ac excrementa
capitis, tum ea quæ in cerebro, tum
quoque quæ circa meninges hærent,
expellit.

Stomachicum, quod ventriculo fami-
liare est.

Stomaticum, quod ori convenit.

Stupefaciens idem quod *Narcoti-*
cum.

Vesicans, *Vesicatorium* quod vesicas
& pustulas excitat, extremam cuticu-
lam tantum attollendo, (est inter-
πυρσινά mitissimum) T. S. Canthari-
des, sinapi, fermentum, flammula, ra-
nunculus, &c.

Vomitorium: quod per os humores
educit.

Ureticum; idem quod diureticum.

Vulnerarium ὑγαιμαντικόν: quod in-
rus assumptum, vulnerum consolida-
tionem juvat.

CAPVT XXXI.

De Modo utendi.

Modus medicamenta adhibendi
duplex est *internus*. & *externus*.

Internus est, quo medicamenta per
os faucesque intra corpus assumuntur,
perficiturque potando, lingendo, masti-
cando, deglutiendo.

Externus est, quo medicamenta
corporis cavitatibus exterioribus so-
lùm immittuntur, vel *superficiēi* ex-
trinfecus applicantur. Cavitates illæ
sunt Os, Oculi, Nares, Aures, Uterus,
Penis, Anus. Applicatio superficiēte-

nus fit, *inunguendo, emplassando, cataplassando, irrigando, lavando vel impositione alicujus rei tepida fovendo, &c.*

N. *Admodum in medicamentis administrandis adhibere oportet, qui convenit ratione loci affecti, tum ratione materię adhibenda.*

Locus affectus exigit modum internum, vel externum, prout collocatus est introrsum extrorsumve, adeoque aditum medicamentis exhibet. Hinc si locus affectus plane sit internus, internum adhibendi modum exigit, sin vero & extrorsum sese extruserit, externa quoque medicamenta admittit. Similiter locus affectus externus, externis curatur, nonnunquam & internis.

CAPITI internè applicantur omnis generis medicamenta interna; *potulenta scil. Lingibilia, comestibilia ac deglutibilia: Externe i. per os: apoplegmatismi, masticatoria, suffitus: 2. Per aures: Aquę, Succı, Olea, suffitus ex aquis stillatitiis, decoctis, &c. vel ex pulveribus carboni impositis: 3. Per nares: Errhina, Ptarmica, &c. 4. Superficietenus: Inunctiones, Irrigationes, lotiones, impositiones cucupharum, fomentationesque alię, suffitus.*

N. *Quinimo qua pedibus applicantur caput maximè afficiunt, ut lotiones, cataplasmata. inunctiones planetarum pedum.*

OCULIS internè eadem quę capiti conveniunt, externe immittuntur,

Collyria, Aquę, &c. *superficietenus Inunctiones, Emplastra, Cataplasmata.*

NARIUM affectibus tam interna quàm externa medicamenta applicari possunt, quę Errhini nomine communiter veniunt.

DENTIBUS: oris collutiones, pilulę vel turundę inditę, linimenta, suffitus, pulveres, trochisci (quibus gingivę fricantur) *Superficietenus*, maxillarum inunctiones, Emplastra, Cataplasmata, fomentationes.

FAUCIBUS: Gargarismi, Fumus, Linctus, Syrupi, Trochisci sublinguales. *Extrinssecus: Inunctiones, Cataplasmata (v. g. in angina ex nido hirundinum,) adde Linimenta eximelle.*

THORAX SIVE PULMONES omnia interna admittunt, præcipue tamen Linctus, Trochiscos, Rotulas, ac Morfellas sublinguales, Electuaria, Aquas, Syrupos, Vapores item ac fumum cum aere attrahendum; *Extrinssecus: Inunctiones, Emplastra, Cataplasmata, Sacculos, Epithemata.*

CORDI omnis generis interna medicamenta adhiberi possunt, sive per pulmones ad Cor transferantur, sive per ventriculū. Præsentissimæ vero operationis sunt odoramenta, quibus spiritus vitales insigniter recreari comperimus. *Extrinssecus adhiberi solent potissimum Epithemata, Inunctiones, &c.*

Epais

Epati convenientia itidem sunt omnia interna. *Superficietenus* applicari possunt, Inunctiones, Emplastra ac Cerota, Cataplasmata, Epithemata, Sacculi.

Lieni similia adhiberi possunt, tam interna quàm externa.

Renibus præter jam dicta medicamenta & losiones infususque conveniunt, clysteresque per anum injecti. Idem judicium de Vesica.

Vero dicantur similiter omnia interna. *Extrinsècus* convenit odor tum naribus tum pudendis adhibitus, ut & Injectiones in uterum, pessici, suffitus, *Superficietenus*: Inunctio-

nes, Emplastra, Cataplasmata (quæ cautè adhibenda.) Fomenta sicca seu sacculi,

Ventriculo adhibentur omnia interna: *Superficietenus*, Inunctiones, Emplastra, Cataplasmata, Fomentationes ex pane tosto (qui vino irrigatur, calideque imponitur) sacculi.

Intestina præter jam dicta interna ac externa medicamenta admittunt quoque, quæ per anum immittuntur, ut sunt Suppositoria, Clysteres, liquoresve alii per syphonem immitendi, tum & quæ umbilico inunguntur.

CAPVT XXXII.

De Formulis medicamentorum practicis.

Formulæ medicamentorum practicæ quæ intrinsècus adhibentur sunt tum *liquidiores*; Apozemata, Emulsiones, Infusiones, Julapia, Portiones, tum *paulo crassiores*; Syrupi, Eclegmata, Electuaria, Boli, tum *solidiores*; Trochisci, Pulveres, Rotulæ, Morsuli, Pilulæ, &c.

(Extrinsècus) quæ adhibentur sunt vel *Liquida*; Aquæ, Olea, Epithemata, Clysteres: vel *Crassiores*; Liniamenta, unguenta: vel *Duriores*; Cerota, Emplastra, Cataplasmata, Sacculi.

N. Quibus formulis medicamenta adhibenda sint, edocent (1.) *Modus utendi* (2.) *materia adaptabilitas*,

quibus (3.) addi potest *Patientis natura*, quæ formulis aliis inhiat, alias avertitur.

Modis utendi singulis suæ correspondent formulæ. Internè, inserviunt usui (1.) *Potabili*: Apozemata, Aquæ, Emulsiones, Infusiones aliæque portiones, (2.) *Lingibili*: Eclegmata sive Linctus, Syrupi, Trochisci sublinguales, (3.) *Comestibili seu Masticabili*: Boli, Condita, Conservæ, Confectiones, Martius panis, Marmoladæ, Mixturæ, id est Electuaria, Rotulæ, Trageæ, &c. (4.) *Deglutibili*: Pilulæ, Pulveres.

Externè inserviunt quæ immittuntur cavitatibus.

I. Ori-

I. *Ori*: Dentifricia, Gargarismi, Linimenta, Masticatoria, Suffitus.

II. *Oculis*: Aquæ, Collyria, Unguenta, fomenta, cataplasmata,

III. *Naribus*: Errhina, Odoramenta, Suffitus, Nasalia,

IV. *Auribus*: Aquæ, Succi, Decocta, Olea, Unguenta, Suffitus.

V. *Vtero*: Clysteres, Pessi, &c.

VI. *Ano*: Clysteres, alique liquores per syringam, Suppositoria, &c.

VII. *Penis*: Clysteres, ceraceæ candela, &c.

II. *Corporis superficiem* applicantur,

1. *Inungendo*: Olea, Linimenta, Unguenta.

2. *Emplassando*: Emplastra, Cerota, Dropaces.

3. *Cataplassando*: Cataplasmata, Sinapismi, Phænigmi.

4. *Irrigando*: seu humectando: Epithemata, Embrochæ.

5. *Lavando*: Aquæ, Lixivia, Balnea, &c.

6. *Simpliciter repide imponendo & fovendo*: Sacculi (Cucuphæ) animalium partes carnosæ calentes imponitæ.

7. *Suffiando*: Suffumigia.

CAPUT XXXIII.

De Dosi medicamentorum.

Dosin medicamentorum interorum metiuntur generaliter, Vires ac Formulæ adhibendæ.

Virium ratione exhibentur.

Akerantia.

Temperatè, à ℥ij. ad ℥ij.

Gradu I. à ℥j. ad ℥j.

2. à ℥ss. ad ℥ss.

3. à gr. v. ad ℥ij.

4. à gr. iijss. ad ℥i.

Purgantia.

1. ab ℥ij. vel iij. ad vi. vel viii. ut Syr. rosar. solut. Viol. solut.

2. ab ℥iijss. ad v. ut mel. rosar. solut. mel. viol. sol.

3. ab ℥ij. ad iij. vel iv. ut

1. Gradu
Manf.

succ. rosar. & violar. (ireos nostr. manna) Syr. è flor. persicorum.

1. ab ℥ss. vel ℥v. ad ℥ss. vel ℥ij. ut Famarind. cassia. (in pulpis.)

2. Grad.
Manf.

2. ab ℥ss. ad ℥ss. ut semen carthami (in infus.)

3. à ℥ij. ad ℥vij. ut Epithym.

1. à ℥j. ad ℥ss. ut mirobalani (ad ℥. v.) polypodium.

2. a. ℥ij. ad ℥ij. ut Rhabarb. agaric. Mechoacanna, Sena.

3. a. ℥ss. ad ℥. j. ut Aloe Her-

3. Grad.
Manf.

Hermodactylus, Turbith.
Gratiola, Jalappa.

1. a. gr. X. ad ℥℥. vel ℥ij.
ut Mezerium, granum
gnidium, Asarum, Colo-
cynthis.

4. Grad. 2. a. gr. v. ad xv. ut Ela-
Manf. terium, cortex hellebor.
nigri.

3. a. gr. iij. ad x. ut Eu-
phorb. Esula. ꝑ. Scammo-
nium.

N. *Specialiorem singulorum purgan-
tium dosim querere propriis locis.*

Formularum ratione adhibentur
medicamenta dosi, quæ respondet
opportunitati adhibitionis, observa-
tis tamen, si opus sit, facultatibus ac
dosi inde dependente. V.g. quæ grata
sunt & facilis assumptionis, majori
dosi exhiberi queunt, perque vices
reiteratas assumi. Ingrata, dosi mi-
nori, & vix ultra vicem unam persua-
dentur.

Utriusque ratione est communis
dosis, qua pro vice una adultis præscri-
buntur.

Apozemata } ℥iij. ad v.
Aquæ stillatitiæ }
Boli. ℥j.

Clysteres adultis lib. i. præter pro-
pter, adhibentur: infantibus ℥ij. iij.
&c.

Condita pro libito sumuntur quan-
titate Juglandis.

Conservæ eadem quantitatē usui
veniunt.

Electuaria alterantia & confortan-
tia à ℥j. ad ℥iij. vel ℥℥.

Lenientia a. ℥j. ad ℥iij. Purgantia
ad ℥j. præter propter.

Elixiria guttulis propinantur, vel à
℥℥. ad ℥j. vel ℥℥.

Emulsionēs pro potu crebro sæpius
ordinantur.

Extracta duriuscula alterantia à ℥j.
ad ℥℥. Purgantia à ℥j. ad ℥j.

Liquores salium & simil. resolutio-
rum à gut. v. ad ℥j.

Magisteria corroborantia à ℥℥. ad
℥℥. purgantia vide sigillatim.

Morcelli ad ℥j. vel ℥ij. &c.

Olea stillatitia à gr. ij. ad gr. xv.

Pilula Laxativa, à ℥℥. ad ℥ij. Purgan-
tes à ℥ij. ad ℥iij.

Præparata, à ℥j. ad ℥j.

Pulveres & species aromat. purgan-
tes v. à ℥℥. ad ℥iij.

Salia vegetabilium à ℥j. ad ℥j.

Sapæ & Syrupi, ab ℥j. ad ℥iij.

Spiritus minerales à gr. iij. ad ℥℥.
vel si debiliores fuerint ad ℥ij. &c. Ve-
getabiles ad cochleare pro re nata.

Trochisci ad ℥iij.

N. *Doses has præter propter dedi. ad-
ulto competentes: notari tamen velim
pro diversitate ingredientium constitu-
tioneque assumentis, cunctas esse mode-
randas. Et si specialius haberi possint, his
potius fidendum.*

CAPUT XXXIV.

De Signatione in genere, ac primum de qualitatibus sensibilibus & figura.

Signatio est, quæ docet modum medicamenta cognoscendi & dignoscendi.

Signa cognitionis plurima existunt: Nos præcipua damus, tribusque illa classibus includimus; Inherentium, antecedentium, consequentium: & hæc singula in consideratione simplici, vel comparata similitudine.

In classe inherentium excellunt. 1. Qualitates sensiles. 2. Figura. 3. Ætas & Sexus, &c.

Qualitates sensiles sunt. 1. Sapor. 2. Odor. 3. Color. 4. Qualitates tactiles. 5. Sonus,

1. Sapor.

Acer, cui subijcitur aromaticus, mordax, seu septicus sive arsenicalis.

Acerbus --- adstrictorius, ponticus, fructuum immaturorum, aluminosus.

Acidus --- acidulus, ammoniacalis.

Amarus --- absynthiacus, aloeticus, felleus, gemmeus, Salinus.

Austerus --- stypticus, adstringens, vitriolatus.

Dulcis --- pinguis, saccharinus, mellens.

Salsus --- serofus, nitrosus.

Unctuosus.

N. Sunt qui inspidum addunt saporem, in quo humiditas insipida sentiatur, alii *Vineum* quoque & lacteum subjungunt. Verum uti prior proprie dictus sapor non est, ita posteriores non simplices, sed compositos sapiunt sapores. *Vineus*; austrenum, dulcem & suavem: *lacteus*; dulcem pinguem & suavem.

Odor.

Odorum distinctio minus perspicua est, à saporibus tamen, cum quibus magna ipsius affinitas est, nomina fere mutantur.

Gratus, *evodens*, fragrans, bene olens.

Molestus, *duodens*, foetens, male olens.

Gravis.

Amarus.

Acerbus.

Acidus, &c.

3. Color.

Albus, cui subijcitur candidus.

Flavus --- luteus, cereus, croceus, aureus, melleus, citrinus, fulvus, vitellinus.

Rubens --- puniceus, flammeus sanguineus.

Purpureus --- Violaceus, gilvus, brunus.

Viridis

Viridis ---- prassinus, herbaceus, æ-
ruginosus, porraceus.

Cæruleus ---- glaucus, cæsius, gry-
sæus, lividus, cineraceus, pallidus,
pullus.

Niger --- ater.

N. Color intuentus, non modo qui in
superficie extrinsecus conspicitur, sed &
qui intrinsecus delitescit sive compressio-
ne, attritione sive modo alio conspicuus
reddatur. E.g. *Hyperici* flores si digitis
confricentur, rubrum exhibent, licet lu-
tei intui tu crescant.

4. Qualitates tactiles.

Crassities, & *tenuitas* sive *subtilitas*.
Crassum est quod ægrè lævigatur, seu
quod vix in tenues partes comminui-
tur. *Tenne* quod contra.

Densitas seu *soliditas* & *raritas* seu *po-
rositas*. *Densum*, quod poris vel exi-
guis, vel nullis pervium est. *Rarum*,
quod multis. Huc *cavum*.

Durities & *mollities*: *Durum* quod
tactu resistit; *molle*, quod cedit.

Gravitas & *levitas*: *Grave*, quod in
se coactum pondere, quam mole magis
est conspicuum. *Leve*, quod laxius mo-
le quam pondere.

Lenitas seu *lubricitas* & *ariditas*. *Lu-
bricum* idem quod lentum & viscidum.
Aridum contra.

Levitas & *asperitas*. *Leve* cujus su-
perficie est æqualis, seu in quibus o-
mnia sunt æqualia (planta, æqualiter
composita.) Huc *rotundum*. *Asperum*
seu *scabrum* in quo partes inæqualem
situm habent, atque aliæ eminent,

aliæ depressæ sunt. Huc superficies
hirsuta, *pilosa*, *angulosa*, *laciniata* qua-
que, &c.

Huc pertinent & dispositiones quibus
res quæque mutabiles existunt,
adeoque.

Combustibilis; incombustibilis.
Concretilis (ut Sal) in concretilis.
Densatilis, indensatilis.
Ductilis (ut metallum,) inducti-
lis.

Exhalabilis (ut aqua, &c.) in exha-
labilis.

Fissibilis (ut venæ arteriæ, &c.) in-
fussilis.

Flammabilis (ut pinguedo) non
flammabilis.

Flexilis (ut Salix, &c.) inflexilis.

Fraxilis (ut baculus, &c.) infra-
ctilis.

Friabilis (ut pumex, &c.) infria-
bilis.

Fusibilis (ut metalla, salia, &c.) in-
fufibilis.

Humectabilis (ut spongia, &c.) in-
humectabilis.

Liquabilis (ut Salia;) illiquabilis.

Mollificabilis (ut pix, &c.) immolli-
ficabilis.

Pressatilis (ut medulla sambuci, &c.)
impressatilis.

Tractilis (ut nervus, corium, &c.)

Sonus.

Tinnitus.

Sibilus.

Sonus gravis.

L 2

Sonus

Sonus obtusus.

Figura.

Figura est quæ resultat ex conformatione & configuratione, qua res scil.

1. Bene habita, pinguis, carnosâ, succulenta, *vel e contra*, malè habita, macilenta, strigosa, gracilis, exucca.

2. Ampla, magna, extensa, *vel e contra*, &c.

CAPUT XXXV.

De Aetate seu duratione & sexu.

Res naturalis qualibet, & hinc ipsa medicamenta naturæ lege universali mutabilia sunt. Mutationis hujus causæ etsi evidentiores sunt, quæ extrinsecus accedunt, attamen præsupponitur quoque intrinsecus mutabilis cujusque natura, qua vel in melius vel in pejus mutari res destinata est, idque non modo quoad rei substantiam, sed & quoad vires. Hanc mutationem ex interna mutabilitate pululantem determinat *ætas*, quam in asservationis doctrina durationem diximus.

Ætas crescentium non incongruè quadruplex statui potest. 1. *Initians* seu infantilis. 2. *Crescens*, juvenilis, adolescens. 3. *Consistens*, virilis. 4. *Decrescens*, senilis.

N. Ab ætate initians augescunt *Crescentia* ad consistentem usque ætatem, hinc imminuuntur paulatim, descenduntque ad interitum.

Est vero ætas crescentium diversimodè mensurabilis.

Plantarum annuarum ætas initians est tempus *germinationis*, i.e. cum

germinare incipiunt. Crescens est tempus *urgescientia*, i.e. cum gemmas protrudere conantur: Consistens est tempus *florescentia*, i.e. cum flores & fructus emittunt: Decrescens est tempus *marcescentia*, i.e. quo folia marcescere incipiunt ac decidunt.

Plantarum non annuarum, animaliumve ætatis simili ratione pro cuiusque speciei longævitate mensurabiles sunt.

Duratio signum est non postremum, quo rei (asservatæ) integritas vel corruptio judicatur. V.g. Si qua ultra durationis suæ terminum asservata nonnulla fuerint, viribus languescentibus vel corruptis, æstimantur.

Sexus distinctio non in animalibus solum, sed & instirpibus conspicua est: nec nominis tantum, sed & rei: *Mares* in stirpium genere magna ex parte sunt Infructiferi; *femine* fructum edunt, ut *Pœonia mas*, *pœonia fœmina*; *Mercurialis mas*, *mercurialis fœmina*, &c. Hinc oritur & virium distinctio, &c.

CAP.

CAPUT XXXVI.

De Antecedentibus.

IN classe antecedentium celebrantur; 1. *Agens*, 2. *Objectum agibile*. 3. *Actio ipsa*, 4. *Locus*. 5. *Tempus seu aër ambiens*.

1. *Agens* (præcipuè naturale) rem motam & conversam sibi quadantenus assimilata arguit.

N. Agripp. Philof. occ. lib. 1. c. 15. *Unaqueque res movet & convertit ad suum simile & inclinatur ad seipsam, secundum totum posse suum, tam in proprietate, i.e. virtute occulta, quam in qualitate, i.e. virtute elementali. Quandoque etiam in ipsa substantia, sicut in sale videmus: nam quicquid diu steterit cum sale sit sal, omne enim agens cum agere coeperit, non ad inferius seipso movet: Sed quodammodo, quoad fieri potest ad sui par & consentaneum: quod etiam manifesto videmus in animantibus sensibilibus, in quibus cibum non in herbam vel plantam nutritiva virtus permutat, sed in carnem transmutat sensibilem. Quibus in rebus inest alicujus qualitas vel proprietatis excessus, siue insit ipsis per naturam, siue quandoque etiam per artem vel casum, ut audacia in meretrice: haec ad talem qualitatem, passionem, virtutem maxime movent & provocant. Sic ignis movet ad ignem, aqua ad aquam.*

2. *Objectum* (materia quæ agentis elaborationi subicitur) etsi naturam

suam sensim mutat, difficilimè tamen ac vix plane exiit.

N. Sic sterco equi avenâ pasti, natura avena plane non exiit. Lac fœmina post assumptum purgans, purgatricis facultatis deprehenditur; Capra lithontripticis pasta, præfertur reliquis in medicamento lithontripticis.

3. *Actio* (motus quo res constituitur) prout diversa est: ita diversam rei factæ naturam arguit. Modum siue in productione rerum spectes, siue in collectione, siue in asservatione.

N. E.g. Excrementa alvi, quia elaborationi minus fuere subjecta, quam fel, magis de natura nutrimenti participant, minus de natura ex elaboratione acquisita. Sambucus quomodo pro diverso collectionis modo diversis polleat facultatibus; supra diximus.

4. *Locus* uti diversas fortitur temperaturas, ita diversitatem in plantis operari potest: & tantam aliquando in plantarum virtutibus mutationem causatur, ut non solum hujus disciplinæ rudimentis initiati sæpenumero fallantur, sed in earum virtutibus inquirendis & medici & qui non parum philosophiæ studiis navant operam. Joh. Bapt. Port. Mag. lib. 1. c. 16. Vide & supra c. 13.

5. *Tempus* celeste variat rerum na-

tivarum proprietates non modo quoad gradus, i.e. quoad magis & minus, sed sæpenumero quoad species seu proprietates ipsas. E. g. Hypericum tempore debito collectum, fugat lumbricos, quod non facit, si secus decerptum sit. Hinc Canon. Qualis est constitutio stellarum, talis censetur & natura sublunarium subiecto-

rum. Est autem constitutio stellarum vigorosa & fortunata in fortitudinibus, debilis & infortunata in debilitatibus, ac infortuniis. Vide supra c. 23, ut & c. 12. & c.

N. Avicen. l. 2. tr. 7. c. 5. *Planta quæ sereno ac claro aëre colliguntur, sunt meliores iis, quæ colliguntur si dispositio aeris humida ac pluviosa fuerit.*

CAPUT XXXVII.

De Consequentibus.

IN consequentibus signa celebria sunt *Nomina, Testimonia, Effecta seu actiones & experientia.*

Nomina rerum indagasse non parum ad rei cognitionem juvat. Et enim, præterquam quod nomina, rerum notæ ac imagines sunt, earumque conceptus ac figuras plantarum imprimunt, ut plurimum certis de causis imposita esse constat. Sic dictus rubinus à colore rubeo, chrysolithus ab aureo. Sic lapis ostiocolus quod ossium fracturas conglutinet, nephriticus quod renum calculo succurrat. Sic dicitur fel terræ à sapore amaro, Glycyrrhiza à dulcedine; Glycypricon, i. e. amara, dulcis à sapore utroque quem refert. Sic nominatur Saxifragia quod calculum frangat: pulmonaria quod pulmonibus conveniat: tussilago quod tussis. Sic dicunt Germani Fieberkraut / febrifuga; (i. e. centaurium minus) quum febrim fuget, &c. Sic sunt linguacer-

vina, lingua avis, bursa pastoris, palma christi, &c. à similitudine quam cum rebus obtinent.

N. Præ reliquis linguis prævalet lingua hebraica, nimirum primus parens, quia integram rerum cognitionem possedit, imposuit nomina, rebus convenientiora, naturamque rei exprimentia, &c.

Testimonia sunt autoritates, quæ rem ore vel scriptis attestantur. Merentur hæc fidem prout à persona fide digna proveniunt.

Effecta seu actiones. Nimirum actiones rem talis naturæ esse arguunt, qualis illæ deprehenduntur, atque aded secundum eandem illam naturam res conjecturantur activæ. Vide cap. 40. n. 4.

N. *Actiones* vocantur nascendi, florendi, generandi, crescendi, prolificandi, fructificandi, concoquendi, pariendique modus & quo amore se prosequantur, horreant, & se invicem alliciant.

Experientia fontium reliquorum

acerbus est frigidus, siccus, & terrestris: *acidus* est humectior quam frigidior, fitque ubi cum austero plus humidi miscetur: *amarus* fit, cum calor plus, quam par sit, increbuit, ariditate & caliditate præstans, siccitate scil. terrestris: *austerus* fit, si *acerbus* paulum remittatur, estque plus frigidus quam humidus: *dulcis* exoritur ex temperata humiditate & caliditate; *salsus*, si calor invalescit, ob id calefacit, abrodit, abstergitque: *unctuosus* seu pinguis, minus quam *dulcis* caliditate præstat, atque aërem participare videtur: *insipidus* seu *aquens* frigida ac humida statuitur temperatura. Bapt. Port. in Phytogn.

N. Duo quæ hic moneam habeo. 1. est, quod ut plurimum mixti occurrant saporibus, in quibus lingua facile decipi adeoque iudicium errare potest. 2. est quod saporibus potius qualitatibus salinarum, quam elementalium primarum sint indices. V. g. Sapor amarus est natura salis gemma vel nitri, adeoque pollet facultate tergente, purgante, lumbricos fugante. *Acerbus* natura est aluminis & stipatur virtute astringente. *Acidus* essentia est salis ammoniaci, adeoque celebratur facultate incidente, æstum extinguente, dissolvente, coagulante, (nimirum teste Quercetano dissolvit corpora, coagulat spiritus.) *Austerus* naturam sapit vitrioli, ea propter qualitatibus est adstrictoria, stiptica, fermentativa. *Salsus* nature est salsi aperientis incidentis, abstergentis,

1. *Ex odore*: Odor saporis rationem sequitur, magnaque est odoris & saporis cognitio. Hinc odor gratus bene olens ut plurimum caliditatis est indicium; *sædens*, frigiditatis ac humiditatis excrementitiæ. *Mordax*, *amarus*, caliditatis: *acerbus*, *acidus*, &c. frigiditatis. *Inolida* sunt fere quæ humida,

N. Avicenn. lib. 2. Canon. cap. 3. Odor, inquit, qui sentiuntur, si mordacitas aut declinant ad latus dulcedinis, omnes illi calidi: si accedat munda, lenta & omnes illi frigiditatem (perhibent) & bene olentia plurimum calida, &c.

3. *Ex colore*: Color albus & pallidus, humiditatis temperamenti indicium, omnibusque in rebus color albus imbecillitatem notare solet. *Flavus*, ex calore oritur. Flores, qui luculento colore nitent, ex cibo pingui & humido proveniunt. Bapt. Port. in phytogn. *Rubens*, *croceus*, &c. immodicæ siccitatis & caliditatis argumentum. *Viridis* seu *porracei* coloris folia ex humiditate multa proveniunt.

N. Bapt. Port. in Phytogn. lib. 2. cap. 36. Flores recentem nati ob nativum humorem coloratiores sunt, ætate proveliti vero pallidiores, decolorati & deformes: nam sicciores ætate fiunt. Sic Avicenn. lib. 2. can. cap. 3. Color albus in corporibus congelatis, quæ in se (habent) humiditatem, non est nisi ad substantiam frigidam, & in corporibus quæ in se (habent) siccitatem & divulsio non est nisi ad substantiam calidam & niger in utrisque

trisque per contrarietatem. Etenim frigus albificat humidum & denigrat siccum & calor denigrat humidum & album reddit siccum. Item; sunt quidam colores (tendentes) ad albedinem, & quidam eorum ad tincturam rubram & nigram. Etenim tendens ad albedinem, si est in natura in specie frigidorum, est frigidior & tendens ad alias (rubedinem & nigredinem) minus frigidus. Et si est natura ad calidum (vergens) & res è converso (se habet.)

Ex tribus hisce præcedentibus primas tenet sapor, hinc odor, postea, color. Avicenn.

4. Ex qualitatibus tactilibus. *Crassities* signum est. 1. abundantium partium terrestrium. 2. humidarum videlicet frigore congelatarum. *Tenuitas* partium ignearum vel ærearum. *Densum* vel est exiccatum, vel frigore congelatum concretumve. *Rarum* siccitatis comes. *Durities* ex sicco est & terrestri (nisi humorum repletio & inde tensio adsit.) *Mollities* humiditatem participat. *Gravitas* comes est densitatis, *Levitas*, raritatis. *Lenitas* ex humiditate est; *Ariditas* ex siccitate. *Levitas* ex humiditate ærea vel aquea est; *Asperitas* ex siccitate.

5. Ex dispositione seu mutabilitate, ejusque recipiendi modo facili vel difficili: E.g. Quæ res recipit velocius calefactionem, calida censetur, quæ frige factionem, frigida. Similiter quæ velocioris est congelationis,

illa frigidior est, & quæ velocioris inflammationis, ea est calidior, &c.

6. *Ab Etate*: Iuniora humidiora fere sunt, vetusta, sicciora. Item crescentia dum immatura adhuc, austeritatem acerbiteratemque ferè sapiunt & inde frigiditatem.

7. *A loconatali*, *Lacustres* plantæ temperamenti ferè sunt humidi & frigidi, quod & animalia dulci aqua degentia imitantur. *Palustres* sunt ferè frigida ac sicciuscula (ob aquam & terrestrem essentiam.) *Fluviales* sunt sicca & insigniter calida, ut quoque linguam nonnullæ exulcerent. *Marina* sunt frigida & sicca (frigida ob aquam, sicca propter sal.) *Pinguis humi* accolæ sunt calida & humida, vel humiditate & siccitate temperata. *Iejuni soli* planta calida & sicca existit. *Mediocris terra* convictrix, tepida est & naturæ nostræ familiaris. *Ærenosi soli* planta est calida & sicca, tenuium partium. *Ancipitis vitæ* plantæ temperamenti sunt misti: Similiter & animalia ancipitis vitæ, mixti temperamenti sunt, & ut plurimum humidiora & excrementitia. *Planta amphibie*, in locis asperginosis enata, sunt frigida & sicca. *Litorales* marinæ plantæ, salis naturam sapiunt, sunt ergo calida & sicca. *Monticola* plantæ, ex agri exilitate sicci nascuntur temperamenti & ex solis apricitate, calidi; sunt insuper partium tenuium. *Campestres*

pestres mediocriter calidæ sunt & sicce. Plantæ in *cavis locis* nascentes frigidæ sunt & humidæ (ob solis absentiam & soli fuliginem.) In *collibus* nascentes temperatæ sunt. *Sylvestres* domesticis sunt sicciores & frigidiore (sunt ejusdem speciei.) *Domesticæ* sunt mitiores & debiliores.

N. Dioscorid. in præfat. l. 1. ad Areum: Magni refert, si ea loca, in quibus herba prodeunt, clivosa & ventis exposita sint & persflata, frigidaque & aquis carentia, cum his in locis vires earum longe validiores intelligantur, cum ea contra, quæ in campestribus, riguis & opacis, ceterisque locis à vento silentibus enascuntur, plerumque degenerent & minus viribus valeant. Sic & Avicenna l. 2. tr. 1. c. 5. Illa (planta) quarum collectionis loca sunt ventosa, vel quæ sunt aëri & vento exposita & sunt versus orientem soli exposita, sunt fortiores aliis.

Ad eundem sensum ait & Quercetan. l. 1. defens. Herm. c. 8. Videre est simplicia vehementis Evacuationis, in montibus potius & saxosis locis, aut inter rupes ubi nativa sedes est metallicorum spirituum, quam in pingui, & fertili loco luxuriare. Quæ ut mitiora & correctiora reddantur ac sylvestrem illam suam naturam exuant, in dome-

sticos hortos traducendæ sunt & transplantandæ.

8. *Ab operationibus.* Sic calidum censetur, quod subtile reddit, resolvit, abstergit, aperit, mollit, maturat, concoquit, discutit, incidit, attrahit, mordicat, rubefacit, adurit: &c. *Frigidum* quod repellit, incrassat, crudum facit: &c. *Siccum*, quod constringit, exprimit: *Humidum*, quod infla, abluit, lubricat, lævigat: &c. Avicenn. l. 2. can.

N. Facultates hæ pleraque rectius salibus acceptæ feruntur.

9. Hisce *Experientiam* superaddere necessum est, quæ solæ, reliqua fere omnia, certitudine vincit. Observatis tamen conditionibus, ad experientię certitudinem requisitis. De quibus supra c. 37.

Qualitates secunda cognoscuntur.

Edatis qualitatibus primis: Nimirum his cognitis non possunt non innotescere & qualitates secundæ, utpote quæ primarum proximè pedissequæ sunt. E. g. calidum reddit subtile, abstergit, aperit, maturat, concoquit, discutit, incidit, &c. Non parvi autem hic momenti est, sapores examinare, atque secundum eos, uti supra diximus, qualitates secundas, determinari.

CAPVT XL.

De Investigatione qualitatū occultarum.

Facultates occultiores ex similitudine imprimis coniecturantur, hinc experientia confirmantur.

N. De facultatū occultiorū investigatione qui prolixius erudiri satagat, consulat Phytognomonicam Joh. Baptista Porta. Signaturas Grollij basilicae suae annexas: Quercetani signaturas in libro de prisca medicina collectas. Nolumus in physicis. Nos compendii studio, quam brevissimis eam regulis includimus, Et sunt.

1. Plantæ, quæ repræsentant partem aliquam hominis, habentur eidem salubres (puta nisi subsit venenata qualitas.) Sic capiti conveniunt capitata: Juglans, nux indica &c. Idem sentiendum de animalibus eorumque partibus. Sic confert Lien, lieni; Epar, epari, &c.

2. Plantæ quæ colore suo, &c. repræsentant humorem (in homine) eidem convenire coniecturantur, adaugendo si in alimentum venerint, expurgando vel corrigendo, sin in medicamenta. V.g. Bilem flavam generant, quæ in alimenta veniunt croci flavique coloris: crocus, beta, ficus, mel, &c. Vide supra c. 38.

3. Quæ repræsentare videntur morbum, morbosumve habitum, ad

curationem ejusdem facere statuuntur; Sic profunt in calculo, ea quæ repræsentant lapides. E. g. milium solis, testæ ovorum, &c. Sic abolent maculas herbæ & animalia maculosa: squamas, squamosa. Sic sanant, perforationes corporis, i. e. vulnera herbæ scilicet perforatæ: Sic plantæ quæ gummi & resinas resudant, ad gummi & pus valent. Plantæ & animalia tumentia, tumetibus partibus profunt. Plantæ & animalia quæ caudicis fissiōnem & vulnera patiuntur, ad glutinanda vulnera faciunt: Quæ corticem cutemve facile abijciunt, ad mundandam cutem. Vide Joh. Bapt. Porta. Phytogn. l. 5. & supra c. 38.

4. Plantæ & animalia qualiter in actionibus & moribus deprehenduntur taliter & in homine statuuntur operari.

N. Nimirum uti diximus c. 36. Vnaqueque res movet & convertit ad suum simile. Stigitur volumus operari ad aliquam proprietatem vel virtutem, quaramus animalia vel res alias, quibus talis proprietas vel actio excellentius inest. Quid autem per actiones intelligatur, diximus cap. 37.

Sic res steriles creditur reddere homines steriles. V.g. Lactuca, filix, salix, fabi-

fabina, &c. Ut & animalia sterilia, mulus, &c. Sic res Salaces & fecunda fecunditatem inferre censentur & advennerem facere. Eg. Passer; stincus, &c. Plantæ multifera, animaliaque multipara facere ad conceptum statuuntur, &c. Plantæ longævæ perpetuoque videntes, vigorem homini conciliare dicuntur. Herba & animalia voracia, concoquendi facultatem hominibus præstare. V. g. lucii, lupi. Animalia quæ ingenio & docilitate valent ad hominum intelligentiam & memoriam valere. E contra quæ indocilia, ruditatem conciliare. Animalia tristia, tristes efficere; somniculosa, somniculosos; Vigilantia vigiles; ferocia, feroces; iracunda, iracundos, &c. Bapt. Phytogn. l. 6. & 7.

§. Plantæ quæ inter se vel cum parte aliqua animalis quoad signaturam conveniunt, & viribus convenire statuuntur.

N. Configuratio i. e. similitudo signaturæ quæ in uno & alteroprehenditur, seu effectus similis præsupponit similitudinem utriusque interni agentis, idque tanto evidentius, quanto signaturæ illa fuerit ætior. Sic conjecturantur alexipharmaca quæ C. Cervi mentiuntur, serpentesve representant, &c. idque ex hoc fundamento; quod id quod C. Cervini figuram gerit, à simili principio interno sit productum, à quo idem illud Cornu. Similitudo igitur principii conjecturare facie similitudinem virium.

Et tantum de Isagoge, &c.



PHAR.



PHARMACOPOEIE
MEDICO-CHYMICÆ,
LIBER II.

DE OFFICINA.

CAPUT I.

De definitione & distributione Officinae.



OFFICINA est pars pharmacologiæ, quæ seriem rerum medicinalium secundum classes officinales describit.

N. Subjungimus classibus præparatorum composita quæque famosiora ac celebriora, utpote quæ non modo non patiuntur ad speciales libros referri, sed & visa sunt regularum illustrationi inservire.

Classes officinales voco, quæ officinis sunt usuales, sive extemporaneo usui ex destinantur, sive asservationi usuique futuro. Suntque classes hæc tum Nativorum, tum Præparatorum.

Nativa sunt triplicis sortis: vel e-

nim sunt naturæ macrocosmicæ, vel vegetabilis, vel animalis.

Ex regno *macrocosmico* sunt mineralia vulgo dicta: Terræ, Aquæ, Lapidēs, Metallica seu mercurialia, salia, & sulphura.

Ex familia *Vegetabilium* sunt: 1. Aromata, Cortices, Flores, Folia seu herbæ, Fructus, Fungi, Ligna & Visca, Radices, Semina; 2. Succī, Olea, Resinæ; Gummi-resinæ, Gummi.

Ex *animalium* profapia sunt: 1. Animalia integra; Partes carnosæ, membranosæ, Cornua, Ossā, crustacea seu testacea, Lapilli, Lac, Fella, Medullæ, Pinguedines seu axungia, Sanguis, Seva, Stercora, Urina, Ungues & Ungu-
læ, Coagula.

Et hæc singula generatim hoc libro descri-

CAPVT I. II. & III.

97

bro describuntur, subiectâ serie suorum præparatorum.

Præparata sunt: Aceta, Aquæ, Balsami, Boli, Calces, Cataplasmata, Clysteres, Condita, Confectiones, Conservæ, Decocta, Electuaria, Elixiria, Emplastra (Cerota) Emulsionnes, Erthina, Epithemata, Extracta, Farinæ, Feculæ, Flores, Gargarismi,

(collutiones) Galatinæ, Infusiones, Julepi, Lapides, Liquores (per deliq. Magisteria, Masticatoria, Morfelli, (Rotulæ) Moreti, Olea, Potiones, Pilulæ, Poma ambræ, Præparata, Pulveres (Trageæ) Species, Salia, Spiritus, Succî, Syrupi, Tincturæ, Trochisci, Unguenta (Balsami Unguentarii, Lini-
menta.)

CAPVT II.

De Terris.

TERRÆ Officinales sunt solùm, quas experientia medicinalibus viribus imprægnatas edocuit. Tales sunt terræ minerales dictæ.

Terra Armena, bolus armena, vera seu orientalis.

Bolus vulgaris, Bohemica, Brundusiaca, &c.

Terra Lemnia. T. sigillata Turcica.

T. Silesiaca, T. sigillata Silesiaca Lignicensis, Strigenfis.

Creta, Kreid.

Gypsum, Gyps.

Marga, Mergell.

Lithomarga, medulla saxorum, Steinmarc.

Ochra, Ochergeel.

Rubrica fabrilis, Röthe/Rötelstein.

Tripolis, Terra tripolitana.

Vites: De Viribus terrarum, qui generali penicillo depingi nequeunt. l. 3. sigillatim agemus.

Præparata communiora sunt, 1. Præparata in specie sic dicta. 2. Destillata, aquæ, spiritus. &c. Vide partim infra in cessibus præparatorum, partim lib. 3.

CAPVT III.

De Aquis.

AQUAS officinales tum nativas esse, tum artificiales seu præparatas, libro superiore diximus.

In classe nativarum sunt:

Aqua fontana, Springwasser.
putealis, Brunnenwasser.

fluvialis, fließend Wasser.

Glaciei Martiæ, Merkensteinswasser.

Lacustris, stehend Wasser.

Pluvia, niva, Regen und Schnee-
Wasser.

Tonitrualis, Donnerregentwasser.

N

Ros

Ros majalis, *Neuenthaw.*

His adungi possent aquæ minerales, quales sunt acidulæ ac thermæ, verum quia officinis peregrinæ sunt, eas hic loci prætermitto.

• *N. Unicum quod hic moneam est, quoties aqua simpliciter mentio fit, fontanam intelligi, eamque puram, limpidam,*

levem. Levitas enim uti spirituum copiosiorum nota est. E. g. in Vino, cerevisia, &c. ita & in aqua bonitatis indicium non ultimum existit.

Preparata usitatoria ex aquis præter pluviam destillatam rarissima sunt, nisi scilicet decocta, &c. quæ aquæ ope fiunt, huc referre velis,

CAPUT IV.

De Lapidibus.

Lapidis vox tum internativa locum obtinuit, tum inter præparata. In nativorum numero sunt. 1. Minerales lapides, de quibus hic. 2. crustacei lapides, quales in capitibus quorundam piscium; de quibus in animalibus. 3. cortices lapidei nucum. 4. acini duriusculi &c.

Lapides minerales officinales sunt.

1. *Lapides pretiosi seu Gemmæ,*
Amethystus, *Amethyst.*
Carneolus, *Sarda, Sardonier.*
Chrysolithus, *Chrysolith.*
Granatus, *Granat.*
Hyacinthus, *Hyacinth.*
Rubinus Orientalis, *Rubin.*
Smaragdus, *Smaragd.*
Huc Margaritæ, *Perlen.*
Corallia, *Corallen.*
Lapis Bezoar Orientalis & Occidentalis, *Orientalisch und Occidentalisch Bezoarstein.*

Ex his quinque *κατ' ἔξοχην* pretiosi dicuntur.

Granatus, Hyacinthus, Sapphirus, *Saphir.*
Sarda, *Smaragdus.*

2. *Lapides minus pretiosi.*

Lapis, *Ætites, Aquilæ, Adlerstein.*
Alabastrum, *alabastrites, Alabaſter.*
Amiantus, *alumen plumosum, Fe-*
derweiß.

L. Armenus, *Armenierstein.*
L. Calaminaris, *Galmeystein.*
Crystallus, *Chrystall.*
Hæmatites, *Blutstein.*
L. Judaicus, *Judenstein.*
L. Lazuli, *Cyanus, Lasurstein.*
L. Lyncis, *Lyncurius, Luchsstein/*
Donnerkeil.

Magnes, *Magnetstein.*
Marmor, *Marmelstein.*
L. Nephriticus, *Griechstein.*
Osteocollus, *Wellstein/Steinbein-*
welle/Beinbruch.

Pumex, *Bimsstein.*
L. Scissilis, *Schiefferstein.*

I. Ser-

I. Serpentinus, Ophires, Serpens *exiccatoria sunt.*

finstein.

Silex, Rieselstein.

Smiris, Smirgell.

L. Specularis, Selenites, Aphroselinus, Fräveneiß.

Spongites, Spongię lapis, Schwammstein.

Talcum, Talsch.

Huc calculus humanus.

Vires. Lapidiosa omnia teste Galeno

l. 9. simpl. desiccatoria vi pollent, cum

Preparationes pro diversa natura lapidum diversa quoque sunt. Unde & diversa preparata. Videlicet 1. Preparata in specie sic dicta. 2. Sal (improprię sic dictum.) 3. Magisterium. 4. Liquor seu oleum. 5. Elyxir, 6. Essentię. 7. Flores. 8. Syrupi. 9. Ingrediuntur quoque alias medicamentorum compositorum formulas. De quibus Olenius lib. 3. ut & infra in preparatis.

CAPUT V.

De Metallis, & quæ eis affinia sunt.

Aurum foliatum finum, geschlagen
fein Gold / Blattgold.

Duplicatum, halb geschlagen Gold.

Vilius, mistum, bicolor, Zwischgold.

N. Est aurum alcoholisatum adscribendum, Muschelgold.

Argentum foliatum finum, Blatt-
silber / geschlagen Silber.

duplicatum, halb geschlagen Silber.

Æs, Cuprum, Kupffer.

æris squamæ crassiores, Kupffer-
hammerschlag.

æris flos, Viride æris, Spangrün.

Ferrum, Eisen.

Ferribaturæ, squamæ, Hammer-
schlag.

Limaturæ, Feilsch.

Scoriæ, Schlacken.

Plumbum, Bley.

ustum, calcinatum, gebrand Bley.

Stannum, Zinn.

Metallorum preparationes. Vide
fis lib. 3.

Metallis affinia sunt.

Mercurius, Quecksilber.

Cinnabaris, Zinnober.

Antimonium, Spießglas.

Huc. Excrementa à Metallis
segregata.

Bismuthum, Wismuth.

Cadmia nativa metallica, Cobal-
tum, Muckenpulffer.

C. Factitia.

Lithargyros Auri, Goldglett.

Argenti, Silberglett.

Pompholyx, Nihili album, Tutia,
Augennicht.

Preparata singulorum dabuntur,
lib. 3.

N 2 CAP.

CAPUT VI.

De Salibus.

S Alia in Officinis nativa sunt & præparata seu artificialis.

Nativa sunt:

Alumen rupeum, Roche, Alaun.
Saccharium, N. præparatum est.
Scissile, Spaltalaun.
Salammoniacum, Salmiay.
comune, gemein Saltz/ Speiß
Saltz.

Gemmeum, Steinsalz.
Nitri, Sal petra, Salpeter.
Vitriolum album, Galikenstein/
Augstein/Weißvitriol.
Cæruleum, cypreum, Cyprisch Vi-
triol.
Viride, Gemein Vitriol.

CAPUT VII.

De Sulphureis

S Ulphur Caballinum, Casschwefel.
Citrinum, gelber Schwefel.
Vivum, lebendiger Schwefel.
Ambra, Ambra, Grisea, Umber/
rechter Umbar.

Bitumina.

Asphaltos, Bitumen Judaicum, Ju-
denpech/ Brittenpech.
Carbo petra, Steinkohlen.
Gagates.

Naphtha.
Petroleum, Steinöhl.
Sperma ceti, Wollraht.
Succinum, Carabe. 1. Candidum.
Agstein/Bornstein/Weiß.
2. Citrinum, gelber Bornstein.
De singulis his agatur plenius lib. 3.
N. Crustacea, E.g. concha, &c. in ani-
malibus describentur.

CAPUT VIII.

De Aromatibus.

I Nter vegetabilia primum locum
merito sibi vendicant aromata,
quippe quæ, uti reliquis communiora
sunt, ita & in præscriptionibus (re-
ceptis ut vocant) simpliciter præscribun-
tur, non facta mentione aliquâ sive ex
radicum numero illa sint, sive ex fru-
ctuum, florum, corticumve. Talia sunt.

Antophylli, Mutternägeln.
Calamus aromaticus, Calmus/
Wurkrohr.
Cardamomum majus, groß Cardo-
mōntein.
Minus, Klein Cardomōntein.
Caryophylli, Nägelein.

Cassia

Cassia lignea, Mutterzinnmet.

Cinnamomum, Canella, Zimmet/

Canell.

Costus Arabicus Verus, Cinamo-
mum album, weiß Zimmet.

Crocus Orientalis, Orientalisch
Safran.

2. Austriacus, f. Ungaricus, Dester-
reichischer oder Ungarischer Safran.

Cubebæ, Cubeben.

Folium Indum, Malabathrum, In-
dischblat.

Galgana major, grosser Galgan.

Minor, Galgan.

Grana paradisi, Cardamomum Ara-
bum, Paradiskörner.

Macis, Muscatbluet.

Nuces moschata, myristica, Nuci-
sta, Muscatnüsse.

Piper album, Weißpfeffer.

longum, langer Pfeffer.

nigrum, schwarzer Pfeffer.

Schænanthum, Camelsbzw.

Spica, Celtica, Romana, saluunca,

Celtisch Spieß.

Zedoaria, Zittwan.

Zingiber finum album belletinum,
Belladin Ingwer/guter weißer Thron
Ingwer.

--- debali velrubei, geel oder ro-
ther Ingwer.

Vires: Aromata in genere sunt ca-
lida & evidenter siccapartiumtenuum,
hinc incidunt, attenuant, aperiunt, &c.
Vide in singulis plenius.

Preparata ex aromatibus fieri pos-
sunt formularum variarum. Aptas
sunt subire infusionem, decoctio-
nem, confectioem, pulverisationem,
adeoque immisceri possunt Electuari-
is, Trochiscis, &c. Potiora tamen &
minus vulgaria quæ inde conficiuntur,
sunt: Extracta: Aquæ, Olea, Salia, Ma-
gisteria.

N. Vis aromatum quia in parte vola-
tili potissimum consistit, præstat inde con-
ficere preparata volatilioris natura, ut
sunt destillata, &c.

CAPUT IX.

De Corticibus.

1. Cortices Officinis usitatiores sunt.

Fructibus: cort. Aurantiorum, Po-
merankenschalen oder Rinde.

Castanearum, Castanienschölsfen.

Citri, Citronenschalen.

Glandium, Cupulæ glandium, Ei-
chen Hütlein.

Granatorum Malicorium, Granat-
Apffel-Rinde.

Juglandis viridis, grüne Nusschalen.

Limonum, Limonien-Rinde.

2. Ex arboribus & radicibus.

Cort. Acaciæ, pruni sylvestris,
Schleedorn-Rinde.

Radic. Cappar. Capparrinde.

Frangulæ, alni nigræ, Faulbaum-
Rinden.

Fraxini (interiores,) Eschern-Rinde.

Guajaci, die Rinde vom Frankosen
Baum.

Rad. Mandragoræ.

Quercus, Eichene Rinde.

Sambuci, ex frutice ac radice (medici,) mittlere Holderrinde.

Tamarisci, Tamar-Rinde.

Thuris.

Tiliæ (interiores, die Rinde vom

Lindenbaum.

Præparata: : Ut cortices substantia differunt, alii nimirum conveniunt cum fructibus, alii cum herbis, quidam cum lignis: ita & diversis interviunt præparatis. *Communiora tamen sunt,* conditi cortices (fructuum quorundam) item Extracta, &c.

CAPUT X.

De Floribus.

Flores Officinales sunt.

Flores Acaciæ, pruni sylvestris,
Schlehdornblüt.

Amarantipurpurei, Floramor.

Anethi, i. e. coma seu Umbellæ,

Dillenblüt.

Anthos, seu Rotismarini, Rosma-
rienblüt.

Aquilegiæ, Agleiblüt.

Basilici, Basilienblumen.

Betonicæ, Betonick.

Borraginis, Borragenbl.

Buglossæ Schenzungbl.

Calcatrippæ, seu consolidæ regalis,

Mittersporenbl.

Calendulæ, Calthæ, Ringelbl.

Caprifolii, Periclymeni, Speckli-

lien.

Cartami, Cnici, Flor/ Waldsaff-

ran.

Centaurii minoris, Tausendgül-

denbl.

Ceraforum, Kirschenbl.

Chamæmeli seu camomillæ vulga-

ri, Camillenbl.

Romanæ, Römisch Camillenbl.

Cheiri, gelbe Violett.

Cichorei, Wegweißbl.

Cyani s. Bapti seculæ, blau Korn-
blumen.

Fabarum, Bohnenbl.

Geniste, Ginstern- Psorallenbl.

Flor. Granatorum, Balaustia, Gra-
natenbl.

Hepaticæ, albæ, nobilis, Leberkraut-
blüt.

Hyperici, Johannisblüt.

Juglandis, Nußbl. Juli Juglandis.

Lavendulæ, Lavendelbl.

Ligustri, Hartriegel.

Liliorum alborum, weiß Lilienbl.

Antheræ liliorum alborum.

Liliorum convallium, Mayenbl.

Malvæ hortensis, Winter-Rosen.

Meliloti, Steinfleeb.

Nymphææ albæ, weiße Seeb.

Luteæ gelbe Seeb.

Pœoniæ, Pœonienbl.

Papa-

Papaveris erratici, Rhæadis, *Alap-
perrosen.*

hortensis, *Magsamenbl.*

Perfici, *Persigbl.*

Populi, i.e. gemmæ seu oculi, *Pap-
pelsnospen.*

Primulæ veris, paralyfis.

Rosarum albarum seu potius palli-
darum, *weiß Rosen.*

Damascenarum.

Rubearum.

Salviæ, *Salbeyblüt.*

Sambuci, *Hölderbl.*

Saxifragiæ albæ, *Steinbrechbl.*

Scabiolæ, *Alpostembl.*

Schœnanthi, *Camelheut/ze.*

Siliginis, *Kornblüt.*

Spicænardi, *Spicanardi.*

Stœchados arabicæ, *Stechasbl.*

Stœchad. citrin. *Reinblumen.*

Tanacet. *Reinfarnbl.*

Tiliæ, *Lindenblüt.*

Tunicæ, *Grasnäglein.*

Tussilaginis, *Hustlattiichblüt.*

Verbasci, *Bulfrautbl.*

Violarum martiarum, *Violen.*

Ex his famosiores sunt. 4. qui pe-
culiari nomine cordiales dicuntur,
Bostraginis, buglossæ, rosarum, viola-
rum.

Preparata ferè omnis generis ex
floribus compilari queunt, Decocta,
Destillata, Electuaria, Infusiones, Un-
guenta, Emplastra, &c. minus vulga-
ria tamen sunt: Succus inspissati, Extra-
cta, Tincturæ, Essentiæ seu spiritus ac
olea, &c.

N. Flores qui constant ex parte vola-
tili, vix quicquam, vel parum salis exhi-
bebunt, aptioresque sunt ad medicamen-
ta, quæ sine diutina exhalatione parata
prostant.

Vires: Vires florum etsi in genere de-
scribi nequeant, cum pro diversitate her-
barum varient: attamen hoc loco notare
expedit, recentes esse humidiores, adeo-
que fere vi lenitiva seu laxativa pollere,
quæ marcescentibus cum tempore adimi-
tur.

CAPUT XI.

De Foliis seu Herbis.

Foliorum & herbarum nomina in
praxi seu receptis sæpissimè con-
funduntur, notantque folia à caulibus
separata. Hæc si minutiora fuerint,
summitates dici solent.

Herba usitiores in Officinis sunt:

Abrotanum mas, *Stabwurk.*

N. *Famina cyparissus est.*

Absynthium ponticum, *Römisch
Wermuth.*

Vulgare s. rusticum, *gemein Wer-
muth.*

Acetosa, *Satbrampff.*

Acetosella, *Alleluja, Buchampffer/*

Hasenlee.

Agrimonia, *Odermenig.*

Alchi-

Achimilla, Sinnenw.
 Alkekingi, Halicacabus, Juden-
 Firschen-Bletter.
 Alsine, Morlus gallinæ, Hünen-
 Darm.
 Althea, Bismalva, Ibisus, Sibisch-
 Kraut.
 Anagallis, Gauchheil.
 Anethum, Dill.
 Antirrhinum, Hundskopff/Dorant.
 Aristolochia longa, lange Osterlucen.
 Arnica, Mutterwurk.
 Artemisia, Beyfuß.
 Asarum, Haselwurkkräut.
 Auricula muris. Pilosella, Maus-
 öhrlein.
 Balsamita hirsutium aquaticum,
 Bachmünke.
 Basilicum, Basilien.
 Becabunga, Bachbungen.
 Betonica, Betonien.
 Borrago, Borretsch.
 Branca ursina, Beerenslaw.
 Buglossum, Ochsenzunge.
 Bursa pastoris, Zeschelkraut.
 Calamintha, Kornmünke.
 montana, Bergmünke.
 Capillus Veneris, adianthum ni-
 grum, Frauenhaar.
 Caprifolium, periclymenum, Welt-
 winde/Specksilien.
 Cardiaca, Herzgespann.
 Carduus benedictus, Cardobene-
 dickkraut.
 C. Mariae, Mariendistel.
 Cerefolium, Körbelkraut.
 Cetarch, Asplenium, Milgkraut.

Chamædrys, Ivamoschata, Saman-
 derkraut.
 Chamæpitys, Iva arthetica, Nidrig-
 pin.
 Chamæmelum Romanum, Camo-
 milla, Römisch Camillen.
 C. Vulgare, gemeine Camillen.
 Chelidonium majus, Schöllkraut.
 Ch. minus, Schorbockskraut.
 Chichorium, Wegwart.
 Cicuta, Wüterich.
 Cochlearia, Rösselkraut.
 Consolida regalis, Rittersporn.
 Cuscuta, Casturha, Flachsseyde.
 Cynoglossum, Hundszung.
 Cyparissus hortulana, Gartenzy-
 press.
 Dictamnus creticus, Cretischer
 Dictam.
 Dictamnus alb. Fraxinella, weißer
 Dictam.
 Ebulus, Altsich.
 Endivia sativa, Endivien.
 Sylvestris, Sonchus, Sautdistel.
 Epithymus, Thymfelde.
 Equisetum, cauda equina, Ross-
 schwanz/Schaffenhew.
 Eupatorium Arabum, Ageratum,
 Leberkraut.
 Euphrasia, Augentrost.
 Farfara, Tussilago, Huflattich.
 Foeniculum, Fenchelkraut.
 Filipendula, Saxifraga rubra, roth
 Steinbrech.
 Fragaria, Erdbeerkraut.
 Fraxini folia, Eschenlaub.
 Fumaria, Erdrauch.

Galega,

Galega, ruta capraria, **Geißkraute.**
 Geranium, Herba Ruperti, **Storch-**
schabel.
 Gratiola, **Erdgalle.**
 Hedera arborea, **Ephen/ Eppich.**
 H. Terrestriis, **Sunderman.**
 Hepatica, alba, **Gramen Parnassi,**
weiß Leberkraut.
 H. Aurea nobilis, **gülden Leberfr.**
 H. Fontana, **Lichen, Brunnen Le-**
berkraut.
 H. Stellaris, **mattisylva, Sternle-**
berkraut/ Waldmeister.
 Herniaria, millegrana, **Harnkraut/**
Bruchkraut.
 Horminum, vulgare Scalea, **Schar-**
ley.
 Hyoscyamus albus, **weiß Bilsenfr.**
 Hypericum, **S. Johannskr.**
 Hyssopus, **Ysop.**
 Illecebra, Fabaria, **Donnerkraut.**
 Lactua, **Lattich.**
 Lauri folia, **Lorbeerblätter.**
 Lentesculustres, **Wasserlinsen.**
 Levisticum, **Liebstöckel.**
 Ligustrum, **Hartriegel.**
 Linaria **wilder Flachs/ Harnkr.**
 Lotus urbana, trifolium odoratum,
Siebengezeit.
 Lupuli Juli, **Hopffensproßlein.**
 Majorana, **Meyran.**
 Malva vulgaris, **Hasenpappeln.**
 Marrubium album, **Prassium, weißer**
Andorn.
 -- Marum.
 Matricaria, **Meterkraut.**
 Melilotus, **Steinklee/ gelb Steinkle.**

Melissa, **Meißenkraut.**
 Menta, **Spickbalsam.**
 M. Crispa, **Kraußbalsam.**
 M. Saracenic, **Strawenmünke.**
 Menthastrum, **menta equina, Ros-**
münke/ Waldmünke.
 Mercurialis, **Bingelkr.**
 Mezereum, **Seidelbest/ Kellers-**
halskraut.
 Millefolium, **Schafgarbe.**
 Mororum folia, **Maulbeerblätter.**
 Morsus Diaboli, **Succisa, Abbiß.**
 Myrti folia, **Myrtenblätter.**
 Nasturtium aquaticum, **Brunnen-**
fress.
 N. hortense, **Gartenkress.**
 Nepeta, **Cattaria, Katzenkraut/**
Katzenmünke.
 Nicotiana nostras, **Toback/ Nico-**
tian.
 N. Peruviana seu Indica, **Indianisch**
Toback.
 Nummularia, **Pfenningkraut /**
Egelkraut.
 Nymphæa alba, **weiß Seeblumen-**
kraut.
 N. Lutea, **gelb Seeblumenkraut.**
 Origanum vulgare, **Dosten.**
 O. Creticum, **Cretisch Dosten.**
 Papaveris folia, **Mohnblätter/ Mag-**
samen.
 Parietaria, **Helxine, Tag und**
Nacht.
 Paris, **Einbeerkraut.**
 Pastinaca sylvestris, **Vogelsnest.**
 Pentaphyllum, **quinque folium,**
Fünffingerkraut.

Perfoliata, **Durchwachs.**
 Perficaria, Pulcaria, **Stöckl.**
 Persici folia, **Pfersingbletter.**
 Petroselinum vulgare, apium hor-
 tensense, **Petersilien.**
 Pimpinella Germanica, **Deutsch Bi-**
benell/ Boockspeterlein.
 P. Italica, Sanguisorba, **weisch Pim-**
pinell.
 Plantago major, **breit Wegerich.**
 P. minor, **spitz Wegerich.**
 Polygonum, Cicutum nodia, **Weg-**
drift/ Wegggras.
 Polium Creticum, **Cretischer Poley.**
 Portulaca, **Wurzelkraut.**
 Potentilla, Anserina, **Genferich.**
 Primula veris, **Schlüsselblumen-**
Kraut.
 Prunella, **Braunellen.**
 Pulegium, **Poley.**
 Pulmonaria arborea, muscosa, **Eich-**
lingen moesch.
 P. vera maculosa, **Lungenkraut.**
 Pyrola, **Wintergrün.**
 Quercus folia, **Eichenlaubbletter.**
 Rosmarinus, **Rosmarin.**
 Rubi Cymar, summitates, **Brum-**
beergipffel.
 Ruta, **Weinrauten.**
 Ruta muraria, adianthum album, **Waurrauten.**
 Sabina, Savina, **Seebenbaum.**
 Salicis folia, **Wendenbletter.**
 Salvia hortensis major, **grosse Sal-**
bey.
 S. minor, cruciata nobilis, **Kreuz-**
salbey.

S. sylvestris, **wilde Salbey.**
 Sambuci cymar, seu summitates, **Holderkeimen.**
 Santicula, **Sanickel.**
 Saponaria, **Seifenkr.**
 Satureja, Thymbra lativa, **Pfefferkr.**
 Sedaney, **Hünerfüß.**
 Saxifragia alba, **weiß Steinbrech.**
 Scabiosa, **Apostemenkr.**
 Scolopédria, lingua cervina, **Hirsch-**
zunge.
 Scordium, **Pachen Knoblauch.**
 Sedum majus, semper-vivū, **Hauß-**
wurze.
 S. minus, Vermicularis, **Mauw-**
pfeffer.
 Sena folia, **Senatsbletter.**
 Senecio, **Kreuzweiskr.**
 Serpillum, **Owendel.**
 Solanum, solatrum, **Nachtschatte.**
 Tamariscus, **Tamariskenbletter.**
 Tanacetum, **Reinfahrn.**
 Taraxacum, **Pfaffenröhrlein.**
 Thymus, Thym/Thymian.
 Tormentilla, Tormentil/ **Nabelkr.**
 Valeriana, Phumajus, **groß Val-**
drian.
 V. minor Phuminus, **Baldrian.**
 Verbascū, thapsus barbatus, **Wul-**
fr. Königskeß.
 Verbena, **Eisenkraut.**
 Veronica, **Ehrenpreis.**
 Vinca pervinca, **Singrün/ In-**
grün.
 Violaria, **blau Violkr.**
 Virga aurea, consolida Saracenica, **Heidnisch Wundkraut.**

Vitis

Vitis folia, Weinrebenlaub.
 Urtica mortua, taube Nessel.
 U. urens, Brennessel.
 Huc muscus arborum.

N. Ex his peculiariter numerantur.

§. Herbae mollientes: malva, althæa, violaria, mercurialis, branca ursina: quibus alii quoque betam, parietariam & attriticem adjiciunt.

§. Herbae capillares: capillus veneris, ruta muraria, polytrichon aureum, trichomanes, ceterach, scolopendria.

Preparata non omnes eadem exhibent, sed pro diversitate substantiæ diversâ; adeoque fere præparatis omnis generis inservire possunt.

CAPVT XII.

De Fructibus.

Fructus in genere denotat omne quod plantæ ultimo proferunt, adeoque & semina, grana, &c. In specie tamen id nominis sibi reservat, fructus majores, quales pyra, poma, pruna, cerasa & his similia.

Fructus usitatiores sunt.

Fructus: Acaciarum, prunorum sylvestrium, i.e. Pruna, Schlehen.

Alchermes, Granatinctorum, grana kermes, Jerberkörner / Scharlachbeeren.

Alkekengi, Baccæ Halicabi, Jundenkirschen / Boborellen.

Amygdalæ amarae, bitter Mandel.

A. dulces, süß Mandel.

Anacardia, Elephanten Laus.

Avellana, Haselnüsse.

Aurantia acida, saure Pomeranzen.

A. Dulcia, süße Pomeranzen.

Been, grana, Beenkörner.

Cappares, Rappern.

Cassia fistula, Cassien in Röhrlein.

Cerasa acida passa seu exiccata, gedörte Kirschen.

Citri poma, Citronen Aepffel.

Cocculæ, Rockföörner.

Colocynthidis poma, Coloquintäpffel.

Cidonia poma exiccata, Quitten schnitten.

Cynosbati exacinati, Hagebotten.

Dactyli, Dattelforn.

Ebuli baccæ, Altkiebeerlein.

Ficus communes, Caricæ hispanicæ, Laubfeigen / grosse Korbfeigen.

F. Martiliana, Caricæ martil. Korbfeigen / kleine Marsilienfeigen.

Fraga exiccata, gedörte Erdbeeren.

Gallæ communes, gemeine Galläpffel.

G. Turcicæ, Türkische Galläpffel.

Granata mala, Granatapffel.

Hederæ baccæ, Epheubeeren.

Jujubæ, rothe Brustbeerlein.

Juniperi baccæ, Korberbeeren.

Limones, Limonia mala, Limonien.

Mespila siccata, gedörte Mespel.

Myrobalani, belliricæ,

Chebula.
 Citrina.
 Emblica.
 Inda, seu nigra.
 Nux aquatica, Tribuli aquatici,
Wassernüsse.
 N. Cupressi, **Cupressnüsse.**
 N. Indica, **Indianische Nüsse.**
 N. Moschata, Nucista, **Muschat-**
nüsse.
 N. Vomica, **Kränenäuglein.**
 N. Juglans, **Welsche Nuß.**
 Oliva, **Oliven.**
 Papaveris capita sine feminibus,
Magsamen Köpff.
 Passula maximæ, Zibebæ, **Zibeben.**
 P. majores, **grosse Rosinen.**
 P. minores, Corinthiaca, **kleine Ro-**
sinen/Corinthen.
 P. Massiliatica, **blau Rosinen.**
 Pinæ nuces, **Pinien.**
 Pistacia, Fistici, **Pistacien.**
 Prunella, **Weinpfäumlein / Bru-**
nellen.
 Pruna acida, **saure Pflaumen /**
Zwetzschén.

P. Citrina, **gelbe Spilling.**
 P. Hispanica, **Spanische Pflaumen.**
 P. Ungarica, **Ungrische Pflaumen.**
 Rubi idæi bacca exiccata, **Him-**
beeren.
 Sambuci bacca, **Hollunderbeeren.**
 Sebesten, **schwarze Brustbeeren.**
 Siliqua ceratiorum, **Xyloceratio-**
rum, Johannisbrod.
 Sorba exiccata, **gedörte Speyer-**
ling.
 Sumach, Rhus, **Gruberkörner.**
 Tamarindi, **saure Datteln.**
 Uva seu bacca paradisi, uva lupina,
Embeer/Wolfsbeer.
Preparata. Fructus aridiores, soli-
 diiores, & minus succulenti nihil pecu-
 liare habent ab herbis. Eapropter &
 easdem suppeditant præparatorum
 formulas. Fructuum succulentorum
 vero partus præcipui sunt: Succii inspif-
 sati seu Extracta, Succii fermentati seu
 vina, Spiritus s. Quinta Essentia, Olea
 & Tartara.

CAPVT XIII.

De Fungis.

Fungi Officinales sunt

Fungus, Agarici, **Lebereschwamm.**
 Cynosbati, Spongiola è Rosis
 siccis, **Schlafflauch/Rosenschwamm.**
 Juniperi, **Wacholderschwamm.**
 Sambuci, **Holdereschwamm.**
 Huc Boleus cervi, **Hirschbrunst.**

Preparata. Communem ut naturam
 habent cum herbis: ita & communem
 aptitudinem, qua præparationem subi-
 re possint.

N. Adnascuntur quoque fungi *Vlmo,*
fago, quercu, betula, populo alba, lu-
glandi.

CAP.

CAPVT XIV.

*De Lignis & Viscis.**Sunt Officinis usitatoria.*

Lignum Aloes, Xylo-aloes, Agallo-
chum; Paradissholz.
Aspalatus, Rhodiser Dorn.
Brasilium, Brasilienholz.
Buxi, Buchsbaumholz.
Colubrinum, serpentinum, Giff-
holz.
Coryli, Haselholz.
Cupressi, Cypressenholz.
Ebenum, Ebenholz.
Guajacam, sanctū, Frankosenholz.
Juniperi, Wacholderholz.
Nephriticum, Griesholz.
Rhodium, Rosenholz.
Santalum album, weiß Sandelholz.
citrinum, gelb Sandelholz.
rubrum, roth Sandelholz.

Sassafras, Fenchelholz / Cassafras.
Suber, Pantoffelholz.
Tamariscus, Tamariskenholz.
Viscum Corylinum, Haselmistel.
Quercinum, Eichenmistel.
Tiliaceum, Lindenmistel.

Preparata. Ligna & viscā præter vul-
gatiore medicamentorum formulas.
V.g. decoctionem, infusionem & inde
resultantes alias, quibus potissimum ad-
aptari apta nata sunt; exhibent minus
vulgariter Extracta, Aquas, Spiritus, O-
lea, Salia.

N. *Hu fuliginem adungere liceet
cum suis preparatis, de quibus peculiari-
ter, l. 4.*

CAPVT XV.

De Radicibus.

Radix est pars ima vegetabilium,
quasi primæ concoctionis officina
Eapropter cum concoctio sit nutri-
menti fixioris volatilifatio & spiritui-
fatio (πνεύματος) radixque nutritur
nutrimento minus elaborato, quam
partes reliquæ, sequitur substantiam
radicum esse naturæ præ reliquis fixio-
ris.

*Usitatiores radices Officinales
sunt.*

Radix Acetosæ (excorticata) Saur-
ampffwurk.

Acori vulgaris, Pseudo-acori,
Schwertelwurk.

A. veri, calami aromatici; Calmus.

Allii, Knoblauch.

Althææ, ibisci, Eibischwurzel.

Angelicæ, Angelicw.

Anthoræ veræ, Heilgiff / Gifftheil-
wurk.

Apii (vulgaris, Epsichw.

Ari. Nordturmhel/Deutsch Ingwer.
 Arisari, Klein Araront.
 Aristolochia longæ, langwelsch O-
 sterlucen.
 A. vera rotundæ, welsch rund Oster-
 lucen.
 A. vulgaris, gemein lang Osterlucen.
 A. fabacæ, runde gemeine Osterlu-
 cen.
 Armoracia, raphani sylvestris, wild
 Meerrettig.
 Asari, Haselturm.
 Asparagi, Spargent.
 Bardanæ, grosse Klettent.
 Bistorta, Serpentina, Mattert.
 Borraginis, Borrest.
 Bryonia, Sticht.
 Zannuruben.
 Buglossæ, Schenzungent.
 Cardopatii, Cardia nigra, Ebert.
 Cariophyllata, Benedict.
 Centaurei majoris, Rhapontici Of-
 fic.
 Chelidonii majoris, Schöllt.
 Ch. minoris, Schorbockst.
 China, Chin.
 Cichorei, Wegwart.
 Consolida, majoris, Symphyti, Wein-
 welle/Walzturm.
 Cucumeris asinini, Eselskürbist.
 Curcumæ, Geelsucht.
 Cyclaminis, Arthanita, Schwein-
 brodt.
 Cynoglossæ, Hundszungent.
 Cyperi longi, langer wilder Gal-
 gan.
 C. rotundi, rund wild Galgan/
 pert.

Dictamni albi, Fraxinellæ, weißer
 Dipsamn.
 Doronici, Gensent.
 Eduli, Altsicht.
 Ellebori albi, weiß Nieß.
 E. nigri veri Stiriaci, schwarz Nieß-
 turm/præp.
 E. nigri vulgaris, gemein Christ-
 turm.
 Endivia, Endivient.
 Enula Campana, Helenii, Alant-
 turm.
 Eryngii, Mammstret.
 Esula minoris, klein Wolffsmilch-
 turm.
 Filicis, Farent.
 Filipendula, Saxifragia rubra, roth
 Steinbrecht.
 Foeniculi, Fenchelt.
 Gentiana, Enkiant.
 Glycyrrhiza, Liquiritia, Süßholz.
 Graminis, Queckengrass.
 Hermodactyli, weißer Zeitlosen.
 Hirsudinaria, Vincetoxici, Schwal-
 bent.
 Hyoskami (excorticati), Bilsam-
 turm.
 Imperatoria, Ostrutii, Meister-
 turm.
 Iridis Florentina, wolrichend Viol-
 turm.
 I. Nostratis, Schwertelt.
 Juniperi, Wacholder.
 Lapathi acuti, Oxylap. Mengel-
 turm.
 Levistici, Liebstöck.

Liliorum, alborum, weiß Lillenzwi-
bel.

Malva, Pappelwurk.

Mandragora, Albrauntw.

Mechoacanæ, Mechoacæ albæ,
weiße Rhabarbara.

M. nigræ, Gelapæ, Chelapæ, Chio-
lappa, schwarz Rhabarbar.

Meu. Behrwurk.

Mezeri, Laureola, Seidelbast.
Kellershals.

Mortus Diaboli, Succisæ, Abbis-
wurk.

Nymphaeæ albæ, Nenupharis, weiß
Seebiumentw.

N. luteæ, gelbe Seebiumentw.

Ononidis seu Anonidis, Heushechel-
wurk.

Pastinacæ sylv. Pastinackw. Vogel-
nestw.

Pentaphylli, quinquæfolii, Fünffin-
gerkrautw.

Petalitis, Pestilenzwurk / Neun-
krattwurk.

Petroselinæ, Petersilienw.

Peucedani, Haarstrangw.

Pœoniæ, Peonienwurk / feminae.
Masculae.

Pimpinellæ, Germanicæ, Bibenel-
wurk.

P. italicæ, sanguisorbæ, Blutkraut-
wurk / welsch Bibenell.

Plantaginis, Wegbreitw. Wege-
richtwurk.

Polypodii quercini, Engelsfuß.

Pyrethri, Bertramw.

Rapa, Raben.

Raphani domestici, s. vulgar. Diet-
lich.

R. Marini, Meerrettich.

Rhabarbari veri, Rhabarbar.

R. Monachorum, Münch Rhabar-
bar.

Rhapontici veri, Rhapontick.

Rhodia, Rosentwurk.

Rubia tinctorum, Färberröthe.

Rusci, Brusci, Mäusdornw.

Sarsæ pariglicæ, Sassaaparilla, Sarsæ-
parill.

Satyrii, Stendeltw. Knabenkrautw.

Saxifragæ, semen saxifragæ, Stein-
brechtw.

Scabiosæ, Apostemtw.

Scyllæ crudæ & præparat. Meerzwi-
bel.

Scorzonera, Gifftwurk.

Scrofulariæ, Scrophulariæ, Braun-
wurk.

Sigilli Salomonis, Polygonati,
Weißwurk.

Siferis, Secacul, Zuckermohren / Zu-
ckerwurk.

Taraxaci, Pfaffenröhreintw.

Tormentillæ, Tormentillw.

Turpethi albi, Turbith.

Tussilaginis, Farfara, Brandlattich /
Hufflattichw.

Valerianæ majoris, groß Baldrian-
wurk.

V. minoris, klein Baldrianw.

Verbasci, Weichkrautw.

Urticæ, Nesseltwurk.

Xerva, Gifftwurk.

N. Ex his usa crebriori famosiores sunt.

5. Radices aperientes majores: apii, fœniculi, asparagi, petroselini, rulci. 5. --- minores: graminis, rubiæ, eryngii capparis, Ononidis.

Preparata: Quod de herbis diximus & similibus nativis, idem de radicibus dicendum: promptuarium

nimirum radices esse, unde ad omnis generis medicamenta, tam interna quàm externa depromi possunt. Hoc tamen de radicibus notare expedit: Partes fixiores præ reliquis in radicibus contineri, aptiores itaque eas esse ad exhibenda medicamenta parte fixiori celebria, veluti sunt; Extracta, Salia, Decocta, &c.

CAPVT XVI.

De Seminibus.

Semen Acetosæ, Satorampfer-
samen.

Agni casti, viticis, Schaffmüllens-
körner.

Althææ, Sibischsamen.

Ammeos veri cretici, Ammeys.
vulgaris, gemein Ammeys.

Amomi.

Anethi, Dillsamen.

Anisi, Anissamen.

Apri, Eppichsamen.

Aquilegiæ, Nigleysamen.

Asparagi, Spargensamen.

Attriplicis, Mölzensamen.

Aurantiorum, Pomeranzenkern.

Bardanæ, Großklettensamen.

Basilici, ozymi, Basilisamen.

Bombacis, Gossypii, Cotti, Xyli,

Baumwollensamen.

excorticatum.

Bursæ pastoris, Tschelkraut.

Calendularum, Ringelblum.

Cannabis, Hanffsamen.

Cardui benedicti, Cardobenedict.

C. Mariæ, Mariendistell.

Carthami vel Cnici, Felsaffrans.

Florsamen.

excorticat pulpa carthami.
conquassatum.

Carvi, Carveos, Wiesenkümmel/
Feldkümmel.

Cataputiæ majoris, Ricinum, groß
Treibkörner.

C. minoris, Esulæ vulpinæ, Treib-
springkörner.

Cerefolii, Körbelsamen.

Cicera alba, weiß Richern / weisse
Ziesererbsen.

C. rubra, rotte Richern.

Cichorii, Wegwart. Wegweiß.

Cinæ, Santonici, sanctum, Wurms-
samen.

Citri, citrei mali, Zitronenkern.

excorticatum.

Coccognidii, Klein Kellersaß.

Colocynthis, Coloquint.

Coriandri, Coriander.

præparatum.

Cucu.

Cucameris, Cucumern.
excorticatum.
Cucurbitæ, Kürbessamen.
excortic.
Cydoniorum, Quittenkern.
Cymini, Cumini, Römisch Rüm-
mel.
Dactylorum. Ossa dactilor, Dattel-
kern.
Dauci communis, Wildmöhrens.
Vogelneßf.
Cretici.
Ebuli, acini ebuli, Attichsamen.
Endiviæ, Scariolæ. Endiviensf.
Eruca, weisser Senff/ gelber Senff.
vulgò.
Fabarum, Fabæ, Bonen.
Fœniculi, Fenchelsamen.
Fœnigræci, Bockshornf.
Fraxini, linguæ avis, Eschbaumsf.
Fumariz, Erdrauchsamen.
Genistæ, Psrimmensamen.
Granatorum. Granatkörn.
Halicacabi. Alkekengi, Judenkirsche-
samen.
Hordei eleæti, Gersten.
excortic.
Hyoscyami albi, Wilsenf.
Hyperici, Johannisstrauß.
Hyslopi, Wopsamen.
Lactucæ, Lattichsamen.
Lapathii acuti Mengeltwurzf.
Lentium, Lentæ, Linsen.
Levistici, Liebstockf.
Limonium, Limonienkern.
excorticat.
Lini, Leinsamen.

Lotifativæ, Siebengezeitsf.
Lupinorum, Lupini, Fegghonen.
Majoranæ, Majoranf.
Malvæ, Pappelf.
Melissæ, Melissenf.
Melonum, Melonenkern.
excortic.
Mili, Hirsehe.
M. Solis, lithospermus, Meerhirsch.
Myrti, Myrtensf.
Napi, Buniadis, Steckrübensf.
Nasturtii (hortensis,) Gartentressf.
Nigellæ, Melanthii, Nigellæ Romanæ,
schwarz Kummel/ schwarz Corian-
der.
Præparat.
Nuclei cerasorum excortic. Kirschen-
kern.
N. Mespilorum, Mespelf.
N. Morellorum seu persicorum arme-
niacor. Morellenkern.
N. Persicorum, Pfersingkern.
Orobi, Erya, Erbensf.
Oryzæ, Reisf.
Pæconiz, Peonienkern/ fœminæ ac
masculæ.
excortic.
Papaveris albi, weisser Magsf.
P. nigri, schwarzer Magsf.
Pastinacæ sativæ, Pastinacsf.
P. sylvestris, Vogelneßf.
Perfoliatæ, Durchwachsfsf.
Petroselini Macedonici, Massiliensis,
Macedonisch Peterlein.
P. vulgaris, apii veri, Peterfiliensf.
Pimpinellæ, Bibenellf.

P

P. Ita-

P. Italica, Sanguisorba, welsch Pimper-
nellfamen.

Pisorum, Pise Erbsen.

Plantaginis, Wegerichfamen.

Porti, Lauchfamen / Schittlauchf.

Portulacæ, Burzelkrautfamen.

Pseudo-melanthii, Kornrathelsf.

Psyllii, Flöhsfamen.

Rapum, Rübensfamen.

Raphani, Rettichfamen.

Rorismarini, Rosmariensf.

Rufci, Rüstentürner / Mausdorns.

Rutæ, Weinrautensf.

Sambuci, i. e. acini.

Saturejæ, Sadanelsf.

Saxifagiæ albæ, weiß Steinbrechf.

Sesami vulgaris, Flachsdotter.

Seselios Cretici, Massiliensis, Cretischer
Seselfamen.

S. vulgaris, Sileris montani, Silerimon-
tanfamen.

Sinapis, Senffamen / rother Senff.

Spicæ nostratis, Spicanardsf.

Staphidis agriæ, Lausförner.

Sumach. Vide fructus.

Thlaspi, Batrensenff. Begkressf.

Thymi, welsch Quendelfamen.

Trifolii odorati, Edelkleesfamen.

Violarum martiarum, blaw Violff.

Urticæ majoris, Nesselfamen.

U. Romanæ, Römisch Nesselfamen.

N. Ex his sunt nonnulla in praxi sa-
mosiora, adeoque peculiariter calida vel
frigida dicta. Sic sunt.

Semina 4. calida majora, anisi, fœ-
niculi, carvi, cumini.

minora; ammeos, amomi, apii,
dauci.

Semina 4. frigida majora; Cucume-
ris, cucurbita, citrulli, melonum.

minora; Endiviæ, scaristolæ, la-
tuca, portulacæ.

Preparata ex seminibus, pro re nata
sunt infusiones, decoctiones, emulsi-
ones, &c.

C A P V T XVII.

De Succis.

Sanguini animalium respondet suc-
cus nutritivus in vegetabilibus. Ea-
propter ut è sanguinis elaboratione
& incorporatione, perittomata diver-
sa resultant, stercus, scil. urina, fel, hu-
mor vitriolatus seu melancholicus,
sudor, axungia, mucilago, lapilli;
quinimo & sanguis ipsemet quando-
que erumpit: Ita in vegetabilibus a-
nalogicè correspondent succi diver-

sorum saporum, olea, resina, guttina-
ta viscosa & resinosa, tartari, salia, &c.
Hac tamen diversitate, quod anima-
lia excretoriis sunt dotata, quibus fere
perittomata excernuntur, vegetabilia
vero raro nisi velis. 1. Quod gaudeant
poris inservientibus exhalationi sub-
tiliori. 2. Quod cum floribus rum-
moschina seu zibettina, i. e. beneolens
prorumpat melligo, tum quoque non-

nun-

CAPVT XVII. & XVIII.

115

munquam graveolens quidam succus. Hinc fit ut crassiora intra ipsum vegetabile fere maneant, arteque opus habeant, qua sequestrantur. Accidit nihilominus in quibusdam, quod ex nimia redundantia ipsamet sibi exitum querant, eodemque dato, (v.g. incisione, &c.) promptus effluant. Sunt hujusce generis perittomata. 1. Aquea; succi. 2. Terrestria, Gummi 3. Sulphurea; Olea, Balsama, Resinæ, Gummi resinæ. 4. Salina, Saccharum; Tartarus.

N. Succiqui sponte vel trunci incisione profluunt; etsi plures dari possint, V.g. succus betula, qui in Finlandia & Suecia verno tempore ex vulnerata betula copiosè extrahitur, postmodumque potius vice à mulierculis etiam nobilioris-

bus habetur, item succus seu lacryma vitis, &c. attamen, nos non nisi officinales hic damus, è quibus inter nativa recensentur;

Succi alterantes.

Vinum.

Acetum.

Succus, acaciæ.

Glycyrrhizæ.

Hypocisthid.

Opium.

Præparationes horum. Vide infra de succis, & speciatim lib. 4.

Purgantes.

anna.

Aloe.

Elaeterium.

De his vide eundem lib. 4.

CAPVT XVIII.

De Oleis & Balsamis.

Olea, & balsami in Officinis pro nativis habita, sunt:
Oleum olivarum.
Omphacinnum.
Petroleum.
Oleum terræ.

Balsamus de Tolu.

de Mecha, s. balsamus verus.

Peruvianus.

Liquidambar.

Styrax liquida.

Vires: Vide singulatim, lib. 4.

CAPVT XIX.

De Resinis.

Resina pulvis lacryma seu liquor est pinguis ac oleaginosus tum sponte ex arboribus profluens, tum interdum accedente vulneratione. Estque dupli-

cis consistentiæ, liquidiuscula aut densiuscula.

Resina liquidiuscula sunt.

Terebinthina Cypria.

P 2

Vene-

Veneta.

Vulgaris.

Pix liquida:

Resina duriuscula sunt.

Resina anime, Offic. Gum. Anime.

Caranna.

Coopal.

Elemi. Offic. Gum. Elemi.

Lacca.

Pix græca. Colophonia.

Tacamahaca.

Thus.

Vires: Resina omnis calefacit, siccatur, digerit, mollit, tenuium est partium magis, minus, discutit, tussis, ac tabi convenit, anodyna est vulneraria & lithontriptica. Vsu resinarum tum internus est, tum præcipue externus in unguentis, Emplastris, &c.

Preparata, 1. Vexamen chymicum resinarum in destillatione præcipue consistit, quam non incongrue rectificationem dixeris, quippe quæ non secus ac in rectificatione oleorum, primum Δ leniori, pars oleosa purior,

subtilior & clarior elicitur: igne dein fortiori, pars crassior & coloratior, coloris scilicet flavi: igne tandem magis validiori, oleum coloris rubei propellitur. Hæc si seorsim exipere libet, triplicis generis nancisceris olea, quorum primum quod clarum, spiritus dici solet; subsequens flavum, olei nomen retinet; ultimum, rubrum balsamum appellatur. Denique quia resinæ crassioris sunt substantiæ, relinquunt & crassiorem remanentiam, cui colophoniz nomen imposuere, à Colophone regione, unde olim advehi suevit. Modum distillandi videsis in oleis.

2. Præter destillationem subjiciuntur nonnunquam & Extractioni, quæ tamen potius depuratio, quam Extractio dicenda erit.

3. Fit & lotio resinarum, dum in ∇ puram demerguntur & agitantur, cujus rei gratia non abs re erit, resinas ad ignem fundere & hinc in ∇ conjicere.

C A P V T XX.

De Gummi Resinis.

Gummi resinas voco, concretas Arborum lacrymas in oleo quidem promptius, attamen & in aqua licet difficulter solubiles. Tales sunt,

Caphura.

Mastiche.

Styrax calamita.

Huc Myrrha &

Bdellium.

Vires & preparata, quia fere discrepant. Vide lib. 4.

C A P.

CAPVT XXI.

De Gummatis.

Gummi seu gummata sunt concreti liquores, aqueis faciles soluti, protusum est stirpibus ferulaceis, tum ex fruticibus, tum ex arboribus excel-
sis. Ex his sunt, quæ ferulacea vulgo dicuntur, à ferulaceis arboribus, è quibus stillant. Suntque

Gummi Ammoniacum.

Galbanum.

Euphorbium.

Opopanax.

Sagapenum.

Sarcocolla.

Vires. Calida sunt, emolliunt, discutunt, tartaream mucilaginem resolvunt. Usus internus vide speciatim lib. 4.

Preparata. 1. Gummi depuratum, Nimirum quia gummi pleraque heterogeneis (arena, sabulo, &c.) conspurcata afferuntur, expedit illa depurare. Hoc fit solvendo in liquore aqueo (calida) solutum colando, exprimendo, & denique lento calore inspissando.

1. Extractum Viscosum seu viscus, Vide infra in Extractis.

Vires conveniunt cum gummatis mucilaginosis, quia non est nisi pars mucilaginosa à parte resinosa sequestrata.

3. Extractum resinosum. Vide item infra Extractis.

Vires. Virtutes quæ integro gummi adscribuntur, latitant præcipue in resina, unde & resina in medicamentis tam internis quam externis, successu feliciore adhibentur. Ex iisdem destillatur quoque felicius oleum, quam ex integro gummi.

4. Oleum stillatitium. Vide infra in Oleis.

Gummata mucilaginosa sunt.

Gummi Arabicum.

Ceraforum.

Sandaracha.

Tragacanthum.

Vires. Sunt Emplastica, incrassant. acrimoniam hebetant, asperitates leniunt, &c.

CAPVT XXII.

De Animalibus Officinalibus integris.

Apes sicca, gedörte Bienen.
Bufo exiccatus, gedörte Kröten.
Cantharides sicca, Spanische Mücken.

Cicada sicca, Heuschrecken.

Lumbici siccati, gedörte Regen-

würme

Millepeda sicca; aselli, Eselchen.

Scinci.

Scarabæi pilares, Käfer/Schröter.

Serpens exiccatus, Schlangen.

Huc Mumia, Mumie.

CAPUT XXIII.

De partibus Carnosis Usitatoribus.

COr Galeritæ.
 Lupi.
 Epar Lupi.
 Porci.
 Ranarum.
 Tauri.
 Lien Bovis.
 Pulmo Agni.
 Suis.
 Ursi.
 Vulpis.

Vires: Partes carnosæ ut & ipsamet animalia carnosæ integra sive viva, sive discepta & adhuc calentia ea sint, si extrinsecus membro alicui imponuntur,

vim habent fermentativam, pægoricam, discutientem. Hinc usus maximi in phrenitide, cephalagia, vigiliis. Applicari nimirum possunt capiti, cervici, plantis pedum. Imposita tumoribus pestilentialibus uti & ictibus animalium venenatorum, præmissa tamen ventosarum applicatione, eliciunt virus. Attritus à calceamentis attritos, ab inflammationibus evadunt. In specie pars quolibet suum simile respicit, Epar epata: Lien Lienes, &c. Specialiora dabuntur, lib. 5.

Preparata usitatoria ex partibus carnosissimis sunt, Decocta, Extracta, Destillata, &c. Vide suis locis.

CAPUT XXIV.

De Partibus Membranosis.

Intestina Lupi.
 Vulpis.
 Testiculi Apri.
 Castoris seu Castorium, Bibergeil.
 Priapus cervi.

Tauri.
 Secundina cervina.
 Umbilicus Infantis.
 Rete ex animalibus.
 De singulis. Vide lib. 5.

CAPUT XXV.

De Cornibus.

Cornu Alcis.
 Bovis.
 Bubali.
 Cervi.
 Hirci.

Rhinocerotis.
 Tauri.
 Huc Unicornu.
 Vires. Frigida & sicca habentur, discutiunt, incidunt, ut plurimum sudorem me-

CAPVT XXVI. & XXVII.

119

movent, atque alexipharmaca sunt, pro
diversa tamen natura animalium, de qua
sigillatim lib. 5.

Preparata. 1. Cornu præparatum
(in specie sic dictum.) 2. Cornu u-
stum, Vide calcinat. c. 42. 3. C. philo-

sophicè calcinat. Vide ibid. 4. Magi-
sterium. 5. Galreda, Gelatina. 6. Li-
quor seu spiritus. 7. Oleum. 8. Sal vo-
latile. 9. Extractum. 10. Quinimò nec
decoctionibus infusionibusve vires
suas denegant.

CAPVT XXVI.

De Ossibus.

GRanum, humanum (non inhu-
matum.)

Dens Apri.

Elephantis Ebur.

Lupi.

Os de Corde cervi.

Ossa Hominis.

Lupi.

Tauri.

Talus Leporis.

Porci.

Vires. Ossa in genere vim habent ex-
siccandi discutiendi, adstringendi, seu

fluxiones sistendi, ossa, ligamenta que cor-
roborandi. Calcanei combusti, ut scribit
Rhases, summè pollent adversus colicos
cruciatu. Specialiora vide l. 5.

Prepar. Ossa ut Cornibus fere co-
gnata sunt substantia: ita & præpara-
tionibus. Hinc fiunt. 1. Os præpara-
tum (in specie sic dictum.) 2. Galre-
da seu Gelatina. 3. Magisterium. 4. Li-
quor seu spiritus acidulus. 5. Oleum. 6.
Sal volatile. 7. Spiritus essentificatus.
Vide infra suis locis.

CAPVT XXVII.

De Crustaceis seu Testaceis.

Lapidès cancerum seu Oculi can-
crorum, Krebsaugen.

Carpionis, Karpffenstein.

Pericarum, Persichstein.

Trutarium.

Mandibula Lucii, Hechtskiefer.

Conchæ, concharum teste ob-
longæ.

Entalium.

Dentalium.

Mater perlarum.

Teste ovorum.

strutionis.

Vires. Crustacea omnia, quia natura
sunt salina & tartarea, medicamentæ
suppeditant excellentissima ad resolven-
dum tartarum seu calculum, ad strangu-
riam, dyssuriam, Ischuriam, difficultates
& suppressiones urinae, ad colicas passio-
nes, ad tartareos morbos pulmonum, &c.

Ex-

Extrinfecus usus sunt creberrimi in dentifriciis, præcipuè si cremata fuerint, hinc & in rimis cutis solidandis, exiccandis, &c.

N. Omnia genera lapidum, qui in capitibus piscium reperiuntur, trita & cum vino exhibita, colicum dolorem compescunt & calculum qui in renibus defixus jacet, atterunt & comminunt.

Wecker ex Galeno & Avicenna, &c.

Preparata nihil ferè peculiare habent à preparationibus lapidum mineralium, de quibus lib. 3. Hinc fieri possunt. 1. Calcinata. Vide c. 43. 2. præparata (strictè dicta) 3. Sal. (improprie ita dictum.) 4. Magisterium, 5. Liquor seu oleum per del.

CAPUT XXVIII.

De Lapillis.

Lapilli quamvis in animalibus plurimis, plurimisque animalium cavitatibus reperiuntur; attamen sunt rari ac præter lapidem Bezoar (de quo lib. 5.) fere nulli, qui in officinis prostant. Ere foret nihilominus, ob insignem vim, quam in calculo resolvendo obtinent, in promptu nonnul-

los habere. Quales sunt:

Lapilli in Ventriculo & Vesica fellis tauri.

Calculus humanus, Ludus Paracelsi dictus &c.

Lapilli hirundinum.

Preparata eadem exhibere possunt, quæ alii lapides.

CAPUT XXIX.

De Lacte & sero Lactis.

Lac est sanguis vi mammarum pro fœtus nutrimento elaboratior redditus. Ex variis lactis generibus præ reliquis inserviunt medicinæ.

Lac Asininum, (quod tamen nostratibus minus usitatum.)

Caprinum.

Humanum.

Ovillum.

Vaccinum.

Optimum est ex animali sano non nimis pingui, ætatis mediæ, recens mul-

ctum, colore candidum, quod ungui instillatum cogitur.

Vires. Refrigerat, humectat, mollit, pæregoricum est, acrimoniam mitigat. Hinc usus insignis in dysenteria (clysmatisatum) in phthisi, &c. Extrinfecus in oculorum destillationibus, capitis dolore (excellit cremor.)

N. Lac etsi optimè nutriat, tamen non omnibus aque commodum est: Nocet enim in visceris intemperie & feбри; quia fasile corrumpitur, malumque adaugere

augere aptum est. Capiti itidem & nervoso generi minus convenit.

Preparata ex lacte, Butyrum, scil. Lac coagulatum, Serum & Caseus, inter nativa merito recensentur.

Vires. Butyrum convenit, ut, consistentia, ita & viribus generalibus, cum axungis.

Lac coagulatum vim habet refrigerantem ac anodynam.

Caseus in medicina rarissimi est usus. Recentem imponunt nonnulli Epatici ad astum febrilem comprimendum, vetustum sunt qui comedant ad resolvendos topophos podagricos.

Serum lactis, seu Aqua lactis, fit duplici modo, per se & per admistionem

rei separationem juvantis. Per se seceratur caseosa substantia à serosa, si lac (non nimis recens) calori exponatur. Admiscuntur, quæ separationem juvent. coagulum. v.g. vituli, agni, &c. liquor acidulus, herba acidula, v.g. acetum. Spir. Vitr. acetosa.

N. Sunt qui serum cum petroselino factum poscam italicam appellant.

Vires. Calfac. & siccac, abstergit, alvum subducit, urinam ciet. Hinc usus crebri in infusionibus purgantibus, abstergentibus, &c. Extrinsicus extergit scabiem, datur per se ab ʒij, ad ℥ij.

N. Integrum tractatum, de facili medicina per feri & lactis usum conscripsit Ioannes Costans.

CAPVT XXX.

De Felle.

Fel est portio chymi excrementitia, flava, amarissima, acerrima, in epate ab utiliore parte separata, inque vesiculam propriam collecta, unde per alvum subducitur, & transeundo alvum sollicitat.

Usitatoria sunt.

Fel Bovis seu Tauri.

Capræ.

Ovis.

Suis.

Ursi.

Fel omne desumendum est ex animalibus mediæ ætatis, quæ neque famem neque sitim passa sunt, neque ex-

ercitio nimium defatigata, neque ira percita: intellige nisi exaltatum fel desideraveris.

Vires. Fel omne calescit, siccac, incidit, terget, discutit, expultricem stimulat, lumbricos amaritudine fugat. Hinc medetur (extrinsecus) hebetudini ac albedini oculorum, purulentie aurium, &c.

N. Differunt autem inter se non modo secundum magis & minus, sed & viribus peculiaribus, tum à natura alimentii, quo animal pascitur; tum à natura ipsiusmet animalis dependentibus. Inter quadrupedum fella efficacissimum est

est taurinum: Inter avium, præstantissimum habetur fel perdicis & gallina. In genere tamen avium fella fortiorum virum censentur, quam terrestrium.

Preparata. Fieri quidem possunt.

Extracta cum Vexfellibus siccatis. Verum præter Tincturam illam Cosmeticam ex felle taurino confectam nullum in praxi vidisse memini.

CAPVT XXXI.

De Medullis.

Medulla. Medulla est pinguedo ossium cavitatibus, velut nutrimentum insita.

Suntq; Officinales.

Medulla Bubula seu bovilla.

Canina.

Cervina.

Equina.

Hircina.

Hædina.

Ovilla.

Vitulina.

Vires. Calefacit, emollit, rarefacit, ulcera explet. Hinc proficiunt medulla-

rum usus in tumoribus induratis & scirrhis, &c.

N. Optima habetur cervina, dein vitulina: Medulla Hircina & bubula tum acrior est, tum sicior, ideoque ad molliendum minus idonea.

Est & medulla spinæ dorsalis cerebrique, id est, substantia molliuscula in cavitatibus eorum collocata. Verum excepto cerebro leporino, reliquæ usus sunt rarissimi.

Preparata exinde fieri possunt præcipua, Aqua still. & Oleum.

CAPVT XXXII.

De Pinguedinibus seu Axungijs vel Adipibus.

Axungia. Gnina, Lämmer schmalz/

Adeps. oder Fett.

Pinguedo. Anatina.

Anserina.

Aprugna.

Ardeæ.

Aschii s. Thymalli piscis.

Canina.

Caponis.

Castoris.

Catti sylvestr.

Ciconiæ.

Cuniculi.

Erinacei.

Gallinæ.

Humana.

Leporis.

Lucii piscis.

Lupi.

Muris montani.

Ovis.

Ovis ex lana. Oesypus.

Porcina seu suilla.

Serpentum.

Taxi seu Melis.

Urſi, fœminæ & masculi.

Vulpis.

Vulturis.

Huc Butyrum & præcipuè majale.

Vires. Calfaciunt, humectant, emolliunt, abſtergunt, digerunt, pus movent, anodyne ſunt plus minus. Nimirum quia

pinguedo vires quadantenus ſecundum naturam animalis ſui ſortitur, prout humanæ natura fuerit, ita & illius. Imbecillior eſt ſuilla (quia ſus frigidior & humidior;) hæc paulo fortior vitulina; hinc gallinacea; efficaciſſima omnium eſt anſerina.

N. Quoties adipis absolute ſit mentio, recipe ſuillam, recentem, ſine ſale candidam.

Preparat. Oleum ſtillatitium.

N. Quomodo axungia lauetur & aſſervetur. Vide lib. I. cap. 29.

CAPVT XXXIII.

De Sanguine.

HEbr. Dam. Arab. Dem. Eſt proximum animalium nutrimentum ex chylo in Venis & Epate elaboratum, adeoque de naturâ animalis magis participans quam ipſe chylus. In Officinis quidem nulli proſtant, adhiberi tamen nonnunquam ſolent maximè recentes.

Sanguis, Anatis.

Anſeris.

Aſini.

Canis.

Columbæ.

Equi.

Hirci.

Hœdi.

Hominis.

Muliebris menſtruus.

Leporis.

Perdicis.

Tauri.

Turturis.

Vires. Calefaciunt, adſtringit, ſanguinis fluxus cohibet, magis minus pro natura diverſa animalium, nutrimentique; quæ ratione & viribus peculiaribus inter ſe differunt. Avium ſanguis, quia nitroſa plerumque ſcatet facultate, incidit, abſtergit, calculum atterit, oculorum ſuſuſioni confert; ut columbæ, milvi, vulturis.

Preparata. Anatomia ſanguinis exhibet. 1. ∇ m ſeu ſpiritum. 2. Oleum. 3. Sal volatile. 4. Sal fixum. His adjuuge baſamum antipodagricum, & magiſterium, cujus formulas vide lib. 5. de homine.

CAPUT XXXIV.

De Sevis.

SEvum. Cervinum.
 Damæ.
 Equinum.
 Hircinum.
 Hædinum.
 Ovillum.
 Taurinum.
 Vitulinum.
 Huc. Cera.

Vires. Sunt calida & humida moderate vel gr. molliunt, discutunt, aliquantulumque adstringunt.

Preparata rara per se exhibent, ut plurimum emplastris aliisque inungendorum formulis interserviunt. Si quis tamen ea destillationi submittere velit, poterit id probè admodum, quo Gummi-resinæ destillantur.

CAPUT XXXV.

De Stercore & Urina.

STercus nihil est aliud, quam nutrimenti assumpti pars inutilior, crassior, feculentior, à parte utiliori in ventriculo & intestinis virtute chylica aliquantulum immutata & hinc per anum excreta.

N. Constat 1. spiritu volatili foetente fragibili (Sulph. foetidum vocant.) 2. Sale fixiori (quo agri fecundantur) tum quoque 3. terreis ac 4. aqueis portionibus, quæ prioribus illis subiectum præbent.

Stercora in Medicina usitiora sunt.

Stercus Anserinum.
 Asininum.
 Aprignum.
 Bovillum s. vaccinum.
 Caninum seu Album-græcum
 Officinarum.

Caprillum.
 Ciconiæ.
 Columbinum.
 Equinum.
 Gallinaceum.
 Humanum.
 Lupinum.
 Muris. Muscerda.
 Ovillum.
 Passerculi.
 Pavonum.
 Suillum.

Vires. Virtutes Stercorum eruenda sunt, tum ex natura rei alimentaria, tum ex natura animalis, cuius vi chylica aliquantulum eas immutari diximus. Avium excrementa (quæ harum natura ut plurimum calidissima est) tota sunt nitrosa, unde & mirificam vim habent.

discu-

discutiendi, incidendi, attenuandi dissolvendi, aperiendi, abstergendi, (scilicet maculas cutis) diversimode tamen, promiscue. diversa aves sunt diversisque vivunt alimentis. lumentorum sterora vim obtinent anodynam, refrigerantem, discutientem, exhibenturque intus & extra.

Præparata præcipua quæ inde exhiberi possunt, sunt:

1. Aquæ stillatitiæ 2. Olea stillat.
3. Salia.

N. Præter quoniam ex stercore vaccino (omnium florum dictam) non memini alias esse usitatas.

De Urinis.

Urina est veluti colamen chymi & sanguinis, constans ex Sale viscosaque terra humiditati phlegmaticæ immixta.

Raræ etiam sunt, quæ in usum medicum veniunt, tamen viribus non carent insignibus, præcipue:

Urina humana.

Caprina.

Ovillæ.

Vires. Calefaciunt, siccant, abstergunt, putredini resistunt, Urinam pellunt, &c.

Præparata. Spiritus Salque volatile, Sal fixum. Vide lib. 3 de homine.

CAPVT XXXVI.

De Unguibus & Ungulis Officinalibus & de Coagulis.

Ungula usitatior est.

Ungula Alcis.

Asini.

Bovis.

Canis.

Equi.

Lyncis.

His addere licet Unguem odoratum seu blattam byzantium.

Vires. V. de seorsim lib. 5.

Præparata. Præparata in specie sic dicta. Magisterium, quibus addi quoque potest oleum stillatitium.

Coagulum nihil aliud est, quam la-

ctis in Ventriculo quadrupedum, quæ adhuc sugunt, concretio & condensatio. Sic sunt.

Coagulum Agni.

Equi. Hippæ.

Hædi.

Leporis.

Vituli.

Excipiendum coagulum antequam ipsa animalia aliud quippiam præter lac maternum degustaverint.

Vires. Coagulum omne, teste Galeo; acris & digerentis est facultatis, adeoque exiccatoria.

CAPUT XXXVII.

De Acetis.

Aceta quæ in Officinis prostant, vel mera sunt, vel qualitatibus medicinalibus aliunde imprægnata.

Demeris horumque præparationibus agitur peculiariter lib. 4. cl. 2.

Aceta qualitatibus aliunde imprægnata (præter pauca alia, de quibus d.l.) fiunt ex Acetæ vini optimo, ac vegetabilibus, suntque vel insolata sive infusa saltem, vel quoque, quæ paucissima tamen sunt, destillata.

Modus fiendi: R. Materiam insolendam puram atque exiccatam, præpara ad infusionem, (*ut sit in decoctionibus incidendo scil. qua incidenda sunt, contundendo quæ contundenda, &c.*) Hinc imple lagenam vel vitrum ac affunde acetum vini acerr. donec ad lagenæ cervicem pertingat: Orificio bene clauso colloca in locum tepidum, vel temperatum & acetum viribus rerum infusarum imprægnabitur.

N. Vegetabilia aliquantulum arefacta recipere oportet; ne squalore suo acetum corrumpant.

Modus destillandi non discrepat à destillatione acetæ simplicis de qual. 4. class. 2.

Aceta Officinalia simplicia fiunt per solam insolationem: suntque usitatoria.

Acetum Anthosatum ex inf. florum anthos.

Calendulatum ex floribus.

Caryophyllatum ex flor.

Cort. citr.

Fragor. è fructib.

Lavendul. è flor.

Menthæ: ex foliis.

Papav. rhæad. è fl.

Rosat. ex flor.

Rub. Idæi. è fructibus.

Rutac. è fol.

Sambuci ex florib.

Scordii: è fol.

Scylliticum, è rad.

Violar. purpur. è floribus.

Aceta composita sunt.

Acetum Alexiacum s. Destillatum alexic. F.F. v. *infra* No. 1.

Bezoardicum. 2.

Prophylacticum FF. 3.

Rutaceum. F.F. 4.

Theriacle August.

1. Acetum agrestinum solutivum Ch. D.

D. S. Clossai Archiatr. apud Metenses celeberrimi.

R. Succus agrestis sive omphacii depurati ʒij.

fol. Sen. Oriental. ʒij.

sem. anis. contus. ʒj.

rad. mechoac. in tenues lamellas dissectæ, non autem pulveris, aliàs

aliàs infusum evaderet viscidum) ʒß.

garyoph. integr. n. ij.

Macerentur in Lagenâ loco frigido & de isto aceto agrestino permisce cochl. ij. aut iij. in iusculis condimenti loco, in quibus prius dissoluta sit ʒß. cremor. Tart. Adultis detur dolis superior integra.

Hujus remedii assiduo usu hemitritæ & morbos Chronicos, quamvis longa patientia edomari, probatum est.

2. *Acetum Alexicacum seu Destillatum alexic. F. f. e. Francofurtense.*

R. Rad. Tormentill.

Zedoar.

Bistort. ā. ʒß.

Angelic.

Imperator.

Hirundinar. ā. ʒiß.

Pimpinell.

Dictamn. alb.

Aristoloch. rot. veræ. ā. ʒijj

Herb. Card. bened.

Galeg.

Scord. ā. Miß.

Sed. maj.

Endiv. ā. Mij.

Fl. Calendul. Miiß.

Rosar. rub.

Nymph.

Borrag.

Tunic.

Sambuc. ā. M. j;

Poma citria recentia minimeque putrida N. viij.

Incisis incidendis, ac contusis contundendis affunde ✕ acerr. lb. X. stent in infusione & (3). postea destillantur per XX vitreum.

3. *Acetum Bezoardicum. F. F. Cl. Dn. D. de Spina.*

R. Rad. Enul. camp. ʒij.

Angelic.

Ostrut.

Valerian.

Vincetoxic.

Chelidon.

Pimpinellæ ā. ʒvj.

Gentian.

Diptamn. alb.

Aristoloch. rot.

Tormentill.

Scabios.

Succis.

Petasit.

Zedoar. ā. ʒß.

Bacc. Junip. Miiij.

Myrrh. elect. ʒß.

Fol. Rut.

Chelidon. maj.

Scord.

Chamædr.

Card. bened. ā. Mij.

Incidentur & contundantur ut est moris, dein affunde.

Aceti vini acerr. lb. viij.

Spir. Vini lbij.

Thériac. Androm. ʒij.

Spir.

Spir. Tartari ℥℥.

Camphor. ℥ij.

Digerantur per dies aliquot (14.)
dein exprimantur, filtrenturque per
chartam.

4. Acetum consortans S. Closs.

Pulseffig.

℞. fol. rut. Mij.

fumar. Mj.

Baccar. Juniper. ℥ij.

Garyophill.

Macis.

Nucis mosch.

Testicul. castor. ā. ℥℥.

Contusis affunde acet. ros. ℔ij.

Infola per aliquot dies vel macera
retrò fornacem.

Vires. Gravidis, puerperis, & ab utero
syncopizantibus prodest, odorando, tem-
pora fricando, & pulsui utrique ex linteis
eo madentibus, alligando. In febribus ma-
lignis commodè additur campb. ℥j.

5. Acetum Prophylacticum FF. Cl. Dn.

D. Arnoldi Weickard.

℞. Rad. Angelic.

Zedoar.

Levistic.

Pimpinell germanæ.

Rut. ā. Mj.

Turbith. el. ℥ij.

Cort. citr. recent. ℥ij.

Baccar. Juniper. bene matur.

℥℥.

Laur. ℥j.

Incisa & contusa, ut moris, mace-
rentur cum acet. acert. Menl. ij. postea
destilletur per XX vitreum. Servetur
pro usu.

Vires. Insignes vires bezoardicas a-
ceta hac recensita obtinent, quibus
non modo contagiosos morbos precavere,
sed & persudorem, urinamve expellere
pollent.

4. Acetum rutaceum. F. F.

℞. Fol. Rut.

Scord.

Card. benedict.

Tanacet. ā. Mj.

Bacc. Juniper.

Rad. Angelic. ā. ℥ij.

Zedoar.

Cort. citr. ā. ℥℥.

Incidentur minutim, ac infundun-
tur in ✚ optimi ℔b. vj.

Viribus convenit cum prioribus.

CAPUT XXXVIII.

De Aquis destillatis.

AQuæ, in Officinis, diversimodè
paratæ prostant, simul ac diversæ
naturæ: aquæ scil. i. e. ad naturam
aqueam accedentes, vel spirituosæ, i. e.

spirituum naturam referentes.

Modus parandi vel destillatio est
vel infusio, decoctiove, vel commix-
tio.

N. *Modos destillandi. Vid. lib. 1.*

Destillatio aquarum pro diversitate materiarum diversimodè peragitur, idque non modo ratione caloris diversi, verum etiam ratione instrumentorum variantium.

In regno MACROCOSMICO aquæ ferè singulæ peculiare destillandi modos obtinent, ideoque specialiter describendæ erunt lib. 3.

In R. VEGETABILI destillantur aquæ ex herbis, floribus, fructibus, radicibus, lignis, & aromatibus.

I. Ex herbis & floribus viridibus.

I. R. Herb. vel Flores q. v. incide minutim conquassave, ac affunde ▽m (ne empyreuma contrahat) destillaque per MB.

N. 1. Ex herbis floribusve virentibus tenerioribus (quorum vis facile evanescit) ut & frigidioribus, destillantur aqua per MB. Ex aromaticis autem ut & calidioribus, quorum vis non ita volatilis, profundiusque inhaeret, commodius per vesicam eliciuntur.

N. 2. Herba odor quo facilius expirat, eò tepidior MB. utendum.

N. 3. Sinobiliores expetis aquas, affunde destillatam super materiam novam ac destilla denovo.

N. 4. Non abs re fuerit præmittere macerationem diei unius ac alterius, vel & fermentationem, addito, si libet, tantillo Sals communis vel fecum cerevisie, præcipue si olea expetuntur.

N. 5. Si colorem nativum spiritibus & aquis destillatis conciliare volueris, im-

pone eos in XX ut transeat ▽ extillans. Verum enim vero, minus durabilis ▽ illa futura est.

2. R. Succum ex herbis expressis ac destilla.

II. Ex herbis siccis. R. Herbam quamcunque vis, incide & affusa aqua calida macera aliquamdiu; hinc destilla.

N. Ex herbis calidis & odoratis melioris nota ▽ a & olea destillantur, si sicca destillationi subiciantur.

III. Ex Fructibus. R. Fructus maturos. E. g. poma, scinde minutim, vel conquassa ac destilla per MB.

N. Ex mollioribus exprimi potest succus ac destillari.

IV. Ex Seminibus. R. Semina grossè contusa, macera cum ▽ hinc destilla per vesicam.

V. Ex Radicibus. R. Radic. conquassa, macera cum ▽ ac destilla per Vesic.

N. Rara sunt ▽ a ex solis radicibus destillata.

VI. Ex Lignis. Ex lignis quæ eliciuntur, spirituosa imprimis sunt, ideoque ad spiritus referendæ. Videri quoque possunt earum destillationes in oleis destillatis.

VII. Ex Aromatibus. R. Aromata grossè contusa, macera cum menstruo idoneo per aliquot dies (4. 5. 6.) dein destillentur per vesicam. Sic stillat ▽ & oleum. Hæc separa & si opus rectifica. Vide de oleis stillat, quia uno &

R

eodem

eodem actu ∇ Olea ex aromatibus proliciuntur.

N. 1. Menstruum in singulis dabitur.

N. 2. Aqua ha spirituose sunt.

In Regno ANIMALI eliciuntur aquæ 1. ex animalibus integris molliusculis, mucilaginosisque. 2. ex partibus molliusculis, V.g. Cerebro spinalive medulla. 3. E sanguine. 4. E novellis cornibus. 5. E stercore.

1. Ex animalibus integris mucilaginosus: 2. Animalia (lota si placuerit) scinde minutissimè, conquassave; hinc destilla ex MB vel VB affusa, si placuerit, ∇ convenienti: Sic paratur ∇ lumbricorum, cochlearum, ut & spermatis ranarum.

2. Ex Medulla Cerebri, paratur eodem modo, addita ∇ cephalica v.g. tilia, pœonia, &c.

3. Sanguinis destillatio etsi itidem è MB perfici queat: præfertur tamen quæ fit igne nudo ex cucurbita fictili. Vide de oleis c. 70. & spiritib. c. 81.

4. E Cornibus quomodo liquor stillit. Vide de oleis. E novellis cornibus, e.g. cervorum fit ∇ per Retortam vel Cucurbitam humilem è MB aut VB affuso paucio Vino vel & sine additione, Vide lib. 5. de Cervo.

5. E Stercore, fit itidem per MB vel cineres, proditque primum ∇ hinc oleum.

Sunt itaque:

Aqua Officinarum Simples ac Phlegmatica.

Aqua Abrotani.

Absynthii.

Acaciae flor.

Acetosæ.

Acetosellæ.

Adianti.

Agrimoniæ.

Albuminis ovorum.

Alchimillæ.

Alkekengi ex baccis.

Althææ.

Alfines.

Anethi.

Angelicæ.

Anguriæ.

Anisi.

Apii.

Aquilegiæ.

Artemisiæ.

Asparagorum.

Aurantiorum ex florib. dicitur ∇ Namp hæ, &c.

Aurant. ex corticib.

Auriculæ muris.

Bardana simpl.

Basilici.

Betonicæ.

Betulae succi.

Bistortæ.

Borraginis ex flor.

ex toto.

Buglossæ ex flor.

ex tot.

Bursæ pastoris.

Calamentæ.

Calami officinarum.

Calcatrippæ.

Calen-

Calendulæ.
 Capillorum Veneris.
 Caprifolii flor.
 Cardui benedicti.
 Mariæ.
 Carvi.
 Cariophyllatæ.
 Centauri minoris.
 Centumnodiæ.
 Ceraforum nigr.
 Carefolii.
 Chamæmeli.
 Chamæpityos.
 Cheyri fl.
 Chelidonii major.
 Ch. minoris.
 Cichor.
 Cinamom. communis.
 Citri excortic.
 Consolidæ med.
 Coriandri.
 Crassulæ.
 Cuscutæ.
 Cyani fl.
 Cydoniorum.
 Cymini.
 Ebuli è flor.
 Endiviæ.
 Enulæ.
 Eupatorii Avicen.
 Euphragiæ.
 Fabarum fl.
 Fœniculi.
 Florum omnium, lætaminis.
 Fragariæ.
 Fragorum.
 Fumariæ.

Genistæ.
 Graminis ex rad.
 Geranii.
 Hederæ retr.
 Hepaticæ nob.
 H. Stellatæ.
 Herniariæ.
 Hyoscyami.
 Hyperici.
 Hyssop.
 Imperatoriæ.
 Lactucæ.
 Lapatii acuti.
 Lavandulæ.
 Levistici.
 Ligustri fl.
 Lilior. alborum.
 Convall.
 Linariæ.
 Lumbricorum.
 Lupulorum.
 Majoranæ.
 Malvæ.
 Matricariæ.
 Meliloti.
 Melissa.
 Mellis.
 Mentæ crispæ.
 Mentastri.
 Mercurialis.
 Millefolii.
 Morfus Diabol.
 Nasturtii aquatici
 Nicotianæ.
 Nucum Jugland, immatur.
 Nymphææ alb.
 Nummulariæ.

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Origan. | Scrophulariæ. |
| Ononidis. | Sempervivi. |
| Pœonia. | Senecionis. |
| Papaveris albi. | Serpilli. |
| Parietariæ. | Sigilli Salom. |
| Pentaphylli. | Siliginis fl. |
| Perficariæ maculosæ. | Solatri. |
| Perficorum florum. | Spermatis ranarum. |
| Petasitidis extoto. | Tanaceti. |
| Pimpinellæ. | Taraxaci. |
| Plantaginis. | Thymi. |
| Pluvialis. | Tiliæ flor. |
| Portulacæ. | Tormentillæ. |
| Præfii. | Trifolii. |
| Primulæ veris. | Trinitatis. |
| Pulegii. | Tunicæ fl. |
| Pyrolæ. | Tussilaginis. |
| Querc. fol. | Valerianæ. |
| Raphani Rust. | Verbasci. |
| Vulgaris. | Verbenæ. |
| Rorellæ. | Veronica. |
| Roris majalis. | Violarum ex fl. |
| Rosarum pallid. | extoto. |
| rubear. | Vitium lacrymæ. |
| Rorismarini. | Urticæ. |
| Rubi idæi ex bacc. | Zedoariæ. |
| Rutæ. | <i>Aqua fortiores cum Vino atq;</i> |
| Salviæ. | <i>¶ a composta.</i> |
| Sambuc. flor. | Aqua Anhaltina, infra No. 1. |
| Saniculæ. | Anisi cum Vino adusto. |
| Savinæ. | cum Malvatico. |
| Satyrii. | Antidotalis, (Alexipharma- |
| Saxifragiæ alb. | ca Matthioli Aug.) |
| Scabiolæ. | Aperitiva, 2. |
| Scolopendrii. | Apoplectica Crollii 3. |
| Scordii. | Apoplect. Sennerti. 4. |
| Scorzonæræ. | |

Arthritica. *Aug.*
 Asthamatica 5.
 Bardanæ composita. *A.*
 Bezoardica. 6.
 Caponis composita. *A.*
 Carbunculi 7.
 Ad desiccandos catharrhos.
 8.
 Carminativa. 9.
 Cephalica aromatica. 10.
 Cephalica F. F. 11.
 Cinamom. c. Malvar.
 c. ∇ rofarum.
 Communitatis ophthalmica
 12.
 Cordialis Herc. Sax cal. 13.
 frigida. 14.
 Cordialis restaurans. 15.
 Cosmetica. 16.
 Cosmetica pretiosa. 17.
 Cosmetica S. Cloff. myrrha-
 ta 18.
 Damascena odorifera. 19.
 Diuretica ex nucleis F. F. 20.
 Antidysenterica. 21.
 Diuretica Cloff. 22.
 Embryonum S. Balsamus pu-
 erorum. *A.*
 Epileptica Langii. *A.*
 Febrifuga. 23.
 Fortis. *A.* vide & l. 3. c. 23.
 Ad gutturis affectus. 24.
 Antihectica. 25. 26.
 Hirundinum. *A.*
 Hysterica Croll. 27.
 Juniperi c. Spir. vini.
 Histerica Matth. Martin. 28.

Imperialis correcta. 29.
 Lavendulæ compos. 30.
 Magnanimitatis. 31.
 Mirabilis. *A.*
 Nephritica. 32.
 Ophthalmica. *vide Collyr.*
 Philosophorum. 33.
 Pectoralis. 34. 35.
 Picarum. 36.
 Regia. *vide in Sal. nit. l. 3. c. 23.*
 Salviæ. composit. 37.
 Antis corbutica. 38.
 Ant. spasmodica. Cloff. 39.
 Splenetica. 40.
 contra Terrorem. 41.
 Theriacalis Bezoardica. *A.*
 Theriacalis contra pestem.
 42.
 Theriacalis Croll. seu Spir.
 theriac. camphorat. 43.
 de trib. Mixtura simplex.
 44.
 Tristantis. 45.
 Vitæ aurea Langii. *A.*
 Vitæ Marthioli. *A.*
 Vitæ comm. *A.*
 Vitæ mulierum. 46.
 Vitæ mul. camphorata. 47.
 Virtutum. 48.
 Vomitiva Plateri. 49.
 Vomitoria Æsculap. Saturn.
 50.

N. Non possum, quin in limine aqua-
 rum compositarum Pharmacopœia tyro-
 nem erroris commonefaciam, quem in
 nonnullarum destillatione comperio. Vi-
 delicet admisceri destillandis ejusce sa-

rina materias, quarum vis contumacior est, quam ut destillationis opere elevari cum ceteris queat. Tales sunt Gemma, Margarita, Corallia, ossa, cornua, aurum, &c. Eapropter si qua talia occurrerint, ne frustra sumptus impendant, praeat eadem destillato admiscere sive sub formula preparatorum id fiat, sive, quod melius sub forma Magisterii, sive quod adhuc aptius sub forma liquoris.

1. Aqua Anhaltina.

R. Terebinth. el. lb. β.
Thur. masc. ℥j.
Lign. Aloes pulv. ℥iij.
Gran. Mastich.
Garryophyll. (aliis fl. anthos.
Nucist.
Cubeb. (alias Galang.
Cinamom. a. ℥vj.
Croc. or. integr. ℥iij.
Sem. Fœnic.
Bacc Laur. a. ℥β.

Pulverisata infundantur in V lb. v. digerantur per ☿ (6.) additis Moschi in petia ligati g. xv. Hinc destillentur lentissimo MB. Quod clarum est separetur à turbido.

N, Praestat Moschum rostro alembici imponere.

Vires: Cals. sic. discutit; stomachum, cor, & reliqua viscera corroborat. Hinc efficax est in animi deliquiis. Extrinsicus crebrior ejus usus est; confert in catarrhis atque doloribus à causa frigida sobortis, in Atribritide quam Vagam vocant, in Paralyti, Epilepsia, Apoplexia,

Vertigine, Tremore, Lethargo, &c. sc. membrum affectum ea benè fricetur.

2. Aqua Aperitiva.

R. Rad. Eryng.
Scorzoner.
Filic.
Centaur. maj.
Brus. ā. ℥β.
Fœnic.
Cort. Cappar.
Tamarisc.
Fraxin. ā ℥iij.
Citri odorat. ℥iij.
Sem. Vitic.
Card. bened.
Cichor. an. ℥β.
Endiv.
Scariol.
Nasturt.
Cit. an. ℥ij.
Herb. Polytrich.

*Adianth.
Ceterach.
Cuscut.
Scolopendr.
Betonie.
Endiv. an. Miß.*

*Sum. Thym.
Epithym.
Lupul.*

*Flor. Hyperic.
Genist.
Borrag.
Meliss. an. Mj.*

*Passular. min. ℥j.
Infundantur in ∇. Lupul.*

Scolopendr.

Card. bened.

Veronic. an. lbj.

Vin. Rhenan. lbjss.

Additis Cinam. ʒiʒ.

Spec. Dialacc. ʒʒ.

Stent in loco calido per ʒ ʒ (2.)
probe clausa, postea ʒ lentur in MB.
Δ lento.

Vires. *Maximarum est virium in re-
serandis obstructionibus totius corporis,
maxime vero Lienis, Epatis & Mesente-
rii, adeoque commendabilis in affectu hy-
pochondriaco, aliisque affectibus affinis.*
Dosis cochl. i.

3. Aqua apoplectica Crolli.

R. Fl. Lil. Convall.

Tilia.

Pæonia.

Primul. veris.

Majoran.

Lavendul.

Salvia.

Betonie.

Rorismar.

Cerasor. nigror. & dulcium. ʒ cre-
scente decerptorum. q. p.

Tritis omnibus & mixtis (vel seor-
sim flores, seorsim cerasa destillantur)
adde farinæ sinapi lb i. vel ij. affusaque
▽ comm. q. s. fermententur ac destil-
lentur in MB. Spiritui elicito adde Eli-
xir. Epilept. Croll. an. circula aliquan-
diu.

N. Ad fermentationem promoveri.

dam in ▽ illa communi cantillum lupuli
ac fermenti coqui potest, vel & fermentum
addere licet sine coctione.

Dof. cochl. f.

4. ▽. Apolectica Sennerti.

R. Fl. lil. convall. q. v. infunde in Vini
optimi Mens. ij. ʒ. (14.) postea destil-
letur ac serva. In destillato infunde
postmodum.

Fl. Lavand. recent. q. placet.

Cubebar.

Cinamom.

Nuc. Mosch.

Macis.

Galang. a. ʒʒ.

Visc. quern.

Rad. Pæon. a. ʒvj.

Stent in maceratione vase clauso &
(14.) Hinc destilla.

N. Possunt & flores tilie addi.

5. ▽. Asthmatica F.F.

Lufftwasser.

R. Rad. Enul. Camp.

Ungul. Caball. a ʒʒ.

Gentian. ʒiij.

Garryophyllat.

Zinzib. alb. a. ʒij. ʒj.

Baccar. Laur.

Juniper. a. ʒij. ʒj.

Cinamom. acer.

Cardomomia. ʒij.

Fol. Salv.

Majoran.

Hyssop.

Marrub. a. Mf.

Irid. fl.

Poly-

Polypod. q.
 Liquirit.
 Jujub.
 Sebest.
 Uvar. passul. min.
 Dactyl.
 Pinear.
 Amygd. d. à. ℥iij.
 Squill. præp.
 Sem. urtic. rom.
 Fœnic.
 Ocy. à ℥iij. ʒj.
 Fic. ping. ʒj.
 Mellis despumat. ʒij.
 Vini Malvat. ℔iij.
 Spir. Vini. ℔iij.

Stent simul in infusione dies aliquot
 (8.) dein destillentur per XX addantur
 Sacchari ℥xviij.

N. 1. Alii addunt ℞ pulmonem Vul-
 pis.

N. 2. Sunt qui Spiritum Vini omit-
 tunt, atque solum Vinum Malvaticum,
 ponderesc. ℔viij. recipiunt.

N. 3. Destillatio addunt Moschi, gr.
 vij.

Vires. Aqua hæc, licet vituli pul-
 monibus solis dicata videatur, utpote
 quibus specificè opitulatur, crassam ac tar-
 taream mucilaginem attenuando, aspe-
 ritatem leniendo, respirationem facili-
 tando &c. nihilominus tamen nec in-
 signibus caret viribus, quibus insuper de-
 bili ventriculo subvenire potis est, crudi-
 tates ejus emendando, frigiditatem corri-
 gendo, &c.

Dosis prout spiritinosa fuerit à cochl.
 ℥. ad i.

6. Aqua Bezoardica.

℞. Rad. carlin. exiccat. ℔j.
 Vincetox. ℔ss.

Summit hyperic. exiccat.

absynth. an. ʒvj. M. F. pulvis.

cujus ℥. ʒxij.

aq. font. ℔. iij.

V. rectific. ℔ss.

M. & destilla per vesicam ad medias
 diss. in sing. ℔. salis Tart. ʒ. lati ʒij. do-
 nec acefcat.

Dos. pro præservat. cochl. j. pro curatione
 ne iiii. aut v. reiterando semel, post horas
 V. sudando desuper usq. dum melioratio-
 nem præsentiat.

7. ▽. Carbunculi.

℞. Flor. Rorismar. f. Anthonf.

Lilior. convall.

Violar.

Borrag. à ʒvj.

Herb. Majoran.

Salv. min.

Lavandul.

Endiv.

Spic. à ʒj.

Nucis moschat.

Zinzib.

Macis.

Gariophyll.

Cinamom.

Cardamom.

Gran. Paradis.

Cubebat.
Galang.
Visc. querc.
Avellanar.
Sem. Pœon.
Raf. c. c. à ʒj.

Incidentur & infundantur in Vini
Malvat.

▽. Lavand.

Spic.

Rosar.

Fragor. à lbij.

Vini alb. generos. lbij.

Postea adde.

Aurifoliat.

Margarit.

Oss. dec. c.

Lap. percar. à ʒß.

Moschi. q. v.

F. l. a. destillatio in MB.

N. Olem margaritas &c. minus recte
subjici destillationi, rectius destillato ad-
misceri.

Vires. Usus hujus aquae spirituosae in-
ternus frequens est, in aquis cordialibus
ac cephalicis: miram enim vim habet
spiritus vitales, animales ac naturales
suscitandi, calfaciendi, viscera omnia ac
praecipue nervosum genus corroborandi,
extrinsecus ibidem usus ejus creber est in
Epithematis cordialib. ac pulsum, in
Catarrhis frigidioribus, Paralyticis mem-
bris, cephalalgia.

8. Aqua ad desiccandos Catarrhos

Fluswasser. s. Closs.

℞ Serpilli q. v. inde cucurb. & af-
funde vini in aluat, quantum ad coope-

riendam herbam suff. relinque in cella
per 3. septim. deinde destilla leniter, &c
in hac aqua maceraligni Sasafr. torno
attriti ʒj. Dos cochl. ʒß.

9. ▽. Carminativa seu de Chamomilla
composita Grimmen-
wasser.

℞. Flor. Chamomill. Rom. M. xxx.

Incidentur & contundantur, infun-
danturque per horas 24. in

Aq. Chamomil. lb. x. (alii xv.

Vini generosi lb. vj.

Hinc exprime fortissime, in cola-
tura iterum infundantur hor. 24. alii
flores Chamomil. com. (M. xxiv.) ex-
primantur, colentur. In colatura ma-
cera.

Fl. Chamomil. M. xij.

Flaved. cort. arant. ʒiß.

Herb. Absynth. ponr. M. ij.

Centaur. min.

Puleg.

Origan. à Miß.

Sem. Aneth. ʒiij.

Anis.

Fœnic. à ʒiß.

Carv.

Cumin.

Card. bened.

Matræ à ʒiß.

Bacc. Juniperi.

Lauri à ʒß.

Stent hor. 24. tunc MB lento de-
stillat.

Vires. Magnarum est virium in mor-
bis, à flatibus subortis, e. gr. passione co-
lica,
S

lica, inflatione ventriculi & sim. Præterquam enim quod flatu discutit, vim quoque obtinet paregoricam.

10. Aqua Cephalica aromatica.

℞. Nuc. muschat. ℥j.

Galang.

Calam. aromat. ana ℥ss.

Macis.

Garyophyllor.

Cinamom. ana. ℥j.

Flor. Lavand. M℥ss.

Vini Rhenani mensur. ij. stent in infusione, postea destillentur.

Vires. Non capiti solum, sed & ventriculo maximopere convenit, imbecillitati eorum succurrendo, cruditates inde ortas corrigendo, & discutiendo. Sennert. in Institut.

11. ∇. Cephalica F.F. vel Epileptica
Schwindelwasser.

℞. Flor. lilior. convall. lb. j.

Pæon.

Lavendul.

Betonica. a. lb. j.

Til.

Primul. Veris ana. ℥iij.

Herb. Botryos. cum flor. Mj.

Rad. Pæon. ℥iij.

Aristoloch. ℥ss.

Diptamn. alb. ℥j.

Sem. Pæon. ℥iij.

Cubebæ. ℥j.

Piper nigr. ℥ss.

Visc. quern. ℥j ℥ij.

Coril. ℥iij.

Macerentur in Vini malvat. Men-

sur. 2. per septimanas. 3. Dein destillantur in MB.

N. 1. Duplici modo ∇ hæc in officinis nostris parata prostat. 1. uti jam descripta est. 2. cum castorei ℥ss. quod vel simplici infusione vel repetita destillatione ∇ m cephalicam cum castoreo dictam constituit.

N. 2. Quoniam Δa huius ingredientia, eodem tempore recentia haberi nequeunt, ne exiccando quid virium pereat, singula, prout collecta fuerunt, infunduntur, seorsim destillantur, destillatumque loco menstrui reliquis affunditur.

Vires. Non immerito Apoplecticam nominaveris, utpote cui morbo præcipue consecrata est. Succurrere tamen apta est, & reliquis capitis affectibus, catarhorum statuumque nequitiis introductis. Quales sunt vertigo, Gravedo capitis, Epilepsia.

12. Aqua communitalis ophthalmica.

℞. Herb. Euphrag. Mij.

Chelidon.

Fœnic.

Verben.

Siler. mont. ana. Mij.

Rut.

Meliss. ana. Mj.

Caryophyllor.

Macis.

Piper. long. ana. ℥ss.

Macerentur per noctem in ∇ rosar. alb. Vini alb. ana.

Destilla. ∇. in MB.

Vires.

Vires. *Acuit visum, sordes oculorum detergit, maculas auferit, ulcera sanat, &c. scil. instillata.*

▽ *communis paulo aliter.*

℞. Sum. Euphrag. Mij.

Chelidon.

Verben.

Betonic.

Chamæpit.

Aneth.

Hormin.

Anagall. flor. rub. ā. Mj.

Sem. Ameos. ℥i.

Rad. Caryophyllat. ℥j.

Fl. Anthos. M℞.

Piper long. ℥ij.

Macerentur in vini albi q. f. per ♂ integrum & destillentur.

Vires easdem obtinet cum priori.

13. *Aqua cordialis Herculis Saxonia calida.*

℞. Cort. citri.

Fol. Meliss.

Ocym.

Vincetoxic.

Fl. Caryophyll.

Rosmar.

Saturejæ.

Sum. Diptamn.

Scord.

Petrosel.

Fœnic. ana. Mj.

Infundantur in f. q. Vini odorati, aut malvatici, per ♂ (3.) postea destillentur: in destillato iterum infundantur.

Caryophyllor.

Macis.

Nucist.

Lign. Aloës. ana. ℥ij.

Destillentur denuo.

N. *Addi possunt grana aliquot Moschi & Ambra.*

Dosis à ℥ij. ad ℥℥. &c.

14. *Aqua Cordialis ejusdem frigida.*

℞. Succ. Borrag.

Bugloss.

Meliss.

Acetos.

Oxylapath.

Trinitat.

Bistort.

Cyan. cærul.

Calendul.

Limon.

Citr. ana. lib. i.

Acet. lib. i. (alii lib. ℥. alii lib. i. ℥.)

Sem. citr.

Portulac.

Flor. Nymph. alb.

Violar.

Rosar. à ℥i.

Terr. sigillat. strig.

Bol. armen. or.

Terr. Lemn. ana. ℥iij.

Spec. Diatr. Santal. ℥ij. (alii o-mittunt.)

Camphor. ℥j.

Infundantur species in succis, macerenturq; ♂ (3.) Hinc destillentur per XX vitreum in MB.

Dosis ℥j. ad ℥iij. &c.

15. *Aqua cordialis restaurans*
P. de Spina.

℞. Corn. Cerv. mollis & tenelli in
 taleolas sect: ℥ij.

Succ. carnis vitulin. & caponis in
 duplici vase s.a. extract. ℥ij.

Succ. pomor. redolent ℥ij.

Bugloss.

Acetosell.

Trifol. acetos. an. ℥ss.

Vini optim.

Lign. Santal. citrin.

Rhod. an. ℥vi.

Cinamom. ℥j.

Lign. aloës. ℥ij.

Digerantur omnia per ☉ & ♀. 2.
 dein destillentur in MB.

℞. Hujus aq. ℥iiij.

Succ. citr. recent q. s. ad gratam
 aciditatem. Deinde adde

Flor. caryophyll. rub. ℥iiij.

Borrag.

Bugloss.

Violar. an. p. ii.

Ros. rub. p. iij.

Extrahatur Tinctura, cui adde

Conf. Alkerm. ℥ij.

Dehyacynth. ℥ss.

Magist. margarit.

Corall. rub. a. ℥i.

Digerantur, & serventur pro usu.

Vires. *Spiritus vitales languidos mi-
 rifice reficit, adeoque convenit in syncope
 palpitatione aliisq. affectibus cordis. Dos-
 eod. s. vel integrum.*

16. *Aqua Cosmetica.*

℞. Ceruss. alb. ℥ij.

Succ. limon. ℥i.

Limac. ℥iiij.

Album ov. n. xv.

Camphor.

Borrag. a. ℥ss.

Myrrh. ℥ii.

Thur.

Mastich. a. ℥ss.

Infundantur hor. 24. in

Aq. Til. ℥iiij.

Sambuc. ℥ss.

postea destillentur.

Vires. *Cutem dealbat, lavemque
 reddit.*

17. *Aqua Cosmetica
 pretiosa.*

℞. Lil. alb. ℥vi.

Ireos Fl.

Fabar.

Ciccr.

Lupinor. a. ℥ss.

Fl. fabar. recent. M℥.

Tragacanth.

Ceruss. alb.

Sachar. alb. a. ℥ss.

Medull. panis alb. in lacte
 made factæ ℥i.

Oliban.

Gum. arab. a. ℥iiij.

Borrag.

Alum. plumos. a. ℥ss.

Album ovi ℥i.

Camphor. ℥ss.

In s. q. aquæ Rosar. & flor. Fabar.
 an infundantur ☉ & ♀. Deinde destil-
 lentur.

18. *Aqua Cosmetica sive myrrbata**S. Clossai.*

℥ lactis caprill. rec. mulcti ℥b. iv.
album ovorum n. xi.

aq. nenuph. &

ros. albar. an. ℥bj.

Succi semper viv. major. ℥b. ss.

vini Hispan. ℥b. 3.

F. destillatio in MB de qua cape
℥bj.

myrrh. opt. subtil. pulver. ℥ij.

Digere per 24. horas & F. iterum de-
stillatio per MB non omnino ad siccita-
tem pro ordinariâ ablutione. Quod si
facies eruganda sit aut epidermidis a-
speritas tollenda tunc

℥ aq. myrrh. præscript. ℥b. ss.

Sach. cand. ℥ij

Borac. ℥j.

Alum. usti ʒj. M. abluatur fa-
cies.

19. *∇ Damascena odorifera.*

℞. Ireos. Fl.

Cariophyll.

Cubebæ.

Cinamom. acerr.

Gran. Paradis.

Calam. arom. à ʒj.

Majoran.

Thym.

Fol. laur.

Fl. Anthos.

Rosar. rubr. ana. Mj.

Lavandul. ʒiij.

Vini optimi Mens. 3. Macerentur
ac destillentur: Destillato liquori ad-
dantur.

Moschi ʒss.

Zibeth. gr. vi M.

Vires: Calfacit, siccac, incidit, discen-
tit, cor ac caput inprimis roborat.

20. *∇ Diuretica ex nucleis F. F.*

(*sen Lignor diureticus,*

Kerntwasser.

℞. Flor. Sambuc. siccac. ʒvi.

Amygd. amar. ʒv.

Nucl. persic. ʒxi.

Cerafor.

Incisa ac grosse contusa macera in
Vini malvat. mens. iij hinc destilla in
MB.

Vires. Insignium virium in atteren-
do calculo, abstergendis ureteribus, urna-
que cienda.

Dosis coch. j.

21. *Aqua antidiysenterica.*

℞. Nucistæ.

Sem. Plantag.

Sanguinar.

Burs. pastor.

Sanguisorb. a. ʒss.

Gallar. ʒ. vi.

Cydonior. exiccat. ʒi.

Mespilor. exicc.

Sorbor. exicca. ʒss

Boli.

Terr. sigillat. a. ʒi.

Flor. Balauft. Mj.

Rad. Acor. ʒss.

Fruct. Acac. exicc. ʒi.

Panistosti cum cru-
sta Mii.

Infunde in Aq. plantag.

S 3

Tor-

Tormentill.
Bull. pastor. a. q. f.
Stent in infusione per σ 8 (8) po-
stea destilla ex MB.

Vires. *Convenientissima est in alvi
uterique fluore, adeoque in dysenteria di-
arrhea &c.*

Dosis. cochl. i. vel. 2.

22. Aqua Diuretica S. Closs.

\mathcal{L} Vini alb. in quo rad. v. diureticae
& ering. prius lotae & contusae, fuerint
maceratae lb ii.

therebinth. &

mellis opt. an. \mathfrak{z} iii.

succi raphan. &

malu. an. quart. i. M & infun-
dantur omnia simul per σ 4. adde lum-
bricorum terrae nodulo inclusorum &
filo suspensorum \mathfrak{z} v. deinde destillantur
in MB.

\mathcal{L} aqua hujus destillat. \mathfrak{z} ij.

Spiritus Sal. com. succinat, id est
per octiduum cum sale volatili succin.
proportione sub tripla digesti \mathfrak{z} ß.

M. F. dosis. Vrinam & calculum po-
tenter promouet. Ex communicatione S.
Clossar.

23. ∇ . Febrifuga.

\mathfrak{z} . Rad. Scorzoncr.

Pentaphyll.

Tormentill.

Dictamn. ana. \mathfrak{z} vi.

Sem. Citr. excort.

Card. bened.

Mariæ.

Acetof. ana. \mathfrak{z} ß.

Santalor. oma. ana. \mathfrak{z} j.

Galeg. Mj.

Fl. cordial. ana. Mß.

Raf. c. c. \mathfrak{z} ß.

Contusis affundantur.

∇ . Tormentill.

Cichor.

Card. bened.

Mariæ.

Pap. errat. a. q. f.

Macerentur in vitro clauso σ (3.)
postea adde

Pomor. citri contus. N. vi.

Succ. Endiv.

Acetof.

Card. bened.

Plantag. an. lib. i.

Borrag.

Scord. an. lib. i.

Destillantur in MB.

Vires. *Conuenit in febribus precipue
malignis: malignitatem quippe discutit,
putredini resistit.*

Dosis \mathfrak{z} j. vel \mathfrak{z} ij. iij.

24. Aqua ad gutturis affectus

(Halsß ∇ .)

\mathcal{L} Fol. pyri sylvestr.

apii.

fanic.

periclym.

scord.

quinquefol.

aristol. rotan. Mij.

herb. perfoliat. totius Miiij.

cerevis. aclescentis (*Satverbier*)
mens. iij.

Fermententur simul per 3. hebdom.

lumi

tum adde
albi græci ℥iij. destilla per vesicam.

Dentur cochl. iij. bibenda in ardoribus gutturis Vnulaque inflammatione, deinde os frequenter eadem colluat, & lintea hac aq. persusa collo obvolvatur.

25. *Aqua Antihæctica.*

℞. Herb. Hyssop.
Hed. terr.
Rorrell.
Centaur. min.
Adianth.
Scabios.
Cichor.
Pimpinell.
Quinquese.
Acetos.
Epatic.
Pulmonar.
Fl. Borrag.
Bugloss.
Papav. rhæad.
Rosa. an. p. ii.
Sem. 4. frig. maj. an. ℥ii.
Rad. Cichor.
Enul. a. ℥. s.
Pimpinell. ℥i.

Cancr. fluviatil. contus. No. xv.

M. & cum lacte caprino infunde ac destilla ex MB.

Vires: Hæctica laborantibus mire prodest, acrimoniam sanguinis obrundendo adeoque nutritionem emendando.

Dosis, Cochl. 3. aut. 4. assumpta mane ac post meridiem totidem.

26. *Alia aqua antihæctica.*

℞. Herb. Pimpinell.

Epatic. stell.

Millefol.

Agrimon.

Veronic.

Nasturt. aq. M. i.

Sem. 4. frig. maj. an. ℥ss.

Flor. Borrag.

Bugloss.

Cichor.

Rosa. an p. 7.

Rad. Cichor.

Enul.

Pimpinell a. ℥vi.

Cancr. fluviatil. No. xlii.

Limac. No. xvi.

Sanguin. de vitulo nigr. ℔i

Pulmonis vitulin. ℔ss.

Aq. Epatic. ℔i.

Lact. caprin. q. s.

F. Infusio & destillatio ex MB.

Vires ac usus conveniunt cum priori.

27. *▽. Hysterica Croctii.*

℞. Rad. Diptamn.

Sem. Dauci ana ℥j.

Cinamom. ac.

Cass. lign.

Meliss. ana. ℥ij.

Croc. or. ℥j.

Castor. rec. ℥ss.

Ex omnibus mixtis F. pulvis, cui affundantur ▽. Rutæ lib. ii. s. stent dies (4.) in infusione. Hinc destilla in MB.

Convenit utero pravis humoribus molestat. Discutit, suffocationi succurrit.

28. *Aqua*

28. *Aqua hysterica Matthæi Martini.*

℞. Fol. Meliss. odor. M. vi.

Betonic.

Puleg. an. Miß.

Calaminth.

Arthemis.

Basilic.

Chamædr.

Hyssop. a. M. f.

Matricar. P. a.

Rad. Pæon.

Eryng.

Meu.

Angelic. dom.

Sylvestr. an. ℥i.

Sem. Carv.

Siler. mont.

Coriandr. pp. an.

℥ij.

Galang.

Zedoar. an. ℥iiij.

Rhapontic. ℥iij.

Comminutis affunde Vini generosi & actu calidi lib. 3. stent in infusione hor. ix. ad cineres calidos. Postea ubi parum ebullierint in Vase cooperto, destillentur in Vase vitreo & quæ primo exibat aqua servetur.

Vires. In affectibus melancholiam redolentibus mirè efficax est. Dosis cochl. s. vel i.

Matthæus Mart. de morb. Mesent.

29. *Aqua Imperialis correctæ,*

℞. Cort. citr. sic. & arant.

Nuc. mosch.

Zinzib.

Garyoph.

Cinnam. tenuis a. ℥ij.

Ros. rubr. ante biduum collect. stor. lbj.

Rad. cyper.

Ireos florent.

Anagal.

Acor. veri &

Zedoar an. ℥j.

Bacc. Juniper. ℥ij.

Fol. laur.

Hyssop.

Meliss.

Salv.

Thym.

Sem. ocym. &

Majoran. an. ℥i.

Flor. lavend.

Anth.

Calend.

Tunic. &

Sambuc. a. lbij.

Incisa & contusa obvolvantur strato rosarum infundaturque per octiduum in aquis partibus aq. ros. & vini generosi ad supereminentiam trium digitorum in cucurb. vitreâ super cineres calid. deinde destillentur Δ lentissimo per & X. integros continuato, apponendo rostro XX.

Mosch. opt. in nodulo ligat. ℥i. vel q. v.

Vires. Medetur Cephalagia, melancholia paralyti, imbecillitati ventriculi, corrigit animam fœtentem, feminas fecundas reddit, partum accelerat, morbis Epidemicis adversatur, quod et-

iana

iam facit (sed potentius) acetum magnam
si residuo superfusum ejusq; tinctura im-
pregnatum.

30. Aqua Lavandula com-
posita.

R. Nucist.

Cubebat.

Zinzib.

Cinamom. opt.

Galang.

Calam. ar.

Macis.

Caryophyll.

Visc. quern. an. ʒiʒ.

Rad. Pæon.

Eruc. à ʒiʒ.

Flor. Til.

Pæon.

Anthos.

Salv. ana. Mʒ.

Lavandul.

Lil. convall. ana. M. xxiv.

Vini optimi q. f. infusio & destilla-
tio in MB.

Vires. Calfacit, exiccat, cephalica est
& cathartica, intrinsecus & extrinsecus ad-
hiberi apta.

31. Aqua Magnanimitatis.

R. Formic. (præstant majores, acidu-
lum odorem exhibentes) Mij.

Spirit. Vini Mensur. i. vel q. f.

Digere vase clauso donec putrefa-
ctione in liquorem abierint. Hinc de-
stillat per MB. aromatizaque tantillo ci-
namomi.

Vires. Calfacit intense, incidit. Usus
ejus præcipuus est in atrophica sive in-

trinsecus, sive extrinsecus adhibere ve-
lis.

N. 1. Si species anacard. insuderis, insi-
gne conficies extractum, ad memoriam re-
borandam.

N. 2. Sunt qui animositatem ejus potius
excitari volunt, unde & nomen accepit;
fides sit penes expertum. De collectione
sunt qui monent, præferendas esse formi-
cas, qua plenilunio cum ovis simul colli-
guntur, hasque ad plenilunium usq; sub-
sequens dirigere jubent.

N. 3. Nonnulli R. lib. ij. aqua magna-
nimitatis descripta addunt.

Confect. Anacard. ʒii.

Castor. recent. ʒi.

Fl. Bugloss.

Anthos. ana. M. j.

Cinamom. opt. ʒj.

Digeruntque per aliquot dies, hinc
destillant.

Alia aqua magnanimitat. de-
scriptio.

R. Formicar. major. (Majo vel Junio
collect.) q. v.

Spin. Vini rectificat. ad eminent. di-
git. 3.

Digestis adde

Fl. Anthos.

Ros. rubr.

Bugloss.

Meliss.

Majoran. ana. Mi.

Castorei el. ʒii.

Spec. Diamosch. dulc. ʒʒ.

Confect. Anacard. ʒi.

Aq. Bugloss.

T

Beto-

Betonic.

Tilia ana. lib. i.

Tritis terendis misce ac menscm
digerantur, deinde destillentur in
MB. & cum proprio sale rectificen-
tur.

Vires. *Cordialis est & cephalica præ
priori magnarumque virium ad memo-
riam roborandam.*

32. ▽ *Nephritica.*

R. Rad. Enul. Camp.

Ononid.

Pimpinell.

Raphan. ana. ℥i.

Petrosel.

Levistic. ana. ℥viii.

Fol. Levistic.

Petroselin. an. Mi.

Saxif. c. toto ℥ij.

Nucl. persic. No. xxx.

Fl. Genist.

Meliss.

Anthos ana M. ss.

Sambuc. Mi.

Bacc. Junip.

Myrtill.

Halicacab.

Sem. anis. an. ℥ii.

Incidantur & infundantur in Vinū
alb. opr. lib. xii. per & (8) deinde destillen-
tur.

Vires. *Diuretica ac lithonriptica est.*
Dosis cochl. i.

33. ▽ *Philosophorum.*

R. Flor. Sambuc. rec. lib. i. ss.

Herb. Lactuc.

Portulac.

Solan. c. toto ana lib. i.

Hyoscyami alb.

Fl. Papav. errat.

domestic. ana lib. ss.

Rosar.

Violar. ana. ℥iv.

Suc. Semperviv. lib. iii.

Plantag.

Acetos. ana lbii.

Endiv. lib. i.

Omnia recentia contusa & incla-
stent in infusione in cella frigida &
(10) postea destilla in MB. vel cinere
ad siccitatem sexies reiterando sem-
perque destillatum affundendo super
novas herbas, omissis siccis, tandem-
que rectifica, rectificato adde sal ex
fecibus extractum, depuratumque se-
peli in terram frigidissimam per men-
sem.

Vires. *Omnibus morbis calidis conve-
nit, &c.*

34. ▽ *Pectoralis Clariss.*

D. D. Lud.

von Hornigk.

R. Hepat. Vitul. N. i.

Pulmon. Vulp. N. i.

Herb. Pulmonar.

Hepat. stellat.

Salvia.

Rutæ.

Hyslop. ana Mi.

Rad. Enul. c.

Gladiol. ℥ss.

Sem. Anis.

Cary.

Carv.
 Fœnic. à ʒß.
 Fl. Borrag.
 Bugloss. ana ʒij.
 Infundantur per hor. 24. in
 Vini veteris gener. M.ij.
 Aq. Scabios.
 Card. benedict. à ʒiv.
 Hyssop. ʒij.
 Dein destilla in MB.
 V. Confortat Pulmones ac Epar, cras-
 sam mucilaginem attenuat, expectorat,
 flatu discutit, obstructiones reserat,
 &c.
 35. ▽ Pectoralis, F.F.
 R. Fol. Scabios.
 Veronic. ana M.ij.
 Capill. ♀.
 Salv.
 Hyssop.
 Marrub.
 Epatic. ana M.j.
 Fl. Borrag.
 Bugloss.
 Violar. à Mf.
 Rad. Enul.
 Ireos fl.
 Petrosel.
 Liquirit a ʒß.
 Sem. Anis.
 Fœnic.
 Urtic.
 Cinamom. el.
 Croc. or. an. ʒß.
 Incis. & contusa digerantur in
 Aq. Scabios.
 Veronic. ana. lib. i.

Hyssop. lib. ʒ.
 Vini alb. lib. iiii.
 Digerantur per ʒ (2) destill. per MB.
 adde Sacchari cand. q. s.
 Vires. Eadem cum priori obti-
 net.

36. ▽. Picarum composita.

R. Sem. Pæon.
 Rad. Pæon.
 Pyrethri. ana ʒl.
 Aristoloch. l. ʒiij.
 Visc. quern ʒß.
 Castorei. ʒi.
 Fl. Stœchad. ar. ʒj.
 Lil. convall. ʒiß.
 Paralyf.
 Pæon. ana. ʒvi.
 Lavendul.
 Rorismar. ana. ʒv.
 Salv.
 Majoran.
 Betonic.
 Hyssop. ana ʒß.
 Cinamom.
 Caryophyllor.
 Cardamom.
 Nucist.
 Cubebar. ana ʒiß.
 Singulis grosso modo contusis & in-
 cis infundantur
 in Aq. Lil. convall. lib. iiii.
 Flor. Tilia lib. iß.
 Primul. Veris. lib. i.

Deinde adde pullos picarum. N.
 xii. qui pennis majusculis abjectis
 conquassentur & addantur infusioni
 T 2 præ-

prædictæ; post macerationem F. Destillatio in MB.

N. *Sunt qui picas in ▽ liliorum lib. iß. ad consumptionem medietatis antea coquunt, infusioni q. postmodum addunt. Verum quia coctione illa volatilis pars prorsus evanescit, quid postmodum eleve- tur non video.*

Vires. Cephalica & antepileptica in- signis est. Dosis cochl. 1. vel. 2.

37. ▽. *Salvia composita. F. F.*

℞. *Salv.*

Majoran.

Thym.

Lavendul.

Epithym.

Beton. ana Mj.

Nucist.

Cinam. ana. ʒß.

Rad. irid.

Cyper. rot.

Calam. ar. ana ʒj.

Storac. cal.

Benz. ana. ʒiß.

Infunde in lib. rv. Spir. Vini rec. &

(4.) deinde still per MB.

Vires. *Calefacit & siccit. Cephalica & arthritica est penetrantissima n- sui conveniens, tam internè, quam ex- ternè.*

38. *Aqua antiscorbutica*

P. de Spina.

℞. Rad. raphan. sylv. lbß.

Scorzoner.

Cichor. ana ʒiij.

Polypod. q. ʒ. vi.

Emul. ʒ. vi.

Cort. tamarisc.

Cappar. ana ʒiß.

Citri ʒß.

Raf. lign. rhod.

Sassafr. ana ʒiv.

Herb. menth.

Meliss.

Chamædr.

Veronic. ana Mi.

Sem. Fœnicul.

Anis.

Nasturt. ana ʒß.

Flor. Cordial. ana ʒii.

Troch. de Cappar. ʒv.

Croc. ʒi.

Digerantur per ☞. 3. in

Vini alb. generos. lb. iii.

Seri lactis caprin. depurat. lbii.

Aq. Cuscut.

Acetofell.

Cardui bend. ana ʒv.

Postea adde

Succi cochlear.

Becabung.

Acetofell.

Fumar. ana ʒix.

Destillentur ex MB.

39. *Aqua Antispasmodica S. Clossai.*

℞. Ungar. ʒiv.

Succin. flav. per triduum in ☞ infusi ʒi.

Vini malvar. lbß.

F. digestio vase clauso per octiduum in B. M. mox destillatio in ciner. ferè ad

ad ficcitatem vitando Empyreuma.

7 hujus liquoris destill. ℥i.

Ad still. post fermentationem ceras.
nigror.

Lilii convall.

Flor. tiliaz arbor. &

Pæon. ana ℥iii.

Rad. utriusque valeriam. ℥ß.

Sem. pæon.

Bacc. Juniper. rec. matur. ana

℥iii.

Pullorum hirund. exenterat. n. 3.

Corvi &

Picarum detractis plumis

exenter. ana. n. 1.

Castor opt. ℥ß.

Caphur. gr. xv. F. omnium

destillatio in MB. bulliente

℥ de liquore stillato quart. 1.

Aq. Claretæ cum ambrâ & mo-

icho. ℥iß. M.

Sumat cochl. 1. aut. 2. incipiente parox.
absq. morâ.

40. Aqua Splenetica. F. F.

3x. Rad. Filic. ℥ii.

Polypod.

Apii ana. ℥iß.

Aristol. rot.

Levistic.

Acor. aq. (pseudo ac.

Cal. arom. ana ℥j.

Cor. Cappar.

Tamarisc.

Lign. fraxini.

Rhabarb. elect. ana. ℥ß.

Sem. Levistic.

Carv.

Anis.

Cymin. ana ℥ii.

Sum. Absynth.

Fumar.

Cuscut.

Fl. Agrimon.

Fol. Ceterach.

Scolopendr. à Mis.

vinii generos. lib. vii. stent in dige-
stione (6. 2.) Hinc destillentur per
MB.

Vires. Lienem roborat, aperit, uri-
nam promouet, &c.

41. ∇. Contra Terrorem.

Schreckwasser.

3x. Flor. Lil. convall. Miß. (vel
plur.

Superfunde Vini albi generos. Men-
suras. 3. stent simul in loco frigido, &
(14.) postea destilla per MB.

Destillato iterum adde

Cinamom. ℥iß.

Cubeb. ℥ß.

Caryophyll. ℥iij.

Macis.

Galang.

Zing.

Zedoar.

Croc. or. ana ℥ii.

M. Stent bene obturata aliquandiu.

Hinc adde

Flor. Lavendul. recent. Mj.

Spic. nostrat. Mf.

Stent iterum aliquot dies.

Hinc destilla in MB. Ex fecibus extrahe

Salcom. destillatoque adde.

N. Sunt qui destillatum ante Salis admixtionem super ocul. 69. preparat. ℥i. destillant. Kerum ut supra monui, rectius destillato admiscetur.

Vires. Convenit gravidis terrorem passis, praecavet abortum, foetumque confortat.

42. ▽. Theriacalis s. contra Pestem.

℞. Succ. Galeg.
Aceros.
Scord.
Citri. ana lib. i.

Theriac. opt. ℥ii.

Mista digerantur aliquamdiu, postea destillentur, Dosis cochl. i. ad ij. ℞c.

43. ▽. Theriacalis Croll. s. spiritus Theriacalis camphoratus.

℞. Theriac. Andromach.
Myrrh. rubr. ℥iij.
Croc. orient. ℥ss.
Camphor. ℥ii.

Mixtis superfunde V rectificati ℥x. stent in loco tepido, cucurbita, imposito alembico, bene clausâ, & (24.) Hinc destilla in MB. à lentissimo calore gradatim ascendendo. Sic Spiritus prodit elegans, quem reaffunde materiae in cucurbita, digere, atque denuo destilla idque vice tertiâ.

N. Sunt qui Camphoram in XX ponunt, contra Camphoram omittunt, Spiritumq; Theriacalem simplicem vocant.

Vires. Egregius usus est in Peste,

ciet sudorem; resistitque veneno, Sennert. in Instit. Harim. in Croll. Finck. in Enchirid. ℞c. Dosis ℥i.

44. ▽. De Tribus. Mixtura de tribus. Mixtura simplex, Diaphoreticum in peracutis.

℞. Spirit. Tartari rectif. ℥iii.
Θ. i. ℥i.

Aq. Theriacal. Comphorat. ℥v. M.

Vires. Ciet sudorem, resistit putredini, magnarumque virium censetur in febris malignis.

Dosis 3j. plus minus.

45. ▽. Trifantis.

℞. Nuc. Mosch. lib. i.

Macer.

Zinzib.

Granor. paradif.

Caryophyll. ana ℥iij.

Rhabar. opt. ℥j.

Castor.

Spicae nard. à ℥ss.

Ol. laurini. ℥ii.

M. & fac ut aromata maneat integra, infunde Vini optimi lib. xiv. maceraque in vitro clauso septiman. 4. Dein cola, speciesque omnes contunde ad pulmenti formam, addanturque postea liquori colato, iterum stent per & 3. saepius agitando, Denique destilla in MB.

Vires. Cephalica & uterina est, crassos flatu discutit.

46. ▽ Vita Mulierum. Weiber

Aqua vit.

℞. Cinamom. acerr.

Nucist.

Nucist.

Macis.

Zinzib.

Caryophyllor.

Gran. paradif.

Cubebæ.

Cardomom. à ʒii. (alii ʒiʒ.

Piper long. ʒj. (alii rectius ʒʒ.

Galang. ʒi. (alii rectius ʒj.

Zedoar. ʒj. (alii omittunt.

Pulverisentur singula seorsim per-
misceanturque: Hinc adde.

Fol. Salv. min.

Menth. crisp.

Fœnic. ana Mj. (alii Melissa: &
melius.

Affunde Vini generosi Mens. iij.
maceraque vase clauso & (14.) po-
stea destilla in MB, vel vesica stanno
oblita.

Vires. Vterum corroborat; suffoca-
tiones ejus compescit, flatu discutit, id-
que adeo feliciter, ut generosis ac nobili-
bus mulieribus Palatinatus, instar Pa-
naceæ in morbis uterinis habeatur. Cor-
roborat insuper ac calfacit ventriculum,
caput, ac reliqua viscera. Exiccat ca-
tarrhos.

Dosis à cochl. ʒ. ad ʒ. ʒc.

Medull. destillatoria, D. D. Weickhard.
in Thes. Pharmac.

47. Aqua vita mulierum camphorata

S. Spiritus matricalis cam-
phoratus.

ʒ. i. Dictas species priores affunde
V digerantur & destillentur.

2. ʒ. Camphor.

Ol. amygdal. d. ana. lb ʒ.

M. optimè digeranturque in MB
vel Cinerib. & ʒ (14.) ut camphora
totaliter cum oleo conjungatur.

Hinc superfunde præfatum spiritum
rursusque per & ʒ aliquot digere.
Sic Spiritus extrahit essentiam cam-
phoræ.

Tandem leni calore MB destilla us-
que ad sublimationem Camphoræ.

N. In rostro poni possunt grana Ker-
mex, quæ ruborem destillato conciliant.

Dosis gut. XX. ad XXX.

48. ∇. Virtutum.

ʒ. Cinnamon. el.

Gran. Paradisi ana ʒj.

Nucist.

Caryophyll.

Zinzib. ana ʒʒ.

Macis.

Galang. à ʒij.

Salv. ʒvi.

Vini Rhenani lib. vi.

Incisa & contusa infundantur per &
24. F. destillatio.

Vires eadem obtinet cum præceden-
ti.

49. Aqua vomitiva Pla-
teri.

ʒ. Nuc. jugland. viridi.

Rad. raphan. ana part. ij.

Acet. Vini part. iij.

Conquassatis nucibus & rapha-
no, F. digesto leni calore, dies (5. vel
6.) postea destilla ex MB.

Dosis ab ʒʒ. ad ʒij.

N. Non

N. Nonnulli fortiozem reddunt ad-
dendo nonnihil aqua benedicta.

50. Aqua Saturnina sive Æsculapj
vomitoria.

Destilla + fortissimum per XX
plumbeum magnum abijciendo quar-
tam partem aceti primò extillantis tan-
quam nimis debile, reliquum excipe ad

siccitatem ferè totalem, cavendo ta-
men ne ab aceti mellagine tetrum ac-
quirat odorem.

Dulce est gustui, datur ad ʒj. ij. & ul-
tra in febribus intermitt. pro Vomitorio
& contra Epilepsiam phlegmaticam à
Ventriculo suscitatum.

CAPUT XXXIX.

De Aquis reliquis.

P Ræter aquas destillatas sunt & aliæ
officinales, ex destillatis sc. simplici-
ve fontana, &c. accedente rerum alia-
rum incoctione, infusione, admixtione,
resultantes.

Modus parandi nihil discrepat à
modo decoctionis, infusionisve, alias
tradito.

Usuatiores hujus formule sunt,

▽. Ophthalmica, F. F. 1.

Ophthalm. Bruni. 2.

Ophth. Quercet. 3.

Aqua ad suffusionem expertissima. 4.

Saphireæ. 5.

Viridis. Collyr. Virid. 6.

Perlarum. 7.

Lac virginis. 8.

Caustica. 9.

Antipodagrica Quercetani. 10.

Antipodagrica I. Raici. 11.

1. ▽. Ophthalmica. F. F.

R. Dialb ʒij.

Baccar. Laur. excoct. ʒij.

Aq. rosar. alb.

fœnic. ana. fbi.

Bolliant l. Δ in cucurbita vitrea
ad consumptionem medietatis, hinc ad-
de Camphoræ ʒij. M. Filtra per char-
tam.

2. ▽ Ophthalm. Bruni. Collyrium
Bruni

R. Vini albi.

Aq. Rosar. alb. ana. ʒiβ.

Aloës Hepatic. subtiliter pulv. ʒj. F.
Collyrium.

Vires. Commendatur ad palpebrarum
scabiem pruriginosam.

3. ▽. Ophthalmica Querce-
tani.

R. Croc. metall. ʒi. vel ʒij.

Infunde in ▽ Euphrag. fœnic. aut si-
mil. ʒv. vel vi.

Vires. Virtutis mira est contra am-
blyopiam amaurosim & suffusionem.

4. Aqua ad suffusionem expertis-
sima.

R. Aquar. euphras.
Fœnic.

CAPUT XXXIX.

153

Verben. ana ℥iij.
 Succorum chelid. major.
 Rut. ana ℥ij.
 Piper long. ℥ij.
 Nuc. mosch. ℥j.
 Caryoph. 3℔.
 Croci ℥j.
 Florum, rorism. aliquantulum contrit. M℔.
 Sarcocoll.
 Aloës hepat. ana ℥iij.
 Fellis perdicum ℥j.
 Incisis tritisque singulis adde
 Sacch. albiss. ℥ij.
 Mell. rosat. 3vi.
 Ponantur in XX vitreo destillentur in
 MB Δ lento
 ℥ hujus aquæ ℥j.
 Spiritus Tart. rectificat. 3j.
 De hac aqua instilletur in oculum laborantem bis aut ter in die.
 5. ▽. Saphirea ad oculos:
 2. Lixivii Ψ cum ▽ fontana facti, & filtrati. q.v.
 In hoc solve * parum.

Id ubi exacte solutum fuerit, aquam hanc in æneam pelvim conjice per noctem & Saphiri acquirat colorem, &c. estque diaphana in vitro seposita.

Vires. Ad omnia ferè oculorum vitia imò ad ulcera quævis mundanda utilissima; cancrum, ambustionem, aliaque multa vitia sanare perhibetur. Oculis aliquot gutta tantum imponuntur, prout scil. multum parumve salis arisve continuerit. Efficax item est ad pelles oculo-

rum auferendas. Potest dilui ▽ still. fœniculi Euphrag. &c.

N. Est usitatissima Agyrtis.

6. ▽. Viridis. Collyrium viride.

2. Ærug. æris ℥ij.

Auripigment. citrini. 3j.

Aq. ros. alb.

Plantag.

Vini alb. ana ℥iij.

M. Bulliant simul, maneatque liquor super materiam.

Vires. Utile est in Pterygio, si oculo instillatur.

Huc pertinent Aqua Cordiales, Krafftwasser / qua si lac colore emulsetur lac, emulsione dicuntur, suntque ex ▽ stillatiis, pulveribus, aliisque cordialibus.

7. Aqua perlarum in Officina usualis.

2. Aq. Rosar.

Borrag.

Bugloss. ana. 3iv.

Manus Christi perlat. 3j.

Sacchar. cand. 3℔.

Alia.

2. Aq. acetos.

Borrag.

Bugloss

Rosar. ana 3iv.

Manus Christi perlat. 3iij.

Margarit. preparat. 3℔.

Syrup. Granat. 3j. M.

Vires. Vulgo notissima sunt utpote ad quas in extremis, tanquam ad ultimum levamen confugunt, cochl. subinde propinando.

V

Hujus

Huius quoque loci sunt & alii liquores
Aquei. *8.*

8. Lac Virginis.

9. Aqu. solan.

nymp.

laetuc.

Acet. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Dissolvantur in his

Lithargyr. argent. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Ceruf. candid. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Camphor. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Stent aliquot horis dum resederint,
quæ crassa sunt, tum transcolentur per
filtrum aut cribrum setaceum.

Ufus magnus lactis huius est, non so-
lum in decorandis Virginibus, acquiren-
doque nitore faciei, sed & in scabie emen-
danda sanguineq. sistendo: tum ad passam
frontem, i. e. passarum more rugatam ex-
planandam, exporrigendamque.

N. Aliud vide apud August.

9. Aqua caustica, F. F.

10. Spirit. Vini rectific. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Pulv. Caryophill. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Zinzib.

Cinamom. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Pulv. Ceruf. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Alum. ust. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

$\mathfrak{z}\text{ij}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Misceantur optime & servantur in
vase optime clauso.

Vires. Mundificat vulnera invetera-
ta, excrescentias exedit.

Alia.

11. $\mathfrak{z}\text{ij}$. ceruf. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Alum. ust. $\mathfrak{z}\text{ij}$ alb. a. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Aq. rosar. $\mathfrak{z}\text{ij}$ \mathfrak{ss} .

Fontanæ $\mathfrak{z}\text{iv}$. M.

10. Aqua antipodagrica Quercetani.

11. Aq. fontan. (potius pluvial.) in qua
aliquoties extincta $\mathfrak{z}\text{ij}$ & \mathfrak{ss} .

Adde vitrum $\mathfrak{z}\text{ij}$ ac $\mathfrak{z}\text{ij}$ dulc.

Vires. Resolvit tartarum, dolores so-
pit. Vid. Querc. Rediv. tom. 3. p. 263.

11. Aqua antipodagrica Joh. Raici.

12. Ap. terimachtim utriusque (i. e.
aq. levistic. à bolo & Terra sigill. de-
stillata) \mathfrak{ss} . i.

Laudan. $\mathfrak{z}\text{ij}$ al. (i. e. $\mathfrak{z}\text{ij}$ \mathfrak{ss} $\mathfrak{z}\text{ij}$ potius
 $\mathfrak{z}\text{ij}$ dulcis acet. fortissimi. an. macerati)

$\mathfrak{z}\text{ij}$.

Albadid. (i. e. ∇ ferri) \mathfrak{ss} ii.

Calcinationis lapidis de Alcohol.

(i. e. Croci metallorum) $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. Löffel in Podagra.

N. 1. Aqua albadid fit limaturam in
aqua macerando, postmodumque ut non-
nulli volunt per vesicam abstrahendo.
Verum enimvero melius foret, ut ex i-
psomet Raici ore in memoriam mihi re-
voco, Limaturam aëri humido exponere
atq. instante plenilunio ex cucurbita hu-
mili seu Urinali aquam destillare, iterum-
que aëri reponere, ac destillare. Quæ aqua
redolet naturam salis & itaque in quan-
titate minori adhiberi potest.

N. 2. Aqua podagr. Rulandi forsan ab
his non multum est diversa,

De Balsamis Otoriferis.

Balsami significationes varias dedimus libr. 1. Earum tres sunt, quæ peculiarem sibi in Officina vendicant locum Balsami scil. odoriferi, Balsami destillati, & Balsami unguentarii: de prioribus hic loci agere convenit, de posterioribus infra.

Balsami odoriferi sunt medicamenta, cum unguentis crassitie certantia, imo plerumque duriora, parata ut olea odorifera corpore crassiori retineantur, quominus exhalent.

Corpora, quibus olea illa incorporantur, sunt 1. Cera alba depurata, 2. Oleum nucis muschatæ expressum, tùm per se, id est, non depuratum, tùm depuratum. 3. Medulla vituli lota. 4. Manna depurata.

N. Quercetani Cœlestem Mannam, quam in Pharmacop. Rest. cap. 26. maximopere depradicat, alii Saccharum depuratum interpretantur, alii aliter. Verum enim vero nihil aliud à Quercetano intelligi, quam ceram depuratam, ex scriptis ejus parallelis liquet. Nimirum in trade, acetum Philosophicum ex acido liquore Manna Cœlestis parare docet, id quod de melle intelligi, cera scil. germano fratre, demonstratur in enodatione menstruorum, cap. 57. infra.

Depuratio ceræ & olei Nucistæ fit per V, inprimis Tartarifatam, ejus beneficio color & odor L. a. extrahitur,

relieto corpore albo, hujus loci idoneo.

N. Alii R. Cera alb. p. vj. Ol. amygdal. d. recent. p. i. V. ad eminentiam digiti unius, digerunt dies (3) hinc abstracta humiditate in MB. corpus reliquum balsamis conficiendis adhibent.

Modus vulgaris. R. Corpus requisitum, admisce olei q. s. ut f. instar linimenti, quod tingunt colore debito.

Modus præstantior. R. Corpus (Ol. Nucist. depurat.) adde extractum rei, cujus Balsamus expetitur, hinc admisce quoque oleum.

N. Proportio inter extractum & oleum est fere tripla, Olei scil. $\frac{3}{1}$. Extracti. $\frac{1}{3}$.

Balsama usitatiora sunt.

Balsam. Angelicæ.

Anisi.

Apoplecticum.

vide infra 1. 2.

Arantiorum.

Bezoarticus pe-

stilent. vid. 3.

Caryophyllorum

Cinnamomi

Citri

Cubebarum

Lavendulæ

Maceris.

V 2

Ma-

Majoranæ
Menthæ
Nucis moschatæ
Rorismarini
Rosarum
Rutæ
Succini
Zedoariæ.

De his vide suis locis, libr 4.

1. Balsamum apoplecticum Crollii secundum F.F.

℞. Ol. Nucist. expr. ℥ij.
Ambr. nigr. ℥iiss.
grif. ℥ij.
Mosch. opt. ℥if.
Zibeth. ℥iif.
Ol. Cinnam. ℥f.
Majoran.
Lavend. ana ℥f.
Caryophyll. gr. vi.
Succin. ℥ß.

Cum Balsamo Indico. q. s. F. Balsamum.

2. Aliter.

℞. Confect. anacard. ℥ij.

Ol. succin.

Lavendul. ana gutt. liij. vel

plures

Zibeth ℥ij.

M.F. Balsam.

Vires. Confortat caput, frigidosque humores discutit, adeoque in Apoplexia, Syncope, Paralyti, & similibus affectibus convenit, naribus inditus, vel quoque modo applicatus.

N. Mulieribus ob suavitatem minus commode adhibetur.

3. Balsamus Bezoarticus pestilentialis.

℞. Ol. Rut. st.

Citr.

Angelic. ana ℥ß.

Succin. rectific. g. v.

Camphor. ℥iij.

Ol. nuc. moscat. expr. ℥ß. M.

N. Oleum nuc. moschata lavetur aq. Ruta, Angelic. Citri, donec fiat album.

CAPUT XLI.

De Balsamis destillatis.

Balsami destillati nihil sunt aliud quam destillati Spiritus, cum Olei portione ex resinis, gummatibus, aromatibus & similibus interveniente Vini Spiritu prolecti.

N. Habes plurima balsama destillata in Antidot. Renodai p. 296. Item alia prestantissima Olea Balsamica in Pharmac. Spagy. Poteri p. 141. & sequentibus.

Balsamus simplicissimus est spiritus

albus thereb. in corpus viscidum rediens dum veterascit, ex plumaceolis admotus, vel ol. garyophyll. inspissatus (℥ß) cum gr. iv. salis hni itidem vulneri instillatus. Magis compositus sic fiat.

℞ Sulph. flavi tbi. resolvatur in tantundem ol. oliv. tamdiu bulliendo spatulaque ligneâ agitando, donec sanguinis colore tingatur, tum remove ab Δ & ad-

& adde cer. alb. ℥ij. & cum refrigerari incipit. adjice pededentim, tincturæ rad. aristol. rot. ℥℥.

tincturæ ♂ (ut est cap. de ♂) ℥j.

Olei myrrh. ℥℥.

Agitentur extra Δ ad consist. Unguenti rubentissimi, quod perlutum vulnera tam simplicia quam compos. perfanat.

Tinctura aristol. rot. ℥ rad. aristol. rot. in pulv. redact. ℥ij.

Terræ foliat. Sal. nit. (ut est in cap. de Sal. nit. ℥j.)

℥ ℥i. Digere super ☞ calidos, filtra & serva.

Usitiores sunt.

Balsamus vitæ, vide infra. 1. & 2.

nervinus, 3.

anti-arthriticus, 4.

antiparalyticus S. Cloff. 5.

mneme-cephalicus, 6.

Petri de Ebano, v. in dispensat. August. Oleum Balsami.

Huc pertinet & liquor seu Balsamus Saponis, v. infra. 7. 8.

1. Balsamus vitæ.

2. Myrrh. el.

Aloësepat.

Oliban.

Balsam. indic.

Bdell.

Ammoniac.

Sarcocoll.

Mastich.

Gum. arabic.

Storac.

Ladan.

Baccar. laur.

Axung. Castor. à 3vi.

Croc. 3℥.

Nucist.

Cinamom.

Caryophyll.

Gum. animæ.

Zedoar.

Galang.

Spic. roman.

Cardamom.

Cubebar. a. 3ij.

Pulverisata & mixta infundantur in V rectific. ad eminent. ditigi 1. digeranturque aliquamdiu. Hinc destillantur per retortam (vitream) in cineribus: Δ que lentissimo lampadis rectificentur.

Dein adde

℞. Ol. Anthos.

Majoran.

Chamomill.

Puleg.

Hyssop.

Salv.

Rut.

Spic.

Lavendul. à 3j.

Thymi.

Saturejæ.

Cubebar.

Zedoar.

Nucist. expr. à 3℥.

Cinamom.

Caryophyllor.

Rosar.

V 3

Citri

Citri.
Arantior.
Fœnic.
Anif.

Carvi ana. ℥ij.

M. F. Balsamus digerendo aliquandiu.

Vires. Cordiale est insigne, balsamumque nostrum mirabiliter recreat, putredinem arcet, sopitos spiritus vitales & animales excitat, cerebrum humidum ac debile confortat, flatus discutit, adeoque commendatur in Apoplexia, uterinis affectibus, lypothymia, &c. Quinimo adeo celebre hisce in oris audit, ut instar Panacea in omnibus fere morbis magnatibus expetatur; usus ejus tam externus, quam externus est.

Dosis gut. iij. iiij. & plur.

2. *Alius.*

℞. Serpilli M. iij.

Santali alb.

Citrin. ana ℥ss.

F. Sulph. ℥j.

Benzoi ℥ij.

Cort. aurant.

Citr. ana ℥ss.

Ambr. ℥ij.

Mosch. ℥ss.

CC. ℥vi.

Pulverisatâ ind. retort. affus. spir. vin. rectificat. ℔viii. Diger. per 14. dies, postea adde

Opobals.

Myrrh.

Aloes epat.

Olibani.

Bdellii.

Ammoniaci.

Sarcocoll.

Styr. liqd.

Mastic. opt.

Gummi Arabici.

Ladani.

Tacamah.

Galbaniana ℥ss.

Bacc. lauri.

Axung. Castorei ana ℥j.

Croci ℥ij.

Nuc. M.

Cinam.

Caryoph.

Gummi Anime.

Zedoar.

Galang.

Spic. ord.

Card.

Cubeb. a. ℥ss.

Spir. Terebint. in quo per mensem macerat. sint ℥ij. troch. de vipera. Hæc mixta cum superioribus digerantur per 8. dies, destillentur, Spiritus separetur, oleo vero adde

Ol. stillat. Junip.

Succini.

Ceræ ana ℥j.

Anisi.

Fœnic.

Cumini.

Rosmar.

Majoran.

Thymi.

Satureiæ.

Spic.

Cam.

Cam. rom.
 Cubeb.
 Zedoar. ana ʒʒ.
 Cin.
 Caryoph.
 Cort. aur.
 Rosar.
 Angel.
 Puleg.
 Salv.
 Rut.
 Lavend.
 Serpill. ana ʒʒ.
 Camph. ʒj.
 Jasmini ʒʒ.

Adde lbvi. Spir. vini rectific. Spir.
 separetur, oleum constituit Balsam.
 vitæ.

3. *Balsamus nervinus.*

℞. Ol. Terebinth. lb. i.
 Lauri ʒij. Misce.
 Hinc adde Gum. Galban.
 Elem. ana ʒv.
 Heder.
 Oliban. ana ʒij.
 Mastich. ʒj.
 Myrrh.
 Aloësepat.
 Laudan.
 Castor. ana ʒij.

Pulverisata admisce oleis, stentque
 aliquot (3.) Dein
 ℞. Galang.
 Caryophyllor.
 Cynamom. ana ʒʒ.
 Nucist.
 Zedoar.

Cubeb. ana. ʒʒ.

Diptamn. alb.

Consol. maj. ana ʒij.

Pulverisata infunde in lbis. vel q. s.
 V. Hinc misce cum prioribus, ac
 destilla per XX vel N vitream in ☉
 primo prodibit Spiritus, dein oleum
 flavum ultimo nigricans, collige si-
 mul oleum flavum ac spiritum pro
 balsamo.

Vires. *Calfacit, confortat nervos, Pa-
 ralyfin & Contracturam sanat, extrinse-
 cus illitus.*

4. *Balsamus anti arthriticus.*

℞. Mumia.
 Mastich.
 Thur.
 Myrrh. à ʒij.
 G. ammoniac.
 bdellii
 opopanac.
 Tartari. ana. ʒʒ.
 Mellis.

Qi roman. ana lb ii.
 Spir. Vini lb vi.

Destillentur per alembicum in re-
 ceptaculum amplum, cum quintuplici
 cohobatione.

*Corroborat articulos, eorumque de-
 fluxiones exiccat, dolores arthriticos
 lenit.*

N. Paulo aliter habet Weickard. Thes.
 Pharmac. libr. 6.

5. *Balsamus Antiparalyticus*

S. Cloffa.

℞. blepharum sive Taxonem tem-
 pore vindemiarum præpinguem, e-
 visce-

visceretur & impleatur sequentibus

℥ Galban.

Ammon.

Sagap.

Opopanax. an. ℥j.

Laudan.

Benzoin.

Styrac.

Olib.

Myrrh.

Bdell. an. ℥6.

Gumm. Carann.

Tacamah.

Elem. an. ℥ij.

Granor. Junip.

Laur.

Heder. arbor.

Cardamom. major. an. ℥j.

Herb. Chamædr.

Chamæpyth.

Beton.

Salv.

Absynth.

Majoran.

Origan.

Ormin.

Thym.

Spicænard.

Juxæarthrit.

Puleg. regal.

Menth.

Hyslop. an. M℥.

Florum Beton.

Chamæm.

Aneth.

Lavend.

Hyperic. an. p. ij.

Sem. Anis.

Fœnic.

Dauc.

Carui.

Ameos.

Apii.

Bardan. maj. a. p. i.

Axung. Ursi.

Vulp.

Anat. ana ℥ij.

Medull. Cruc. vitul. &

Bubuli ana ℥ij.

Sal. communis Mi.

Concidantur, tundantur & Virro-
rentur, adde

Thereb. Ven.

Cer. nov. ana quart. i.

Consuantur fortiter & lento Δ in
veru assentur & liquor inde stillans su-
pra carnem rejiciatur idq; tamdiu, do-
nec raro tota torrida sit, substillatus li-
quor vel adeps recondatur, cujus parti-
bus duabus admisceatur Balsami Sulph.
Rulandi pars una.

Vires. Mira præstat in morbis frigidis
& Ischiadicis.

6. Balsamus mneme cepha-
licus.

℞. Succ. fol. Meliss.

Flor. myric.

Lilior.

Primul. ver.

Rorismarin.

Lavendul.

Borrag.

Genist. ana ℥ij.

Aq. vir-

Aq. Vit.
Nymph.
Rosar.
Violar. an. ʒi.

Cubebæ.
Cardamom.
Gran. paradif.
Santal. Citrin.
Carpobalsam.

Ireos.
Croc. or.
Satureiæ.
Pœoniæ.
Thym. an. ʒß.
Styrac. lig.
Calamit.

Opopanax.
Bdelli.
Galbani.
Gum. heder.
Ladan. an ʒvi.
Rad. aristoloch. long.
Pœon.

Ol. Terebinth.
Nardin.
Costin.
Juniper.
Laurin.
Mastichin.
De been.
De spica an. ʒv.

Pulverisanda pulveriscentur & misceantur omnia. Destillantur per XX f. gradus Δ. ▽ & oleum separetur.

Vires: Tanta efficacia esse scribunt, ut perpetuam rerum memoriam pariat.

Usus ejus hunc esse ferunt, ut primis

2. mensibus nares, & aurium meatus quotidie, magnitudine pisicillanantur sequentibus 2. mensibus tertio quoque die, aliis 2. mensibus bis in septimana, deinceps singulis septimanis semel. Hinc 14. diebus semel, ut ita annus compleatur tandem annis sequentibus, singulis semestribus semel.

Aqua in capitis affectibus, frigidis ac catarrhosis utilissima est, uti & balsamus.

N. Ferunt Carolum Ducem Burgundie à Doctore quondam Anglo decem milibus floren. emisse. Vid. Sennert. practic. lib. 1. part. 2. c. 5.

7. Liqueur seu Balsamus Saponis.

℞. Saponem Venetum incisum, affunde Spiritum Vini, atque semel ac iterum destilla; affunde denuo eundem, & relinque in loco calido, postea per chartam filtra, est instar olei brunnei, seu spadicei coloris.

Vires. Subleuat podagricos dolores si locus affectus eo illinetur.

8. Oleum saponis alio modo.

℥ Saponis Veneti aut Hispan. scabendo probè imminuti & argillæ communis ana partes æquales, formentur globuli instar nuc. mosch. & coniciantur in ♀ magno Recip. instructam, pelle in Reverb. clauso primo lento Δ postea validiori ad totalem usque ♀ uum expulsionem, tandem Oleum fuscum prasinum ab acutissimo spiritu separa, quod per rectificationem in citrinum mutabitur.

Vires. Deterget & resolvit potentissimè, ratione ingredientis lixivij, dolores juncturarum à causâ frigidâ compescit, coacta digerit, contusa dissipat, urinam

præpeditam movet, colicam flatuosam solo Umbilici litu resolvit. Ex communicatione S. Gloss.

CAPUT XLII.

De Bolis.

Boli in officinis pro usu nulli extant, sed ex præscriptione usui extemporeo parantur, idque vel miscendo solum, vel inspissando, &c.

Fiunt ex Electuariis, pulpis, conservis, pulveribus in consistentiam minus fluidam deglutibilemque redactis.

N. Cavendum ne sapore ingrato abdominalis evadat.

Exempla.

I.

℞. Rhabarb. pulveris. ℥j.

Conserv. Rosar. rec. ℥ss.

Cum Syr. rosar. sol. F. Bolus.

II.

℞. Elect. lenitiv. de manna. ℥ss.

diaphanic.

diacatholic. à ℥ij.

Cum saccharo alb. F. Bolus pro vice una.

N. Addi potest & pulvis conveniens.

Vires. Purgat humorem serosum ac biliosum.

III.

℞. Conserv. rosar. antiqu. ℥ij.

Laudan. opiat. gran. iiss.

F. Bolus.

Consert in fluxu alvi & sim. dolorem sedat, somnum inducit.

IV.

℞. Cassiæ rec. extract. ℥j.

Sem. anis. ℥j.

Cum oleo amygdal. dulc. rec.

F. Bolus in niphritide.

V.

℞. Prunor. damasc. num. x.

Sebesten. num. vii.

Passul. enuel. ℥ss.

Coquantur cum aqua colenturque fortiter. Hinc adde

Pulp. cass. ℥ij. coquantur denuo ad spissitudinem mellis. Tum adde

Pulv. sen. ℥ij.

Cum Sacchar. F. Bolus pro 2. vel 3. vicibus, &c.

De Calcibus seu Calcinatis.

Calcinationem sex fieri modis diximus lib. 1. Ex his duo, non nisi ignem requirunt, reliqui aliud aliquid (Δ potentialem vocant) insuper expetunt, cujus beneficio calcinatio peragatur.

Mineralium calcinationes dabimus sigillatim, lib. 3.

Vegetabilia, v. g. herbae, radices, ligna, cortices, aliaque φλόγισα igne comburantur luculento, donec in cinerem fuerint redacta.

N. Simili modo incinerari possunt, & capita mortua ex destillationibus residua, si super lamina ferrea vel in fictili comburantur.

Animalia, horumque partes molliores comburantur ut plurimum in fictilibus clausis & lutatis) ad nigredinem usque. Sic aves comburantur cum pennis, lepus cum pelle, &c.

Cornua, triplici exponuntur calcinationi: Ustioni, vaporationi & corrosioni; quam praecipitationem quidam vocant.

Ustione comburantur cornua, donec per nigredinem albida facta, sint. Idque plerumque in fornace figulina fieri solet. Hinc cornua usta dicta.

Vaporosa calcinationis modus hic est: Cornua suspenduntur ponuntur vè

in capitulo, parte vè superiore Vesicae, quae aliquota liquoris portione adimplenda sit: hinc subitus accenditur ignis, ut vapor vi caloris elevatus, cornua penetrando friabilia paulatim candida q; reddat.

N. Opus hoc est fere & 3. diciturque philosophicè calcinari.

Liquor adhiberi poterit vel ∇ simplex, destillata vè appropriata, vel succus decoctum vè medicae intentioni respondens. Liquor autem ne qua penitus exhalet, recentem subinde affundere oportet.

Corrosiva calcinatio fit affusis liquoribus acidis, v. gr. aceto, Spiritu Sal. nitr. Θ i, & sim. quibus scil. ossa vel cornua grossè contusa, rasae solvuntur, corro-duntur, postmodumque in calcem (quam magisterium vocant) praecipitantur. Vide c. 6. 7.

N. Simili modo calcinantur & crustacea.

Modus potro calcinationis ut diversus est; ita calcinata diversorum sunt nominum. Hinc calces, cineres, croci, salia, usta.

Sic sunt:

-- Calx \odot is; vide libr. 3.

ζ x, vide libr. 3.

Cineres plurimi è quibus tamen officinis 4. usitiores, adeoque κατ' ἐξοχήν 4. Cineres dicti.

X 2

Aq-

Absynthii		Cervorum pulli
Fabarum è stramine.		Cuculus
Genistæ		Erinaceus
Sarmentorum Juniperi		Hirundo
Crocus Metallorum	} vide } libr. } 3.	Lepus
Martis aperitivus		Passer troglotides
adstrictivus		Serpens
Veneris		Cornu cervi ustum
Uti si combusti Cancr.		alcis.
		Ungula equi.

CAPUT XLIV.

De Cataplasmatibus.

Cataplasmata fiunt ex rebus medicinalibus, quæ vel pulverisata, vel quoquo modo in pulvis consistentiam, sive per se, sive adhibita humiditate redigi possunt: præcipue tamen parantur ex herbis (viridibus siccisvè) radicibus, floribus, seminibus, oleis, fructibus, axungis, farinis, micis panis, & similibus.

Modus fiendi adhibetur pro re nata; cum, vel sine igne. Sine igne fit ex herbis viridibus, contusis aut earum succis expressis aliisque liquoribus convenientibus, quibus reliqua admiscuntur ut fiat pulcullæ instar. Ignis beneficio coquantur res cum liquore conveniente cum cataplasma: vel fructus succulentius ut mollescant elixantur, hinc exprimitur pulpa per setaceum, eique reliqua admiscuntur.

N. 1. Liquor pro rei necessitate varius est, aqua, lac, vinum, & simil.

N. 2. Sicca præstat optimè pulverisatam.

sare, viridia conquassare, & ad putrilaginem coquere.

N. 3. Cataplasmata tepide fere imponuntur, exceptis anacollematis & sinapismis, &c.

Officinalia nulla extant.

Exemplo ergo sint:

Cataplasma resolutivum Foresti. r.

contra cruorem, Terband. 2.

de nido hirundinis. 3.

Antifebrile. 4.

Anacollemata. 5.

Sinapismus. 6.

Vesicatorium. 7.

Cataplasma resolutivum.

Foresti.

R. Flor. Chamomill.

Stœchad.

Sum. Absynth.

Rut.

Caulium & stipitem eorum.

Salv.

Sabin. à Mj.

Cœque

Coque omnia simul in lixivio ex cinere quercus vel sambuci, vel vitis alba; deinde pistentur addendo pulverem qui

℞. Alumin.
Sulphur.
Gallar.
Cypress.
Sal. commun. à ʒss.
Aloes.
Baccar. Laur.
Pyrethr.
Sem. caul. à ʒij.

In fine addatur sterces recens columbarum vel caprarum.

Vires. Resolvi crassos humores ac tumores inde ortos, ut varices, elephantiam Arabum. Forest. lib. XXIX. observat.

25.

2. Cataplasma contra Cruorem; vulgo Terband.

℞. Bol. armen. ʒij.
Cretæ ʒj.
Prunor. Sylvestr. succ. ʒj.

Pulverisa quam minutissimè & coque cum aceto acerrimo, hinc admisce.

Radic. symphit. pulverisat. parum.

In fine adde Farinæ avenac. q. s. ad consistentiam cataplasmatiss, subinde instillando nonnihil olei myrtillorum.

Vires. Cruorem ex casu vel contusione collectum resolvit & siccat. Felix Wirz. in Chirurgia.

N. Ejusce farina cataplasmata inter-

Chirurgos usitatissima sunt, fiuntque ex terra sigillata, bolo armeno, sanguine draconis, cerusa, pice, resina, succino, lapid. calamin. succo acaciae & similibus adstringentibus & exiccantibus.

3. Cataplasma Laxativum.

℞. Rasuræ rad. bryon. rec.
Mell. comm. liquid. ana fbi.

Fellis taurin. fss. M. F. Catapl. quo venter inferior vesperti in introitu lecti per noctem emplastratur. Puerulis ad alvum bis terve movendam lumbricosque tum necandos tum excludendos sufficit. In adultis v.

℥ Succorum cucum. agrest.

Panis porcin. ana ʒj.

Lactis ricin. &

Tithym. ana ʒss.

Pulv. hyer. pier. ʒij.

Pulp. colocinth.

Helleb. utriusque ana ʒij.

Cass. rec. extract. ʒij. aut iij.

Nutrientur omnia simul F. Catapl. quod ventri admoveatur ab umbilico ad pubem, vel cum butyr. vetusti putrefacti q. s. incorporentur in Unguentum.

4. Cataplasma de nido hirundinis
Mynsicht.

℞. Nidi hirundinis num. i.

Alb. græci ʒss.

Rad. Alth.

Lil. alb. à ʒj.

Caricar. ping.

Dactylor. an. num. iij.

X 3

Co

Coque in ∇ ad remanentiam pultis,
postea adde

Ol. Violar.

Farin. Chamæmel.

Fænigr.

Sem. Lin.

Tritic. ana $\mathfrak{z}\text{vi}$.

Cerebr. cati $\mathfrak{z}\beta$.

Pulv. noct. combust.

hirund. combust. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Vitell. ovor. num. ij.

Croc. orient. $\mathfrak{d}\text{j}$. M. F. Catapl.

*Commendatur in angina desperata
collo sapius tepide applicatum.*

5. Cataplasma antisebrile.

$\mathfrak{z}\text{x}$. Fol. urtic. maj.

Solan.

Semperviv. ana Mj.

Tel. aran. $\mathfrak{z}\text{ii}$.

Sal. q. s.

F. Catapl. applicandum pulsib. in
feb. Petr. Hisp.

Hinc pertinent & *Anacollemata*, quæ
nihil aliud sunt quam Cataplasmata
frontalia, intercipiendæ defluxioni
consecrata, adeoque fiunt ex adstrin-
gentibus quæ ut plurimum albumine
ovi subiguntur. E. gr.

6. *Anacollema frontale.*

$\mathfrak{z}\text{x}$. Mastich.

Thur.

Myrrh. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Bol. arm.

Pulv. later. à $\mathfrak{z}\beta$.

Croci $\mathfrak{d}\text{i}$.

Cum Albumin. ovi, Ol. rosac. &
pauillio acet. F. Frontale.

*Vires. Prodest in leppitudine aliisque
affectibus oculorum fronti impositum.*

Aliud.

$\mathfrak{z}\text{x}$. Argillæ ustæ.

Farinæ volatil. Staubmeel.

Boli armen. à $\mathfrak{z}\beta$.

Suc. Acac.

Hypocist. à $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Cum Album. ovi & modico aceto
F. Frontale.

*Vires. Convenit in Hemorrhagia na-
rium.*

*Huc referendi sunt & Sinapismi ve-
sicatoriaque in forma Cata-
plasmatis.*

Hæc fiunt ex sem. Sinapi, nasturtii,
urticæ; radic. thapsiæ, cyclamin. bryon.
scillæ, allii, Euphorb. cantharid. & si-
milibus, susceptis pulpa ficuum, fer-
mento, melle, oxymelite, sapone & si-
milibus.

7. E. gr. *Sinapismus.*

$\mathfrak{z}\text{x}$. Pulpæ caricar. (in \mathfrak{x} coctar.)
 $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Sem. linap. $\mathfrak{z}\text{ij}$. M.

Ruborem cuti inducit.

8. *Vesicatorium.*

$\mathfrak{z}\text{x}$. Cantharid. præparat. (i.e. alias &
capitibus abscissis, num. xxx.

Fermenti acris. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Cantharides pulverisatæ suscipiantur
fermento, humectando si opus sit aceto
acri.

De Clysteribus.

Clysmus, Clysma, Enema, est liquor imprægnatus facultate medicamentali, per syphonem in intestina intromittendus.

Duo ergo continet. 1. Liquorem. 2. Facultates, quibus liquor imprægnatur.

Liquoris est decoctum (plantarum, pisorum, carnis, &c.) vel similis humor Medici intentioni commodus. E.gr. Urina, lac, serum lactis, oleum, &c. simil.

Facultates Clysterum variæ esse possunt, purgantes, alterantes, anodynæ, lithontripticæ, carminativæ, abstergentes, adstringentes, &c. Inter cæteros tamen usitatiores sunt clysteres purgantes, qui ut plurimum compositi sunt, fiuntque ex partibus (4. 5.) decocti alicujus emollientis, partibus (1. 2.) olei, additis insuper purgantibus ac stimulantibus, v. g. Electuariis speciebus &c. similib.

N. Purgantium dosi duplo major esse potest in clysteribus, quam in assumendis; oleum additur ubi emolliendum erit, omittitur ubi fortiter purgandum & revellendum.

Dosis est ab ℥iij. in infantibus, ad xii. vel xv. in adultis.

Modus parandi liquecet uno ac altero exemplo.

1. R. Urinæ lb. i. F. Clysma in Hydropse.

2. R. Oleum Olivæ ℥v. vi. vii. F. Clysma ad leniendam alvum.

3. Herb. emollana M. j.

Rad. Alth. ℥j.

Fl. Chamomill. M. β.

Fic. ping. N. v.

Vitell. ovi, num. i.

Coque in sq. aquæ ad lb. i.

In colatura dissolv. cass. pro Clysteribus ℥vi. Bened. laxat. ℥β. Ol. Chamæmell. ℥iij. Sal gemmæ. ℥j. vel Sacchar. rubr. ℥β. ad ℥j. F. Clysma.

N. Sunt qui sal commun. vel gemma ad ℥j. usque injiciunt. Verum podex loci maxime sensibilis est, præstat dosin hanc imminuere.

Huc referendi quoque sunt Clysteres uterini (μτεγχυστα) qui itidem sunt liquores medicamentales per syphonem (μτεγχυστον) in uterum fundendi. Liquor itidem hic varius adhiberi potest, aqua stillatitia, decoctum, succus vel simile quid, cui pro rei exigentia admiscantur pulveres, Electuaria, olea &c. simil.

Dosis pro vice una sufficiens est ℥iij. vel v. vi. præter propter.

Exem-

Exemplo sint.

1. *R.* Decocti Equiseti & Tormentill. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Olei Myrtin. $\mathfrak{z}\text{ss}$. Trochisc. despod. $\mathfrak{z}\text{j}$. M.F. Clyster, in mensium fluxu.

2. *R.* Hydromel. $\mathfrak{z}\text{ij}$. v. mell. $\mathfrak{z}\text{ss}$. F. Clyster ad eluendum uterum.

3. *R.* Succu mercurialis depurati, vel decoct. rubiæ tinct. Eryng. aut

cyclaminis, vel radic. aper. vel salviæ, matricariæ, nepetæ $\mathfrak{z}\text{ij}$. Pulv. myrrhæ $\mathfrak{z}\text{j}$. Clyster ad promovenda menstrua.

Ad hunc locum pertinent & Iniectiones penis, quæ itidem ex liquore conveniente fiunt, siye decoctum is sit, siye aqua stillatitia, vel similis.

CAPUT XLVI.

De Conditis.

Cnditorum constitutionem absolvunt res condiendæ ac liquor condiens, quibus pro lubitu aromatizans accedit.

Res condiri aptæ sunt, *radices, cortices, caules, fructus, nuges, & flores aliquot.*

Duo in rebus condiendis præcipuè consideranda occurrunt.

1. Quia res condienda vi liquoris intus ac extus perfundi postulat, mollem illam esse nec nimis crassam oportet.

2. Quia esui condita præcipuè destinantur, haud ingrata ac gustu abominabilia ea sint, fas est. Hinc si durior & amarior res condienda fuerit, maceratur antea in ∇ frigida dies (5.6.7.8. pro re nata) singulis diebus aquam deplendo, recentemque dando, vel coquatur insuper donec mollescat. amariorque quodammodo extrahatur. Cave autem ne nimia extractione solum cadaver condiendum

relinquatur. His adde, si crassior, major, solidior res condienda foret, secundam eam esse, pro exigentia, secundum longitudinem, latitudinem, tessulatum, &c.

N. 1. Loco aqua nonnunquam lixivio macerare expedit, hinc aqua simplici dulcorare.

N. 2. Quod si libuerit condita aromatizare, aromata condiendis insigi poterunt.

Liquor, quo res condiuntur est Saccharum clarificatum & syrupisatum, id est, in aqueo liquore dissolutum, & ad syrupi consistentiam inspissatum; nonnunquam mel depuratum, aliquando muria.

Sic condiuntur.

I. Radices.

R. Radices benè purgatas (integras si teneræ fuerint, vel sectas, si crassiores) exemptis si opus sit lignosis partibus, redige ad mollitiem & si opus sit, ad saporem gratiorem, ut docui

docui, hinc sicca & cum Sacchari ana. (circiter,) tantilloque decocti proprii, vel aquæ, coque ad consumptionem humiditatis, consistentiamque Syrupi.

II. Cortices.

Cortices nihil à radicibus peculiare habent.

III. Caules.

R. Caules (à pellicula exteriori purgatos) reduc ad mollitiem, hinc coque cum ana Sacchari in decocto solum, ad consistentiam.

IV. Fructus.

R. Fructus molliores (e.g. cerasa, baccas, ribes, berberes, mala persica, & simil.) affunde Sacchari Syrupisati vel mellis part. dimidiam, coque ad consumptionem humiditatis, alias situm contrahit.

Duriore, ut poma citria, cytonia, & simil. prius ad mollitiem redigendi sunt, amariores ad saporem gratiorem. Limonia & olivæ muria imponuntur.

V. Noces.

R. Noces virides, perfora stylo, macera dies (9. 10.) in ∇ frigida l. 2. hinc coque ut mollescant; siccitas aromatisa, configendo cinamomo aut caryophyllis, cumque sacchari ana. ac aquæ q. s. coque.

VI. Flores.

Flores condiuntur affusione Sacchari syrupisati. Sunt autem pauci qui hac ratione integri condiuntur, scilicet flores citri, arantium, & in-

terdum rosarum. Ex reliquis fiunt potius conservæ. Capparum flores sale; genistæ, sale & aceto condiuntur.

N. Sunt qui flores albumine ovi conquassato illitos saccharo pulverisato aspergunt, solis calori exponunt, floresque hac ratione integros coloratosque conservant.

Condita officinalia usitiora sunt.

Condita Aurantia poma integra ac in partes dissecta.

Aurantiorum flores.
cortic.

Berberes.

Borragin. rad.

Calami aromat. radic.

Cassia.

Cerasa amarena.

Cichor. rad.

Citria poma integra.
in taleolis.

Citria maxima cum Carne;

Citrinat.

Citria sicca, fructuener Citrinat.

Citri cortices, eingemachte Citron-
Schalen.

flores.

Consolid. maj. rad.

Corna.

Cydonia, eingemachte Quittin.

Cynosbati bacca, eingemachte Han-
bitten.

Enulæ rad.

Eryngii rad.

Y

Lactu-

Lactucæ Hisp. caules sicci, truchene

Lactuc.

Mala armeniaca præcocia, eingemachte Möstelen / oder Mamine-leucken.

Mespila integra.

Myrobalani Belliric.

afferuntur con-
Chebulæ *dita ex*
Citrinæ *India.*
Emblicæ

Nuces Indicæ, scilicet moschata, cum involucris, ganze Muscatnuß mit Schelffen.

Nuces moschata, scilicet sine involucris, eingemachte Muscatnuß ohne Schelffen.

Nuces Juglandes.

Perfica.

Pimpinellæ rad.

Piper nigr. in racemis ex India affer-
tur.

Pruna sylvestria, eingemachte Schle-
den.

Pruna citrina, eingemachte Spelling.

Pyra muscatella, eingemachte Zucker-
Bierlein / oder Muscateller
Bieren.

Rhabarbarum.

Ribes.

Satyrii rad.

Scorzonæræ rad.

Sorba, eingemachte Speyerling.

Zedoariæ rad.

Zingiber, Chinense.

commune.

*Sunt & quacondiuntur aceto,
sale, & simil. ut*

Modus condiendi est.

1. Consperge cum sale ac compri-
me, ut sal in exudante humiditate li-
quescat.

N. Si res condienda minus succu-
lenta fuerit, affundi poterit modicum
v.

2. Affunde + stentque ut pene-
tret, vel si nimium liquoris sit, exhalet
aliquantulum.

Sic prostant.

Condit Cappares.

Cucumeres.

Oculigenistæ.

Limonia poma.

Olivæ.

Portulacæ summitates.

C A P V T XLVII.

De Confectionibus Saccharatis.

Confectiones Saccharatæ,

id est:

R Es Saccharo obductæ, sunt.

1. Saccharatæ sive Sacchara-
cæ, simpliciter ita dictæ. 2. Confectiones
Saccharo cando seu candifato in-
ductæ. His 3. subungere licet

Sacchara succis florum certorum sub
colore horundem imprægnatæ. Sac-
chara insuccata non immerito vocave-
ris.

*Modus conficiendi confectiones
Saccharatas.*

1. Rem conficiendam, inde pelvi
cupreæ

cupreæ (Confect Ressel.) Saccharumque syrupisatim paulatim instillando, continuo supra calorem versa, ut humiditate absorpta Saccharum rei conficiendæ adhæreat, ac tandem instar crustæ eandem obducatur.

Res quæ hoc modo conficiuntur sunt semina, nuclei excorticati, aromata, radices, cortices, ut & flores ac summitates, sed raro.

N. 1. Semina si opus sit præparantur prius macerando in $\frac{1}{2}$, ut semen Coriandri.

N. 2. Si amariora conficienda fuerint, corrigi volunt antea, ad modum, quem in conditis docuimus.

Res quæ confectiones confiuntur est Saccharum Canariense, interdum Saccharum candifatum.

Plerumque primum amylo res conficiendæ obducuntur, hinc Saccharum superducitur. Unde duplicis generis confectiones proflare solent; finæ scilicet ex mero saccharo, & minus finæ ex amylo & saccharo, uti dictum, præparatur.

Modus conficiendi confectiones saccharo candifato incrustatas non differt ferè à modo condiendi, nisi sola brodii condientis saccharati, consistentia, nimirum hoc si crassius fuerit, saccharum in crystallos concreuit, resque injectas quæ crusta obducit.

Confectiones usitiores Saccharata sunt.

Confectio Amygdalarum dulcium

überzogene süsse Mandeln.

Amygd. amarar.

Anisi, überzogen Anis Samen.

Laxativi, Purgier Anis Zucker.

Calami aromatici, überzogen Calamus.

Cardamomi minoris, Cardamomen Confect.

Carvi, id est seminis, überzogen/Rümmel.

Caryophyllorum, überzogen Negel.

Cichorei rad. überzogen Cichorenw.

Cinz. Santonici. sem. lumbricorum, überzogen Wurmsamen.

Cinamomi, Zimmet Confect/überzogen Zimmet.

Coriandri, überzogen Coriander.

magni, mit grosser Crispatur.

Corporis sine anima, confectio.

Moschardina, moschata, Bisem 3.

Cubebæ, überzogen Cubeben.

Dauci communis, überzogen wild Möhrensamens.

Fœniculi.

Lavendulæ florum.

Macis.

Majoranæ sem.

Pimpinellæ rad.

Pinearum.

Zedoariæ.

Zingiberis.

Confectiones Candifata scilicet Saccharo cando incrustata.

Confectio Acori, Candisirten Calamus.

Aurantior. cort.
 Caryophyllorum
 Cinnamomi.
 Citronata i.e. cort. citri.
 major.
 Citri cort. i.e. minor.
 Macis.

Nucis moschat.

Zingiberis.

Huc

Sacchara insuccata.

Saccharum rosaceum
 violaceum, &c.

CAPUT XLVIII.

De Conservis.

Res conservisandæ (conservandæ)
 ut plurimum flores sunt, raro her-
 bæ, rarius radices, rarissime caro fru-
 ctuum.

Modus.

3. Quod conservisare volueris, con-
 quassa (mortario præcipuè lapideo pi-
 stilloque ligno) atque inter quassan-
 dum admisce Saccharum.

Proportio Sacchari variat: In re-
 bus humidioribus ac mucilaginosi-
 s conservisandis, recipitur duplum: in
 siccioribus; ad triplum usque ascen-
 ditur, additurque nonnihil ∇ æ stilla-
 titiæ.

Flores & herbas recentes conservisa-
 re oportet, attamen si nimia humidita-
 te scatent, in umbra exiccati aliquan-
 tum expetunt.

N. 1. Sunt qui ex floribus ac sac-
 charo S. S. S. faciunt, soliꝝ idipsum ex-
 ponunt. Alii Iulepum conficiunt, eum-
 que admiscendo conservisationem absol-
 vunt.

N. 2. Poteris iidem, si volueris,
 flores vel herbas conservisandas in mi-
 nutissimas antea incidere partes, hinc

addito Saccharo conservisare uti di-
 ctum.

Radices prius coquendæ sunt, dein
 conquassandæ vel & per fetaceum tra-
 jiciendæ, hinc conservisandæ.

Caro fructuum omnino fetaceum
 trajici expetit.

Conserva usitiores
 sunt.

Conserv. Absynthii romani è summi-
 tatibus.

Acaciæ flor.

Acetosæ fol.

Acetosellæ fol.

Anthos, id est, flor. rorismar.

Betonic. fl.

Borragin. fl.

Buglossæ fl.

Calendular. fl.

Cardui bened. summ.

Cichorii ex fl.

Citri pulpæ s. medullæ.

Cochleariæ fol.

Consolidæ major. flor.

Euphragiæ summ.

Fumariæ summ.

Galegæ summ.

Geni-

Genistæ flor.
 Heder. terr. comp. Aug.
 Lavendulæ fl.
 Liliorum alb. fl.
 Liliorum convall.
 Majoranæ summit.
 Malv. fl.
 Meliss. fl.
 Menthæ.
 Nymphææ alb. fl.
 Papav. errat. fl.
 Portulacæ fol.
 Pœoniæ fl.
 Perficorum fl.
 Primulæ veris fl.

Prunellæ fl.
 Pulegii summit.
 Rosarum albar.
 rubrarum recens & antiq.
 Glata.
 Salviæ fl.
 Sambuci fl.
 Scabiosæ
 Scordii
 Tiliæ fl.
 Tunicæ fl. i.e. caryophyll. hort.
 Tussilaginis fl.
 Veronicæ summit.
 Violarum martiarum.

CAPUT XLIX.

De Decoctionis.

Decocta fieri possunt ex rebus omnibus, quæ pronæ sunt, virescunt, lixatione brodio suo communicare, adeoque ex mineralibus, vegetabilibus, & animalibus.

E Mineralibus non respuunt decoctionem Terræ crudæ calcinatæve, Lapides calcinati, Metalla calcinata, Antimonium crudum & calcinatum, & us crudus cinnabaris, Lithargyrium, Sulphur. Nimirum aquæ etiam simplicis incoctæ vires quasdam impertiunt, maxime tamen, si adhibitus fuerit liquor facultate penetrante gravidus, qualis Vinum, Acetum, Aquæve stillatiæ. Quin & Metalla ignobiliora, potissimum si calcinata ea fuerint, verbi gratia, minium, cerussa, limatura ferri calcinata, & sim. decoctioni apta sunt.

Decoquantur autem hæc omnia, in pulveres redacta.

Ex Animalibus decoctioni parent, partes carnosæ, membranosæ, cornuatum crudaraspata, tum calcinata, & sim.

Verum enimvero, hic loci de Decoctionis potissimum agemus potulentis, in praxi usitatoribus; quæ Apozeugmata communiter dicunt. Hæc parantur in primis è vegetabilibus: videlicet è radicibus, corticibus, herbis, floribus, baccis, fructibus, lignis. Superadditis tamen nonnunquam (sed raro) nonnullis à mineralibus aut animalibus.

Liquor in quo res & communiter elixantur, est aqua fontana, hæc (adhibenda, quoties alius alicujus men-

tio nulla fuerit facta,) aqua pluvia, aqua destillata, (sed non adeò commodè ob spirituosæ portionis exhalationem, nisi coctio in diplomate instituat,ur,) serum lactis, hydromel, Vinum.

N. Hoc præstat in fine coctionis superinfundere.

Quantitas liquoris ad res coquendas varia sumi solet, prout sc. res longiorem vel breviorē coctionem expetierint. Duriores siquidem ac solidiores ut diutius sunt coquendæ, ita majorem liquoris quantitatem requirunt, quippe coctione liquor paulatim exhalat. Sumitur autem e. gr. proportio quadrupla; sextupla, decupla, duodecupla, &c. Respondente enim Man. i. ʒʒ. ʒv. vel ʒvi. pugillo ʒij. vel ʒiij.

Modus parandi absolvitur.

1. Præparatio ad decoctionem.
2. Decoctione.
3. Clarificatione.

1. Præparatio fit incidendo, contundendo, radendo, limando, &c.

2. Decoctio fit vulgariter. 1. Δ e nudo. 2. Vase aperto æneo stanno obducto. 3. Ordine observato, sc. a. Est autem coquere sc. a. materias coquendas non simul & semel injicere, sed diversis vicibus, prius posterius, prout naturæ volatilioris, fixioris, mollioris, durioris, solidioris, res fuerint. Nimirum si cornua, ligna, cortices, radices, folia, semina, aromata ac flores decoctioni destinantur, primum cor-

nua, ligna, cortices & radices aliquandiu coquenda sunt, hinc folia ac semina superinjicienda, tandem quoque sub finem decoctionis, aromata & flores; utpote quorum vis facile in auram evanescit.

N. Res duriores macerantur prius aliquandiu.

3. Depuratio fit vulgariter albumine ovi, cum quo decoctum expressum, vel saltem colatum ebullit, quod dein per colum trajicitur. Vide lib. i. c. 14. Clarificate.

Vsurpatio. Quia saporis minus grati ferè sunt decocta, gratia conciliatur Saccharo Syrupove addito ad singulas doses ʒj. plus minus, pro palato ægroti. Quin imò & aromaticus sapor super addi ferè solet; nonnihil ex aromatibus commiscendo.

Sunt decocta celebriora.

Decoctum

Alterans, vide infra, N. 1.

Antimonial. 2.

Aperitivum majus. A.

— cum Rhabarb. A.

minus sc. lenitivum.

minus A.

Capillorum veneris, A.

Carminativum Clysmaticum, Cord.

Clysterum remollientium, Cord.

Commune ad dissolvenda solutiva

Cord Renod.

Commune Medicinale cum & sine fena. A.

Epaticum 3.

Epatis vituli, 4.

Epi-

Epithymi, A.
 Florum & fructuum, A.
 Fumariz.
 Hystericum, s.
 Majale, 6.
 Pectorale simplex & compositum, A.
 Purgans Quercetan. 7.
 Splenis bovis; 8.
 Senæ, v. A.

1. Decoctum alterans.

R. Santal. rubr. ʒss. (alii ʒvi.
 Succ. citri recent. ʒss. alii ʒj.
 Sacchar. clarificat. ʒj.
 Aq. fontan. puriss. lb. iij.

Stent in maceratione per noctem,
 mane coquantur ad lb. ss. colentur, ac
 seruentur pro usu.

N. Alij addunt ʒ Spir. ʒi ʒss.
 Aliiter.

R. Santal. rubr. ʒss.
 Sem. citr. ʒss.
 Fl. Rosar. rubr. p. i ss.
 Sacchar. candi. ʒj.
 Spir. ʒi ʒss.
 Aqu. fontan. lb. iij.

Digerantur per noctem, hinc de-
 coquantur ad lb. iij.

Colaturæ adde

Rob. ribium.
 Succ. citri.
 Sacchar. depurat. à ʒj.

Vires. Refrigerat, cor viresque confor-

mat.

2. Decoctum Qiale Cl. D. D.

Lud. ab Hornig.

R. Rad. sassaf. ʒj.
 Lign. visc. Querc.

Lentisc. ʒvi.

Fol. Beton. Mj.

Parata pro decoctione coq. in aq.
 pluvialis limpidæ Mensur. iv. bulliant
 per $\frac{1}{4}$ horæ, postea inde ʒ. crudi ʒj. in
 petia ligati & porro bulliant, donec
 mensura una & dimidia sit consumpta.

Vires. Catarrhis medetur, scabiem-
 que curat, impuritates tum per insens-
 lem transpirationem, tum per alvum e-
 ducens.

Vsus: mane haustus calide assumi-
 tur.

3. Decoctum Epau-
cum.

R. Rad. Aristoloch. rot. ʒj.
 Rhabarb. opt. ʒss.
 Chamæleon. nigr. ʒij.
 Rad. Petrosel.

Cichor. à ʒvi.

Cardopat. ʒij.

Herb. Endiv.

Scabios.

Betonie.

Acetos. à Mf.

Sem. Fœnic. ʒj.

F. Decoctio in ∇ font. lb. vi. ad con-
 sumpt. tertiæ partis.

4. Decoctum Epatis
Vrsuli.

R. Epar vitul. in frusta incisum.
 Santal. rubr.
 Cinamom. ana ʒss.
 Spic. nardi.
 Rosar. rubr. ana. p. i.
 Conserv. flor. cichor. ʒj.

Tro-

Trochisc. Rhabarb.

Eupator ana ℥vi.

Coque in phiala capaci bene occlusa calore balnei ferventis horas 7. vel 8. donec hepar totum ferè in liquorem redactum sit, quem ad perfectionem decoque addendo si velis saccharum.

Vires. Conducit in omnibus Epatis affectibus, & imbecillitatibus; in fluxu praesertim hepatico & hydropisi.

Dosis ℥ij. iij. mane ac vespere.

Quercet. in Pharmacop. Rest. cap. 26.

N. Eodem modo fieri quoque possunt decocta Pulmonum non solum Vulpis. sed & Vuli & Agni, addendo pectoralia affectibus pulmonum congrua. Quercetan.

5. Decoctum Hystericum.

℞. Herb. puleg.

Artemis.

Abrotan.

Matricar.

Meliss.

Verben.

Serpill. ana Mj.

Rad. Pimpinell.

Baccar. Lauri, ana ℥ij.

Castor. ℥j.

Sabin. ℥ij.

M. & lege artis F. decoctum.

Vires. Ciet menses, uterumque roborat.

6. Decoctum Majale.

℞. Herb. Fumar. Mj.

Summ. Lupul.

Cichort.

Agrimon.

Asplen.

Absynth. pont. à. Mf.

Rad. Polypod. ℥℞.

Glycyrrhiz. ℥℞.

Fol. Sen. ℥ij.

Sem. Anis. ℥ij.

Omnia quæ haberi possunt recentia, misce cum reliquis ac coque in seri laetis ℔b. iv. ad tertias.

Colaturæ adhuc calidæ infunde per noctem.

Rhabarb. el. ℥ij.

Spic. indic. gran. vii.

Schænanth. ℔.

Ebullient semel ac iterum, hinc colentur.

Vires. Sanguinem purificat.

Dosis ℥iv.

7. Decoctum purgans pro delicatis.

Quercetan.

℞. Follicul. sen. s. f. ℥vi.

Aqu. pomorum redolentium aut fragorum q. s. pro una vice.

Macera vase claulo per horas 24. addendo parum succi Limonum, hinc ebulliant, fortiterque exprimantur, adde

Succi pomorum redolentium recentis, ℥ss.

Sacchari candi si liber.

Clarifica cum albumine ovi, ac aromatiza cum ∇ cinamomi.

Vires. Leniter purgat sine fastidio.

8. Decoctum splenis bovis.

℞. Splenem bovis in frusta incisum.

Cina-

Cinamom. grossè contus. ℥j.

Caryophyllor. ℥ss.

Croc. ℥ij.

Vini alb. seu malvatic. q. s.

Inde in vitrum capax, quoddam bene clausum in MB. ferventissimo, hor. 24. ebulliat, donec splen in particulas minutissimas coctus & consumptus fuerit, magnaq; Juris exquisitissime cocti, & fragrantissimi copia restet.

Vires. *Specificum est ad duritiem & obstructionem lienis & mensum*

suppressionem.

Dosis ℥ij. continuando per quatuor aut quinque dies, cum menses fluere soliti sunt. *Quercetan. in Pharmac. Restit.*

N. *Potest itidem redigi in formam Extracti, vide infra.*

Plures decoctorum formulas qui expetitur, adeat Quercetanum in Pharmacop. rest. Weckerum, Poterium, & simil.

CAPVT L.

De Eclegmatis, Lohoch, Linctibus.

Materia præbent pectoralia: videlicet pulveres, conservæ, mucilagines, syrupi, decocta, mella, pulpæ, sapæ, & simil.

Modus parandi.

℞. Pulveres convenientes, fructus, gummi arabicum, Tragacanthum succum glycyrrhizæ, amyllum, &c. incorpora (in mortario, piloque ligneo) cum mellis, syrupi, mucilaginis, decocti, & simil. liquoris glutinosi, q. s. donec exactè mixta & mellis consistentiam nata fuerint.

Ex tempore quæ præscribuntur, fiunt ex Eclegmatis usualibus, pulveribus; conservis; cum syrup. q. s. incorporatis, vel ex solis syrupis cum sacchar. candi vel pentidiati, q. s. mixtis.

N. 1. *Decocta itidem ac succi in formam Eclegmatis cum Saccharo co-*

qui possunt.

N. 2. *Proportio pulveris est ferè unc. ss. ad syrup. unc. ij.*

Eclegmata usualia sunt.

Lohoch, ad asthma, s. scyllæ compos.

de Cassia *vid. infra.*

N. 1.

de Caulib.

de Farfara.

de Papavere.

Passulatum, N. aliud,

vide infra 2.

de Pino

de Portulaca

de Pulmone vulpis

Sanum & expertum

è succo scyllæ

1. *Lohoch de Cassia pro Clysteribus.*

℞. Herbi Malvæ.

Z

Mer-

vide
Aug.
gust.
&c.

Mercurial.

Parietar.

Violar.

Beta.

Absynth. ana M. i.

Coq. in f. q. aqu. ad lb iv.

Adde pari pondere Medull. cass.

& mellis despumati ana F. Lohoch.

2. Lohoch passulatum s. Electua-
rium passulatum.

℞. Passular. minor. unc. iv.

Sacchar. cand. unc. ij.

Aq. Scabiosæ.

Fœnic.

Farfar. ā unc. ij.

F. l. a. Eclegma.

Vires. Confert in Tussi, acrimoniam
Cassarherum mitigat.

CAPUT LI.

De Electuariis & Mixturis.

Electuaria sunt, vel molliora, (con-
sistentiâ confectionum opiatarum)
vel solidiora in tabulis. Priora sunt hu-
jus loci.

Modus parandi varius est, adeoque
potius exemplis quàm regulis demon-
strabilis.

Electuaria vulgaria (confectiones
opiatæ communiter appellatæ,) fiunt
è pulveribus minutissimis, melle de-
spumato calente, (rarò saccharo syru-
pisato) susceptis, quibus solubilia si
admiscenda ea sint, seorsim dissoluta
subinde affunduntur, postmodumque
ad fermentationem loco tepido repo-
nuntur.

Reliqua fiunt sola ferè mixtura,
scil. pulverum, electuاريorum usua-
lium, conditorum (in frustula disse-
ctorum) conservarum, extractorum
ten essentialium, & simil. quæ suscipi-
untur liquore, maximeque syrupis q.

s. ad consistentiam. Et hæc dicuntur
vulgò mixtura.

N. Adduntur & interdum pauca
guttula oleorum stillatiorum, vel spiri-
tuum & i. Sal. communis ve.

Sunt Electuaria, tum alterantia,
tum purgantia.

Electuaria alterantia usitatiora sunt.
Electuarium.

Diacorum Aug.

Pseudo acori, vide infra. N. i.

Alexipharmacum 2.

De Ciconia 3.

Alkermes, s. Confectio Alker-
mes.

De Alio, 4.

Anacardinum; s. confectio Ana-
cardina, s. confectio sapien-
tum. A.

Antidorus Matthioli, A.

Archigenis, A.

Athanasia magna, A.

Aure-

Aureum Alexandrinum, A.
 Camphoratum, 5.
 Chalybeatum, A.
 Chalybeatum, Horatii Augeni, 6.
 Arcularii, 7.
 Corroborans specificum croll, 8.
 Cordial, 9.
 de Croco, 10.
 Diaphoreticum Plateri, 11.
 Diacodium, A.
 Diureticum Montag, A.
 de Ferri scorris, A.
 Hystericum, 12.
 de baccis lauri Rhafis, A.
 Miclera Nicolai, A.
 Mithridarium, A. C.
 Orphietanum, 13.
 Nucum, 14.
 Diaolibanum, C.
 de Ovo,
 Papæ f. Guidonis contra pestem,
 A.
 Philonium Mesuz, A.
 persicum Mes. A.
 majus s. Romanum Nicol. A.
 Tharsense Galeni, A.
 contra phthisin, 15.
 Podagricum S. Gloss, 16.
 Regum, 17.
 Requies Nicolai cum saccharo, A.
 Resumptivum Fernelii C.
 Dia-satyrium, A.
 Scorbuticum, 18.
 Dia-scordium Fracastor, A.
 Theriaca Andromachi, A.
 Diatesaron, A.
 Communis, A.

Triphera magna, A.
 minor, A.
 Saracenica, A.
 El. Vitæ Arnold. de V. N.
 N. *Quia species aromatica ad electu-
 aria, cum melle vel saccharo conficienda,
 ordinata olim fuerunt, & harum ple-
 raque Electuarii nomine communiter ad-
 huc veniunt, quas vide infra; Prestaret
 tamen species ab Electuariis distingue-
 re.*

*Electuaria lenientia usitiora
sunt.*

Electuar.
 Diacassia cum manna, A.
 Diacatholicum, Antidotus Catho-
 lica Nicolai, A.
 Diaprunis simpl. A.
 solutivum, Diadama-scenum, A.
 Hierapiera Galeni, f. simplex, A.
 Lenitivum Florenzola, A.
 de Manna, A.
 Triphera Persica Damasceni, A.
 Elect. Purgantia usitiora.
 Electuar.
 Diafarum Fernelii, vide infra. 1.
 Antimoniale, 2.
 Benedicta laxativa; Nicol. A.
 Diabalzemer. f. Elect. Sennatum
 A Renod.
 Diacarthami f. Diacnicu, A.
 Caryocostinum, C.
 Catharticum Imperiale, Nicol. C.
 de Citro solutivum, A. C.
 Diacydonites f. Diacydonium laxa-
 tivum, A.
 N. *Ad Gelatinas referri potest.*
 Z 2 Epi-

Episcif. Elefscoph. A.
 Hamech. f. confectio Hamech.
 major, A.
 Hiera composita, A.
 Logadii, A.
 Pacchii, Archigenis, Ruffi, f.
 Diacolocynthidos, A.
 Indum majus, A.
 Diaphanicum Mesuæ, A.
 Ferneli, A.
 de Psyllo, Montagnanæ, A.
 Rosarum Mesuæ, A.
 de Succo rosarum Nicol. A.
 N. *Ustatius est in tabulis.*
 Diasbesten, Mantagnanæ, A.
 Diasenna Nicolai, A.
 de Tamarindis, 3.
 Huc Passulæ laxativæ, A. C.

ELECT: ALTERANTIA.

1. *Elect. Pseudoacori stomachicum.*

2. Rad. Pseudoacori. à cortice exteriori mundat lb. i. minutissime incisæ & conquassatæ infundantur in Vini rubr. ℥ (3. 4.) Hinc coque ad consumptionem vini, mollitiemque radicis.

Postmodum adde mellis depurat lbij. vel iij. iterum parum coctis addantur Zinzib. optimi minutim incis. ℥ij. vel 4. misceantur optime l. Δ ad consistentiam; hinc remove ab Δ & immisce.

Pul. Cinnam. acer. unc. 8.

Piper long. ℥ij.

Galang.
 Nucif.
 Macis.
 Cubeb.
 Cardamom. ana ℥iij.
 Gran. paradif.
 Piper nigr. ana ℥. i. plus minus F. Elect.

N. *Alii admiscunt amygdal. dulc. & pineas excori.*

Vires. *Confortat stomachum & caput frigidum excrementa incidendo excicando, &c.*

Dosis ad magnitud. avellana vel juglandis; mane ac vespere.

2. *Electuarium Alexipharmacum.*

Cl. Dn. D. Petri de Sp.

F. F.

3. Rad. Diptamn.

Caryophyllat.

Cyper. rot. à ℥iij.

Afari ℥vi.

Ireos flor. ℥ij.

Fol. Rut.

Fl. Rosar. rubr. à ℥iij.

Diptamn. cret. ℥ij.

Spic. indic. ℥iij.

Cinamom.

Croc. or. à ℥i.

Baccar. Junip.

Laur. à ℥vi.

Mastich. ℥iij.

Agar. tr.

Myrr. el. à ℥ij.

Bol. arm. præp.

Spec. liberant. à ℥vi.

Con-

Contundantur subtilissimè & cribrentur. Postea

℞. Nuc. Jugland. ʒiij.

Fic. pingu. ʒix.

Conquassentur simul, addito q̄; modico vini trajiciantur per cribrum ad pultis consistentiam. Deinde

Sacchar. opt. lb̄iij. ʒiij.

Dissolve cum aqua q. s. Δ lento.

Postea adde

Mellis despumat. lb̄iij.

Coque ad aqua consumptionem.

Deinde adde

Puliculam illam ficuum & nucum.

Theriac. Andr. ʒix.

Conserv. ros. rubr. lb̄i.

Succ. Absynth. inspiss.

Misce optimè cum spatula lignea, dein removeantur ab igne, & agitentur continuò, donec refrigerint, postea adde pulveres, misceanturque perfectissimè, in fine adde

Ambra gr̄is. drach. i.

Mosch. ʒj.

F. Electuar.

Vires. Usus ejus creberrimus fuit in seivissima illa nuper à peste, in qua tam preservando; quam curando profuisse comperitum est.

3. *Electuar. Alexipharmacum de Ciconia; Arcanum Alexipharmacum.*

℞. i. Recentem ciconia sanguinem, destilla per MB. remanentem in cucurbita sanguinem exicca & pulverifa. Hinc.

1. Extrahe Sal ex ventriculo cico-

nia incinerato, beneficio aqua illius ex sanguine destillata, idq; pulverisatæ illi sanguinis remanentiæ admisce.

Hiscæ 3. addantur in vitro satis capaci:

Succin. alb. el. ʒ. i.

Corall. rubr.

Baccar. matur. uvæ inversæ.

Essent. Mumia.

Rad. Anthor. à ʒiβ.

Lap. Bez. or. drach. iij.

Theriac. opt. unc. iβ.

Hoc cum oleo pini (ex nucl. express) incorpora, deinceps tantum olei superaddendo, ut digitos 3. vel 4. latos emineat. Tandem insolentur aliquamdiu orificio vasis diligenter obstructo, quoniam vetustius eò melius.

Vires. Efficacissimum est contra omnia metallica, animalia & vegetabilia venena, quæ tum vomitu, tum secessu, tum sudore expellit.

Dosis unc. β. cum haustu ∇ a. vini, vel lactis tepidi. Croll.

N. Loco Sal. com. ex ventriculi cinere extracti malle ipsas tunicas pulverisatas admiscere.

4. *Electuarium s. mixtura de Allio.*

℞. Digitor. allii, num. iv.

Frixis & contusis cum melle & mithridatii, drach. iij. adde

Sperm. ceti.

Granor. Juniper. ana ʒj.

Castorei ʒj.

Z 3

Pulv.

Pulv. parietar. ℥j.

Oxymell. liquillit. q. s. F. Elect.

Vires: *Insignium virium est contra colicam.*

5. *Electuarium Camphoratum*
Kegleri.

℞. Rad. Diptamn. alb.

Tormentill. à drach. ij.

Zinz. alb. unc. ij. (rectius ʒss.)

Sacchar. cand. unc. ij.

Margarit. præparat. unc. ss.

Nuc. vomic.

Os de c. c. à drach. ij.

Camphor. unc. i.

Theriac. Andr. unc. iv.

Sacchari alb. in aq. acetos. solut.
q. s. F. Electuarium.

Vires, *Alexipharmacum ac sudoriferum est, maximeque usui in morbis malignis.*

Dosis drach. j. ad ij. &c.

Paulo aliter.

℞. Rad. Diptamn.

Tormentill.

Zedoar. ana. unc. ss.

Zinzib. drach. ij.

Herb. card. benedict. unc. ss.

Turb. alb. & gumm.

Nuc. vomic. à unc. ss.

Rhabarb.

Os. de c. c.

Oc. ʒ à drach. i.

Camphor. unc. i.

Sacchar. cand. unc. i.

Theriac. Androm. unc. vi.

M. F. Electuarium.

6. *Electuarium Chalibeatum Horatii*
Augenii.

℞. Piper.

Zinzib. ana. unc. ss.

Cardamom.

Catyophyllor.

Doronje. ant. Angelic.

Crociana drach. ij.

Tamarisci unc. ss.

Sem. Basilic.

Anis. ana drach. ss.

Limatur. chalyb.

℥ss.

Mellis despumat. ℥iij.

F. Electuarium.

Vires. *Conferit in temperie frigida mulierum.*

7. *Aliud Elect. Chalybis*
Arcularii.

℞. Scob. Chalyb. ʒiij.

Succ. recent. pomorum Borsdoiff.
purific. ʒvi.

Macera 24. hor. effunde per inclinationem. Succus novus affundatur, tribus vicibus id reperatur. Succus tandem inspissentur ad formam Electuarii.

Dosis à ʒss. ad ʒss.

8. *Electuarium corroborans specificum*
s. *Medicamentum specificum omnium septem membrorum principalium,*

Crollii.

℞. Ol. succini ter vel quater (per ▽
Majoranæ vel simil.) rectificati
drach. ij.

Spirit. Oli veri.

Salis

Salis cranii humani. (vel magisterii,
ana unc. 8.

Tincturæ croc. or.

Granor. alkermin. ana ʒij.

Sal. margarit. ʒij.

Corallor. ana ʒij.

Ol. Cinamom.

Macer. ana ʒ8.

Lact. Sulphuris. ʒij.

Extr. Spodii ʒij.

Antimon. diaphoret. ʒ8.

Magist. Tarr. ʒij. i. e. Tartari.

Colati

Tinctur. croc. ʒij.

Extr. chelidon.

Rhabarb. ana ʒ8.

Liquor. crystal.

calcul. microcosmic. ana ʒij.

Cum extracta & inspissata Theriacæ essentia melle juniperino, conserva rosarum, addendo pro libitu saccharum rosaceum F. electuarium, addita Moschi & Ambre, ana drachmar.

N. Propter ventriculi sympathiam cum reliquis membris addantur spirit. ʒij. veneris drach. ʒij. aquæ Ol. Naciss. ʒij. stillat. drach. 8.

Dosis gran. ʒ 6. 7. usq. ad 20. ʒ8.

9. Electuarium seu mixtura cordatis.

8. Conserv. rosar. unc. viij.

Borrag.

Bugloss. à unc. iij.

Violar. unc. ij.

Nymph. unc. i8.

Confect. Alkermin. unc. 8.

Pulp. citr. condit. unc. iij.

Fl. citr. condit. unc. ij.

Spec. Diarrhod. Abb. ʒij.

Margarit. preparat. ʒ. ij.

Corallor. utrorumque

prepar. ana ʒij.

Lign. Aloës pulv. ʒiv.

Ambr. gryf. gran. vi.

Fol. ʒ num. x.

Cum syrupo acetos. citri q. s. F. mixtura.

Vires. Spiritus vitales Balsamumque natura corroborat.

Dosis ad magnitudinem avellana.

10. Electuar. de Croco.

8. Croc. or. ʒ. i.

Rad. Zedoar.

Tormentill.

Nuc. vomic. à drach. ij.

Camphor. ʒij.

Sem. Eruc.

Rad. Diptamn. alb.

Angelic. à drach. ij.

Petasit. drach. iij.

Theriac. Venet. ver. ʒvi.

Mithridati. unc. vi.

F. Electuarium.

Vires. Alexipharmacum est. Regleriano nihil vel parum cedens.

11. Electuarium diaphoreticum

Plateri.

8. Syrup. de papav. ad ʒvi.

Rob. sambuc.

Ebul. ana. ʒij.

Spir. Juniper. ʒ. vi.

M. in electuarium.

Vires-

Vires. Somnum conciliat, dolores sopit atque sudorem ciet, adeoque convenit in hydrope. Vide Hechstett. lib. 1. obs. iv. dec. 3. cas. 1.

12. *Electuarium hystericum seu landanum facile.*

℥ fragment. lapid. pretiosorum.

Saphyr.

Hiacinth.

Topas.

Smaragd. ana ℥j.

Corall. alb. & rubr.

Margar. præpar. a ℥iv.

Rad. Galang.

Rhabarb. an. ℥iij.

Gumm. arab.

Opopan.

Galban.

Thur.

Mastich. an. ℥ij.

Bdell.

Sarcocoll. an. ℥ij.

Euphorb. ℥ss.

Camphor. ℥iiss.

Sem. coriandr.

Fœnic.

Cardamom.

Salis communis.

Opii Theb. alc. a ℥ss.

Cinnam. ℥ij.

Spiritus thereb. ℥j.

Mell. despumat. lbss.

℥ &

Aq. Imperial. an. q. l.

F. Laudanum l. a. instar Opiatæ.

Dos. iij. gran. super bibendo parum vini, & os frequenter Oxycr. colluendo ad præcavendum faucium & gutturis ardorem propter euphorb.

Suffocatis ab utero, de micranicis convulsis a causâ frigidâ magna solatio est.

13. *Electuarium Orvieta-num.*

℥ Rad. carlin. seu chamæleont. alb.

Tormentill.

Pistoloch.

Aristol. rot.

Scorzon. Hispan.

Calam. arom.

Angelic.

Imperator.

Anthor.

Sem. fanton. &c.

Fol. ejusd.

Dictamn. alb.

Bol. arm.

Terr. figillat. an. ℥j.

Theriac. veter. ℥iij.

Mell. hispan. cocti pondus triplum F. Electuar.

Vires & dosis eadem qua Theriace Androm.

14. *Electuar. Nucum.*

℥ Nuc. Jugland. num. xx.

Ficuum. ping. num. xv.

Rut. unc. i.

Sal. commun. ℥ss.

Mellis. unc. ij.

M. F. Electuarium.

Vires: Alexipharmacum est.

15. *Electua-*

15. *Electuarium contra Phthysin.*

℞. Conserv. Rosar. vet. ℥ij.
 Loch. de pulm. vulp.
 Papav.
 Pino. ana ℥ss.
 Sem. 4. frig. maj. excort.
 Lactuc.
 Cydonior. an. ℥j.

Amygd. dulc.
 Pinear.
 Pistac. ana ℥ss.
 Mastich.
 Terr. sigillat.
 Bol. armen. ana ℥ss.

Gum. Arab.
 Amyl. ana. ℥j.
 Spec. Diatragac. fr. ℥ss.
 Diapenid. ℥ss.

Sem. Papav. alb.
 Portulac. ana ℥j.
 Pulmon. vulpis exicc. ℥ss.

Cancr. fluviatil. ust.
 Trochisc. de Catab.

Tragacanth. ana ℥j.

Cum Syrupo de papav. & glycyrrh.

F. Mixture.

Vires: *Acrimoniam mitigat, tenuitatem in crassat.*

16. *Electuarium podagricum S. Clossai.*

℞ Resin. scammon.
 Jalap. an. ℥j.
 Hermodact. ℥vi.
 Sagapen. ℥ss.
 Sem. Anis.

Fœnic.
 Carui.
 Milii solis.

Garyophyll.

Mari.

Costi arab.

Zinzib.

Mastich. a ℥ss.

Liquetur sagap. in aceto scyllit. coletur per setaceum commiscendo pulv. præscriptos, & in mortario marmoreo adjiciendo per pugillos sacch. pulverisatum & irrorando aq. ivæ Arthrit. F. Electuar. ut Opiata, addendo Essentiæ anis. gutt. x.

Dos. a ℥j. ad ℥ss. ad præcautionem doloris arthritici singulis mensibus in occasu De.

17. *Electuar. Regum.*

℞. Pinear. unc. iß.
 Rosar. rubr. drach. ij.
 Amygd. dulc. unc. ss.
 Santal. citrini. ℥ij.
 Ambr. gris. ℥ss.
 Moschi. gran. iij.

Sacchari albiss. in ∇ rosar. fragrantiss. solut. lb. i.

Vires. Refrigerat, exiccat, nutrit, corroborat, &c.

18. *Electuar. Scorbaticum.*

℞. Conf. cochlear. ℥iß.
 Chamædr.
 Meliss.
 Rosar. incarnat.
 Acetos. citri a ℥vi.
 Condit. calam. arom.

Aa

ZZib.

ZZib.

Rad. Pimpinell.

Cort. citri à ℥iij.

Extr. Absinth.

Juniper.

Sem. Sinap.

Eruc. à ℥ij.

Cardamom.

Cinnamom. à ℥j.

Tart. & ti. ℥i℥.

Ol. Anis. ℥j.

Cinam. ℥℥.

Cum Syr. de Cinam. & de cochlear. an.

q. f.

F. Mixtura.

Vires. Reserat obstructions mesenterii, lienisque tenorem corroborat, ideoque in scorbutica affectu virium est insignis.

Dosis magnitudine juglandis parva mane jejuno stomacho assumpta.

ELECTUARIA PURGANTIA.

1. Diasarum Fernelij.

℞. Syrup. menth.

violar. ana unc. viii.

Coquantur in mellis crassitiem sub finem subducto igne insperge: Radicis peponis arefactæ.

Seminum raphani & urticæ maceratorum in ∇ rosarum, arefactorum, & tritorum ana unc. i.

Rad. asar. contritæ & cretæ ℥ij.

Cinamom.

Sem. fœnic. à drach. iij.

Confice in electuario liquidum.

Vires. Omnis generis humores cir-

ca ventriculorum & præcordia exuberantes, vomitione educit, non continuato, sed ex intervallis facto impetu, senis atque prægnanti tutum ac facile.

Dosis drach. iij. vel unc. ℥. ex aqua hordei vel ex mulsa.

2. Electuarium Gale Crollii.

℞. Vitri. & correct. per ∞ vid. lib. 3.

Theriac. Androm. à unc. ij.

Nuc. moschat.

Mastich.

Cort. arant.

Corall. rubr. præp. à drach. ij.

Caryophyllor.

Sem. Fœnic.

Coriandr. præp. à unc. ij.

Pulverisentur optimè & commisceantur, F. Massa pilularum, cum miva cydoniorum, q. f.

Vires. Purgat minori violentia, quam vitrum ac in primis per secessum.

Dosis debiliori, pilula una magnitudine pis, fortiori dua.

3. Electuarium de Tamarindis.

D. D. Greg. Horst.

℞. Fol. Sen. ℥℥. ℥v.

Cinamom. opt. ℥vi.

Sem. fœnicul. ℥i.

Vini malvat. opt. ℥iij.

Semelebuliant, postea in loco calido per ∞ digerantur. vase clauso F. deinde colatura cum expressione, qua extrahatur pulpæ passul. min. & major. ana ℥iv. ℥. Extractæ massæ per setaceum adde pulpæ Tamarind. Elect. diaprun. s. lenitivi an. ℥iij. crem. Tart. ℥ij. ol. Nucis mosch. still. Di. anis. ℥℥.

M.F.

M. F. Ele&tuarium.
 Vires. *Purgat leniter serofos biliososq;* humores. *Dosis ℥i. circiter.*

CAPVT LII.

De Elixiriis.

Elixir in officinis est liquor spirituosus, facultatibus præcellentibus, mediante infusione imprægnatus. Hinc convenit ut plurimum cum Tincturis liquidis.

Modum parandi singula ferè suum obtinent.

Usitatoria sunt:

Elixyr Alliatum. N. i.

Citri. 2.

Camphoræ 3.

Hysericum & Antepilepticum S.

Cloß. 4.

Epilepticum Ant. Freyen/5.

Crollii. 6.

Cratonis. 7.

Iuniperinum, vid. lib. 4.

Pestilentielle. 8.

Nephriticum. 9.

Elixyr Proprietatis. 10.

Synopticum. 11.

Uterinum Croll. 12.

Vita Matthiol. August.

maius Quercet. 13.

minus Querc. 14.

1. Elixyr alliatum.

℞. Allior. expurgat. N. xx.

Contundantur, XX imponantur: affunde Sp. Vini rectific. ad 4. digit. eminent. destilla ex MB. per cohobia,

semper nova alia addendo, in ultima destillatione adde Camphoræ in petia ligatæ collo XXbici appensæ ℥. i. destilla ut prius, habebis præstantissimum Elixyr alliatum.

Vires. Magni præservativi locum habet in peste, quovis mane cochlear. unum, vel per se, vel cum aq. still. Card. bened. aut Veronica assumptum.

Vid. Deodatus in path.

2. Elixyr Citri.

℞. Cortic. citr. recent. ab albicante medulla separator. ℔iij.

Vinon rectific. ℔xij.

Macerentur aliquamdiu, postea destillentur per vesicam cum refrigeratorio, donec phlegma stillare incipiat.

Huic spiritui, cum pauxillo croci tincto, adde

Succ. citri purific. ℔i.

Habebis Elixyr citri.

N. Sennertus addit quoque ∇m rosarum ℔i. in qua soluta Sacchar. cand. unc. x.

Vires. Elegans est cordiale & antidotus contra pestem & aeris contagia.

Dosis cochl. i. singulis auroris, jejuno ventriculo, nisi Epatis calidior temperies, vel capitis imbecillitas prohibeant,

A a 2

eo

eo enim casu, satiato ventriculo melius
conferi Tentzel. in exegeſi.

3. Elixyr Camphora. ſ. Vi. Camphora-
tus, ▽ peſſilentialis Hart-
manni.

R. Vi opt. ſbi.

Camphor. ſelect. (tempore Aſti-
vo) ꝓvii. ʒi. (Hyemali) ꝓx. ʒij. M.
incifa prius camphora; & ſtatim ſol-
vetur ſine Δ, appende in nodulo croc.
or. ʒi. fiet ▽ aurei coloris. Serva in vi-
tro benè clauſo.

Vires. Utiliſſimus eſt in peſte, tam
praſervando, quam curando.

N. Poterit itidem adhuc ſemel deſtil-
lari. Hartman. in praët. loc. de peſte.

4. Elixyr hyſtericum & antepi-
lepticum.

℞ Rad. pæon.

acor. ver.

viſc. querc. ana ʒi.

ſem. pæon. ʒß.

fantal. rubr. ʒii.

flor. nymph. alb.

lavend.

Rof. rubr.

papav. errat. a Mß.

camph. ʒii.

extracti opii puriſſ. ʒii.

caſtor. per ▽ ʒi.

ſpiritus ſang. human. vel

cervini ʒxii.

▫ volatilis ʒi.

Ignem enſtruo digerantur in diplo-
mate, coletur liquor per chartam ſer-
veturque.

Dos. junioribus à gutt. vj. ad ʒß. adul-

tis ad ʒj. in vino, juſtulis, aq. ſtillat. tam
in paroxiſmo quam diebus aliquot ante
Novilunium. Idem Elixyr valet adver-
ſus hemicraniam, Cephalaaam, vertigi-
nem per aliquot dies continuos ſumptum,
purgato tamen antea corpore.

5. Elixyr Epilepticum. D. D.

Grenen.

R. Spirit. Corall.

Tart. à ʒiſ. ʒii.

Sal. com. cran. human. volat.

ſang. human. volat.

Succin. volat. à ʒj.

M. ſtent in digeſtione, & (14.) ſer-
vetur in vitro benè clauſo.

Dos. guttula aliquot.

6. Elixyr Epilepticum Crollii.

▫ lum ad ſtavedinem calcinatum;

imbibe Vi ut ſ. maſſa.

℞. Hujus maſſa ſb. iſ.

Raſur. cranii human.

Viſc. Quercin.

Ungul. alcis.

Granor Pæon. à unc. i.

Omnia ſcindantur & tundantur, po-
ſtea mixta deſtillantur per Retortam
gradatim.

Hujus egreſſi liquoris ſb. i. rectifi-
cetur in MB ſupra.

Caſtoarei.

Spec. Diamoſch. dulc. ana ʒß.

Anacardin. (fruct.) ꝓvi.

Poſtea adde Vi ſbiv.

Sal. Pæon drach. i.

Liquor. ſalis perlar.

Liquor. ſalis corall. à ʒi.

Ol. aniſ.

Suc-

Succin. ana. ℥ij.

M. & digere in MB per mensem.

Dosis cochl. f. vel integrum in ∇ pœon. & simili, continuando dies (9.)

7. *Elixyr antepilepticum Cratonis.*

℞. Ciner. cornic. ex nido extract.
Turtur.

Cran. human. calc. ana ℥ij.

Gran. Tiliæ autumnō collect. ℥ii.

Stercor. leonin. ℥β.

Affunde V ad eminent. digit. 3. extrahe f. a. ex fecibus calcinatis elixivia fal, addeque extractionibus. Postea adde vini malvatici tantundem (cum V) & sacchar. candi unc. iv.

Dosis cochl. f. ad 1.

8. *Elixyr pestilentiale.*

℞. 1. Flor. Sulph. ℥iii.

Ol. Juniper. (à bacc.) rectificat.
℥. viii.

Succin. rectific. ℥ii.

Digerantur ut fiat solutio florum 2.

℞. Theriacæ Addrom lb. 1.

F. Extractio cum V optimo, abstrahæ Vi.

3. ℞. Rad. Enul. c.

Angelic.

Baccar. Junip. à unc. iii.

Extrahatur Tinctura cum eodem spiritu, abstrahaturque iterum Vi. Misce jam extractum hoc cum extracto Theriacæ, ac affunde olea illa essentificata, prius tamen filtrata, circula omnia simul lentissimo calore.

Vires. Secretum est, quod in peste & morbis epidemicis ad miraculum operari solet, tam præservando quàm per sudorem contagium expellendo.

Dosis, in præservatione guttula aliquot, in curatione à ℥j. ad ℥ij in vino acetosaceo, aqua scordii, vel alio aliquo liquore appropriato. Croll.

9. *Elixyr Nephriticum.*

℞. Baccar. myrtillor.

Heder.

Alkekeng.

Juniper ana ℥ii.

Herb. Adianthi.

Veronic.

Rusc. ana p. 1.

Rad. Cyper.

Pimpinell.

Ononid. ana ℥β.

Succ. Limon. ℥ij.

Fl. Genist.

Bugloss.

Sem. Melon.

Cucurbit. ana ℥j.

Nucl. avellanar. c. pellib. N. iv.

Vi. rectific. q. f.

F. infusio in cella subterranea.

Vires. Prodest nephriticis ac calculosis, calculum atterendo & expellendo.

Dos. coch. f. vel 1.

10. *Elixyr proprietatis.*

Elixyr hoc desumptum est ex Paracelso Archidox lib. 8. num. 6. ubi omisso menstruo. (origine ut loquitur) ℞. Myrrh. Aloepat. Croc. ana circulat in arena lenissimo calore per menses duos, dein elicit oleum per XX.

Aa 3

idque

Idque cum anatico pondere circulati
(vide de extractis) per mensem circu-
lat. Menstruum illud omiffum varias
opiniones peperit, unde & diverfi pro-
cessus, inter quos tamen usitatiffimus
est hic Crollianus.

R. Myrrh. Alexandr.

Aloës Epatic.

Croc. Orient. vel Ungar. à ℥iv.

Pulverisata humecta V alcoholisa-
to; hinc affunde Ol. Sulph. p. c. ad
emin. digit. 2. 3. extraheque tincturam
ac decanta. Relictæ materiæ affunde
V, & ulterius extrahe, decantaque.
Tandem quæ restant faeces, destilla-
tioni submitte, destillatumque priori-
bus adde.

N. Elixyr hoc, si aliquamdiu digestioni
commiseris, gratius sit sapore, atque effica-
cius operatione.

Vires. Partium est tenuium, calefacit
& exiccat, à putredine conservat, sudo-
rem ciet, proficuum ejus usus est in morbis
malignis, hypochondriacis, uterinis, sto-
machi cruditate atq; inde appetitu immi-
nuto. Extrinsecus mundificat valde vul-
nera sordida.

Dosis à gutt. viij. ad xij. & plures.
Croll.

II. Elixyr Syncopiticum S. Cl.

R. Aq. florum trium cordial.

Calend.

Lilii convall.

Roris solis an. ℥iv.

Succilimon. depurat. lb. i.

Aq. ros. quart. tres.

Meliss. lb. β.

Florum tunic. ℥iij.

M. in matraccio magno & inde in no-
dulis Antidoti Orvietanæ (cap. 51. de-
script.) ℥β.

Confect. de hyacinth.

Alkerm.

Diambr. an ℥ij.

Croci Oriental. ℥vi.

Camph. ℥β.

Cort. citr. cond. raspat.

lb β.

Sacch. cand. in aceto.

ros. solut. ℥iv.

Omnia in matraccio sigillentur luto
tenaci, stent in ventre equino per
15. 6, deinde in MB. destillentur ad-
miscendo sub finem ℥iv. pulv. di-
ambr.

Hoc remedium mira præstat adversus
febres syncopales, Apoplexiam morbosque
subitaneos Dos. cochl. ij. paulo ante pa-
stum, sed præmissis generalioribus ad ple-
thoram vacuandam.

12. Elixyr Uterinum.

R. Castor. lb i.

Croc. unc. ij.

Extrahe tincturas sc. cujusque
seorsim cum V, abstrahe ad rema-
nentiam extractorum, quibus mixtis
adde:

Extr. artemis. ℥vi.

Sal matr. perlar. ℥i.

Ol. stillat. angelic.

anis.

succin. à ℥ii.

Digerantur mixta omnia per
6 8.

Dosis

Dosis huius Elixiris ℥j. vel ℥ij. ingruente paroxysmo qualicunq; hysterico, tunc ilico sanantur, provocato sudore. Quod si singulis mensibus appetentibus menstruis aequali dosi utantur, non reuertetur morbus. Croll.

13. *Elixyr vite majus*
Quercetan.

℞. Rad. Zedbar.
Angelic.
Gentian.
Valerian.
Tormentill.
Scorzoner.
Galang.
Lign. Aloës.
Santal. citr. a ʒij.
Fol. Meliss.
Ment. rubr.
Majoran.
Basilic.
Hyssop.
Thym.
Fol. Chamæpit.
Chamædr. a. Mß.
Gran. Laur.
Juniper.
Cort. Limon.
Atanticor. ficc.
Sem. Pæon.
Sesel.
Aneth.
Fœnic.
Anis.
Citri.
Card. Bened. à ʒij.

Caryophyllor.
Cinamom.
Macis.
Zingib.
Cubebar.
Cardamom.
Piper long.
rot.

Spic. nard. à ʒij.
Benzoini.
Myrrh.
Oliban.
Succin.
Mastich. à ʒvi.
Fl. Rorismar.
Salv.
Pæon.
Stæchad.
Calendul.
Lavendul.
Hyperic.
Centaur. min.
Betonie.
Lil. convall.
Tilia ana p. ij.
Cichor.
Rosar. rubr.
Bugloss. à p. r.
Mellis optimi.
Sacchar. alb. ana. lb. r.
Aqua Vitæ optimè rectificata.
lb. x.

Digerantur f. a. ♂ (8. 10.) vase
Hermet. claulo. Hinc f. expressio
quæ destilletur, (ponendo in ro-
strum mosch. ʒß. ambr. grisc. croc. ana
ʒi.)

3j.) igne initio gradus 1. & extillabit
 ▽ clara, quam collige seorsim: dein
 auge Δ ad grad. 2. & prodibunt spi-
 ritus nebulosi. Tandem Δ adhibe
 fortiolem ut extillet oleum, & ma-
 neat in fundo materia sicca, nec ta-
 men perfecte arida, ne empyreuma
 extillatum sapiat. Ex hac residua ma-
 teria extrahe tincturam s. a. cum ▽
 illa priori clarissima & effunde. De-
 mum misce tres illos liquores, ac de-
 stilla denuo per gradus ut prius, sin-
 gulis seorsim susceptis. Ex materia in
 utraque destillatione residua, post-
 quam incinerata fuerit, elice Sal. com.
 beneficio ▽ illius clariss. primo extil-
 lata, eamque ▽ m sale imbutam
 misce cum spiritu & oleo ac cir-
 cula.

*Vires. Huius Elixiris ineffabiles sunt
 virtutes ad curandas & præcavendas
 Vertigines, Epilepsias, Apoplexias, Para-
 lyses, Manias, Melancholias, Asthmata,
 Synopes, Lypothymias stomachi, & alia-
 rum partium debilitates, cachexias, hyste-
 ricas passiones, & alia id genus summa &
 deploranda symptomata.*

*Dosis, guttula aliquot in ▽ vel decocto
 conveniente.*

N. Hic Quercetani processus non

*sine causa à Chymiatro celeberrimo, Fri-
 derico Greiffen correctus est, quam
 correctionem, Quercetano Redivivo
 insevi.*

14. *Elixir vitæ minus ejusdem
 Quercet.*

℞. Rad. Gentian.
 Centaur. min. à ʒiii.
 Galang.
 Cinamom.
 Macis.
 Caryophyllor. a ʒj.
 Flor. Salv.

Rorismar. à p. ij.
 Vini albi generos. lb. vi.

Macerentur in MB ♂ ♀ (8.) dein
 exprimantur fortiter. Expressio de-
 stillatur per XX in cinere ad siccitatem.
 Residua materiae extrahe tincturam
 cum ▽ illa destillata, s. a. Postmo-
 dum in cinera materias relictas & elice
 sal cum ▽ card. benedict. vel simili
 (vel & fontana) sal inspissatum & pu-
 rificatum adde tincturae superiori &
 circula.

*Vires. Specificum est remedium ad o-
 mnes cachexias stomachi, capitisque im-
 bellitates.*

Dosis cochlear. ʒ.

De Emplastris, Ceratis & Dropacibus.

Cerata (cerota,) nihil ferè ab Emplastris differunt, nisi quod paulo sint molliora & tractabiliora, adeoque non rarò inter se confunduntur.

Fiunt ex rebus pinguibus, oleis videlicet, resinis, (quæ faciunt ut cuti tenaceus adhæreant) axungis, medullis, gummatibus iisque cera q. s. susceptis, additisque nonnunquam & pulveribus.

Modus fiendi.

R. Liquabilia, fundeque ad ignem, hinc immisce sensim pulveres, agitaque continuo donec refrigerant.

N. 1. Proportio cera ad olea est $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}$.
ad resinas $\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2}$.

N. 2. Proportio pulverum ad olea est $\frac{1}{8}$.

N. 3. Gummata addenda si qua purganda prius fuerint ac solvenda in aceto similive liquore aqueo, vel si alias humor aqueus (acetum decoctum, succus, mucilago) addendus fuerit, cum oleis initio tantisper solutis illa vel liquor coquendus erit, donec planè exhalarit.

Emplastra modo fiunt eodem.

1. Funditur cera cum oleo, hinc admiscetur resina, adipēs, gummata, ut similiter liquecant, tandem subducto igne admiscetur pulveres, continuoque agitantur, donec refrigerant.

N. 1. Antequam planè refrigerint

malaxari solent aqua frigida, inq. cylindros. s. magdaleones redigi.

N. 2. Si lithargyrium addendum sit, primum id in oleo erit coquendum.

N. 3. Proportio exacte definiri nequit, recipiuntur tamen ferè ad aridorum \mathfrak{zj} . olei, pinguedinis vel mellis \mathfrak{zij} . cera \mathfrak{lb} .
1. resinarum \mathfrak{zviij} .

N. 4. Loco cera alia nonnunquam recipiuntur, e. gr. landanum & simil.

Cerota usitatiora sunt.

Cerotum ex Betonica.

Capitale.

Cerine Ctesiphontis.

Diachalciteos.

Diapalma

de Galbano, s. matricale

Infrigidans Galeni.

Oelypi

Diapiper

expelle arietina

pro Herniosis.

Isis.

Sacrum s. Diadictamnium, s.

Emplastrum diadictam.

Santalinum

Sparadrappum Vigonis.

Stomachale

Emplastra usitatiora sunt:

Emplastrum

Album Coctum, Aug.

Apostolicum, A.

Arthriticum, N. 1.

Asclepiadis, Weck.

Bb

Barba-

Barbarum majus, *Weck.*minus, *Dissaldu*
*in Cordum.*Basilicum majus, *Aug. Weck.*minus, *A.*è lapide calaminari, *Zettenpflaster/A.*

Cephalicum, 2.

Ceroneum, *A.*de Cerussa, *Renod.*Diachylon simpl. f. album, *A.*composit. f. empl. de mucu-
laginibus, *A.*magnum, *A.*parvum, *A.*cum gummis, *A.*Citrinum, *A.*de crusta panis, *A.*

Diaphoreticum, 3.

Divinum, *Renod. Weck.*

Febrifugum, 4.

ad Fonticulos, *F. F. 5.*ad fracturas ossium, *Ren.*de tribus farinis, *Weck.*Gryseum è lapide calaminari, *A.*Gummatum *Paracelsi*, 6.

ad Hernium, 7.

ad Hydropem, *A.*de Janua, *Ren.*Iris flavum. *Dissaldu in*
*Cordum.*de baccis Lauri, *A.*Mastichinum, *Renod.*

Magneticum, 8.

de Meliloto, *A.*de Minio, *A.*

Mundificativum, 9.

Nervinum, *A.*Nigrum sticticum, *A.*

Oppodeldoch, 10. 11.

Oxycroceum commun, *A.*Vigonis, *A.*Diaphanicum calidum, *A.*frigidum, *A.*è ranis, *Vigonis, Renod.*de Rhabbaro, *A.*

Saturninum, 12.

ad Scyrthos, 13.

Sparadrap, *Renod.*de stercore canis, *Vigonis,*
Weck.

Splenicum, 14. 15.

Sticticum, 16.

Stomachicum, *Weck.* aliter habet *Re-*
nod.

Diasulphur, 17.

Tetrapharmacum, *A.*Tripharmacum, *A.*

ad tophos.

de Tacamahac, 18.

ad Tophos, 19.

Viride, *Cord. Weck.*

Vesicatorium, 20.

Filii Zachariæ, *A.*

Dropaces, 21.

1. *Emplastrum Arthriticum*
*F. F.*2. *Emplastr. Diachyl. magn. 3vi.*

Oxyroc.

Diapalm. à 3ij.

Medull. cervin.

Axung. Ursin. à 3iss.

Tacamahac. in vino dissolut. 3iij.

M. F. f. a. *Emplastrum*, quod oleo
vulpino malaxetur.

Vires.

Vires. Doloribus arthriticis, maxime
proficuum est, lenit, discutit, resoluit.

2. Emplastrum Cephalicum.

F. F.

℞. Resin. pin. ℥ij.

Ladan.

Myrrh.

Mastich. ℥vi.

Gum. Tacambac.

Galban.

Opopan. à ℥β.

Visc. Tilia. ℥v. ℥ij.

Sem. Pœon. mar. ℥ij. ℥ij.

Cubebar. ℥iv.

Ol. Succin.

Nucist. à ℥β.

Gummatis in ✚ dissolutis, f. l. a.

Emplastrum, addendo Tere-
binthinæ ℥iij. M.

Vires. Capitis catarrhos exiccat, i-
demque corroborat, proin confert in A-
poplexia, Epilepsia, Vertigine, & simi-
lib.

3. Emplastrum Diaphoretici-
cum.

℞. Ceræ. citrin. ℥xvj.

Bdell. pulver. ℥v.

Colophon;

Pic. naval. ana ℥iv.

Succin. citrin. ℥iij.

O. Ammoniac. ℥j.

F. Emplastrum, f. a. malaxan. locum
Ol. ovorum.

Vires. Discutit, seorsam humiditatem
elicit & absunit.

Usus est præcipui in Ischiatica, intume-
scentia pedum, & simil.

4. Emplastrum Febrifugum Stro-
belbergeri.

℞. Terebinth. cypr. opt. ℥iij. lique-
scat in vase cupreo super Δ moderato;
huic injice.

Araneæ. Vivar. in hypocaustis vel lo-
cis mundis captæ. N. xv.

Misceantur & agitentur cum pistillo
ligneo, usque dum color Terebinthi-
næ fiat cinereus & vix aliquid de arane-
is deprehendatur: Tum iterum tepesa-
ctæ mixturæ adde:

Telar. araneæ mundarum quan-
tum prædictæ araneæ texere, vel harum
loco adhuc 19. araneas mediocres: ite-
rum fortiter agitentur: Interea etiam
immiscendo.

Asphalti opt. pulveris. &

*. albiss. ana ℥iij.

Terantur usque dum refrigeret ma-
teria & acquirat consistentiam Empla-
stri nigerrimi. Reponantur per 14. ℥.
tandem rursus ad Δ mollescat, & ma-
nib. oleo febrifugo inunctis malaxetur
modicè.

Usus. Formentur inde Emplastra in-
star $\frac{1}{4}$. Thaleri, quæ auro vel argento
obducta, corioque testæ, imponantur
pulsib. utriusque carpi hora una ante
paroxysmum, relinquendo per 9. ℥.
Tunc eadem hora in profluentem a-
quam projiciantur.

N. Oleum febrifugum vide

c. 27.

Emplastrum hoc est de quo Strobel-
bergerus in introductionem typis expressam
omissa descriptione Anno 1626. divulga-

Bb 2

vii

vis descriptionem itaque transmisit mihi
Clariss. D. D. Iohann. Christoph. Eifen-
menger / Physicus Ord. Imperialis Heil-
brunnensis, amicus meus integerrimus,
cujus verba ne de genuina descriptione
dubites, hic subjungo. Es sunt: Hanc de-
scriptionem mihi communicavit illu-
striss. Comitis Caroli à Woldenstein
(qui non solum à grana hujus beneficio
liberatus, sed 800. Thaleris à D. Siro-
belbergera emit:) Frater Adamus Co-
mès à Woldenst. p. i. Ord. Teuton. Com-
mendator in Heilbrunn.

5. Emplastrum ad Fontinellæ.

F. F.

℞. Cerus.

Lithargyr. à ℥vi.

Ol. Rosar. lb. j.

Aq. Rosar. ℥viii.

Coquel. Δ. in fine adde ceræ alb.

℥iij.

F. l. a. Emplastrum.

Vires. Arcet inflammationem.

6. Emplastrum Gummatum
Paracelsi.

℞. Gumm. Serapin.

Bdell.

Opopanac.

Galban. à ℥j.

Solve in ☞ cola, colaturæ
adde Mastich.

Thur. masc. à ℥iij.

Ceræ alb. ad pondus omnium

F. Emplastrum.

Vires. Mundificat vulnera & conso-
lidat, discutit tumores.

7. Emplastrum ad quamvis herniam
excepta hydrocele.

℞ exuvias anguillarum non salitas & in
aq. calcis lotas, coque in lixivio donec
crassescant & F. instar glutinis, quod
effunde super marmor.

℞ hujus glutinis trajecti ℥iv. adde
Lapid. hæmatit.

Sacchari. ℞i.

℞ ustian. ℥iij.

Gumm. ammon. in ☞ acerr. so-
lut. & cum ol. Myrrh. confu-
si ℥iij.

M. Omnia in fictili super. F. lentos,
ut coëant in massam Empl. tenuis, ex-
tendatur super alutam. Hoc gluten
adeò tenax est ad hernias glutinandas,
imò ad solum peritonæum, ut omne
aliud impar sit, superponendo levissi-
mum subligaculum & diætam con-
gruam observando.

8. Emplastrum magneticum.

℞. Gumm. Serapin.

Ammoniac.

Galban. à ℥iij.

Solve in ☞ cola & inspissa:

Hinc.

℞. Terebinth. latic.

Ceræ ana. ℥ß.

Liquefac ad ignem, atque subducto
igne admisce exactè gummi.

&

Ol. Succini. ℥ij.

atque tandem

Lapid. seu magnetis arsenicalis
drach. iij.

Ter-

Terra Φ i 3j.F. Emplastrum ac malaxa cum Ol.
Scorpionum.

Vires. *Vlceribus aut carbunculis pestilentialibus applicatam subito rumpit, venenum ex imo instar magnetis potenter attrahit, nec apertum ulcus coire patitur, ante perfectam extractionem omnis venenositatis. Hartman. in Pract.*

N. Lapidem s. magnet. Arsenic. Vide in Lapidibus.

9. Emplastrum mundificati-
uum.

R. Cera lb. i.

Resin. alb. 3iv.

Terebinth. latic. 3i.

Ol. bufonum.

Scorpion. ana 3ij.

Styrac. liquid. 3vi.

Suc. chelidon. expr. 3iv.

Aristoloch. rot. 3b.

Gumm. ammoniac. in \times .

solut. & inspissat. 3ii.

Myrrh.

Sarcocoll. $\dot{\text{a}}$ 3j.

F. l. a. Emplastrum.

Vires. *Mundificat vulnera venenata ac fistulosa. Hartman. in Pract.*

10. Emplastrum Oppodeldosh secundum
Fel. Würtz.

R. Cera Virgin. lb. ij Terebinth. lb. i.

Ol. commun. 3iv.

His liquefactis adde

Succi Chelidon.

Fol. querc.

Alchimill.

Veronic. $\dot{\text{a}}$ 3ib.

Coque ad consumptionem humiditatis, dein admisce.

Gumm. cum \times depurat. & inspissat.

Ammonic.

Galban.

Opopan. $\dot{\text{a}}$ 3vi.

Golophon. 3ib.

Succin. 3b.

Mastich.

Myrrh.

Oliban.

Sarcocoll.

Omnibus benè mixtis & paululum refrigeratis adde agitando.

L. Hamatir. Præparat. 3ib.

Croc. Φ 3ij.

Q. 3j.

Tur. præparat. 3ij.

Lapid. calaminar. 3x.

Tandem in fine admisce

Terra Φ li edulcora-

ta q. s.

ad colorem brunnum i. e. purpureum conciliandum.

F. Emplastrum.

Easdem vires ac applicationem cum stictico Crollii obtinet

N. Terebinthinam addere præstat ante pulveres.

11. Emplastrum Oppodeldock
Paracelsi.

R. Gumm. Galban.

Opopan.

Bb 3

Am-

Ammoniac.

Bdell. à ℥ij.

Macerentur per ☿ (8. vel plures)
in ✕ cola & inspissa ad consistent. mel-
lis; Dein.

℞. Lithargyr. pulv. ℔. i. (alii ℔. i℔.

Ol. commun. ℔i℔.

Coque lento Δ continuo agitando,
donec brunnū sive spadiceum calo-
rem acquirat : hinc adde.

Cerae ℔. i.

Qualiquefacta, immisce etiam supe-
riora gummata, & paulò post.

Ol. Laurin. ℥ij.

Move diligentissimè, donec nimi-
rum omnia exactissimè fuerint mixta
remove ab igne, adde.

Croc. ☿.

Mum. transmar.

Magnet. præparat.

Magist. corall. alb.

rubror. à ℥℔.

Lapid. calamin. præp.

Myrrh. rubr.

Thur. masc.

Mastich.

Rad. aristoloch. rot.

à ℥ij.

Hispulveris: infunde pedetentim in
liquefactum Emplastrum, omnia exa-
ctè miscendo.

Postremo.

℞. Balsam. succin. ℥j. (ol. crassioris

O. lautin. ℥j.

Terebinth. ℥℔.

M. & liquefac seorsim, solve in
eodem.

Camphoræ ℥ij.

& tandem. Croc. or. ℥℔.

Solutionem hanc seorsim factam,
cum Emplastro calido misce exactissi-
mè, ut fiat Emplastrum, quod malaxa
oleo hypericonis.

Vires. *Curat omnia vulnera, pun-
ctim & caesim inflata sine omni pure. Ex-
crescentiam carnis impedit, ejus tantum,
quantum opus est producendo. Ulcera an-
tiqua prius mundificata similiter curat.*

N. *Si fortius desideras & ad sananda
quævis asthiomena & corrodentia ulcera
proficuum.*

℞. Croci metallor.

Colchotar.

℥ij per se præcipit. a-
na q. v.

M. pulverisando, atque pulveris
hujus ℥℔. misce ad liquefacti Empla-
stri ℥℔. superaddendo aliquid Tere-
binthinæ. *Hartmann. in Croll. & in
Practica.*

12. Emplastrum Saturninum exper-
tum à S. Closs.

℥ albi plumbi ℥iv.

Cretæ albi℔. ℥℔.

Myrrh. rubr. ℥ij.

Amalgamatis ex part. ij. ☿ & par-
te unâ ℔ ni. ℥vi.

Axung. verris q. i. ad formandum
Emplastrum in mortario ca-
lido.

Vires: *Ulcerata callosa & maligna, i-
mò pessima unâ solâ admotione curat.
ablucendo ea primo (si sordida sint) aqua
dissolutionis lapidis Salutis Crollij, mox
Empl.*

*Empl. in alutâ sat. spissè extensum admo-
veatur. Ulceri, & si opus sit Emplastro
Diachalciteos contineatur, superinducta
fascia lanea (Gallicè felin, satis stricta, ne-
que removeatur ante 15. d.*

13. *Emplastrum ad Scyrrhos
S. Clossai.*

℞ Gumm. carann.
Tacamahac. an. ℥j.
Ammon.
Galban. an. ℥ij.

Liquentur in aceto & per linteum
colentur, deinde admisce.

Ol. liliorum alb. ℔ss.
Axung. taxi ℥ij. M. & adde
℥ mineral, vel aquilæ alb. dulcifi-
cat. ℥ij.

Redige ad formam Emplastri & ad-
junge.

Lytharg. subtiliter pulveris. ℥ij.
Rad. elleb. nigr.
Bryon. an. ℥ij. M.

Hoc Empl. omnestumores contu-
macissimos & erudos vel suppurat in
partibus suppurabilibus, vel ex toto re-
solvit, si flatus prædominentur.

14. *Emplastrum Spleneticum de
Cicuta, F.F.*

℞. Cicut. eum toto incisâ & pulveris.
℥ix.

Succ. expressæ ejusdem ℥iv.

Ol. cappar. ℥xviii.

Itini ℥v.

Misce, digereque in MB per 4. de-
in coque. Hinc colentur cum forti ex-
pressionē.

In hac dissolve:

Ceræ novæ. ℥ivss.

Gumm. ammoniac. in succ.

cicut. sol. ℥ss.

M.F. Emplastrum.

Vires. Lienem obstructum aperit, ro-
borat, duritiem emollit, &c. sed & rubo-
rem inducit.

15. *Aliud Empl. Spleneticum Foresti,
Ceratum de Ammoniaco
dictum.*

℞. Ammoniac. in ✕ dissol. ℥j.

Ung. Dialth.

Empl. de melior. an. ℥ss.

Furfur. frument. cibrat.

Pulv. rad. Bryon.

Ireosana ℥ss.

Pingued. anat.

Anser.

Gallin. a. ℥iij.

Bdellii.

Galban. ℥ss.

Ol. irin. an. ℥ss.

Bulliant leniter in mucilaginis
sem. lini & sænugr. ā q. l. & ut in for-
mam debitam cerati coeant, adde Ce-
ræ ℥ss.

Terebinth. &

Resin. pini ana ℥ss.

F. Emplastr.

Vires. Plurimum emollit & resolvit
duritiem scirrhusam, eoque nomine arca-
num Foresti fuit. Obs. 20. 12.

16. *Emplastrum Sticlicum
Crollii.*

℞. Minii.

Lap. calaminar. ana ℔ss.

Lithargyr. auri & arg. ana ℥iij.

Oil.

Ol. Lini.

Olivar. ana t̄b̄f.

Laurin. t̄b̄f.

Cera.

Colophoniz ana t̄b̄j.

Vernicis.

Terebinth. ana t̄b̄f.

Gumm. Opopanac.

Galban.

Serapin.

Ammoniac.

Bdellii ana ʒiij.

Carabe citrin.

Oliban.

Myrrh. Alexandr.

Aloës epat.

Aristoloch. long.

rotund. ana ʒj.

Mum. transmarin.

Magnetis.

Hæmatit. ana ʒiʒ.

Corall. albor.

rubeor.

Matr. perlar.

Sanguin. Draconis.

Terræ medicat. Strigenf.

Vitriol. alb. ana ʒj.

Fl. Antimon.

Groc. ʒ ana ʒii.

Camphor. ʒj.

1. Gummata ʒ. solvantur & depurentur solvendo in aceto, exprimendo & rursus inspissando.

N. Dosis potest augeri propter feces abjiciendas.

2. Oleo lini & olivarum admisceatur Lithargyrium utrumque, coquen-

do & agitando, donec oleum coloretur, postea addatur lapis calaminaris, & paulo post, minium. Coquantur ad sufficientiam (horas duas) cujus proba est, si supra unguem gutta concreſcat & condensetur.

3. Tandem addatur circa finem Vernix, Oleum Lauri, cera, colophonia; omnibus benè mixtis & liquefactis affunde successivè gummata liquefacta, diligentique agitatione misce, idque calore lentissimo (cave ne bulliat) postea admisce pulveres: ultimo Camphora resoluta in oleo Juniperino addatur.

N. Si forte nimis durum esset, addatur adhuc aliquid cera & colophonia. (prestat terebinthina) Proba justa decoctionis hac est; guttule aliquot frigescent, (in aquam sc. frigidam stillatæ, vel suprà tabulam metallicam,) hæc refrigerata si digitis adhaerint nimis molles, si gnum est imperfecta decoctionis, coquatur igitur ulterius ut dureſcat. Tum affunde in frigidam, at malaxa benè (hor. 3. vel 4.) manibus inunctis oleo ex chamomelin. rosar. juniper. lumbricor. hypericon. ana q. v. mixito.

Vires. Prodest contra inveterata ulcera & vulnera recentia, consolidando, mundificando, putredinem arcendo. Matureſcere facit apostemata cuncta.

17. Emplastrum Diasulphur.

Rulandi.

ʒ. Balsam. Sulph. Ruland. ʒiij.

Ceræ. ʒʒ.

Calophon. ʒiij.

Myr.

Myrrhæ ad pondus omnium.

Omnibus præter myrrham liquefactis & bene comixtis inspergatur myrrha subtilissimè trita, lentoque Δ coquantur, ($\frac{1}{4}$. horæ) semper agitando. Hinc ab igne remove, agitaque donec refrigescant.

Vires. Curat, omnis generis ulcera, Sennert. Instituit.

18. Emplastrum stomachicum
de Tacamahaca.

R. Tacamahac. \mathfrak{z} iii.

Storac. \mathfrak{z} j.

Ambari momentum.

F. Emplastr. cum oleo aliquo appropriato v.g. mastich. &c.

Vires. Emplastrum est stomacho longe utilissimum, siquidem roborat, appetitum ciet, concoctionem iuvat, & flatus discutit. Monard.

19. Emplastrum ad Tophos & gummata
R. ea S. Closs.

\mathfrak{z} empl. Opodeldoch Penoti aut Croll. rec. \mathfrak{z} vulgar. aut \mathfrak{z} an. part. æqual. Malaxentur simul cum pauxillo gumm. guajac. & exalutâ nodis admoveantur.

20. Emplastrum Vesicatorium, Clariss.
D.D. Petri de Spina, pro
usu F.F.

R. Cantharid. sine alis & cap. \mathfrak{z} ss.

Myrrh.

Mastich.

Camphor.

Afæcetid. \mathfrak{z} ss.

Butyr. recent.

Terebinth. lot. \mathfrak{z} ij.

Ol. rosar. \mathfrak{z} ss.

Ceræ \mathfrak{z} j.

F. sa. Emplastrum.

Vires. Supracorium crassiusculè extensum hor. 8. vel 10. Vesicam excitat.

N. Vide idem apud Gregor. Horstium l. 4. observ. part. 1. ubi omittere suadet A. sam fœtidam.

21. De Dropace.

Ad emplastra pertinent & Dropaces, qui sunt Emplastra, à pice, ut nomen, ita & substantiam sortita, licet interdum quoque malaginatæ instar fiant.

Modus fiendi.

Liqua picem, addito tantillo olei, & simil. hinc immisce immiscenda materialia.

N. Materialia sunt piper, pirethrum, rosamarinus, euphorbium, castoreum, bitumen, Sulph. salpetra, sal commune, cinis sarmentorum.

R. Picis aridæ \mathfrak{z} i. Olei \mathfrak{z} ii. F. Dropax simplex.

R. Picis \mathfrak{z} ii. ol. citon. vel mastich. \mathfrak{z} ss. M. Confert in vomitione ventriculo impositus.

R. Picis siccæ, ceræ nov. ana. tbs. axung. suillæ \mathfrak{z} vi. Sulph. viv. \mathfrak{z} j. Liqueantur in crassitiem Emplastri.

R. Picis, ceræ, colophon. ana \mathfrak{z} iiij. Sal. com. \mathfrak{z} ss. bitum. \mathfrak{z} j. Sulph. viv. \mathfrak{z} iiij. piper. euphorb. ana \mathfrak{z} ij. cantharid. \mathfrak{z} ss. castor. \mathfrak{z} j. F. Dropax.

Vires. Interveniunt Dropaces præcipue membris calfaciendis, sanguini alliciendo,

Cc

ciendo,

ciendo, & consequenter atrophiam emendanda.

Adhibetur calfactus, (derasis antea ca-

pillis) avelliturg, antequam omnino refrigeret, iterumq, calefit, & applicatur, idq, toties, donec pars rubescat.

CAPUT XIV.

De Emulsionibus.

Emulsio, ab emulgendo sic dicta, est medicamentum liquidum lac colore æmulans, ex medulla fructuum, seminumve lactescentium interveniente liquore appropriato, prolectum.

Exhibent lacteum humorem amygdalæ, sem. 4. frig. major. sem. papaver. (alb.) portulac. lactuc. card. mariz, card. benedicti, cannabis, violar. bombacis, Napi, Aquileg. Citri, &c. nuclei pœon. pineæ, pistacia, persicarum nuclei.

Lactææ substantiæ eliciendæ satisfacere poterit liquor aqueus quicumque, veruntamen quia intrinsecus emulsionnes ferè sumuntur, gratos adhibere liquores fas erit. Tales sunt aquæ stillatitiæ, aqua fontana, (cum panis frustulo decocta) decoctum hordei, glycyrrhizæ, ciccerum, C. C. passularum, jujubarum, & simil.

Quantitas liquoris varia est, modo major, modo minor, prout crassior, vel dilutior emulsio expetitur. Communiter autem sumitur, triplum, quadruplum ad decuplum, & ultra.

Modus fiendi.

R. Lactescentia, quæ adhibere animus est, (excorticata si excorticari

possint, ut amygd. sem. frig. maj.) pista in mortario (præstat lapideo) subinde nonnihil liquoris (ne attritu pinguescant) instillando, hinc affunde liquoris medietatem circiter, exprime per linteam. Residuum, (quia substantia lactescens vix tota vice una emulgetur,) contunde denuò, ac emulge cum reliquo liquore.

Usus. Per se propinari poterit, vel & aliis exhibendis inservire, ut sunt potissimè pulveres cordiales minerales, vel his similia magisteria, &c.

N. 1. Quod si ingrata foret, dulcorari poterit Saccharo, vel rotulis; exempli gratia, manus Christi, julpio violar. rosar. vel simil.

N. 2. Cave, acida commisceas, quippe his substantia lactescens ad subsidendum prompta est.

Quia emulsionnes ex medicaminibus sunt, quæ faciliè corrumpuntur, ex tempore ad præscriptum parari solent.

Sic fit.

Lac id est, Emulsio amygdalarum dulcium.

R. Amygd. dulc. excorticar. lbss. decoct. hordei mensur. 1. F. emulsio.

Emul-

Emulſio nephrocathartica.

R. Sem. violar. purpur. ℥ss. vel 3vi.
cum ∇ veronic. F. emulſio.

Emulſio ad acrimoniam

R. Amygd. infuſ. in ∇ roſar. ℥ii.
Sem. melon. papav. alb. à 3j. hordei
mundi diutiſſimè cocti ℥iii. F. emulſio
in ∇ hord. lbss. adde Julep. roſ. ℥ii.

Emulſio expulſiva.

R. Sem. Aquileg.
Napi an. ℥ii.
Aq. Fumar.
Galeg.
Aquileg. a. ℥iſſ.

F. Emulſio.

Vires. Valet ad morbillos & exan-

themata expellenda.

N. Addi poſſunt pro libitu Iuleb vio-
lar. ℥ss. ut & pulveres appropriati. V. g.
C. C. oc. al. cancri &c.

Emulſio refrigerans.

R. Decoct. C. C. uſti, vel ſialyus adſtri-
cta ſit. C. C. raſpat. lb i.

Sem. 4. frig. maj. an. ℥iii.

Papav. alb. 3i.

F. Emulſio.

Vires. Commoda eſt in febribus pra-
cipuè epidemiis

N. In pleuriticis affectibus ſolo ad-
miſcere Aquam papav. errat: ſemenq;
Cannabis ſeminibus illis frigidis inter-
miſcere &c.

CAPVT LV.

De Errhinis.

ERrhina variis parantur formulis vi-
del. liquoris extracti, linimenti, pul-
veris, &c.

Liquores tùm ſimplices adhiberi
poſſunt, verbi gratia, ſuccus betæ,
majoranæ, rutæ, &c. Tum compo-
ſiti.

Errhini liquidi formula ſie

1. Errh. Cratonis.

R. Sem. nigell. 4. diebus in acet.
roſ. infuſ. atque pulv. 3j.

Aq. majoran. cum ſucc. herbar.
expr. 3ij. M.

Purgat caput. Crato.

2. Errh. Montani.

R. Succ. bet. recent. ℥iii.

Aqu. majoran. ℥ii.

Ol. amygd. 3i.

Miſc. cum brodio pulli.

Vires. Commendatur admodum ad
eliciendos catarrhos per nares. Uſuq; exi-
mii dicitur in tinnitu aurium.

Errhinon in formâ pulveris

S. Cloſſei.

℥ Florum ptarmicæ 3ii.

Bethon. 3i.

Nicotian.

Rad. angelic. an. 3iſſ.

Transmittantur per ſeta-
ceum addendo.

Scobis ligni S. 3ii.

Cubebæ. 3i.

F. pulvis.

Vires & Doſis: Hujus 3j. attraha-

Cc 2

err

tur per nares ex tubulo incurvato. Evacuatur per nares & os magnam mucilugini salivaeque copiam.

Extractum Nasale.

P. de Spina.

℞. Succ. recent. anagall. ℥iij.

betæ.

nicotian. foem. à ℥ii.

betonic. ℥i℞.

Turbeth. gumm. ℥v.

Agaric. albiss. ℥j.

Infundantur in f. q. aqu. sca-
bioſæ, digeranturque in vaſe clauſo
& (8.) Hinc decanentur, abſtraha-
turque ad conſiſtentiam extracti mol-
lioris.

Vires. Potentiſſimè educit pituitam,
& humores ſalſos à capite per nares; ca-
tarrhosque ad fauces & pulmones deſtil-
lantes ad nares divertit, parum naribus
inducit.

Linimenta, vide infra de Unguentis.

CAPUT LVI.

De Epithematis.

Epithema eſt etymologicè omne
id ſonat, quod parti alicui impo-
nitur, ſive liquidum id ſit, ſive durum:
attamen in praxi denotat recentiori-
bus (veteribus enim malagmata, un-
guentaque notabat, mediæ corporis
regioni accommodata) medicamen-
tum liquidum, quod ſpongiâ, panno,
linteo, ſtupa ſuſceptum parti alicui im-
ponitur.

Fiunt Epithemata ex ▽ ſtillati-
is, fuccis, decoctis, emulſionibus,
aliisque liquoribus convenientibus,
ſive ſolis: ſive cum pulveribus, ſpe-
ciebus, electuariis, & ſimilib. com-
mixtis.

N. Penetrationis ergo additur non-
nunquam aliquid vini odoriferi, a-
ceſſi, ſpiritus ſeu aquarum ſpiritu-
ſarum.

Proportio { Liquor. ℞ ℞.
Pulver. ℥j. ad ℥℞. & ul-
tra.)
Vini vel ſpiritus ℥j.
plus minus.

Adhibentur ſerè tepidè, præcipuè
capiti & cordi; artub. v. etiam frigidè
applicari poſſunt.

Epithemata in officinis parata nul-
læ extant, ſed ex tempore miſcentur,
ejuſ rei gratia ſpecies certæ in prom-
ptu haberi ſolent.

Ut

Species pro epithemate Cordis.

Epatis

quibus & alias ſubſtituere licet

Exempla erunt:

I. Epithema Cordiale.

℞. Aqu. Roſar. ℥iv.

Nympha.

Vio-

Violat. à ʒij.

Bugloss.

Meliss. à ʒß.

Vini alb. odorif. ʒj.

Pulv. sem. acetos.

Corall. rubr. præparat.

Santal. citrini.

albi à ʒß.

Cort. citri. ʒj.

Croc. ʒß.

M. fiat. Epithema.

Vires. Cordi refrigerium adfert, syncope correptos excitat, panno scarlato susceptum, cordisque regioni tepide impositum.

II. Epithema Epaticum.

R. Aqu. portulac.

Rosar.

Plantag.

Acetos.

Intyb. à ʒiv.

Sem. portulac.

acetos.

Endiv. à ʒi.

Troch. de camphor.

Santal. citr. à ʒij.

Aceti parum.

M. F. Epithema.

Vires. Epatis & sanguinis æstum demulcet, & hinc sistit hæmorrhaginem narium Epati tepide impositum.

III. Epithema in febrili malignis.

R. Aqu. Rosar.

Sambuc.

Lactuc. à ʒiß.

Acet. rosac.

rutac. ana. ʒiß.

Spec. Diatr. Santal. ʒi.

Sal. nitr. præparat. ʒj.

Theriac. Andr. ʒiß.

Croci. ʒß.

M. F. Epithema, cui & tantillum camphoræ admisceri poterit.

Vires. Carpis & fronti applicatum æstum febrilem mirum in modum, in febribus malignis præcipuè mitigat, Cephalalgiam lenit, somnum conciliat.

CAPVT LVII.

De Extractis, ac 1. de Menstruis.

Extractorum campus latissimus est, fieri nimirum possunt ex mineralibus, vegetabilibus ac animalibus.

Liquor, cujus beneficio extracta fiunt, [Menstruum vulgè dici solet] varius occurrit. Spiritus vini, spiritus juniperi, spiritus mellis, spiritus Tere-

binthinæ, Vinum, Hydromel, serum lactis, ros majalis, uti & hujus spiritus, acetum destillatum, ∇ stillatitia, (sive ex aqua fontana pluvialive, sive ex vegetabili uno, aut pluribus, & simil. elicita illa sit.) Nec enim quivis humor, cuius extractioni convenit, sed certus certæ, sulphu-

Cc 3

reus

reus sulphureæ; salinus salinæ,
&c.

Inter alia autem menstrua famosissima sunt. 1. Vi. 2. ∇ vitæ Tart. Quercetani. 3. ∇ temperata Basilii. 4. Acetum Philosophicum Quercetani. 5. Menstruum universale, aqua calica Lullii dicta, de quibus paucis differere placet.

1. Spiritus Vini.

Spiritus Vini menstrum adeo famosum est, ut quoque catholicum nonnullis dicatur. Adhiberi solet, ubi simpliciter menstrui mentio facta fuerit. Verum enim vero, num in extractione purgantium commodè adhibeatur, non immeritò dubitatur: ansam dubitandi præbet natura illius sulphurea, quæ parti salinæ extrahendæ, quali purgatrix facultas inhæret, minus commoda est: Rationi huic adstipulatur experientia, quâ constat, vim purgatricem, quam ∇ intractam reliquit, postmodum alii paruisse menstruo. Ea propter cum farrago sat copiosa menstruorum suppetat; quæ non modò minus sunt laboriosa ac minus pretiosa, sed & purgantibus qualitatibus extrahendis commodiora, satius erit loco ∇ laboriosi ac pretiosi aliud quoddam menstruum eligere, e. gr. aquam destillatam convenientem.

Adhibetur ∇ tùm simplex, tùm acuatus, vide lib. 4.

N. Sunt qui ∇ crebris destillationibus per serpentinæ, id est, serpentes

canales destillatum & in substantiam pinguem redactum, circulatum majus paracelsi esse volunt, sed male.

2. ∇ vitæ Tartarificata Quercetani.

Quercetanus inter Medicos Hermeticos hæc postremus, peculiaria prædicat menstrua, quæ tamen sibi met reservavit. Inter hæc sunt ∇ vitæ tartarificata ac acetum philosophicum. De ∇ vitæ Tartarificata in Pharmac. restit. cap. 26. Haslenus, inquit, hand dubiè animadvertisti in variis ejusmodi purgantibus Extractis, varia quoque menstrua & dissolventia, apta tamen & congrua à nobis usurpari, & quorum magni & egregii effectus abunde satis patebunt. Sed verus & peritus Chymicus qui ingeniosa quadam arte & industria sciverit preparare ∇ m vitæ tartarificatam, hujusque perfectam cognitionem adeptus fuerit, is poterit inde eruere dissolvens quoddam sive menstruum generale, quo extrahet Essentias omnium rerum purgantium, radicum, foliorum, herbarum, seminum, fructuum, & florum: is inquam verè gloriari poterit, de summo & elegantissimo naturæ mysterio, de quo non licet plura addere, ne justam doctorum iram & reprehensionem incurram &c. Hæc Quercetanus de sua ∇ vitæ tartarificata, cujus præparationem nullibi expressè tradidit, nisi intellectam velis ∇ vitæ ex hydromelite Tartarificato prolectam, de qua in Pharmacop. cap. de Hydromel. hæc habet: Ex commemorato malvatico vino

vino nostro artificiali (i.e. ex hydromelite) extrahitur præstantissima ∇ vita, vino longè accommodatior, ad eliciendas rerum essentias. Sit ut sit, parum cedere videtur, nisi prorsus eadem sit (ut multi opinantur,) ea scil. quam dabimus!.

4. Cl. 2. de vino.

3. Aquatemporata Basilii.

Occurrit itidem de menstruo hoc Basiliano varietas non parva. In hoc tamen conveniunt omnes, quod ex Vi originem trahat, quem alii acunt sale comununi, alii sale sarmentorum, alii spiritu salis, de quibus plenius lib. 4. de Vino.

4. Acetum Philosophicum Quercetani.

Aceti sui Philosophici crebrò meminit Quercetanus, eique primas inter aceta tribuit. Verum adeo ænigmaticas illius reliquit descriptiones, ut mentem genuinam vix assequi liceat. *Acetum Philosophicum*, inquit, (in tetrad. de antidot. Confilis) ex acido liquore roris seu manna cœlestis, cum eadem met minera per digestionem, & fermentationes Philosophicas sit & præparatur, & paulò post, componimus & conficimus, inquit, (acetum Philosoph.) ex mixtione & convenienti proportionem, fermentatione ac unione aërea aciditatis animalis, & mercurialis acoris aquei, cum vegetabiliterrestri. Hæ sunt descriptiones à Quercetano relictæ, quarum obscuritas diversas peperit interpretationes, adeoque diversas a-

ceti illius præparationes. Libavio sit ex rore martio & manna: aliis sit, ex melis & salis liquefacti an. lb. i. \times lb. ij. quæ digesta simul destillantur cum rectificatione aliquoties reiterata. Modum utrumque etsi non penitus rejiciam, attamen neuter mentem Authoris satis explicasse videtur. Nimirum secundum hunc acetum Philosophicum fieri colligitur, ex aceto hydromelitis vinosi, & sale Tart. vel proprio sale. Et enim mel, quid aliud est, quam ros seu manna cœlestis, industria apum (unde & animale audit) congestum? Hinc ipsemet Quercetanus rejectis aliis acetis, verbi gratia, è vino & simil. utpote quæ ad solutionem & extractionem rerum metallicarum inidoneæ sint, præfert aceta hydromelitem vinosorum, scil. quæ cum manna cœlesti, naturam animale percurrerunt, & præter vegetabilem induerunt. Vide *Tetrad. pag. mihi 406*. Idem Quercet. in *Pharmacop. restit.* ubi in descriptione theriacæ de melle agit, Mel produci & elaborari ait ab apibus, quæ solummodo pascuntur manna cœlesti, & ex floribus odoriferis suavissimis & delicatissimis succis alimentum exsugunt.

Per terrestre vegetabile Vini tartarum intelligi ex eo liquet, quod vinum omnium vegetabilium nobilissimum facit, adeoque $\text{uax}^{\text{e}} \text{ex}^{\text{e}} \text{u}$ vegetabile vocari ait.

5. Menstruum Universale.

De

De Menstruo universali satius esse ducotacuisse, quam aliquid incerti tradidisse: Veruntamen non possum quin moneam, post habitis rebus particularibus, ad subiectum universale esse aspirandum, idque quærendum, non quale pedibus calcatur, sed quatenus Vesta ea est nitidissima, id est, tartarea veste involuta.

Modus parandi Extracta.

R. Materia, ex qua Extractum parare libet, q. v. para ad infusionem grossè pulverisando, scil. incidendo, radendo, & simil. hinc affunde menstruum, (e. gr. V) ut superemineat digit. (2.3.4.) repone in teporem (MB. cineris, fimi, &c.) Extraheque s. a. Tandem depletiones omnes confunde & abstrahel. Δ. (gr. MB.) ad consistentiam debitam.

N. 1. *Extracta cum menstruis nondum abstractis, confusa, Tinctura dicuntur.*

N. 2. *Crebriora sunt huiusce Extracta expurgantibus, rariora ex alterantibus, quippe horum succi loco ac tunc Extractorum, Essentiarumvè sepe asservari solent.*

Sic parantur Extracta:

EX MINERALIBUS, modo jam descripto, uti patet, lib. 3.

N. *Extracta mineralium pleraque Tinctura nomen retinent, de quibus infra.*

EX VEGETABILIBUS, scil. 1. ex herbis, 2. floribus, 3. seminibus, 4. fructibus, 5. radicibus, 6. lignis & cortici-

bus 7. aromatibus, hinc 8. ex resinis, 9. ex gummatibus.

1. *Herbarum Extracta sunt rara, quippe [uti dictum,] succi eorum loco prostant. Fieri tamen possunt.*

1. *Modo generaliter dato, ex herbis scil. siccis.*

2. *Ex succis inspissatis (si subtiliora Extracta expetis,) cum ∇ sua propria dephlegmata (spiritu) quod Extr. dein filtrandum & ad consistentiam redigendum.*

3. *Quercetanus. R. Herbas virides, conquassat, elicitque ∇m leniter destillando V. Fecibus omnino siccis, (nihil tamen adustionis redolentibus,) & in pulverem grossum reductis, affundit ∇ illam destillatam, extrahitque s. a.*

II. *Florum Extracta in specie sic dicta, rara itidem sunt. Succie contra expressi inspissatique (qui communiter Extractorum ac Essentiarum nomine veniunt) crebriores; de quibus in succis agitur.*

Extracta prioris generis sunt.

R. Flores vel gemmas (e. gr. hypericantis) incide ac affunde V rectific. ut undique madefiant, macera (σ 8.) dein exprime. Expressionem purifica per digestionem ac subsidentiam (non cum albumine ovi, quod in omnibus tincturis, in quibus aliquid resinæ latitat, benè notandum.) Partem puriorem à fecibus decanta; Vm destillando abstrahet; remanentemque tinctu-

tincturam coagula ac serva. Sic paratum usuale est Extractum, seu Essentia Croci, quæ nonnunquam Tincturæ titulo venit.

N. Fieri eundem possunt cum aavis propriis, vel alienis, convenientibus tamen, præcipuè si acidula ea fuerint reddita guttulis aliquot spiritus Tartari, vel Vitrioli.

III. *Seminum* Extracta eodem cum reliquis parantur modo, beneficio V.

IV. *Fructuum* Extracta (proprie sic dicta) ratiore itidem sunt, crebriores succi inspissati, quæ veniunt nomine saporum, rob. mellium & succorum. Fieri nihil ominis quæque possunt ex fructibus siccatis per V, vel quod melius, cum sua propria Aqua vitæ, (spiritu) quæ postmodum abstrahitur relicto Extracto in consistencia mellis. *Quercetanus in Pharmac. rest.* Sic fiunt Extractum baccar. juniperi, baccar. lauri Vide & Tincturas.

V. *Radicum* Extracta usualia pleraque sunt succi, sufficit enim si succulentæ ea sunt, faciliusque expressionis, (non mucilaginosæ) solummodo coquere, exprimere ac inspissare: Nihil ominis tamen parari quoque possunt extracta subtiliora nimirum

1. Ex radicibus minus succulentis, modo generaliter dato cum V parantur

N. *Quercetanus in Extractis bezo-*

ardicis parandis adhibet spiritum juniperi, abstractamque ∇m (in inspissatione) reservat pro usu ibidem bezoardico.

Sic fiunt Extracta Angelic. Aristoloch. Enulæ, Gentian. (cujus succus magis usualis est) Imperatoricæ, Pæoniæ, Tormentillæ, Zedoariæ.

2. Ex radicibus succulentis ac mucilaginosi, fit 1. Succus inspissatus, hinc ex succo seu mucilagine inspissata, l. a. cum V extractum confic. Sic paratur Extractum Symphyti.

Huc referre licet & succos qui digestionem rubicundiores evaserunt, ideoque sanguinis titulum nacti sunt, vel Mumia.

2. Radicem succulentam quamcunque vis, purifica optimè, contunde ac exprime succum; hunc in phiola digere calore MB, donec in rubrum convertatur colorem. Materiâ in rubredinem conversa, omniq; hypostasi sive crassamento ab ea separato, separetur liquor, qui colore albo inde destillabitur, extracto in fundo remanente sub forma sapæ rubicundæ. *Quercetanus in Pharmac. restituit. c. 26.* Sic fit Extractum ex radice Hyoscyami, cujus usus est in anodynâ cujusdam & laudani compositione. Sic paratur & Extractum Etulæ.

N. Ex radice Symphyri & Satyri simili serè modo, Extracta sanguinea seu sanguines eliciuntur. Nimirum pulpa illarum cum pane ac vino vel Sp. vini digerantur

Dd

digerantur

digerantur, defecentur ac inspissentur. Verum enim vero non Extracta, sed succi scilicet propriè dicendi sunt. Vide suis locis libr. 4.

Vl. Lignorum & Corticum lignorum Extracta, duplicis generis ferè acquiri possunt, Viscosum scilicet ac Resinosum.

Viscosum, quia naturæ est aquæ, nihil aliud est quam succus inspissatus, ea propter & menstruo paret aqueo, coctioneque interveniente faciliè elicitur.

Resinosum (resina, gummi alias) sulphureo felicius obedit menstruo, in quo excellit *V*, quem aquæ admiscere fas est.

Modus eliciendi extracta resinosa seu Gummata.

R. Rasur. ligni (v. gr. Guajaci) q. v. (lib. 7. 8.) affunde *V* optimum, (ex vino, fecibus vini, vel hydromelite vinoso,) digere vitro clauso *VB* dies (12. 15.) & rubescet; deinde exprime fortissime, ut egrediatur quoque liquor spissus rubicundus & oleaginosus. Hinc fiat abstractio, donec materia in fundo maneat, in consistentia mellis, bulliendoque bullas emittat, non secus ac mel ipsum. Tunc calentem materiam effunde in *V* frigidam, & coagulabitur instar aloës, aut gummi rubei. *Quercetan. Pharmacop. restit. cap. 26.*

N. 1. In conficiendis huiusce generis extractis, non incongruè loco Vi adhibere quoque licet hydromel quoddam vino-

sum, aut V as stillat. convenientes, v. gr. V. ulmaria, cardui benedicti, fumarie, & similia, quas tamen acidulas reddere oportet cum succo Limonum aut simili. Quinimo & sola fontana, interveniente sufficienti coctione resinosum extractum elicere potis est.

N. 2. Idem Extractum cum Virectificatiss. alleclum, precipiatur nonnunquam affusione V a, diciturque Magisterium; ut Magisterium Cinamomi, Lappa, &c.

Extracta Viscosa.

R. Rasuram ligni q. v. coque cum aqua quam sufficienter, hinc exprime, clarifica & inspissa q. s.

VII. Aromatum Extracta ut eo promptius obediunt, *V* nonnihil addere convenit, v. gr. *R.* Caryophyllor. grossè contus. *℥ij.* *V* still. *℥xii.* *V* *℥iv.* macera vase clauso. Dein exprime, clarifica per digestionem, abstrahè aliquantulum in *MB* (ob spiritum qui primum extillat (reliquum evaporare sine ad consistentiam debitam. Eodem modo fieri possunt & Extracta ex aliis aromatibus, v. gr. ex calamo aromatico, cardamomo, cubebis, cinamomo, &c.

VIII. Resinarum extractio non nisi depuratio est, qua Resinæ in *V* rectificatissimo solvuntur, colantur, ac demum abstracto *V* inspissantur, vel affusa aqua, quâ sulphurea *V* natura diluitur ac debilitatur, præcipitantur. Et hæc nonnunquam titulo Magisterii veniunt, aut Resinæ, e. g. Resina vel

vel Magisterium scammonii, & simili.

IX. Gummatum Extracta sunt portiones gummatum, tùm viscosæ, tùm resinosa ab invicem scil. separata. Convenit igitur hæc separatio iis solum, quæ parte viscosa ac mucilaginosâ simul constant, ut ferulacea; fitque. *R.* Gummi aliquod ferulaceum, solve lento calore (præstat in cucurbita cæco alembico oclusa, vel vase simili,) solutum ac depuratum, reponere aliquot diebus, & subsidebit pars resinosa. Hinc decantetur liquor turbidus à resinosa parte subsidente) clarificeturque si opus) depurando cum albumine ovi, vel per linteum colando, ut clarus evadat; dehinc inspissetur lenissimo calore *℞*. Sic habes viscum, i.e. Extractum viscosum.

Resinosa illa subsidentia lento quoque calore exiccata, exhibet resinam, i.e. resinosum Extractum.

N. Extrahit quoque Resinam *℞* re-
ctificatissimus.

In ANIMALIUM familia Extracta suppeditare possunt partes carnosæ, quæque his assimilata membranosa, v. gr. Matrix. Hinc stercora, fella, ossa, cornua.

Excarnibus, carnosisque partibus fieri possunt Extracta, si lotæ exiccantur atque cum *℞*, vel simili appropriato spiritu extrahantur, postmodumque ad consistentiam debitam inspissentur.

N. 1. Præstat, si primum antequam exiccantur, in *℞* myrrha essentificato, aliquot & macerentur. Vide Extractum splenis bovis, libr. 5. Item Extractum mumiæ humana, libr. 5.

N. 2. Quercetan. Pharmac. rest. cap. 26. inspissat decocta, additque appropriata, (vide supra in decoctis,) atque ita Extracta carnosia parat.

Ex stercoribus animalium si qua Extracta parare animus sit, per *℞* id optime perficies, quippe hic fœtorem corrigit.

Ex fellibus. R. Fella exiccata, extrahe cum *℞*, vide in Bove lib. 5.

Ex ossibus. R. Ossa (v. gr. 2. vel 3. crania recentia) tere crasso modo affundeque aquam vitæ, [juniperi seu salviæ,] ut (dig. 4. s.) supernatet, digere vase accuratissime clauso, (& 12.) post coletur & exprimatur fortissime. Sic liquor exibat rubicundus instar sanguinis, qui oleosus & resinosus erit. Iterum affundatur fecibus novum menstruum, digerendo, (& 4. vel 5.) cola & exprime. Expressos liquores destilla in alembico, donec remaneat Extractum in forma Sappæ.
Quercet.

N. Digeri & depurari poterit:

Ecornibus. Extracta cornuum fiunt è teneris (cervorum) cornibus, vel è cornibus etiam induratis, sed adhuc recentibus, mediante itidem *℞* vitæ appropriata, quæ acidula prius reddita sit cum liquore Sulph. acidulo. *Quercet. Pharmac. rest. cap. 26.*

N. Extracta in Syrupos rediguntur, addendo post clarificationem Syrup. pomor. redolent. vel rosar. pallidar. vel Cinamom. In pulverem verò per frequentem cohobationem cum aqua propria & lentam exsiccationem.

EXTRACTA usitiora ALTERANTIA.

1. Alterantia simplicia.

Abfinthii.
Acori.
Agallochi, s. Ligni Aloës.
Angelicæ rad.
Aristoloch. rot. rad.
Card. benedict.
Caryophyllor.
Castorei.
Centaur. min.
Chelidonii major.
Croc.
Cubebar.
Dictamn. s. fraxinellæ.
Enulæ c.
Galangæ.
Gentianæ.
Guajac.
Imperator. rad.
Melissæ.
Menthæ.
Majoranæ.
Myrrh.
Petasitid.
Pæon.
Rutæ.
Sabinæ.
Satyrii. rad.
Scabiosæ.

Scordii.
Symphyt.
Tormentill.
Valerian.
Zedoar.
Zinziber.

2. Alterantia composita.

Extr. Laudanum opiatum, cum & sine Moscho & Ambra, vid. lib. 4.

Bezoardicum Quer. N. 1.
Chalybeatum, 2.
Hystericum, 3.
Maticale S. Gloss. 4.
Pestilentiale, 5. 6.
Pulmonum, 7.
Satyrii compos. 8.
Theriace, 9.
Theriaca benedicta, 10.
Theriaca cœlestis, 11.
Uterinum Mynsiehti, 12.

3. Extractum Bezoardicum Quercetani, pro Laudano suo.

4. Rad. Angelicæ.
Zedoar.
Galangæ.
Tormentill.
Cort. citri.
Lign. Aloës.
Santal. rubr.
citrin. à ʒj.
Gran. Alkerm.
Dictamn.
Spic. nard.
Caryophyll.
Nuc. moschat.
Macis.
Cinamom.

Been alb.

rubr. à ʒiʒ.

Camphor. ʒj.

F. Extractio cum ∇ vitæ Juniperi-
na.

Vires. *Eximiarum est Virium in ar-
cendo Veneno, morbisq, contagiosis, qua-
lis pestis, febris maligna.*

2. *Extractum Chalybeatum
magnum.*

℞. Limar. Chalyb. præp. ʒiij.

Rad. Ireos fl. ʒj.

Bugloss. sylv.

Cyclamin.

Eryng.

Bryon.

Zinzib. an. ʒʒ.

Fol. Ceterach.

Ling. cervin.

Betonic.

Rut.

Chamædr.

Chamæpit.

Agrimon.

Calamenth. a. g. xv.

Spic. indic.

Croc. or. an. g.v.

Cort. fraxin.

Rad. Capp.

Fag.

Salic.

Cost. dulc. an. ʒj.

Visc. quern. ʒj.

Cinamom. ʒʒ.

Sem. Ameos.

Cardamom.

Cumin. acet macerat.

Coriandr.

Agni cast.

Melanth.

Petroselin.

Portulac. an. ʒʒ.

Silermont.

Galang.

Caryophilli.

Macis

Xylaloes.

Zedoar.

Doronic.

Gentian. an. gr. xv.

Incisa & contusa grosso modo
infundantur in f. q. V. & f. l. a. Extra-
ctum.

Vires. *Magnas vires obtinet in aperi-
endis obstructionibus præsertim lienis, E-
patis, uteri ac Mesenterii, adeoque mor-
bis inde subvenit.*

3. *Extractum hystericum.*

℞. Succ. Savin.

Centaur. min.

Matricar.

Arthemis.

Fol. Meliss.

Flor. Calendul. a. Mʒ.

Rad. angelic.

Filicis.

Aristoloch. rot. a. ʒʒ.

F. Extractio cum aqua Melis. ac Sa-
binæ addendo Sal. Tart. tantillum,
Tinctura inspissetur.

℞. Hujus Extracti ʒij.

Extract. Myrrh. ʒi.

Dd 3

Croc-

Croc. ʒb.

Castor. ʒb.

Borrac. ʒii.

Fecul. Bryon. ʒiib.

F. Massa.

Vires: *Menses obstructos referat, uterinasque passiones discutit.*

Dosis ʒb. ad ʒiib.

N. *Aqua illa abstracta in idem magnas suppetias ferre potis est in iisdem affectibus.*

4. *Extractum Matricale*

S. Cloſſai.

¶ *Extracti lienis bovis.*

Puleg. regal. &

Croc. cum V parati ʒij.

Myrrh. in aq. rut. murar. cum spiritu

Q-acida, dissolut. ʒij.

Extract. cort. arant. & citri ʒiij.

Fæcul. bryon. ʒb.

Camphor. ʒatæ cum V præmisâ digestionem ejusdemque abstractionem in F ʒij M.

Vires. *Hujus portio ad pisi magnitudinem dissolvatur in aquâ aliqua hysterica & exhibeatur.*

5. *Extractum pestilentielle.*

R. Rad. Angelic.

Olsnit.

Imperator.

Zedoar.

Vincetoxic. à ʒb.

Tormentill.

Gentian.

Petasit.

Succif.

Pimpinell. à ʒj.

Sem. Levistic. ʒiij.

Angelic.

Meliss. à ʒil.

Sem. Citr. ʒi.

Gran. Juniper. Mij.

Fol. Veronic.

Meliss.

Arthemif.

Scord.

Galeg.

Scabios.

Card. bened. à Miß.

Fl. Hyperic. M. i.

F. Extr. cum V. & inspissetur.

Vires. *Maximarum est virtutum in arcendo aëre pestilentiali, eodemque morbo & similib. malignis affectibus curandis & præcavendis. Sudorem movet.*

Dosis à ʒj. ad ʒij. &c.

6. *Extractum pestilentielle Tycho-
nis de Brahe.*

1. R. Theriac. Androm. veter. lb.

1. Extrahe Tincturam cum V rectificatiss. ad superemin. palmæ affuso, Vase bene clauso. Effusiones filtra & abstrahe l. Δ ad consistentiam mellis.

2. Fiant flores Sulph. simplices ter per se & quarto ex Aloë, Myrrha & Croco semel iter elevati.

R. Horum ʒiv.

Ol. Juniper. è bacc. rectific. ad eminent. digit. 4.

N. Po.

N. Potest etiam addi olei succini re-
tificati pars quarta, sic melius.

Stent in digestionem tepidâ & im-
prægnabitur oleum tinctura Sulph. ru-
bicundâ, effunde, ac si libet filtra. Ita-
que

℞. Extract. Theriac. part. xii.

Bals. illius Sulph. part. i.

Addendo si libet nonnihil Extract.
rad. Angelic. Mag. Succin. alb. & Sal.
Absinth. ut & aliquantulum de Spiritu
illo theriacali abstracto, digerantur (d.
8.) Hinc fiat separatio ad consistenti-
am mellis.

Summum est curativum pestis. Do-
sis g. viij. x. xij. &c. In aqua appropri-
ata statim ab initio morbi assumpt. ut su-
dorem cieat. Præservationis vice assu-
mi poterunt quotidie maneg. ij. vel. iij.

N. Potest ulterius exaltari per addi-
tionem Tinctura Corallorum, Saphyr.
Hyacinth. & Margarit.

Quinimo ut universalius inde me-
dicamen exurgat, acui potest tantillo flo-
rum reguli & talis per diurnam rever-
berationem rubificationum. Vide lilium
Theophr.

Descriptionem hanc Rudolpho
Imperatori submissæ communicavit
Tycho Brahe.

Ex communicatione D. Johan,
Waltheri Held.

7. Extractum Pulmonum:

℞. Pulmon. Vulpis, incide in frusta
minutissima, ac adde

Herb. Veronic.

Hyssop.

Scabios. ana Mß.

Sem. Anis.

Fœnic. ana. ʒj.

Coque in phiala capaci benè occlusa
in MB ferventi horas 7. vel 8. donec
pulmones in liquorem redacti fuerint.
Hinc cola, colaturamque inspissa. a. ad-
dendo Sacchari q. libet, ad consisten-
tiam extracti.

Vires. Imbecillitati ac affectibus pul-
monum confert.

N. 1. Eodem modo fieri quoque pos-
sunt Extracta Epatis, Splenis, & simi-
lium, ex Decoctis supra Quercetano al-
latis.

N. 2. Præstat modus quem supra ge-
neraliter dedimus.

8. Extractum Satyrii com-
positum.

℞. Extract. Satyr. simpl. lbß.

Sal. margarit. ʒß.

Ol. nucist. still.

Anis.

Cinamom. an. ʒß.

Vires. Impotentibus succurrit. Dosis
gutr. aliquot. ad 20.

N. Extract. simpl. v. l. 4.

9. Extractum Theriacæ seu
Essentia.

Theriaca simplex & alcoholisata.

℞. Theriac. Androm. opt. extrahe
f. a. tincturam cum ∇ vitæ juniperina,
vel ∇ extophis cervinis, vel simili ∇
bezoardica sive theriacali. Decantatas
tinctu-

tincturas destilla ad remanentiam Essentiae Theriaca in consistentia mellis, quam serva pro usu, titulo Extracti theriaci simplicis, vel adde sal ex cinerata remanentia elixivatum, sub nomine Extracti s. Essentiae Theriacae alcolisatae.

N. De hoc Theriaca & similibus Extractis, duo quae moneam, habeo.

Primum suggerit ingredientium diversitas, quae vix credibile est, singulorum Essentias aequae uni soli menstruo parere. Nec est quod oggerant, fermentando cubet in unam naturam coaluisse: Dubium enim haud leve, utrum fermentando naturarum adeo immutari possit, ut quae antea menstruum Tartareum prorsus respuebant, facta fermentatione id ipsum ammi. e amplectantur.

Secundum, quod monere dixi, ipsaemet praeber fermentationis, quippe quae potissimum rerum fermentabilium partem in Q. E. exaltat, id est, volatilifat, spiritua-lem ac volatilem reddit. Exemplo sint Vinum, Cerevisia, succi fructuum fermentati, & similia. Ea propter cum Tinctura destillationi submitatur, quae volatiliior pars abstrahitur, quis infringet Extractum in fundo destillatorii remanens, potissima sua parte esse exutum.

Ut has difficultates evitent, sunt qui speciem seorsim mensuris idoneis extrahunt, itaque Extracta postmodum conjungunt. Verum enim vero, nec h. ad metam ad quam collimant, pertingere videntur. Etenim compositionem Theriacae subeunt non pauca naturae aromatica,

subtilioris, tenuioris, volatilioris, &c. Quae facultates ad Theriacae constitutionem non minus necessariae sunt, quam reliqua in substantia minus volatili residentes. Idcirco, cum volatiles illi spiritus à fixioribus in inspissatione separantur, operationem Theriacae integram in Extracto hoc quae sibi spondebit? Adde quod hac ratione nonnullorum ingredientium ferocia, quae alias fermentando in Theriacae cicuratur indomita maneat, imo vires suas exerere aptior evadat. Praestat itaque Theriacam in sua propria substantia adhibere, quam laboriosa hac extractione operam perdere. Id quod de aliis quoque, exempli gratia, pulularum quarundam Extractis censendum.

Verum enim vero, non simpliciter Theriacae Extracta improbare velim, praecipue si spirituosiores seu oleosiores partes interveniente praecipitatione sint, reservata. Quae in re non possum, quin industriam commendem hymici solertissimi FridERICI GREIFFEN Pharmacopaei apud Tübingenses celeberrimi, Amici mei honorandi, qui imperfectionem preparationum harundem perpendens, perfectiorem non ita pridem in decade sua nobilissimorum medicamentorum, juris publici fecit, unde.

10. Theriaca Benedicta Quercetani aucta & correcta.

1. Solvenda.

R. Troch. scyllit. Quercetan. ʒvi.
de Viper. Venetian.

Est.

Ess. (extr.) opii cum ✕ fact. ana.
℥iii.

Succ. Glycyrr. in ▽ still. sol. & inspiss.
℥i℥.

Ess. croci (cum V.) ℥j.

Myrrh. in ✕ sol. & inspiss.

Oliban. in gran. à ℥vi.

Gran. styrac. cal. in V sol. & ex-
press.

Gumm. Arab. albiss.

Sandarac. in gran.

Sagapen. in gran.

Succ. Acac. in ✕ sol. & insp.

Hypocist. in ✕ f. & insp.
ana ℥℥.

Asphalt. el.

Galban.

Mastich.

Opopanax. (singul. in gran.) à ℥ij.

Essent. Castor. ℥i.

2. *Extrahenda aromata.*

Piper. long. ℥iiii.

Cinam. ac. ℥i℥.

Acori. f. calam.

Cass. lign. Veræ.

Cost. Ver.

Pip. albi.

nigri.

Schænanth.

Spic. indic.

Stæchad. arab.

Zedoar.

Zingib. alb. à ℥vi.

Cardam. min.

Carpobals. veri.

Cubebæ.

Folii.

Galang.

Caryophyllor.

Macer.

Spic. celtic. à ℥℥.

Lign. Aloës ℥ij.

Extrahenda reliqua.

Mirobalan. Chebul. ℥vi.

Baccar. juniper. ℥℥.

Laur. ℥ij.

Fl. Rosar. rubr. ℥i℥.

Hyperic.

Centaur. min. ℥ii.

Herb. Card. bened.

Scord. cret. à ℥i℥.

Calamenth. mont.

Dictamn. cret.

Marrub. à ℥. vi.

Abrotani.

Chamædr.

Chamæpit.

Orig. cret.

Polii Cret.

Rorismar.

Salv. min.

Scabios. à ℥℥.

Majoran.

Mari.

Lign. Asphalt.

Santal.

Agaric.

Rad. irid. Flor. à ℥i℥.

Angelic.

Pentaphyll.

Rhabarb. el.

Tormentill. à ℥vi.

Aristoloch. rot.

Asar.

E c

Cyper

Cyper rotund.

Diptamn. alb.

Enulæ camp.

Gentian.

Imperator.

Meu.

Pimpinell.

Phu Pontic.

Serpentar.

Succif.

Valerian.

Vincetoxic. an. ʒß.

Aristoloch. long.

Cruciat. à ʒij.

Sem. Buniad. seu Napi agreſſ.

ʒiſſ.

Petroleſ. maced. ʒ. vi.

Ammeos.

Amomiracemof.

Aniſ. torrefact.

Citri.

Fœnic. Cret.

Hyperic.

Seſel ſeu Siler. mont.

Thlaſpi ſeu Naſturt. alb. à ʒß.

Dauci cretic. ʒij.

3. Pulverifanda.

Confect. ſerpentum juniperinae Quer-

cet. ʒiij.

Terr. ſigillat. ʒvi.

Lemn.

C. C. uſti à ʒß.

4. Liquida.

Baſam. Indict.

Ol. Nucis moſchat. expr. ʒ.

ʒiſſ.

Caryophyllor. ʒj.

Succin. camphorat. ʒiſſ.

Spir. ☉ ʒß.

1. E. Extractio ſeorſim medietatis aromatum & reliquorum extrahendorum, ſingulorum ſc. 1. cum V rectific.

2. cum V ☉. pluviali, Eſſentiam cum V extractam præcipita cū Extractione in V ☉. Hinc abſtrahe in MB. ac collige ſeorſim ſpiritum theriacalem primo egredientem, ſeorſim etiam V theriacalem ſubſequentem ad conſiſtent. mellis, Reſiduam medietatem in pulverem redige.

2. Ex remanentia incinerata elixivia Sal. Com. cum V pluviali.

3. In ſpir. theriacali ſolve ſandarac. Olib. Maſtich. ſtorac. omneſque Eſſentias non ſatis liquidas eo dilue.

4. Cum V theriac. in pulverem redige Trochiſc. de ſcyllis & Vip. ſolve in eodem ſuccum Glycirrhizæ, G. Arabic. & Sal. com. proprium.

5. In ſpir. Terebinth. ʒvi. ſolve Aſphaltum.

6. Reliqua omnia, ut Eſſ. Opii. & Hypociſt. Acac. Myrrh. ſagapen. Galban. & opopanac. ſolve in ☿.

7. Omneſe extractiones, ſolutiones, pulveres, Baſſama, olea, expr. deſtill. ſpiritus & Sal. com. ſ. a. commiſce quam optimè & redige in maſſam pilularem. Hinc.

11. Theriaca Cæleſtis.

12. Theriac. benediſt. prior. ʒiſſ.

Extrahe cum ſp. Theriacali, effunde & abſtrahe ad conſiſtent. mellis. Ab-

Abſtractio
ſervata
extrahe
tie affun
duam eſſ
& conſiſt
remanet
dem in
nit.) ſe
Extrahe
conſiſt.
miſce,
Magil. co
Perlat.
Hyacy
Rubin
Smarag
Bezoart.
Sal. cora
Petia
Bezoart
Terr. ſig
Unicon
Oſſ. de C
Ambr. g
Infuſum
Extrahe
Vires
hui adu
arcend
morumq
es vigili
tuo corre
da, &c.
N. R
hanc vidi

Abstractum spir. (essentia seorsim aservata) reafunde remanentia priori, extrahe denuo & decanta. Remanentia affunde Vrectific. ac extrahe residuam essentiam ejus, decanta iterum, & confunde cum priori. Residuam remanentiam in V theriacali & tandem in ✕ spiritu Salis balsamici (Sal. nit.) fortificato extrahe. Et his ultimis Extractionib. priores præcipita & ad consist. mellis coagula, tandem permisce.

Magist. corallor.

Perlar. à ʒj.

Hyacynthi.

Rubin.

Smaragd. à ʒvi.

Bezoart. Animal.

Mineral.

Sal. corallor.

Perlar. à ʒß.

Bezoart. Oriental.

Terr. figillat.

Unicorn. veri.

Off. de C. C. à ʒiij.

Ambr. grif. ʒij.

Inspissa in vase duplici ad formam.

Extract. vel massæ pilularis.

Vires. *Vires Quercetanus huic attribuitur admirabiles in Venenis & contagiis arcendis; in exagitatione spirituum humorumque sedanda, in catarrhis, dolorib. & vigiliis mitigandis. In Balsamo nativo corroborando, putredine præservanda, &c.*

N. Rationem utriusq. hujus compositionis vide sis de cade superius allegata.

12. *Extractum uterinum Mynsichti.*

R. Bacc. Sambuci.

Ebuli ana ʒiv.

Rad. Poron. debite collect.

Arthemif. rub.

Dictamn. alb.

Bryon. ana ʒß.

Visc. quern.

Sum. ammeos.

Herb. puleg.

Meliss.

Cass. lign.

Croc. or.

Castor. veri. ana ʒß.

Extrahe cum V. eumque separa ad remanentiam extracti. Postea adde,

Sang. porcæ in clibano exiccat. & cum V hysteri. præpar. ʒß.

Bezoart. Jovial,

Mag. Jovis, Anglic.

Matr. perlar.

Corallor.

Ol. antophyllor.

Angelic.

Succin. alb.

Arantior. ana ʒi.

Denuo misce & f. Extractum pro usu.

Vires: *Medicina est saluberrima in affectibus uterinis, etiam deploratissimis: Dosis ʒj, ad ʒß. tribus aut 4. diluculis continuis in aq. aliqua convenienti.*

Ec 2

Ex.

EXTRACTA PURGANTIA.

Extracta purgantia simplicia, ut & quæ sub nomine alicujus simplicis veniunt, *vide lib. 4.*

Purgantia composita.

Extractum

Benedictum *vide infra*. N. 1.

Diacarthamum. f. Cnicopharmacum *Aug.*

Catholicum; *A.*

F. F. *vide infra* 2.

Sennerti, 3.

Arnoldi Weickhardi, 4.

Cholagogum Querc. *A.*

Holagogum Andernaci, *A.*

Melampodii, f. Ellebori nigri.

Mindereri, *A.*

Melanagogum Querc. *A.*

Panchymagogum Crollii, 5. 6.

Hartmanni, 7.

Augustanorum.

Phlegmagogum Querc. *A.*

Pilularum Aggregativ. *A.*

Aurear, *A.*

Cochiar, *A.*

Lucismajor *A.*

1. *Extractum benedictum.*

* Fol. Sen. el.

Rhabarb. à ʒij.

Agaric. ʒj.

F. Extractum.

Vires. *Purgat biliosos ac mucilaginosos humores.*

Dosis à ʒss. ad ʒj.

2. *Extractum Catholicum Francofurtense.*

* Aloës succotrin. ʒj.

Turbeth. el. ʒss.

Colocinth. ʒvi.

Agaric. albiss.

Diagryd.

Rad. Ellebor. à ʒss.

Spec. Diarrhod. abbat. ʒj.

Macis.

Stæchad. ar.

Galang.

Cardamom.

Zedoar.

Caryophyll.

Cinamom.

Fl. Anth.

Lign. Aloës.

Visc. querc. à ʒss.

Ambr. grif. ʒj.

Infunde omnia in V (8.) exceptis speciebus, Diarrhod. & Ambra, fiatq; Extractum, cui adde Extractum specierum Diarrhod. idem per V factum & Ambram.

Vires. *Omnes humores blandè purgat.*

Dosis à ʒi. ad ʒij.

3. *Extractum Catholicum Sennerti.*

1. ʒj. Diagryd.

Trochisc. Alh.

Gumm. de Peru, ana ʒss.

Aloës. ʒj.

F. Extractum cum V seorsim.

Idem f. Extractum.

2. ʒj. Turbith. el.

Rad. Elleb. nigr. à ʒss.

Rhabarb. ʒj.

Spec. Diarrhod. abb.

Aro-

Aromat. rofat. ℥ij.

Utrumque Extractum conjungatur ad massam pilularem constituendam.

Dosis à ℥j. ad ℥ij.

N. Felicius forsā procederetur, si Resina Diagrydi, Magister: Gummi de Peru, Extract. Aloës, per se fierent ut lib. 4. docebimus, atque Trochisci Alhandali cum reliquis infunderentur.

4. Extractum Catholicum, D. D.

Arnoldi Weickhardi.

℞. Aloës succotr. lb̄ss.

Rhabarb. opt. ℥v.

Fol. Senn. s̄st. ℥i v.

Rad. Mechoac. ℥iij.

Colocynth.

Turpethiel. ℥iiss.

Eful. præparat. ℥ss.

Gener. s. mirobalan. à ℥iij.

Cinamom.

Zinzib.

Macis.

Galang.

Zedoar.

Caryophyllor.

Cardamom.

Cort. citr.

Schænāth. à ℥j.

Spec. Diamb. ℥ij.

Diarrh. abb. ℥iij.

F. Extractio l. a. cum V & ∇ fœnic. exprimat. & inspissetur.

Dosis ad ℥ss. vel ℥ij.

4. Extractum Panchymagogum

Trollis, I.

℞. Spec. Diarrhod. Abbat.

Diamb. ana. ℥j.

Extrahatur Tinctura cum V l. a. vitrum crebro movendo.

Deinde

℞. Pulp. colocynth. ℥vii.

Turpeth. gummos. ℥v.

Agaric. opt. ℥j.

Rad. Elleb. nigr. veri ℥j.

Scammon. Elect. ℥vi.

Fol. Sen. ℥iv.

Rhabarb. el. ℥iij.

Elater. ℥ii.

Sem. Ebul. trit. ℥iij.

Hermoda. ℥iij.

Incidenda incidantur, terenda terantur; affunde Tincturam illam specierum, extrahaturque Tinctura l. a. decantatas extractiones inspissa leni calore MB. ad consistentiam mellis, postmodum adde.

Ol. Cinam.

Caryophyllor.

Nucist. ana gutt. x.

Sal. perlar.

Corall. ana. ℥ij.

Salem è fecibus superioribus calcinatis extractum.

Rasur. cranii human. [vel off. calcinat.] ℥ss.

F. Massa.

Vires. Non datur melius catharticū, quod minori molestia omnes humores noxios expurget.

Dosis à ℥j. ad ℥ij. ex vino malvatico, vel alio generoso è juscūlo, vel alio

Ec 3

casa-

catapotis aggregativis admixtis; datur
 & in forma pilulari,

6. *Extractum Panchymagogum*
Crollii. 2.

℞ Pulvæ colocynth. ʒvi.
 Agarici.
 Scammon. el. ana ʒß.
 Hellebori nigri.
 Spec. Diarrhod. Abbat.
 Aloës succotrin. ana ʒj.

Extrahe s. a. cum V eumque i-
 rerum abstrahe. Et quia in extractio-
 ne sæpè virtus purgatrix solet debilita-
 ri, ideo quidam solent ad unam par-
 tem Extractorum addere crudorum
 purgantium partem alteram; adde er-
 go superioribus, antequam Extra-
 ctum in fundo remanens planè inspisse-
 tur.

Trochisc. Alhand. ʒvi.
 Diagryd. præparat.
 Agaric. troch. à ʒß.
 Aloës Epatic. ʒj.
 Pulverisata redigantur in massam ju-
 stæ consistentiæ.

Dosis à gran. 20. ad 25. & 30.
 & ultra.

N. Aliud vide in Pharmacop.
 Augustana.

7. *Extractum Panchymagogum*
Hartmanni.

℞. Fol. sen. s. st. ʒij.
 Rhabarb. el. ʒiß.
 Rad. Hellebor. nigr. ʒj.
 Turberh. alb. gummos.
 Polypod. quern.
 Trochisc. Alhand.
 Agaric. Trochisc. ana ʒß.
 Medull. sem. cartham.
 Myrrh. rubr. el. ana ʒiij.
 Spec. aromat. Garyoph.
 Diamb. ana ʒj.
 Cortic. citr. ʒi.

Concisa & contusa extrahan-
 tur simul omnia cum V & ∇ ci-
 nam. ana ʒiij. F. Expressio. Feces
 denuo extrahantur cum sola ∇ cinam.
 tenuiori, percoletur postea. Extra-
 ctio adde Extracti Aloës cum ∇ Be-
 tonic. vel Veronic. facti ʒiij. F. mistio,
 & inspissatio ad justam consistenti-
 am, addendo Ol. Garyophyllor. gran.
 10.

Dosis. à ʒß. ad ʒiij. Hartman. in
 Croll.

Alias insuper descriptiones videre po-
 teris, dicto libro.

C A P U T LVIII.

De Farinis.

Farinarum conficiendarum modus
 vulgaris est.
 Sunt usitatiores in Officinis.

Farina Amyli, amydi, Craſſe
 Meel.
 Avenæ.

Faba-

Fabarum
Fœni græci
Glandium
Hordei
Lentium
Lini

Lupinorum
Ouzæ
Pisorum
Siliginis
Tritici
Volatilis, Staubmeel.

CAPVT LIX.

De Feculis.

Feculæ ex radicibus nonnullis, iisque viridibus eliciuntur, rarissimè ex foliis.

Modus fiendi.

gr. Rad. (v. gr. ari.) q. v. lotam vel rasam, conquassa optimè in mortario, affundendo aquam subinde, ut fiat pulpa liquidiuscula, hanc fortiter exprimè, expressionem liquidam repone, ut subsideat fecula. Feculam subsidentem exicca. Sic fiunt.

Fecula Ari.

Bryoniæ
Iridis nostrar.
Liliorum albor.
Pœoniæ
Raphani marini.
Scyllæ.
Serpentariæ.

N. Scylla operationem habet peculiarem. Vide libr. 4.

Ononidis radix coctâ in s. q. aquæ (hor. 3. 4.) si decoctum illud clarificatum prius & aliquantulum inspissatum reponatur, Tart. iidem ad fundum mittit.




CAPVT LX.

De Floribus.

Flores in Chymia sunt subtiliores corporis partes, per sublimationem, à crassioribus particulis, sub forma sicca separata.

Modus, ut singulis ferè diversus est; ita & in singulis describi postulat.

Usitiores sunt.

Flores Antimonii.
Cinnabaris Antimonii.
Flores Arsenici  sublimatum.
Benzoin.
Mercurii varii, hoc  dulcis
Salis .
Sulphuris varii.

CAP.

De Gargarismis, Diaclysmatis & Dentifriciis liquidis.

Diaclysmata, (Collutiones oris) sunt liquores, qui in ore detinentur, iterumque expuuntur. Hi si gargarizando adhibeantur, dicuntur Gargarismi seu Gargarismata, quod tamen vocabulum etiam generaliter pro diaclysmate non raro usurpatur. Eadem si phlegmati è cerebro eliciendo destinantur, Apophlegmatismi nomen assumunt.

Liquores hi in Officinis pro usu nulli exstant, sed ex tempore, ad præscriptiones datas, dispensantur. Fiunt ut plurimum ex aquis (simplici vel destillata,) succis, decoctisve convenientibus, in quibus pro libitu diluuntur syrupi, mella, sapæ (℥ij, iij, iiij, ad ℔b. i. ∇x) tantillum aceti, O usti, Sal. nitr. crudi, præparati, spiritus Sal. nitr. & i. & simil. In summa, omnis generis liquores, & quicquid in his dissolubile est, diaclysmata ingredi non nequeunt.

Exempla sint.

1. Diaclyisma Odontalgicum
& apophlegmaticum.

℞. Piper alb.
long.
Cubeb.
Staphisagr.

Cort. mori
mandrag. à 3j.

Rad. pyrethr. 3ij.

Contundantur & ex vino albo f. decoctum. ad ℔b. i. In colatura dissolvatur tantillum aceti.

℞. Diaclyisma.

Diaclyisma refrigerans.

℞. Cancros. vii. N. v. vi. vel viij.

Sedi major. M. iij. vel iv.

Contunde & exprime succum.

Vires. *Maximè prodest in inflammatione oris & faucium.*

3. *Diaclyisma ad gingivas.*

℞. Aqu. Chelidon. min. bis destillat.

℥iv.

Ousti 3j.

M. & si libet f. filtratura.

Vires. *Insignium virium est in gingivarum putredine.*

4. *Aliud.*

℞. Aqu. Chelidon. min.

Plantag. an. 3℔b.

Cochlear. 3i.

Extr. Chelid. min. 3j.

Mell. rosat. 3℔b.

Spir. ̄ig. vi M.

Vires.: *Vires easdem cum precedenti obinet, sed feliciores, præsertim in gingivarum putredine scorbutica.*

5. *Dia-*

5. *Diachysma seu Gargarismus anti-scorbuticus. S. Cloff.*

℞ Herb. cochlear.

Pyrol.

Beccabung.

Nasturt. aquat. a. Mj.

Rad. aristol. rot.

Enul. camp. an. ʒj.

Rhabarb. opt. ʒʒ.

Baccar. laur. ʒvi.

Croci ʒj.

Zinzib. alb. ʒii.

F. pulvis grossus: Maceratur per biduum in lb. ij. cerevis. veter. idque in diplomate, decoctum coletur.

Vires: *Valet ad gingivas scorbuticas & sanguisnuas. Patienseo os colluat, ac mane & vespere ʒij. de eodem hauriat.*

6. *D. Ad faucium inflammationem.*

℞. Aqu. Plantag. ʒij.

Rosar.

Acetol. à ʒi.

Prunell. ʒii.

Rob. Diamor. ʒʒ.

Sal. nit. preparat. ʒʒ.

M. F. Gargarismus.

7. *Diach. apophlegmatizans.*

℞. Cort. rad. sambuc. ʒj.

Rad. Galang. ʒʒ.

Pyrethri. ʒij.

Fol. Betonic.

Origan.

Majoran.

Meliss. à. M. j.

Cubeb. ʒiʒ.

Sem. Sinap. ʒj.

Uvar. passar. M. i.

Coquantur in vino vel aqua.

℞. Colatur. lb. iʒ. præter propter

Oxymel. scyllit. ʒiii.

M. F. Gargarismus.

Vires *Phlegma à cerebro elicit.*

8. *Huc referendi sunt LIQUORES. fricandis dentibus, gingivisq; destinati.*

℞. Aqu. Prunell.

Plantag. ana ʒiii.

Rob. Diamor.

Syr. rosar. sicca. ʒʒ. vel ʒj.

Spir. ʒi ʒʒ. M.

Inservit ad dentes dealbandos, extergendos, stabiliendos.

N. *Spiritus acidi profunt maximè ad dentes dealbandos, sed & stuporem earum inducunt.*

CAPVT LXII.

De Gelatinis.

Gelatina est succus inspissatus, purior, clariusculus, cum saccharo in scatulas effusus & congelatus. Et hinc Gelatina dicitur.

Parantur è fructibus nonnullis succulentis, tum è cornibus ac ossibusterioribus.

E Fructibus.

FF

℞. Fru-

R. Fructus, exprime succum, exprefsum coque & clarifica, (cum albumine ovi,) hinc addito faccharo in spiffa fenfim & effunde in scatulas.

Aliiter.

R. Fructus, coque in ∇ , decoctionem citra exprefionem decanta, vel filtra, faccharumque addendo in spiffa.

*E Cornibus & Ossibus tenuioribus
fit sine Saccharo.*

R. Rasur. cornuum offiumvè (vel eadem in fragmenta minutiora redacta,) coque vel digere aliquamdiu in ∇ (commun. stillatitiave appropriata,) hinc coque & filtra calidè, coagulaque.

N. Quod si ossa & cornua nimis dura sunt, acuari ∇ a poterit liquore aliquo acido, verbi gratia, spirit. Θ -i, \times , & simil.

Exemplo fit

Gelatina offium de corde cervi.

\mathcal{R} Rasur. offium cordis cervi \mathfrak{z} ij. Coq. in aq. & vini alb. ana \mathfrak{lb} ss. per horas 6. aut 8. ad medias, deinde colentur, in colatura diss. facch. opt. \mathfrak{z} vi. agi-

tentur simul cum

Succi limon. \mathfrak{z} ii.

Aq. ros. \mathfrak{z} j.

Dein recoquantur ad medias, addendo sub finem.

ambr. griseæ seorsim in aq. ros. infus. \mathfrak{z} ss.

Tincturæ cinnam. in vino fact.

\mathfrak{z} j. Colentur & refrigerentur.

Sic sunt.

Gelatina Cytoniorum.

Pomorum.

Pyrorum.

Ribium.

Cornu cervi.

Granii humani.

N. 1. His immiscentur nonnunquam pulveres, vel Extracta, & simil. unde Gelatina composita, tum alterantes, tum purgantes, v. gr. Gelatina Cytoniorum purgans. vide libr. 4.

N. 2. Sunt qui Gelatinas Cytoniorum Marmelatas vocant, easque tum simplices, tum aromatisatas pro usu domestico parant, varii coloris.

CAPUT LXIII.

De Infusionibus.

Infusionis (infusi) nomen potionibus potissimum imponi, iisque purgantibus, lib. 1. diximus, harum rationem hic loci exhibemus.

Liquorum exhibent aquæ stillatitiæ, (tum & fontana,) serum, mulsum, hy-

dromel vinosum, vinum, & simil.

Materia infusioni apta, etsi & ex mineralibus & animalibus sumi queat, tamen hujus loci inprimis sunt vegetabilia, & maxime purgantia cum corrigentibus.

Modus

Modus parandi.

Recipiuntur res medicamentales; præparatæ ad infusionem, incidendo; contundendo, limando, &c. prout in decoctorum doctrina traditum; immerguntur liquori, quantitate & qualitate intentioni medicæ respondentem, reponunturque, si extractio maturanda, loco calido, (in cineres vel juxta fornacem.) Hinc decanetur liquor, exprimaturve pro usu.

Proportio liquoris præscribitur ferè q. l. id est, ut materia cooperiatur, liquorque superemineat digitos versus, 1. 2. 3. &c.

*Exempla sint**1. Infusio Cholephlegmagoga.*

℞. Agaric. elect. ℥i℥.
Rhabarb. opt. ℥ij.
Zinzib. ℥ss.
Spic. Nard. gran. v.
Sal. gemin. gran. iij.

Pulverisentur grossè & infundantur per noctem in

Aqu. Eupator.

Cichor. à ℥i℥.

Hinc calefiant & colentur cum expressione. F. Potus.

Vires. Purgat bilem & phlegma.

N. Sal gemma additur ad facilitandam extractionem: cujus rei gratia & sal. Tart. add. poterit.

Hujus generis sunt Vina medicata, (ut & Cerevisia medicata,) tum alterantia, tum purgantia v.g.

2. Vinum Arithriticum:

℞. Fol. chamædr.

Chamæpit.

Sum. Salv. ana ℥i℥.

Flor. primul. ver.

Anth.

Lil. convall. ana ℥ss.

Ras. lign. Guajac. ℥viii.

Visci quern. ℥ss.

Rad. Chin. ℥iii.

Caryophyllat. ℥iv.

Vini musti mensur. lxxx.

Ponantur ad fervescientiam, ut deferveant.

3. Vinum Medicatum Cephalico-Splenicum.

℞. Rad. Caryophyllat. ℥i℥.

Cichor. ℥i℥.

Enul. ℥j.

Herb. Ceterach.

Veronic. c. fl.

Card. bened. c. florib.

Epatic. stellat. c. flor.

Summit. Centaur. min. ana

Mi℥.

Cort. Arant. sicc. ℥ss. ℥ij.

Incidantur herbae, contundanturq; grossè radices & cortices, infundanturque in vini mensur. viij.

Vires. Catarrhis insigniter opitulatur, caput, epas & lienem corroborat.

4. Vinum Matricale.

℞. Herb. Meliss.

Puleg.

Capill. ♀.

Salv.

Calamenth.

Artemis. ana M.℥.

Fl. Squinanth. ℥ss.

Ff 2

Calen-

Calendul.
Cheir. anap. ij.
Nucist.
Macer.
Cubebar.
Cardamom.
Granor. Paradys.
Zedoar. ana ʒj.

Vini generosi mensur. iv. addendo
saccharum pro libitu.

5. *Vinum purgans.*

℞. Fol. Sen. Al. f. st. (sine stipitib.) ʒx.
Follicul. sen. ʒiʒ.
Epithym. ʒvi.
Sem. cartham. conqu. ʒʒ.
Gialapp. ʒiij.
Cort. Helleb. nigr. ʒʒ.
Cinamom. ʒj.
Galang. ʒʒ.
Zingib. ʒʒ.
Cort. citr. ʒij.

Vini mensur. i.

Vires. *Purgat humorem Melancholicum & seorsum. Dosis ʒiij. iij.*

N. *Plura Exempla aliunde petere licet, vel ex decoctis, vel ʒis destillatis compositis huic accersere. Nimirum species dictorum Medicamentorum non minus & hic adhiberi poterunt.*

6. *Vinum Sanctum.*

℞. Vini alb. opt. lb. xv.
Lign. Guajac.
Sars. Parill. an. ʒiʒ.
Fol. Sen. f. st. ʒiij.
Polypod. q. ʒij.

Conquassata infundantur, digeranturque hor. 24.

Vires. *Valet ad morbos frigidos, paralyticos, cacochymicos & maxime ad lumen & inveteratam. Singulis diebus mane ʒviij. & sero ante ingressum lectitandem, patiens capiat. Exerceatur valide, nec opus ut semper domi in claustro maneat. Philip. Mill. in mirac.*

Huc pertinent Vina Hippocratica seu Clarea.

v.g.

7. *Clarum laxativum.*

℞. Cinamom.
Galang.
Caryophyllor.
Macis.
Zinzib. à ʒj.
Turbith. alb. ʒvi.
Fol. sen. el. ʒj.
Mechoacann. ʒiij.
Sacchar. ʒiij.
Vini generosi ʒxvi.
Aq. fontan. ʒviii.
Cremor. Tart. ʒij.

Stent in infusione per noctem, dein colentur per Manicam Hippocraticam.

Vires. *Purgat humores melancholicos & pituitosos.*

Dosis ʒiij. vel iij.

8. *Claretum purgatorium, s. Vinum Hippocraticum ʒiale.*

℞. Vitri ʒ subtiliss. pulveriss. ʒj ʒij.
Vini alb. opt. ʒvi iʒ.

Digerantur vase vitreo benè clauso, in MB. ʒ ʒ (6.) dein cola, colaturæque adde.

Sacchar.

Sacchar. albiss. pulverisat. ℥iij. vel
℥β.

Aromatiscetur cum opt. ▽ cinam. &
servetur. Dosis ℥ij.

Vires. Satis leniter suaviterque op-
erationem suam infra & supra exercet.
Sala.

CAPUT LXIV.

De Iulebis & Moretis.

Iulebi (Julepi) in Praxi usitatissi-
mum potionis genus constituunt,
quod ob saporem gratum, pro potu
ordinario ægris præscribi ut plurimum
solet.

Parati autem in Officina nulli ex-
tant, sed ex tempore parantur.

N. *Iulepi violaceus & rosaceus Offi-
cinarum, Syrupi consistentiam obtinent.*

Parantur ex liquore potulento, in
quo Syrupi, saccharumve dissolvuntur,
additis, prout visum fuerit, & aliis in li-
quore illo dissolvi aptis, qualia succi spi-
ritus, & simil.

N. *Syrupi vices & conserva supplere
potest, accedente colatura.*

Liquor ille potulentus adhibetur
varius: Aqua stillatitia, fontana, (cor-
recta pane tosto) decoctum verbi gra-
tia, C. C. Glycyrrhizæ, Hordei & si-
mil.

Proportio Liquoris, ℔. i.

Syrupi. ℥j. ℥ij. vel prout
palato placuerit.

Acidiusculi, adeoque gratiores,
non raro reddi solent, spiritu Qui
ad saporem gratum usque instilla-
to.

Exemplo sint.

1. R. Decoct. C. C. usti, id est, in quo
c. c. (v. gr. ℥j. vel ij.) sit coctum
℔. i.

Syrup. papav. err. ℥j.
corallor.

Succ. Berberor. ana ℥β.
M. F. Juleb.

Confert in febris aliisque sangui-
nis ebullitionibus, quas vigilæ alique
fluxus comitantur.

2. R. Aqu. fontan. pane correct.
℥x.

Julep. rosar. ℥iβ.

Syr. cinam. ℥β.

Aqu. Rosar. ℥iv.

Spir. Qui q. l. ad gratum saporem vi-
delicet ℔β. vel ℥β.

F. Juleb.

Vires. Refrigerat, roborat, potusque
gratus est agrotis.

3. R. Aqu. hordei, id est, decoct.
℔iβ.

Conserv. rosar. ℥iij.

Conquassetur conserva, tantillum
subinde decocti affundendo, hinc co-
letur, & si placuerit, filtretur.

N. 1. *Acida si decocto C. C. (in pri-
mis è crudo C. C.) instillaris, turbidum
id redditur.*

Ff 3

N. 2. Po-

N. 2. *Poterit itidem Santalo rubro aromatizari, santali scil. ꝑ℞. simul conquassando.*

Hujus quoque loci est Moretus nostratibus dictus, potionis genus, ex aromaticis aliisque confortantibus commixtum, addito ad gratum saporem saccharo vel syrupo.

N. *Moretus dicitur à moris seu dimoro ingrediente. Estque mulierculis nostratibus potionis genus usitatissimum, quo veram imprægnationem confortari, falsam exturbari, persuasum sibi habent.*

1. *Moretus usualis proditionibus.*

℞. Diamor. c. sacchar. ꝑ℞.
Juleb. rosar.
Aqu. cinamom. à ꝑ℞.
Spec. Diamb. ꝑ℞.
Trag. Stomach. ꝑ℞.
Vini optimi, lb. i. M.

Bibatur mane bonus haustus, idque diebus continuis 3.

2. *Moretus pro pauperibus.*

℞. Diamor. c. sacchar. ꝑ℞.
Juleb. rosar. ꝑ℞.
Trag. commun. ꝑ℞.
Vini, lb. i. M.

3. *Moretus absque speciebus.*

℞. Diamor. c. sacchar. ꝑ℞.
Julep. rosar. ꝑ℞.
Aq. cinamom. ꝑ℞.
Vini generosi, lb. i. M.

N. *Species quæ adduntur, post infusionem colando iterum separantur.*

Nodulus pro puerperis.

℞. Croc. integr. g. vi.
Galang.
Macis ana ꝑ℞.
Antophyllor. N. iv.
Cardamom. ꝑ℞.
Baccar. laur. decort. N. vi.
Dentur mixta.

C A P V T LXV.

De Lapidibus.

Lapidis nomen hic sume non pro lapidibus nativis, sed pro medicamentis præparatis, quæ veniunt nomine lapidis, ut sunt 1. Lapis vegetabilis dictus. 2. Medicamenta in duritiem terream ac lapideam excocta.

Lapis vegetabilis nihil aliud est, quam essentiales vegetabilis alicujus partes conjunctæ, ac in lapidem q. coagulata. Fitque

℞. Plantam siccam, digere cum

menstruo proprio (▽ propria stillatit.) destilla, ut habeas phlegma, spiritum ac oleum. Ex remanente ac superstitute materia incinerata extrahe sal beneficio phlegmatis. Ex eadem (seu ejusdem speciei planta) extrahe tincturam cum spiritu illo. Hinc impræгна Sal. com. tincturâ suâ s. a. ad sufficientiam. Postea adde olei quantum imprægnatum illud sal imbiberet potest, & in lapidem quasi coagulantur.

N, Hu-

N. *Hujusce medicamenti genus etsi in Officinis paratum non extat, opera precium tamen esset, introducere, in quo autem notandum, quod lentissimo igne in lapidem paulatim convertere id oporteat.*

Alias lapidis nomine veniunt. Lapis septicus s. cauterium potentiale, tum quoque lapis Philosophorum, (de quibus Augustani,) & præter hos.

1. *Lapis corrosivus.*

℞. Lixivium, è quo sapo niger coquitur. Id sartagine exceptum coquitur in lapidem, qui tesserarum in formam scinditur, cum refrigerit, ac vitro rectè obturato servatur.

Vires. *Cauterium in igne est, dimidia hora spatium fonticulum inducere sufficiens. Heurn. in Meth. pract.*

2. *Lapis s. magnes arsenicalis.*

℞. ♂ crudi.

Sulph. flavi.

⊖ albi.

Pulv. subtilissimè lentoque igne liquefac. Vase refrigerato eximitur materia, quæ frigore indurefcit.

Vires. *Usus ejus est in peste, ubi in forma periapti de collo suspenditur: ingreditur insuper Emplastrum magneti cum Hart.*

3. *Lapis medicamentosus Crollii,*

s. Lapis salutis.

℞. ♂ virid. ℔ i.

alb. ℔ β.

Alumin. ℔ β.

Anatron, id est, fel vitri.

Sal. commun. ana ℥ iij.

Tart.

Absynth.

Arthemif.

Cichor.

Perficar.

Plantag. à ℥ β.

Ponantur in illa vitreata, affunde parum aceti rosacei, ac coque igne l. sæpius agitando; ubi incipit spissescere, adde.

Ceruf. ℔ β.

Boli armen. ℥ iv.

Diligenter misceantur omnia, donec vi ignis mediocris in lapidis duritiem massa concreverit, quæ postea fracta olla eximenda, & ad usus reservanda.

N. *Si gummata, myrrham videlicet & thus, addere voles, instituatur coctio lenta, ne comburantur, nec vis illorum in igne evanescat.*

Vires. *Virtutes ejus varie sunt. Tollit ulcera & defluxiones; desiccat vulnera inveterata: curat erysipelas, scabiem, tineam serpiginis.*

Modus utendi.

Liquefcit ejus ℥ j. in ∇ pluvial. mensura i. filtretur, filtratura hac utere, tum lavando, tum linteolum imbuendo ac imponendo.

4. *Alia descriptio Iohannis*

Greiff.

℞. Alumin. ℥ iv.

⊖ li ungar. vir. ℥ ij.

alb.

Tartari.

Borrac.

Borrac.

Mastich.

Thur.

Sal. * à ʒj.

Ceruf. ʒvi.

Boli arm. ʒiij.

Crasso modo contusa, coquantur in olla vitreata capaci, cum ✕ fortissimo, ut supra. *Hartm. in pract.*

5. *Alia.*

℞. ʒi lb. i.

Sal. nit. lb. ʒ.

Ceruf.

Alumin.

Bol. armen. à. ʒiv.

Sal. ammoniac. ʒij.

Omnia bene trita coque l. Δ. cum ✕ ad eminentiam digit. 2. affuso in olla satis capaci, donec omnia redigantur in lapidem durum.

6. *Alius lapis salutis.*

℞. Alumin.

Myrrh. à ʒiij.

ʒi alb.

Anatron.

Ceruf. an. ʒij.

Thur. ʒj.

Bol. armen.

Ærugin. à ʒiv.

Tere simul, & cum ✕ q. s. coque ac coagula in lapidem.

7. *Lapis mirabilis.*

℞. ʒi alb.

virid.

Sacchar. fin.

Sal. nit. ana lb. i. ʒ.

Sal. * ʒi ʒ.

Alumin. crud. ʒiv.

Gamphor. ʒj.

Minutissimè pulverisata, miscantur cum muria sive brodio olivarum conditarum, ut fiat instar mellis. Coque dein lente & coagula in lapidem.

Vires. *Easdem vires obtinet cum prioribus lapidibus salutis.*

8. *Aliter : Lapis rubens dictus.*

℞. Vitriol. Roman.

alb. ana lb. i. ʒ.

Alumin.

Lithargyr.

Lap. calamin. ana. ʒiv.

Tart. albi puri.

Sal. ammoniac.

commun. ana ʒ ʒ.

Affuso aceto coque l. Δ. semper agitando, & cum incipit spissescere adde

Ceruf. venet. lb ʒ.

Boli arm. ʒiv.

M. diligenter, & coque in duritiem lapidis.

De Liquoribus.

Liquores hic voco humores per deliquium, aut similiter paratos.

N. In his excellunt salia resoluta, quæ Balsami, vel interdum olei nomen, licet minus accurate, sibi vendicarunt.

Resolvuntur salia per deliquium, si aëri humido exponantur, vel & humore aqueo imbibantur: reliqua quia peculiarem modum obtinent, quo in liquorem redigantur, specialiter suis locis innotescunt.

Liquores usitatiores sunt.

Liquor. Salis ammoniaci.

Arsenici.

Corallorum.

CrySTALLORUM.

Salis gemmæ.

Lapidis Judaici.

Ludif. calculi humani.

Oculorum cancri.

Perlarum.

Saturni.

Talci.

Tartari, i. e. oleum Tart.

Huc Liquor Lumbricorum.

Myrrhæ.

Commendatur et idem maximopere Liquor Lithontripicus compositus.

℞. Ocul. cancr.

Lapid. Judaic.

Lyncur.

Spongia.

Ætit. ana q. v.

Pulveratis affunde Spiritum Salis ad digit. 3. stent in solutione & aliquot, hinc depleatur solutio, restitansque materia, novo spiritu salis affuso denovo solutioni submitatur, donec tota ferè soluta sit. Solutiones confusas coagula evaporando vel abstrahendo. Coagularum tritum solve per deliquium, liquorem hunc coagula iterum, ac solve, idque repete donec coagulationem ulteriorem admittere nolit.

Vires. Maximarum censetur virium in calculo resolvendo.

Dosis gutte 4. 5. &c. indies propinata. Vide Medull. dest. part. 1. tr. 10.

Liquor ad ulcera.

℞. Calc. viv.

Sal. ammoniac. ana.

Læviga simul. & funde ad follem fusione maturata, & confluit ∇ quam effunde. Massæ huic tritæ adde sal Tart. tantundem ac fuit alterutrus, reponeque in cellam ad liquefendum.

Vires. Sanat impetigines, ulcera fistulosa, aliaque maligna & inveterata mundificat, & ad sanationem disponit, proin confert in cancro, serpigine, lue venerea, & simil.

CAPUT LXVII.

De Magisteriis.

Magisterii nomen est si æquivocum sit, uti libr. I. dictum: attamen communiter usurpatur pro pulvere, ut plurimum, candido, per præcipitationem ex certis quibusdam rebus præparato. Res illæ tum è mineralibus sunt, ut terræ & lapides, tum è vegetabilibus, ut Herbæ, &c. tum ex animalibus; ut ossa, cornua, crustacea.

Modus fiendi.

R. Materiam ex qua Magisterium parare constitutum est, tere aut comminué grossè, hinc affunde liquorem convenientem, acidum vel similem ut solvatur, vel extrahatur; solutio præcipitatur (affuso liquore vel materia cujus vis solventis vis obtundatur,) præcipitatus pulvis abluatur, si opus sit ∇ communi, hinc exiccetur lente.

*Sic fiunt.**Magisteria.***1. E Mineralibus.**

Tritis affunditur solvens, solviturque s. a. solutio præcipitatur, eluitur & siccat.

N. 1. Liquor solvens vulgariter adhibetur ✕, tum per se, tum acuaturn per Sp. Sal. nit. vel similes spiritus minerales, sc. ∅ Sal. com. &c. vel peculiaris destillatur solutioni aptus liquor, de quo suis locis.

N. 2. Præcipitatio fit communiter

oleo Tart. p. d. nonnunquam spiritu ∅ illo modo grisea aliquatenus evadant præcipitata, hoc, albescent magis.

N. 3. Quæ consistentie sunt durioris, ut lapides, antea calcinari volunt. Vide specialius libr. 3.

2. E Vegetabilibus.

1. Tritis grossè vel incisis affunde lixivium forte ex Sal. Com. Tart. & ∇ pluviali paratum, extrahatur, decantetur ac præcipitetur effundendo aquâ aluminis (in qua O solutum) exicca lente.

N. 1. Præstat adhibere herbas mediocriter siccas.

N. 2. Sic nobis in usu sunt tam ex alterantibus, quam purgantibus, v. gr. Magisterium Rhabbarbari, cujus dosis ʒß.

2. Sulphureis i. e. quæ oleosa parte scatent, extrahitur Tinctura beneficio ∇ rectificatis, præcipitaturque affusa aq. com. vel ∇ aluminis.

N. 1. Sic fit Magist. Resinarum, Succi, Corticum resinosorum, e. gr. cinam. Turbeth. Chalapp. &c.

N. 2. Extractis Cat. non immerito annumerari poterunt.

3. Ex Animalibus.

Ossa, Cornua, Crustacea seu Testacea exhibent sua magisteria modo, qui de lapidibus traditur. Videlicet bene-

beneficio ✕ vel spiritus alicujus mineralis acidi & acris.

Usitiora sunt.

Magister.

Concharum.

Corallorum rub.
alb.

Cornu cervi.

Cranii humani.

Crystallorum.

Dentis apri.

Granator.

Hyacinth.

Lap. Judaici.

Magnetis.

Mandibularum lucii.

Matris Perlarum.

Oculorum cancri.

Ovorum struthii.

Percarum lapillorum.

Perlarum.

Rubino.

Saphiro.

Smaragdorum.

Terræ sigillatæ.

Tutia.

Vitri Venetiani.

Ungulæ alci.

Sic & Mag. Jalappæ.

Scammonii.

Succini.

Turpethi.

CAPUT LXVIII.

De Masticatoriis.

Masticatoria, Διαμασσηματα sunt apophlegmatizantia ita dispensata, ut dentibus mastificentur.

Fiunt modis tribus:

1. Simplicia, vel integra, vel in pulveres redacta, concisave mastificantur; ut Mastiche, uvæ passæ, pyrethrum, cubebæ, folia salviæ, agaricus & simil.

2. Eadem contusa nodulo includuntur, qui ori inditus dentibus subinde comprimitur.

3. Eadem cum cera, mastiche, carne passularum ficuumve, tere-

binthina, melle, & simili in massam subiguntur, dentibus submittenda. v. gr.

℞. Rad. pyrethr. ʒj. Nucist. Zinzib. ana ʒij. Mastich. ʒj. Dissolvatur Mastiche in pista calida cum pistillo, hinc cætera admisceantur subigendo in massam, vel pastillos masticabiles pondere ʒss.

Item.

℞. Rad. pyrethr. Mastich. ana. ʒss. subigantur cum cera in morsulos magnitudine avellanæ.

CAPUT LXIX.

De Morsellis & Rotulis.

Morselli, (Morsuli, Tabulæ,) ex omnibus Medicamentorum generibus fieri possunt, quæ non respuunt cum saccharo soluto commisceri, inque placentas indurari. Talia sunt pulveres, Semina, (minutiora) condita, Conservæ, Olea, Extracta: Inprimis tamen ad morsellorum compositionem cooptantur pulveres, de quibus tamen notandum, quod non opus sit æque subtiles eos recipi, ac in rotulis.

Modus fiendi.

R. Sacchari q.f. solve in liquore debito super ignem: hinc coque ad consistentiam, ut frigefactum induretur, (probare id poteris tantillo in orbiculum stanneum vel lapidem effusio:) Hinc immisce sensim pulveres, optime agita, effundeque dum adhuc calore liquidum est, supra tabulam cupream lapideamvè, ut refrigescat & induretur, demum scinde in tabulas.

N. 1. In purgantibus loco sacchari recipi potest Manna, cujus proportio uti & sacchari pro Medici voluntate adhibetur: ut plurimum recipitur sacchari sextuplum, octuplum, &c. prout res immiscenda fortiores vel ingratiore fuerint, e. gr. ad Extracta & Olea destillata major sacchari quantitas expetitur.

N. 2. Nuclei ac semina emulsiōi

apta, si ad morsellorum constitutionem concurrant, pro libitu in emulsionem redigi poterunt, quo saccharum dissolvatur.

N. 3. Condita, duplici modo morsellos subeunt. 1. Conguassata. 2. In frustula incisa.

N. 4. Olea destillata si occurrerint in fine ea instillare oportet; vel paratis morsellis illinere. Idem judicium sit de Moscho ac ambra, que in aqua rosarum dissolvuntur, atque paratis tabulis illinuntur.

Usitatiores sunt alterantes.

Morsuli.

Bezoardici è pulv. bezoardic.

Cephalici è speciebus cephal.

è succo & corticibus citri, s. de citro, vide infra. **N. 1.**

Imperatoris, è spec. Imper.

Pectorales, 2.

Post pastum, A.

Saccharum rosarum tabularum.

Saponea, A.

ad Vermes, A.

Zingiberis cocti, A.

Purgantes usitatiores.

Morsuli.

Diacarthami, A.

Diaphænic, A.

Diaturbith, cum rhabarb. è speciebus.

de Diagrydio, s. laxativi, v. infr. 3.

de Manna Tartarifat, vide libr. 4.

de Me-

de Mechoaca, 4.
 è succo rosarum.

1. *Morselli de Citro.*

R. Carn. citr.

Cort. citr. condit. concis. à ʒj.

Ol. citr. gran. xij.

Succ. citri puriss. q. s.

Sacchar. in ∇ citri. sol. ʒxvi.

F. l. Morsuli.

Sunt Cordiales, ut citrum.

N. Fiant & simplices è succo, corticibus
 & saccharo.

2. *Morsuli pectorales.*

R. Pinear. rec. in ∇ rolar. parat. ʒʒ.

Amygd. d. excort. ʒv.

Sem. Melon. rec.

Cucum.

Cucurb. à ʒij.

Spec. Diarrhod. abb. ʒiv.

Mag. perlar. ʒj.

Sacchar. alb. in ∇ rolar. & scabios.
 sol. ʒxvi.

F. F. à Morsuli.

Sunt nutritivi, refrigerantes, acrimo-
 niam mitigantes, adeoque conveniunt in
 hectica.

3. *Morsuli de Diagryd. s. laxat.*

R. Crem. Tart. ʒij.

Refin. scammon. ʒʒ.

Sacchar. in ∇ rosar. sol. lb. i.

F. Morselli.

Purgant bilem.

Dosis adulto ʒʒ.

4. *Morsuli de Mechoaca, F. F.*

R. Conserv. violar. ʒj.

Spec. Diatragacfr. ʒiʒ.

Turbith. gum.

Mechoac. alb. ana ʒʒ.

Diagryd. præpar. ʒij.

Ol. cinam. still. gran. vi.

anis. gran. iv.

Sacchar. in ∇ fænic. sol. ʒxiv. F. l.

a. confectio in morsul.

Purgant bilem ac phlegma.

Dosis ab ʒʒ. ad ʒj.

Vide part. i. l. 4. observat. Cl.

Gregor. Horstii.

De Rotulis.

Rotularum parandarum modus i-
 dem est, nisi quod Rotulæ, quia formu-
 las Morsulis minores experunt, medi-
 camenta requirant, quæ rotularum for-
 mationem non impediant. Pulveres
 itaq; subtiles esse oportet, dosique mi-
 nori.

Proportio sacchari vulgatissima
 est octupla, ($\frac{1}{8}$) plus minus. In
 purgantibus vero quadrupla, ($\frac{1}{4}$)
 sacch. } In oleis stillatitiis major,
 pulver. }

scil. sacchar. ʒj. ol. gran. i v. & c.

N. Fiant & rotula è succo & saccha-
 ro; si scil. hoc in illo solutum ad consisten-
 tiam justam coquatur & rotuletur. Ve-
 runtamen notatu hic dignum, Rotulas,
 quæ ex succis acidulis fiunt, v. gr. è succo
 curi non admittere coctionem, sed sola
 parari mixtione. Videlicet, R. Sacchari
 pulverisat. lb. i. caleseat ad ignem len-
 tum, hinc affunde succi, v. gr. Berber. ʒij.
 misce & effunde in rotulas.

Rotula usitatiores sunt.

Rotulæ de Berber.

Manus Christi simpl.
perlar.

Diatragaeanth.
Sulphuris pectoral.
Laxativæ infantiles.

1. *Rotula pectorales.*

℥ Sacch. albiss. ℥j.
Florum Sulph. benzoinat. (ut cap.
de Sulph. dicitur) ℥ij.
Ambr. grif. gr. vi.
Mosch. Orient. gr. ij.
Ol. fœnic. gut. iij.
Gumm. tragic. in aq. sca-
biof. infus. q. f. F. massa.
2. *Rotula infantiles laxativæ.*

℥ Cranii human. præpar. ℥ij.
℥ ii per sextam Anonem dulcificat.
Rad. Jalap. an. ℥j.
Margar. præpar. ℥ij.
Confect. alkerm. ℥ss.
Ol. cinnam. gutt. vi.
Sacch. in aq. scord. solut. ℥iiij. F. Ro-
tulæ.

*Vermes necant, & inde genitam Epi-
lepsiam arcent.*

Quinimo ex singulis pulveribus &
speciebus, tam alterantibus, quàm pur-
gantibus, addito saccharo in conve-
niente ∇ soluto Rotulæ pro rei exi-
gentia fieri possunt.

CAPUT LXX.

De oleis Stillatitiis.

Olea propriè sic dicta, triplicis ge-
neris in Officinis veniunt. 1. De-
stillata. 2. Expressa. 3. Infusa cocta.

Olea destillata.

Olea stillatitia ex singulis simplicium
familiis parari possunt, mineralium,
vegetabilium, ac animalium.

MINERALIA, quæ Oleum, fun-
dunt, maximè sunt ex genere sulphu-
reorum; ut succinum, carbo Petræ, &
simil.

Destillatio illorum eadem est, quæ
resinarum vel gummatum.

VEGETABILIA primaria, ex qui-
bus olea destillantur, sunt herba, flo-
res, fructus, semina, radices, ligna, corti-
ces, aromata.

Secundaria sunt olea, resina, gummi.

Modus destillandi olea ex primariis,
eadem opera perficitur, qua ∆ sac spi-
ritus destillari diximus, & ut plurimum
per vesicam.

N. 1. *Felicius oleum ascendit. 1. Si
nonnihil Sal. com. vel Tart. immiscetur.*

2. *Si digestio fermentativè præmitti-
tur, cujus promovenda gratia nonnihil
secum cerevisia, vel & Sal. com. Tart. ad-
di poterit.*

3. *Si oleum præcipuè expetitur, sta-
tim auctiore igne destillatio incipi po-
test.*

1. *Ex herbis.* 2. Herbas virides,
vel siccas, q. v. contunde ac affunde
∇m, (additoque Sal. com. manipul.
ac altero, colloca ad putrescendum)
hinc destilla per vesicam.

N. Her-

N. Herba sicca plus olei suppeditant quam virides.

II. Ex floribus, [siccis præcipuè] olea ad eundem modum destillantur, præcipuè si contusi dies aliquot (14.) adjecta parte Sal. com. $\frac{1}{2}$ vel hujus loco sacchari, cum ∇ fuerint macerati. Sic fiunt oleum chamomillæ, lavendulæ, rosarum, &c.

III. Ex seminibus R. Semen. c. gr. sceniculi grosse contusi, lb. i. affunde ∇ . font. ferventem, q. s. addendo Sal. com. M. i. (vel insuper si libet Tart. \mathfrak{z} j. aut ij.) digere dies (8. 9. 10.) hinc destilla Δ mediocri per Vesic.

IV. Ex fructibus, e. g. baccis juniperi, lauri, & similibus, simili ratione, uti dictum, oleum educitur.

N. Fermentatio promoveri potest addito tantillo fecum cerevis.

V. Ex radicibus. R. Radices conqualta ac digerendum ∇ aliquamdiu, hinc destilla per vesicam.

N. i. Præstant sicca, uti & quæ collectæ fuerunt, antequam in stolones abierint.

2. Majorem olei copiam si experis destillationis residuum cum ∇ illa destillata, macera ac destilla iterum.

VI. Ex corticibus, non lignosis oleum ad eundem cum radicibus paratur modum, v. gr. ex cort. arantior. citri.

N. Præstant cortices nondum exiccati.

VII. E lignis & viscu. R. Segmenta lignorum arida, q. v. imple retortam terream, (lutatam,) ac destilla in excipulum sat amplum, igne nudo gradatim adhibito, sic extillat primum liquor clarus, continuato hoc igne post horas (4. 5.) sequentur spiritus nebulosi, tandem auge ignem, ut fundus retortæ condescat, sic ascendit oleum nigricans & fætidum, quod à liquore separa ac rectifica. Sic fiunt olea è ligno guajaci, agallochi, buxi, coryli, ebeni, juniperi, santali, serpentariæ, sic & viscorum coryli, querni & simil.

N. i. Fieri quoque possunt per descensum, sed nostratibus inusitatum est, oleumque crassius exhibet.

2. Cautè procedas, nec nimium properes, spiritus enim impetuosius receptaculum discingere proclives sunt.

3. Elici quoque possunt olea hujus sortis ex resinosis lignorum Extractis, ad modum resinarum aliarum destillatis. Kesh. cent. 86.

4. Sunt & ligna, sed pauca, quæ oleum suum, (quod subtilius ac volatilius est,) per vesicam cum ∇ fontana destillata tarde licet, profundunt, ut sassafras, lignum rhodium, cypressinum. Videlicet lignum serratum vel minutim incisum, maceretur in ∇ aliquamdiu, dein destilletur per vesicam, destillatione dies aliquot continuata prodit tandem oleum.

Rectificantur olea, tum ex cucurbita, tum ex vesica, cum ∇ copiosa quantitate destillando. Nonnunquam tamen,

tamen, si ponderosiora sint, arenæ immixta per retortam rectificari opus habent.

VIII. Ex aromatibus. R. Aromata grossè contusa, (pulveres minus olei fundunt,) macerentur cum menstruo idoneo, per aliquot dies, (4.5.6.) hinc destilla per vesicam, sit prodit oleum & ∇.

N. 1. *Poterit iidem & aliquid Sal. com. vel Sal. nit. vel Tart. admisceri.*

N. 2. *Alii in ejusmodi oleis eliciendis amygdalas rebus addunt, ut majorem copiam nanciscantur, sed fraudulentè; etenim partem majorem ejus olei amygdala sibi merito vendicant.*

N. 3. *Alii digerunt primo aromata in spiritu Terebinthina cohobato aliquot vicibus supra Sal. com. calcinato. Verum nec hipurum oleum aromaticum nanciscuntur.*

N. 4. *Separatio olei ab ∇ fieri potest*
1. *Subsidendo. Mimirum si aliquamdiu (8. 14.) destillatum immotum in cella steterit, subsidet oleum.* 2. *Filtrando per chartam* 3. *Per gossypium. Vid. l. i. c. 14.*

IX. Ex resinis. R. Resinarum lb. 2. vel 3. affundatur ∇ quantitas copiosa, destillenturque per vesicam.

Sic prodibit Oleum, quod primo clarissimum stillat ∇ supernatans (dicitur vulgò Spiritus.)

Hinc incipit paulatim flavescere, muta itaque receptaculum, & suscipe flavum hoc oleum, (si placet seorsim,) continuando destillationem, do-

nec nihil olei amplius extillet, (dicitur Oleum.)

Tandem exime materiam in vesica restitamentem, (quæ colophoniam dicitur,) eamque destilla ex retorta in arena, & extillabit oleum crassum rubrum, Balsamus vulgò)

N. *Possunt quidem Olea hac & Balsamus una eademque destillatione per retortam elici, igne scil. gradatim adhibito, verum enim vero præstat per vesicam priora illa elicere, tum ut præcaveatur evirgescere, tum quoque ne eorum astu labor irritus reddatur, quod alias facillè accidit. Si nihilominus volupe sit per retortam ea simul destillare, exastuatio præcaveri potest, si arenam resina liquefacta immiscueris.*

Sunt autem resina usitata Lenticis, (Terebinthina cypria,) Laricis, (id est, Terebinthina vulgaris,) pini.

X. Ex gummi resinis. R. Gummi-resin. lb. 1. inde retortæ vitreæ, (ventre capaci) ut saltem tertia pars impleatur, destilla per arenam in receptaculum, aliquota parte ∇ adimpletum, primo ∇ lento, & prodibit oleum, dein auctiori, & extillabit Balsamus.

N. 1. *Ut fervescentiam præcaveas, arena aliquid admiscere poteris: Alii loco arena addunt triplum silicium grossè contusorum, vel salis aliquid, quo ascensionem olei promoveant.*

N. 2. *Rectificari potest hoc oleum per cineres cum ∇ destillando, vel & laterum fragmenta ignita eo imbibendo, at-*
que

que ita destillationem peragendo, non secus, ac destillatur oleum de lateribus.

Sic fit oleum è Gummi, Anime, Elemi, Tacamahaca.

XI. Ex gummatis, (præcipuè ferulaeis) Olea elici possunt ad eundem modum quo ex resinis. Nimirum oleum subtilius per vesicam cum ∇ destillando elicitur, crassius ac ponderosius per retortam. Vel si maior destillatione una eademque utrumque per retortam elicere, destilla initio calore leniori, ac suscipe oleum subtilius seorsim, dein collige crassius igne auctiori. Præstat tamen per vesicam, ut de resinis dictum.

N. Felicius eliciuntur hæc olea ex Extractis resinosis, ad modum quem in resinis dedi.

Reliquorum oleorum præparationes, si qua ab hisce discrepant, specialius in singulis edocebimus.

Ex ANIMALIUM familiâ exhibent Oleum, cornua, medulla, cerebri, ossa, ungula, pinguedines, sanguis, stercora, (vide de ∇ is.)

Cornua, ossa, ungula, igne nudo per retortam (terra lutatam) pelluntur, funduntque uno ac eodem labore liquorem seu spiritum acidum, (phlegmate commixtum,) oleum ac sal volatile. Oleum id rectificat.

Medulla cerebri ac spina fundit oleum, si admisto Sal. com. per retortam vitream ex arena destilletur.

Pinguedines, (axungia, serum, butyrum, cera), destillantur aliis rebus com-

mixta, ex cucurbita vel retorta vitrea idque per cineres aut arenam; commiscuntur autem, vel cum lateribus pulverisatis, vel cum filicibus calcinatis, vel cum cinere arenavè, ut eo facilius oleum ascendat.

N. Quantitatem rei adjicienda edocebit pinguedinis destillanda consistentia, quæ in aliis mollior, in aliis durior, plerumque autem sumitur pars tertia vel quarta, interdum pondus æquale.

Sanguis destillatur igne nudo ex cucurbita figulina alta ac spaciola, ad remanentiam terræ nigræ, levis ac spongiosæ. Destillatum liquorem filtra per chartam, & transibit liquor, remanente in charta oleo fœtente, (in parva quantitate,) Liquor hic exhibet spiritum, Salque volatile hinc inde vasis destillatorii adhærescit.

N. Præstat sanguinem calentem recipere, (meiretas scil. 2. vel 3.) eumq; in MB, clauso vitro digerere (& 9. vel plures) hinc per gradus destillare.

Olea destillata nescitiora.

Oleum Absynthii.

Anethi.

Angelicæ.

Anisi.

Aurantiorum.

Butyri majalis.

Benzoin.

Calami aromatici.

Camphoræ.

Cardamomi.

Carvi.

Hæ

Caryo-

Caryophyllorum.
 Ceræ rectificat.
 Chamæmeli.
 Chære folii.
 Cinamomi.
 Oleum Citri cort.
 Cymini.
 Cubebarum.
 Euphorbii.
 Fœniculi.
 Galbani.
 Guajaci.
 Hyssopi.
 Juniperi è baccis.
 ex ligno, August.
 Laterinum Philosophorum
 A.
 Macis.
 Majoranæ.
 Mastichis.
 Melissæ.

Menthæ.
 Myrrhæ rectific.
 Nucis moschatæ.
 Origani.
 Piperis.
 Pulegii.
 Rorismarini.
 Rosarum.
 Salviæ.
 Saponis.
 Savinæ.
 Serpilli.
 Smegmatis.
 Spicæ.
 Succini albi.
 flavi.
 Tartari.
 Terebinthinæ.
 Zedoariæ.
 Zopissæ.

CAPUT LXXI.

De Oleis expressis.

Exprimuntur Olea ex seminibus ac nucleis nonnullis oleosis.

Modus.

R. Nucleos siccos (e.gr. amygdal) non rancidos, excortica ac contunde in mortario lapideo minutissimè, hinc inde sacculo, ac exprime fortiter sub prælo.

N. 1. Prestat ut plurimum massam illam tritam in sartagine torrere, vel vapore ∇ calida tepescere. Exemplo sit vulgaris ille modus exprimendi olea ex

semine Lini papaveris, & simil.

N. 2. Elicuntur quoque Olea, sed pauca, per decoctionem rei in ∇ qua decoctione pars oleosa supernatat, sic fit Balsamus peruvianus, oleum lauri, & similia.

N. 3. Olea sine Δ expressa sunt saporis gravioris.

Usitata sunt.

Oleum amygdalarum amarum, dulce.

Avellanarum, A.

Bala-

Balaninum è balano myrepica.

Cannabis.

Oleum Carthami, A.

Ceraforum, ex nucl. A.

Citri è granis, A.

Erucae sem.

Hyoscyami, ex femin.

Juglandium, ex nucleis.

Lauri, A.

Lini sem, A.

Macis.

Nigellæ, ex sem.

Nucis moschatæ, A.

Olivarum ex olivis maturis.

N. Hoc Oleum intelligitur, quoties

Olei simpliciter mentio

fit.

Omphacinum ex olivis immaturis.

Ovorum, ex vitellis.

de Palma, s. de palla.

Papaveris.

Perficor. nucleor.

Pinearum.

Pistaciorum, A.

Raporum sem.

Ricinum, s. de Cherva.

Sesaminum, A.

CAPVT LXXII.

De Oleis per infusionem & coctionem, &c.

Olea hæc cum simplicia, cum composita officinis usitatissima sunt.

Modus parandi.

1. *Simplicia* recentia incisa coquuntur oleo mixto aquæ, vino, aliivè liquori convenienti, idque tantisper donec humiditas aquea exhalarit.

2. *Sicca simplicia* in oleo mero macerantur.

Commodior modus hicce est.

Herbis exiccatis ac pulverisatis affunde oleum, digereque in MB horas (12.) dein exprime fortiter, expressionem expone calori leni, ut fæces subsideant, quas separa.

N. Oleum communiter adhibetur olivarum, interdum omphacinum, vel

aliud, de quo peculiaris semper occurrit admonitio.

Usitatiora Olea insolata simplicia.

Oleum Absinthii, cum Oleo Omphacino.

Abrotani.

Anethi.

Chamæmelinum.

Cheyrinum.

Cydoniorum, c. Omphac.

Enulæ, c. Ol. Sesamin.

Euphorbii, c. Ol. Cheyrino.

Febrifugum. 1.

Formicarum.

Hederæ terrestris.

Hyperici comp. Göleri, 2.

Hh 2

Ellen-

- Ellenberg. 3.
 Jasminum.
 Irinum.
 Ligustrinum, Cyprinum
 de alcanna.
 Lilinum.
 Liliorum convall.
 Lumbricorum, c. Ol. Omph.
 Mastichinum, c. Ol. Omph.
 Menthæ, cum Omph.
 Melilot, ex fl.
 Momordicæ, ex fruct.
 Myrtillorum, c. Ol. Omph.
 Myrtinum, c. Ol. Omph.
 Nardinum simpl.
 Nicotianæ.
 Nimpheæ alb. c. ol. Omph.
 Pestilentielle. Bartol. 4.
 Populeum.
 Purgans comp. 5.
 Ranarum.
 Rosatum vulgare
 Omphacinum.
 Rutæ
 Sambucinum
 Scorpionum simp.
 è Styrace
 Verbasci
 Vernisum. Vernix, è Ol. Linī
vide libr. 4. Juniper.
 Violarum ex fl.
 N. Huc pertinet & Balsamus Sulph.
 Lithargyrii, & simil. quæ nihil aliud sunt
 quam oleum s. spiritus Terebinthina mi-
 neralibus illis imprægnatus.
 Olea collecta composita.
 Oleum de Capparibus.
- Castorei
 Costinum
 Croci
 Hyperici
 Liliorum
 Majoranæ, s. Sampsuchinum
 Mandragoræ
 Moschellinum
 Nardinum comp.
 Papaverinum
 de Piperibus
 Resolutivum
 Rosarum Mésuæ
 Scorpionum compositum
 magnum
 Stomachale Cratonis
 Vulpinum
 Zanetinum Melichii.
 Cord. in append.
 1. *Oleum febrifugum Strobel-
 bergeri.*
 2. Ol. Nymphææ unius saltem anni.
 Lumbricor.
 Rosar.
 Hyperic.
 Amygdal. am. à ʒj-
 Mixtis impone scorpiones vivos N.
 1x. Exponantur soli (paretur si possibi-
 le in ingressu ☉ in signum m, vel ☌.)
 donec moriantur scorpiones, tunc et-
 iam adde.
 Theriac. Andr. opt. ʒʒ.
 Reliquantur insolati per ☉. 14.
 Vires. Easdem vires cum aliis scor-
 pionum oleis libr. 5. descriptis obtinet. In-
 primis tamen inservit Emplastro febrifu-
 go consiciendo.
 2. *Oleum*

2. *Oleum Hyperici compositum* f. *Balsamus Hyperici*. Nobiliss. Georg. Gö-
leri a Rabenstein.

R. *Oleum Hyperic.* opt. lb. i.

Vini generos. sextar. tres.

Ol. Terebinth.

Laterin.

Lumbricor. à ℥ij.

Ceræ ℥j.

Pinguedin. human. destillat.

Ol. de medulla (hum. vel cerv.)
destill. à ℥ij.

Theriac. Andr.

Mithridat. à ℥j.

Visc. querc.

Til.

Coryll. à Mj.

Fol. Persicar.

Rut. murar.

Pyrol. à M. iij.

Flor. Antirrhin. M. viii.

Hyperic. M. v.

Verbasc. M. ij.

Betonic.

Centaur. min.

Prunell.

Consolid. aureæ.

Parmic. Austriacæ.

Chelidon à M. i.

Sem. Antirrhin. ℥j.

Hyperic. ℥ij.

Rad. Dracuncul. maculat.

Aristoloch. rot.

Symphyt. à M℥.

Scrophular.

Fabariæ f. Crassul. maj. à Mj

Bulliant sive coq. in diplomate va-

se optimè clauso ad consumptionem
Vini. Exprimantur fortiter; postea
imponantur.

Croc. ℥

Mumia.

Mastich.

Thur.

Myrrh. an. ℥ij.

Denuo coq. leviter dein pro circula-
tione ponantur ad solem, hyeme ad
fornacem.

N. Non opus est prædictum oleum vel
Balsamum de novo sapius conficere, si qui-
dem Balsamus iste ad solem collocatus fa-
cile ex novis floribus, superius annotatis
et foliis Persicaria et Pyrola, nec non de
semine Hyperici augeri potest, et de no-
vo restaurari, et tantum injiciendo et
ad tempus aliquod in sole digerendo, post-
modum hyeme colando et ad fornacem
collocando. Quo enim vetustius hoc o-
leum fuerit, eo efficacius et nobilius eva-
det.

Ufus et Applicatio: i.e. Hoc oleum si-
ve Balsamus excellentissimus existit con-
tra hausta venena, introsumptus: Macta-
men conditione, ut prius concutitur Vo-
mitus per lixivium vel oleum olivarum
calidè bibitum, vel quod melius per
Nicotianas. Tabaci.

2. Calculum et arenas pellit, sapius in
ovo cocto assumptum.

3. In magna quantitate exhibitum
vermes ventris necat et expellit, præser-
tim si in Persicaria exhibeatur.

4. Prædicto modo usurpatum, corpus
ab omni corruptione et multis ulcerib.

Hb 3

pra-

preservat, ut planè nulla in corpore humano sive interius sive exterius nasci queant.

5.6. Auriginem quoque & Hydropisin discutit.

7. Interna itidem vulnera & qua confusa sunt mirabili effectū curat.

8. Vomitum sanguinis & Dysenteriam vi compescit atque constringit.

9. Vulnera omnia externa, qualiacunque sint etiam ea quæ Venenatis armis influcta fuerunt, mira celeritate Balsamica vi contrahit atque conglutinat, omnia alia vulnerum symptomata prohibens ac tollens, si lenteola rasa in eo madesiant & vulnerib. imponatur, illa sapius lavando & extergendo. Possunt insuper hoc oleo omnia Emplastra Sticlica, quemadmodum & reliqua in sua virtute & efficacia sola malaxatione confortari, ut majoris inde virtutis & energia sint.

10. In capitis v. vulnerib. ubi cranium quoque ad duram vel pia materem laesum fuerit; optimè & studiose cavendum, ne prædicta linteola nimis humida vulnerib. supponatur, sed antea perquam bene expressa sint: Si vel una gutta sola super duas illas membranas caderet, jam de vulnerato actum esset & insaniam incurreret.

11. Præterea omnes impressiones magicas, ab imaginatione jaculatione, imprecationibus & lamiarum prestigiis influctas stupendo planè modo irritas facit, & persanat, tam interius assum-

ptum, quam exterius illitum, applicatum-
vè.

12. Quod si alicui cultri ligna, vitra, seta, panni lacerati, fila, acus, crines, testa & quacunque alia intra corpus & stomachum vel & gulam, unde suffocationis periculum incurrat per incantamenta & prestigias impacta fuerint, siq. nullis aliis medicamentis cedere velint, hoc oleo inungantur, ac ipsis quoque ad bibendum exhibeatur, quantitate trium cochlearium, Admirabilem vim experieris: Vel enim prædicta omnia, per aliquod magnū ulcus exiccatum tanquam aliquod emunctorium protrudet, vel per vomitum rejiciet, aut tandem per inferiora coget, ac tandem ager penitus in columis citra omnem perditionem evadet: Balsamum hunc meum communicavit Clariss. Dn. D. Iohan Christophorus Eiseamen-
ger. Physicus Imperialis, Reip. Heilbron-
nensis, Amicus ac Fauctor meus honoratissimus.

3. Oleum Hyperici compositum D.

D. Erhardi Ellen-
bergii.

℞. Fol. Hyperic. recent. M. iij.

Contunde modicè, deindè superfunde

Ol. de Scorpion. simpl. ℥. iij.

Ponantur in ☉. per 4. postea in MB. per 8. 24. coque & fortiter exprime. Cola oleum per Colatorium vino albo lotum. Deinde adde.

Flor. Hyperic. recent. contus.
M. iij.

Re-

Relinquito denuo ad solem 8
4. & mox coquito in MB cola ut ante.
Idem repetendum cum florib.
semper recent. bis tervè, donec oleum sanguineum acquisiverit colorem.
Hinc.

℞ Cymar. (semin.) Hyperic. immaturarum, modico vino albo generoso madefactarum ℥.iij.

Coque in MB. per 8. 3. postea exprime ut ante, & hoc reiterandum quater, semper cum cymis recentib.
Post hæc,

℞ Card. sancti. (benedict.)

Meliss.

Verben.

Scabiosæ.

Betonica.

Chamædr. à MB.

Contunde modicè & coq. in MB per triduum; deinde cola. Colaturæ injiciantur

Sum. Galeg.

Scord. rec. an. M. j.

Centaur. min.

Diptamn. Cret.

Rorismarin. à MB.

Coq. in oleo prius herbis contusis per 8. 3. in MB. F. colatura. Deinde

℞ Rad. Zedoar.

Diptamn. alb.

Angelic. gummos.

Aristoloch. utriusque

Carlin.

Valerian.

Gentian.

Tormentill.

Vincetoxic.

Cort. citr. ana ʒiʒ.

Contusa infundantur & coq. per 8. 4. in MB exprim. fortiter ac interim injiciantur.

Caryophyllor.

Macis.

Schœnanth. à ʒiʒ.

Santal. rubr. ʒʒ.

Bacc. junip.

Laur. à ʒij.

Cinam. ac. ʒj.

Benzoin.

Storac. cal. à ʒvi.

Contusa & hæc ponantur in MB per 8. 3. dein colentur. Postea

℞ Bufon. N. ij.

Natricem N. i. { Serpentem nobis Vnct dictam seu Boam.

Araneæ viv. N. C. C.

Injiciantur in oleum prædictum & coque per 8. 2. postea abjiciantur & imponantur.

Rhabarb. el.

Myrrh. fin.

Aloës Epat. an. ʒiij.

Croc. ʒj.

Spic. nard. ʒiʒ.

Theriac. Andr.

Mithridat. an. ʒvi.

Coque in diplomate per 8. 4. nec amplius coletur, sed conservetur pro usu.

Ufus. Valet præcipue contra omnia Vene-

venena. Illinitur arteriis manuum, pedum & cordi, repetitur illitio tribus alternis horis. Pestem tam curat, quam praeservat. Febriles insultus arceat (inun-ctum dorso, & metacarpis manuum, pedumque plantis.) Dolores colicos demulcet. Urinam provocat. Vermes per secessum expellit (illitum umbilico:) Valet ad vulnera venenata, quae vel ab animali venenato, vel ferro infecto sunt infecta. In paronychia nihil praestantius, si statim ab initio, antequam inflammatio venenosa supervenerit, facta fuerit inun-ctio.

Hoc oleo frui ex communicatione Jacobi Holzapffel Pharmacopaei nostratis diligentissimi, Affinis mihi dilectissimi.

4. Oleum antipestilentiale Bartol.
Bonacursii Itali.

℞. Flor. Hyperic.

Rad. tormentill.

Carlinæ.

Aristol. rot.

Centaur. maj. an. ℥vi.

Sant. omnium

Spic. nard.

Celt.

Dictamn.

Bacc. juniperi.

Zedoar.

Gentian.

Imperat.

Card. ben. an. ℥β.

Carpobals.

Doronic.

Cort. citri.

Fol. persic.

Artemis.

Rutæ.

Beton.

Scord.

Chamaedr. an. ℥iiij.

Radic. Pimpin.

Valerian. major.

Vincetox.

Been utr. an. ℥iij.

Anthor.

Scorzon.

Bistort. an. ℥vi.

Moschi.

Maceris an. ℥ij.

Caryophyll. ℥iij.

Macerentur per 3. dies in vini malv.

℥v. coq. exprim. expresso adde recen-

tes species supra dictas, adde

Bufonem magn. vivum.

Viperam vivam.

Ranam

Lacertas.

Cochleas v.

Scorpion. L.

Ligni aloes ℥β.

Theriac.

Mithrid. an. ℥ij.

Benzoi.

Galbani an ℥iij.

Laudani

Succini

Myrrh. an. ℥j.

Ol. hyperic. ℥iij.

Oliv. vet. ℥v.

E Cineribus destillentur omnia, fiatq; ter cohobatio, tandem oleum decan-
tetur,

terur, quo inungitur cordis regio sub axillis, & inguina ad arcendam pestem.

3. *Oleum purgans compositum*

S. Cloffai.

℞ Ricini American. &

vulgar. an. ℥iij.

Sem. cataput minor.

Ebuli mundat. a. ℥β.

Rhabarb. pulveris. ℥j.

Santal. citrin. ℥β.

Contund. fortiter, donec abeant in pastam, ex quâ per expressionem fortem eliciatur Oleum.

Dof. gutt. vj. in jusculo præpingui, alias ardorem in gutture excitat, quamobrem à nonnullis, pilula unica ex micâ panis duabus guttulis hujus ol. inebriatâ fingitur, vel inter duas oblatas concluditur. Purgat âvis xaj uatw hydrope affectos.

CAPVT LXXIII.

De Pilulis.

Pilulæ fieri possunt 1. ex rebus quibuscunque ficcis, beneficio visceri ac glutinosi alicujus liquoris (Syrupi, Mucilaginis, Succi aliquantulum inspissati, Extracti, & simil.) incorporatis.

2. Ex foliis succis extractisvè inspissatis.

N. 1. *Salia liquationi fermentationique apta sunt, idcirco si qua admiscenda, in minima dosi admisceri volunt.*

N. 2. *Extracta vel succi inspissati rediguntur commodius in pilulas, si addatur nonnihil pulveris appropriati, quam si sola inspissatione incrassentur.*

N. 3. *Potest & olei guttula una ac altera instillari.*

Modus fiendi.

℞. *Medicamenta convenientia (pulveres) atque cum liquore viscido conveniente, contunde quam optimè in mortario, ut exactè cuncta misceantur ac cohæreant.*

N. *Pilulæ rari de omnis generis medicamenti parari possunt, rariorès tamen sunt alterantes, crebriores purgantes.*

Sunt

Pilula alterantes usitiores.

Pilulæ de Bdellio, *August.*

Bechicæ, *Cord.*

Pilulæ Bechicæ albæ } *conveniunt cum*
nigræ } *Trochiscis, à*
quibus sola forma differunt.

de Castoreo, *A.*

de Cynoglossa, *A. C.*

Renod.

Diaphoreticæ, *vide infra, N. 1.*

Diureticæ, *2.*

Antepilepticæ, *3.*

Febriles, *4.*

Narcoticæ Plateri, *5.*

de Styrace *S. Cloff. 6.*

contra Tussim, 7.

Pilula. Purgantes.

Pilulæ de Agarico Mesuæ, *A. C. R.*

li

Aggre-

Aggretivæ majores Mesuæ. Polychrestæ, A. C. R.

Aggregativæ minores Mesuæ
A.

Alephanginæ, s. aromaticæ, Pilulæ Solis Mes. A. C.

Alephanginæ Valerii Cordi
de Aloë lota, A. & C.

rosata, A.

& Mastiche, A. C.

de Ammoniaco, Querc. inf. 1.

Arabica Nicolai, A. C.

Arthriticæ, s. arthetica, A. C.

Arthriticæ Scheffer, 2.

Affaieret Avicennæ, A. C. R.

Aureæ Nicolai, A. C. R.

N. *Alias Pilulas hujus nominis conscripsit Marsilius Ficinus, quas & Magicas vocat, vide Mecker.*

Pilulæ Benedictæ, A. C. 3.

Cholagoga, Querc. v. 4.

Ante cibum.

N. *Pilularum, quas ante cibum appellant, variae occurrunt descriptiones. Sunt enim qui omnibus pilulis stomachicis id nominis imponunt: Renodæus stomachicas Galeni ita communiter appellari ait. Weckerus diversas exhibet descriptiones pilularum ante cibum, tum & pilularum ante & post cibum, dictarum.*

Pilulæ de Colocynthide Damasceni,
A. C.

Dicuntur & hoc nomine Pilula de Nitro Tralliani.

De Esula Fernelii, v. 5.

de Eupatorio majores Mesuæ
A. C. R.

N. *Potius Pilula de Rhabbarbaro dicenda sunt.*

de Euphorbio Mesuæ, A. C.

de Euphorb. Quercetani, 6.

Febriles, 7. 8.

Febrifuga Scheffer, 9.

Fœtida Mesuæ, A. C. R.

de Fumaria Avicennæ, A. C. R.

Gummosæ, 10.

de Hermodactylis, A. C. R.

de Hiera picra, A. C.

Hieræ simpl. A. C.

de Hiera cum Agarico, A. C.

composita, A. C.

Hydroticæ, A.

Hydropicæ, Bontii, 11.

Iliacæ Rhafis, 12.

Imperiales, C. A.

N. *Renodæus alias exhibet, quas & Catholicas indigitat.*

Indæ Haly, A. C.

de Lapide armeno, C.

Lazuli, Mesuæ, A. C. R.

de Ladanq, 13.

Lucis majores Mes. A. C.

minores Cord.

Marocostina, Mindereri, 14.

Mestichinæ, conciliatoris, A. C. R.

Matricales Scheffer, 15.

de Mechoacanna, Renod.

de Mezereo Damasceni, A. C.

de quinque generibus Myrobalanorum, Tralliani, A. C.

de Nitro, s. Diacolocynthidos A. R.

Octo-

Octomeræ, s. de octo rebus, Nicolai, A. C.

de Opopanace, Mesuæ, A. C.

Panchynagogæ. Quercet. 16.

Pestilenciales Avicennæ, s. communes, A. R.

N. Corde dicuntur pestilenciales, Riffi, seu de tribus.

Pestilenciales Florentinorum, & Ruffi, A. C.

Pestilenciales compositæ, 17.

Antipodagricæ, 18.

Polychrestæ S. Clossi, 19.

de Rhabbaro Mesuæ, A. C.

de Sagapeno, s. Serapino, Mesuæ A. C.

de Sagap. Quercetani, 20.

de Sarcocolla Mesuæ, A. C.

Sine quibus Nicolai, C. R.

Stomachicæ Alkindi, A. C.

Stomachicæ Mesuæ C.

de Succino, 21.

Tartareæ melanagogæ, Querc. 22.

Tartareæ Bontii, 23.

Tartareæ meæ descriptionis, 24.

ALTERANTES.

1. Pilula Diaphoretica S. Clossi.

℥ cinnabar. ꝯ ii rectificat ꝯj.

Præservativi ex croco myrrh. & aloë ꝯß.

Cryſtall. Sulph. ꝯj.

Ol. guajac. q. s. ad corporatiōem

F. pill. duæ, exhibeantur super bibendo cochl. i. acidi Guajac. mixti cum tribus partibus vini alb.

2. Pilula Diuretica S. Clossi.

℥ Tereb. Venet.

Galbiana part. æq. M. in mortario marmor. terendo diutissimè, usq; dum simul incorporentur, quod difficultate non caret. Dos. est à ʒj. ad ʒij. Tereb. ꝯlo addita vim ejus vomitivam refrænat, & diureticam conciliat.

3. Pilula Anti Epileptica

S. Clossi.

℞. Præcipitati solaris per se in matracio Δ febrili continuo, parati ʒj.

ꝯ mineralis ꝯiv.

Ol. ꝯ febrifugi (ut dicitur cap. de ꝯ) gutt. xx.

Extracti castor. per V evaporando facti.

Succiri, ana ʒj.

de pœon. mare cum V facti.

Pœon. fœmin.

Bryon. ana ʒijß.

Fol. Helleb. nigr. subtiliss. triturat. ꝯii.

F. pulvis & cum succo porri massa pilularum, cui admisce Ol. angelic. fativ.

Spiritus Oli ana gutt. x.

Usus: Cape ante paroxysmos aut post quadram C a pill. duas ꝯj. ponderantes, sumendo postea jusculum carniū acido Oli conditum.

4. Pilula febriles.

℞. Extr. card. bened. ʒß.

centaur. min. ꝯj.

c. c. ust. præparat.

sal. absynth. à ꝯß.

Cum Syrupō de card. benedict. F. num. xx.

Ii 2

Usus

Uſus: Exhibeantur ante paroxyſmū
expeſteturque ſudor.

5. *Pilula Narcotica Plateri.*

℞. Opii puriſſ. ʒi.

Infunde ∇ vitæ ʒß. diſſolv. lento ca-
lore. eodemque exſicca.

Deinde alia affuſa ∇ vitæ molleſcat,
additis ol. cinam. gran. 2.

Poſtea.

℞. Cinam.

Sacchar. cand. ʒi.

Piper. ʒi.

Sem. coriandr. ʒij.

Croci ʒß.

Subtiliſſimè pulveriſatis adde opi-
um diſſolutum, ſenſim opio pulveres
miſcendo.

Poſtea cum ſyr. de papaver. redi-
gantur in maſſam pilularem, addendo
moſchi ʒß.

Maſſa hæc diu in mortario agite-
tur, & ne exſiccetur, Ol. de Been pa-
rum ſubigatur. Servetur in loco humi-
do.

Vires. Dolores ſopiuunt, ſomnum con-
ſiliani.

Dofis gran. ʒ. 6. Sennert. in Inſtit.

6. *Pilula de Styraçe ſive laudanum
Pectorale.*

℥ Styraç. calamit. ʒij.

Laudan.

Olib.

Myrrh. an. ʒj.

Succi glycyrrh. ʒiß.

Ambar. grif. ʒj.

Extract. Opii per ✕ parati ʒj.

Croci cum V facti ʒiiij.

M. cum

Syr. de cort. citri ʒij.

F. Maſſa pilul.

Dofis gran. x. Siſti pertinaciſſimam
tuſſim & catarrhum ferinum. Prægan-
tibus non ſine abortus deſcrimine tuſſien-
tibus multoties cum ſucceſſu dedit S. Cloſ-
ſaus Archiater apud Meienſes.

7. *Pilula ad Tuſſim.*

℞. Succ. Glycyrrhiz.

Thur. ana ʒi.

Myrrh.

Croc.

Opii ana ʒj.

Cum Syr. pap. errat. q. ſ.

F. Maſſa.

Vires. Catarrhos ſubtiles & ſalſos à ca-
pite ad pectus incrassant, ebullitiones hu-
morum ſiſtunt, tuſſimque ſedant.

Dofis à gran. viij. ad ʒß.

Purgantes:

1. *Pilula de Ammoniaco Quer-
cetani.*

℞. Aloës cum ∇ Endiviæ ſolutæ & pu-
rificatæ, ʒiv.

Gumm. ammoniac. in ✕ ſcyllic.
ſoluti & colati.

Myrrhæ in Vino igne MB diſſoluti
& dum caler adhuc, trans-
colati à ʒß.

Maſticis.

Spec. Diatr. Santal. à ʒß.

Croc. ʒij.

Sal. Fraxini vel Abſynth.

ʒiv.

Cum

Cum Syrupo de Stœchade, vel de succ. rosarum.

F. Massa Pilularum.

Vires. Purgant insigniter tartarum, omnemque feculentam corporis materiam, magnoperè conferunt adversus omnes defluxiones, cachexias, oppilationes lienis, ejusdemque duritiem & scirrhum, febres quartanas inveteratas: præstantissima sunt ad homines corpulentos evacuandos.

Dosis à ℥ss. ad ℥j. ad laxationem alvi, alias ascendi poterit ulterius.

2. Pilula Arthritica Guilielmi Ernesti Schefferi Medici Francofurtensis.

℞. Resin. Jalapp. ℥ss.

Essent. Rhabarb ℥j.

Aristoloch. rot. ℥iv.

Gentian.

Tartar. vitriolat. an. ℥j.

Diagrid. rosat. ℥iv.

Mag. Chalyb. ℥j.

M. F. cum Essent. Fol. senn. Pilulæ numero xxx. pro ℥j. & deaurentur.

Ha pilula apprimè conveniunt in catharrois defluxionibus, imprimis in qua ad artus decumbunt, pituitam & serosos humores blandè educunt, & viscera obstructionibus liberant.

Dosis v. vi. vii. vel ix.

Acuentur interdum Troch. Alban- dal. Mag. Gutt. gemu. &c.

3. Pilula benedicta.

℞. Aloës rosar. ℥ss.

Gumm. ammoniac. in guttis, f.

purissimi, ℥ij.

Succ. card. benedict. inspissat. ℥j.

M. cum vino albo, vel ∇ card. bened. rectificata.

F. Massa.

N. Aloës succotrina purissima subtilissime teritur, succus rosarum incarnatarum ad pulvis consistentiam permiscetur, siccatur, teritur.

Usus ante & post pastum, imo ejus initio ac fine.

Dosis gran. xv. ℥j. &c.

4. Pilula Cholagoga de Centaurio Quercetani.

℞. Succor. optimè depuratorum

Centaurii minor.

Rosar. pallidar.

Eupator. Mesuæ.

Rad. oxylapathi à ℥iv.

Quibus adde aloës præparat. (ad modum Quercet. vide libr. 4.) ℥vi.

Digerantur MB. hor. duodecim, ut fiat perfecta dissolutio & mixtio, dein omnia coagulentur ad mellis consistentiam.

Cui adde.

Pulv. Rhabarb. ℥j.

Xylo aloës.

Myrrhæ à ℥ij.

Croci.

Cinamomi à ℥ss.

Spec. Diatr. santal.

Trochif. Diarrhod. à ℥i.

M. F. Massa.

Vires. Profunt in omnibus febribus biliosis, aquato morbo, & cachexia. Febris itidem cæterarumque partium, nu-

tritioni dicatarum, obstructionibus mirifice auxiliantur.

Dosis à ℥ss. ad ℥j.

5 Pilula de Esula Fernelii.

℞. Cortic. rad. Esulæ minor. macerata hor. 20. in ✚ & succo portulacæ ℥ij.

Grana Ricini expurgata & torrefacta, numero XL.

Miobalanor. citrinor. ℥iſs.

Chamædryos

Chamæpityos.

Spicæ. nardi

Cinamomi ana ℥ij.

Omnia tenuissimè trita, excipiantur Tragacanth. ▽ rosar. solut. ℥i.

F. Massa.

N. Esula non sit recens, sed saltem ante menses octo collecta.

Vires. Valde turbant, sed sunt efficaces in corporibus robustis.

N. Minus exiccabuntur, sed & minus efficaces erunt, si excipiantur syrupo rosarum solutivo, non mucagine Tragacanthi.

Dosis à ℥j. ad ℥iſs. &c.

6. Pilula de Euphorbio, Quercetian.

℞. Euphorb. præparat. (ad modum Quercet. vid. lib. 4.) ℥i.

Spic. nardi.

Mastiches à ℥vi.

Opopanac.

Sagapeni præparat.

Bdell. ana ℥ss.

Agaric. troch.

Troch. alhandal. à ℥iij.

Syrupi violati aciduli, q.ſ.

F. Massa.

Vires. Mirabiles sunt contra omnis generis febris chronicas, intermittentes atque quartanas, nec non contra omnes cachexias, hydropisim & colicos dolores.

Dosis à ℥j. ad ℥ij.

N. Habet Quercetianus & pilulas perisilentialès de Euphorbio.

7. Pilula febriles f. Giales ad febres Hartmanni.

℞. Vitri ℥ii (iusto tempore si fieri potest, & diligentissimè) præparati, prætereaque cum spiritu Qi albificati & tenuissimè pulverisat. ℥ss.

Sacchar. candi ℥iij.

Farin. tritic. ℥iv.

Croc. elect. ℥j.

Coque cum ▽ commun. l. ▽ ad consistentiam pultis, cavendum tamen studiosè, ne in fine massa aduratur, sed ferè panis formam habeat. Asservantur in integritate sua quadriennium: Postea tandem scabritiem contrahunt, minus deinde utiles.

Vires. Mirificè febriles mineras, aliaque symptomata exhauriunt. Exhibentur ante paroxysmi insultum, cum vestigia horroris gliscunt.

Dosis à ℥ss. in pueris; ad ℥j. in adultis fortioribus.

8. Pilula febriles ad quartanam

Sennerti.

℞. Ol. ℥ii saccharati. ℥j.

Aloës succotr. ℥ss.

Ambr. gryf. ℥ij.

Croc.

Croc. Ziſſ. (veleſſent. croc. Zi.

F. Maſſa pilularum.

Vires. *Purgat per inferiora, nonnunquam per ſudorem.*

Dofis ℞. ante paroxyſmum, cum conſerva v. g. roſarum, &c.

N. Dicitur Landanum mercuriale.

9. *Pilula febrifuga D. D. Schefferi.*

℞. Sp. hier. picr.

Reſin. Jalapp. an. ℥ij.

Fecul. Aron.

Eſſent. Rhabarb.

Lign. Colubr.

Gentian.

Centaur. min.

Roſar. rub.

Diagryd. roſar.

Tartar. vitriolat. an. ℥j.

Ol. citri. g. vi.

M. F. cum Eſſent. Fol. Sen.

pilulæ n. xxx. pro. ℥j.

In omnibus febribus intermittentibus admodum utiles ſunt & in ventriculi compreſſionibus, ejusque cruditatibus à bile & pituita ortis, vermes quoque expellant.

Dofis iij. iv. v. vj. vij.

10. *Pilula gummoſa S. Cloſſ.*

℞. gumm. ammon.

Galban. in aceto ſcyllit. liquor. &

per linteum traject. a.

℥iij.

aloës in veſicâ.

myrrh. ana ℥ij.

maſtich.

croci Orient. an. ℥ij.

turbith.

agar. troſchiſc. an. ℥iv.

trochiſc. alhand. ℥.

ſcammon. præpar. in

℥iſſ.

balaſam. Peruv. tepidi ℥iij. M. omnia ſimul, & adde ℞ cum ☉ præcipit. ℥ij.

F. Maſſa pilul. in aluta ol. amygdal. dulc. in volvenda; coquenda ſunt lento Δ donec paulatim evaporato (ſpatulâ ſemper agitando) materia in maſſam reducatur.

Dofis cap. ij. aut iij. inſtar. baccarum juniperi horâ primâ ante cœnam & in ingreſſu lecti.

Vires. *Dupliciter agunt in morbis quartanariis, hydrope, cachexiâ, chloroſi, menſtruis provocandis, ictero utroque; primo per vim ſuam attenuantem & emoll. materiam præparant Catharticiſis expellendam; ſecundo humores liquatos fluxilesque redditos blandè expurgant.*

11. *Pilula Hydropica Bontii, Medicæ apud Hollandos quondam celeberrimi.*

℞. Aloës opt. ℥iſſ.

Gumm. gut. gam. ſubtiliter pulver.

& cum malvatico diſſoluti & lavigati,

℥iſſ.

Diagryd. eodem modo parat. ℥i.

Gumm. ammoniac. ℥iſſ.

Tart. Glar. ℥ſſ.

Cum ſyrup. roſ. ſol.

F. Maſſa.

N. Hæ

N. *Hæ sunt illæ pilulæ, ex quibus una cum Tartareis, infra descriptis, Bontius, Principis Auriaci Medicus maximam sibi famam acquisivit.*

Vires. Educunt aquas potenter.

Dosis ʒß. ad ʒj.

12. *Pilula Iliaca Rhasis.*

℞. Colocynthid.

Sagapen. ana ʒvi.

Diagryd ʒij.

Cum succo porri

F. Massa.

N. *Alii omisso succo porri, solvunt sagapenum in vino, eoque reliqua suscipiunt.*

Vires. *Solvunt passionem iliacam ac colicam, cephalalgicis, hemicranicis salubres sunt. Verum cum iudicio usurpanda.*

Dantur à ʒß. ad ʒß.

13. *Pilula de Landano.*

℞. Ladan. ʒß.

Mastich. ʒj.

Calefiant in mortario & dissolutis adde.

Troch. Alhand. ʒiiij.

El. de succ. rosar. ʒß.

Cum Syr. ros. sol. q. s.

F. Massa.

Vires. *Subducunt alvum, mucilaginemq, Tartaream emolliunt & expurgant, usq, sunt insignis in dolore Colico.*

Dosis à ʒj. ad ʒj.

Greg. Horst. obs. part. I. l. 4. obs. II.

14. *Pilula Marocostina Minereri.*

℞. Mari veri.

Croc. orient. ana. ʒi.

Agar. trochisc.

Cost. veri indici.

Myrrh. elect. à ʒiß.

Ammoniac. thym. ʒiiij.

Rhabarb. el. ʒvi.

Lign. Aloës ʒß.

Aloës succotrin. &c.

1. Solvatur ammoniac. in ✚ scyllit.

2. Diluatur myrrha lævigata in ✚ rutac.

3. Diluatur aloë lævigata in mucharo rosar. ʒvi. defecetur, coleturque.

Hinc mistis his tribus, affunde succ. limon. aut citri. ʒiv. addeque agaricum cum succis apii, fœnic. & absynth. in puliculam subactum, accedente modica irroratione ∇ cinamomi, ut & Rhabarbarum simili modo cum succis cichor. pimpinellæ ac fumaria subactum.

His ita mixtis, terantur crocus costus & lignum aloës, diluanturque cum aqu. rosar. fragr. & succ. citr. ana.

Tandem confunde utrumque & affunde.

Aqu. Lupul.

Borrag.

betonic. à ʒiv.

Card. bened.

Agrimon.

Iv. arthetico.

Centaur. min.

Rorif.

Rorismarin.

Ceraſ. nigr. à ℥iv.

Digerantur in MB. ̄ 3. deinde cantetur, filtretur & abſtrahatur in MB. poſtmodum inſpiſſetur ad conſiſtentiam pilularum.

Ex fecibus reſiduis fiat de novo Extractio cum extillata illa & abſtracta ▽ ſ. a. exprimatür leuiter, coletur & inſpiſſetur pro pilulis.

Vires. *Mucilaginem tartaream in ventriculo, meſenterio, liene, epate collectam incidunt, paulatim educunt, viſcera eadem, ut & caput ſimul roborant, adeoq; morbis quam plurimis inde ortum trahentibus ſuccurrunt. Vide & pilulas Tartareas Querc.*

Dofis à ʒß. ad ʒj. Extracti prioris; poſterioris enim doſis exhiberi poteſt maiori.

15. *Pilula matricales D. D.*

Schefferi.

℞. Sp. hier. picr. ʒß.

Extr. Aſar.

Gentian.

Ariſtoloſch.

Helen.

Myrrh.

Dictamn. alb.

Rub. Tinſt.

Croc. an. ʒß.

M. F. pil. cum Syr. Artemiſ. inſtar piſorum.

Menſeſcient & puerperia promouent, uterum ab impuriſatibus liberant.

16. *Pilula Panchimagoga Quercetani.*

℞. Aloës optimè præparat. (modo Quercetan. vide libr. 4.) lbß. affunde ſuccum violarum optimè per digeſtionem depuratum, atq; ad mellis conſiſtentiam inſpiſſatum, expone calori ſolis vel ſimili, ſingulis diebus rudicula lignea agitando, ſic exactè paucis diebus commiſcebuntur. Mixtioni ſuo tempore (prout habere recenter poteris,) adde.

Succorum (optimè per digeſtionem depuratorum, & ad mellis conſiſtentiam inſpiſſatorum.) ſc.

Florum primulæ veris

Perficæ arboris

Rofar. pallidar.

Cichorii

Bugloſſi

Hyperic. ana ʒiv.

His cum Aloë perfectè mixtis, (erit Maſſa lb. ij.) adde

Extract. Sennæ

Agaric.

Rhabarb. à ʒij.

Cinamomi

Pulv. ſcenic.

Aniſ. ana ʒi.

Spec. Diatriæ ſantali, ʒiv.

F. Maſſa.

17. *Peſtilentiales compoſita.*

℞. Aloës epatic. puriſſ. ʒj.

Croc.

Myrrh. an. ʒj.

Zedoar.

Gentian. an. ʒj.

Rhabarb. el. ʒij.

Agaric. alb. ʒj.

Kk

The-

Theriac. Andr. nucis Jugland.
quantit.

Species pulveriscentur seorsim, dein
misc. in mortario. Ex massa f. Pilulæ in-
star pisorum.

Vires. *Memoriam roborant, visum
acuunt, omnia membra confortant, tor-
mina ventris sedant, alvum laxant, cru-
ditates tollunt, putredinem, pestilentia-
lesque morbos arcant. Quin & sudorem
citant, adeoque Panacea instar nonnullis
habentur.*

Prophylaxeos causa sumitur Pil. N.
1. singulis diebus: Curationis vero viij.
vel x. cum aq. conven: agerque benè te-
ctus sudet.

N. Sunt qui Pilulas Iesu vocant, secre-
tasque sic habent.

18. *Pilula antipodagrica*
Doringi.

℞. Pulv. Chamæpith.
Chamædr. ver. an. ℥ii.
Centaur. min.
Rad. aristoloch. rot.
Rhapont. ver.
Gentian.
Sem. hyperic.
Gran. human. præpar.
an. ℥i℥.
Rad. Cichor.
Santal. rub. an. ℥i.

Incorporentur cum s. q. succi Cha-
mæpith. addendo nonnihil terebinth.
cypr. pro meliore unione. f. pil. pro lu-
bitu.

Ufus: assumantur per 30. dies sin-

gulo trimestri pondere ℥ss. Horst. ob-
serv. l. 3. obser. 3. p. 258.

19. *Pilula Polychresta S. Closs.*

℞. Extract, aloës cum succo cichor. præ-
par. ̄iv.

Colocynth. per aq. fumar.
parat.

Resin. scammon. subtil. pulveri-
sat. an. ̄ij.

Croci Angl. pulver.

Salis Tart.

Myrrh. troglod.

Flor. Sulph. benzoinat. à ̄j.

F. Massa, ̄a.

Dosis ̄j. jejuno stomacho mane su-
menda aut tribus post cœnam horis. O-
mnis generis humores purgant.

20. *Pilula de Sagapeno Quer-
ceian.*

℞. Sagapen. gumm. os. depurat. ℥vi.
Ammoniac. depurat. ℥iij.
Extract, trochisc. Alhand. ℥i.
Diagryd. ℥ss.

Salis gemm. ℥i℥.

Cum syrupo violato acidulo & tin-
cto, f. Massa, ex qua conficiantur pilulæ
in pisi vel ciceris formam.

Vires. *Admirandi sunt effectus in fe-
bribus quartanis, dissolvunt nimirum se-
ces gummosas, & tenaciter corpori nostro
adherentes.*

Dosis, unica pilula initio paroxysmi,
continuando aliquot dies. Sed usum earū
precedat preparatio, v. gr. cum decoctis
preparantibus melanagogis, & simili-
bus.

21. *Pilula de Succino Cratonis.*

℞. Pulv. Succin.

Mastich. à ℥℔.

Aloës. ℥x.

Agaric. ℥iij.

Aristoloch. rot. veræ, ℥i.

Cum Syrup. de Betonice. q. s.

F. Massa.

Vires. Aluum leniter solvunt, caput roborant, adeoq; à catarrhis præservant. Prescribit Author bis in mense, sumereq; jubet post primum somnum.

Dosis ℥j. Crato

22. *Pilule Tartareæ seu Melanagoga,**Quercetani.*

℞. Crytall. vel cremor. Tart. ℥iij.

Polypod. quern. ℥ij.

Passul. corinthiac. ℥i℔.

Myrobalan. omnium ana ℥℔.

Flor. Bugloss.

Borragin.

Nymph. anap. i.

Coquantur in f. q. aquarum fumarie & scolopendrie ad medietatis consumptionem. Hinc.

℞. Decocti hujus depurati ac clarificati. ℔. ij.

Succi pomorum redolentium depurati. ℔. i.

Adde.

Folliculorum senæ mundat. ℥iij.

Turbith.

Rad. hellebor. nigr. veri à ℥i℔.

Macis.

Myrrh. el. ℥j.

Caryophyll.

Cinamom.

Epithym. à ℥℔.

Macerentur & digerantur ad ignem MB, (♂ 4.) vase vitreo clauso, deinde materia adhuc fervet, fiat expressio, vel per seraceum trajectio, cui adde aloes depurat. ℥iij. omnia sufficienter coagulentur ad ignem lentum: addendo sub finem dum ferè refrigerata erit materia.

℞. Spec. Diarrhod. abb.

Lætific. Gal.

Troch. Dialac. à ℥i.

Sal. Absinth.

Fraxin. à ℥ij.

Essent. (tinctur.) croci, ℔ij.

Ol. anis. aliquot. guttul.

Reducantur in bonam pilularum consistentiam.

N. *His pilulis adjicit interdum Essentias Aloës & Scammon. Essent. Extract.) Rhabarb. à ℥i℔. Essent. (Extract.) Sen. ℥j. & Essent. (Extract.) Trochisc. Alhand. ℥℔. plus minus, vocatque polychrestas.*

Vires. Admiranda illarum virtus (inquit Querc.) nunquam satis laudari potest, purgant utramque bilem, omnes humores crassos, tartareos, falsos & mucilaginosos radicitus eliciunt, vel è partibus etiam profundissimis: succurrunt diversis maniacis & melancholicis affectibus; febribus quartanis opitulantur, & conducunt adversus psozam, cancerum, lepram, & luem veneream, eo quod purificent totam massam sanguinis à variis corruptionibus, diversorum effectuum effectricibus causis. Sumi possunt ma-

Kk 2.

ne ac

ne ac vespere post cœnam parciorem & ante somnum.

Dosis ℥j. vel ℥i℥. ad summum.

23. *Pilula Tartarea Bontij.*

℞. Aloës succotr. el. ℥iij.

Gumm. ammoniac. (cum ✕ squill.)
depur. ℥i℥.

Tart. ♂ lat. ℥i℥.

F. l. a. Massa.

Vires. Prioribus substitui possunt, maximi enim sunt levaminis in morbis Tartareis, quales sunt affectus hypochondriacus, obstructio lienis, mesenterii, &c. Incidunt enim tartaream mucilaginem, inprimis qua in prima ventris regione collecta est, eamque per dejectionem expurgant.

Dosis à ℥j. ad ℥j. mane vel ante cœnam. ℥℥.

N. 1. Tanta sunt apud Hollandos astimationis, ut piaculum habeant, communes eas reddere.

Duplicis autem circumferuntur ibidem sortis.

1. Parantur uti jam dedimus.

2. Recipiunt Extractum Rhabarbari paratum ex Rhabarbari el. ℥℥. & corrigentib. spec. diamargarit. frig. & diarrhod Abbat. à ℥j. in succo citri per noctem maceratis, in quorum colatura dissolvuntur species superiores, fitque l. a. Massa. Et sic respiciunt magis Epar, regionemque secundam bilelevant.

N. 2. Eadem illa priores pilula, addito styracis ℥j. nostratibus in usu sunt, ex ordinatione D. D. Petri de Spina,

Medici ut celeberrimi, ita dexterrimi.

24. *Pilula Tartarea mea descriptionis.*

℞. Aloës lucid. fragat. id est, cum succo fragorum insuccata. ℥i.

Resin. ammoniac. ℥iij℥.

Sal ♂ subdole.

Essent. croci orient. à ℥i.

Magister. Tart. purgant. in ▽ buglosæ aliquoties soluti & coagulati. ℥ij.

Extr. Gentian. ℥i℥.

Cum tinctura Tart.

F. Massa.

Vires. Saburram tartaream & mucilaginosam ex infimo ventre inprimis educit Lienem, Uterum & Epar insartu liberat, morbosque inde prognatos felicissime curat.

Dosis ℥℥. vespere ante cœnam assumpta. Quippe die subsequenti leniter dejectiones aliquot causantur.

N. Constitueram pilulas has, utpote quarum operationes optatas multoties expertus sum, mihi soli reservare, at vincit candor & amor in proximum, cujus saluti non prodesse, vetat conscientia.

N. Desideras forsan, amice Lector, in numero Pilularum, Angelicas, vulgo dictas, quas Clariss. D. D. Hartmann. Beyero, p. m. Officina nostra acceptas referunt. Has libentissime inseruissim, nisi cautum esset illas propalare. Ea propter excusatum me habeo, certoque tibi persuadeas descriptiones multorum
ingre-

ingredientium, quas pro Angelicis venditari videris, non esse genuinas, ipsa enim duobus solis nituntur vegetabili-

bus. Suntque Extractum propriè dictum, Extracto improprie dicto commixtum, &c.

CAPVT LXXIV.

De Potionibus.

Potulentorum genera in Praxi usitataiora diximus esse Apozemata seu Decocta, Aquas, Emulsiones, Infusiones, Potionesque alias. De prioribus alias dictum, de posteriori hic loci agendum.

Est Potio de qua hic agimus liquor, in quo alia Medicamenta crassiora diluta sunt, & præcipuè purgantia: Quin & solæ infusiones nonnunquam sufficiunt.

Modus ergò parandi sola, ferè mixtio est, quam, si res diluenda seu dissolvenda, viscosa & tenax fuerit, in mortario absolvere convenit.

Liquor adhiberi potest varius, usitatus tamen recipiuntur Decoctiones, Infusiones & maximè Aquæ destillatæ.

Res dissolvendæ sunt Syrupi, Electuaria, Extracta, Manna, pulveres, & similia.

Exemplo sint.

1. Potio purgans.

℞. Extr. Fol. sen. ʒʒ.

Rhabarb. ʒʒ.

Cnicopharm. ʒʒ.

Syr. Diaser. ʒʒ.

Rosar. solut. ʒv.

Aq. Cinam. ʒj. (ad saporem, &c.

Fl. Acac. ʒj.

M. F. Potio pro una vice.

Vires. *Educit humores biliosos & pituitosos.* 2. *Alia.*

℞. Fol. sen. ʒiij.

Epithym. ʒij.

Rhabarb. el. ʒiij.

Spic. celt. ʒj.

Infundantur in decoctione pectorali, q. s. per noctem.

In colatura dissolve.

Syrup. rosat. sol. ʒiij.

Confect. Hamech. ʒʒ.

F. Potio.

Purgat humorem melancholicum.

3. *Potio sudorifera.*

℞. Diascord. Fracastor. ʒiij.

Aqu. Sal. nit. Sulph. ʒij.

Mell. gran. Juniper. ʒj.

Extr. card. bened. ʒʒ.

Aqu. card. bened. ʒij.

M. F. Potus.

Vires. *Sudorem movet, viriumque insignium est in febribus malignis.*

4. *Alia sudorifera.*

℞. Liqueor. Lumbric. ʒiij.

Theriac. Andromach. ʒj.

Spir. Tart. ʒj.

Aq. cinam. ʒj.

Mixtur. simpl. ʒj.

Kk 3

Aq.

Aq. Veronic. ℥i℥.

M. F. Potus.

Vires. *Admirandarum virium est in arthritide vaga, si semel ac iterum repetatur.*

F. Potio Vulneraria.

℞. Herb. Sanicul.

Veronic.

Pyrol. an. Mii.

Consol. Sarac.

Trichoman. ana M℥.

Flor. Borrag.

Bugloss. ana p. i.

Sem. Anis.

Fœnic. ana ℥ij.

Cinam. ℥ij.

Jujub. N. vi.

Dactyl. N. iij.

Bulliant in f. q. aq. hord. f. a.

Vires. *Conuenit in vulneribus praeputie pectoris, ubi & expectoratio necessaria est.*

Sumantur de die ℥ij. cum Dijo-

culicantri. Glandorp.

N. *Plures vide apud Quercet. & alios.*

6. *Alia potio Vulneraria.*

℞. Herb. Vinc. pervinc.

Millefol.

Betonic.

Alchimill. ana M. i.

Rad. Zedoar. ℥ij.

Vincetotic. ℥ij.

Nuc. vomic. ℥ij.

Macis ℥℥.

Nucist. ℥℥.

Galang. ℥ij.

Coq. in aq. & vini ana mens. f. ad ca-

sum digitor. 2. transverforum. Co-

laturæ exhibeantur ℥i v. mane ac toti-

dempost meridiem.

N. *Formulas plures habes in Quer-*

cetan. Rediv. tom. 2. pag. 859. & alibi.

C A P V T LXXV.

De Pomis Ambra.

Poma ambra fiunt ex odoratis pul-
veribus, (addi & olea possunt,) qui-
cera, styraceliquida, balsamo Indico,
mucilagine Tragacanthi, cum tantillo
Terebinthinæ ad tenacitatem si opus
sit, suscepti, additaque ▽ rosarum vel
simili optimè in corporati, in globulos
prout visum fuerit, rediguntur.

N. *Nomen mutantur ab Ambra,*
non quod ea necessario & semper ingredi-
atur, sed quia odorem suavem spirant,
adeoq; ambra amulantur.

Exemplo sint.

1. *Odoriferum Crollianum.*

℞. Macis.

Caryophyll.

Cinamom. vel cass. lign. odorat. a-

na ℥ij.

Moschi ℥℥.

Ziber. ℥ij.

Gumm. arab. ℥i.

Tragacanthi prius suprâ fornacem

siccati. ℥ij.

Hæc

Hæc duo gummata cum moscho te-
antur.

Omnibus diligenter tritis, misce Zi-
bettam, & affunde aquam Namphæ,
(id est, è floribus aurantiorum,) seu Da-
mascenæ odoriferæ pro libitu, (ex o-
doratis specificis & ∇ rosarum præpa-
ratæ, in qua prius per 8. dies in digestio-
ne modicum de Paracelsi carbon. vel
Zibetta occidentali admixtum sit,) at-
que in corpora.

N. 1. Carbon seu Zibetta occidentalis,
quantum ex Paracelsi archidox. conse-
cturari potest, nihil est aliud quam stercus
seu Sulph. humanum, in digestionem ali-
quandiu positum, & ex foetidissimo illo o-
dore, sponte sua longa digestionem summam
suaveolentiam natum. Vide Hartman.
in Croll, ut & lib. 5. Class. 1. ut & Agricola
in comm. Popp.

N. 2. Poterit & parari, si pulverisa-
ta illa mucilagine Tragacanthi (in ∇ a
odorifera soluti) suscipiantur.

Vires ac Usus. Adhibitum naribus
odore suo sanguinem movet, & cor supra
modum refocillat, in Apoplexia, Epilepsia,
Colica, Suffocatione matricis, pestilen-
tiali aura.

N. Misceri potest tantillum cum oleo
nucistæ expresso, ut fiat quasi linimentum,
& in supradictis morbis debito modo ad-
hiberi. Croll.

2. Aliud pomum umbra.

R. Storac. calamit. ʒiʒ.

Benzoin.

Laudan. ana ʒʒ.

Caryophyllor. ʒij.

Nucist.

Macis ana ʒi.

Rad. ireos fl.

Cyper. rot. à ʒiʒ.

Fl. Rosar. ʒi.

Lavendul.

Majoran. ana ʒʒ.

Storac. liquid. ʒi.

Zibett. ʒʒ.

Mosch. ʒj.

Cum Balsamo indico

& ∇ rosar. ana q. s.

F. Massa.

3. Aliud.

R. Laudani pur. ʒi.

Styrac. calam. ʒij.

Benzoin. ʒi.

Nucismoschat.

Cinamom.

Macis ana ʒʒ.

Coriandr.

Caryophyllor. ana ʒj.

Mastich.

Olibanana ʒj.

Lign. Aloës. ʒʒ.

Ambr. gran. v.

Mosch. gran. x.

F. Massa.

4. Aliud.

R. Styrac. cal. ʒij.

Mastich.

Thur. masc.

Sandarach. à ʒiʒ.

Costi.

Spic. à ʒi.

Lign. aloës ping. ʒiij.

Mosch.

Ambr.

Ambr. an. gran. aliquot.
Terebinth. parum.
F. Pomum.

Fluxus inhibet.
N. Vide sis & apud August. pom.
Ambra, 1. 2.

CAPUT LXXVI.

De Preparatis.

Preparata Officinarum communi-
ter & in specie sic dicta, nihil aliud
sunt, quam simplicia nonnulla duriu-
scula in tenuissimum pulverem, acce-
dente aqua aliqua cordiali, redacta.

Talia sunt: Terræ, Lapides, Perlæ,
Corallia, Ungulæ, Crustacea. (testa-
cea.

Modus.

Rem præparandam, læviga su-
per porphyrite, lapide versatili quam
minutissimè, inter lævigandum asper-
ge aquam aliquam cordialem, (ut plu-
rimum ∇ rosarum adhibetur,) ut
fiat instar pultis, hanc expone loco
tepido vel aëri, ut in umbra exicce-
tur.

N. Quæ solidiora & duriora, adeo-
que minus lævigabilia sunt, ustione
antegressa calcinari friabiliaque reddi
solent, ut cornua, ossa, crustacea, & si-
mil.

Usitatiores sunt.

Præparat. Cinnabaris.
Conchæ marinæ.

Corallia alba.
rubra.
Cornu cervi ustum.
Cranium human.
Crystalli.
Granati.
Hæmatites.
Hyacinthus.
Lapis armenus.
Judaicus.
Lazuli.
Magnes.
Mandibula Lucii piscis.
Margaritæ.
Mater perlarum.
Ocul. \odot .
Ova Struthii.
Percarum lapides.
Rubinus.
Saphirus.
Smaragdus.
Succinum.
Tutia.
Ungula alcis.

De Pulveribus & Speciebus.

Pulveres ac Species fiunt tritura lāvigatione vè, quarum apparatus nonnunquam exiccatio, calcinatioq; antegressæ.

N. 1. Res si subtilioris volatiliorisq; fuerint substantiæ, trituram minus fortem expetunt.

N. 2. Res pulverisanda, etiamsi commisceri debeant, si sint diversæ duritiei, seorsim terantur.

N. 3. Quia virtutes pulverum facile evanescent, præstat, quorum pulverisatio sine mora perfici potest, nisi crebrioris sint usus, integra asservare.

Pulveres sunt tum simplices, tum compositi.

Simplices magis usuales sunt.

Pulvis Agarici.

Alari.

Aurantiorum cort.

Caryophyllorum.

Cinamomi.

Croci.

Cubebarum.

Concharum febrilis, v. libr. 5.

Glyzyrrhizæ.

Hellebori albi.

Jalappæ.

Lumbricorum.

Mechoacannæ.

Rhabarbari.

Santalorum cunctorum.

Senæ.

Pulvis Serpentum, vide libr. 4.

Tormentillæ.

Ventriculi gallinarum.

Zingiberis.

Pulveres compositi prostant sub titulo pulverum vel specierum.

Sunt usuales pulveres alterantes.

Pulvis contra Abortum, August.

Adstringens Galen. A.

Alexiterius Sal. infra. N. 1.

Anonymus contra Phthisin, A.

Bezoardicus Nicol. A.

NB. Alium habet Renodæus.

Bezoart. sine pretiosis, 2.

cum pretiosis, 3.

Electuarii de bolo, A.

Cachecticus Quercetani, 4.

Cæsaræ gryseus, A.

rubeus, A.

contra calculum, A.

ad casum, A.

Catharticus pro ossib.

S. Cloff. 5.

de cineribus Avicenn. A.

de Cypero, 6.

Cypheos, A.

ad dentifricia, A.

Dentifricius, 7.

Alius S. Cloff.

contra defluxiones, 8.

Dysentericus, 9.

Epilepticus Marchionis cum

& f. Unicornu. A.

- Antepilepticus de secundina, 10.
 Antepil. diaphoreticus, 11.
 Epilepticus, 12.
 pro Epithemate cordis, A.
 epatis, A.
 Febrilis, 13.
 Fortis. Tragea fortis, 14.
 Grossus. Tragea grossa, seu species
 incisa, 15.
 Haly, A.
 Hepaticus. Tragea hepatica
 Quercet. 16.
 Hystericus. Tragea hystERICA
 Quercet. 17.
 Hysteric. A.
 Antinephriticus. Tragea Antineph.
 Querc. 18.
 Partum provocans, A.
 Helidei de Paduanis, A.
 Rubeus pannonicus, A.
 Saxonicus, A.
 Sperniolæ compos. 19.
 Stomachicus, Quercet. 20.
 Ad strumam, A.
 Trithemii, 21.
 Violarum odoratus, A. C.
 Pro ulceribus gutturis, A.
 Species Diamb. cum ambra & mo-
 scho, A.
 Diamb. sine ambra & mo-
 scho, A.
 Dianifu, A.
 Dianthon, A.
 Contra Apoplexiam, A.
 Aromaticæ caryophyllatæ,
 cum & sine ambra
 & moscho, A.
 Aromaticæ rosat. cum & sine am-
 bra & moscho, A.
 Diacalamenthes, A.
 Cephalicæ, 22.
 Diacinnamomi, A.
 Diacoralli, A.
 Confectionis cordialis, A.
 Contra pestem Ferd. Imp. A.
 Cordiales cum & sine ambra & mo-
 scho, A.
 Diacubearum, 29.
 Diacurcuma, f. Diacrocū, A.
 Diagalanga, A.
 de Gemmis calidæ, cum & sine am-
 bra & moscho, A.
 de Gemmis frigidæ, A.
 Ducis, f. Electuarii ducis, A.
 de Hyacyntho, A.
 Diahyssopu, A.
 Imperatoris, A.
 Diaireros Salom. A.
 simpl. A.
 usitata, ibid.
 Justini, f. Electuarii Justini, A.
 Dialacca, A.
 Lætificantes Galen. cum & sine am-
 bra & moscho, A.
 Lætificantes Rhafis, A.
 Liberantes, confectionis liberant.
 A.
 Species Lithonribon, A.
 Diamargariton, calidæ Avic. A.
 Diamargariton frigidæ, Nic. A.
 Diamoschu amaræ, A.
 dulcis, cum & sine am-
 bra & m. A.
 Diapenidion, A.

Dia-

Diatrion pipireon, 1. & 2. *A.*
 Diapleres archonticon. cum & sine
 moscho, *A.*
 Diapœonias, cum & sine ambra &
 moscho, *Cord.*
 Diaprasin. Nicolai, *A.*
 Electuarii resumptivi, *A.*
 Diarrhodon abbatis, cum & sine
 moscho, *A.*
 Rosatæ novellæ, *A.*
 Diaspoliticon, *A.*
 Diatrion Santalon, *A.*
 Diathamaron, cum & sine mo-
 scho, *A.*
 Diatragacanthi calidæ, *A.*
 frigidæ, *A.*
 Ad Vermes, confectio ad vermes,
A.
 Dia-Xylo aloës, cum & sine am-
 bra & moscho, *A.*
 Dia Zingiberis, *A.*
 Huc Sal Philosophorum, 24.
 Sacerdotale. 25.
Purgantes Pulveres.
 Pulvis Artheticus Paracelsi. *vide in-*
fra 1.
 Chalagogus Quercetani, 2.
 Pulvis Cornachini, 3.
 Laxativus, Tragea laxativa, *C.*
 Melanagogus Quercetani, 4.
 Nafalis, ad nafalia, *A.*
 Panchymagogus Quercetani. 5.
 Passavanticus, 6.
 Phlegmagogus Querc. 7.
 Salæ, 8.
 Senæ præparat. Montagn. *A.*
 Solutivus, de tribus, *A.*

Magistralis Stock-
 staldi, *A.*
 Sternutatorius, *A.*
 Sternut. Rulandi. 9.
 Baumannii. 10.
 Ad suppositoria communia, *A.*
 acutiora, *A.*
 sicca.
 Tartari præparat. *A.*
 ad vermes,
 Species benedictæ laxativæ, id est Ele-
 ctuarii benedict. la-
 xativ.
 Diacarthamu, id est, Electuarii Dia-
 carth. *A.*
 Caryocostini, i. e. Electuar. *A.*
 Episcopi, s. Elefoph. *A.*
 de succo rosarum, id est, ele-
 ctuarii.
 Diaturbith cum Rhabarbaro.
PULVERES ALTERAN-
TES.
 1. Pulvis Alexiterius specificus
Ang. Sala.
 2. pulv. viperini 3ij.
 Extr. Bezoardici pretiosi
 Magisterii margarit. an. 3ß.
 Ol. sem. Angel. destill. 9ß.
 Cinnam. gutt. vi.
 M. in mortario vitreo.
Dosis à ʒj. ad 3ß. cum vehic. appro-
priatis singulis quadris (Cæ, Iis qui cum
veneno infecti sunt danda est ʒj.
Extractum Bezoardicum
sic fit.
 2. Lignialoës resinous.
 Granor. Kerm.
 Ll 2

- Santal. alb. odorif.
 Cass. ligneæ.
 Zedoar.
 Croci opt.
 Scenanth.
 Rad. carlin.
 Vincetox.
 Doron.
 Angel.
 Fol. Dictamn. Cret.
 Scord. Cret. an. ʒij.
 V q. s. F. extractum s. a.
 cui adde ʒij.
 Magisterii lapid. pretiosorum cum
 Sal. nitr. calcinat.
 2. Pulvis Bezoardicus sine pretiosis.
 F. F.
 ʒ. Bol. armen. ver. cum aqu. scabiosi
 præparat.
 Terr. sigillat. Silesiac.
 Rad. diptamn. alb.
 Tormentill. ana. ʒv.
 Angelic.
 Gentian.
 Rad. Petasit.
 Zedoar.
 C. C. ust. præparat.
 Succin. alb. præparat.
 Oss. de c. c.
 Rasur. Ebor.
 Cort. citr.
 Corall. rubr præp. à ʒß.
 M. F. Pulvis subtilissimus.
 Dosis ad ʒj.
 3. Pulvis Bezoardicus cum pretiosis.
 ʒ. Pulv. modo præscripti, ʒi.
 Margar. Præparat. gran. xvi.
- Hyacinth. præparat.
 Rubin. præparat.
 Granat. præparat.
 L. Bezoar. or. a. gr. vii r.
 Fol. argent.
 Aur. ananum. i.
 F. Pulvis subtilissimus.
 Vires. Cordialis ac diaphoreticus in-
 signis est, ususque præcipui in morbis ma-
 lignis.
 Dosis à ʒj. ad ʒij.
 4. Pulvis Cachecticus Quercetani.
 ʒ. Limatur. chalyb. in tenuissimum
 alcohol. per ∇ simplicem redactæ, vel
 cum Sulph. calcinatæ. ʒi.
 Fec. rad. Ari ʒiß.
 Ambr. grif. ʒß.
 Essent. corall. (Magist.
 Margarit.
 Succin. præparat.
 Cinamom. ana ʒiv.
 Sacchari, q. s. ut fiat pulvis gustui
 gratus.
 Vires. Est summum Remedium ad
 cachexias, tam virginum, mulierum,
 quam virorum, juvenum ac senum.
 Dosis cochlear. s. mane continuando ad
 dies aliquot.
 5. Pulvis Catharticus pro ossibus
 S. Closs.
 ʒ rad. irid.
 aristol. rot.
 euphorb. an. ʒß.
 Sabin. sicc.
 Oust.
 ʒ præcipitati ana ʒj.

Cerus

Ceruſſ.

Myrrh. an. ʒij.

Ol. garyoph. ʒj. M.

F. pulvis quo aſpergatur os carioſum carne denudat. & aq. O. prius ablutum.

6. Pulvis de Cypero odoriferus.

℞. Rad. Ireos flor. ʒiſſ.

Cyperi rot.

Acor. à ʒij.

Lign. Santal. citr. ʒſſ.

Rhodii, ʒj. ʒij.

Spec. Diamb. ʒj.

Troch. Gail. monſchat.

Mofch. ʒſſ.

Ambr. gran. xii.

F. Pulvis.

Vires. Pulvis eſt odoriferus, conſortans ſpiritus vitales & animales.

7. Pulvis Dentifricius.

℞. Silic. fluviatill. calcin. ʒiij.

Lapp. pumic. præparat. ʒſſ.

Rad. Ireos fl. ʒij.

Ol. ſtillat. roſ. ʒſſ. (vel ex lign. rhod.

F. Pulvis ſubtiliſſimus.

Vires. Exterget dentes ſatorem oris emendat.

N. 1. Alium vide apud Auguſt.

N. 2. Dentifricii pulveres ſunt potiſſimum ex pulveriſatis corallis, calcinatiſſimis, cornibus, lapidibus, cruſtaceis, radicibus ireos, cruſtâ panis toſta, ſalibus uſtis, cineribus, & ſimil.

Alins S. Cloſſ.

℞. farin. laterum rubrorum ʒſſ.

Imbibatur per vices ſpiritus Sulph. pari quantitate & fiet puls, cui addes

Tart. vini alb. ʒiij.

Panis ad nigredinem uſti ʒij. M.

F. pulvis, quo dentes nigrore aut virore infecti confricentur, & vino calente abluantur.

8. Pulvis contra defluxiones, Fluſſ. pulver / Rothlauffpulver.

F F.

℞. Maſtich. alb.

Succin. in fragm.

Summ. Sabin.

Rut.

Oliban.

Sem. cannab. ana ʒi v.

Stachad. citr. M. ij.

M. F. pulvis groſſus.

6. Pulvis Dyſentericus Crollii.

℞. Succin.

Sang. dracon.

Lap. Hæmatit.

Corall. rubr.

Sem. portulac.

Plantag.

Anchor.

Rad. Tormentill.

Terr. ſigillat à ʒij.

Balaustior. ʒi.

Nuciſt. num. iv.

Cinamom. ʒſſ.

Croc. ʒ adſtring.

Talc. calcinat.

Matr perlar. calc.

Oſſ. microcoſm. calc. à ʒi.

Lapides lævigentur, reliquisque minutiffimè tritis addantur.

Vires. Valet in omnibus profluviis alvi, menſtruorum, narium, &c.

Dosis ℥j. ad ʒiβ. vel ʒij.

10. *Pulvis antiepilepticus de secundina.*

℞. Secundin. puelli primogeniti exsiccat. ʒβ.

Cranii maris calcinat. ʒi

Pulv. pullorum corvi, ʒij.

Coagul. lepor. ʒi.

Rafur. c.c. ʒij.

Castor. ʒβ.

Succin albiss. ʒij.

Visc. quern. ℥ decresc. collecti. ʒβ.

Granor. & red. Pæon. ante novilunium collect. à ʒβ.

Ambr. gris.

Moschi ana ʒβ.

Spec. Dianth.

Diapirris archont.

Lætific. Galen.

Margarit. præparat.

Corall. præparat. an. ʒj.

F. Pulvis subtilissimus.

11. *Alius Antiepilepticus Diaphoreticus.*

℞. Cinnabar. ʒ ii purificat.

Magist. Corallor.

perlar.

cran. human. ana.

F. Pulvis subtilissimus.

Dosis à gran. 10. ad 16. bis in septimana exhiberi potest. Hartmann. in Pract. Sennert. Instit.

12. *Pulvis Epilepticus D. Arn. Weickardi.*

℞. Rad. pæon. decrescunt ℥ collect. ʒj.

Sem. Pæon. masc. excort. ʒβ.

Ung. alcis ʒij.

Succin. alb.

C.C. ust. præp. an. ʒij.

Margar. præp.

Corallor. rub. præp. ana ʒj.

Stercor. pavon. ʒi v.

Lap. Bezoar. or. ʒj.

Unicorn. veri ʒij.

Limatur. ʒ ungar. ʒj.

Croc. ʒj.

Manus Chr. perlat. ʒβ.

F. Pulvis subtilissimus addendo

Ol. still. macis ʒβ.

Dosis à ʒβ. ad ʒβ.

13. *Pulvis febrilis.*

℞. Rad. Diptamn.

Petasit.

Zedoar.

Fol. scord. ana ʒij.

Sem. Card. bened.

C.C. ust. præpar. à ʒi.

ʒ diaphoret. ʒij.

F. Pulvis subtilissimus.

Vires. Est contra omnis generis febres, quas per diaphoresin expellit.

Dosis ʒj. Grünlingius.

14. *Tragea fortis. Species fortes.*

℞. Piper nigr. ʒij.

Zingib. ʒi.

Croc. or. ʒi.

Caryophyll.

Galang. à ʒij.

F. Pulvis.

Vires. Usus esse potest in aromatisandis discibus.

15. Tra-

15. *Tragea grossa, Species grossa.*

℞. Glyzyrrhiz. ʒß.
 Cinnamom. ac. ʒv.
 Zingib. alb.
 Calam. arom. à ʒij.
 Galang.
 Zedoar. à ʒij.
 Nucist.
 Caryophyll.
 Macis.
 Cubebar. à ʒj.
 Confect. anis.
 fœnic.
 Carv.
 Coriandr. à ʒvi.

Aromata inciduntur grossè modo,
 confectionesque admisceantur.

Vires. *Confortat ventriculum, adeoq;
 digestionem iuvat.*

16. *Tragea Hepatica Quercetani.*

℞. Corall. rubr. præparat.
 Spod.
 Spec. Diatragac. à ʒij.
 Fl. Hepatic.
 Sem. acetos.
 Porrulac. à ʒi.
 Croc. ♂ optimè præparati, ʒiiss.
 (cum ∇ simpl. vel cum Sulph.
 Croc. ♂ ex Ol. Sulph. parat. ʒij. (vi-
 del. 3:
 Sacchar. rosat. pro libitu.
 F. pulvis.

Vires. *Pulvis est admirabilis, contra
 omnes obstructiones, imbecillitates, ac*

*intemperies hepatis, cui pristinum robur
 reparat: singularis porro adversus omnes
 fluxus hepaticos, cachexias, hydropises, i-
 eterum, &c.*

17. *Tragea Hysterica Quercet.*

℞. Cass. lignæ.
 Calam. aromat.
 Sem. agni casti.
 Pastinac.
 Rutæ.
 Pœon.
 Anis.
 Fœnic.

Cardamom.
 Macis.

Cinamom.

Caryophyllor. à ʒi.

Fec. Bryon. ʒiiss.

Sacchari anthosati ad pondus o-
 mnium.

M. F. Pulvis.

Vires. *Prodest albo mulierum fluori
 & uteri suffocationi.*

Dosis ʒiß.

18. *Tragea Antinephritica Quercetani.*

℞. Tunicæ interior. ventriculi Gal-
 linæ.

Stercoris albi Gallin. à ʒß.

Pulveris pelliculæ interioris, quæ
 in putaminibus ovorum re-
 peritur. ʒiiss.

Herniariæ.

Cinnamomi à ʒiv.

Nucleor. mespilor. ʒij.

Sem. Fœnicul.

Anis.

Anis. à ʒj.

F. Pulvis subtilissimus.

Vires. Effectus pulveris huius efficacissimi sunt in alterando, & expellendo calculo. Valet in idem ad colicam passionem.

Dosis ʒʒ. ad ʒj.

19. Pulvis Sperniola compositus
Crollii.

ʒ. Myrrh. el.

Thur. masc. à ʒij.

Croci trit. ʒʒ.

Camphor. ʒij.

Tere omnia & misce.

Pulverem hunc imbibe. ▽ stillat. sperniolæ, id est, spermatis ranarum, vigesies vel trigesies, ita tamen, ut semper prius sponte exiccetur.

Hinc serva ad usum.

N. Sperniola colligenda est mense Martio, triduum circiter ante novilunium, (sic non foetet) destillandaque MB.

Vires. Summum est remedium in Hemorrhagia à naribus, gutture, utero, quia frigiditate sua coagulat sanguinem. Confert quoque, si solvatur cum aceto, & Erysipelati, doloribus vè podagricis calidis applicetur. Hemorrhagiam quoque vulnorum impositione sistit, Paronychiam necat, &c.

Dosis gran. 4. 5. 6. 7. 8.

N. Si hemorrhagia è sanguinis corruptione originem traxerit, non malum sanè remedium, quippe putredinem arceat. In uterinis vero affectibus, ob myr-

rhæm ac crocum, aliud adhibere mallem.

20. Pulvis Stomachicus Quercetani
s. Brickmanni.

ʒ. Rad. Ari præparat. ʒij.

Acori. vulg.

Pimpinell. à ʒi.

Ocul. cancr. ʒʒ.

Cinamom. ʒij.

Sal. Absynth.

Juniper. à ʒj.

Sacchari rosati, q. s.

F. Pulvis.

Vires. Exhibetur non tantum ad ventriculum corroborandum, cui proprie convenit, sed etiam ad capitis affectus, hemi-craniam, vertiginem, melancholiam hypochondriacam, cachexiam: ad calculum ac febrem quartanam: habet enim facultatem deoppilandi, tartarum resolvendi, &c.

Dosis ʒʒ. ad ʒij.

Præparatio radicis Aronis fit macerando, cum vino albo, horis 12. hinc decantatur vinum novumq; affunditur, denuoq; antea maceratur, qua maceratione acrimonia extrahitur. Hinc radix lente siccanda.

21. Pulvis Trithemii.

ʒ. Calam. arom.

Gentian.

Cymin.

Siler. montan.

Anisi.

Carvi.

Levis.

Levist.

Petrofelin.

Spic. hard. a. 3ß.

Zinzib. albi.

Chamæpyt.

Fol. sen. cl.

Cryst. Tart. a 3vi.

Macis.

Cubeb. an. 3ij.

Garyoph. 3vi r.

M.F. Pulvis subtilissimus.

Vires. Sunt qui huius laudes summe commendant, ad memoriam confortandam. Videlicet, post purgationem convenientem. R. Huius pulveris 3j. ▽ magnanimitatis gutt. xij. & vini nonnihil, sumuntque mane & vespere per totum mensem; altero mense, mane solum; tertio bis vel ter singulis septimanis, idque mane; quarto mense bis qualibet sept. & postea ad dies vita singulis mensibus semel, crescente Luna. Sed crapulam vitare monent, ebrietatemque.

21. Species Cephalica.

F.F.

R. Cinamom. 3ij.

Rad. pæon.

Sem. pæon. exc.

Cit. exc. ana. 3x. 3ij.

Zinzib.

Cubeb. an.

Caryophyllor.

Macis ana 3v. 3ij.

Spec. cordial.

arom. garyoph. a. 3viiij.

diamosch. dulc.

Spec. diamb. ana 3iß. gran. vi.

Nucist. num. ij.

F. pulvis.

Vires. Calefacit caput, exiccat catarrhos, spiritus animales & vitales purificat, corroborat, adeoq. balsamo nativo insigniter confert.

Dosis a 3ß. ad 3ij. vel 3j.

20. Species Diacubeborum.

R. Santal. trium ana 3ß.

Spod. præparat.

Ras. Ebor. ana 3iiij.

Sem. Amomi.

Cubeb. an. 3i.

F. Pulvis.

Vires. Aperit & confortat Epar.

24. Sal. Philosophorum.

R. Sal. com. fusi.

Sal. gemm. ana 3i.

Galang.

Macis.

Cubeb. an. 3j.

F. Pulvis.

Vires. Iuvat concoctionem ventriculi, cruditatesque consumit.

Dosis gran. 4. mane, jejuno stomacho.

25. Sal. Sacerdotale.

R. Sal. commun. torref. 3iiij.

Piper 3l.

Cinamom. 3ß.

Zedoar.

Zinzib. ana 3ß.

Sem. cumin.

carv. ana 3i.

F. Pulv. subtiliss.

Vires. Dolori capitis medetur, ven-

Mm

tri-

triculum calefactis, cruditatesque & flatus consumit, concoctionem iuvat, colicum dolorem profligat.

Dosis gran. viij. ad vx. &c.

Idem aliter.

℞. Sal. commun. ℥j.

Cinamom.

Cumin. ana ℥ij.

Zinzib.

Amom.

Siler. mont.

Piper.

Satureiæ.

Hyslop.

Origan.

Puleg. ana ℥i.

F. Pulv. subtiliss.

Vires. Easdem cum priori obtinet.

N. Dicitur Sal Sacerdotale, quia Sacerdotibus olim (tempore Eliæ) ad dolorem capitis & oculorum caliginem in usu fuisse statuitur.

PULVERES PURGANTES.

1. Pulvis Arthriticus Paracelsi.

℞. Hermodactyl.

Turbeth. opt.

Diagryd.

Fol. Senn. el.

Rasur. cran. vel ossium human.

Sacchari. ana.

Vires. Purgat secure & blandè omnes defluxiones podagricas.

Dosis ℥ss. ℥j. ex aqua lva arthetica, fragaria, &c.

2. Pulvis Chalagogus Querc.

℞. Rhabarb. elect. ℥ij.

Fl. Violar. ℥ij.

Rosar. pallid.

Hyperic. à ℥i.

Spec. Diatrionsantal.

Mastiche.

Cinamomi à ℥ss.

Diagryd. ℥j.

Sacchar. violar. ℥ss.

M.F. Pulvis.

Dosis ℥j.

3. Pulvis Cornachini.

Fit ex mixtione diagrydii Tartari, & 8 diaphoretici cum cremore Tart. commistorum, proportionè invicem pro re nata variante, verbi gratia, Diagryd. Sulph. gran. vii. vii. i. vel ℥ss. & diaph. gran. v. vi. vii. &c. Crem. Tart. ℥j.

Vires. Tantum pulveri huic attribuit Auctor, ut peculiarem de eo conscripserit librum, commendatque ad omnes ferè morbos, qui purgatione opus habent.

4. Pulvis Melanagogus Querc.

℞. Fol. Sen. ℥i.

Sem. anif.

Fœnic. à ℥i.

Cinamom. ℥ij.

CrySTALL. Tart. ℥vi.

Sacchari ℥ss. M.

Dosis à ℥j. ad ℥j.

5. Pulvis Panchymagogus Querc.

℞. CrySTALL. Tart. ℥j.

Senn. el. ℥x.

Hermodactyl.

Turbith. à ℥ss.

Rhabarbari.

Ag-

Agaric. troch. ana ℥iij.
Scammon. præparat. ℥ij.
Macis.

Cinnamomi

Galang. ana ℥iſſ.

Sacchari violati, ad
pondus omnium.

Dosis ℥j.

6. Pulvis Passavanticus

℞. Flor. Borrag.
violat. ana ℥ij.

Zinziber.

Spic. mard. ana ℥i.

Glycyrrhiz.

Sem. anif. à ℥ij.

Diagryd. ℥iij.

Rhabarb. el. ℥vi.

Turbith. gumm. ℥i.

Senæ ℥ij.

M. F. Pulvis.

Vires. Purgat omnes humores noxios,
maximè bilem.

7. Pulvis Phlegmagogus Quer-
cetani.

℞. Spec. Diacartham. ℥ij.

Agaric. Trochisc. ℥ſſ.

Turbith.

Hermodaetyl. ana ℥j. M.

Dosis. ℥j.

8. Pulvis Phlegmagogus Sala.

℞. Cryst. Tart.

Hermodaetyl. mund. à ℥i.

Turbeth. albi ℥vi.

Resin. Scammon. ℥ij.

☉ Caryophyll. cum saccharo,
mist. ℥ſſ. M.

Vires. Purgat serosos ac phlegmati-

cos humores, sine molestia.

Dosis ℥ſſ. ad ℥j.

9. Pulvis Sternutatorius
Martini Rulandi.

℞. Sem. Nigell.

Hellebor. alb. ana ℥j.

Majoran.

Rorismar.

Salvia ana ℥ſſ.

Mosch. gran. ij. M.

Caput roborat, pituitam elicit.

℞. Fl. Anthos.

Lavendul.

Salv.

Betonic.

Fol. Majoran. à ℥j.

Macis.

Cinamom.

Glycyrrhiz.

Ellebor. alb. præp. an. ℥j.

Tabac. opt. ℥i.

Omnibus pulverisatis & probe mix-
tis: adde

☉ Still. anif.

Caryophyll.

Macis

Majoran. anag. iv. M.

II. Alius, Iohann. Nicolai Bau-
manni M. D.

℞. Fol. Tabac. indic. ℥i. ℥j.

Rad. Ireos flor. ℥iſſ.

Lap. pumic. ℥ij.

Moschi gran. ij.

F. Pulvis.

N. Moschus omnes erit, simu-
lieri adhiberi debeat.

Mm 2

CAP.

CAPVT LXXVIII.

De Sacculis.

Sacculus fomentarius fieri potest ex vegetabilibus quibuscunque incisis, sc. crassiuscule vè contusis, sacculoque infutis.

Applicatur tepidè sive siccum sacculum velis, sive humidum, id est, in liquore aliquo coctum & expressum.

*Exemplo sint*1. *Sacculus stomachalis.*

℞. Herb. Menth. crisp.

Calament.

Origan.

Betonic.

Abfinth. an. M. i.

Majoran.

Fl. Rosar. rubr. à M. ℞.

Camomill. odorat. p. i.

Rad. calam. arom. ℥iij.

Nucis moschat. num. i.

Baccar. Laur. ℥i℞.

Sem. anis.

carv.

cumin. à ℥i.

Ex conquassatis & incisis F. Sacculus stomachalis cancellatim intersutus.

Vires. *Confortat Ventriculum. Crato.*

2. *Sacculus cordialis.*

℞. Fol. Meliss. M. i.

Basilic.

Card. bened. à M℞.

Santal. citrin. ℥ij.

Cort. citri.

arantior. à ℥i℞.

Flor. Laur. ℥i.

Cinamom.

Galang.

Nucis Moschat. [Nucist.

Macis ana ℥j.

Lign. Aloës. ℥℞.

Sem. citri.

Meliss. ana ℥℞.

Fl. Borrag.

Bugloss.

Anthos.

Meliss. à p. i.

Rosar. p. ℞.

Ex his crassiusculè contusis, F.

Sacc. interceptus serico.

Vires. *Confert in palpitazione. Crato.*

3. *Sacculus Nephriticus, seu Paregoricus.*

℞. Herb. Malv.

Heder. ter.

Bismalv.

Cerefol.

Parietar. ana M. ℞.

Rad. Alth.

Lil. alb. à ℥i.

Sem. Fœnugr. ℥vi.

Fl. Camomill.

Melilot.

Saxifrag. à p. i.

Contusis & incisis, F. Sacc.

Inco-

Incoctus pluviae, lactive applicetur
renibus in dolore nephritico.

*Huc pertinent & Cucupha, cuius
Exemplum sint.*

4. Species pro Cucupha, F. F.

℞. Rad. Ireos fl. ʒss.

Cyper. rot. ʒiij.

Fl. Lavendul.

Anthos. ana ʒiij.

Fol. Menth.

Majoran.

Ocym. ana ʒij.

Storac. cal.

Benzoin. ana ʒiiss.

Sein. Nigell.

Coriandr. præp.

Summ. Thym.

Stœch. Arab. ana ʒi.

Mosch. gran. iij.

Ambr. gryl. gran. ij.

F. Pulvis grossus, qui in gossypio
susceptus insuatur pileolo serico, inter-
pasando.

CAPVT LXXIX.

De Salibus preparatis.

Salia tùm nativa in Officinis extant,
tùm artificialia: de nativis alibi, de
artificialibus hic loci agere fas est.

Artificialia salia, vel sunt simplicia,
vel composita, seu mixta.

Simplicia, (proprie sic dicta) totu-
plicia sunt, quotuplices res naturales,
quippe res nulla est, quæ salis prorsus
expers sit, imò constitutio rerum natu-
ralium primitus ex sale dependet.

Medium quo salia eliciuntur li-
quor quilibet aqueus est; in quo salia ut
solvuntur, ita & eidem sese immi-
scent. Quia tamen res naturales ple-
ræque valide compactæ sunt, præmis-
sumque requirunt apparatus, quo
compedes, quibus sal impeditum est,
aperiantur, pro diversitate compa-
ctionis, diversi quoque apparatus in-
venti sunt.

Creberrima tamen præ reliquis est

incineratio, qua partes mixtæ disgre-
gantur, salque fixum in cinere rema-
nente aptum redditur, in ∇ lique-
re, muriamque constituere; maximè
si maceratio, transcolatioque repetita
intervenerit.

E. gr.

℞. Cinerem (absinthii à carboni-
nibus purificatum,) coque cum ∇ in
lixivium, vel transcola ∇ in fervidam
aliquoties; sic imprægnabitur Sal. com.
nomenque sortietur lixivii. Hoc pu-
rifica filtrando, inspissaque lenta eva-
poratione, aut crystallisatione.

N. 1. Salia, hac ratione calcinata,
quia lixivium sapiunt, nec satis albicant,
calcinentur, id est, comburuntur, fun-
duntur vè communiter ad ignem, ut al-
bedinem acquirant. Verum potior vide-
tur ratio, albificandi per iteratas solutio-
nes, filtrationes ac inspissationes, hac ta-
men

Mm 3

men admonitione, in majori dosi hac salia esse exhibenda: Saporem lixiviosum quod attinet, optimè is aboletur si cineres cum Sulph. ana circiter mixti, accenso Sulph. calcinentur, atque hinc elixiviationi submittantur.

N. 2. Salia hac fundunt spiritum penetrantissimum si ad modum, quo Sal commune destillantur.

Salia volatilia, (essentia nonnullis dicta, nihil aliud esse videntur, quam portio salis aliquantulum elaborata humori nutritivo immixta, necdum substantiæ crassæ insinuada.

Modus fiendi ex plantis.

℞. Plantam convenientem coque cum magna quantitate aquæ, hinc exprime succum, eumque optimè putificatum inspissa aliquantulum, reponeq; ad crystallandum, s. a.

N. Si succum purificatum recenti herba affuderis, interveniente digestionem, coctione ac expressione, ut prius, majorem salis copiam nancisceris.

Exhibent in idem, ligna, ossa, cornua, sanguis, &c. salia volatilia; sed non nisi interveniente destillatione, qua parietibus vasorum destillatoriorum ea adhærescunt. Vide in oleis destillatis.

Salia improprie sic dicta, parantur ex lapidibus, metallis, cornibus, ossibus, crustaceis, quæ beneficio acidi cuiusdam spiritus solvuntur, (communiter recipitur ✕, vide Magisterium,) filtrantur, & evaporatione in pulverem rediguntur, quem sal vocant.

Hunc saltem abluunt aliquoties,

ne acidum sapiat, & servant pro usu, vel edulcoratum in liquorem per deliquium in cella resolvunt. Vide Liquor.

Salia simplicia usitiora.

Sal Absynthii fixum

Essentiale.

Acetosellæ

Sal Aluminis Saccharum O.

Angelicæ

Artemisiæ

Borraginis

Cancrorum

Cardui benedicti fixum,

Essentiale.

Centauri minoris.

Cerefolii

Chamæmeli

Cichorei

Cinamomi

C. c. volatile

Cranii volatile

Euphrasie.

Fabarum è stramine &

corticibus

Fœniculi

Fragariæ

Fraxinè ligno.

Fumariæ

Genistæ

Guajaci volatile

Hederæ terrestres.

Hyperici

Hyssopi

Juniperi è baccis.

ex ligno.

Lavendulæ.

Majo-

Majoranæ.

Matricariæ.

Melissæ.

Menthæ.

Nitri crystallini,

fixi. Lapis prunellæ.

Ononidis.

Perficariæ.

Pimpinellæ.

Plantaginis.

Rutæ.

Salviæ.

Sanguinis humani.

Scordii.

Succini volatile.

Tamarisci.

Tartari.

Vitrioli vomitivum.

Urinæ.

Urticæ.

Zedoariæ.

*Salia improprie sic dicta, (rectius
calces diceres,) usitatoria sunt.*

Sal Jovis.

Saturni.

Corallorum.

Perlarum, &c.

Salia composita.

1. *Sal. Alkali.*

℞. Ψ. ℔. i.

Ciner. Ifatidis, ℔. ℔.

Tart. Sal. nit. ana ℥i.

Coque in ∇. ut fiat lixivium, filtra ac inspissa ad siccitatem.

N. 1. Theophrastus. ℞. Cinerum clavell. Ψ. & cinerum fabarum, extrahit lixivium, coagulatque.

N. 2. Venetiani. ℞. Ψ. ℔. i. cineris fagi, vel quercus. ℔. ij. Fellis vitri & icaleinati. Tart. a ℥ij. Fac lixivium, atq; exinde Sal.

N. 3. Alkali equivocationem vide libr. 1.

Usus hujus Salis solus Chymicus est, inservitque separationi Qis a Ge, si influxu injicitur. 2. Facit ad fluxionem & facilitandam.

2. *Sal Alembrot.*

℞. Sal. com. præparat. & Salis alkali, a ℥i. F. lixivium cum succi menthæ ac caryophyllat. ana ℥ij. aquæ fontan, ℔. ij. Filtra & coagula.

N. 1. Dicitur & Sal Ellebrot. Sal. Taberi. Sal. Alkitran.

N. 2. Est & Sal. Alembrot. nativum, quod in Cypro, ex certa terra, in monte Olympo extrahitur; formamque & colorem sanguinis concreti habet, sed nostratibus incognitum.

3. *Sal. Antron.*

℞. Calcis viv. ℔. i. v.

Alumin. ℔. ij.

Vitriol. ℔. ij.

Salis commun. ℔. iij.

F. Lixivium cum vino albo, digere per dies aliquot (9.)

Postea.

℞. Stiriar. salis petræ. ℔. x. affunde lixivi tantum, ut operiatur sal in aheni. Misce benè ac solve, coque ad medias, cola ac repone ad concrescendum.

Vires. Metallici hoc sale utuntur ad purgationem fusionemque Metallorum.

SA

Sumitur & Anatron, i. pro felle virri.
 2. pro terra Sarracenicā, cuius sunt speci-
 es, nigra, rubra, & cœrulea. 3. pro excre-
 scentia alba ac lapidea, quā in petris cre-
 scit, in modum usnea alba, à quibusdam
 Sal nitrum vocata. Vide Unzer. de
 Sale.

4. Borrax.

℞. Sal. ammoniac.
 Nitri.
 Tartari calcinat.
 G. arabic.
 Sal. commun. à ʒi.
 Mastich.

Alumin. roch. ana ʒß.

Pulverisatis affunde Urinam, filtra
 accoque, donec materia in falem con-
 crescat.

N. Alii conficiunt ex Sal. nit. & urina
 puerorum invicem commistis & coagula-
 tis. Alii Borracem nostratē ex peculiari
 lapide (Borracis nomine) eoque calcina-
 to extrahi volunt, monente Tholdio in
 Halographia.

Vires. In medico usu facit ad men-
 strua, ac partum provocandum, venerem-
 que stimulantem.

CAPUT LXXX.

De Sapone Oderato.

Sapo odoratus, Smegma odoratum
 odoramenti formula est, constatq;
 ex sapone, (potissimum Veneto, cui
 res odoratissimæ subtilissimè pulverisatæ im-
 miscentur, adhibita ▽ fragrante, v. gr.
 rosarum.

Formula sint, ex D. D. Weickhardo.

1. Sapo Moschatus.

℞. Sapon. Venet. ʒij.
 Styrac. calam. ʒij.
 Rad. Ireos fl. ʒj.
 Nuc. moschat.
 Cinamom. ana ʒß.
 Santal. alb. ʒi.
 Al. dulc. ʒij.
 Caryophyll. ʒj.
 Mosch. gran. iv.

Incorporentur in mortario cum
 ▽ rosarum.

Vires. Habet vim abstergendi & con-
 ciliandi gratum odorem, simulque con-
 fortandi nervos.

N. Loco cinamomi nucisæque licet o-
 lea stillatæ adhibere.

2. Alius.

℞. Caryophyll.
 Macis ana ʒi.
 Benz.
 Rad. Ireos fl. ana ʒß.
 Mosch. gran. x.
 Ambr.
 Zibett. ana gran. v.
 Sapon. Venet. lb ij.

Distemperentur cum ▽ rosarum,
 adjiciendo Ol. stillat. cinam.

3. Sapo ad impetiginē.

℞. Tart. calcinat. ʒß.
 O. calcinat. ʒj.

Flor.

Flor. Sulph. \mathfrak{D} ij.
 g. v.
 Alæ dulc.
 Storac. liquid. an. \mathfrak{z} j.
 Calamit.

Lithargyr. an. \mathfrak{z} ℥.
 Rad. lapath. acut. \mathfrak{D} j.
 Ol. Caryophyl. g. iij.
 Saponis veneti q. l.
 F. Globuli.

CAPVT LXXXI.

De Spiritibus.

Spiritus ut diversi sunt volatilitate ac fixitate, ita & diverso caloris gradu, diversisque destillatoriis destillantur, Fixiores scilicet Retortâ, igneque fortiori, arenæ scilicet, vel nudo. Volatiliores XX atque igne blandiori, scil. VB. MB. vel cinerum.

Fieri possunt spiritus ex mineralibus, vegetabilibus ac animalibus.

Spiritus MINERALES singuli ferè peculiare sibi vendicant modos, quos vide suis locis.

N. *Qua ratione sine vasis destillatoriis spiritus minerales destillari queant libr. i. c. 20. declinavimus. Conscripsit & de eodem peculiarem quendam Tractatum Johann. Glauberus, titulo Furni Philosophici.*

Spiritus VEGETABILES eliciuntur naturæ volatilioris; è foliis, floribus, fructibus, seminibus, aromatibus: fixioris; è lignis, corticibus, viscis.

Modus eliciendi spiritus volatiliores non discrepat à destillatione ∇ rum stillatitiarum, quippe inter has & spiritus hoc solum discriminis intercedit, quod aquæ dictæ maximam par-

tem phlegmatis contineant, spiritus minorem; unde & rectificando spiritus ab aquis sequestrantur.

N. 1. *Res fermentata siquidem promptius ac copiosius spiritum balant, si res destillanda fermentari apta fuerit, fermentationem præmittere suadeo, quippe quâ præter dictam faciliorem exhalationem, spiritus in quintam Essentiam exaltantur; persuasum autem tibi habeto, fermentationem feliciter in vasis ligneis, v. gr. quernis, procedere, quam in vasis aliis.*

N. 2. *Fiunt quoq; spiritus quorundam vegetabilium cum vino, ut spiritus liliorum convallium, &c. Verum cum pars maxima ∇ debeat, præstat hujuscæ generis cognominare, ∇ cum adjectione danti vegetabilis, e. gr. ∇ m liliatum, vel ∇ m vitæ liliatam.*

1. *Sic fiunt ex herbis & floribus.*

2. *Herbas aut flores recenter (tempore sicco collectos) contunde atque in vas terreum vitreatum, vel dolium quernum (præstant enim ad fermentationem vasa lignea,) intermisso sale comprime, clausoque vase in cellam reponere (per mensem unum vel plu-*

N^a

res)

res) donec fermentando acidiusculum ac vinosum acquirant odorem. Hinc destilla per vesicam, (aut MB,) usque ad siccitatem, destillatum affunde, si libet, parti destillandæ residuæ ac destilla denuo. Tandem rectifica.

Aliter.

Exprime succum, eumque cum confusis herbis recentibus mixtum ad fermentandum colloca.

N. 1. Si minus succolenta res fuerint, aqua fervente irrorari ac perfundi volunt.

2. Fermentatio promovetur adjecta aliqua portione, Sal. com. (qua & putrefactionem praeavet) Tart. secum cerevisia, vini, fermenti dissoluti (in ∇) vel sacchari.

3. Poterit & ex fermentatis succus exprimi, atque cum novis herbis denuo fermentari; sic copiosior extillat spiritus.

II. Ex fructibus & baccis succulentis.

3. Succum expressum, eumque clauso vase debite defervere sine, ac destilla: sic fiunt spiritus pomorum, pyrorum, mespilorum, citoniorum, &c.

III. Ex fructibus & baccis minus succulentis.

3. Fructus vel baccas, conquassa ac affunde ∇ m ferventem, vel ebullire parum permitte, hinc colloca, vase clauso infermentationem, addendo si placet nonnihil secum vini vel ce-

revisæ, & simil. sic, fiunt spiritus baccar. & juniperi.

IV. Ex fructibus carnosiss, (i.e. qui palpiam exprimendo praebeant.)

3. Expressam carnosam substantiam, v.gr. cerasorum nigrorum, (exemptis nucleis,) reponere σ (14.) ad fermentandum cum Sal. com. &c. destilla, sic fiunt spiritus, seu Quinta Essentia, baccarum sambuci, fragorum.

N. Licet initio, si ita visum fuerit, aliquid ∇ a ferventis addere.

V. E seminibus calidioribus ∇ cum oleo ascendit, quæ rectificando exhibet spiritum, præcipue si fermentatio fuerit præmissa. Vide supra de Oleis.

N. 1. Spiritus hi aquarum nomine ut plurimum veniunt.

N. 2. Si loco ∇ a vinum in maceratione adhibueris, spiritum itidem nancisceris, sed compositum ex ∇ i seminisque dati spiritu, præstat itaque hunc ad differentiam spiritus simplicis scil. cum ∇ a destillati, appellare spiritum compositum, seu ∇ i cum adjunctione destillati seminis, (e.gr. anisatum, vel ∇ m vitæ anisatum, vide supra.

VI. E frumentis parari possunt Quinta Essentia, si in Cerevisiam reducta ea fuerint; qua ratione magnam spirituum copiam exhibent.

VII. Ex aromatibus spiritus quomodo eliciantur, vide cap. 38.

VIII. E lignis prodit una cum oleo per destillationem liquor acidulus,

lus, (vide supra cap. 70.) qui rectificatus, spiritum refert.

N Rectificatio fieri potest super colchotare aut sale marino, vel cineribus propriis, sic exit primo phlegma inspidum; hinc spiritus acidus seorsim colligendus.

Ex ANIMALIUM familia exhibent spiritus cornuæ, ossa, sanguis, urinæ.

Cornua, ossa, ungula, fundunt spiritum acidulum mediante destillatione, (vide de oleis) hunc rectifica in MB.

Sanguinis itidem spiritus beneficio destillationis elicitur, (vide in oleis & Vis,) est que liquor ab oleo separatus & denuo rectificatus.

N. Coronidis loco addo, si oleum aliquod stillatitium cum Vi rectificatissimo digeratur, oleum illud à spiritu absorberi, ut sub forma spiritus deliteat.

Spiritus minerales usitatiores.

Coralliorum

Mercurii

Salis ammoniaci

communis

gemmæ

nitri

Saturni

Succini

Sulphuris

Tartari

Vitrioli.

Huc & spirituosæ composuit; V.

R. Sal. nit. Sulphurea. v. l. 3.

Spiritus vegetabiles.

Spiritus Absinthii.

Aceti vini

Angelicæ.

Anisi, id est, ∇ cum vino destillati.

Spiritus Cardui benedicti.

Centaurei minoris.

Ceraforum nigrorum.

Cochleariæ

Cydoniorum

Ebuliæ ex granis

Fœniculi

Fragorum

Guajaci

Juniperi

Liliorum convallium

Melissæ

Rorismarini

Rosarum

Salviæ

Sambuci

Thymi

Tiliæ flor.

Veronicæ

Vini

N. Compositi spiritus ferme sub titulo aquarum recensentur, ut spiritus theriacalis id est, ∇ theriacalis; &c.

N. 2. Spiritus oleaceos quare sub Oleis, ut spiritum Terebinthinae, & similia.

Huc.

1. Spiritus Antapoplecticus

S. Cloff.

℞ = sang. cervini lbss.

Nn 2

Infu-

Infusionis florum lavend. in aq.
pæon. fact. ℥iv.

M. & destilla ad medias per MB. spiritui
extillato adde infusionis novæ florum
lavend. eandem quantitat. destilla denuò
idque tertium repete tandem adde hu-
ic Δ V rectificat. ℥ij.

Dosis a gutt. vj. ad xij. & xx. in jascu-
lo aut aq. appropri. Iuvat Paralyticos, A-
poplecticos, Pleuriticos, Asthmaticos, o-
mnes eos quorum pectus sanie aut pure oc-
cupatur, anacatharsin enim promovet e-
gregiè.

2. Spiritus Nephriticus.

℥ Ovum struthionis, pulver. affun-
de Δ Sal. com. & in digestionem re-
linque, donec probè soluta appareat

corticum ovorum substantia, atq; tum
per chartam filtretur, serveturque.

Vires. Est $\epsilon\upsilon\pi\acute{o}\tau\epsilon\iota\varsigma$ ov nulli fere secun-
dum à Casareis medicis S. Clossao commu-
nicatum.

Dosis gutt. vj. viij. ex vino opt. vel aq.
florum fabar. florum acac. mal. veron.
addito syr. dialth. Fernel. Insigniter aperit,
incidit & commovet arenulas, calculum,
aruriam, nonnunquam etiam menses &
sedes atque etiam serum in hydropicis.

N. Fit & insignis spiritus nephriticus
□ a spiritum à Θ o destillando. Vid. I.
Agricol. in Popp. p. 1. p. 585. Löffelium in
Scrutinio Remim. Confer cum Querc. in
Querc. Rediv. t. 3. p. 704.

C A P U T LXXXII.

De Succis.

Succi ex vegetabilibus potissimum
depromuntur, rarò ex animalibus.
E vegetabilibus puta non omnibus.

Inidonea enim sunt, 1. nuclei, semi-
na, & reliqua oleosa, qualia sunt amy-
gdalæ, pistacia, semina lini, (de quibus
egimus in oleis expressis.

2. Minus apta sunt aridiora, ut fru-
ges, nisi decocta harum succos appel-
lare libuerit.

Modus fiendi.

℞. Vegetabilia succulenta, (mi-
nus succulenta, macerari, insolari, e-
lixativè antea volunt ∇) conquassa
& exprime, hinc clarifica, (cum albu-
mine ovi, filtrationeque vel digestio-

ne quod melius,) si opus est Δ l. inspissa,
atque ne empyreuma contrahat, conti-
nuò agita; sic fiunt succi.

I. Ex floribus. ℞. Flores virides
imple XX, premendo, collocenturque
ad digerendum, s. putrescendam in
MB. satis profunde, donec in mu-
cilaginem abiisse videantur: Hinc ex-
prime succum, clarifica c. alb. ovi, &
inspissa lentè ad consistentiam mellis;
sic fiunt succi, (Essentiæ dictæ) bo-
rag. bugloss. pæon. verbasc. violar. & si-
mil.

N. 1. Si flores minus succulenti fue-
rint, affundatur parum ∇ a: sic fit extra-
ctum, s. succus inspissat. flor. tunica, ca-
lendu-

lendula, Keyri, Cyani, rorismar. rhead. salu. & simil.

N. 2. *Præstant flores primum erumpentes.*

N. 3. *Expressum succum si recentibus floribus affunderis, majorem succi copiam colliges.*

II *Ex fructibus. x.* Succulentos exprime, vel coque antea; hinc exprime trajiceque per seraceum, liquidioresque ad mellis consistentiam inspissa.

N. *Succi è fructibus alio ferè nomine gaudent, mellis scil. si dulces sapiant, ut mel in niperinum, passularum, & simil. alias Roob. Sapa; ut rob. de berberis, de ribis.*

III. *Ex radicibus & lignis, interueniente coctione, (in ∇,) & expressione succi eliciuntur, adsciscuntque nomen Extractorum, vide supra cap. 57.*

Succi officinales, tùm liquidi præstant, tùm inspissati.

Liquidi qui per se conseruentur pauci sunt, quippe præter succos, acidulos & fermentatos illos potulentos, (qualis vinum, vinum pomorum, pyrorum, & simil.) nulli ad tempus durabiles sunt: hinc fit ut addito saccharo, melileve, in syrupum coquantur, vide de Syrupis, c. 48.

Quin imo vel ipsis succis acidulis nonnihil sacchari ferè additur, cuius vi tùm parum fermentantur. tùm ab injuria corruptionis conseruantur.

N. *Dantur & succi è vegetabilibus, tùm per se ruptis, tùm incisis sponse stillantes, (lacrymas vocare expetit) Verum hi partim nativis accensentur, partim non usuales sunt.*

Talis est succus betule, qui in Suecia & Finlandia, mensibus Martio & Aprili collectus & fermentatus, mulierculis nobilibus potui suppetit; succus juglandis arboris, liquor sc. qui in quercuum stipitibus coacervatur; lacryma ritidis amputata. Huc opium & simil.

Succi Officinales Liquidi, qui & Vina dicuntur sunt.

Succus Berberum

Citri

Cytoniorum

Granatorum acidorum

Limonum

N. *Succi recentes tot ex tempore parari queunt, quot vegetabilia viridia succulenta exhibentur, verum quia gramineum sapiunt saporem, minus in usum veniunt, licet sapor ille saccharo corrigi queat.*

Succi inspissati.

Succus Absynthii communis.

Acaciae nostratis.

N. *Verus Officinis habetur inter nativa.*

Agrimoniae.

Aloë

Cardui benedicti

Chermes granorum

Centaurei minoris

Cydoniorum

Emulæ

Nn 3

Fu.

Fumariæ
 Glycyrrhizæ
 Gratiolæ
 Hyperici
 Hopscjami
 Ireos nostratis cœruleæ
 Liquiritiæ
 Mercurialis
 Myrtillorum Germanicorum,
 Heidelbeersafft.
 Nicotianæ
 Papaveris domestici
 erratici

Plantaginis
 Rosarum incarnatarum,
 rubrarum
 Scrophulariæ
 Solatri
Huc pertinent.
 Rob. de Berberis simplex.
 de Ribib.
 Mel Ebulinum
 Sambucinum
 Juniperinum
 Passularum

Consistentiam E-
 lectuarij fere obti-
 nent.

CAPUT LXXXIII.

De Suppositoriis & Pessis.

Suppositoriorum formandorum ratio in hoc sita est, ut fiat ex materia duriuscula, glabra, adeoq; in anum intrudi apta, sive illa aptitudo per se rebus insit, sive mixtione, coctione vè concilietur.

Prout igitur indicatio fuerit, ita suppositoriis materia eligenda, anodyna sc. detergens, consolidans, exiccans, alvum irritans, &c.

Usitatissima tamen sunt suppositoria dejectoria, eaque pro ratione operationis triplicia.

1. Lenia, quæ solo ferè tactu materiali movent. Talia fiunt ex lardo, sicu in versa, sevo hircino, bubulo, (candela, seovina,) cera, farina aquæ incocta, (ex qua fiunt suppositoria in sole exiccanda,) caulibus, & radicibus, v. gr.

betæ, brassicæ, bliti, mercurialis, petroselini & simil.

2. Mediocria, quæ aliquali acrimonia stimulant. Talia parantur ex melle ad crassitiem cocto, sapone, terebinthina cocta. Quibus adduntur interdum & alia, v. gr. mulcerda, sal, saccharum.

3. Fortiora, quæ vi purgante lacessunt. Talia fiunt ex purgantibus, lenioribus, ac fortioribus: agarico, aloë, hiera picra, pulvere ad suppositoria, elleboro, scammonio, & similibus.

Modus parandi.

Mel coquitur lentè ad spissitudinem, ut digitis tractari possit, sine inquinacione, experiri id licet guttula in laminam frigidam, vel stanneam effu-

effusa,) hinc effunditur in dictam laminam, oleo illitam, dumque frigesceit, formantur suppositoria; oleoque illinuntur.

Si qua addenda fuerint, ante effusionem ea pulverisata admiscere oportet, vel & formatos cylindros iisdem involvere, ut obducantur.

Portio mellis ℥i. Pulver. (ad purgantia mitiora) ℥i. præter propter, (ad fortiora) ℥ss. 3ss. vel ℥i. Sal. com. aut gemm.

Ut ℞. Mellis, q. s. (℥i.) salis gemm. ℥ss. aut Sal. com. ℥j. muscerd. ℥ss. F. suppositorium.

℞. Agaric. ℥j. sal. gemm. ℥ss. mellis, q. s. F. suppositorium.

℞. Pulv. ad suppositor. commun. ℥i. mellis, q. s. F. suppositorium.

De Pessariis.

Pessaria, pessi, nascalia, ad digiti formam ferè formari consueverunt, fiuntque ex rebus medicinalibus uterinis, quæ vel suscipiuntur, sacculo lineo oblongo, lana concerpta, gossy-

piovè, vel incorporantur cum melle, ladano, galbano, cera, succo, similive re, formanturque ad dictam formam digiti.

M. Figura suppositoriis similia sunt, nisi quod longiora & crassiora.

Exemplo sint.

℞. Myrrhæ 3ss.

Spec. hier. pic. compos.

benedict. laxat. ana ℥i.

Cum melle cocto F. pessarium, quod panno raro obductum, immittatur utero ad menses ciendos. *Weickhard.*

℞. Stercoris asini, q. s. desicca & pulverisa, involvaturque pulvis panno de serico, pro pessario hæmorrhagiam uteri sistente, &c.

℞. Burs. pastor. M. ss. contunde & inde panno pro suppositoio menses sistente, &c.

N. Possunt itidem radices certa, v. gr. rubia tinctorum, cyperi, Iridis, & simil. loco pessarii adhiberi.

CAPVT LXXXIV.

De Syrupis, Mellibus & Robis Syrupisatis.

Syruporum materia principalis est liquor quidam medicamentosus; decoctum, infusum, succus, aqua stillatitia, acetum vè. Servilis, est saccharum clarificatum, melle depuratum, cum quibus liquor ad consistentiam mellis liquidiusculi coquitur.

N. Saccharum & mel adduntur

præcipuè ut liquorum corruptibilitatem arceant, tum quoque ut qualitatem ingratam mitigent, saporemque medicamento gratiorem concilient. Hinc non abs re foret, loco sacchari aut mellis aliquando gratiores alias adhibere melligenes, cum liquore syrupisando qualitatibus conspirantes; quales sunt, verbi gratia,

ria, mel passularum, rob pomorum redolentium, succus glycyrrhizæ depuratus, &c.

Syrupi sunt simplices vel compositi.

Simplices, qui ut plurimum ex simplici unaque re medicinali cum saccharo aut melle parantur.

Compositus, qui ex pluribus.

Modus fiendi.

℞. Liquorem clarificatum, (decoctum, infusum, succum expressum, acetum,) adde saccharum, vel mel, & simil. coque, clarifica, (si opus,) inspissa, ad mellis consistentiam, ac repone pro usu.

N. Guttulâ in tabulam frigidam effusâ consistentiam experiri licet.

Proportio liquoris ad saccharum aut mel est fere dupla vel tripla.

Verbi gratia:

℞. Decocti. ℔. iij. sacchari. ℔. iij. vel i. prout crassior, vel dilutior syrupus expetitur, vel prout durationi longiori, breviori vè destinatur.

Virium ratione sunt syripi alterantes & purgantes.

Syrupi alterantes usitatiores.

Syrupus de absinthio major, A. C.

Acetositis citri, s. è succo citri, A. C.

de succo acetosæ,
acetosellæ.

Acetosus simplex, id est, ex ✚ & ∇. A.

Acetosus compositus, (è radicibus ✚ & ∇ A.

Acetosus Diarrhodon, A.

Adiantinus Fernelii, A.

de Agresta, A. C.

de Althæa Fernelii, A.

Renod.

Anisi simplex Querc. inf. 1.

Anepilepticus Querc. 2.

Aquilegiæ flor.

Arantiorum è succo.

è corticibus.

è floribus.

de Artemisia Fernelii, composit. 3.

è succo Betonicæ.

de Betonica compositus.

de succ. Berberum.

Bizantinus simplex, s. Dynari,

è succ. Endiv.

Ap. Lupul. Bugloss.

Bizantinus compositus, A. C.

de Borragine, s. Infusionis.

de Buglossa è floribus.

de Calamentha Mesuæ,

A. C.

Calendula Quercetani, fit è succ. vel Infus. flor.

è succ. Chamæmeli.

Capillorum Veneris simplex, ex decoctione.

Capillorum Veneris comp.

Cardiacus, 4.

de succo Cardui benedicti.

Ceraforum acidorum è succo.

Cichorii simplex è succo.

de Cinamomo, A.

N. Quer.

N. *Quercetanus parat cum Vino mal-*
vatico. Augustani cum ꝑ cinamomi.
de Cortice citri.

N. *E succo citri dicitur syrupus aceto-*
statis citri.

Coralliorum, v. l. 3. c. 6.

Cytoniorum è succo.

Cytoniorum Vinosus sim-
plex, f. Miva cytonio-
rum, quæ simplex & a-
romatica.

de Endivia simplex,
compositus.

de Erysmo Lobelii, 5.

de Eupatorio Mesuæ, A. C.

de Farfara; è succo.

N. *Renodans compositum exhibet.*

de fragis è succo.

de Fumaria simplex; è succ.

de Glycyrrhiza Mesuæ, A. C.

Granatorum dulcium: è suc-
co.

Granat. acidorum: è succo
cum aceto.

Oxysaccharum composit.

Antihecticus, 6.

de succo Hederae terrestres.

de succo Hyperici.

de Hyssopo Mesuæ, A. C.

de Jujubis Mesuæ, A. C.

de Limonibus: ex succo.

de Lupulo: è succo.

de succ. Melissophyll.

de Mentha minor: è succo
Menth. granat. dulc. vel
acid.

Syrupus de Mentha major, Mesuæ
A. C.

de succ. Mercurialis.

Myrtinus compositus Me-
suæ.

Nephrocatharticus Jouberti,
A.

Nicotianæ seu de Peto sim-
plex, Quercet. 7.

Nicot. compositus, 8.

de Nymphæa: è florum infu-
sione, A.

de Nymphaea compositus.
Pedemontani, 8.

de Papavere albo simplex,
A.

de Papav. alb. compositus A.

de Papav. erratico, è florum
infus. A.

de Floribus Paralysis.

de Pede cati, f. Hispidula.
sive

de Æluropo simplex: fit ex in-
fusione summitatum.

de Æluropo compositus, 9.

Flor. Pæoniæ.

de Pilosella: ex infusione sum-
mitatum floridarum.

de succo Plantaginis.

de Pomis è succo.

de Portulaca Mesuæ.

de Prassio Mesuæ.

de duabus radicibus.

de quinque rad.

Refectivus Cord.

Ribium è succo.

O o Syru:

Syrupus Rosatus regius, seu Julepus ro-
fatus.

de Rosis siccis

de Rubo Idæo

de Scabiosa.

de Scordio è succo

compositus Mer-
curialis, A.

de Scolopendrio Fernelii,
A. C.

de Sempervivo è succo
compositus.

Siliquarum

de Stœchade simplex, A.
compositus, A.
Fernelii, A.

de Symphyto Fernelii, A.

de Testudinibus, 10.

Flor. Tunicæ.

de succo veronica.

Violatus simplex

compositus Mesuæ
regius, s. Julepus
violatus.

ex succo.

Hujus loci sunt & Syrupi melliti,
mella vulgò dicti.

Ut

Mel Anthosatum

Emblicorum, id est, mel in
quo Emblici myrob.
conditi, vel deco-
ctum Emblicorum in-
spissatum.

Mel Menthæ, è succo & mell.
ana,

Mercuriale è succo &
mell. $\frac{1}{2}$.

Rosarum simplex, ex in-
fusione triplici &
mell. $\frac{1}{5}$.

Rosatum citratum

Mesuæ, ex gem-
mis & mell.

Violatum simplex ex in-
fusione triplici &
mell. $\frac{1}{5}$.

Sic Oxymel simplex

compositum

diureticum

scylliticum simpl.
compos.

Huc pertinent & Rob composita.

Rob de Agresta

de Berberis

de Cornis

de Ribib.

ex succ. & sacchar.
 $\frac{1}{2}$.

Diameron simplex, ex succ. $\frac{1}{2}$ &
mell.

compositum

usitatum Gal.

Nucum ex succo cort. vlrud.

jugl. & mell. $\frac{1}{2}$.

Syrup. purgantes usitatiores.

Syrupus Flor. Acaciæ Aug.

de Carthamo, A.

de Cichoreo cum Rhabarba-
ro, A. C.

Diaferreos, Andern. A.

de Epithymo.

de Fumaria comp. s. major.

Syrup.

Syrupus Hellebor. minor. Querc. i.

Helleborat. major.

Holagogus, 2.

Flor. persicorum.

de polypodio, A. C.

de pomis regis Sabor, A.

cum sena Querc.

de Rhabarbaro solutivus.

Aug.

Rosatus solutivus simplex f.

Mucharum, è Damascenarum 3. infus.

Rosatus laxativus compositus, f. Helleboratus.

Rosatus compositus, sine Helleboro.

de Senna.

Violatus solutivus, f. infusio-
nis.

Vomitivus, 3.

Mel Rosatum laxativum, } ex infus.

Violatum laxati- } & mell.

vum. } 1/2.

Oxymel Helleboratum Gesner. A. C.

Oxysaccharum vomitivum, 4.

1. Syrupus Anisi, cum Vino:

Quercetani.

Rx. Anisi conquassati, ʒiv. maceretur in vini generosi, lb. ij. per tres dies, coletur: Colaturæ adde Sacchari, lb. ij. & coque ad syrupum.

N. Eodem modo concinnari possunt Syrupi, & ex aliis seminibus, veluti ex semine feniculi, pœonia, ex bacis lanri, juniperi, & simil.

2. Syrupus antiepilepticus:

Quercetani.

Rx. Rad. pœoniæ.

Visci querni, ana ʒß.

Cinamomi opt. ʒij.

Flor. calendulæ.

Lilii convall.

Tiliæ.

Lavendul. à p. i.

Rosar. rubr. p. ij.

F. Extractio cum spiritu Juniperi, vel

Vi, ad eminentiam digit. 4.

Decantetur.

Rx. Tincturæ ʒx.

Sacchari candi pulverisat. ʒiij.

aut iv.

M. & accendantur, flagrentque continuo agitando, donec syrupus satis coctus, aut plus minusve fortis videatur. Tum enim extinguendum erit incensium.

Vires. *Præstantissimus est Syrupus, tam præcautioni, quam curationi inserviens.*

Dosis cochlear. f.

3. Syrupus de Artemesia Fernelii.

Rx. Summit. Artemis. M. ij.

Rad. Iridis.

Helenii.

Rubiæ.

Pœoniæ.

Levistici.

Fœniculi à ʒß.

Herb. Pulegii.

Origani.

Calaminth.

Neper.

Melissophyll.

Sabinæ.

Oo 2

Safm

Sampfuchi
 Hyssopi
 Prassii
 Chamædryos.
 Chamæpityos
 Parthenii
 Betonicæ à M. j.
 Sem. Anis.
 Petrosel.
 Fœnicul.
 Ocymi.
 Dauci
 Rutæ
 Nigellæ ana ℥iij.

Contusa macerentur horis 24. in hydromelit. lb. viij. Coquantur ad lb. v. cum sacchari. lb. v. F. Syrup. qui condatur Cinam. ℥i. Spic. ℥iij.

Vires. *Insignium est virum in uteri affectibus, à viscida mucilagine subortis, promouet menstrua, uterumq; repurgat.*

4. Syrupus Cardiacus. F. F.

R. Vini albi generosi. lb. ij.

Aqu. Rosar. ℥iij.

Cinamom. ℥b.

Zinziber.

Caryophyll. ana ℥iij.

Ligentur omnia in petita, addaturque Sacchar. ℥iv.

Coque ad consistentiam syrupi postea adde

Ambr. gryf. gran. iij.

Mosch. g. i. in syndone.

Vires. *Conuenit in lipothymia, aliisque cordis affectibus.*

N. *Præstat sola infusione, vel in MB parare.*

5. Syrupus de Erysimio Lobelii.

R. Erysim. totius recent. M. vi.

Rad. Enul.

Tussilag. succo adhuc prægnantium.

Glycyrrhiz. ana ℥ij.

Herb. Borrag.

Cichor.

Capill. q. ana Miß.

Flor. Cordial.

Anthos.

Stæchad. vel Betonic. ana

M. b.

Sem. Anis. ℥vi.

Passular. mundatar. ℥ij.

Incisis & contusis f. omnium decoctio f. a. in f. q. aquæ hordei, hydromelitis & ℥vi. succi Erysimi, ad lb. ij. vel iij. exprime, inque Colatura dissolve sacchar. q. f. f. syrupus.

Vires. *Efficacissimus est ad mucilaginem pulmonum incidendam, & educendam, adeoque ut beneficio ejus iuuentulas decennio rancidine laborantes, se percuravisse, testetur Authôr libr. obseruat.*

6. Syrupus Antihæcticus Rivierii

Med. Regii.

R. Testud. lacustr. aut fluuiat. in frusta dissect. lb. ij. cancror. fluuiat. vivorum contract. lb. b. sem. quat. frig. major. ℥iv.

Limacum per medium sectorum

Mij.

Succi veron. mar.

Melon. ana lbj.

Vinialb. lbvi.

Sacci

Succi nicot. lb. ii.

Uvarum Corinth.

Passul. ana q. s.

Ponantur omnia in magno mactracio benè obturato & sinantur digeri per 2. postea destillantur ex cineribus, & ex liquore destillato & sacch. cand. lb. iv. F. syrupus Cap. 3j. pro dosi paulò ante pastum bis aut ter in die, adde usus tempore

Lactis sulph.

Perlarum an. gurt. viij. M. & exhibe

Lac perlarum fit terendo eas super marmor in Alcoòl, irrorando aq. ros. paulatim, deinde iterum terendo in mortat. marm. cum succo limonum statim perlæ dissolventur, filtra, colatura serveretur.

7. Syrupus Nicotiana, s. de Peto simplex Querc.

℞. Succ. Peti lb. iv.

Hydromelit. simpl. lb. i.

Oxymelit. simpl. 3iv.

Omnibus simul mixtis, fiat digestio in MB. 2. vel 3, ut defecerit; hinc decanta, ac digere iterum ut supra, donec materia ab omni fœculentia depurata fuerit, adde postea sacchari lb. ij. & coque in syrupum.

N. Succus Peti opus habet per-exquisita & ingeniosa digestionē, qua vis vomitiva, ac dejectiva corrigitur, atque in syrupum abut præstantissimum, adversus omnes affectus asthmaticos, in quibus pulmonum bronchia pituita crassa ac viscosa adeò infarciuntur, ut

intercepta respiratione suffocationis periculum immineat, in quo casu syrupus hie ritè preparatus & administratus mirā præstat. Cerebrum insuper a catarrhis, sive fluxionibus serosis & frigidis liberat, simulque per inferiora educit.

Dosis cochlear, s. ubi tamen à principio summa opus est circumspeditione, postea vero dosi augenda erit.

8. Syrupus de Nicotiana compositus Quercetani.

℞. Succi Peti (Nicotianæ) depurati (ut supra) lb. iij.

Hydromelitis simpl. lb. i.

In quibus macera per 2. vel 3. MB.

Fol. Hyssop.

Polytrich.

Adiant.

Flor. Tussilag. in.

Stachad.

Violar.

Bugloss. ana p. ij.

Sem. Bombac.

Urtic.

Card. bened. à 3i.

Follicul. senæ 3iij.

Agaric. rec. trochisc. 3i.

Cinamom.

Macis.

Caryophyllor. à 3i.

Dein fortiter exprimantur, digerantur denuo ad perfectam fecum depurationem. Colaturæ lb. iij. adde tantundem sacchari, coquantur in syrupum.

Vires. Ad anhelosos & asthmaticos

Oo 3

alias

aliosque affectus omnes pulmonum à frigidis & crassis humoribus subortos, qui pulmonum bronchiis inhærentes, vel tussim antiquam, vel ipsam dyspnœam pariant, excellentissimum est remedium, alvum leniter solvendo.

Dosis ʒiʒ. vel ʒij. ad summum.

9. Syrupus de pede cati compositus.

℞. Dactylor. mundat.

Jujubar.

Sebesten.

Ficuum recent.

Passul. major. enucl. à ʒi v.

Ungul. caballin. c. toto.

Pulmonar. maculos. c. flor. à Mij.

Pedis cati.

Ceterach. ana M i.

Glycyrrhiz. ras. ʒi.

F. Decoctio & exinde cum sacchari lb. ij. syrupus perfectè coctus.

Vires. Pectoralis est ac nutritivus, unde his qui phthisi laborant, solamini magno esse poterit.

10. Syrupus de Testudinibus ὁ ἑλεονῶν Resumptivus Renodai.

℞. Carnis testudinum, ʒiv. (abjectis cauda, collo & pedibus.

Hordei mundat. ʒij.

Carnis dactylorum, ʒi.

Passularum damalcenarum.

Glycyrrhiz. rasæ ʒvi.

Sebesten.

Jujub. ana num. xii.

Sem. Bombac.

Melonum.

Cucum.

Citrull. ana ʒʒ.

Sem. Lactul.

Papav. alb. ana ʒij.

Herb. Ungul. caballin.

Pulmonariæ ana M. i.

Flor. Violar.

Nenuphar. à ʒʒ.

F. Decoctio. In colatura clarific. ac lb. iv. adde Sacchar. alb. lb. ij. sacchar. rosati & diatragacanth. frig. ana ʒv. F. syrupus.

Vires. Conferunt his qui à morbo chronico resurgunt, macie confectis, tabidis, phthisicis, & simil.

Syrupi purgantes.

1. Syrupus Helleboratus minor Quercetani.

℞. Fibrarum hellebori nigri. ʒij.

Agaric. rec. trochisch. ʒij.

Fol. sen. mundat. ʒij.

Turbith.

Hermodaetilor. ana ʒi.

Sem. Anisi.

Fœnicul.

Cort. Citri à ʒʒ.

Caryophyll.

Macis.

Cinamom. à ʒij.

Macerentur in Oxymelitis simplicis, Vini malvatici, & aquarum Mellisæ ac Fumariæ ana q. s. vase vitreo clauso, hinc leviter bulliant ac exprimantur. Depuratæ per digestionem colaturæ addantur.

Syrupi de pomis redolentibus solutivi.

de suc-

de succis rosarum pallida-
rum.

Sacchari rosati & violati ana
℥iv. F. Syrupus.

*Vires. Omnibus morbis à materia
tartarea, crassa ac tenace, à phlegmate a-
dusto, bile aut melancholia dependenti-
bus; in capite, thorace, ventriculo, hepa-
te, utero, ipsisque articulis mirum in mo-
dum confert.*

M. Habet & idem Quercetanus Sy-
rupum belleboratum majorem, sed suffi-
cit hunc in Officinis paratum asservare.

2. Syrupus Holagogus; F. F.

℞. Rad. Polypod. querc. rec.

Cappar. ana ℥i.

Fol. Scolopendr.

Ceterach.

Meliss.

Betonic.

Rutæ murar. à M. r.

Flor. Trium cordial.

Cuscut. ana M. ℞.

Sem. Limon.

Fenic.

Anis. à ℥ij.

Carthami contus. ℥i.

F. Decoctio in f. q. aquæ, ad rema-
nentiam quantitatis, cui species infra
scriptæ infundi queant. Decoctio hæc
ita stet horis 24. tum fiat colatura, & in
hac infundantur.

Fol. Senn. mundat. ℥iv.

Agaric. albiss. ℥ij.

Hermodactill. alb. ℥vi.

Rad. Hellebor. nigr. in aceto
preparat. ℥i.

Epithimi

Zinzib. alb. ana ℥ij.

Caryophyllor. ℥ij.

Macis ℥j.

Bulliant parum & stent in infusio-
ne horis 24. hinc exprimantur.

℞. Expressionem integram (ad ℞.
j. & ℥ij.

Succi rosar. incarnatar. ℥ix.

Sacchari albiss. ℞. iij.

Coque ad ℞. iv. circiter.

*Vires. Convenit omnibus humoribus
expurgandis, præcipuè atra bili, ac exin-
de morbis oriundis.*

3. Syrupus Vomitivus.

℞. Aqu. Vomitoria s. benedictæ.

(sive illa ex croco sit, sive ex
vitro ℥ii,) ℥vi.

Aq. Rosar. fragrant. ℥i℞.

Pulv. cinamom. ℥ij.

Digerantur vase clauso horis 24.
postea cola. In colatura dissolve Sac-
chari ℥viij. coque ad consistentiam sy-
rupi.

Dosis à ℥j. ad ℥ij.

4. Oxyaccharum vomitivum.

℞. Vitri. ℥ii. pulver. ℥℞.

Acet. vini albiss. ℥viij.

Infundantur in MB. l. Δ. per ho-
ras xv. colaturæ adde sacchari albiss.
℥iv. reduc. in patina vitrea ad consi-
stentiam.

*Vires. Uti eo possumus pro vomito-
rio adversus febres continuas, pestilen-
tes & intermittentes, paulo ante paro-
xysmum: item contra venena, Ex
ambæ-*

anthemata, antequam scilicet prodierint.

Dosis à ʒij. ad vj. Sala.

N. Loco Vitri & in his compositionibus sumere quoque licet crocum metallorum, vel etiam flores & ij.

CAPUT LXXXV.

De Tincturis.

Tinctura, tum liquidioris, tum solidioris consistentiæ in usu sunt.

Liquidioris consistentiæ Tinctura nihil aliud sunt, quam extractiones sine abstracto menstruo.

Solidiores consistentiæ Tincturae sunt pulveres, sine combustione ex liquidioribus tincturis abstracto menstruo residui. Et hoc juris sola mineralia sibi vindicare videntur.

Modus fiendi fit ad modum, quem de Extractis dedimus. Conveniunt nimirum Tincturae cum Extractis in plurimis, adeoque non raro confunduntur, quam confusionem uti in aliis, ita & hocce in loco removere, non absque commodo foret. Hinc fiunt Tincturae.

I. Ex fructibus.

℞. Rob. affunde V, ac extrahe.

Vel ℞. Baccas seu fructus exiccatoꝝ, affunde V convenientem stillatitiam, ac extrahe, &c.

N. Si Tinctura lente inspissetur, Extractum dicitur. *Quercet. P. R. cap. 26.* Sic fiunt Tinctura cerasorum, baccarum sambuci, ebuli, & simil.

II. Ex floribus.

℞. Flores siccos, infunde in V appropriata, (propria) vel fontana te-

pida, additis guttulis aliquot spirit. ̄i, vel Sulphuris.

Famosiores Tincturae sunt.

E Mineralibus.

Tincturae

○
☾
☿
♄
♃
♂
♁
Sul.

vide libro tertio.

Smaragdi.

Ex vegetabilibus, & maxime ex floribus.

Tinctura Alkekengi è baccis.

Essentia croci, vid. l. 4.

Cerasorum nigrorum.

Fragorum.

Hypericonis, vide c. 57.

Flor. Pæoniæ.

Rhæados.

Rosarum.

Violarum.

Granorum Sambuci.

Ebuli.

Ex animalibus.

Tinctura fellistauri; vide libr. 5.

I. Tinct.

1. *Tinctura Parac. diaphoretica*
correcta à S. Closs.

2. Zedoar.

Angelic.

Calam. arom.

Galang.

Macis.

Zinzib.

Cinnam.

Gran. parad.

Piper. nigr.

Caryoph.

Sassafr.

Sassaapar.

Ulm. an. ʒj.

Aloës.

Mastich.

Myrrh.

Thur.

Camph. an. ʒß.

Mosch. ʒj. infund. in

V &

Aq. ros. moschat. an. q. s. ut superemineant digitos 4. Adde ad maturandam putrefactionem.

— Sulph. per camp. ʒß.

Salis juniperini ʒij.

Stent in loco calido per 14. &.

Dos. ʒj. in formâ qualibet. Eliquat glaciata, resinosa diffundit, fuliginosa efflat, balsamicâ suâ vi putredinem arceat, & soperiferis morbis auxiliatur.

2. *Tinctura Cathartica S. Closs.*

Arch. Mediomatricum.

ʒ Scammon. ʒj.

Turbith.

Agar.

Hermadaet.

Rhabarb. an. ʒij.

Pulverisata indantur lagenæ vitreæ addendo.

V per 40. & circulati, ut acrimoniâ deponat (vel ejus loco aq. cinnam. alb. i. exstillat.) ʒß.

Infundantur per 8. & in ciner. & agitentur bis aut ter singulis diebus, tinctus — aureo colore depleatur serveturque. Ejus cochl. j. M. cum ʒß. syr. ros. pallid. viol. aut limon. accefacti cum — Oli.

Benignè admodum corpus à saburra phlegmaticâ aut serosâ vindicat & repurgat.

CAPVT LXXXVI.

De Trochiscis.

Materia Trochiscorum sunt omnis generis Medicamenta, quæ pulverisata, liquore conveniente, (viscoso,) suscipi, compilari ac impastari queunt.

Parantur autem in Officinis Tro-

chisci, partim ut pulveres viscoso aliquo liquore compacti ab injuria aeris eò melius asserventur, exigenteque necessitate adhiberi queant, partim quoque, ut per se applicentur, e. gr. Trochisci bechici, sublinguales,

Pp

pro-

prophylactici, trochisci pro fumo, & simil.

Modus fiendi.

℞. Medicamenta subtiliter pulverifata, redige in massam cum liquore conveniente mucilaginoso, e.g. cum mucilage aliqua (Tragac.) cum succo, syrupo, & simil.

Ex massa impastata formantur trochisci, seu parvi pastilli, (quibus character pro libitu imprimitur,) vel fiunt inde bacilli oblongi.

Trochisci usitatiores alternantes.

Trochisci.

de Absinthio, Mesuæ, *August.*

de Agno casto, Rhafis, *Aug.*

Alexiterii f. contra pestem, 1.

Aliptæ moschatæ, cum ambra ac moscho, A.

Aliptæ moschatæ, sine ambra & moscho.

de Alkekengi, cum opio, A.
sine opio.

de Aniso, Mesuæ, A.

Bechici albi, cum moscho, A.
sine moscho.

nigri,
rubri, sive è bolo.

de Benzoin.

de Berberis.

de Camphora, Mesuæ.

N. Renodans alios è Myrepsō
substituit.

de Cappariibus, Mesuæ.

de Charabe, f. succino, Mesuæ.

de Corallio, Nicol.

Diacoralliu, Gal.

Cypheos Damocratis

de Eupatorio, Mesuæ

pro fumo vulgares, 2.

optimi, f. cum moscho, 3.

de Gallia moschata

Gordonii

Hedychroi

de Violis, Nicol.

de Lacca, Mesuæ

Moschardini, 4.

de Myrrha Rhaf.

Pectorales. Baculi pectorales, 5.

Prophylactici cum mithridatio, 6.

Ramich Mesuæ

Diarrhodon, Nicol.

de Santalis, Mesuæ

Diaspermaton Gal.

de Spodio

de Terra sigillata, Mes.

de Vipera, Gal.

de Xyloaloe, Mesuæ.

Huc referendi sunt. 1. Trochisci ophthalmici, quibus imponitur nomen Sief. 2. Candela pro fumo. 3. Sapo odoratus, ac 4. Roma Ambra, de quibus partim suis locis, partim hoc loco.

Collyria sunt usitata.

Sief. album cum sine & Opio

album Galeni.

citrinum Mesuæ

de plumbo Mesuæ

de rosis siccis

de thure Rhafis.

Vide

Di-

spen-

satori.

Tro-

Trochisci purgantes.

Trochisci de Agarico, Mesuæ.

Agaricus Trochiscatus,

Alhandal. f. de Colocynthi-

de,

de Rhabarbaro.

de Violis solutivi.

1. Trochisci Alexiterii, Renodæi.

℞. Rad. Zedoariæ.

Gentianæ.

Tormentillæ.

Rad. Ireos flor. à ʒj.

Angelic. ʒij.

Cinamomi.

Caryophyllor.

Macis, ana ʒß.

Zinziber ʒj.

Coriandri præp.

Rosar. ana ʒj.

Cort. citri. succ. ʒij.

F. Pulvis subtilissimus, & cum tucci Glycyrrhizæ ʒvi. f. pasta mollis, de qua formentur trochisci, vel potius bacilli oblongi.

Vires. Pestis præcavenda multum conferunt, si in ore detineantur, vel & in ventriculum demittantur.

2. Trochisci pro fumo vulgari.

F. F.

℞. Santal. citrin.

Rosar. rubr.

Caryophyll.

Cinam. à ʒvi.

Benzoin ʒiß.

Stryac. calamit ʒi.

Sacchar. pulv. ʒxi i.

Cum mucilag. Tragac. in ∇ ros. fact.

f. trochisci.

3. Trochisci pro fumo cum moscho

F. F.

℞. Benzoia. ℞. i.

Stryac. calamit. ʒviij.

Rosar. rubr. ʒi.

Lignialoës. ʒß.

Caryophyll.

Santal. citr. à ʒij.

Sacchar. alb. ʒviij.

Mosch. ʒi.

Zibett. ana ʒß.

M. & cum infusione tragacanth. in ∇ rosar. formentur trochisci.

4. Trochisci moschardini alias confectio

moschardina: corpus sine anima.

℞. Moschi ex ∇ rosar. dissolut. ʒj.

Saccharialbiss. ʒvi.

Amyli. ʒv.

Atterantur pistillo, & cum mucilage tragacanth. (ex ʒi.) in ∇ rosar. facta., f. grana instar. hordeaceorum, quæ exiccantur in umbra, pro usu;

N. Sunt qui sanguinem Draconis ʒj. addunt.

Vires. Graveolentiam oris emendant, si pastillus unus ac alter in ore detineantur.

5. Baculi pectorales.

F. F.

℞. Spec. Diatragac. frigid.

Diatreos simpl. ana ʒi.

Rad. Liquirit ʒß.

Pp 2

Sac-

Sacchar. albiss. ℥vi.

Cum mucilagin. Tragacanth. F.

Baculi

Vires. Tussim leniunt, asperitatem demulcent.

6. Trochisci Prophylactici cum
Mithridatio,
F. F.

℞. Boli armen. in succo citri infusi &
exiccati. ℥i.

Corall. rubr. præpar. ℥ij.

Rasur. c. c. ℥i.

Succin. alb. ℥ij.

Rad. Tormentill.

Pimpinell.

Imperator.

Angelic.

Zedoar. à ℥ij.

Cinamom. ℥ij.

Croc. ℥j.

F. Pulvis subtilissimus.

℞. hujus pulveris. ℥ij.

Mithridatii opt. ℥i.

⊙ Cinamom.

Angelic. ana gutt. i.

Sacchar. albiss. ℥ij.

Cum infusione G. Tragac. in ∇
angelicæ facta, F. Trochisci.

Vires. Frequenter hic in usu sunt ad pe-
stem præcavendam.

Hujus quoque loci sunt, candelæ
& baculi fumales, quæ fiunt ex pul-

veribus odoriferis, impastatis mucila-
gini Tragacanth. Styrac. & simil. uti
trochisci pro fumo, à quo non disse-
runt, quoad modum fiendi.

Sic sunt.

7. Candela fumales. F. F.

℞. Benzoin. ℥xvi.

Lign. Aloës.

Ahad.

Santal. citrin.

Ladan. ana ℥iv.

Oliban.

Mastich.

Caryophyll. à ℥iij.

Sacchar. alb. lb. ij.

Carbon. tilia. lb. iv. β.

F. Omnium pulvis subtilissimus
& cum mucilagine tragacanth. in ∇
rosar. majoran. & cort. citri facta, for-
mentur candelæ, addendo parum sty-
racis liquid. & terebinth.

8. Massa seu baculi pro
fornace.

℞. Benzoin.

Storac. cal. à ℥i.

Ladan. opt. ℥vi.

Balsam. indic. ℥iij.

Lign. aloës ℥iij. (præstat. Extract.

Mosch. Alexandr.

Zibett. ana ℥j. M. f. a. f. Massa.

Formenturque instar ceræ Hispa-
nicæ bacilli fornaci affricandi.

De Balsamis inunctoriis, Linimentis,
Vnguentis.

Balsami Inunctorii, Linimenta & Unguenta, vix præparatione, & ferè, non nisi consistentia, inter se differunt, quam illi liquidiores habent instar mellis; ista paulò duriorem, ac vix fluidam; hæc crassiorem adhuc, minusque fluidam: ubi tamen notari velim, in praxi plerumque Linimenti ac Unguenti nomina confundi.

Materiæ ex quibus parantur, sunt olea, butyrum, adipēs, sæva, medullæ, resinæ, mucilagines, succi, ut & res aliæ, quæ aptæ sunt dictis materiis, vel sub forma pulverum immisceri, vel iniisdem colligari, &c.

N. 1. } *Zj. vel ij. in linimentis*
Sumitur ad } *Zj. vel iß. in balsamis.*
Olei Zj. pin- } *Zjß. vel Zß. in unguentis*
guedinis ferè } *addita insuper pulveris,*
Zj. &c.

M. 2. Balsami ob molliusculam consistentiam Cera carent. Linimenta vel nihil, vel parum admittunt, (scil. ad Olei Zj. Cera Zj.) Unguenta vero ut consistentiam requirunt crassiorem, ita & materiam volunt puriorem, adeoque Ceram copiosiore, & nonnunquam gummatâ.

Modus parandi.

Recipiuntur Olea, hinc adduntur quæ crassiorem inducunt consistentiam, idque vel sola mixtura, vel si

opus sit liquefactione interveniente.

N. 1. Fieri potest quoque linimentum unguentumvè ex pulveribus, melle oxymelite, syrupo, & simili susceptis, in forma scil. Electuarii.

N. 2. Succiquei si addendi sint, coquendi illi sunt cum oleis ad humiditatis illius aqueæ consumptionem, cujus indicium est, si instilletur guttula super prunas, sine strepitu.

Balsami usitiores sunt.

Balsamus Balsaminæ, 1.

Hispaniæ, 2.

Hyperici magistralis, 3.

Mirabilis s. compos. 4.

Uterinus, 5.

Vulnerarius, 6. 7. 8. 9. 10.

Linimenta usitatiora sunt.

Linimentum Hi, id est, Balsamus

Hi, dictus, 11.

Linimentum de Amianto, 12.

dentrificium, 13.

Errhinum, 14.

Vnguenta usitatiora.

Vnguentum.

Agrippæ Mesuæ, Aug.

Ægyptiacum, A.

Alabastrinum, A.

Album Avicenn.

Album Camphoratum, A.

Unguentum.

Altheæ simplex, Dialthæa, 1.
 compositum, A.
 Anodinum, Cord.
 Anodinum, 15.
 Anodin Podagricum, Croll. 16.
 Apostolicum Avicenn. A.
 Aregon. A.
 Arthanitæ majus,
 minus.
 Aureum, Mesuæ.
 Basilicum.
 de Bdellio.
 Butyraceum nervale, 17.
 de Calce.
 ad Carunculas penis.
 de Cerussa Avicen.
 Citrinum.
 Clysmaticum.
 Comitissæ.
 Cardiacum, 18.
 Cordiale, 19. 20.
 de Cyclamine.
 de Cynoglossa.
 Fuscum.
 de Clycyrrhiza.
 ad Hæmorrhoides.
 Noribergense.
 Infrigidans Galeni.
 Jovis, f. de Verbena.
 de Lithargyrio.
 Martiatum magnum,
 parvum.
 Mercuriale.
 de Minio camphoratum.
 Narcoticum, 21.
 Nervinum,

Unguentum.

de Nicotiana.
 Nihili ad Oculos.
 Ophthalmicum, 22.
 Pectorale.
 Pediculorum.
 ad Perniones, 23.
 Pomatum.
 Diapompholygos f. Nihili,
 Nicolai, A.
 Populeum.
 Potabile.
 Resumptivum.
 Rosatum.
 Rubeum camphoratum.
 ad Scabiem, 24.
 Spleneticum,
 de Succ. Arantii.
 Sympatheticum, 26.
 Terebinthina, 27.
 ad Tineam.
 de Tutia.
 ad Vermes.
 Violatum.
 Viride Reginz.
 Viride potabile. Butyrum Viri-
 de, 28.
 1. Balsamus balsamina sic fit.
 2. Fol. florum & fructuum balsamin.
 ana ʒiv.
 Rad. consolid. major.
 Ophioglossan. ʒij.
 Aristol. rot.
 Zedoar. an. ʒß.
 Visci in folliculis Ulmi reperti
 ʒiß.

Succi

Succi astacor.

Fol. pervinc. &

Sanic. an. ℥j.

Infund. in Ol. oliv. q. f. & insolentur.

Colato oleo ad libr. sing. adde Ol. ver-
nic. liquid. ℥j.

*Hic Balsamus inservit nervosis parti-
bus vulneratis aut ambustis, dolorem he-
morrhoidum sedat & mammillarum in-
flammaturans, addito camph. tantillo, ci-
saricibus delendis prodest cum ol. ovo-
rum mixtus.*

Balsamus Hispania.

℞. Olei vetustiss. ℥iv.

Hyperic. ℥ij.

Terebinth. puræ, ℥viij.

Frumenti integr. ℥ib.

Rad. card. bened.

Valerian. a ℥i.

Thur. pulverisat. ℥ij.

Radices & herba crasso modo
contusa, ponantur in olla, infundan-
turque in Vini albi generosi, q. f. ut o-
mnia in Vino mergant, per & (2.)
hinc adjiciantur oleum & frumentum,
coquanturque omnia ad Vini consum-
ptionem. Mox facta forti expressio-
ne, addatur Terebinth. & Thus, & ite-
rum parum ebulliant, ferventurque in
vase vitreo.

Vires. Sanat vulnera partium etiam
nervosarum spatio, ut ajunt, viginti qua-
tuor horarum.

Modus utendi talis est.

Abluto prius vulnere Vino albo
frigido, statim inungitur totum vul-
nus oleo prædicto calente: quod si

hoc commodè fieri nequeat, per sy-
phonem intra vulnus, tanquam per cly-
sterem immittitur & confertim labra
vulneris ad mutuum contactum addu-
cuntur ligatura, aut futura, aut glutine:
deinde partes circumstantes prædicto
oleo similiter inunguntur. Supra ve-
ro vulneris labia jam reducta, linteum
imponitur, prædicto oleo madens, &
supra hoc aliud Vino nigro expressum,
mox alia lintea sicca: deinde fascia
superligatur. Vide Hieronimum Fa-
bricium ab Aquapend. secundo Opere
Chyrurg. part. 2. c. 7.

℞. Balsamus Hyperic. Magistralis.

*f. oleum hyperici magi-
strale.*

℥ Ol. oliv. ℔. r.

Vinirubr. odor. ℔b.

Lumbricorum sale communi asper-
sorum ℥iv.

Terebinth. Vener. ℥ij.

Granorum matur. Matrisylv. se-
ptembri collect. Mij.

Florum hyperic. p. iv.

Insolentur per æquinoctium æ-
stivum aut paulo post, colato liquo-
ri adde spiritus thereb. in quo salis Hni
quantum capere poterit solutum sit
℥ij.

Ol. Myrrh. ℥j. M.

Per se vulnera curat.

℞. Balsamus mirabilis sive

Compositus.

℥ Balsam. Momordi seu Balsamin. se-
quent. ℥iv.

Sulph. per

Sulph. per ω um thereb. extract. $\text{℥} \text{ss}$.

Ol. hyperic. magistral. seq. $\text{℥} \text{ij}$.

Tinctur. $\text{O} \text{tis}$.

Magnetis alb. pulveris. ana $\text{℥} \text{ss}$.

Digerantur per mensem. Instillentur guttulæ aliquot in vulnus calidè, appposito desuper Empl. diaSulph. Rulandi.

Ex communicatione S. Closs.

5 Balsamus Uterinus.

R. Galban puriss.

Serapin. elect. ana $\text{℥} \text{vi}$.

Al. fœtid. $\text{℥} \text{ss}$.

Ammoniac. $\text{℥} \text{i}$.

Dissolve in oleo destillato Juniper. & Terebinth. addendo olei Lauri stillat. $\text{℥} \text{ss}$ succin. $\text{℥} \text{ss}$ M.

Vires. Uteri suffocationes insigniter sistit, menstrua ciet, si umbilico inungatur, vel abdomen deorsum eo confricetur.

6. Balsamum vulnerarium,

Crollii.

R. Flor. Hyperic. lb. i .

N. Colligantur cum Solis ortu, balsamico tempore, in exaltatione; videlicet circa Festum Johannis ante novilunium.

Flor. Cheiri.

Centaur. min.

Chelidonix.

Prunell.

Chamomill.

Rad. Aristoloch.

Consolidæ mediæ vel majoris, à

$\text{℥} \text{ss}$.

Rosar. rubr. $\text{℥} \text{ii} \text{ss}$.

Mumiæ transmar.

Myrrh.

Thuris à $\text{℥} \text{ss}$.

Mastich. $\text{℥} \text{i}$.

Storac. liquid. $\text{℥} \text{ij}$.

Incisis incidendis & tritis terendis F. infusio in ∇ boni, lb. viij . & aliquot, hinc decantetur cum forti expressione. Spiritui huic tincto, (nisi velis majoris efficacix ergo reiterare infusionem florum,) addatur olei olivarum recentis, quod supra ramenta pinguia abietina per octo dies, in digestionem stetit. lb. v . Terebinth. claræ commun. & resinæ laricæ lotæ in ∇ hyperic. $\text{lb} \text{ss}$.

Iterum per $\text{℥} \text{14}$. omnia digerantur: ultimo abstrahatur ∇ in MB. tunc balsamum manebit in fundo rubeum, instat. sanguinis.

Vires. Balsamum est ad vulnera & punctiones sanandas efficacissimum. Confert & in omnibus tumoribus, inflammationibus, contractis & contusis membris, rupturis ossibus.

Ufus idem qui præcedentis esse potest.

7. Balsamus vulnerarius.

R. Galbani.

Ammoniac.

Bdell. à $\text{℥} \text{ss}$.

Macerentur in ℥ per $\text{℥} \text{3}$. hinc colentur & inspissentur ad consistentiam mellis.

Postea.

℥ . Myrrh. rubr.

Mastich.

Mastich. el. à ʒß.

Oliban. ʒj.

Pulverisata solve coquendo igne lento in Ol. Olivar. lb. i. oleum sc. per vices affundendo, semperque agitando, donec posteriora hæc bene fuerint eliquata.

Tandem gummata illa priora inspissata (uti dictum,) admisce simili modo agitando, & dein recens oleum olivarum per vices affundendo, donec & altera quoque lb. olei adjecta fuerit, & Balsamus aliquid flavedinis contraxerit.

Vulnera recens punctim & casim facta, citissimè curat.

Usus idem est qui precedentium.

N. Fortior erit in mundificatione vulneris, si arginis ʒj. addideris, & per mensem insola veris, qua ratione feces subsidentes rejici queunt. Hartm. in praxi.

8. *Alius Balsamus Vulnerarius.*

℞. Ol. Olivar. ʒi v.

Therebinthin. ʒvi.

Mastich. ʒv.

Thur. ʒj.

Myrrh. ʒvi.

Galban. ʒj.

Ærugin. ʒiij.

Camphor. ʒj.

Acet. opt. ʒiijß.

Sp. vini ʒß.

Coq. ad consumptionem aceti. Colatura fervetur pro usu.

9. *Balsamus Vulnerarius Mentesium.*

℞. Ol. oliv.

Sem. lini purif. an. lbß.

Laurini ʒj.

♂ Baccar. junip. still. ʒß.

Garyophill. ʒj.

Aloës succotr. ʒij.

Thererb. Venet. ʒij.

Virid. æris ʒiij.

⊖ alb. ʒiijß.

Pulverisanda & pulveriscentur & coquantur simul Δ lento dum virorem acquirat oleum. F. Bals.

Lavetur vulnus recens sive casim, sive globulo sclopetico infictum vino repente, deinde Balsamus ex tomento lineo, quantum fieri potest calidè instilletur & Empl. stictico Croll. obtegatur pars vulnerata. Brevi admodum tempore curat, symptomatica vulnerum, imprimis vero Synoviam arcet, morsuum venenatorum malitiam corrigit. Ex communicatione S. Closs.

10. *Balsamus vulnerarius Samaritanus.*

℞. Ol. olivarum, vel hyperic.

Vinialb generos. an.

Coquantur ad ignem ad consumptionem vini.

Vires. Insignis est ad vulnera recentia mundificanda, & consolidanda.

11. *Linimentum de H. Balsamus.*

H.

Solve Sal H in X, ut optimè eo imprægnetur, hinc abstrahe aliquantulum

tulum ✕, misceque hujus ℥. iij. cum olei rosar. ℥. iv. vi. &c. agitaque ut f. Linimentum.

Vires. *Confert inflammationibus, & ambustis illitum.*

12. *Linimentum Hycompositum, seu Linimentum de amianto.*

℞. Amiant. ℥. iv.

Plumb. ust. ℥. xij.

Tur. preparat. ℥. ii.

Calcinentur, deinde pulverisata macerentur cum ✕, ac quotidie per mensem materia agitur semel: post mensem ebullienda est unius horæ quadrante, ac quiescere sinitur, donec clarifcat.

Deinde.

℞. Aceti hujus clarif.

Ol. Rosar. ana

Misc. optimè, donec f. Linimentum.

Vires. *Miraculosum est, ad tineam puerorum, & ad ulcera tibiæ sananda. Inungitur scil. pueri caput totum ac scabiem. Ulcera vesperi inunguntur. Boethius de Woodt.*

13. *Linimentum dentrificium.*

℞. Rad. Ireos. ℥. i.

Pumic. ℥. ss.

Alum. ust. ℥. ss.

Oc. ℥.

Corallor. rubr. ana ℥. i.

Pulverisata excipiantur melle rosato f. Linimentum.

14. *Linimentum Errhinum.*

℞. Succ. Ireos.

Cyclamin.

Majoran.

Betæ ana ℥. ij.

Ol. Irin. ℥. vi.

Elaterii gran. vij. cum Cera.

f. Linimentum. Crato.

15. *Unguentum C. C. Anodynum Gualbelmi Simonidis.*

℞. C. C. dimidium minutim incusum ponatur in cacabo vino pleno, addito semper vino q. s. bulliant ad vini consumptionem. Deinde abjecta crasso C. C. parte, medulla remanens fricetur manibus, adde postea

Ol. Abroan.

Hyperic.

Aneth.

Scorpion.

Lumbricor. terr.

Nucum.

Laurin.

Ruc.

Spic.

Sabin. an. ℥. ss.

Axung. human. ℥. ss.

Castor. ℥. ii.

Nitri ℥. ss.

Euphorb. ℥. ss.

M. F. l. a. Ungent.

Vires. *Summe prodest in doloribus scorbutico-colicis atrocissimis, tum & in pareticis & podagricis, aliisque terminibus.*

16. *Unguentum Anodynum in Podagra.*

℞. Flor. Rosar. sylvestr. M. x.

Herb.

Herb. & Cortic. exterior. hyoscyam.
recent. M. vi.

Concisa coquantur in Vini men-
sur. s. hinc exprimantur & colentur.
Colaturæ l. Δ ad mellis consistenti-
am inspissatæ, adde pingued. suill. ca-
strat. lb. ij. misce optime ad Δ; tan-
dem ubi parum refrigerata fuerint:
admisce.

Opii in vino solut. ℥i.

Croci pulv. ad magnitudinem
aveillanat. duarum.

Extract. flor. verbasci. ℥℞.

F. Unguentum.

Vires. *Singularis est in sistendo dolore
Podagrico & Nephritico, si calide affectus
illo inungatur.*

N. Ubi dolori nephritico velis applica-
re, opera precium feceris, si manipul. duos
vel tres baccarum Iuniperi ab initio com-
positionis cum hyoscyamo teras & expri-
mas. Croll.

17. Unguentum butyraceum nervale

S. Closs.

℞. Herb. absynth. virid.

Majoran.

Sisymb. r.

Hyssop.

Meliss.

Calamenth.

Orig.

Basilic.

Hyperic.

Rut.

Calend.

Sabin.

Tanac.

Arthemis.

Abrotan.

Flor. Chamæm.

Melil.

Hyperic.

Bethon.

Agrimon.

Centaur. min. a. M. r.

Concidantur minutim & in
magno fictili bull. in butyr. Majal. lb.
vii.

V lb. vi.

Percoctis herbis & consumpto V
exprimantur per torcular, & coquantur
simul cum butyro, admiscendo succi
nicot. depurat. lb. ij.

Therib. lot. lb. i.

Ceræ ℥vi. F. Unguentum.

Vires: *Valer ad omnes affectus frigi-
dos nervorum spasmus Cynicum, praefer-
tim si spondyli cervicis & partes illa quæ
moveni musculos faciei eo inungantur, si
verò totum pectus & cartilago Xypho-
des, tunc sedat singultum, tuncque sic pra-
scribitur.*

℥ Bals. Peruvian. ℥i.

Butyrosi nostri ℥ii.

V ℥i. M. omnia ad exhalationem
usque V.

18. Unguentum Cordiacum, Herkge
span. Salb / F. F.

℞. Herb. Cordiac.

Chamædr.

Malv.

Senecii.

Jaceæ.

Qq 2

Amar.

Amar dulc.

Scabios.

Semperviv.

Morsus gallin. ana. M. ij.

Incidantur & coquantur in lb. viij.
butyri recentis, ad consumptionem a-
quositate, dein exprimantur, & F. Un-
guentum.

Vires. *Frequentis usus est in affectu
infantum, quem Cardiacam appellant.
Fricant eo hypochondria & locum car-
diae, &c.*

19. Unguentum Cordiale, D.D. Ar-
nold. Weickhardi pro Officinis.
F.F.

2. Ung. rosat. Mef. ℥iij.

Ol. Scorpion, simpl. ℥i℥.

Nucist. express.

Stillat. cort. citri.

camphor. ana ℥i.

Antidor. Matthiol.

Theriac. Andr. ana ℥i℥.

Aloës rosat. ℥ij.

M. F. Linimentum.

Vires. *Corroborat Balsamum vite,
sanguinisque viribus subvenit, Cordi in-
unctum.*

20. Unguentum Cordiale Ch.

Ludovic. ab Horning.

2. Ung. ros. opt. loti ℥iij.

Balsam. Apoplect. ℥j.

Ol. nucist. express. ℥j.

Still. cort. citri ℥℥.

Cinam. g. v.

Rosat. g. vi.

M. optimè,

Usus idem qui prioris.

21. Unguentum Narcoti-
cum.

℥ Sacchar. ℥i ℥ij.

Opii ℥j.

Camphor. ℥j.

⊙ express. nucis mosch. ℥j.

nucleorum persic. ℥ij.

ambr.

Mosch. an. ℥j. F. l. a. Un-
guentum.

Vires. *Non tantum tolluntur ardores
& dolores Capitis, sed etiam suaviter
conciliatur somnus, si utraq; tempora eo
illinantur.*

22. Unguentum Ophthalmicum, F. F.
D. D. de Spina.

2. Tut. preparat. ℥℥.

Camphor. ℥j.

Aqu. rosat. alb. ℥i.

Butyr. rec. ℥i.

Virid. æris parum.

M. F. Unguent.

Usus. *Applicatur cilsis, in inflamma-
tione ac rubedine oculorum.*

23. Unguentum ad perniciem mi-
randum.

℥ Cer. flav.

Picis resin.

alb.

Ol. oliv. &

Sem. lin. ana lb℥.

Sævi bovini.

Vervec. liquat. ana quart. liij.

Thur. albis. ℥ij.

Minii ℥i officinarum ℥iv. F. Un-
guentum.

De quo

De quo illinatur calidè cum pluma
pernio ulceratus supposito linteolo mundo.
Non ulceratus v. fortiter petreolo ante Δ
confricetur. Tanta utilitatis est, ut quot
annis plures istius Vng. libras in pauperes
eroget. S. Cloff. Fissuras in super mammil-
larum & Erysipelata leviora sanat pre-
cedente fotu cum V.

24. Unguentum contra scabi-
biem.

Rx. Lithargyr.
Ceruf. alb. an. ℥i℥.
Acet. rofar. ℥i℥.
Ol. rofar. ℥v i.
Sulphuris viv. ℥v i.
Sal. comm. ℥iij.
Butyr. recent. ℥iij.
Terebinth. ℥i℥.

M. f. a.

25. Unguentum somniferum, F. F.

Rx. Opii thebaic. ℥ij.
Croc. ℥℥.
Ung. rofar.
alabastr. ana ℥ij.
Ol. nucist. ℥v. ℥j.
Acet. sambuc. parum.
F. l. a. Unguent.

Vires. Inungetur temporibus, fronti,
& cervici pone aures, ad conciliandum
somnia.

26. Unguentum spleneti-
cum.

Rx. Ol. Amygdal amar. ℥i.
Cappar. ℥ij.
Nucl. persic. express. ℥℥.
Succ. Rad. Bryon.

Cyclamyn.

Cicut. ana ℥ij.

Gumm. Ammoniac. in ✱ dissolut.

Bdell. ana ℥i℥.

Pulv. Cort. cappar.

Tamarisc. à ℥℥.

Fraxin. ℥v i.

Ceterach.

Summ. centaur. min. à ℥℥.

Sem. Cymin. aceto macerati, &
iterum exiccati. ℥ij.

Ceræ novæ, q. s. F. Unguent.

Vires. Vim habet calefacientem, emol-
lientem, resolventem, aperientem, robo-
rantem.

N. Penetrandi gratia potest addi ℥j.
vel ij. Ol. spic. vel Ol. stillatit. absynth.
℥i℥.

27. Unguentum Sympatheticum,
Crollii.

Rx. Adip. Verris aprugni.

Ursin. ana ℥i v.

Bulliant per horam dimidiam, in Vi-
no rubro, fundanturque super aquam
frigidam, colligaturque pinguedo su-
pernatans.

Dein.

Rx. Lumbricorum lotorum pulve-
ris.

Cerebri aprugni

Santal. rubr.

Mumiæ

Hæmatit. ana ℥i.

Uscæ è cranio hominis interempti,
℥i.

Qq 3

F. l. a.

F.l.a. Unguentum cum pinguedinibus illis.

N. 1. *Animalia illa quò seniores, & adeps melior.*

N. 2. *Usnea colligenda ¶ crescens, & in bona domo existente, & scilicet si fieri possit non ¶, aut Hi. Parandumque Unguentum ¶ in libra existente.*

N. 3. *Sunt qui omittunt Usneam & Mumiam.*

Usus.

Hoc Unguento sanantur omnia Vulnèra, (modo nervi, arteriæ, &c. non sint læsa.) Ungatur telum, quo vulnus inflictum, quoridie semel, si necessitas urgeat, & vulnus sit ingens, alioquin secundo vel tertio die inunxisse sufficit.

N. 1. *Telum servetur in linteolo mundo, & loca non nimis calido, ne damnum inferatur Patienti. Cavendum etiam ne pulvis super telum cadat, nec ventus afflet in loco frigido, alioquin Pateriens mire affligeretur.*

N. 2. *Si vulnus punctum inflictum, ungatur telum versus mucronem descendendo.*

N. 3. *Si telum desit, sanguis ex vulnere lignello suscipiendus, quod dein ut de telo dictum, tractandum. Hac ratione dolor dentium mitigari quoque potest, si nimirum lignellum sanguine Gingivarum imbutum, eodem unguento inungatur.*

Operatio hujus Unguenti perficitur identitate Balsami, sive spiritus il-

lius Balsamici, qui in homine & cruore idem est. Inter hos enim spiritus non alia est differentia, quam quod in homine Spiritus ille adhuc vitali actu vi-geat, in cruore autem coagulatus sit. Quare cum experiamur, affinitatem sanguinis tantum posse, ut uno fratre, vel consanguineo proximo, peste correpto, & alter etsi longo viæ intervallo absit eadem afficiatur, quid non fieri posse autumabimus, sanguinis identitare.

28. *Unguentum Terebinthina, vulgò Entersälbichen.*

℞. Terebinth. lb. ij.

Virell. ovor. num. vi.

Mastic.

Myrrh.

Oliban. ana ʒi.

F. Unguent.

Vires. In vulneribus generationem puris promovet.

29. *Unguentum Viride potabile, Byrrum viride,*

F.F.

℞. Herb. Salv.

Hyssop.

Prassil.

Menth.

Betonic.

Scolopendr.

Scabios.

Cichor.

Fœnicul.

Meliss.

Veronic.

Matrisylv.

Aqui-

Aquileg.

Rue.

Petrosel.

Millefol.

Centaur. min.

Agrimoni.

Aristoloch. rot.

Plantag. c. toto ana M. ij.

Butyri Majalis, lb. viij.

Infunde herbas omnes recentes
suo quamlibet collectionis tempore

in butyro, stentque donec omnes col-
legeris & infuderis, postea exprime, ex-
pressum coque ad consumptionem a-
quo firatis, F. Lq. Unguentum.

Vires. Expetitur a vulgo, assumitur-
que ad sanguinem coagulum resolu-
dum, dolores lentendos, pulmonum mu-
cilaginem demulcendam & expellendam.
Quin & extrinsecus ad dictos affectus
adhibetur.

NB. Cum maturante prælo sequentia medicamenta suis locis non
fuerint inserta, ea hîc subungere placuit, quod ne ægrè feras, Lector
optime, te amicè rogo. Referatur igitur ad Caput XXXIX. de Aquis
reliquis. p. 152.

1. Aqua ophthalmica.

℞. Aq. rosar. alb.

Lil. alb.

Fœnicul. an. ℥x.

Bacc. Laur. contr. ℥ij.

Galb. ℥ij.

Camphor. ℥ij.

Bulliant in diplomate & stent per
noctem bene clausa, manè colentur &
conserventur pro usu.

Ad Cap. XLIX. de Decoctis. p. 176.

2. Decoctum laxativum P.

de Spina.

℞. Rad. Sars. parill.

Alth.

Borrag. an. ℥ss.

Glycyrrhiz. ℥ij.

Digerantur hos. 24. in lb. iv. ▽ & fer-
ventis. Dein coquantur ad lb. iij.

Postea adde

Rad. Polypod. ℥ss.

Epithym. ℥ij.

Fol. Sen. el. ℥ss.

Agaric. troch. ℥ij.

Mechoacan. opt. ℥ij.

Flor. Borrag.

Bugloss.

Violar. an. p. r.

Tamarind. ℥vj.

Passular. min. ℥ss.

Dactyl. recent. N. iv.

Sem. Cartham. contus.

℥ij.

Anis.

Fœnicul. an. ℥ss.

Carvo.

Caryophyll.

Zinzib. an. ℥j.

Coque adhuc parum s.a. dein expri-
mantur & colentur pro potu.

Vires: Blande movet album, acresque

humores obtundit, adeoq. convenit quam
maxime in doloribus colicis.Dosis. ℥iv. mane, & si liber post meri-
diem.

Ad Cap. LXXIII. de Pilulis, p. 255.

3. *Pilula hysterica.* Greg.

Horstii.

Dictamn. an. g. v.

Cum Rob. sambuc. f. Massa.

℥. Aloës succorr. ℥iii.

Myrrh. opt. ℥j.

Extr. cal. ar.

Card. bened. an. ℥℥.

Croc. g. iii.

Rad. Gentian.

Aristol. long.

Vires: In impuritate uteri, & men-
sum obstructione à crassis & pituosis
humoribus proveniente, cum successu ex-
hibentur.Dosis: ℥℥. per dies aliquot continu-
ando.

Et sic Finis esto Libri secundi.





PHARMACOPOEIAE
MEDICO-CHYMICAE,
LIBER III.
DE
MACROCOSMO-
LOGIA,
SEU MINERALOGIA.

CAPUT I.

De Mineralogia in genere.

Ibris superioribus
medicamentorum
tractationes genera-
lio- res fuerunt cum
subjunctis compo-
sitis, quæ non passa
sunt speciali alicui
certove nativo accenseri, qua ratione
Pharmacopœja generalis dici posset:
specialior sequitur, qua nativa singula
cum annexis præparatis perstringun-
tur.

Pharmacopœjæ specialis partes
sunt, Macrocosmologia, Pythologia, &
Zoologia. Tot enim numerantur Mun-
di universi regna: Macrocosmicum
scil. vegetabile & animale, eaque in-

ter se summa cognatione conjuncta.

N. Regnabac vocat Hippocrates; (lib.
i. de Dieta,) tres concentuum har-
monias, similitudine ex musicis desumpta. Ni-
mirum sunt instar trium sonorum, perfe-
ctam & absolutam universitatis har-
moniam constituentium. Basin Macrocos-
mus perhibet, qui reliquis duobus subster-
nitur seu fundamentum, sine quo ea nec
concordare invicem, nec subsistere queunt.
Regnum vegetabile refert tertiam in mu-
sicis dictam, videlicet, ut latitudo hujus
semitoni inter tertiam majorem & mino-
rem circumscribitur: ita & in regno ve-
getabili latitudo deprehenditur, qua alia
ad naturam macrocosmicam propius ac-
cedunt, alia longius ab eodem recedunt.

Aaa

Lati-

Latitudo hæc vegetabilium juxta Moſen triplici terminatur claſſe, Prima continet germen pumilum, ſponte naſcens (אֶשְׂרָא) Secunda herbam ſeminificam (אֶשְׂרָא) Tertia plantam lignoſam (אֶשְׂרָא) Regnum porro animale, quintam & ſextam exhibet. Hæc enim uti longius à baſi recedunt, ambitumque integri toni continent: ita & regnum animale non modo longè à natura macroſmi diſtat, ſed & latitudine majori circumſcribitur. Sunt nimirum in hoc regno animalia aquea (נֶפֶשׁ הַיְּהוֹנִתִּים) i. e. anima, ſeu ſpiraculum vivens aquarum.) Sunt & terrena (נֶפֶשׁ הַיְּהוֹנִתִּים) i. e. anima ſeu ſpiraculum vivens terra.) Eſt & Homo אָדָם ex Adama, i. e. terra & aqua exaltatis creatus, qui præterquam quod eſt cum reliquis animalibus הוּא נֶפֶשׁ i. e. anima vivens, inſpiratum habet inſuper נֶפֶשׁ הַיְּהוֹנִתִּים ſpiraculum vitæ: adeoque reliqua omnia antecellit.

Macroſmologia eſt rerum macroſmicarum enodatio.

Res macroſmicas voco; quæcunque extra familiam vegetabilium & animalium collocantur, ſive primariæ ex ſint, i. e. macroſmi membra, ſive ſecundariæ, i. e. ex peritromate macroſmico productæ.

N. Conſtitutionem rerum macroſmicarum generalem libro primo paſſim deſcripſimus, quo Lectorẽ remitti-

In uſurpatione generaliter hic pen-

ſitandæ veniunt vires, ut & modus utendi.

Vires. Mineralibus fortiores, ac magis radicales ineſſe quam reliquis, ex eo convincitur, quod prima origini ſint propiora, idcirco & uniora, & conſequenter fortiora. Virius enim unita fortior.

N. 1. Fortitudo hæc ſecundum latitudinem demetienda eſt, quæ à primo illo principio diſtant. Sunt enim è mineralibus, quæ vel ad naturam vegetabilium progreſſa ſunt. Horum virtus ut magis eſt explicata & extenſa, ita minus fortis. Sic ſunt bitumina.

Sunt e contra, quæ à natura Univerſaliſi hanc ita longè receſſerunt. Horum igitur virtus ut unior, ita & fortior. Sic ſunt Salia, Metalla, & ſimil.

N. 2. Habent & vires mineralia ſuperſciarias, quæ facile in actum deducuntur, e. g. ſal vires habet, quas exercet in ſubſtantia, interna enim Sal. communis vires non apparent, niſi ſal ſit inverſum, e. g. in ſpiritum redactum.

Modus utendi mineralibus, tam internus; quàm externus eſſe po- teſt.

N. Sunt qui uſum internum mineralium præcipue mercurialium, metallicorum & ſalinorum ex medicina deturbant. 1. Quia ſint venenata. 2. Quia & diu pernicioſam poſt ſe relinquunt.

Re. Ad 1. Non adhibentur quatenus venenata, ſed quatenus ſaluti conferentia, ſive hoc ſit acquiſitum veneni abla-

tionis.

nione, siue correctione, &c. Constat nimis rem, quò nobilior primitus fuit creata, eò deteriore postmodum vi corruptionis evasisse: Corruptio autem quia accidentarium est, essentiam & radicem prorsus non abstulit, sed occultat ac detinet sub suo dominio. Exemplo sit serpens venenatus, qui sub veneno salutarem circumfere antidotum: adde quod nec omnia quæ veneni accusantur, venena revera sint.

Ad 2. Non adhibentur quatenus acrimonia illanoxia est, sed quatenus reliquis mista intentioni Medici convenit, vel & quatenus mitigata est eadem & emendata: Sic ingreditur Theriacam chalcitis, sic ornat allium culinam, &c.

Ad 3. Particulariter concluditur, & non nisi adversus ea, de quibus constat, quod perniciosam dispositionem introducant. In his autem constituendis uris iniquum esse duco limites transcendere: ita temerarium reputo, mineralibus vel solis, vel citra necessitatem velle inhærere.

Res macrocosmicæ seu minerales sunt tum primariæ, i. e. ad naturam Elementorum seu macrocosmi membrorum propius accedentes, ut Terræ & Aquæ: tum secundariæ, i. e. è peritotate macrocosmi prognatæ, ut: Lapidés, Metalla, Metallis finitima seu semimetalla, metallica excrementa, Salia, Sulphura.

CAPUT II.

De Terris.

DE Terra incipimus, non quatenus Elementum audit simplex, soloq; conceptu comprehensibile, sed quatenus macrocosmico semine, imprægnata est. Mortua enim rectè à Paracelso perhibetur, vivere autem Elemento invisibili, id est, vapore seu spiritu universalis infuso: quippe hujus virtute, terra aliàs mortua vivificatur, sterilis fecundatur, vegetatur, inque naturam variam, tum mineralium, tum vegetabilium, tum animalium facessit. Ex mineralibus sunt, quæ terræ faciem adhuc quidem retincentes, à communi tamè terra quo-

dammodo recedunt, atque medicarum terrarum classes subeunt. Hæ pro diversitate matricum, colorum, proprietatum, regionum vel aliarum etiam circumstantiarum, diversa nomina sortiantur. Sic dicitur 1. Ratione solis natalis; Terra Lemnia, Turcica, Armenia, Chia Melitea, Strigensis, Brundusiaca, seu Bohemica, Labacensis, sive Wetteravica. 2. Ratione proprietatum & colorum: Terra, Oris, Cris, Qrea, Orialis. 3. Ratione signi impressi; Terra sigillata, &c. Nos reliquis Terrarum speciebus omissis, Officina-

rum nostratum terras solummodo enodabimus.

N. Dicitur Arabicè Teri, Gracè Téa vel Tñ, German. Erd.

Vires. Terram in genere frigidam communis statuit opinio, nix Elementorum quadruplici combinatione, quippe quâ terra per frigiditatem ad aquam accedit, aqua per humiditatem ad aërem, aër per calorem ad ignem, ignis per siccitatem ad terram. Verum, licet hæc de Terra dici queant, quatenus ut Elementum simplex illa consideratur, id est, quatenus cum reliquis Elementis, Elementorum generationem ingreditur; Attamen quatenus nobis terra offertur, minimè talis censerè poteris, quippe (teste Hippocrate libro *de Aëre* potius *de Aëre*) multum calidi (spiritus illius de quo supra) terra inest, cujus vigore fecunda ipsa redditur. Fecunditas enim non nisi à principio spirituosus procedit, eoque calido, licet in caliditate ea, maxima scilicet latitudo ac diversitas deprehendatur. Quoad qualitates reliquas astringentiæ censetur natura, ac putredini resistens.

PRÆPARATA.

Præparationes quibus Terræ subijci possunt, & inde Medicamenta producta sunt.

1. Purificatio seu Lotio; unde Terra lota.
2. Præparatio officinarum: unde præparata.
3. Præcipitatio: unde Magisterium.

4. Destillatio: unde Spiritus, &c.

I. De Lotione.

Quia Terræ, ut plurimum sabulo ac calculis scatent; lavari communiter solent, id est, in aqua dissolvi, qua solutione sabulosa ac lapidosa substantia, utpote quæ terra utili ponderosior est, subsidet. Hinc aquam terra turbidam decantant, exhalandoque exiccant: verum lotio hæc, meo quidem iudicio citra aliqualem, imò magnam vitium iacturam fieri vix poterit; Nimirum pars quædam subtilis, (quæ magna ex parte terræ perfusæ sunt) lotionem illa recedit: Volatilis itidem terræ pars (quæ imprægnatæ terræ sunt) exhalando evanescit. In præparationibus itaque præstat terram crudam non lotam recipere.

N. Non improbamus imbibitionem seu imprægnationem, quæ terra succo aliquo medicamento iteratis vicibus humectantur, rursus exiccantur, atque ita viribus confortantur novis.

2. Præparatio.

Præparandi modus non est diversus à modo præparandi generali, c. 76. Lavigantur nimirum terræ, subindeque irrorantur aquâ appropriatâ (v.g. Tormentillæ,) redigunturque in pulpam per se exiccandam.

3. Præcipitatio. unde Magisterium.

Solvi-

Solvitur Terra in Spiritu aliquo acido, e.g. Spiritu Sal. com. vel simili, solutio decantatur, præcipitaturque cum oleo Tart. per del. vel cum Δ , communi largiter affusa, præcipitatum edulcoratur aquâ fontanâ.

4. *Destillatio ac Sublimatio,*
unde

I. *Spiritus simplex.*

Re. Terræ orbiculos formatos, ac destilla igne nudo ex Retorta. Vide infra de Terra sigillata.

2. *Spiritus cum Vino.*

Re. Terræ, (e.g. Strigenfis, de mine-
ra antequam lavetur,) q. v. affunde aquam destillatam: inde Retortæ, ac destillata lente, ut aliquantulum aperiatur corpus. Hinc superfunde V, digere & destillata.

3. *Spiritus Alcalisatus seu Balsamus.*

Re. Terræ Strigenfis, (crudæ non lotæ,) q. v. affunde aquam tonitrualem, macera aliquot septimanas ad putrescendum. Hinc destilla per XX. Ex materia superstitite extrahe Sal. com. idque destillato liquori junge, circula per mensem. Postea destilla iterum. Si liquor secum rapiet Sal, nanciscerisque subtilem Balsamum.

Aliter.

Re. Terræ crudæ vel lotæ, e.g. lib. xx. &c. destilla per cucurbitam vitream loricatam ad latus inclinantem (vel per Retortam) calore sat forti gradatim adhibito. Primum extillat Aqua, hinc Spiræus; Spiritibus animadversis

augeatur ignis, & sublimabitur Sal: Conjunge salem hunc aquæ destillatæ, ac destilla denuo semel ac iterum, ut post destillatum liquorem Sal sublimetur: vel digere simul: sic Balsamum habes pretiosum, Conrad, Kunrath / in Medulla destillat.

N. In copia Terram destillare oportet, alias parum Sal. com. nancisceris.

I. *TERRÆ ARGILLACEÆ,*
SEU SIGILLATÆ.

Omnibus Terrarum generibus laudem merito præcipit argilla, quæ a sigillo quo sæpe notate venditur, sigillata dici solet, Arabicè Terimachtim German. Siegel Erd. Hanc varii generis Officinæ exhibent.

Sunt enim Terræ sigillatæ, 1. Turcicæ (Turcicis Characteribus insignitæ) quas pro Lemniis terris communiter venditant, cum veræ terræ Lemniæ Galeni minimè respondeant: Verum enim verò si sint qui Terram sigillatim in placentulis cinericei coloris Constantinopoli advectam, pro vera Terra Lemnia usurpare velint, utpote quæ inter modernas præstantissima sit, ipsis bellum propterea non indicam.

2. Est Terra Melitea, sic dicta, à Melita seu Maltha Insula, in qua eruitur, alias Terra sigillata Sancti Pauli.

3. Est & officinalis, terra sigillata Germanica, eaque duplex, una dicitur Strigenfis lutei coloris, quæ in

Scaptenfula auri Suenicensi reperitur, dicitur Officinis Terra sigillata Strigenfis, à Striga Silesiæ Oppido, ubi præparari ac sigillari cœpit: dicitur & Medulla vel axungia Solis, eò quod Sulphure Solis imprægnata credatur: Altera Lignicensis vocatur, estque triplex, coloris scil. rubei, albi & cinerei. Hanc vocant axungiam Lunæ, quippe quæ Sulphure (æ sit perfusa; Item Unicornu minerale, quod viribus vero Unicornu respondeat.

N. Similiter & in reliquorum metallorum cuniculis inveniuntur terra. Sic & in Wetteravia, haud longè à Labaco oppido, species quadam terra datur, quæ ad axungiam Solis accedere videtur: Et Husanaprope Marpurgum.

Delectus; Præstantissima omnium, quæ modernis in usu sunt, cenletur Lemnia, rubri, hinc cineritii coloris, quæ Constantinopoli ad nos pervenit. Huic succedere potest axungia Solis, in affectibus cordis, vel axungia Solis, in affectibus cordis, vel axungia Lunæ, in capitis & Epatis morbis: Ex Lunari autem antecellit ea, quæ cineritii coloris est.

Nota. Bonitatis in terris est, 1. si lingue adhereant. 2. si saliva aut humore humectata, in bullum sese elevent, vel in ∇ conjuncta bullas excitent.

Vires. Exiicat, astringit, resistit, puere dini venenoque, resolvit, sanguinem dilatat, adeoque ciet sudorem. Usus præcipuus in peste, febribus malignis, Diarrhæa, Dysenteria, in moribus animalium

venenatorum. Extrinsicus in vulneribus malignis mundificandis, in istu venenato.

N. 1. Terra Labacensis, Terra sigillata vires amulari videtur: sudores largiter movet nec vi adstringendi reliquis cedit.

N. 2. De axungia Solis experientia comprobavit; 1. Quod cruda, (qualis scil. ex minera eruitur) sapissimè Epilepsiam curaverit. 2. Quod in Philtrū maxime profuerit.

Dosis à $\mathfrak{z}\beta$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

PRÆPARATIONES ET PRÆPARATA TERRARUM ARGILLACEARUM ac inprimis sigillatæ.

1. Terra sigillata præparata.

N. Ut plurimum terra sigillata sine præparatione vulgari in usum venit.

2. Magisterium.

\mathfrak{z} . Solve in spirit. Sal. nit. præcipit. ol. Tart. p. d. vel ∇ . comm. ita Magisterium sub colore terræ nativo nancisceris.

Dosis à $\mathfrak{z}\beta$. ad $\mathfrak{z}\beta$. & ultra,

3. Spiritus Terra sigillata simplex.

Destillatur terra, per se ex Retorta: Nimirum.

\mathfrak{z} . Terra Silesiæ flavæ (optima est, quæ duobus monticulis insignitur) libr. 1. frange in particulas duas, ac destillata per Retortam, igne nudo, hor. 6. vel plures, (ad σ integrum,) in Receptaculum capax. Primum extillat Phlegma, dein Spiritus albi-

albicantes in parva quidem copia, sed grati acoris ac saporis.

N. *Terræ restans*, ejusdem etiamnum figura extrahitur; sed quæ non amplius lingua adhaeret, nec saliva humectata in bullas exurgit.

Uſus: Non opus habet rectificatione, sed in usum venit una cum Phlegmate.

Dosis ℥ss. Vide Horstium in Problematibus.

4. Spiritus Terra sigillata cum Vino.

Fit macerando Terram cum ∇ & destillando. Hinc digerendo eandem cum V atque destillando. Vide supra.

5. Spiritus Terra alcalisatus, seu balsamus Terra.

1. Fit si cum ∇. maceretur ac destilletur, & postea cum sale suo alcalisetur. Vide supra.

2. Destilletur sine ∇. floresque forti calore propulsi, cum liquore destillato conjungantur.

Vires. Vires ex terra viribus judicari poterunt, præter quas vim quoque habet arthriticos dolores summè mitigandi, malignitatem scabiei corrigendi, &c.

N. Solvit quoque ☉,

6. Oleum Terra Strigoniensis.

℞. Terræ Strigoniensis ℔. i. Assunde aq. pluvialem destill. colloca in locum temperatè calidum per mensem vel amplius, & oleositas à corpore suâ

sponte separabitur, & aquæ innabit, aquam separa per infundibula & oleositatem cum part. vii. ∇ destilla & egredietur Oleum aurei coloris & ui innatus. Materiam autem instar perlæ albam in fundo relictam exime, cum aq. pluvîâ Sal. communem ut moris est, extrahe, hunc oleo redde, majorumque virium ergò circula, & ex ∇ vitrea in Arena destilla.

Dosis gutt. xj. in vehic. convenit in febribus malignis, variolis, calculo.

Q. E. terra sigillata vide in Hodegetico Popp. p. 120.

II. BOLUS.

Bolus terræ genus est, ex pallido rubrum, vaporibus & alibis inprimis imprægnatum.

Dicitur Medicis Bolus armena, vel orientalis, eò quod ex Armenia finitimisque locis, præcipuè advehatur. Præcipuè dico, ne excludam & alia loca in quibus ea foditur, & ad nos transportatur, quibus nec Germania nostra caret, unde nobis Würtembergica usus est.

Delectus. Præstat pura (non arenosa) quæ in lævorem calcis instar affuso humore, promptissimè solvitur ac commanducata butyri modo liquefcere videtur. Reliquis tamen præstantior censetur, quæ ex Armenia vel locis finitimis apportatur.

Vires. Valde siccæ, astringit, roborat. Hinc usus ejus saluberrimus est in fluxu sistendo, in humore inspissando, in pu-

in putredine arcenda, veneno obtundendo, &c. quæ ratione convenit in Diarrhæa, Dysenteria, fluxu menstuo; Catarrho spustione sanguinis; Hemorrhagia nasum & vulnerum, &c. Externus ejus usus creber est in Cataplasmatibus, pulveribus astringentibus, &c.

PRÆPARATA.

1. Bolus armena præparata, fit modo generali.

N. *Vi de Terra sigillata monuimus, cruda potius, quam præparata terra armenia in usu est.*

2. Magisterium: fit ut Magisterium terræ sigillatæ.

III. CRETA.

Creta, *Freid* / à Creta Insula sic dicta, ubi in copia invenitur, (licet Dania, Gallia, & aliæ regiones quam plurimæ ea scateant) terræ species nobilissima est, durior & candida.

N. *Renodus triplicem hujus facit speciem, candidam, virescentem & nigricantem; Verum, nobis non nisi candida in usu medico est, eoque rarissimo.*

Vires. Siccatur, abstergit, emplastica est.

Ufus ejus internus nonnunquam in ardore Stomachi est, externus in vulneribus, ulceribus, &c. siccandis.

IV. TERRA JAPPO-

NICA.

Est & terræ genus, &c. huc refertur ex fine hujus libri pag. 172.

V. MARGA.

Marga, est portio quædam pinguis & quali medula, in saxis nonnullis, dum franguntur reperta, unde & Medulla Saxorum dici solet, German. *Steinmarg.*

Vires. Siccatur, adstringit, consolidatur, socratica est, tartarum sanguinemque coagulatum resolvit, (intus exhibitum.)

VI. OCHRA.

Ochra terræ species est durior, coloris flavi, seu lutei. Germ. *Ochergoel.*

Vires. Siccatur, astringit, discutit, excrementas reprimat.

Ufus. Ejus rarissimus est, & non nisi externus ac præcipue in vrbicibus & collis, tum quoque in tumoribus duris discutendus (Emplastrum.)

VII. RUBRICA.

Rubrica terræ species est lapidosa rubea, &c. dicitur & rubrica fabrilis, quod fabris lignariis crebro inserviat, in ducendis lienis, German. *rothe Freide* / *Rotelstein.*

Vires. Siccatur astringit.

Ufus ejus Medicus est in sputo sang. & in Emplastris vulnerariis & siccantibus.

VIII. TRIPOLIS.

Tripolis terra est coloris Citrini intense, speciesque videtur Ochra.

Vires. Ufus ejus in Pharmacopæia vel nullus, vel rarus est, nisi quod pro destillandis Spiritibus salinis, salibus admisceatur, quod minus ea fluant.

Aquæ nativæ, quæ usui Pharmaceutico inserviunt, tum simpliciores sunt, tum minerales.

Præparationes utrarumque sunt: 1. Purificatio. 2. Destillatio. 3. Inspissatio. Hinc aquæ depuratæ, destillatæ & salia.

1. Purificatio.

Scitent nonnunquam aquæ crassissæ & heterogeneis fecibus, unde depuratione opus habent. Depurationis hujusmodi sunt. 1. Filtratio per chartham bibulam. 2. Digestio, qua partes crassiores ad fundum secedunt.

2. Destillatio.

Destillatio aquarum in genere, pro variante volatilitate, fixitateve eliciendi liquoris, erit instituenda in VB, MB, cinere, tum quoque in arena, convenientiora autem hic sunt destillatoria vitrea.

3. Inspissatio.

Inspissatio partem fixiorem reddit conspicuam, quæ si salinæ naturæ fuerit, elixivari potest, l.a.

Vires. Aqua quatenus aqua seu liquor est, summè humida censetur, frigida remissè. Verum, quatenus aliis rebus immixtis vehiculum præbet, eatenus probarum diversitate qualitatis prædicta judicatur.

AQUÆ SIMPLICIORES.

Aquæ simpliciores sunt aqua 1. fontana, 2. putealis, 3. fluvialis, 4. palu-

stris, 5. pluvialis, 6. nivea. Ex his usitatior fontana & pluvialis, quibus quoque 7. ros majalis addi poterit.

1. *Aqua fontana* est omnium purissima & usitatissima. Purissima est, quia per terram seu colatorium colatur. Usitatissima est, quia ad omnia recipitur, ad quæ aqua sine peculiari mentione alterius, e.g. pluviae, &c. recipi jubetur.

N. Præfertur inter fontanas quæ fluit ab Oriente ad Occidentem, quæ decurrit à montanis locis altioribus, item quæ Vesu, Gustu & Olfactu, pura, clara, tenuis, levis, ac sincera deprehenditur, ut & quæ citò incallescit, & citò refrigeratur, quæ Hyeme calidior, Æstate frigidior. Aquam hanc injecto pane tostato corrigere, agrotisque, loco potus sat grati concedere nostrates consueverunt. vulgo Brodtwasser.

2. *Putealis* fontanâ vilior, & crudior ut plurimum habetur, eò quòd ponderosior plerumque sit ac linguam magis feriens (*ein hart Wasser.*) Verum si ex vivis scaturiat scaturiginibus, reliquisque bonitatis signis abundet, illius vices subire haud inepta est.

3. *Fluvialis*; quod radiis Solaribus exposita fuit, magis habetur digesta quidem, quàm putealis: Verum tamen in usurpatione ejus, non erit inutile, spectare, unde originem trahat, quoque perlabatur.

4. *Palustris* pessima omnium censetur

Bbb

setur

setur, adeoque è Medicina eliminanda.

5. *Pluvialis*, est aqua levis linguamque minus feriens, (ist ein weich Wasser) fontanæ vicaria, utimur ea ut plurimum destillata. Sunt qui præferunt imbres à Meridie advolantes, vel ab Oriente, utpote quas radiis Solaribus magis imprægnatas & digestas arbi- trantur.

6. *Nivea*, pluviali affinis est, magisque penetrans, adeoque & ad sudorem movendum non in efficax, quas vires naturæ salinæ acceptas refert, quâ præ reliquis abundat, vi frigoris condensata.

N. 1. *Præfertur collecta circa solstitium Hybernium & Equinoctium Martii.*

N. 2. *Odonalgiam pertinacissimam aqueâ nivæ fuisse domitam, vide Zacut. l. 1. Hist. med. observ. 46. De usu vid. d. l. dub. 42.*

7. *Ros*, reliquas omnes subtilitate, adeoque & penetratione antecellit: Constans liquore volatiliori, saleque acriori, præfertur Majalis.

PRÆPARATA.

Aquæ fontanæ plerumque crudæ in usum accersuntur; Meteoricæ autem plerumque destillatæ. Præter has sunt qui & Essentiam seu Spiritum alcalisatum inde parant, idque mediante destillatione & salificatione.

Destillatio.

1. Aquæ pluvial. vel nivæ bonam

quantitatem, destilla ex cucurbita vitrea leni MB calore, ut solummodo pars spirituosâ colligatur, hinc subsiste. Alii, ut eò felicius pars spirituosior à reliqua sequestretur, præmittere solent digestionem seu putrefactionem, (per mensem 1. aut 2.) in vase Herm. clauso, qua fit ut non modo feces subsideant, sed & liquor quodammodo ad sequestrationem disponatur.

Hinc paratur.

Spiritus alcalisatus, seu Essentia.

2. Spiritum jam elaboratum; adde Sal. comm. circula simul vase Herm. clauso, per mensem destill.

Salificatio.

1. Aquæ quantitatem maximam (mensur. 20. 30.) exhale aliquantulum, (si opus sit interposita filtratione,) hinc reponantur, evaporetque ad siccitatem; sic nancisceris feces salsedine imprægnatas. Elixivia crebris solutionibus, habebis sal purum.

N. 1. *Sunt qui feces calcinant, sed metuo ne quid pereat. Conveniet enim & Sal. com. volatile.*

N. 2. *Sunt & qui Sal. com. volatile ex spiritu sibi spondens, sed successu mihi irritum.*

N. 3. *Terra illa residua ex evaporatione, si per O pellatur, oleum quoque supernatans exhibet, sed parum.*

Tartarum Philosophicum
S. Cloß.

Ros vel aq. pluvia levi artificio reduci-

ducitur in Terram subalbam, si scilicet matracium rore semiplenum H. S. immergatur in Aq. Thermalem calentem vel retrò clibanum aut in hypocausti ergastulo digerantur longo temporis intervallo, sic n. de die in diem vi Δ lenti atque continui generantur Atomis splendentes, quæ ad fundum vasis agglomerantur, & à cœruleâ aq. supernatante separari debent.

Spiritus aq. pluvialis acidus & ardens Ioh. Fabri.

Imbibe hanc Terram decimâ parte alterius aquæ pluvialis, digere dum spissescat, idque septies reitèra, habebis materiam pinguem & ad syrupi consist. accedentem, è quâ Δ-Primo —um acidum, deinde Δ-Arenam igneam propelles. Utrumque rectifica & super ☉ sive gummi restans plures cohoba, intercedente semper digestionè, quod supererit calcina Δ rev. rberii ad albedinem, & ex calce hac Sal naturæ extrahe. Jam liquores illos salī fixo reasfunde, digere, congela in MB, tandem sublima in salem crystallinum, quem in matraccio H. S. furnoque secreto in terram fixam rubentemque figere non dubitabis.

Hanc pro Panacæâ Universali habent plures Philosophi.

Aqua minerales.

Sub aquis mineralibus comprehendimus acidulas & thermas, quæ nihil aliud sunt, quam aquæ mineralibus essentiis in terræ abyssò imprægnatæ.

Duo ergo & his insunt; Mineralis sc. substantia, ceu pars potior, & Plegmaticus liquor, seu aqua, substantiæ illi Minerali vehiculum præbens.

Mineralis illa essentia nihil esse videtur aliud, quam Spiritus mundi in terræ gremio conceptus, inibi pro varietate matricis vel locorum in hanc vel illam naturam mineralem, prout illa à natura naturante naturata fuerit, transplantatus, aqueoque liquori ceu vehiculo commixtus.

Estque substantia hæc mineralis varii generis, metallina, salina, bituminosa, terrestris, &c. tum ratione volatilitatis; fixior, volatilior, &c.

Vires. Vires aquarum mineralium, pro diversitate commixtorum mineralium decernenda, in quibus tamen, cum impossibile sit, in accuratam & penitiorem earum devenire mixtionem, experientia potiores partes danda sunt.

CAPUT IV.

De lapidibus in genere.

L Apides sunt corpora terrea, dura & ductilia, vi lapidificâ ex materia lapidescente, id est, viscosa terrestri

seu tartarea, coagulata.

N. Generantur lapides ex peristomate salino terrestri, quod in nutritione

rerum-redundat, vique suâ lapidificâ in duritiem lapideam coagulatur.

Suntque vel pretiosiores, vel minus pretiosi: Illi gemmæ nomen adsciscunt, præcipue si diaphanæ fuerint; hi nomen lapidis retinent.

PRÆPARATA.

Præparationes seu operationes quibus lapides in usum Medicum veniunt, præcipuæ sunt 1. Pulverisatio & præparatio in specie sic dicta. 2. Calcinatio, cui subjunguntur. 3. Solutio, Coagulatio, & Purificatio seu Edulcoratio. 4. Liquatio seu Deliquium. 5. Destillatio seu Volatilificatio. His accedit interdum 6. Syrupificatio.

N. *Integrum & insignem tractatum de lapidibus conscripsit Nobiliss. Anselmus Boetius de Boodt / Medicus Rudolphi Secundi, quem in describendis lapidibus potissimum sum secutus. Præter hunc inservit Conradus Kunrath / medulla sua destillatoria, integrum fere Tractatum de Lapidibus pretiosis ac minus pretiosis, utrorumque præparationibus ac facultatibus, part. I. tr. 10.*

I. Pulverisatio & Præparatio.

Pulverisatio lapidum commodissima fit primum tritura, quam dein suscipit lavigatio. Præparatio fit si inter lavigandum ∇ conveniens stillatitia aspergitur, inque pulpam massam redigitur, in umbra exiccandam.

II. Calcinatio.

Calcinatio cui lapides subjiciun-

tur, vel ministra est, vel principalis. Ministra est, quâ lapides ad principalem illam suscipiendam, disponuntur; diciturque strictè loquendo calcinatio. Principalis est, qua lapides propius in usum Medicum veniunt, dicitur solutio potius quam calcinatio, adjunctamque habet coagulationem cum annexa edulcoratione.

Calcinatio qua lapides ad solutionem disponuntur, perficitur vel ignitione tum simplici, tum retractoria, vel corrosione, eaque aut cum Sal. com. aut cum Sulphure, &c.

Ignitio simplex fit, si lapis vi ignis nudus, tum liberi, tum reverberio inclusi comburitur, donec in calcem redigi queat. Exemplo fit calcinatio illa vulgaris lapidum calcinatoriorum, unde calx viva murariis expetita.

Ignitio retractoria: quando lapis ignitus in liquore aqueo extinguitur, idque vicibus repetitis, donec in calcem redigatur.

N. Est & alius modus calcinandi: Nimirum pulverisati miscentur cum duplo carbonum pulverisatorum. (præstant fagini) inque fornace figulina & 24. \times bulo cooperculato cremantur.

Corrosio 1. cum Sal. nit. Lapis grossè (saltem) ad minimum contusis, miscetur cum Sal. nitri portione æquali, duplo, plus minus, ignique committitur fortissimo, ut Sal. nit. fundatur & concremetur.

N. Peragitur & hoc modo: Nitrum funditur primum, hinc fuso super injicitur

citur paulatim lapis calcinandus pulveri-
satus.

Corrosio 2. cum Sulphure : Lapis cum
Sulphuris duplo, triplo, ter, quater, plu-
riesve in ♀ bulo aperto ad Sulphuris
exhalationem uritur.

*N. Præstat Sulphur vivum, vel flores
Sulphuris adhibere.*

*De Calcinationibus hic notandum in
genere.*

*I. Si quidem calcinationes id finis præ-
se ferunt, ut lapides fiant solubiles, pa-
rum interest, utrum uno pluribusve
calcinationum modis finem dictum con-
sequaris. Sic perficiunt calcinationem
alii uno calcinationis genere (v. gr. Basi-
lius ignitione sola Corallia calcinat) a-
lii duobus, (sic calcinat Crolius gem-
mas &c.) 1. Cum Sulphure. 2. Cum Sal
nit. Runrath / è contra, 1. cum Sal nit.
2. Cum Sulphure : alii præmittunt quoque
calcinationem ignitionis & præcipue ressin-
tioriam.*

*2. Si quid indissolutum remanserit, de-
nuo calcinandum est, idque vicibus toties
repetitis, donec tota substantia, rejectis secti-
bus sit dissoluta.*

III. Solutio.

*Solutio Lapidum tam pretioso-
rum, quam vulgariarum variis potest
administrari menstribus, quibus lapi-
des ut plurimum calcinati injiciun-
tur, locoque tepido reponuntur, ac
subinde s. a. id est, toties repetitis novi
menstrui affusionibus & decupelatio-
nibus, donec opus fuerit, & nihil am-
plius solvatur.*

*Menstrua idonea solutioni vide sis in
solutione Coralliorum, præcipua ta-
men sunt Acet. destill. vulgare ac impru-
mis alcalisatum, terebinthinatum,
Acet. destill. mellis, Spiritus Oli Sal ni-
tri. Ol. Sulphur. per C. &c.*

Coagulatio.

*Coagulatio solutorum lapidum fieri
potest, vel menstrui abstractione, vel so-
lutionis præcipitatione.*

*Abstrahitur menstruum, tum evapo-
rando, tum destillando.*

*Præcipitatio fit instillatione Sal
com. fusi, Ol. Tart. p. d. &c.*

*Edulcoratio fit iteratis soluti-
bus, ac coagulationibus, vel ablutioni-
bus.*

*N. Purificatio, quæ sæpius iteratur, et
sal præstantius ac purius evadit.*

IV. Liquatio.

*Liquatio seu dissolutio per deli-
quium fit, quando Sal lapidum in vi-
treâ marmoreave patinâ, vel simili, in
locum humidum exponitur, ut in liquo-
rem dissolvatur.*

V. Volatilisatio.

*Volatilisatio fit : si salia sæpe solvan-
tur coagulenturque, atque tandem
cum ♀ (vel ♀. dest. appropriata seu
quod melius cum Spir. herbæ appro-
priatæ) & ♀ 14. in fimo equino di-
gerantur, multotiesque per cucur-
bitam humilem vel retortam destillen-
tur, quippe post quamlibet putrefactio-
nem aliquid Sal com. cum menstruo
ascendit.*

*N. 1. Destillatum hoc constans ex
Bbb 3 Men-*

Menstruo ac Essentia lapidis, (id est, ex sale lapidis volatilifato) dicitur Elixir: verum si menstruum calore (leni) abstractum fuerit, remanet Essentia in fundo.

N. 2. *Præstat Vini essentiam cum salis liquore conjunctam, sine separatione asseruare, quippe utraque sese mutuo perficiunt, adeoque vis salis resolutive, qua calculum seu Tart. resolvit Essentia illius vinosi viribus exaltatur, quin & Vini Spiritus sit magis penetrativus, & ad calculi resolutionem operativus.*

VI. Syrupisatio.

Syrupisatio fieri potest, si solutionem (factam cum succo assumptioni internæ idoneo, v. gr. succo citr. berber.) cum saccharo in syrupum redegeris, affusa si libet aqua stillat. conveniente.

Operationibus hisce fiunt ex Gemmis.

1. Gemma Præparata.

Præparantur modo dicto; lavando, subindeque irrorando, cum ∇ . cordiali (rosarum, buglossæ, & sim.

2. Sal.

Gemmæ calcinatæ solvuntur interveniente digestionem in Acet. destill. vulgari (vel terebinthinato:) solutiones filtrantur: hinc abstrahitur menstruum, salque relictum purificatur eluendo cum ∇ destillata, Croll.

N. 1. *Sunt qui malunt Acet. destill. à sexta parte cineris herbe Kali ternis cohabitum destillatum. Nimirum hoc sub dulce*

nec adeo mordax est. Hartm. in Croll.

N. 2. *Calcinatio hic fit, vel sola ignitione, scilicet ustione; vel corrosione. Placeat hic modum Crollii inferere, qui est: Gemma levigata cum Tart. (flor. Sulphur.) ter quaterve comburantur, idque igne rota \times buloque operculato: ultimo tegitur totum crucibulum carbonibus. Calx gemmarum lotionem à Sulphure repurgata miscetur cum Sal. nit. ana. & calcinatur denuo in tigillo clauso igne rota ut fluant. Tandem abluitur optimè Sal. nit. calxque gemmarum exiccatur. Sic parata est ad solutionem.*

N. 3. *Si quid indissolutum manserit, id nova calcinatione comburendum & solvendum idque toties, donec tota ferè gemmarum substantia dissoluta sit.*

3. Magisterium.

Præcipita solutionem dictam cum Ol. Tart. p. d. vel Spir. Φ . i.

N. *Fiunt quoque Magisteria gemmarum, solvendo eas in spiritu Sal. nit. vel Salis Naturæ, & præcipitando cum Ol. Tart. Vid. Quercet. in Pharmac. rest. cap. 24. & 26.*

4. Oleum gemmarum seu liquor.

Sal Gemmarum optimè solutionibus ac coagulationibus purificatum reponitur in cellam supra marmoream tabulam, ut liquecat.

N. *Felicius sit mensibus Julio & Augusto, Croll.*

5. Tinctura seu Essentia: Sal gemmarum exaltata.

Liquori sive Oleo (Magisteriove) gem-

gemmarum affunditur V alcolifatus. F. Extractio f. a. separatur solutio, abstrahiturque menstruum ad formam usque crassiorem: Hartm. *Quercet. in Pharmac. rest. c. 24.*

6. *Oleum per distillationem, Essentia elaboratior.*

A liquore gemmarum evoca V cumque recentis V atque Acer. destill. terebinthinati ana. destilla denuo per retortam: post evocatum menstruum prodeunt sales in forma Olei. Hartman. in Croll. sect. de liquoribus gemmarum.

7. *Extractum Gemmarum, crystalli & lapidum S. Closs.*

℞. Pulv. impalpabilem cujuscumque gemmæ. lapid. aut crystalli, tere cum tantundem Sal. mar. decrepit, & reverbera vase testeo infurno figuli per 24. horas materiam resolve in aqu. font. calidâ, agita aquam fortiter & quod solutum erit, affunde per inclinationem in vas aliud vitreatum, ita vicissim procede aliam aq. calidam affundendo & decantando, donec calx

in fundo restet insolubilis, quæ novæ remixtioni & reverberationi erit submittenda. Decantatas a. aquas residue permitte, & separa à limo subsidente in illas projice guttatim ☉ Tart. ut lactescant, filtra per chartam, crassamentum illi adhærens separa, & limo superiori permisce, idemque de novo age præcipitando, colando, dum nullum amplius limum dederit. Omnes has viscosas substantias in unum junctas per ablutiones plures à falsedine vindica, iisque Acer. destill. affunde, digere donec dulcescat Acer. destill. abstrahere ad siccitatem, restabit sal griseum, è quo Tincturam trahes cum V opt. eoque revocato per distillationem apparebit sapa sive Syrupus Lapid. aut gemmæ dissolutæ ulterius in Essentiam (si velis) provehendus.

8. *Syrupus.*

Fit dicto modo ex solutione & Saccharo. Vide Syr. corall.

Et hæc de Lapidibus in genere, sequuntur jam Gemmæ.

CAPUT V.

De Gemmis.

1. *Chrysolithos.*

Chrysolithos (veterum,) Topasius Gemmariorum modernorum) est gemma aurei coloris. Germ. Chrysolith.

Duo ipsius sunt genera, Orientalis & Europæus, ille ut colore, ita du-

ritie Europæum superat: hic enim instar Crytalli mollis est, & cum aureo colore vel multum vel parum nigricat.

Inveniuntur in Bohemia passim.

Vires. *Natura solaris ex signatura judi-*

judicatur. Proinde creditur timores nocturnos & melancholiam minnere, intellectum confortare, molestisque in somniis adversari, (sinistro sc. brachio alligatus, aut collo suspensus, auroque inclusus) alii commendant ejus assumptionem ad morbum comitalem, & pestem.

II. Granatus.

Granatus est Gemma pellucida, ex flavedine rubens, ignis instar, minique nativi vel factitii colorem ferè referens. Germ. Granat.

N. Sunt diversa genera Gemmarum qua colorem ignis amulantur, adeoque sub Carbunculis, (quo nomine à Carbonibus sumpto, Gemmas illas in genere vocant,) comprehenditur v. g. Granatus, Hyacinthus, Rubinus, &c. Hinc sunt, qui Granatum faciunt Rubinum colore obscuriore, expositus enim luci aut soli, carbonis imaginem ostendit dilucidius, quam ipsemet Rubinus.

Sunt granati alii (vel aliarum) Orientales, alii Occidentales. Orientales, ut meliores ita & pretiosiores, proinde provinciam officinalem solis Occidentalibus linquunt. Hi sunt tum Hispanici, tum Bohemici, tum Silesiaci. E quibus Bohemici reliquos antecellunt.

Vires. Exiccant, corroborant, medentur cordis palpitationi, melancholia resistunt & veneno, spustionem sanguinis sistunt, Tartarum in corpore resolvunt, collo suspensi iisdem virtutibus vulgo celebrantur.

PRÆPARATA.

1. Granatus præparat. Fiel. com.

2. Magisterium.

Igniuntur Granati & in Spir. Sal com, aliquoties extinguantur, donec solvantur, Soluti, oleo Tartari, in lactis cremorem coagulantur, atque ∇ calida dulcorati postmodum usui adhibentur.

N. 1. Fieri quoque inde possunt & alie præparatorum formula ad modum generaliter datum.

N. 2. Sulphur granatorum Bohemicorum describit Agric. tomo 2. p. 261.

III. Hyacinthus.

Hyacinthus est Gemma pellucida, ex flavedine rubens, ignisque flammam imitans. Germ. Hyacint.

Sunt alii (vel aliarum) Orientales, alii Europæi. Hi inveniuntur ad Iseram fluvium, in confinibus Silesiæ & Bohemiæ, suntque Orientalibus ignobiliores. Quoad colorem, referunt alii colorem minii nativi, aut sanguinis admodum biliosi: & hi sunt præstantissimi: alii rubedine Croci flavescunt, alii exactè ostendunt succini colorem, & hi viliores: alii albi pellucidi succini colorem referunt, & hi omnium vilissimi habentur.

Vires. Vin habet cor corroborandi, & à peste tuendi: Singulare quoque est specificum contra spasmodum & contraturas. Amuletum quoque antipestiferum habetur collo appensus, aut annulo inclusus. Quercetani in Ph. Res. cap. 26. B. d. B.

PRÆ-

PRÆPARATA.

1. *Hyacinthus præparat.*2. *Sal & Magisterium.*

N. *Hyacinth. in Pract. Calcinat. cum æq. parte Sulphur. vivi (minera adhuc conjuncti non in magdaleones reducti,) in tubulo forti, cum operculo tecto, (non lutato) Δ circulari: 1. lento. 2. fortiori, tandem 3. fortissimo, donec Sulphur omne exhalet, nec amplius Tartari odorem spiret. Hinc eluitur optime & denuò cum ana. Sal. nit. calcinat. Δ circulari, donec in massam abeat in Δ metallici instar rubescens: Hinc injicitur in Δ calidam, eluiturq; optime donec non amplius Sal nit. sapiat. Huic pulveri affundit Acet. destill. serebinthinatum, solvitque s. a. donec hyacinthi sine soluti reliquiis exiguis fecibus infundo. Solutionem filtratam exhalare permittit ad siccitatem, pulveremq; optime edulcoratum exhibet, (Sal. com. hyacinthi) aut cum Oleo Tart. præcipitat. (Magisterium.)*

*Dosis ℞. vel ℞j.*IV. *Lapis Nephriticus.*

Lapis Nephriticus est lapis opacus, variegatus, ex colore viridi, aliisq; permixtus. Germ. *Griesstein.*

Rarò hic Lapis in se duos colores habet, semperque viriditatem refert; alius scilicet viriditatem ex albedine, alius viriditatem subflavam, interdum sub caeruleam; plerumque ex viridi albo, flavo, ceruleo nigroque colore mixtio est. Poliri exactè non potest, semper enim ipsius superficies pinguis apparet, quasi Oleo inuncta esset.

Adfertur ex nova Hispania. In

nonnullis etiam Hispaniæ locis, & in Bohemia reperitur. Tantà invenitur mole, ut pocula inde fieri possunt. Quin imò frustum hic Francofurti conspicerelicuit, ultra libras 50. pendens.

Vires. Commendatur adversus nephritidis aut stomachi dolores, sed ejus præcipua laus est ad nephriticos dolores, calculumque, & arenulas expellendas. Medetur his affectibus brachio vel coxendici alligatus, aut de collo suspensus. Cujus rei gratià armillas inde factas gestare solent. ☉ in ingrediente insculpunt signum M.

V. *Rubinus.*

Rubinus est Gemma diaphana rutilans, rubensque, (exigua portiuncula est cœrulei coloris) ac limam respuens. Græcè *Ῥυβινός*. Arabicè *Jacur*. Latine *Carbunculus*, *καρβυκλον*. Germ. *Stubin.*

N. *Rubedo ipsius est instar sanguinis, lacca indica aut coloris coccei, Permesin.*

Nobiliore Rubini in Insula Zeilan nascuntur, alii qui minores, in Coria, Calecut, Cambia, & Bishnagar. Optimi in flumine Pegu. Exploratur bonitas ore & lingua. Nam frigidiores & duriores, meliores reputantur. Nascuntur in lapidea matrice rosei coloris, primumque candicant, deinde paulatim maturescentes ruborem contrahunt. Hinc albi immaturi. Nascuntur plerumque in eadem fodina, ubi Saphiri reperiuntur.

Ccc

Vires.

Vires. Tradiunt rubinum gestatum, vel elibitum, venenis resistere, ac a peste preservare, tristitiam arcere, libidinem coercere, malas cogitationes, & terrentia somnia auertere, animum exilare, corpus incolume conservare, ac si homini infortunia insint, eam mutatione coloris in obscuriorem significare, usque prateritis iterum pristinum colorem recuperare.

PRÆPAR.

Rubinus preparat. more communi.

VI. Sapphirus:

Sapphirus est Gemma cœruleo colore, pellucida & diaphana. German. Sapphir.

Sunt aliquæ colore cœruleo albida, aliæ cœruleo saturo: hæc mares, illæ femellæ appellantur, aliæ omni colore carent, albæque vocantur.

Orientalis inveniuntur in Calecut, Cabanor, Bisnagar, Zeilan, & præstantissima in regno Pegu.

Occidentales, variis in locis reperiuntur, Confinia Bohemæ, & Silesiæ satis præstantes ferunt. Præstantiores tamen sunt Orientales.

N. Color in igne facile auferitur.

Vires. Est frigida & sicca, asstringens, consolidans, alexipharmaca, cordi ac ophthalmica. Proinde oculorum humiditates exiccat, inflammationem auget, & extinguit (in collyriis adhibita, aut huiusmodi lotio excepta, palpebrisque oblita superioribus,) valet ad omnia alvi pressuram, dysenteriam fluxum hepaticum,

hamorrhoidum, sanguinisque rejectiones (assumpta cum ∇ plantag. tormentill. &c.) Ulcera interna & vulnera sanat, cor corroborat, & laticat, pesti omnique veneno, febribusque malignis adversatur: cardiacos ac melancholicos affectus quousque lenit, tollitque (intus exhibita.) Integra Sapphirus fronti adhibita, hamorrhagiam sistit, ac inflammationibus applicata, eas extinguit. In orbiculum redacta nisi magnitudine ac perpolita oculis imposita, pulveres, oculices, & quicquid in oculum deciderit, auferit, oculos a variolis & morbis tutatur, &c.

PRÆPAR.

1. Sapphirus præp. fit modo communi, leviganda cum ∇ cordiali.

2. Sal.

3. Liquor seu oleum.

N. 1. Sapphirum duplo pondere Sulphuris commixtam calcina, calcem ∇ affillatitia sapis ablue, rursusque exicca. Postea spiritum Vini persunde ac macera, tum rursus exicca, quodque in fundo remanet, iterum calcina, destillaque toties, donec in Vino liqueat, nixis instar, tandem abstrahit, & provenit sal, quod in loco humido in liquorem solvitur, Boët de B.

N. 2. Alii solvant Sapphiri pollinem in Acet. destil. & succo limonũ, solutionemque cum alio cordiali exhibent mixtam.

Essentia seu Tinctura

Calcinatur Sapphirus bis, ac per oleo ∇ solvitur, abstracto deim oleo ∇ cum ∇ Essentia extrahitur B. de B.

VI. San-

VII. Sardius Lapis.

Sardā, Sardius Lapis est Gemma semper speciosa, loturę carnis, seu carni sanguinolentę similis, unde & Carneolus, vel corruptę Corneolus vocatur, Germ.

Carneol.

Non omnes uniusmodi inveniuntur coloris, alii enim sunt rubri, alii exigua sanguinis rubedine tincti, alii subflavescentes ex rubedine.

Laudatissimus Carneolus in Sardinia invenitur, hinc in Epyro & Agypto, sed Babilonius ceteris præferunt, Indici & Arabici etiam non contemnendi, ut nec Europęi. Nam in Bohemia, Silesia, aliisque Regionibus præstantes inveniuntur.

Vires. Pulvis ad omnem sanguinis fluxum propinatur. Gestatus fertur animum exhilarare, timorem pellere, audaciam præstare, fascinationes prohibere ac corpus contra venena quavis tueri. Inprimis autem sanguinem undecunque fluentem peculiari proprietate sistere: ventrique alligatus parum conservare.

PRÆPARATA.

Sardius præparat. modo communi.

VIII. Smaragdus.

Smaragdus est Gemma pellucida & diaphana, grato suo virore pulcherrima, omnium gemmarum fragilima, Arabicę Zamarrut, nonnullis Prasinus, Germ. Smaragd.

Sunt alii Orientales, alii Occidentales.

Orientales, uti sunt virore amœ-

nissimi, ita & præstantissimi.

Occidentales sunt, tūm Peruviani, tūm Europęi. Hi reperiuntur in Cypro, Britania, aliisque in locis, sed reliquis sunt ignobiliores.

Vires. Omnem alvi sanguinisque fluxum, & præcipuę dysenteriam ebibitus sistit, nec refert utrum à mordaci humore, an à veneno ortum ea habuerit: venenatis item morsibus, pesti, febribus pestilentibus medetur.

Dosis gran. 6, 8, 10.

Inter amuleta præcipuę commendatur ad Epilepsiam, partum accelerat, (alligatus coxę) eundem retinet, (impositus ventri) Hemorrhagiam sistit, (ore conditus) dysenterias omnes, ac hemorrhoidum fluxum indubitato compescit, (ventri adhibitus; teste Guainerio.) Timores ac Terriculamenta arcere fugareque, ac hamivritam febrem tollere creditur, (è collopendulus, &c.

N. Frangi Smar. in coitu quandoque experimento comprehensum dicunt, Card.

PRÆPARATA.

1. Smaragdus præparat.

2. Sal & Tinctura Smaragd.

Smaragdus pulverisatur, ac per linteum trajicitur, hinc superfunditur Spirit. Urinæ, qui aliquid phlegmatis adjunctum habet, ut colorem extrahat; spiritu dein iterum destillatione abstracto, in fundo remanet Extractum (sal) gryseum, è quo tandem (citra edulcorationem) vi V extrahitur color seu Tinctura summę viridis:

Ccc 2

abstra-

abstrahere igitur ad aliqualem consistentiam & serva.

Dosis gran. 10.

B. de B. Hartm. in Practic. de Dysent. Tenizel. in Exegeti sua, Finck. in Enchirid.

Vires. Dysenteria & fluxibus alvi quibuscumq; mirifice potest, nec minus utilis est in cordis & capitis affectibus, Palpitatione, Melancholia, Paraphrenitide, Syncope, &c.

N. 1. Urina, quicquid potest visui salis facit: hinc non errabis, si ∇ stillatitiam, convenientem Sal com. urinæ acuatam loco menstrui adhibueris. In primis quoque, quia Urina simpliciter destillata, nisi sale suo acuatâ sit, laborem irritum facile reddere potest.

N. 2. Tinctura hac nihil aliud esse videtur, quam Elixir, constans partim ex Smaragdi substantia, partim quoque ex sale Urina, dicta substantia commixto.

C A P I T V L

De Corallis.

Lapidibus pretiosis subjungimus Corallia & Margaritas, utpote quæ non modo substantiâ & viribus, sed & præparationibus, & inderesultantibus præparatis, Gemmis adsimulantur.

Corallium est frutex sub aqua marina generatus, Græcè κοράλλιον & λιόδενδρον Arabicè, Bassad, Mergen seu Morgian, Beld, Latine; Corallium, Coralium, Corallum. German. Corallen.

N. Corallia generari ex succo lapidescente certum est: utrum autem succus ille per se in fruticem lapideum prorumpat, vel an prius ligneam suscipiat figuram subindeque in lapideam vergat, vel denique an plantam (emortuam) sub marina aqua repertam, penetret, transmutet, adeoque huius figuram retineat, dubium: Dubitandi occasionem præbet, quod frutice Coralliorum dentur, qui ex parte

ligni adhuc referunt substantiam, partim Coralliorum. Nos posthabitis ejusce farina dubitationibus, qualis præter hanc, & illa est, quam habent de fructibus Coralliorum granulatis, quos alii negant, alii perhibent: item de induratione, quam alii fieri statuunt, simulac Corallii frutex extra aquas esse incipit, alii etiam in ipsa ∇ Corallia indurari volunt: utpote quas scire parum est emolumentum, ignorare parum detrimentum, pergitur ad ea, quorum Medici interest, differentias scilicet, vires & præparationes.

Differentia.

Corallii variaz sunt ratione colorum differentia: aliud enim rubrum est, aliud nigrum, viride, subflavum, cinereum, fuscum, aliove mixto colore ornatum. Cæteris omnibus præfertur rubrum minit nati colore, quod masculi nomen obtinet; & hoc recipiendum quoties simpliciter coralli-

corallium præscribitur sine coloris mentione. Palescens scæminæ nomen habet. Huic succedit corallium album: deinde nigrum, (Antipathes olim dictum.) Nam quod alio colore est, neque in usum adhibetur, neque pro corallio, vulgo habetur.

Rubrum, in India & Siene, teste Plinio, reperitur, nunc in Mari Tyrreno & Siculo passim invenitur, Neapolimque adfertur, ubi politur. Hoc antequam rubescat, & quodammodo maturum fiat, videtur variis coloribustingi. Nigrum reperitur in Gallicia Hispaniæ. Album reperitur rarò, solidumque est, & cavitatibus caret, quibus signis distinguitur à specie quadam, Hispanis Polo dicta, quæ in Catalonia ab iis qui corallium rubrum quærunt, inventa pro corallio albo pretio viliori dividitur. Carer hoc cortice, crescitque in fundo maris, non in faxis, ut rubrum corallium.

Vires. Corallium omne exiccat, refrigerat, adstringit. Cor præcipuè, deinde ventriculum & jecur roborat, sanguinem purificat, ac proinde pesti, venenis, febribusque malignis adversatur, bilarem hominem efficit, (nigrum tamen Corallium homines melancholicos reddere perhibetur,) sistit fluxus quoscunque alvi, uteri, penis, Gonorrhæam, Epilepsiam infantum præcavet, (siccens nato ante omnem cibum in lacte materno gran. 10. exhibeantur.) Extrinsecus commendatur ad ulcera, quæ carne ex-

plet; ad cicatrices, quas extenuat; ad oculos quorum etiam lachrymas sistit, usumque recreat in collyriis.)

Dosis à ℥i. ad ʒj.

Rutilantia Corallia ex communicatione Paracelsi amuletum exhibent celebre contra terribilamenta, fascinationes, incantationes, venena, Epilepsiam, Melancholiam, Daemonum insultus, fulmina. Album appensum, ut pectus contingat, hamorrhagiam sistit mulierum, & fluxum album.

PRÆPAR.

Operationes, quibus Corallia elaborantur, sunt 1. Preparatio. 2. Calcinatio. 3. Solutio. 4. Coagulatio. 5. Liquatio. 6. Sublimatio:

I. Preparatio.

Preparatio nihil à regula communi diversum habet.

II. Calcinatio.

Calcinatio Coralliorum est vel Ignitionis vel corrosionis.

Calcinatio Ignitionis est tum mitior, tum violentior, tum restinctoria.

Calcinatio mitior.

Fit igne reverberij, dando tamen calorem secundi gradus, ne tinctura seu color ipsorum ignis violentia exhalet. Quercet. de preparat. Medic. Spagyric.

Ignitio violentior.

R. Corall. integror. q.v. calcina Δ reverberij primum lento ut saltem viva flamma corallia in furno reverberij posita, superficietenus lambat. Corallia hoc modo; primo gradu

gradu albescentia, tamdiu Δ gradatim aucto fatiganda sunt, donec ex albedine in flavedinem, ex flavedine in rubedinem summam reducantur, corpore toto reddito spongioso ac levi, id quod plerumque biduo vel triduo absolvitur.

Sic Corallia facta sunt habilia ad deponendam in Ψ tincturam. *Hartm. in Croll. Sen. inst.*

N. Si *Sal. com.* Coralliorum propriè dictum desideras, vehementi ustione eadem in cinerem redige, moreque solito, lixivium inde faciendo, salem elixirviando extrahe.

Calcinatio Ignitionis extinctoria.

R. Corall. grossè trit. candescant in igne, extinguanturque multoties in Aceu. destill. ut solvantur. Filtra dein abstrahèque Acet. destill. & consequentia sal corallorum per deliq. resolubile. *Med. destill. part. 1.*

Calcinatio Corrosionis. 1. Cum Sal. nit.

R. Corall. tritor. atque Sal. nit. ana crema. ut duodecim horis fusa, liquoris modo fluant: vel combure ad consumptionem Sal. nitri, deinde duas horas candentia in igne consistent. *Less. 1. cap. 8.*

Aliter.

R. Corall. subtiliter trit. ac Sal. nit. ana M. injice per vices in retortam tubulatam candefactam cum Excipulo apposito. Tubulum ab injectione statim obtura, & cum penitus materia in-

jecta fuerit, continuo Δ e hor. 18. corallia probè calcin.

Hec adscribitur Hartmanno, unde Tincturam fecisse dicitur.

2. *Cum Sulphure.*

R. Corall. trit. p. iij. Sulphur. p. l. (alii an.) calcina Δ circulari per hor. 2. Postea ignita adhuc infunde in Acet. destil. (ad coral. 3i. Acet. destil. lbj.) vas mox operculo claudendo. Hinc digere per 14. abstrahè, &c. *Sennert. Instit.*

3. *Cum Pumice.*

R. Corallia grossè contusa F. cum pumice usto S. S. S. cementaque in vase clauso, Δ reverberii, spatio 8. 3. Quo opere finito pumex, relicto corpore albo, coralliorum tincturam imbibisse creditur. *Gans. de Corall. verum impugnat id ipsum Tentzel. in exegefi, p. m. 512.*

III. *Solutio.*

Liquores, quorum beneficio corallia solvi possunt, varii occurrunt. Præcipui tamen sunt Acet. destill. commune & radicatum: succus, berber. melon. citri. rosmajalis, (spiritus ejusdem cum suo Sal. com. acuatus:) liquor betulæ: spiritus mellis, terebinthinæ, ligni guajaci, buxi, juniperi, quercus, summitatum alni, sorbi sylvestris, spir. Sal. com. spir. Θ , spir. Tart. ut & Ψ iisdem acuatus, spir. corallior. ardens; Phlegma Hi, optimus. Spiritus Paris. &c.

Quinimo corallia cum Sulphur. calcinata, simplex solvit ∇ .

Modus solvendi nihil peculiare habet: Nimirum corallia in liquoris f. q.

sq. solvuntur, scilicet donec penitus fere soluta sint.

Purificatio & Edulcoratio salis & Magisterii fit plerumque ∇ destill. vel si placet, adhibere poteris rorem majalem è tritico collectum & destillatum, aut aquam aliquam cordialem: coagulantur dein vel liquoris abstractione, (tùm destillatoriâ, tùm Evaporatoriâ) vel præcipitatione.

Præcipitatio perficitur instillatione Ol. Tarr. p. d. spir. Θ i, vel ∇ destillatæ, vel Ol. Sulphur. p. c.

Reliquæ operationes ex sequentibus facili innotescunt.

PRÆPARAT.

I. Corallia preparata.

Fiunt cum ∇ cordiali (rosarum) la.

N. In usu sunt preparata rubra ac alba.

II. Pulvis Corallorum Θ latus.

\mathcal{H} . Corall. rubr. præp. \mathfrak{z} ij. Ponantur in cucurb. affundendo aq. ros. \mathfrak{z} vi. Θ li \mathfrak{z} ij. Statim ebullient & elevabuntur in bullas, quibus cessantibus reponatur vasin MB. per horas aliquot, effundatur aq. per inclinationem, quæ erit insipida, in fundo reperies calcem albam cum acore astringitorio, sed acrimoniâ carentem.

III. Sal Corallorum.

Firex rubr. corall. r. Usitatus per Acer. destill. ut moris: vide supra.

2. Per succum berber. & limon.

Quereetar. in Pharmacop. rest.

N. Nonnulli \mathfrak{z} i. Succilimonum expressi & depurati \mathfrak{z} ij. liquoris betula mense Aprili collecti \mathfrak{z} viij. coquunt ad casum \mathfrak{z} viij. cui denud addendo succi Limon. \mathfrak{z} i. destillant aliquoties rectificando. In hoc solvunt corallia, perlas, & simul. solutionemque propinant. Hartm. in Croll. de perli.

3. Per spiritum seu liquorem acidum Guajaci. Sic purgat optimè sanguinem in lue venerea. Hartman. in Pract.

4. Per spiritum Θ i.

5. Per spiritum Sal communis.

N. I. Solutiones cum spir. Θ i aut Sal. communis factas si citra menstrui separationem in usum vocare volueris, circula aliquandiu & magnam acrimonia partem amittent, præcipue si quoque ∇ m affuderis.

Vires. Ex superioribus repete.

Dosis à gran. 6 ad 20.

N. 2. Paracelsus calcinat primo corallia leviter in reverberio cum Sal. nit. ana: hinc solvit digerendo cum ∇ . Postea ∇ abstrahit, salque relictum per deliquium solvit, idque vocat Magisterium, libr. 6. archid.

IV. Sal dulce corallorum.

Calcineantur per biduum in furno figuli ad albedinem summam, solvantur in Acer. destill. sequenti loco tepido per octiduum. Rubescet solutio, menstruum abstrahit lento Δ ad siccitatem usque, sal hoc resolve pluries in Rore majali, filtra & coagula, tandem siccatissimum & al-

& albiſſimum ſalem detine per 3. ſeprim. in F calidis, ut maiorem acredinis ſuæ partem deponat.

N. *Acet. deſtill. pro hac ſolutione bis aut ter cohobandum eſt ſuper herbam Kali, ita minus fit mordax & tamen non minus corallorum, ut & perlarũ ſolutivum.*

V. Magiſterium.

I. Magiſterium Officinærum.

Inſtilletur in ſolutionem corall. (cũ Acet. deſtill. factam) Ol. Tart. per d. præcipitatus pulvis edulcoretur ∇ a deſtillata.

N. *Alii præcipitant cum ſpir.*

Θ . *Vites. Ut Magiſterium à ſale non differt ſubſtantia: ita nec viribus, nec doſi.*

2. Magiſterium butyracum.

Solve corallia in ſpiritu magico, (id eſt, ſpiritu roris majalis, vel quod idem in Acet. deſtill.) præcipita cum Ol. Sulphur. per C. præcipitatum edulcora ac digere aliquamdiu cum Vi, quociterum abſtracta habes magiſterium in ore inſtar butyri liqueſcens.

Huc referri poteſt & Galreda Coralliorum. \mathcal{R} . Corall. præparat. & * Fiat deſtillatio ex Arena ſic aſcendit Sal, remanebitque in fundo maſſa inſtar Galredæ.

3. Magiſterium plumaceum.

Solve ſ. a. corall. in ſpiritu non de

phlegmato, deſtillato ex Sal. com. & O. ana lbj formatiſc. cum argillæ lbj. vel iij. in globulos, videlicet vel per vices injiciendo corallia in ſpiritum, vel è contra corallis ſpiritum eundem per vices ſuperfundendo: decanta ſolutionem, filtra, [affundendo, ut eo commodius filtrari poſſit, ∇ deſtillatam roſatam, ſi placet.] præcipita cum Ol. Sulphur. p. C. vel ſpiritu. Θ i edulcora ∇ cordiali & exicca.

N. 1. *Cũ corallia velut aſcendere deſinunt, menſtrum debilitari incipit, ſubſiſte igitur & inſpiſſa aliquantulum.*

N. 2. *Menſtrum ſuperius ſitandem igne fortiffimo fatigaveris, aſcendit materia ſalina rubefcens.*

Aliter.

Solve ſ. a. corall. in ſpir. Sal. nit. filtraque [affundendo ∇ pulv. deſtillatam,] hinc præcipita cum Ol. Sulphur. p. C. edulcora & exicca.

N. *Hoc modo in magiſteriis præſtantiæ redigi poſſunt & perla, oſſa, cornua, (e. gr. C. C.) ungula, nec non cruſtacea.*

En Candide Chymicæ cultor, inſignes plumaceorum magiſteriorum proceſſus gratis tecum communico, magni alias emptos, quos cum plurimis aliis ex communicatione obtinui Viri ſolertiſſimi Dn. Joannis Saltzwedelii Pharmacopœi apud Mœno-Francofurtenſes celeberrimi.

N. *Querc. ſolvit in ſpiritu ſalis Natræ Pharm. reſt. c. 24.*

4. Oleum

Vl. Oleum seu liquor corallo- rum.

N. Oleum Corallorum propriè oleum non est, sed liquor, vel per deliquium factus, vel per destillationem prolectus, de priori hic agimus, de posteriori paulo post, in spiritu.

Fit liquor ex sale.

R. Sal. corallorum repone, ut lique-
scat per deliquium.

N. 1. Liquefit felicius mensibus Iulio
& Augusto.

N. 2. Liquefit promptius si solutio ali-
quamdiu (& 14.) digeratur, (ut rubescat)
ac dein (Acet. destil. abstracto) optimè dul-
corata, defecata & purgata fuerit, (solu-
tionibus ac coagulationibus iteratis ut mo-
ris) inò si ulterius cum Vi circuletur. Ve-
rùm hoc Oleum appellandum est potius Es-
sentia, de qua vide Cunrad. Runrabt/ in
Medull. destill. p. 1. p. 215.

N. 3. Alij R. Corall. trij. lbj. Lapid. pru-
nell. lbj. vel lb. i. calcinati fundendo &
3. materiam illam tritam ponunt in cellam
ad liquefendum.

Dosis gran. v.

Vires. Prater vires corallorum supra
descriptas confert & in calculo.

Dosis à gran. 4. ad 15.

N. Vide & solutionem Corallorum, cap.
15. in Bezoard. & compos.

VII. Essentia seu Tinctura Co- rallorum.

R. Salem Corallorum [purifica-
tum optimè per iteratas solutiones ac
coagulationes, vel magist.] volatilisa
nimirum cum V digerendo, ac de-

stillando,] vide volatilisationem lapi-
dum in genere,] Postea abstrahe leni
MB calore Vm, ac remanet Essentia
corallorum, quam si placet ex arena per
retortam propelle.

*Vide Quercetian. in Pharmac. restit.
cap. 24.*

N. 1. Nihil interest utrum sale recepe-
ris per Acet. destill. factum, vel per spirit.
Sal. com. per spir. phlogiston acet. destill.

N. 2. Vi felicius essentiam corallorum
secum per XX transferet, si addideris ali-
quid camphora, e. g. ad Vi, mensur. i.
camphor. 3b.

N. 3. Cunrad. Runrabt/ soluit & di-
gerit 1. cum Acet. destill. quo iterum ab-
stracto soluit & digerit 2. cum ∇ plu-
destillata (NB.) recentissima, 3. cum spir.
Vini.

Vires. Ut preparatio Tincturarum o-
perosior est, quam salis ac magisterii, ita
& virtus earundem fortior.

Dosis, gutta aliquot: vj. ad xv. ad
& ultra.

2. Tinctura Basilii.

R. Salis corall. (per spir.) Sal. com.
edulcoratissimi 3viij. Sulphur. 3b. mi-
xta: leniter comburantur, donec Sul-
phur consumptum sit: Postea contere
tantillum camphoræ cum corallis, idq;
accenso Δ eabsumes, hinc edulcora &
extrahe tincturam l.a. cum V, abstrahe
V ad consistentiam Olei.

N. Maniaci & Melancholici hanc Tin-
cturam curati sunt, Dn. D Gans.

3. Tinctura Quercetani.

Extrahe Tincturam l.a. ex corallis
Ddd calci-

calihatis, (e.g. ignitione mitiori,) digerendo vase H. cl. cum menstruo coacti, de stillato scilicet cum proprio suo saccharo, (id est, cum rore majali, qui cum melle aëreo destillatus,) ad eminentiam digitor. 8. affuso. Menstruo demum abstracto, remanet Tinctura in fundo. *Quercet. lib. de prepar. Med. Spagy.*

4. *Aliter..*

℞. Magister. Corall. extrahe cum Sulphure bezoardico ex re vegetabili profecto, (id est) cum V rectificatissimo) in vase H. cl. ad ignem cinerum. Postea separa & in perfectum Tincturam decoque. *Quercet. Pharmacop. cap. 24.*

5. *Tinctura Hartman.*

℞. Sal. corall. (per Acer. destill.) purificatissimum, impræгна Acer. destill. tantisper, donec nihil istius spiritus amplius retinere velit. Sal. ita imprægnatum digeratur, (or. 26.) in MB. Postea destilletur per Ret. Reverberio clauso vel Balneo sicco, ita tamen, ut prius Phlegma. in utile evaporet. Postea prodeantes spiritus albicantes seorsim, capaci recipiente excipiantur, continuando destillationem, donec omnes spiritus cum oleo rubro instar sanguinis prodierint: separetur spiritus (qui ardens instar V) per Retortam ab oleo rubro, quod in Retorta manebit.

Hoc menstruum (spiritus scilicet hic partim ab Acer. destill. partim a corallis productus) extrahit ex recentibus

corallis impositis tincturam rubicundissimam, quæ si rursus ab hoc spiritu per destillationem liberata, & tandem cum V, vel alia aliqua V cordiali appropriata digesta perque cohobia volatilis facta fuerit, elegantissima evadit. corallorum Tinctura, suavissimi saporis, fragrantissimi que odoris.

N. Imprægnatio illa fit hoc modo:

℞. Sal. com. Corall. lb. i. Acer. destill. opt. ℥ij. destilla leniter, ut extillet solum Phlegma in spidum; secundâ vice affunde Acer. destill. ℥ij. iterum quod destilla, atque ita perge singulis vicibus. Acer. destill. ℥j. plus affundendo, donec iam acre Acer. destill. inde prodierit, perinde ac affusum fuerit, Hartm. in Crall.

6. *Tinctura Hartmanni, 2.*

℞. Corall. calcina (ignitione violentiori,) q. p. in jice in V. vel in alcohol spiritus. roris majalis, ac paulo post extrahitur tinctura, fecibus, (sine ulla virtute) in fundo remanentibus. Tinctura hæc aliquantulum coagulata, fit rubicundissima, cum quadam dulcedine.

Vires. Est tantarum virium, ut post ejus usum aliquoties repetitum, impossibile sit, ullam impuritatem in sanguine totius corporis superstitem esse posse. Exhibetur in vehiculis convenientibus, à gut. 3. ad 10.

N. Hæc sanè tinctura medico commendatissima esse debet, ob stupendas ejus vires, ut quæ cum spiritibus hominum magnam convenientiam habeat. Hartm. in Crall.

7. *Alia*

7. *Alia Tinctura per acetum
Coralliorum.*

R. Corall. contul. lbij. eliciatur per retortam acetum, id est, liquor acidulus, quo prolecto urantur corallia vehementer, donec reddatur albissima: exempta dein redigantur in pulverem, ex quo s.a. cum aceto illo, digestionem leni, extrahe T. donec Acet. destill. nihil amplius solvere valeat, univetis-que corallis dissolutis, nihil præter terram utilem remaneat. Decantatos liquores destilla in arena ad siccitatem, ut separetur phlegma: Dein recipiente mutato, fac ut igne auctiori & spiritus sublimis per XX propellatur, qui diligenter colligendus. Tandem relictum pulverem album spiritu ☉ penitus solve, eundem spiritum ☉ igne forti abstrahere, corallia relictæ fortissimo igne ure, donec colorem ferè nativum recipiant. His affusus proprius ipsorum spiritus tincturam prolicere dicitur.

N. ✕ ex corall. lbij. dest. vix solutio-
ni dicta sufficiet.

8. *Tinctura per spiritum corallio-
rum ardentem.*

R. Corall. trit. q. v. extrahe tinctu-
ram s.a. digerendo cum spiritu corall.
ardente, [vide infra,] abstrahem-
struum, atque extrahe denuò cum
V. Gans.

9. *Alia per spiritum seu ☿
mellis.*

R. Corall. cum Sal. nit. calcin. extra-
he s.a. cum spiritu mellis, (vide de

melle,) decanta & abstrahere in MB. do-
nec in fundo spissus relinquatur succus,
huic eduleurato, extrahe Tincturam
cum V, habes Tincturam coralliorum
veram. Hartm. in Croll.

Dosis gran. 4 ad 10. vel 12.

10. *Alia per Aquam Tem-
peratam.*

R. Sal corall. (per spiritum ☉) ex-
trahe s.a. cum ☿ temperata, (ex Vi &
spirit. ☉, vide l. 4. in Vino.) decanta,
filtra & abstrahere.

11 *Alia, per Phlegma Hi.*

R. Corallia calcinata, superfunde
Phlegma Hi, cum spiritu acuto Hi. di-
gerantur vase cl. & rubescet men-
struum: abstrahere in B, affundeque V, di-
gereque denuò, ac pelle per retortam,
sic extillabit essentia corallorum rubi-
cunda: abstrahere V ad consistentiam.
Ioh. Agricola.

Vites. Insigne est cordia'e, balsa-
mumque nativum summe exaltat Usus-
que præcipui est in terrore infantum.
Epilepsia, & simil.

Dosis gran 3. 4. 5.

N. Eodem modo possunt solvi corat-
lia cruda, sed tardius.

12. *Tinctura corallorum Hol-
satica.*

1. Fiartale Menstruum: R. Tartari
crud. pulveris lbiv. phlegm. ☉ (spir.
suo volatili adhuc gravidi). lbiii. ☉
ung. lb 1. stent in digestionem ☉ (3)
Dein destilla ex XX per gradus. Δ aper-
to, donec nihil amplius exeat. Rectifi-
ca optimè.

Ddd 2

2. R. Co-

2. *℞.* Corall. subtiliss. pulveris q.v. Superfunde præcedens menstruum, misceque diligenter. Stent in digestionem, sic rubescet saturatè. Filtra & abstrahæ ad siccitatem in arena, & remanet pulvis rubens. Ex hoc extrahe Tincturam per ∇ temperat.

N. 1. In præparatione ∇ a temperata unio iteratis sæpius rectificationibus peragenda est.

N. 2. In præparatione menstrui prioris verum Tartari Sulphur $\times \times$ bico adhaerescere solet.

N. 3. Ex Colcothare elegans Tartarus Θ atus crystallinus parari potest.

Hac habet Lector ex communicatione viri celeberrimi Dn. D. Langelots, Chymiatræ in aula illustriss. Holsatiæ dignissimi, cui Tinctura hac familiarissima est, adhibetque in omnibus affectibus ab impuriatæ sanguinis ortis.

13. Per oleum citri.

His jam addi poterit Tinctura per oleum citri, quod è corallis rubris, crudis etiam tincturam elicit. Huic si dempto oleo vehiculum aliud præbere poteris, tincturam corallorum non contemnendam habebis.

14. Tinctura Corallorum

S. Cloß.

Resolve corallos inf. q. \odot Sal. com. solutionem filtra & abstrahæ \odot forti ∇ ita ut omnes separentur à calce, cui affundes Acet. destill. ex quercubus novellis mense Martio detruncatis, ad extrahendam Tincturam, quæ etir corallis, hyacinthini, evoca menstruum &

remanebit pulvis subtilis, cui superfundes ∇ circulatum, digere, decanta, feces separa à tincto ∇ , quem iterum digeres, ut novas feces (si adsint) deponat ad fundum, tandem filtra & ∇ ad medias abstrahæ. Parum habebis, sed magnarum virium adversus Contracturas.

Dosis $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. per se.

N. 1. Potest etiam parari Tinctura modo Glauberiano cum sale Tartari instar Tinctura Silicum.

N. 2. Fit etiam sublimando corallos cum \ast Tincturam extrahendo cum ∇ ut est in Myroth. loh. Fabri. Adde Rosinccij tinctur. p. 227. cum \mathfrak{ss} . lign. Sanctiant Coryl.

VIII. Floris.

Flores coralliorum parantur ad modum, quo perlarum flores parari dicemus.

N. Fieri quoque possunt flores corallorum sublimatione tum \ast instituta.

IX. Spiritus seu oleum.

1. Spiritus corallorum ardens, supra in quinta Tinctura Hartmanni descriptus est, videturque compositum quid esse ex \ast & corallis, ardereque ratione spiritus \ast vinosi.

2. Oleum itidem d. l. descriptum est.

3. Spiritus Corallatus, Spiritus terra Corallatus.

Fit ad modum quo perlatus spiritus cum terra sigillatæ. Vide ibidem.

4. Oleum

4. *Oleum Corallorum succinat-
um.*

℞. Corall. rubr. pulverifat. ℥b. i.
succin ℥b. f. M. & destilla per retortam,
vel cucurbitam, sic succinum Tinctu-
ram corall. per XX attrahet, in forma co-
loris sanguinei. In fundo vasis resistet
pulvis corallorum colore albus.

Vires. *Oleum illud valet in Epilepsia
& Apoplexia.*

Dosis gutt. 4. ad 8.

N. Huic similis est modus quo Coral-
lia sale subdulci salita, pinguedineque a-
romatica saginata, destillationi subji-
ciuntur, atque ita in tincturam suam dictis
comitibus committuntur, cum iisdem per
Retortam pelli aptam.

X. *Syrupus Corallorum.*

℞. Corall. rubr. grossè contus. q. v.
solve in succo Berberorum vel Limo-
num optimè deputato, coralliis ad e-
minentiam digitorum, 3. 4. 5. superfu-
so. Hinc

℞. Succillius Essentiâ corallina
imprægnari part. ij. Sacchar. cand.
(vel commun.) part. i. coque ad con-
sistentiam.

N. i. Colorem dilutiorem si expetis af-
fusa ∇ destillata conveniente, pro libitu
conciliare poteris.

N. 2. Poteris similiter fieri solutio
cum liquoribus acidis destillatis, Innipe-
ris cil. aut Guajaci.

N. 3. Quercetanus monet solutionem
institui, 1. In vitro subere vel cerâ
Hispanicâ occluso, ne Essentia Corallina
separetur 2. In V.

N. 4. Si quid restiterit nondum solu-
tum huic recens succus affunditur, donec
penitus solutum fuerit.

N. 5. Similiter fieri possunt & Sy-
rupi margaritarum & lapidum pretioso-
rum.

N. 6. Artificium Quercetani ad
concinnandum hunc Syrupum, nullum
est aliud, quam evaporatio lentissima in
MB tepido solutorum corallorum in suc-
co berb. adjectis ℥vi. sacch. ad libras sin-
gulas solutionis, ita ut spatio horarum
12. non exhalet ultra spissitudinem tha-
leri, aut macrocollonis densioris, alias
certo certius soluta corallia a menstruo se-
parabuntur.

Syrupus Corallorum compositus.

D. Sam Cl. & D. de
Mayerne.

℞. Corall. rubr. subtil. in mort. marm.
lævigat. ℥iv.

Succilimon. depurat ℥xii.

Aceti quercin. ℥vi:

Digerantur in B. per octiduum,
quotidie vas bis vel ter agitando dein-
de filtrentur per chartam.

℥. solutionis colata ℥x.

Succi berber. depurat. ℥v.

Tinctur. ros. ℥iv.

Sacch. alb. ℥b.

M. & mediante cocturâ blandâ in
vasè argenteo F. Syrupus, cui inter co-
quendum infundatur Nodulus conti-
nens.

Santal. citrin. ℥ij.

Ligni aloës ℥j.

Ddd 3 Ambr.

Anibr. gr̃ss. xv.
 Mosch. pr. vi.
 Dosis cochl. i. mane ac vesp̃eri longe a
 pastibus.
 Vires. Ex viribus Coralliorum suprà
 callatis & succo Berberorum vires cen-

scenda sunt. Laudatur valde in Diar̃th̃ea.
 Dysenteria, fluxu hepatico ad restau-
 rationem facultatum naturalium, &c.
 XI. Species Diacorall.
 XII. Trochisci Diacoralli Galen.
 XIII. Troch. de Corall. Nicolas.

CAPUT VII.

De Margaritis.

Margaritæ, Perle, (Uniones, si
 magnæ sint) sunt Lapides ro-
 rundi, in conchis nonnullis ex peritto-
 mate eodem quo testæ generantur,
 producti. Arab. Lulu, Germ. Perlen.
 Duplices censentur, Orientales &
 Occidentales: Illæ splendidiores sunt,
 adeoque cæteris præferuntur, & præ-
 sertim Persicæ. Hæ lactescunt, mi-
 nusque sunt splendida. Inveniuntur
 etiam in Europæ locis multis, ut in
 Scotia, Silesia, Bohemia, Frisia, lo-
 cisque maritimis aliis, sed vilioris ex
 sunt notæ. Majores itidem & quæ
 perforatæ sunt, censentur minoribus,
 & non perforatis maturiores & præ-
 stantiores.

Vires. Cordiale præbent nobilissimum,
 quo balsamus vitæ oppressus; viresq; exo-
 luta insigniter recreantur ac confortan-
 tur, proinde venenis pesti & putredini re-
 sistunt, animum ex hilarant. Et hujus rei
 gratia in tantum ascenderunt honorem,
 ut vel agonis tantum extrema recreatio
 communiter inde expectatur.

PRÆPARATA.

Perlarum præparationes iisdem
 sunt operationibus, quibus corallia,
 calcinatione autem ignitionis hanc in-
 digent. Supervacanea igitur illarum
 extinctio in Δ vitæ ardentissima,
 quam vult Quercetanus in Pharmac.
 rest. cap. 26.

Solutio Perlarum iisdem perfici
 potest liquoribus quibus corallio-
 rum.

Purificatio quoque & Edulcoratio
 nihil à coralliorum purificatione pecu-
 liare habent.

Præcipitatio, iisdem cedit liquori-
 bus, quibus coralliorum præcipita-
 tio.

Hinc

I. Præparata Perle.

Præparantur more vulgari, super
 porphyrio lapide lavigando, subinde
 que ∇ cordiale, (verbi gratia,
 rosarum, melissæ, & simil.) aspergen-
 do.

II. Sal Perlarum.

Fit,

Fit, ut in corallis dictum: Solvendo perlas, vel quod [usitatus] in aceto, vel in succo Berber. & Limon. &c. solutionem filtratam ad remanentiam salis inspissando, in spissatamque abluione, ut dictum, vel in solutione iterata purificando ac dulcorando.

N. 1. Non opus habent tritura, quippe: vel integra atque citra digestionem Acet. destill. obediunt.

N. 2. Solutionem in succo Limonum: at Betula Destill. vide de Corallis.

N. 3. Fit quoque Sal Perlarum, in quovis liquore dissolubile, beneficio succi citrei mali, digestionem depurati. Nimirum perla lota, & si placet contusa, in eodem illo succo ad eminentiam 4. digitorum affusa, digestionem interveniente solvuntur, solutionis affunditur ros majalis destillatus, vel ∇ Melisse, decantaturque, solutio: hinc affunditur novus succus citrei depuratus, digeritur, affunditurque iterum ros destill. vel ∇ Melissi, atque decantatur. Et. Et hic labor toties repetitur, donec perla penitus soluta sine reliquis perpanet fecibus. Demum solutio leniori igne inspissatur, ad remanentiam pulveris.

Dosis à gran. 6. ad ʒss. Ex aqua rosis majalis cum manna destillata, vel ex aq. Cinam. cum ∇ rosi. &c. Hartman. in practico.

N. Paracelsus, Sal perlarum, ut & reliquis inde paratis maximas vires attribuit. Processus, inquit, harum esset simplices, tamen, crede experto, mirifica operatio ipsarum (perlarum) est. Non

tamen fit per artem hac virtutum actio, sed in natura ipsarum est, qua in grossa substantia occulatur, & non potest operari, sicut mortuum corpus, sed resolutione facta, vivificatur corpus ejus, lib. 6. archid.

Huic finitimum est.

Sal sive Magisterium Perlarum Riverii.

Re. Perlar. subtiliss. tritar. q. v. impasta cum succo citri vel auranti & relinque aliquam diu. Postea solve cum Acet. destill. s. a. donec perla ex toto ferè fuerint soluta. Collectum acetum misce cum tertia parte ∇ fluvialis, destilla in arena igne primum lento, dein fortiori. Destillatum reafunde capiti mortuo restitanti, & denuo solve, postea filtra, evaporaque admodum lentè, & reses erit perlarum Magisterium.

Vires. Prater vires supra allatas summum est preservativum Athritidis.

Dosis ʒj. ad summum.

III. Magisterium Perlarum.

1. Communest solvendo cum Acet. destill. & precipitando cum Ol. Tart.

2. Butyraceum eodem modo fieri potest, quo Magister. butyraceum corallorum.

3. Plumaceorum preparatio itidem ex corallis repetenda. Confer Rolfinck. Chim. p. 347.

Vires. Vires ex viribus perlarum descriptis facile colligi possunt.

Dosis

Dosis à gran. 6 ad 15.

VI. Oleum seu liquor Perlarum.

Fit per deliquium; modum ex superioribus repete.

V. Essentia, Tinctura, Arcanum Perlarum.

Rx. Perlas q. v. solve cum Acet. destill. & para sal; Sal ita paratum iteratis in Acet. destil. solutionib. ac coagulationib. [rejectionis semper fecibus] purifica, donec nullæ amplius feces ab ultimis solutionib. restiterint, atque adeo ipsæ perlæ ab omni immunditie liberatæ sint. Hinc solve cum ∇ pluviæ, vel rore majali, destillandoque abstrahere humiditatem, idque toties repete, donec interveniente destillatione perlæ sint edulcoratæ, [id quod ostendit aqua postremò destillatæ dulcedo.]

Ac sal ita defecatum, digere vase clauso in MB, (ϕ 8. vel 10.) cum Vi rectificatis, ad eminentiam 2. diggit. affuso. Sic Perlæ cum tempore Essentiam suam instar olei spissi ad superficiem Vi remittent, quam cautè separa, novumque Vi affundendo, laborem repete, quoties visum fuerit. Convertitur enim totum ferè sal, relictis paucissimis feculis, in Essentiam. Hanc de novo cum V aliquamdiu circula, postea leni destillatione MB. Vi separa & serva.

N. Eadem perlarum Essentia cum V per Retortiam, vel per MB seu reverbatorium siccum, institutis cohobis tandem omnis transiit.

Vires. De usu constat ex viribus margaritarum, fortissimarum autem virium est propter summam subtilitatem.

Dosis à gran. 6. ad 14. Hartman. in Croll.

Arcanum, per spiritum Guajaci.

Rx. Perlar. subtiliss. trit. q. u. extrahe f. a. tincturam rubicundissimam cum spiritu Guajaci rectificato, residuum pulverem calcina leniter, atque extrahe iterum bis aut ter cum novo spiritu Guajaci. Postremò calcina fortius, atque iterum extrahe. Extracta coagula in MB ad apparentiam cuticulæ versicoloris, quippe quæ signum est, abstracto phlegmate, solum arcanum seu Essentiam perlarum cum spiritu Guajaci, in forma coagulata restare.

N. 1. Hæc Essentia ac spiritus vix à se in vicem separari poterunt.

N. 2. Eadem Essentia seu Arcanum perlarum cum ∇ melissa, & similibus q. f. subito solvitur, inq. rubentem pellucidum colorem vertitur saporis elegantis.

Vires. Optimè sanguinem mundificat, magnarumque virium est in lue venerea.

Dosis à gutt. 6. ad 14. Hartman. in Croll.

Alia Tinctura.

Rx. Perlar. 3℔. spir. Sal. com. q. f. solve f. a. decanta; abstrahere, ut fiat pultrix, quam elue ∇ stillat. Circula cum V septimanas 6. tandem V abstrahere, le-

he. leni MB. calore. Libav. in Syntagmate.

V. Flores Perlarum.

Solvuntur perlæ cum Acet. destill. solutio digeritur aliquandiu (permensem) dein abstrahitur Acet. destill. & tandem fortiori igne elewantur flores. Libav. in Syntagm. lib. 2. c. 25.

N. 1. Sublimari possunt quoque Margarita & Corallia beneficio *.

N. 2. Flores perlarum per solutionem in H₂O ni describit Hartman. in Croll. p. 474.

VI. Spiritus perlatus, seu spiritus terra perlatus.

R. Sal. vel Magisterii perlarum ℥vi. Terræ sigillatæ lbj. M. ac imbibe cum s. q. olei perlarum, & fac globulos quos exiccatos, destilla per retortam uti destillatur spirit. Sal communis Rectifica & serva pro usu.

Vires. Summum, est secretum in Podagra.

N. Eodem modo fieri potest & spiritus Corollatus.

CAPUT VIII.

De Lapidibus minus pretiosis: qui sunt.

I. ÆTITES.

ÆTites Lapis est veluti prægnans cum quatitur, alio in utero sonante: hujus genera pro diversitate superficie, (scabraz, scil. vel lavis,) colorum, tum materiæ inibi contentæ, constituantur quatuor.

1. Est exterius scabrum colore vario, plerumque nigricante: continet in se lapidem Collimum dictum.

2. Cinerei coloris est, acin se argillam vel margam continet.

3. Terram in se concludit.

4. Præter hos addit Plinius: Taphusium nomine, qui nostratibus incognitus.

N. 1. Dicitur lapis Aquila, quod in aquila nido reperiatur ad promovendum parium ab aquila edeporatus. German, Alderstein/ Klapperstein.

N. 2. Primus Orientalis est, raroque pruni magnitudinem superat.

Secundus & Tertius etiam in Germania juxta Svinfurtum reperietur, pugnique magnitudinem sæpe æquant.

Vires. Partum promovet, si feminibus alligetur, sin brachio, eundem retinet: observare autem expedit, statim à partu esse removendum, ne & iterum ad se trahat.

II. ALABASTRITES.

Alabastrites, *Alabastrites*. Alabastrum, Onyx, lapis candidus notissimusque est, Germanicè Alabastrstein.

Species statui potest Marmoris, verum accuratè pensitatus, ipso mollior est, proinde Marmor incoctum & imperfectum, si ita vis appellare poteris. Hic si ita mollis sit ut cultro

Ecc scin-

scindi possit, gypsum rectius dixeris & est id lapidis, è quo varia torno finguntur vasa.

Ufus rarioris Officinalis est, nec ingreditur usalia, nisi solum unguentum alabastrinum.

Vires. Combustus resina aut pice exceptus durities discutit, stomachi dolores cum cerato leuat, gingivas comprimit. Dioscorid.

III. AMIANTHUS.

Amianthus ($\alpha\sigma\beta\epsilon\varsigma\delta\epsilon$) alumen plumosum, est lapis alumini scissili non absimilis, adeo ut nonnullis inter se confundantur, Germanic. Federtweiß / Steinschlack / Schiefertweiß / (quippe sunt, qui tales ex eo conficere norunt,) Ceindacht / quod elychia ex eodem fiant incombustilia.

Differt ab alumine scissili, quod hoc combustile sit, saporisque astringentis, illud non item.

Vires. Veneficiis resistere creditur omnibus, præcipuè tamen veneficarum. Præterea abstergit, scabiem sanat; si cum ∇ vito & saccharo solvatur, mixturaque ejus exigua portio quotidie mane detur, album fluxum mulieres mox iri sanatum ajunt.

PRÆPARATA.

Præparata Officinalia quæ amianthus ingrediatur, præter unguentum citrinum, nulla sunt. Commendant tamen nonnulla supra modum Linimentum ad tineam puerorum, & ad ulcera tibiæ, quod vide lib. 2.

IV. LAPIS ARMENUS.

Lapis armenus est lapis maculis viridibus, cæruleis & subnigris relucens, sicut lapis lazuli punctis aureis, adeoque non differunt inter se, nisi solâ maturitate, uterque enim in unis iisdemque scaptenfulis reperitur. Lazuli tamen lapis ceu maturior, crebrius invenitur in fodinis aureis; armenus in argenteis.

Dicitur lapis armenus seu armenius $\Lambda\delta\delta\epsilon\alpha\gamma\upsilon\epsilon\upsilon\iota\delta\epsilon$, quod olim ex Armenia solum ad nos translatus sit, hodie tamen & in Germania producitur, verbi gratia, in Comitatu Tyrolensi sub nomine Melochites. Dicitur Arabicè Hager seu Hagiar, Germ. Armentierstein / Bergblau.

N. Præfertur colorato cæruleus.

Vires. Desecat mediocriter, extergit cum levicula acrimonia & levissima adstrictione. Internè propinatus purgat sine noxa humorem Melancholicum, $\alpha\upsilon\tau\omega\varsigma\ \eta\gamma\epsilon\iota\alpha\delta\alpha\tau\omega\varsigma$. Verum similtoties, (12. aliis 50.) lotus fuerit, purgat solum per inferiora. Hinc conducit in Mania, Melancholia, Epilepsia & similib.

Dosis in substantia ʒj. ad ʒiv. Extrinsecus miscetur Medicamentis ocularibus, uti & Psilothris palpebrarum.

PRÆPARATA.

1. Lapis creberrimè lotus, quem præparatum vocant.
2. Pilula d. l. armeno, vide Diss.
3. Magisterium sit l. commun. Lapis, calcinatur per fl. Sulphur. hinc solvitur calci-

calcinatus in aceto fortissimo alkalifato aut mellito. *Querc. Ph. restit.*

N. Mallem equidem lotum adhibere lapidem, vel solutionem cum Ψ perficere, quippe vis purgatrix aciditate infringi apta est.

V. LAPIS CALCARIUS.

Lapis Calcarius, est lapis ille gryseus ex quo violentia ignis conficitur calx muraria, Germanicè *Kalkstein*.

Officinalis non est, nisi in PRÆPATIS, quæ sunt.

1. Calx viva, Græcè *ἀραιός*. Arabicè Herach, Nure, Nura.

Vires. Est ignea, mordax, adurens, cumque progressu temporis crustam gignens.

2. Calx lora, (è qua sal optimè f. a. elixiviatum.) Exiccat sine mordacitate, adeoque valet ad contumacia ulcera, (verbi gratia, venerea) uti & ad ambusta & alia, quæ non facillè curationem admittunt.

3. Lixivium, quod conducit ad vulnera putrida eluenda. Quin imò ex eodem fit ∇ ophthalmica insignis quam vide lib. 2.

4. Spiritus. R. Ψ q. v. læviga minutissimè, imbibeque cum Ψ i alkalifato, (qui ab omni Phlegmate purus sit, alias incassum laboratur,) quantum scil. imbibe illa potest, (non ad eminentiam) abstrahere Ψ leniss. MB calore, cum co-

hobius (8. vel 10. repetitis) sic fortificatur vis ignea. Ψ .

R. Hujus Ψ lævigatæ, ζx , Sal. com. Tartari puriss. ζj .

\odot Tart. probè prius igniti ζxi .

Misc. ac destilla ex Retorta lutata, infra medietatem repleta, in excipula duo, quorum unum (in quo sit parum Ψ rectificatiss.) destinatum sit suscipiendo spiritui, adeoque capacious alterum (quod vacuum) extillanti phlegmati.

Excipulum prius connexum sit cum canali ex alterius illius excipuli collo deducto, posterius sit collocatum, ut phlegma recta delabi possit. Accenso igne stillat primum phlegma, quod delabitur in excipulum vacuum; dein auctiori igne prodit spiritus albicans, qui per canalem in alterum illud excipulum ad Ψ recta tendit, eique sese commiscet, ut separari ab invicem difficulter possint.

Rectifica aliquoties, & separa leniss. calore Ψ in phiola, vel accende Ψ qui effligrabit remanente spiritu Ψ in fundo.

N. 1. Nisi Ψ initio cum Ψ , ad modum dictum fuerit imprægnata, adeoque exaltata, in cassum laborabitur, quippe defluit in excipulum minus, vique phlegmatis commixti nullius evadit valoris.

N. 2. Spir. primo flavus est, verum leniter in cin. rectificatus, clarescit.

Vires. Summum est arcanum in atterendo radicitusque pellendo calculo,

cujuscunque species, aut loci. Confert & Podagricis. Pulmon. nocet.

In usu Pharmacopœtico solvit Chrysallos, oculos ☿, lapidesque durissimos. Kest. lib. i. c. 80. spiriens minerales volatiles figit. Basil. in rep. L. P.

N. Alii misceri ☿ cum bismutho, ac destillant ex ☿ in receptaculum capaciss. aliquot (sex) mensuris ☽ adimpletum.

5. Hinc spiritus ☿ alcalisatus.

R. Sal ☿, solve in spiritu ☿, ac forma globulos cum argilla, vel misce cum pulvere laterum, destillaque per retortam.

VI. LAPIS CALAMINARI.

RIS.

Cadmia lapidosa, cadmia metalli expers, est lapis fossilis, subflavus, non admodum durus, luteum dum accenditur fumum eructans, Germ. *Galmei* / *Galmeinstein*.

Reperitur sæpius in metallorum fodinis.

Vires. Siccat leniter, extergit, adstringit, ulcera carne replet, cicatricem inducit. Adhibetur solum externè, creberrimòq. usu infantum excoriationibus exiccationis ergo inspergitur.

N. Viuntur eo & arariis ad conficiendum aurichalcum, cuprum enim pallere facit.

PRÆPARATA.

1. Lap. Calamin. præparatus.
2. Emplastr. è lapide calaminari, vulgò Zelttenpflaster / August.

3. Empl. Gryseum de lapide calaminari August.

Vires cum lapide calaminari communes habet.

4. Magisterium lapid. Calaminar. S. Cloß.

Solvitur in part. x. ☿us Sal. com. deinde præcipitatur pulvis rubeus cum Ol. Tart. more vulgari & dulcoratur sæpius aquâ calidâ.

Evacuat per vomitum & secessum, minus quàm ☿ præparatum.

VII. CALCULUS HUM.

MANUS.

Calculus humanus est, qui in hominum copore generatur, hoc etsi variis accadat in locis, tamen maximè in renibus & vesica, è qua eximitur sæpe lapis, lapidi Bezoar figurâ non abfimilis, Dicitur & Ludus.

Vires. Summè valet ad tartarum in omnibus corporis partibus, imò ad calculos etiam grandiores resolvendos, expellendos, adeoque ad obstructions inde ortas referandas.

PRÆPARATA.

I. Sal. Lud. crystallinum.

Ludus cum carbone calcinatus ebulliat in ☿ fervente: quod indissolutum manet, calcinetur iterum ebulliatque, idque toties repetitis vicibus, donec ludus penitus sit solutus. Solutiones filtratas coagula, & habebis Sal.

Hoc Sal, quia sulphure scater imputo, denuo cum carbonibus (anat.) calcinatum solve ut prius, filtraque: hinc

hinc per evaporationem coagula, vel si lubet aliquot solutionibus & coagulationibus purificatum atque in crystallum redactum, serva.

N. Kesslerus solutioni adhibet Acet. destill. l. 4. c. 26.

Calcinatio.

Calculus pulverisatum primo leniter ∇ circulari, postea reverberii per gradus, calcina, donec planè videatur in calcem abiisse.

Vel, misce ludum cum duplo carbonum, (precipue faginarum,) + buloque tegula operto in fornace figulina calcina hor. 24. Hartm. in pract. Sennert. Instituit.

Aliter:

Ludum calcina hor. (6.) cum Sal. nit. extrahe Sal. com. cum ∇ . Vini spiritum iterum abstrahere, remanetque sal in fundo.

2. Oleum f. Ls quor Sal. com. p. d.

Elixir ac Essentia.

Elixir ac Essentia Ludi ex Sal. com. parari possunt ad modum, qui in genere de lapidibus descriptus est. Videlicet interveniente volatilisatione cum ∇ , cum quo Sal. com. illud optimè calcinatum digeritur, perque tot cohobis destillatur, donec penitus Sal. com. cum ∇ transferit. Sic habes Elixir, à quo si ∇ in MB leni separaveris, Essentiam in fundo reperies.

Dosis huius Essentia gran. 5. 6. ad 12. singulis diebus in liquore convenienti. Hartm. in pract. Senn. Inst.

VIII. CRYSTALLUS.

CrySTALLUS, lapis transparens est, 2. quam in glaciem congelatam, omnino referens. Dicitur CrySTALLUS à $\kappa\rho\upsilon\varsigma$ id est, gelu, & $\sigma\tau\iota\mu\alpha$, id est, contraho, Germ. Crystall.

N. Gemmam, si vocare libet, licet, modo omnium mollissimam dixeris, vel à similitudine coloris, qua gemmas colorata CrySTALLUS refert, pseudo-gemmam verbi gratia, pseudo-berillum, pseudo-topasium, pseudo-saphirum, pseudo-smaragdum, qua veris gemmis molliores sunt. Sic & Iris vocata gemma à colore quem fronti applicata exhibet, CrySTALLI species est.

Invenitur variis in locis, etiam in Germania, Bohemia, Ungaria, Cypro & Lusitania, & nonnunquam in agris

Delectus.

Quantum colorata minimè negligenda sunt, ac precipue pseudo-adamas, quæ aliis nobilior, attamen in præparationibus Chymicis recipitur. CrySTALLUS proprie sic dicta, quæ eligenda est purissima, pellucidissima, ac eximie intensa.

Vires. Facultatis est adstrictoria, adeoque confere dysenteria, diarrhæa, caliacæ, cholera, fluxui uterino præbet lactis abundantiam, atterit calculum rocius corporis, hinc prodest & podagricis.

Si pulveris \mathcal{D} ij. vel \mathcal{Z} j. pondere cum \mathcal{O} amygdal. dulcium exhibetur, curat

Eee 3. eos

eos qui Φ m hauserunt, Boet. de Woodt/
Matthiol. vid. Heer.

N. Sunt qui Crystallum radiis solari-
bus obiciunt hūque concentratis cutem in-
iurunt, loco cantherii.

PRÆPARATA.

1. Preparata in specie sic dicta.

Fit, leg. commun.

2. Sal Crystallorum.

Crystallus calcinata solvitur in Acet.
destill. vulgari, Terebinthinato, s. a. so-
lutio filtratur, abstrahiturque ad siccita-
tem. Materia remanens, Sal. com. Cry-
stallorum: purificatur ut moris.

N. 1. Alii calcinant Crystallus primo
cum Tartaro dein cum Sal. com. Alii è
contra, priorem calcinationem cum Sal.
com. peragunt posteriorem cum Sulphure.
Alii alterutra saltem calcinatione Crystallum
solubilem reddunt. [Exempli gr.
Quercetanus & Boëtius de Woodt / cum
Tartaro.] Quidam pramittunt ignitio-
nem, vel simplicem, vel restinctoriam. Qua
diversitas neminem moveat, modo Crystallus
solubilis fiat. Vide Notas de Calcinatione
Lapidum in genere.

N. 2. Calcinatio vera crystalli extat in
Nuisement. de l'esprit de l'univers. p. 140.
Ex hac calce elicitur Sal nephriticum per
ebullitionem in aq. urtic. major. fortificata
suo proprio sale & \mathfrak{z} ij. spiritus Salis marini,
colori virid.

N. 3. Si Salis huius usum sine mora
expetieris. \mathfrak{z} . Crystallus grossè contus.
candefac ac extingue in ∇ . Raphani
Ononid. Petroselin, & simil. acnata spir.
 Φ i, vel \odot Sulphur. idque multoties (de-

cies) repetatur: filtratura si libet adde sac-
chariq. pl. as habes ∇ ononidis, & simil.
Crystallisatam Boëtius de Woodt.

N. 4. Alii loco Acet. destill. adhibent
 ∇ destillatam Urtice minoris, Boëtius de
Woodt.

N. 5. Neque confertim, neque continuò
Sal Crystalli exhibere licet, præsertim ubi
natura languidior extiterit. Hartman. in
Croll.

Dosis salis à gran 6. ad 16.

3. Magisterium Crystalli.

Solutioni [cum ∇ urtic. factæ, &c.]
instilla Sal. com. fusi aliquid & præcipi-
tabitur, decanta, elue, exicca.

4. Oleum seu liquor Crystallo-
rum.

Solvitur Sal Crystallorum per de-
liquium, ut moris. Sennert. Institut.
libr. 5. part. 3. s. 3. cap. Medull. de-
stillat.

Dosis gran. xv. ad xx.

5. Elixyr Chrysalis.

Fit volatilisatione Salis Crystallo-
rum. Nimirum.

\mathfrak{z} . Salis Crystall. optimè [iteratis
solutionibus ac coagulationibus] pu-
rificati, q. v. digere in fimo equino, vel
ejus vicario MB, cum Ψ , vel cum ∇
urticæ, [vel potius cum Ψ supra urti-
cam destillato,] \mathfrak{z} 14. Dein destilla
per cucurbitam humilem, retortamvè,
sic menstruum secum aliquid Sal. com.
transferet, remanenti materiæ affunde
recens menstruum, idque toties, donec
Sal. com. ferè totum ascenderit. Serva
pro usu.

Boëtius

Boëtius de Woodt/ Beguin.

6. Essentia Crystalli.

Destilla Elixyr Crystalli & abstracte menstruum lento MB calore, ad consistentiam mellis, vel si placet inspissa.

N. Kesslerus Elixyr Crystallorum parat hoc modo.

1. Crystallus calcinat ignitione restinctoria in Acet. destill.

2. Calcem hanc comburit cum Sal. nit. horis duodecim.

3. Hujus massa ℥iv. affundit Acet. destill. ℥x. digerit & p 2. vel 3. in MB abstracta ad siccitatem Acet. destill. remanentiam resolvit per deliquium, oleumque rubrum seorsim colligit, (neglecto albo quod a Sal. nit.) rubrum illud digerit & p 3. cum vino fecesque subsidentes rescit. Claram solutionem tum liquore, e. gr. cum vino exhibet, idque quotidie ter. Kessler. lib. 3. cent. 44.

7. Cremor Crystalli.

℥. Crystall. in Alcohol redacti, Sal. com. Tart. defæcati ana ℥ij. calcinetur in furno Anem. vel in fornace figulinâ, in testâ vitreatâ cum operculo foramine pervio, donec vasa figuli perfecta sint, postea in aq. Urinæ minor. projiciantur, & omnia solvantur in aquam lucidissimam viridis coloris, si quid pulveris in fundo manet, abjiciatur, liquor vero prædicto immitte parum Sal. com. fusi pulverisati, ubi pulvis fundum petet.

Cujus edulcorati dosis erit à ℥℥. ad ℥j. vel solitariè, vel cum cremore Tart. in

hydropè & calculo commendatur. Habuit S. Cl. ex commun. D. Gregor. Horstii feli. memor.

IX. Hematites.

Λιβ. αμαλιν. Lapis est, vel terra duriuscula, sanguinem colore æmulans. Arabicè Seedenigi. Germanicè Blutstein.

N. 1. Lapis Hamatidis nostratibus officinis usitatus, differt à veterum hamatide.

N. 2. Interdum niger est, interdum, flavus, interdum ferri colorem habet.

Reperitur Lapis Hamatites Officinarum in variis Germaniæ locis. Sæpè inter rubricas & ferri fodinas, quales propè Joachimicam vallem Boemiæ, item circa Breslam, aliquando ex Ostracite nascitur, ut propè Hildesheimium contingit. Excoquitur in ferrum lapis hic, adeoque ferri materia existit. Fit etiam hamatites ex magnete usto.

Optimus habetur friabilis, saturato colore niger, qui per se durus est & æqualis, nulla sorde admista, aut septo intermedio, habetque cinnabari similem colorem, sed saturatiorem; loci natalis ratione, Hispanicus præstat.

Vires. Refrigerat, exiccat, adstringit, glutinat, adeoque convenit ulceribus oculorum & pulmonum, oculis lachrymantibus, sanguinis expulsiōni medetur, profluvia, v. gr. hæmorrhogiam uteri, alvi, &c. compescit.

Datur pollen internè à ℥j. ad Div. Ex

Externè modis variis adhiberi potest.

PRÆPARATA.

Hæmatites præparatus fit leg. c. cum
▽ adstringente, verbi gratia, Plantagi-
nis vel Tormentillæ.

N. 1. *Hæmatites per* ∞ *exhibet spir.*
odore ac sapore spiritum ∞ *amulantem.*

N. 2. *Hæmat. cum* * ∞ *tus pulverem*
præbet insigniter diaphoreticum, coloris au-
rei valde jucundum.

N. 3. *Pollen cum aqu. diaphoretica*
maximo cum fructu podagricis exhibe-
tur.

Ex communicatione Clariss. Dn. D.
Langelots.

X. *Lapis Iudaicus.*

Lapis Judaicus olivæ specie subro-
tundus, tener & friabilis est, striis se-
cundum longitudinem discurrentibus
& æqui distantibus, ac si arte (torno)
factæ essent, colore est albo & subcine-
reo.

Reperitur in Judæa, unde *Iudæandæ*
dicitur, hinc & in Silesia.

Dicitur Aetio Lapis Syriacus, aliis
Phenicitæ, Tecolithos, Arabicè Hager
alieudi, & agiar aliheud. Germ. *Juden-*
stein.

Aliqui sexum distinguunt, minores-
que fœminas vocatas, ad vesicæ lapi-
dem commendant, majores masculos,
inter quos aliqui sunt longiores minimi
digiti quantitate, ad renum lapidem ex-
pellendum.

Vires. *Medetur difficultati urinae, cal-*
culos vesicæ, præcipuè que renum rumpit.
(ritus exhibitus.)

PRÆPARATA.

1. *Præparatus fit lege c.*

2. *Sal. &*

3. *Magisterium.*

Calcina cum Sulphure, solveque in
Acet. destill. mellito, vel spirit. Sal. com.
hinc abstrahæ, habes sal, vel præcipita-
cum Ol. Tartari, habes magisterium, e-
dulcorando.

Dosis gran. aliquot. Quercetan. P. resti-
tut. cap. 26.

4. *Oleum seu Liquor: fit per deli-*
quium.

N. *Oleum lapid. Iudaici Lyncis &c.*
per deliquium reperies in Cista med. p.
III.

XI. *Lapis Lazuli.*

Lapis Lazuli, est lapis opacus Saphiri
colore, aut florum Cyani, aureis pun-
ctulis aut flammulis exornatus, arme-
nio durior.

Dicitur *Λίθος κυανός* Lapis cœruleus.
Arabicè Hager, Azul.

N. *Ex hoc fit color ille cyaneus, quem*
ultramarinum vocant; asurum verò ex
lapide armenio, vel cyano germanico fa-
ciunt.

Genere tantum duo sunt, fixus, id
est, colorem in igne non mutans, qui
ferè ex Oriente affertur, & non fixus,
qui in Germania reperitur, ac vulgò
Lasurstein vocatur, unde color dictus
Lasurblau.

Vires. *Viribus convenit cum lapide*
armenio, sed imbecillius eas exercet.
Purgandi facultate præditus est, præci-
pue contra Melancholicos omnes affe-
ctus,

Etus, quarianam, apoplexiam, morbum comitalem, lienis vitia, aliosque complures, à melancholico succo originem ducentes.

Dosis ʒj. in polline subtilissimo.

N. Pro amuleto etiam de collo gestatur, ut puerorum terribilissima arceat, oculorum aciem roboret, syncopem & pragnantium abortum præcaveat, Verum parum appropinquante, ne foetum retineat, auferendus est. Boëtius de Woodt.

PRÆPARATA.

1. Lapis multoties, (in Δ) lotus, quem præparatum dicunt. Lavatur autem ut acrimonia, visque exurendi loturâ auferatur.

2. Magisterium.

Fit cum Sp. Sal. com. melius eum ∇ .

N. Quercetanus Ph. R. calcinat cum Sulphure, & solvit cum Acet. destill. Vini optimo; hinc præcipitat cum Ol. Tart.

Dosis ʒj. & c.

3. Elixir.

Calcinatur Lapis Lazuli in fornace laterum, deinde Aq. vitæ solvitur calcinatus.

Fiorovantus hac solutione multos morbos & febres malignas se curasse scribit, & ulcera etiam pessima in optimum statum ad miraculum usque redegeisse.

4. Oleum seu liquor, qui illitus dolores podagricos, inflammationesque levat.

5. Essentia seu extractum.

R. Lapis Lazuli q. pl. igniatur 6. vel

7. extinguitur que in ∇ , tandem in pulverem redigatur, & cum ∇ m. elissæ ipsius recementa terrea eluantur, (laß abschleichen) redigantur in pulverem tenuissimum, & cum ∇ , digerantur in calore septim. 3. vel 4. dein abstrahatur ∇ , & remanentiam serva.

Dosis à ʒss. ad ʒj. Harim. in præf.

Crystalli purgantes Lap. Lazuli.

Calcinetur forti ∇ donec albescat, teratur in marmore, bulliat in s. q. Acet. destill. per v. aut vi. horas. Decantatum Acet. destill. injiciatur in vas fictile non vitreatum, strictique orificii, s. aut 6. unciarum capax, os testæ cerâ occludatur, reponatur in cella, & transudabit lanugo crystallina intra paucos σ , vasi-que testaceo adhærebit, hanc collige, aliam expecta, & c.

Dicitur hoc Sal. sive flos Lapidis Lazuli acuire panthymagogi vel aliorum Extr. Etorum vires, si illis permisceatur.

XII. Lapis Lynch.

Lapis Lynchis, Belemnites, (ὄνυξ ἢ βελόνη à sagitta, cujus effigiem refert,) seu dactylus Ideus, à figura dactyli & Ida monte Cretæ Insulæ, ubi invenitur, est lapis teres, pyramidalis, sub variis coloribus repertus. Germ. Albofels / Schostein / Luchstein / Zappenstein / (si niger sit.)

Inveniuntur albi, nigri, cinerei, pellucidi, vini talerni instar. Et hic forsitan est quem veteres LYNCEURUM appellarunt, quem succini speciem fefcerunt.

cerunt, ob colorem quo succinum refert, quemque ex urina Lyncis, simulac ea excernitur, coagulari, nonnulli fabulantur.

N. *Petus hic lapis graveolet, & ne ustus quidem odorem deponit.*

Reperiuntur multis in locis Germaniæ, in Borussia, Pomerania, Episcopatu Hildesiensi, Helvetia, Ducatu Würtembergensi, (Göppingæ,)

Vires. *Adhibetur ad calculos frangendos, non aliter quam lapis Iudaicus, Curat vulnera. Putatur etiam ad pleuritidem (quia mucronem habet,) valere.*

N. *Putant lapidem hunc potum contra Ephialtis suppressiones, noctisque ludibria valere, ac fascinationibus succurrere.*

XIII. Magnes.

Magnes est lapis, qui ferrum vel alium magnetem ad se trahit, ac plagas mundi ostendit. Græcè $\Lambda\iota\theta\omicron\varsigma\ \mu\alpha\gamma\eta\eta\tau\iota\varsigma$. L. Heracleus, $\eta\epsilon\rho\alpha\kappa\lambda\epsilon\iota\varsigma$. Lat. Herculeus, sideritis s. magnetis. German. Magnetstein.

Reperitur circa ferri fodinas in diversis locis Germaniæ, Norvegiæ, Sueciæ, Italiæ.

Delectus.

Vegetior plerumque cæteris esse solet, qui ferri colorem habet.

Vires. *Vires habet hamatitidis, teste Galeno, adeoque adstringit, sanguinemque sistit, (ustus) crassos & melancholicos humores educit, sed usus est rarioris.*

PRÆPARATA.

Unguentum Magneticum, seu

Sympathicum, vide lib. 2.

N. 1. *Sunt qui ex magnete usto & cera Emplastrum conficiunt, idque summè ad podagricos dolores leniendos commendant.*

N. 2. *Corroboratio magnetis institui potest, si cum $\Psi\Delta$ mediocri cementsetur, ac postmodum in solutione vel oleo σ extingatur.*

XIV. Marmor & Ophites.

Marmor lapis est insigniter durus ac ad splendorem suscipiendum, si polietur, ita aptus, ut statuar vel columnæ egregiè nitentes inde sculpi possint, Græcè $\mathcal{M}\alpha\rho\mu\alpha\rho\varsigma$ (à splendore) Germ. Marmelstein.

Genera multa sunt, cum nec certa illis figura, nec color certus sit. Alia sunt alba, v. gr. Alabastrites. Alia rubra, Alia nigra, ut Lydius Lapis. Alia variis coloribus, ut Porphyrites, Ophites, de quo hic.

Ophites est marmor instar porphyritæ durissimus, colore viridi saturato, dilutis ejusdem coloris maculis quasi aspersus. Græcè $\omicron\phi\iota\tau\eta\varsigma$. Latine Serpentinus. Germ. Serpentinstein.

N. 1. *Bottius de Boodt / cinereum quoque constituit Ophitem, eumque durissimum, tum & nigriusculis maculis aut punctulis variegatum & hunc mollitie alabastrita.*

N. 2. *Veteres Ophite genera fecerunt. 1. Nigricans durum. 2. Cinereum punctis distinctum. 3. Lineis quibusdam candidis interstinctum, candidum molle.*

Hinc

Hinc apparet veterum Ophiten à nostrate esse diversum.

Foditur noster in locis variis, Italiae & Germaniae, verbi g. in Misnia, quod ramen ob molliem, rectius Alabastris accensetur, diciturque Zeblicium.

Vires. Veterum Ophita omnes alligati contra capitis dolores, & serpentum ictus (ex signatura) profunt, teste Dioscoride. Qui Lineas habent, Lerhargo & capitis doloribus auxiliari dicuntur, arcereque pestem petechialem (ex signatura) Galeno lithonripticus est intro assumptus.

N. Ophita nostrati multa vulgus tribuit, videlicet, poculum inde factum, si venenum susceperit, id sudore prodere. Conducere colica, pleuritidi, torminibus, ac ventriculo refrigerato, doloribus podagricis, nephriticis, si calfactus ophites loco affecto applicetur. Opitulari quartanis, tertianis phibificis, hepaticis, si poculum quotidiano usui destinetur.

XL. Ostiocola.

Ostiocola lapis est albo cinereoove colore, ossisque figuram æmulans. Dicitur lapis Ossisfragus, Lat. Sabulosus, Ostrites, Osteolithus, Holotheus, Morochtus Matthiolo, German. Weinbruch/Bruchstein/Weinwell/Waustein/Sandstein/Steinbein.

Nascitur Darmastatino in agro in Palatinatu, locis arenosis, (an der Bergstrass/) item in Saxonia, in Silesia, &c. crescit per arenam forma Coralli.

Vires. Celebratur ad ossa citò glutinanda, quippe materiam callo idoneam citissime suppeditat, adeoque glutinationem maturat. Adhiberi potest internè ʒj. ad ʒiſs. & externè in catapl. Emplastris, &c.

PRÆPARATA.

Ostiocola præparat. la vigando cum ∇ geranii. Cremor Weinlini prodest hypochondriacis.

XVI. Pumex.

Pumex lapis est erosus, porosus, spongiosus, exiguisque cavernulis, seu foraminibus plenus. Græcè κλαμπς, Arabicè Tanech. Germ. Bymstein.

Invenitur ad Confluentiam Germaniae.

Probantur, qui candore minimoque pondere, ut & qui quam maxime spongiosi, aridique sunt, trituque faciles, nec arenosi in fricando, &c.

Vires. Refrigerat, siccatur, extenuat, ulcera leviter purgat, cicatrices explet, & emendat. Farina adhibetur sæpè medicamentis oculorum, & verendorum. Immisceitur item dentifriciis & sternutatoriis.

PRÆPARATA.

Pumex ustus.

Uruntur trinâ unctione, ita ut torreantur carbone puro, ac toties vino restinguantur albo. Lavantur deinde & siccantur conduntur quam minimè uliginoso loco.

N. Quidam terciâ unctione refrigeratos potius quam restinctos terere malunt ex vino. Boetius de Boedt.

Fff 2

17. La

XVII. *Lapis specularis.*

Lapis specularis est lapis fossilis, instar crystalli pellucidus ac in bracteas tenuissimas scissilis. Dicitur communiter Selenites, aliis alumen Scaiolæ.

Invenitur in Moscovia, copiose item in Hispania, in Saxonia, Thuringia, Marchia, Misnia, &c. Et si autem ut plurimum candidus sit, attamen reperitur & variis coloribus, melleus scil. niger, fuscus.

N. Veterum Selenitem, (aphroselenitem) quia noctu lucebat, à nostrate diversum esse, nemo non intelligit.

Usus est rarioris, nec adhibetur facile, nisi ad mulierum faciem dealbandam, & rugas depellendas. Quidam tamen commendant in Epilepsia.

PRÆPARATA.

Calx & Liquor.

Combuitur igne in pulverem candidissimum, qui per deliquium oleum seu liquorem præbet. Vide Talcum.

XVIII. *Silex.*

Silex durissimum genus saxi est, vel marmore durius, extrinsecus leve. German. Kiesel/ Kieselstein.

Differentiæ ejus plurimæ sunt.

Nam a'ii liquabiles sunt, & plerumque foris albi & pellucidi, Germ. Flußsteine/ weisse Kiesel/ Bachsteine.

Aliqui prorsus diaphani sunt.

Aliqui ita duri, ut ex iis ignis excutiat, unde & Pyrites dicuntur. Germ. Feuerstein.

Aliqui prorsus opaci sunt.

N. Qui mollior es sunt marmore, non

silices, sed lapides simpliciter appellantur.

Vires. Silicum communis usus internus esse potest, ad tartaream mucilaginem incidendam, calculum resolvendum, ac proinde ad obstructions referandas. Extrinsecus frequenti usu in dentifriciis adhibetur.

Pyritis vim possidet calfaciendi, siccandi, discutiendi, digerendi, adeoque Emplastris digerentibus admiscetur.

PRÆPARATA.

1. Sal fit leg. comm. calcinatum solvendo in ♁

Dosis gran. 6. ad 10. vel 20.

N. 1. Calcinatio fit eodem modo, quo Crystallus calcinari diximus.

N. 2. Si ex tempore adhibere volueris restingue silices ignotos in vino generoso, aut aceto idque toties, donec plane in pulverem fuerint redacti ac exhibe vinum. Hartm. in præst. Medull. destill.

N. 3. Querc. solvit cum Acet. destill.

2. Oleum fit per deliq. (mellis. Ph. R.

Dosis ℥j. Medull. destillar.

3. Cremor silicum & crystalli paratur etiam facillimè, ex liquore Silicum descripto in parte secunda furnorum Glauberi p. 136. si scilicet liquor ille diutius in cellâ ferretur, tandem Galredam quandam demittit ad fundum, & Tart. supernatante, quod tam diu evacuandum erit à dictâ Gelatinâ quamdiu aliquid liquoris sursum feretur, deinde edulcandum est.

Cremor hic de facili in quovis vehiculo dissolvitur. S. Clossai experientia, add. Spir. aperit, Penotti.

XIX.

XIX. Lapis Spongia.

Lapis Spongiæ est lapis proflus friabilis, in spongiis concretus, colore candido vel gryseo.

Dicitur Cystelithos (ab usu,) German. Schwamstein.

Vires. Extenuat absque insigni caliditate, ad calculos renum vesicæq. frangendos utilis est. Valet etiam ad strumas discutendas, si nempe omni mane fiat haustus propria urina, & postea in ultima Cæquadra singulis diebus sumatur in vino, cum Sal. commune Tartari & S. Vide Gluckrath. Idem præstat spongia combusta.

PRÆPARATA.

I. Sal.

Calcinatur cum Sulphure calcinatione levi, solvitur in Acet. destill. vel spiritu Sal. com. Item; ignitus toties in Acet. destill. extinguitur, donec in calcem resolvatur.

XX. Talcum.

Talcum Officinis lapis est, speculari lapidi similis, magis tamen tenuis, squamosus, viridiusculus, igni resistens ac fixus. Dicitur à nonnullis Stella Terræ. Germ. Talc.

N. Invenitur & Talcum rubrum ac nigrum (Parac. in Chronic. Carynthia) verum Officinis minus idusitatum est.

Electio.

Optimum censetur, quod Venetiis ad nos transportatur, Muscoviticum tamen æque bonum est, probatur autem præcipue viridiusculum.

Vires ac Usus: Potissimus ejus usus est externus & cosmeticus, adhiberi ta-

men nequit, nisi vinculo suo liberatum, præparatum, ac in liquorum redactum sit.

PRÆPARATIONES.

E præparationibus Talci præcipua est Calcinatio, reliquæ enim operationes, qualis est destillatio & liquatio, per se notæ sunt.

Calcinatio igitur tum est sicca, tum humida.

Calcinatio sicca.

1. Contunditur in pollinem tenuissimum pistillo ferreo, postea forti ollæ committitur, operculo addito, imponiturque furno vitriariorum, figulorum vel calcariorum (in einem Kalkofen) ubi maximæ flammæ sunt. Post triduum aut quattriduum eximitur, & si in calcem redactum sit, servatur; sin minus, reperitur labor, donec perfectè calx dealbuerit.

2. R. Talc. opt. q. v. contunde in mortario candenti, (sic melius teritur Talcum, donec nullum amplius splendorem referat, pulverem trajice per cribrum setaceum, ac cum carbonum Tillæ ana. Misc. calcinaque in fornace singulina & 2. vel 3.

3. R. Talc. subtilissime pulver. lbj. Sulphuri. per Sal. com. calcinat. ana F. S. S. S. ac cimenta in ✕ clauso $\frac{1}{2}$. & ut ✕ candeat. Dein exime ac edulcora. Loco Sulph. prodest Tart. per Sal petr. calcina.

4. R. Talc. opt. in laminas tenues redacti, q. v. candefac ac extingue aliquoties, (duodecies vel pluries) in S. Sulphur. donec fiat candidum instar ni-

Fff 3 vis.

vis. Edulcora ∇ pluviali, & ex sicca. Hinc impasta cum albumine ovi, ac forma globulos, quos in calce viva reconditos, atque \times clauso impositos, calcina \oslash ρ 3. in fornace figulina vel vitriaria & fiet Talcum, instar Chrystallorum; exime.

5. \mathcal{R} . Talc. opt. part. i. Sal. com. p. ij. Misc. & calcina per quadriduum, postea tere & abluere, pulverem exsiccatum panno involutum, obducito luto crasso, ac sepeli in Tart. crudo, calcinaque \oslash ρ 15. tere ac solve in ∇ vitæ, solum coagula.

6. Calcinaur cum Metallis; nimirum injice Talcum argento Orichalco, vel cupro, ad ignem fuso horam dimidiam (hor. aliquot.)

Calcinatio humida.

\mathcal{R} . Talc. Venetian. opt. scinde cultello in particulas subtilissimas, digere in sole ferventissimo, vel fimo equino per mensem, cum Acet. destill. acerrimo Vini Hispanici, quotidie aliquid Acet. destill. superaddendo, donec acetum fiat q. mucilaginosum.

Hinc

PRÆPARAT.

1. \oslash Talc. destillatum, Cosmeti- cum Hartmanni.

\mathcal{R} . Talcum calcinatione humida, (cum \times .) in mucilaginem redactum, destilla per retortam lutat. Δ nudo, in excip. capaciss. Primo prodit Acet. destill. postea oleum album. Hæc separa.

N. Alii Talc. pollinem cum cochleis olla immittunt, ut Talcum devorent, ubi

devoraverint, cum testis easas vitro imponunt, ac ab eis aquam extillant, pro mulierum mangonio.

Vires. Acet. possunt manus abluere, \oslash vero fieri inunctiones.

N. Ajunt, si primo facies fuerit diligenter ab omnibus sordibus purgata, succum integrum mensem durare posse. Hartmann. in Croll.

2. \oslash Camphora Talc. atum.

\mathcal{R} . Talc. crud. (præstat calcinat.) optimè pulverisati part. i. \oslash Camphorat. p. ij. digere ut albescat \oslash Vide de \oslash Camphora.

3. Liquor Talc. sive \oslash per deliquium.

\mathcal{R} . Talc. optimè calcinatum, (calcinatione 1. 2. vel alia,) F. Extractio cum Acet. destill. filtra & coagulat. Edulcora ac reponere postea ad liqueendum in cella.

N. Alii progrediuntur ulterius, atque \oslash cum ∇ circulant, abstrahuntque aliquot cohobis.

Liquor Talc. S. Cloß.

1. Talcum in pollinem terendum est, id quot fit 4. modis, vel enim Talcum ex foliatum calculis fluviatilibus integris permiscetur, sacculo oblongo includitur, & ministerio duorum hominum successivis vicibus agitur fortiter, vel lapidi pumicis continuè affricatur, pulvisque decidens colligitur, qui tamen minus sincerus est, vel in mortario calientissimo contunditur. Ego illud longè facilius, beneficio limæ lavigatoria (une lime douce) aurifa-

rifabrorum in scobem attero, cuius t̄b̄. confundo cum t̄b̄. Sal. com. ac in furno venti per hor. xii. calcino, calcinatum repono in cellā, quod liquefcit se paro à non liquefcente, calcem hanc siccata denuò calcino in tigillo Δ vehementissimo cum part. 4. Sal. nit. Ita Talcum colliquabitur in massam albam pellucidam, quæ in cellā reposita defluit in liquorem glutinosum.

Vires. *lentigines & maculas faciei* ex-est, *curam dealbat*, verum non diu relin-*quendus est liquor*, sed *aqu. florum fabarum, nenuph. &c.* abluenda facies est ne E-*pidermidem* arrodāt.

*Alius liquor atq. Magisterium
Talc.*

R. Talc. grossè trit. (subtilis pulvis separatur) q. v. infunde in Acet. destill. 8 (3. 4.) Hinc superjiciatur plumbo fufo, calcineturq. ad friabilitatem. Hoc solvatur in Acet. destill. Solutioque ab-*strahatur*. Solvatur iterum aliquoties in aq. destillata, purificeturque à fecibus. Tandem præcipita cum spir. ̄i, edul-*cora & exicca.*

N. 1. Solutum ante præcipitationem per deliq. solvi potest, unde liquor.

N. 2. Calcinari itidem potest super a-*liis metallis, v. g. Care &c.*

Ex communicatione amici cuiusdam *Hamburgensis.*

Cremor Talc.

Pulverisetur uno è modis 4. supra-*dictis* affunde Acet. destill. terve, Bull. lento Δ in patinā vitreā spuma pinguis supernatans colligatur cum cochl. de

spumatorio, dum dabitur, Acet. destill. cremori mixtum evaporet, cremor a. resolvatur in phlegmate Sal. com. vel pomatæ alicui permisceatur.

*Inservit dealbanda faciei. Ex comm.
S. Closs.*

4. Tinctura Talc.

R. Talc. optimè pulverisat. q. v. di-*gere cum* ̄i Philosophico, in fi-*mo equino mens. 3. 4.* sic solvetur Tal-*cum*, protrudetque ad superficiem non nihil instar pinguedinis.

Huic affunde V, digere ac abstrahe cum repetitis cohobiis, & transibit tan-*dem XX.*

Alia.

R. Talc. calcinat. extrahe cum ̄u Sal. com. viridi, decanta, abstrahe, ac co-*hoba aliquoties*, sic ascendit tandem & Tinctura, transitque alembicum sub colore rubicundo.

Vires. *Præservativum est efficax in peste, quotidie sumptum. Dosis gran. vj.*

N. *Præstat hic rubrum Talcum sum-
pisse, si haberi possit.*

*Tincturam Talc. rubri vide in Agric. p.
787. tom. secundi.*

Alia.

R. Talc. q. v. affunde Spir. Vitriol. abstrahe aliquoties. m. cum Sulphur. reverbera. Extr. tinctura m. d.

XXI. *Unicornu fossile.*

Unicornu fossile. Cornu fossile. Ebur fossile. Lapis Ceratites, est lapis colore & levore cornu referens, interdum et-*iam forma ipsa, gegraben Einhorn/ ge-
graben Eissenbeim.*

N. 54-

N. Sapius tam crassum ac magnum reperitur, ut à nullo nunquam animali produci poterit. Substantia lapidea semper & vel dura vel mollis est. Exterius ut plurimum dura, intrinsecus plerumque mollis, alba, levis, friabilis, compacta, absque poris, lingua firmiter adhaerens, odore nonnunquam grato. Cortex exterior interdum flavescit, cinereus, albus & subniger est.

Invenitur in variis locis Germaniæ, prope Elbingerodam Oppidum Comitatus Stolbergenſis, prope Heidelbergam, Hildesheimium. Item in Moravia, Silesia, Saxonia, Hassia, multisque locis aliis.

Materia hujus creditur Marga, aquâ subterraneâ lapideſcente irrigata & fluida reddita, quæ pro diversitate matricum in quas fluit, vel & pro diversitate rerum, quibus sese insinuat, sc. lignorum vetustorum, cornuum, ossium subterraneorum, varias quoque su-

scipit figuras & odorem.

Vires. Non omnia habent eandem facultatem, aut æque validam, sed differunt pro diversitate originis, reſque commixta. Vi plurimum excitant, adstringunt, proindeque sistunt alvi profluvia, gonorrhæam, menstrua alba hæmorrhagiam narium, hæmorrhoides. Quod si in super odor medullis accedat gratus, cordi imprimis grata sunt, idque roborant, Epilepsiam arcent. Quæ cum rebus aliis sunt commixta modula, pro earum facultatibus natura mixta censentur. Extrinsecus ulcera ad cicatrices perducunt, oculorum lacrymas sistunt, (in Collyriis.)

N. Frustum hujus generis Cornu non longe Marpurgo Hassia & terra erutum obtatum mihi est, hant ita pridem, brachium crassius æquans, ebori simillimum, nisi quod corticem arboris extorsum figura referret & poro mediano destitutum esset. Hæc referenda ossa Schatzfeldica.

CAPUT XI.

De Metallis.

Et primum de Auro.

Metalla sunt corpora dura, ductilia ex succo salino sive mercurio vitui sulphuris in terra coagulato.

N. Libro primo diximus, res secundarias ex peritomate rerum primaria- rum fieri. Peritoma ergo macrocosmicum veniens in matricem, sive locum metallificum, id est, metallorum generationi aptum, si ibidem subsisterit, suscitatur spiritus seu ignis illius peritomatis,

subindeque vi matricis metalline in naturam metalli facessit. Duobus ergo ut omnia ita & metalla constant; humiditate scil. quæ & vis dicitur, & spiritus seu igne, qui Sulphur. Duo hæc in sale fundata sunt vitriolato, id est, in naturam talem transmutato, qualem natura ad generanda metalla proxime requirit. Hoc sal alteratur ulterius paulatim, nec enim statim metallum evadit perfectum. Quare,

cum

re, cum in natura constitutum sit, ut partes diverse invicem misceantur atque in super mixtio & maturatio fiant successive, particulis scilicet nonnullis, citius ad maturitatem pervenientibus, aliis tardius, aliis crudis aliquantulum manentibus; & in hac metallorum generatione varietatem quandam esse necessum est, quia particule alia maturiores, alia minus matura. Maturiores ergo partes id esse suspicor, quod Philosophi sub titulo seminis metallini eliciunt. Licet enim in Metallis partes adeo compacte & unite sint, ut difficulter invicem separari queant, unde fateri convenit, plerasque laborationes, maxime vulgares, non separatorias, sed solum preparatorias seu exaltatorias esse, id est, quibus metalla circa separationem puri ab impuro, solum alterantur, ut eo melius à calore nostro superari, inque actum deduci queant: attamen separationem illam contra multorum experientias hinc inde annotatas, impossibilem statuere, pertinacium potius est, quam virorum cordatorum. Quin imo non modo cuidam ex amicis meis, sed & mihi fors favit, ut oleum rubicundissimum, aqua supernatans ex \odot elicerimus.

De viribus Metallorum in genere nihil addo, nisi quod tanta inibi a majoribus deprehensa sint, ut principalioribus macrocosmi stellis, macrocosmique membris principalioribus & dicarint, & nomina communia imposuerint, uti patet partim ex sequentibus partim ex libr. 1. cap. 9.

Metalla non ineptè in classes tres collocantur, idque tam secundum conformitatem disparitatemve duritiei, quam secundum convenientiam præparatorium.

Prima continet Metalla nobiliora, \odot & ζ m.

Secunda ignobiliora duriora, σ & ϱ m.

Tertia, Ignobiliora molliora, η & χ .

Præparatio Metallorum sunt.

1. Purgatio.

2. Calcinatio. 1. Immerfiva. 2. Vaporosa ac Illinationis. 3. Amalgamatoria. 4. Cementatoria. 5. Reverberatoria.

3. Volatilifatio: unde Metallum volatilifatum, id est, in spiritualem naturam redactum.

4. Extractio: vel potius maturatio, s. exaltatio; unde Tincturæ.

5. Sublimatio: unde Flores.

6. Salificatio: unde Sal.

7. Mercurificatio: unde φ s.

AVRUM.

Aurum Metallorum cunctorum est nobilissimum, solidissimum, colore fulvum, compactum ex principiis summe digestis, adeoque fixis.

Dicitur Chymicis. 1. Sol, quia soli tum macrocosmico seu cælesti, tum microcosmico, id est, cordi sympatheticè respondere creditur, unde & \odot is signò notari suevit. German. Gold.

Ggg

2. Rex

2. *Rex Metallorum*, quod principatum inter metalla sibi vindicet.

Præstantissimum censeatur Arabicum, hinc Ungaricum, tandem Rhenanum.

Vires. Balsami seu calidi nativi, cordisque summum corroborans est, unde & in omnibus morbis in quibus vires reficienda sunt, cum successu exhiberi poterit. Mundificat insuper sanguinem, noxiorum scil. humorum discussione ac diaphoresi.

N. Crudum aurum foliatum veteres multis commiscuere compositionibus, Verum, me hercle, cui bono, præter quam quod oculos pascat, non video, solidior enim & compactior ejus substantia est, quam ut à calido nostro resolvi, inq. actum deduci queat. Nec sufficit, quod nonnulli mutua cordis ac auri effluvia sympathica statuant, atq. ea propter aurum foliatum exhibent. Etenim præterquam quod eadem facilitate id destrui possit, qua citra rationes adferitur, applicari posset extrinsecus majori in copia, atque dubio procul majori cum utilitate, minoreque vel nullo cum dispendio.

PRÆPARATIONES.

I. PURGATIO.

Purgatio Solis fit, vel à sordibus superficietenus adherentibus vel à metallis imperfectioribus commixtis.

Purgatione à sordibus sufficit lotio ex ∇ , præcipue quæ Tartaro vel Sal. com. imprægnata est, vel ex ∇ minus spirituosæ, id est, aquosior.

Purgatio ab imperfectis Metallis fit.

1. Per calcinationem immerivam.

Solvitur \odot in ∇ , quæ solum \odot solvat, relictis reliquis intactis, hinc depletur solutio, præcipitaturque; calxilla denuo fusa, putum exhibebit aurum.

2. *Per fusionem* 1. cum $\&$: Fiat regulus solaris, modo quem habes de regulis in $\&$: regulum hunc Solarem \times bulo impositum, colloca in anemum, addè Δ carbonum circularem, (suppressionis quoque si vis) adhibe si opus follem, donec totum $\&$ effumari, & non nisi \odot penitus purificatum remanserit. Vocant, Vor dem Balge geblasen / sic purgatur \odot ab omnibus metallis.

2. Cum H . fit ad eundem modum, quo \odot purgare docemus, capite sequenti.

2. Per cementationem.

R . \odot laminatum. F. in olla cementatoria, S. S. S. cum cemento vulgari vel regali, committe igni gradatim horis aliquot, ut metalla imperfecta comburantur.

Cementum vulgare.

R . Farin. laterum, Z viii.

Sal. com. præparat. Z iv.

Sal. Nit. Æ rugin. ana Z B. M.

Cementum Regale, quod soli \odot parcat.

R . Farin. later. Z iij.

*. 8. Sal. com. preparata. á 3i. Misc. humectando Urinā.

Cementum optimum.

℞. ① p. i. ② p. ij. fundatur simul, hinc fac lamellas tenuissimas instar papyri. Deinde per horas 40. vel 50. Δ forti cemento mixto ex farina later. Sal. Com. colchotare, virid. aris & * irroraque cum Acet. destill. forti, sic perit cupium. Beguin.

Cementum aliud.

℞. Alumin. plumos. 3j.
Sal. Com. calcinat. 3j.
Sal. Nit. 3℔.
Alum. crud. 3j℔.
Terr. ① i 3℔.

Cum. Acet. destill. F. pasta, cui involvatur ① laminatum.

Primum stratum fieri poterit ex Sal. Com. calcinat & farin. later. cui. ① priori cemento involutum imponatur. Tandem ultimo finiri poterit stratum cemento priori: cementetur gradatim primo Δ lento hor. tres, plus minus, dein auge ignem, ut * bulum candelat hor. 4.

N. Hac ratione probari possunt flores, quippe qui integri manent evanescentibus metallis imperfectioribus.

II. CALCINATIO.

Calcinatio ① est i. Immerfiva. 2. Vaporosa. 3. Ama gamatoria. 4. Cementatoria. 5. Reverberatoria.

Calcinatio immerfiva.

Calcinacionis immerfivæ actus duo

sunt: Solutio & Coagulatio, seu Præcipitatio.

Solutio. fit per. ℞. per ③ ② ij. glaciale, per ℞ Sal. Nit. bezoardicum, per ℞ Sal. Nit. vel. Sal. com. acutas per ℞ Sal. Com. alcalis. per ③ Hi, Liquorem seu Balsamum Sal. Com. ℞ alcalisatum Acet. destill. per ℞ alcalisat, per spiritum bolarem ③ *, spiritum ① i volatilem, Tartari, sanguinis, ① næ calcis vivæ, mellis, ③ ij, ③ j, minerarum ①, ②, ③, Hi, roris Majalis, & simil.

Coagulatio fit, vel humiditatis discussione, vel soluti ① percussione ③ Tartari, p. d injectione cinerum clavelator, vel salium ex vegetabilibus elixiatorum.

Præcipitatur itidem solutio Solis per ② injectum.

Præcipitatio fit etiam cum soluto * co, ℞ u ① a. Dissolutio cum menstruo aqueo insipido vix est possibilis. Poteest tamen acrimonia ℞ Sal. Com. solventis aliquo modo occultari. Sic multi asserunt ③ Sal. Com. ferè insipidum evadere, si lateres candentes sæpius in eo extinguantur, & postmodum destilletur spiritus dulcescens, in quo postea Solem solvunt. Alii Balsamo Sal. Com. dulci utuntur, quod fit ex Sal. Com. per vices xii. ℞ u Acet. destill. imprægnato, deinde destillato, flores Sal. Com. collo ① te ad hærentes solvuntur in cella in ③ aurifolutivum.

Hinc

⊙ *Sclopetans seu fulminans.*

℞. ⊙ laminati & in frusta incisi, q. v. solve digerendo in \mathcal{R} , (ex ∇ lib. i. * \mathfrak{z} iv. (solutioni infunde guttatim bonam quantitatem \mathfrak{g} i Tart. p. d. (vel è contra solutionem ⊙, infunde in bonam quantitatem \mathfrak{g} i Tart. p. d.) donec solutio clara & alba evadat, sic præcipitabitur ⊙ instar limi. ⊙ le omni ex parte præcipitato, elue salsedines ∇ commun. calcemque ⊙ is calore hypocaufti lenissimo exicca vel sponte sua exiccati permitte; sic paratum est ⊙ fulminans.

N. ⊙ hoc fulminans cautè tractes, ne flammam scil. concipiens detrimentum inferat, concipit enim promptissimè ac deorsum vergens, quicquid substratum, non sine adstantium periculo, in frustilla dissipat. Lavigaturus itaque memento singulis vicibus parum sumas, non ferro sed ligno agitand. vel — u Sal. com. aut Sulphuris guttatim affuso, vim phlogiston ac fulminantem adimās. Figitur quoque vis fulminatoria si calx illa in \times l. Δ per horas aliquot (24.) continuatà agitatione coquatur.

Vires. Sunt qui huius gran. ij. vel iv. ad sudoresciendos exhibent.

Hinc \mathfrak{E} Diaphoreticum.

℞. Calcis ⊙ [∇ malvat. aliquoties irrigatæ; atque iterum exiccatæ] \mathfrak{z} j.

Croc. \mathfrak{z} j.

Ambr. Gryf. & mosch. or. ana gran. vi.

Misc. & serva.

Vires. Cum Vinomalvatico, vel alio liquore. exhibuum, multos affectus domare dicitur, præsertim ex obstructione ortos: cordiale quoque insigne est, atbystericis minus utile, ob moschum \mathfrak{E} Ambram.

2. Calcinatio vaporosa.

Pit similiter vaporibus ex liquore aliquo corrodeute, (uti dictum,) elevatis. Paracelsus lib. 5. de morte rer. natur. hanc habet; *crocumq. acquisitum* \mathfrak{O} m \mathfrak{O} is appellat.

℞. ⊙ lamin. suspende super Urinam pueri, mixtam cum uvarum presarum exuviis, (mit *Weintrester*) in Aludele sat amplo firmiterque clauso. Hinc pone in exuvias uvarum calidas \mathfrak{O} (14.) & adhærescet laminis crocus pedè leporino abstergendus.

3. Calcinatio amalgamatoria.

℞. ⊙ laminat. p. i. \mathfrak{O} crudi puri p. vi. circiter F. āāā. nimirum ⊙ laminatum (& si vis ignitum,) cum \mathfrak{O} ad Δ calefacto, ut fumare incipiat misce: misturam in ∇ infunde, ut mistura ea undique fere similis evadat.

Hinc tere cum duplo Sulphuris, continuoque ad Δ lentum agitando calcina, donec \mathfrak{O} & Sulphur. sine liquefactione ac concretionem exhalarint, calxque ⊙ is colore calendulæ remanserit. Sic calcinatur Basilio ad conficiendam Tincturam, vide infra, & conjunge Basil. Chym. Milii tr. 2.

N. Fe.

N. 1. Felicius procedet calcinatio si
[ante combustionem cum Sulphur.] idem
¶ cum ☉ toties amalgamatus, & ab eo-
dem per retortam abstractus fuerit, do-
nec sese invicem amplius amplecti recu-
sent. Vide Hartmann. in practic. de Dy-
sent.

N. 2. Beguinus separat ☿ cum super-
fluum per corium, post separationem mi-
scet restantem massam cū duplo Sal. com.
decrepitati, reverberatq; sine fusione ☉ is
in ☿ bulo lutato; & non nisi parvo fora-
mine aperto, ☉ em ita calcinatum (☿
edulcoratum,) amalgamat denuo cum
☿io massam traiectione in corio restan-
tem miscet cum duplo Sulphuris vivi su-
perfunditque ☿ optimum, una cum Sul-
phure efflagrandum, sic relinquitur ☉
spongiosus valdeque attenuatus.

4. Calcinatio cementa- toria.

1. Fit quando ☉, vel cum Su'phure,
vel Sal. cō. quopiam stratificationem mix-
tus, in Δ reverberii adhibito caloris
moderamine, ne ☉ fluat, subtilissimè
pulveratur. Sala de ☉.

2. Cum C. C. usto.

Rz. ☉ limat. q. v. tere diligentissi-
mè cum C. C. usto, dein reverbera
(quod in furno figulino quoque fieri
potest) donec colorem acquirat in-
carnatum.

Vires. Medicina est virib. suis
efficacissima dosis proportionem C. C. (que
recipitur fere octupla) est; qua grana
☉ 3. 4. ☿c. contineat, Finck. in Enchir.

Aliter cum C. C. crudo

Rz. ☉ laminat. & C. C. in similes
laminas redactum. F. S. S. S. collo-
ceturque clausa lutataque pyxide in Δ
calcinationis gradualem, tandemque
horis 4. auge Δ m, ut pyxis incandescat:
hinc exime, atque itera calcinationem
novo adhibito C. C. donec ☉ redda-
tur friabile. (fit vice tertiâ.) Tandem
☉ hunc calcinarum denuo. cum C. C.
usto tere ac reverbera Δ mediocri, ut
colorem acquirat laterum. Sic opti-
mum habes Solis pulverem.

N. Expediit fundum pyxididis arena
vel alum, plumoso tegere, ac stratum eo-
dem claudere. Ioh. Agric. de Sol.

5. Calcinatio reverbera- toria.

Reverberari Sol. dicitur, quando in
pulverem purpureum seu summe brun-
neum, subtilem ac levem redigitur, id
quod fit per se ignitione solâ, vel etiam
flores Sulphuris calci ☉ admiscendo
& comburendo.

N. Supplere reverberationis vices pos-
sunt iterata ☉ calcinationes, sive illa per
aâa, sive per R facta fuerint.

III. VOLATILISA- TIO.

Vnde ☉ spiritualisatum.

Volatilisationem voco ☉ is per
XX destillationem, qua ☉ velut in
spiritualem naturam redigitur, idque
fit beneficio volatilis alicujus, ejus-
que debiti vehiculi, seu menstrui, ni-
mirum

mirum hoc ipsum à ☉ soluto toties cohobatur, donec secum in liquida forma eundem Solem evehat. Vehiculum autem commodum præbet, i. ☿.
 2. ☿ ☿ glaciale, (vide paulo post)
 3. ☿ Sal. nit. Bezoardici, (vide ☉ potabile per ☿ Sal. Com. Bezoard.) ☿ Sal. Com. rectificat.

N. Loco Sal. com. communis, haud sine commodo substitui poterit ☿ ex sale alicujus vegetabilis, v. gr. Cardui benedicti.

IV EXTRACTIO.

Vide ☉ potabile Tinctura ☉.

N. Tincturas plerasq. Solis solutiones & exaltationes potius esse quam extractions non diffiteor; attamen quia vulgariter Tinctura nomine afferuntur, & nobis visum fuit idem retinere. Aurum itaq. potabile communiter dicitur aurum in liquorem redactum, internoq. usui idoneum, de quo loqui videtur Hippocrates lib. 1. de Diata text. 47. Qui aurum, inquit, ac opus adhibent, tundunt, lavant, blande igne liquant (neque enim vehementi coit,) quod ubi elaboraverunt, ad omnia utuntur. Scias tamen & extractiones genuinas non esse impossibiles. Nimirum & Amici cujusdam mei & propria mea experientia didici, quod ex Sole oleū rubicundissimum aqua supernatans extrahi possit. Id quod hic repetō, ne de certitudine dubites.

I. ☉ Potabile per ☿ sale urina acuatam

R. Calcem ☉, (per ☿ factam, reverberationem in summam porosi-

tatem & brunitatem redactam, affunde ☿ microcolmit. digere l. calore per mensem vase H clauso; donec sanguinis instar rubicunda tinctura evadat. Hinc decanta, & affunde novum menstruum, idque toties repete, quoties opus. Solutiones collectæ per octo & duodecim dies degerantur. Hinc lenissimo calore menstruum, (in similes usus reservandum,) in MB separetur. Sic remanet tinctura in fundo forma ☿i rubicundissimi, in quolibet liquore solubilis, quæ vicem ☉ potabilis supplere potest.

Eandem solutionem si loco MB in arena per cucurbitam vel retortam destilles: tandem ☉ tinctura simul per XX transit, rubicunda instar sanguinis, relicta in fundo terrâ acidâ nigra, spongiosa. Tinctura è menstruo suo in MB saltem tepido liberata ulterius exaltari potest, si aliquoties in ☿ solvatur, ac spiritus idem per destillationem à tinctura abstrahatur.

Dosis à gran. iij. ad viij. imo vel ultra Hartm. in Croll. & in Pract. Senn. Inst. Kesh. 1. Cent. 2. Gluckr. in Beguin. libr. 3. cap. 2.

N. Sala, Scheunemanus & alii loco salis volatilis urina, sale naturæ recipiunt, i. e. Macrocosmi Elementorum vesperitum in terra seu Macrocosmi Generatorio, (ut inibi in fatuum terrestrium nutrimentum faceat, in corpoream substantiam transplantatum. Hunc arte spargyrica summe depuratum,

tum, animatione exaltatum, vocant ☿ m
Philosophorum.

Consule Hartman. in Croll. pag. 399.
Salam de ☉ potabili. Tentzel. in Exeg.
pag. (mihi) 491. Scheunemani Hydro-
mantiam, &c.

Aliter cum ♀ acuato per Sal.

Com. vel ☿.

Alii ♀ acuunt, vel sale volatili, seu
floribus Sal. Com. aut ☿, vel Crysta-
lis salis dulcibus, vel spiritu ✱, aut Sal.
Nit. atque ut dictum, cum hoc ♀ acu-
to; ex calce ☉ summè brunna & poro-
sa, Tincturam digerendo extrahunt:
abstracto menstruo remanet tinctura
in fundo, quam circulando fixare li-
cet.

Usus.

☿. Hujus Tinctur. ʒj. ▽ theriac. ʒj.
M. pro sudorifero aliquot dies conti-
nuando.

Dosis ʒj. Vide Quercetan. in libr. de
Mehicam. Spagyric. preparat. Salam de
☉ potabili. Kesler. lib. 3. c. 31.

3. Aliter cum ♀ alcolisato ☉
vita Quercet.

Primò calcina Solem laminatum
per cementat. (cum Sal. nit.) & re-
verbera. Secundo, cimenta per Sac-
char. ʒi, super hac mixtura accende
aliquoties, ♀ alcolisatum. Relictam
materiam circula (♂ ʒ 14.) cum ♀
alcalisat. abstrahe & affundendo no-
vum ♀ alcalisat, iterum circula & ab-
strahe, idque repete, donec tota ☉ sub-
stantia per XX efferatur. Separato men-

struo remanebit ☉ vita præstantissimū
in fundo. Quercetan. Sala.

4. Alind per Ol. ☿ y gra-
ciale.

☿. Calcin. Sol. reverberat, conjunge
cum Ol. ☿ ii graciali rectificato, dige-
rendoque per mensem extrahe tinctu-
ram rubicundam: quod si illud oleum
vicissim seu secunda vice destilletur, au-
rum elevatur in ♀ solubile, & hoc est ☉
potabile.

Vires. Valide per diaphoresin movent.

Dosis gutt. 3. 4. vel 5.

N. Oleum ☿ ij quod prima hac destil-
latione ab auro prodit, purgat leniter, sol-
vitq; omnes obstructions, & multa alia
præstat Hartm. in Croll. p. 226.

5. Alind per Ol. ☿ ij Saccharatum, Ba-
sily Magisterium Solis.

☿. ☉ volatilifat. affunde oleum ☿ ii
Saccharatum, cum tantillo spirit. Sal.
com. & extrahetur tinctura, relicto cor-
pore ☉ intacto. Basil. in Triumph.

6. Alind per spirit. Sal. nit. Bezo-
ardicum.

☿. ☉ foliat. ac calcinat. solve in
spiritu Sal. nit. Bezoardico. rubicun-
do, abstraheque menstruum calore le-
nissimo, (ne spiritus nimium prode-
ant,) per XX, vel phiolam oblongioris
colli, usque ad pelliculam seu oleosita-
tem. Hinc recens rubicundum men-
struum affunde, solve, abstrahe, simi-
liter procedendo tertia vel quarta
vice. Tandem hæc ipsa solutio ☉ ex
retorta Δ fortiori destillatur, ut &
spiri-

spiritus prodeant, quos affunde iterum cohobando, donec ipsum aurum rubicundum instar rubini apparuerit.

2. *Aliud* ☉ potabile per ☉
H.

℞. Calc. ☉ per ☿ vel ☿ &c.) circula per aliquot dies cum Ol. Hi flavo; sic compagem ☉ in liquorem solutam videbis.

Vires & dosi. *Usus* ejus est contra venena non contemnendus, imo sapè visum est, gutt. iv. ad viij. in vino exhibitis, etiam eos, qui existimabantur mortui proximi, resocillatos fuisse. Multum etiam præstat in Caduco, Apoplexia, Paralyse, & ceteris morbis capitis. Hartmann. in Croll. pag. 474. Kessler. libr. 4. Num. 57.

8. *Aliud* per spiritum
Sal. communis.

℞. Calcis ☉, [solutionem Solis in ☿ Basilii præcipit. cum ☿,] q. v. affunde spirit. Sal. com. rectificat. digerendo extrahe tincturam, corpore ☉ albo remanente in fundo, [quod est reducibile in Cam fixam] tincturam exalta cum ☿ circulando, totiesque cohobando, donec cum ☿ per XX deducatur, Kessler. lib. 4. c. 71.

9. *Aliud* per ol. Sulphur.

℞. Calcis ☉ q. v. affunde ol. Sulphur. p. c. ad eminent. digit. 7. abstrahe cohobando aliquoties, donec ☉ solvatur. Solutum tandem ☉ affunde ☿ rectificatiss. ad eminent. dig. 4. oleo Sulphuris non separato. Digere septim. (6.) Hinc

abstrahe per XX ☿, idque reitera, donec ☉ per XX elevetur. Hoc facto abstrahatur lenissimè ☿, ut manet in fundo liquor rubicundus.

N. 1. Post tertiam vel quartam cohobationem separandum est phlegma, novumque etiam affunde.

N. 2. Reiteratio cum ☿ opus est septimanarum aliquot (10.)

Hinc fit.

Aurum Diaphoreticum compositum Poppi.

℞. Calcis ☉ (à qua Ol. Sal. com. abstractum) ʒj. Ol. ☿ ij. (ex cinnab. nativa) ʒij. Ol. ☿ is (ex scoris ☿) ʒj. Superfunde Sulphur. vini, aliquoties id abstrahendo, & remanet pulvis paulatim Δ calcinandus & figendus.

Prodest in contracturis. Dos. g. viij. Popp. in Thesaur.

10. *Aliud* per Essentiam
Sal communis.

℞. Optimè calcinat. (per āāā, &c.) affunde ☿. seu Oleum (Balsamum) Sal. com. ac extrahe, (solve) f. a. Decantatis extractionibus, (solutionibus) affunde ☿ opt. rectificat. sic ☿ animam Solis ad se trahet, relictā Essentiā Sal. com. in fundo, quam separa; Tincturam ☉ in MB à ☿ libera. Sala de ☉ potab.

11. *Aliud* per spir. Manna.

℞. Calc. ☉ fulminantem, redige in flores per peculiare aliquot instrumentum argenteum deauratum: Ex floribus extrahe tinctur. cum spiritu man-

mannæ abstrahere ad consistentiam pro
libitu.

Vires. Sudorem, eumque fœdissimum
pellit, felicissimè morborum quorumcun-
que malignorum & venenatorum semi-
narium secum vehens. Cl. Helv Diete-
rich.

Dosis gutta aliquor.

12. Aurum potabile cum Salcom-
munis Tartari.

F. āāā ℥j. cum ℥vi. ☿ more
vulg. superfluum ☿ium per corium
exprime, globulum restantem tere cum
ana Sal Com. fusi, fac evaporare ☿ium
mediocri Δ, salem ablue aqu. calidā,
calcem ☉ tere fortiter cum ℥iij, ☿
communis, pone in tegulā fulminato-
ria (eine Treibscherven) coopertā cum
foramine, cementa per 3. horas ad to-
talem usque ☿ evaporationem idque
ementationis opus 5. aut 6. cum pari
quantitate novi ☿ reitera donec sc. ☉
in spongiam rubicundam attollatur. 1.
Extrahatur tinctura per seq. Menstru-
um ℥ (spiritus Sal Com. Tartari parati,
ut indicabitur cap de Tartaro vini part.
1. V part. x 11. Destilla simul ex cucurb.
Hunc V Tartari satum affunde calci
sive floribus ☉ sublimatis & tingetur
rubro colore, abstrahere V, remane-
bit pulvis coccineus, cujus vires innu-
meræ.

N. Si calcem spongiosam aliquoties
averis cum part. 8. ✱ci donec sanda-
racino colore eleuetur & postea ab admi-
xtione ✱ vendicaveris, feliciter & citius

extractio fiet Tinctura. Ex commun. S.
Closs.

13. ☉ potabile Franc. Anto-
nii.

☉ Purgetur (bis) per ☿. Hinc calci-
netur cum ☿. & Sulphur. Extraheque
cum Sulphur. Hi.

N. Licet & vice secundā cum Salcom.
marino fuso ac tertia cum Salcom. Tartari
calcinare.

Dosis g. 7. 8. &c.

N. Hoc est genuinum illud adeo decan-
tatum ☉ potabile Londinense, cujus descri-
ptionem mihi servare constitueram. Verū
cum à diversis locis, quin etiam ex aula qua-
dam illustrissima transmitteretur, ut com-
municaretur, nolui hac in re expectatio-
nem frustrari.

14. Aliud Quercetan. ☉ vite
dictum.

Ex calce ☉ levissima & spongiosa,
elice Tincturam digerendo in MB. per
✱, Tincturam hanc exalta circulando
cum V.

Vires. Ad innumerabiles morbos fe-
rè incredibilis videtur virtutis. Quer-
cetan. in Sclopet. Et ex hoc Sala in ☉
potab.

15. Aliud Laudanum ☿ riale
Bayeri.

☿. ☉ per Sulphur. & ☿ m optime
calcinat. ℥ss. Olei ☿ alis ℥v. (foran ol.
Hi) Digerantur calore ciner. in phio-
la H. C. & octo, sic extrahitur tinctura
☉ rubicunda hanc (relicto albo cor-
pore) in phiola H. C. digerendo coa-
Hhh gula

gula (in Athanore) in lapidem rubrum, quem super porphyretico humido solve; rejectisque fecibus de novo coagula; tertio eandem operam repete.

Dosis gran. 2. ad 5.

16. Alund Billichij.

1. Calcina cum \mathcal{R} ac præcipita.
2. Reverbera cum flor. Sulph. & \mathcal{Q} . ut evadat pulvis instar boli armeni.
3. Solve cum \mathcal{V} rectificatis. digerendo ac cohobando multoties, (20.) & ultra; dein coagula abstrahendo.

4. Solve in spirit. Sal. com. digere dies aliquot (3.) hinc abstrahere. *Billichij. in Exerc. th. 102.*

17. Tinctura \mathcal{O} is.

\mathcal{L} auri fulminantis probe edulcat. part. i. spiritus \mathcal{O} i volatil. part. iv. (sunt qui Oleum \mathcal{C} ausiticum, in quo salis proprii pars 3. resoluta sit adhibent, sed tale menstruum naturæ nostræ inimicum est) Digerantur in \mathcal{B} . repenti per 40. \mathcal{O} . Tinctum cum rubicundissimum & clarum separa per inclinationem, abstrahere ad siccitatem, affunde \mathcal{V} è vino Hispanico factum & Tartarizatum, & in calore lenissimo fiat Extractio instar Rubini, tinctos spiritus destilla & ad aliquam consistentiam redige, vel pulveris formam, quem etiam à sapore \mathcal{V} poteris eluere aqua still. vell. dissolvere in quocunque liquore approprio.

N. Si defuit spiritus \mathcal{O} i volatil. tunc

eius loco seq. Menstruum excellentissimum substitue.

\mathcal{R} . Sal. communis lb. i. Sal. nit. \mathcal{Z} vi. destilla f. a.

\mathcal{H} ujusaqu. fortis part. iij. \mathcal{V} tantundem, infunde \mathcal{V} in magnâ cucurb. quam statim occludes. \mathcal{X} suo, ebullitum enim illico commixti \mathcal{C} us & flavescunt, deinde durante ebullitione rubedinem acquirunt, tandem eadem cessante menstruum sub viride evadit, quod quidem nil peculiare possidet, nisi quod illius a credo facili negotio ab auro soluto elevatur, id quod adhibitis aliis \mathcal{R} fieri non potest.

Ex communio S. Closs.

18. Tinctura Fraxis Basilij.

\mathcal{R} . \mathcal{O} per \mathcal{A} calcinat. p. i. solve digerendo in \mathcal{R} \mathcal{A} ta. (vide in Sal. nit. \mathcal{R} m Basilij,) vel in \mathcal{R} salinâ, (id est, Sal. com. acuata) p. iij. hinc depleatur solutio, restantique \mathcal{O} calcidenuo \mathcal{V} illa solvens affundatur, &c. donec penitus soluta calx sit: Solutiones digere in \mathcal{M} B, ut subsideant feces, quas separa. Solutionem defecatam digere iterum in \mathcal{M} B \mathcal{O} (9.) Hinc abstrahere \mathcal{R} ad oleitatem, abstractam aquam affunde vicissim, impræгнаque calcem cohobationibus tantisper repetitis, donec liquor ferè insipidus extillarit. Tum affunde noxam \mathcal{R} , impræгнаque denuo ut dictum, in arena, idque tantisper donec \mathcal{O} per \mathcal{X} penitus transportatum

tatum sit. [N. Cum singulis distillationibus ignis est augendus,] tandem abstrahere per MB ad oleitatem, reponaturque ad Crystallifandum, f. a.

Hinc

32. Crystall. Op. 1. & ii vivi purg. p. iij. agitato optimè, sic apparebunt colores, subsidebitque aāā. Exhalet & restabit pulvis Solis purpureus in ✕ solubilis: qui tingit subito instar sanguinis.

Ex hoc pulvere extrahe f. a. tincturam rubicundam cum Vi, qui cum spirit. Sal. com. mixtus & dulcificatus sit, (vide spirit. Sal. comm. dulcem ac ∇ temperatam Basil. in Vi,) donec menstruum ulterius non tingatur, & corpus album reliquum sit.

N. 1. Menstruum nisi caute & rite preparatum sit, protinctura rubicunda, extrahit viridem, vel alterius alicujus coloris.

N. 2. Corpus illud album in extractione tincturae residuum, inseruit Sali & & io conficiendo, de quibus infra, videatur Tholdij Halographia, ubi ex testamento Basilij Monachi, prolixè elaborationes hasce describit.

19. Paulo secus ex manuscripto testamento Basilij.

1. Purga Op. per &.

2. Calcina, i. e. solve purgatum Op. in R, coagulaque.

3. Volatilisa cum spir. Sal. com. acuat, per spirit. draconis, (✕) vide supra.

Præcipita cum Ol. Tart. vel quod melius per abstractionem lentam.

5. Reverbera cum flor. Tart. vide supra.

6. Extrahe Tart. Solis per Vigneum, & spirit. Sal. com. vide ∇ temperatam in V.

7. Digere extractum Sulph. & solve denuo in & Philosophorum, vel in R dicta.

8. Volatilisa cum V.

N. Basil. repet. lapid. Phil. volatilisa Op. per spir. Sal. communis, hinc conjungit extractum Sulph. cum spir. Orubeo (corrosivo) per digestionem cum V dulcificato solvit & digerit aliquamdiu, tandem cohibet, donec nihil in destillatorio residui remaneat. Sic acquiritur liquor solaris seu Opotabile maximarum virium.

20. Unicorn Solare seu Manna Solaris.

R. Calcem Solis optimè reverberatam, imbibe aliquoties, menstruo solaris, id est, affunde aliquantulum solaris menstrui (ad eminent. dimidii digiti,) vaseque H. clauso digere, l. Δ ut siccefcet.

Hinc iterum affunde, ac digere, totiesque repete, ut Sol in pulverem subrubeum transmutetur.

Dosis à gran. i. ad 5.

N. 1. Menstruum solare destillatur per cornutam ex minera, repetitis aliquoties distillationibus. Mynschr.

N. 2. Felicius forsàn processeris, si Menstruum hoc sale suo alcalisaveris, calcem, cum alcalisato hoc menstruo circula veris ad modum, quo alias tincturas nomine mannas fieri diximus.

Hbb 2

Hic

Hic non possum non monere quod non nulli tincturam Solis, beneficio oleorum aromaticorum sibi imaginentur. Nimirum calcem Solis optimè elaboratam impastant cum oleo, e. gr. Garyophyllor. Cinnamomi, &c. hinc ∇ rectificatissimum affundunt, atque intercedente digestionem tincturam extrahunt.

Verum, mehercle, loco tincturae Solis aromaticorum oleorum tincturam nanciscuntur, qua ∇ rectificatissimo, seu suo simili (accedit enim ad naturam oleagineam) admixta acquiritur.

V. SUBLIMATIO.

Unde Flores Solis.

R. \odot optimè calcinat. (per spirit. Sal. com.) part. i. \ast depurat. p. vii. Misc. & sublima. Sic elevabuntur flores Solis, quos eluendo ab \ast libera.

Dosis gran. 6. & 9.

Fiat peculiare instrumentum argenteum aut cupreum. (pyxididis instar complicatilis) constans ex duabus partibus superiori ac inferiori, ut aperiri possit. Instrumentum hoc in latere tubulum habeat, per quem sclopetans injici possit, (paulatim id fieri necessum est,) tubulum statim obturando. Sic elevabitur \odot fornicique superiori adhærescit.

VI. SALIFICATIO.

Unde 1. Sal. \odot

R. \odot finip. i. $\&$ purificat. q. v. vel vi. F. $\hat{a}\hat{a}\hat{a}$. abstrahaturque $\&$ per retortam. Hinc F. iterum $\hat{a}\hat{a}\hat{a}$ ex relictis scil. Solis calce, &c abstracto $\&$, idque re-

petatur toties, donec \odot assumere $\&$ amplius nolit. Tunc affunde \ast optimum, [vel & spiritum Sal. com. acuatum,] digereque l. Δ , decanta ac abstrahere menstruum ad siccitatem, & remanebit Sal. com. Solis.

N. 1. Cum relictis \odot , eodem modo procedere potes amalgamando nimirum ac abstrahendo, donec totus \odot in Sal. com. convertatur Kesler. lib. i. c. 4.

N. 2. Alii idem meditantur ex \odot per ∇ calcinato, ac per mensem reverberato.

1. Aliter.

R. \odot foliat. vel quod melius calcinat. 3b. Sal. com. Sal. Nit. O, ana 3j. Misc. ac impone phiolæ ceræ Hispanica obturatæ, digereque calore arenæ, sic solvetur \odot . Hinc affundendo ∇ . calidam præcipitabitur \odot in forma pulveris purpurei, [maximè si $\&$ Tart. instilletur.] Pulveri optimè edulcorato affunde ∇ rectificatis, stentque aliquam diu, (mensis aliquot, vase clauso,) ut ∇ sale Solis imprægnetur. Hinc decantetur ∇ & abstrahatur, efflagretvè. Sic relinquitur Sal \odot albiss. infundo.

Vires. Insigne est Diaphoreticum.

Dosis gran. 2. 3. 4.

3. Sal Solis Basilianum.

R. Corpus illud album, in extractione tincturæ \odot Basilianæ residuum, reverbera leniter per mediâ horam, ut aliquo modo corporale fiat. Hinc affunde ∇ mellis corrosivam, digere, extraheque Sal. a. (labor est

est dierum 10, circiter.) Aquam mellis sale Solis impregnatam subijce destillationi MB ut abstrahatur. Sal Solis residuum edulcora, aliquoties ∇ comm. destillatam affundendo, atque destillationibus repetitis abstrahendo; tandem cum ∇ clarifica.

Dosis gran 2. 3. 4. &c.

N. In hac extractione Salis remanet materia utilis pro Φ io. Solis conficiendo.

VII. MERCVRIFICATIO.

R. Materiam in confectione Salis Solis Basiliani residuam, affunde spirit. Tartari digere per mensem, ac destilla à scoriis Φ per retortam (vitream) in receptaculum ∇ & frigida aliquota parte adimpletum, & habebis Φ m Solis.

Tholdius in Halographia ex Testamento Basilii Monachi,

Φ ius Solis Paracelsi.

Paracelsus generaliter hunc modum præscribit, quo singula Metalla in Φ vivum redigi possint.

Nimirum:

1. Calcinat Metallum fumigando i. e. per fuliginem, Φ rii. *Vide libr. I. cap. 14.*

2. Calcem Metalli amalgamat cum Φ digerit, abstrahitque.

3. Abstractum Φ m iterum cum calce eadem amalgamat, digerit & abstrahit toties, scil. iterando, donec calx metalli supra candelam instar cere liquari possit. Hinc digerendo calcem illam in Φ m convertit. *Vide lib. de suscitacione rerum naturali, ut & lib. 6. Archidox. ubi tempus amalgamandi observare monet, quo Planetæ & cœlestes correspondentes coniunguntur. De quo legi potest libri huius primi cap. 22.*

CAPVT X.

De Argento

Argentum Metallum est nobilissimum candidum, Auro imperfectius. Dicitur Chymicis Luna vel Cerebrum, eò quod in Macrocosmo Lunæ, in Microcosmo cerebro sympathicum sit. Germ. *Silver.*

Vires. Capitis corroborans perhibetur specificum spiritusque animales confortare, unde & in omnibus capitis affectibus peculiaris efficacia censetur, quæ

in primis Epilepsia, Apoplexia, & similia.

PURGATIO à sordibus superficialibus.

Coquatur, laveturque cum ∇ , in qua solutum Tart. ac Sal. com.

1. PURGATIO ab alienis Metallis.

1. Per calcinationem immersionem.

Hhh 3

Solve

Solve C per V , quæ solummodo solvat C , relictis Metallis intactis.

2. *Per fusionem cum H_o.*

Immitte plumbum in + bulum ignitum, ut lique scat, quo liquefacto, superinijce Cm , continuando ignem, donec cum plumbo metalla illa imperfecta vi ignis, partim in fumum abeant, partim quoque scoriarum nomine secernantur, relictâ C in fundo.

N. 1. Ignis sat fortis requiritur, unde erit, furnum anemium adhibere.

N. 2. Hæc hac purgatione in spumam C argenti recrementis concretus, dicitur. *Urbargyrus*, de quo infra.

3. *Per nitrum.*

Fluat C d ignem, hinc superinijciatur per vit. Sal. nit. & purgabitur C .

II. *CALCINATIO.*

1. *Immer.*

Solve Cm laminat: in liquore aliquo corrosivo, coagula inspissando vel præcipitando, ac edulcora. Præcipitatur autem C soluta, per muriam salinam, V salinam, vel per particulam aeris injectam:

N. *Liquor ille corrosivus, vel est R* [vide in Sal. nit.] *vel spirit. sal. nit. vel his finitimus humor, (ut patet infra in tincturis, seu C à potabili.) recipitur autem in quantitate tripla, quadrupla sexdupla, &c.*

N. 2. C hac ratione soluta, si more solito ad crystallisandum reponatur, con-

crefcit in Crystallus, quos vitriolum C vocant.

2. *Calcinatio Amalgamatoria.*

R. C pur. ac Q . ana F. aââ. admisce $\frac{1}{2}$. Sal. com. vel O -li. Exhalet Q ad Δ , residuum eluatur.

Calcinatoria Cementatoria.

Fit, per Tart. O -lat, per S , per U ; per Sal. com. & simil.

N. *Calcinatio hæc fieri debet sine fusionem.*

E. gr.

R. C lamin. p. 1. Q . = . p. ij. Misc. exhaletque Q ad ignem, & remanet C instar resinæ. *Senn. Instit.*

Sic cementatur quoque cum duplo S , vel cum quadruplo Sal. com. hor. 4. 5. 6. 7. 8.

Aliter.

R. C limat. p. i. fl. Sulphur. p. ij. Sal. com. p. β . Misc. sublimaque (sepius, ut flores Sulphuris sublimari solent, sublimatum restanti materiæ semper addendo, ultimâ vice sublimatum abjice, restantemque materiam aquâ elue.

Calcinatio C cementatoria fit etiam ut supra dictum est de O potabili cum = Sal. com. Tart.

Calcinatio Reverberatoria.

Quia C facilius igni ac calcinationi parat, quam O , ulterius operosa reverberatione opus non habet, nihilominus tamen, cui ita visum fuerit, amplius C calcinatam elacorare poterit, denuo illam cum Sulph. vel cum Sal. comm. (S) vel simul cum Sulphure & S , vel cum

cum Sal. Com. & * & c. aliquoties probitu cementando, ac dein ablutionibus à falsedine liberando.

E. gr.

R. Calc. C (per V) 3j. Sal. com. 3ij. * 3ij. Misce & reverbera per 8.

III. SOLVTIO ET EXTRACTIO

unde Capotabiles & Tinctura.

N. Luna ut mollior est Sole, ita facilius quoque in potabilem formam reduci potest, adeo ut si optimè calcinata fuerit, soli Vi, optimè tamen rectificato obediat. Quia tamen laborasse aliquo modo laboriosus ac diuturnus est loco V simplicis, idem ille V acuat, vel aliud aliquod menstruum recipi solet, ut patebit in singulis.

1. C potabilis per V simplicium.

R. C m calcinat. (cum V in quo aliquid * sit solutum) extrahe cum V cohobando aliquoties.

Dosis gran. 3. vel 6. Gluckrath.

Aliter.

R. C calcinat. (per R, seu liquorem corrosivum destillatum ex Minii p. r. * p. ij. extrahe cum V optimè rectificato Kesler 1. cap. 1.

2. C potabilis per V sale urinae acuat, & simul.

R. C m calcinat. (per R, Sal. nit. cum cohobis, vel per R) extrahe per V rectificatum acuat, sale urinae volatili, [i. e. per V microcosmicum,] filtra & coagula. Vide de O Kesler. 1. cap. 7. Sennert. Instit. Beguin.

Aliter.

R. C calcinat. (scilicet miscendo cum fl. Sulph. p. ij. Sal. com. p. r. & sublimando septies, vide supra cementat.) p. 1. V opt. p. ij. Sal. com. Urin. volat. p. 2. digerantur in vase benè clauso per dies aliquot.

Hanc destilla per retortam vitream aliquoties, (8. 9. aut tantisper) donec materia ascendat cærulei coloris. Sin minus hæc successerint, calcinetur denud C pluries, & procedatur ut dictum.

Dosis gran. 5. 6. 7. & c.

N. Eodem modo fieri quoque potest. C potabilis per V acuat, Sale Natura, de quo in O.

3. Alia C per V Tartarifat.

R. Calcem C & reverberatum, (cum fl. Sulphur,) affunde V opt. Tartarifat, abstrahè cum septem cohobis, sic solvetur C, circula per mensem in MB & habebis liquorem cæruleum. Kesler lib. 4. c. 4. 4.

4. Alia per V Glatum.

R. C calcinat. q. v. extrahe s. a. tincturam cæruleam cum V Glato (vide Vinum) decanta ac abstrahè.

N. Præstat reliquis in Epilepsia.

5. Tinctura C a Basiliana.

Habeatur in promptu.

1. Sal. communiter cum ana Ψ & calcinat, vide calcinat. Virid. æris.

2. Ad manus sit calx C.

3. Paretur R ex O i & Sal. nit. ana.

Ergo.

R. Calcem C, misce cum Sal. com. calcina.

calcinato, cum calce viv. & inde phiolæ vitreæ, affunde ∇ m, eamque abstrahæ destillando, cohobaque vice tertia, ultima vice ignem augendo, ut materia in vitro fundatur. Sic \mathcal{C} in nancisceris pellucidam, ex qua cum \times fortiss. extrahatur s. a. tinctura sub colore ultramarino.

N. Remanebit corpus \mathcal{C} æ in extractione hac residuum, quod Salis \mathcal{C} æ conficiendo reseruetur.

Videatur Tholdius in Holographia ex Testamento Basilii.

N. Plures modos tincturas \mathcal{C} æ conficiendi, ad imitationem modorum, qui in Solis tincturis descripti sunt, ipsemet Lector colligere poterit.

E. gr.

Tincturæ cum ∇ acuato per Sal. com. naturæ, &c.

Essentia \mathcal{C} æ, uti lapidum & crystalli extracta Clossæana sunt, parari potest. *Vid. c. 4.*

Luna potabilis S. Closs.

Luna potabilis fiet si primo \mathcal{C} am laminatam pluries cum Sulph. calcinaveris, & inde per affusionem aqu. communis \ominus lum elicueris, quod resolvendum erit in Spiritum composito ex Sal. com. Sal. nit. & ∇ præscripto Art. de Tincturâ Solis, feces segregando per digestionem, tincturam cœruleam cogendo in pulverem, è quo demum per ∇ vera essentia exurgit adversus Epilepsiam optima.

Ex communic. S. Closs.

Alio modo.

Primo âââ &c. pars una \mathcal{C} cum part. 8. ¶ ii exprimaturque per corium, secundo globulus restans teratur cum quadruplo Sal. com. decrepitari & prunis ardentib. calcinetur per horas 4. in pyxide cæmentatoria, si quid non probe calcinatum superfit, cæmentetur iterum addito novo Sal. com. & calx à Sal. com. per additiones liberetur. Tercio sublimetur hujus calcis zj . cum $\text{z} \text{iv}$. \times ci idque 5. repetatur 4. liquore acido potabili primo (\times) dein Sulphureo, vegetabili (∇) extrahatur Tinctura, quæ ad siccitatem reducta sal dabit in cella diffluens in Oleum, quod itidem spatio 80. ¶ fixari poterit in Medicinam morbis cerebri specificè dicatam.

Ex communicat. ejusdem.

IV. SALIFICATIO.

\mathcal{C} æ in salem \ominus tum quomodo convertatur, ex jam dictis innouit. Dabimus igitur modum salificandi Basilianum, quem ex testamento ejus manuscripto verbotenus cum plurimis aliis transtulit Tholdius in suam Holographiam.

Nimirum.

R. Corpus illud \mathcal{C} æ in extractione tincturæ Basilianæ residuum, affunde ∇ mellis corrosivam s. a. abstrahæ & edulcora, ut dictum in Sale Solis.

N. Supererit materia, ex qua extrahi potest ¶ .

Vires. Conducibile est morbis capit. &c.

in *ſ* inprimis Epilepsia, Hydropicam a-
quam exiccat, &c.

Dosis gran. 4. 5.

Spiritus lunaris S. Clossai.

Prima opera sit in parando *Œ*li
*Œ*a, quod fit per Sulph. instar *Œ*li *Œ*is,
verum ad minus calcinationibus 20. i-
teratis indiget. Longè faciliore ac me-
liori methodo extrahitur è limaturâ
*Œ*a subtilissima beneficio aq. lili con-
vall. *℥*ij. fortificatæ cum *℥*j. spiritus
*Œ*li *Œ*is (vel cum *✕* tenendo per
menſem in digestionem cinerum, sic spi-

ritus *Œ*eus imprægnabitur Tincturâ
*Œ*ex cyano subvirescente, quâ seposita
aliud spiritum *Œ*li *Œ*e ei substitue, to-
tiesque extrahe, donec tota ferè *Œ* so-
luta sit, tandem solutiones evapora ad
cuticulam usque, collige cryſtallos, è
quib. siccatis per *Œ* more solito primo
phlegma & spiritum *Œ*is pelles, quæ
seorsum servanda, deinde auctiori *Œ*
spiritum *Œ*a & ultimò oleum.

*Spiritum hunc Lunarem Idiopathicum
Epilepsia quæ totum esse expertus est author
qui supra.*

CAPVT XI.

De Ferro.

*Œ*lassis secunda, Metalla ignobili-
ora duriora continet, Ferrum scil.
& cuprum.

Preparationes precipue.

1. Purgatio. 2. Calcinatio. 3. Sub-
limatio. 4. Destillatio. 5. Extractio.
6. Salificatio. 7. Liquatio.

FERRVM.

Ferrum Metallum est ignobilius,
constans ex Mercurio & Sulphure mi-
nus liquabili, crudiori, seu si mavis ex
Sulphure, ac Sale, quæ partibus terreis
crudioribus immixta sunt.

Vires. Diversis *Œ* dotatum est viri-
bus: adstringendi sc. *Œ* aperiendi. Vis a-
peritiua in volatiliore potissimum residet
parte, ac proinde in sale: vis adstrictiora
infixiori, adeoque in terra latitat. De his
qui ulterius erudiri cupit, adeat problem.

Horst. Decad. 7. q. 2.

PURGATIO *Œ* à sordibus su-
perficariis.

Purgatur *Œ*is limatura à sordibus
quibus forsancatet, tum ventilando,
tum abluendo *Œ* communi.

1. Purgatio *Œ* Gradatoria:
unde Chalybs.

2. *Œ*is in lamellas vel virgulas, (di-
gitum majoris crassitudine) redacti p. 1.
Carbonū salicis vel fagi pulver. Rasur.
cornu bovis, p. 1. stratifica, ac in vase
clauso igni committe furni anemii for-
tissimo. hor. 4. aut 6.

N. Chalybs igitur nihil aliud est quàm
Œ optimè purgatum, ideoque loco Ferri
Chalybem præstat recipere.

II. *CALCINATIO*:
unde Crocus.

I. Calcinatio Reverberatoria, unde Crocus & obstructivus.

Limaturam & is igne fortiss. eo usq; reverbera, donec in Crocum elevetur leviss. & rubicundissimum.

N. 1. Sal commune vim habet reverberationem hanc accelerandi. Hinc sunt, qui citioris reverberationis gratia limaturam initio aliquoties urina puerorum (vel ∇ salsa, acetovè) conspergunt, iterum exiccant, postmodum reverberationi subjiciunt. Sic reverberatione unius atq; alterius diei & in florem surgit rubicundissimum, qui quotidie, ne vi ignis pereat vel nigrescat, colligatur. Hartm. in pract. Gluckr. in Beguin.

N. 2. Si quæ pars nondum satis reverberata sit, elaboratioremque separare velis, affunde ∇ m, agita, atque antequam penitus subsideat, ∇ m levioressc. & magis elaborato Croco turbidam, in aliud vas effunde, parte graviore, qua subsidet in priori vase relicta: Abstrahat vel decantata dein aqua, habes Crocum levioressc, crudioribus suis ac gravioribus portionibus spoliatum.

Alii R. Limat. & lb. ij. Sal. com. decrepit. lb. iij. (vel ana) mixta reverberant per diem. Hinc & iterum edulcoratum subtilissimè lavigant, denuoque reverberant, [dies octo vel decem] donec elevetur Crocus subtilissimus, quem quotidie auferunt, atque ∇ plantaginis præparant.

Vires. Obstructivus hic Crocus est, ac

seccativus, confert in Dysenteria, Lienteria, Gonorrhæa & similibus.

Externus ejus Usus est in exiccandis ulceribus & vulneribus. Quercetan. in Pharmac. restitut. Senn. in Institut.

Dosis à ℥ss. ad ℥j.

N. Adhærescit & Crocus & in baculis ferreæ furni destillat.

2. Calcinatio fusoria: unde Crocus & aperitivus.

Laminis & seu Chalybis ignitis adeo ut scintillent optime admove magdaleones Sulphuris: sic liquefcit & instar ceræ, deciditq; granulatim in frigidam suppositam, teratur subtilissimè & servetur pro usu.

Vires. Virtutem habet referandi, aperiendi & attenuandi. Quercet. in Pharmac. rest. Beguin.

N. Maximus requiritur calor, ideoque præstat officinam fabrilem adire.

3. Calcinatio Cementatoria: unde & m & u.

Laminæ (Limaturæ) &, cementa cum Sulph. pulv. igne paulatim adhibito per horam, ita Sulphure accenso calcinatur &: Materiam exemptam ac tritam calcina iterum per se, [non secus ac calcinatur & in præparatione vitri,] ut Sulphur penitus efflagret, diligenter movendo, donec ferro adhære re incipiat.

R. & hujus calcinati ac triti lb. i. Sulphur. ℥ss. Misc. exactè, ac calcina iterum per hor. $\frac{1}{4}$. Dein tere iterum, ac adde

adde tantundem Sulph. idque repete
quinquies vel pluries, *Croll.*

Ex hac & calce fit Θ -m Θ -is.

2. *Aliter.*

R. Θ laminatum cements cum Sulphure & Tartariana, Crocum laminis
adhærentem absterge. *Parac. l. de morte
rer. natur.*

4. *Calcinatio Immerfiva.*

Solutio & fit in quolibet liquore cor-
rosivo, etiam minori acrimonia prædi-
to. Ut ∇ vulgaris \sim Θ -i, Sal. nitri, &
Sal. communis, Sulphuris, Θ -is, \times iaci.
Coagulatio fit, vel inspissatione, vel præ-
cipitatione, sed raro.

E. gr. per ∇ .

R. Limatur. Θ ζ j. affunde sensim
 ∇ . ζ vi. digere per noctem, & ab-
strahe ∇ in arena. Sic relinquitur
Crocus rubicundissimus, per deliqui-
um solubilis.

Per \sim Sulphuris.

R. Θ laminat. vel limat. vel croc.
& aperit. cum Sulphure præparat.) af-
funde guttatim Θ Sulphuris, simplex
vel ∇ mixtum,) solutioni affun-
de ∇ calidam, filtra, coagula aliquan-
tulum, ac repone ad Crystallifandum s.
a. Crystallus purifica solvendo ac coa-
gulando. *Hartman. in pract. Beguin.
Gluckraib. & Kesler. libr. 1. cap. 13.
Tentzel. in Exegef. loco de Θ o Sul-
phur.*

N. 1. Similiter fiunt Θ Crystalli & cum
 \sim Sal. com. p. 1. & \times p. 3.

N. 2. Eodem modo fiunt & Crystalli
& cum \sim Θ -i. Et hi dicuntur Sala.

Magisterium Chalybis Glatum.

Nimirum:

R. Θ purgatum solve in \sim u Θ -i
rectificatiss. coagula. Sic habes Magi-
sterium Chalybis Glatum in forma
Vitrifoli viridiusc. *Sala in Tartalog.
cap. 8.*

5. *Calcinatio Vaporosa.*

Laminas Θ supra ∇ in cucurbita
clausa suspende, cucurbitamque in arc-
nam calidam colloca, sic vaporum ad-
hærescet paulatim laminis crocus pede
leporino abstergendus.

N. Labore repetito major copia croci
colligi poterit. *Senn. Inst. Hartm. in diss.
Chymiatr.*

6. *Calcinatio Illinitionis.*

R. Laminas Θ illine Θ Θ -i, vel Sul-
phuris, vel limaturam Θ eodem liquo-
re consperge, & repone in cellam. Po-
stea ablue aqua, & subsidebit crocus,
qui parum ad rubedinem solummodo
calcinandus.

N. *Quercetanus infundit \sim Sulphu-
ris, ac ∇ ana in cochlear ferreum: omnia
bullire finit ad ignem lentum usque ad
consumptionem: Hinc reponit per aliquot
dies, pulveremque croceum abstergit, qui
facile liquefit. Hunc verum Epatis re-
staurativum appellat, eumque in Tragea
hepatica seu basin recipit. Vide Pharm.
cap. 16.*

Vires. Visissimus est hic Crocus in Ca-
chexica, insigne est aperitivum.

Dosis gran. 3. 4.

Eodem modo fieri quoque potest

Crocus σ beneficio \sim . O. \ast . Sal. nit.
Paracels. l. de mort. rer. natur. Verum
 hic Crocus non nisi extrinsecus adhi-
 bendus est.

Aliter.

\mathcal{R} . ∇ (ex σ i calcinat. & Sal. com.
 ana cum argilla destillata,) infunde in
 cochlear ferreum, ut evaporet. Sic sta-
 tim relinquitur crocus tenerimus, qui
 abradendus & in vitro (quia facile li-
 quescit,) reservandus est.
Gluck.

III. VOLATILISATIO AC DESTILLATIO.

unde 1. Aqua. σ .

\mathcal{R} . Limatur. σ is, expone aëri hu-
 mido in cella aliquamdiu, (septimanas
 aliquot,) hinc destilla, vel ex humili
 Aludele, vel ex Retorta. Sic nancisce-
 ris aquam σ is sal redolentem, sed pau-
 cam.

N. 1. Destillatio hac feliciter procedit,
 & a crescente, & circa plenilunium.

N. 2. Post abstractionem reponi denuò
 potest, ut solvatur; denuoque destilletur
 ut prius.

2. \sim σ is.

\mathcal{R} . Mineram σ , destilla per Retor-
 tam: liquorem destillatum reaffunde;
 digere ac iterum destilla.

3. σ Martiale album.

\mathcal{R} . σ q. v. solve in \sim u Sal. com. so-
 lutio destilletur per retortam, sic \sim
 prodit, Essentiâ σ is imprægnatus sapo-
 re subdulcis.

Vires. *Aperit obstructions præsertim
 Epatis, Lienis, venarumve saraisarum,
 ac Uterii.*

Dosis gran. aliquot.

4. σ σ iale rubrum.

\mathcal{R} . Solutio σ præcedens, impræ-
 gnetur cum crem. Tartari, destilletur
 ∇ fortissimo, ex cucurbit. vitrea humi-
 li, vasis intus videbis colores instar
 candæ pavonis, extillatque primò li-
 quor: igne dein fortiori, σ grave cum
 Crystallis, quos per del. solve & junge
 prioribus.

Vires. *Leviter adstringit & roborat.
 Hinc in Dysenteria & fluxibus alvi aliis-
 que maximi commodi existit, Clariss. Dn.
 D. Helvicus Dietericus, Archiater. Sere-
 niss. Elect. Brandenburg.*

Dosis gran. 3. 4. & ultra.

5. σ σ Sulpureum.

\mathcal{R} . Mannæ σ (Tincturæ) circula
 cum ∇ rectificatis, & supernabit σ de-
 stilla per XX , ut transeat & oleum.

N. *Fragrantissimum hoc σ perhibe-
 tur ac pingue.*

Vires. *Maximas vires habere consuetur
 in obstructione ac debilitate Lienis, &c.
 D. D. Paulus Keller.*

6. Ol. σ præstans.

\mathcal{R} . Croc. σ per Reverb. Spir. σ i,
 philos. q. f . Digere, extrahe aliquoties
 recenti spiritu rubedinem. Spiritus
 tinctos junctos abstrahe ad mellagi-
 nem. Hanc extrahe cum ∇ Sal verò
 cum ∇ comm. Spiritus tinctos abstra-
 he ad

he ad oleaginositatem, cui sal purificatum per digestionem.

Vires. Summum est obstructivum.

Dosis gran. 4. 5. &c.

Clariss. D.D.I.C. Faus.

7. Vitrioli & is destillatio.

Destillatio Θ i ex Θ confecti nihil peculiare è destillatione Θ i vulgaris habet, iisdem enim modis perficitur. omnesque Medicamentorum formas, quas ex eodem illo vulgari Θ lo descripsimus, exhibet, felicioris tamen est operationis, in morbis ad Θ is affinitatem accedentibus.

IV. EXTRACTIO.

unde Tinctura.

\Re . Limatur: Θ lb. 5. candefiat, & extinguatur aliquoties in vini malvatici lb. iv. sic Essentia Θ Θ -lata communicatur malvatico.

Dosis ab 3b. ad 3ij. in jusculo vel haustu aqua cichorei. Harim. in pract.

Aliter.

\Re . Θ limat. \times ana lb. i. coque in sartagine ferrea l. Δ . semper agitando donec \times consumptum sit, (quo sa pius, eò melius, infunde postea in vino malvatico lb. 4. 5. 6. digere, quotidie aliquoties agitando, (Θ 14) postea depleto & adhibeto.

Vires. Prodest ad omnes affectus Splenis, item ad menstrua, tum provocanda, tum inordinata corrigenda.

Dosis 3b. ad 3ij.

N. Potest aromaticarij Garyophill. & simil. Finck.

2. Tinctura ex Θ crudo.

\Re . Limat. Θ extrahe rubedinem cum \times acerrimo s. a. decanta & abstrahe. Dein extrahe cum ∇ . Quo tandem iterum abstracto, relinquitur Tinctura seu Essentia Θ in fundo.

Dosis ad 3j. vide Senn. Inst.

Aliter.

\Re . Limat. Chalyb. q. pl. irroretur \times aliquoties & exicetur. Hinc extrahe cum ∇ Tartarato. J. C. F.

3. Alia ex Croco Θ Quercetani.

\Re . Croc. Θ [per ∇ facti,] extrahe Tincturam digerendo cum ∇ vulgari donec rubescat, decanta à fecibus, & abstrahe ad oleositatem.

Dosis: Pramissis universalibus, propinantur mane ac vesperi gutt. 9. vel 10. in decocto juniperi. Harim. in pract. loco de Hamorrhag. & de Hydrops.

4. Alia ex Croco Θ

Sic & ex croco Θ per reverb. fit Tinctura cum ∇ , cujus eadem Dosis.

5. Alij que Basilij est.

\Re . Limat. Θ solve in sp. Θ i rubr. p. r. ∇ . fontan. p. ij. filtra calide & crystallisa, s. a. Crystallos exicca sub regula continuo agitando, habebisq; crocum purpureum: affunde \times & extrahe s. a. Hinc abstrahe in MB \times , ac elue, ∇ m font. aliquoties abstrahendo. Tholdius.

N. 1. Eodem modo ex Θ o Θ ad summam rubedinem reverberato extrahitur Tinctura seu Sulph. beneficio \times s. a.

Quæ abstracto ✕ in forma pulvisculi rubicundissimi asservanda.

N. 2. Ex remanente terra extrahitur Sal. com. per ∇ m mellis corrosivam.

5. *Alia ex Scorius cæruleis.*

R. Scorias ♂ cærul. vitrescentes pulverisæ. (alii calcinant prius hor. 24.) extraheque tincturam rubram digendo cum ✕ acerrimo, filtra & abstrahæ, restantem Tincturam edulcora aliquoties ∇ pluvial. Tinctura hæc liquefcit sponte in cella.

N. Efficaciorem habebis Medicinam si per ∇ , Tinctura solutionem ac extractionem denuo iteraveris.

Vites. Longè efficacior est, quam Crocus vulgaris reverberatione factus. Vim habet sistendi omnes fluxus, si ve sint Menstrua, si ve Gomorrhæa, Dysenteria, Diarrhæa, Hemorrhagia, &c.

7. *Alia ex floribus Croci ♂.*

R. Croci ♂ (per reverber.) sublima cum ✕, ex floribus edulcoratis extrahe Tincturam cum ∇ , abstracto iterum ∇ , relinquatur Essentia in fundo.

N. Dicitur precipitare ∇ m, Kesler, lib. 3. c. 71.

Alia ex calce ♂.

R. ♂ Limat. à quo ✕ sexies vel pluries sublimatum sit, extrahe cum ∇ decanta & abstrahæ aliquoties cohobando.

N. Pulvis ille ante extractionem in liquorem resolvi potest, qui ∇ elota etiam intrinsecus exhibetur.

9. *Alia.*

R. Croc. ♂ probè calcinat. q. v. irora cum spirit. ♂ digereque in calida donec spir. ♂ exiccatus fuerit: hinc tere super marmore affus. que ∇ fontanâ macera in Arena calida per ♂ (3.) postea filtra per chartam: filtraturam inspissa & extrahe cum ∇ Tincturam.

Ex communicatione Affinis mei dilecti Jacobi Holshapffel/ Pharmacopœi nostratis laboriosissimi.

10. *Alia Tinctura, Manna ♂ is*

R. ♂ Laminat. q. v. extrahe cum ∇ u ♂ alcalisato, filtra & abstrahæ, sic habes Tincturam ♂.

11. *Basium ♂ & ♀ is seu Tinctura extemporanea S. Closs.*

Compara tibi ♂ ex viridi æris Distillierten Grünspan) pelle per ∇ A Arena quicquid phlegmatis & spiritus volatilioris exire poterit. Hoc affunde super limaturam ♂ in vase strictiori. Intra quadrantem horæ absque adjuvamine Δ sanguine ♂ tis ♀ us imprægnabitur, abstrahæ phlegma atque fusibili croco ∇ superfunde, denuoque extrahe.

11. *Sal saccharinum & Tinctura flava ♂ ejusdem.*

℞ Croci ♂ parati cum Sulph. q. v. Affunde aq. restantem post præcipitationem butyri ♂ ii, quam Spiritum ♂ li Philosophicum vocant, una cum phlegmate (si hic desit cape ∇ um Sal. nit. Sal. com. diureticum ut cap. de Sal. com. indicabitur) sine extrahere in tin-

tingturam flavam cum fœtore quodam Sulphureo, qui mox evanescit. Hanc coagula post filtrationem in Sal. Com. Saccharo dulcius, & majoris virtutis gratiâ ¶ circula.

Vires. Hepar roborat, unde hydropicis, iisque qui diffuentia in tibiis ulcera patiuntur prodest, menses superfluos & hamorrhoides siccat, dysentericos iuvat sumpta cum zher. rec. lienem deobstruit.

Dosis sal. (S. cum ol. nuc. mosch. Tinct. gutt. vii. in vino aq. linaria,

13. Tinctura rubra ¶.

Laminas ¶ subtiles stratifica cum pumice & reverbera per 24. horas. Rubescet pumex, è quo cum ¶ tingturam poteris elicere & in sal. rubrum coagulare.

Ad Calcinationem reverberatoriam pertinet seq.

Limaturam ¶ calcina absque ullâ præparatione aut commixtione Δ reverberii, donec ex rubedine summâ in calcem albam transierit.

Dosis ʒss. in vino albo. Frater D. Rondeletii hoc medio ab Ischuria curatus est.

Ex commun. S. Cloff.

14. Tinctura alia & inde.

Magisterium ¶ is albisimum.

Limatura ¶ is Δ fortis. eousque reverberetur, donec elevetur in crocum leviss. & rubicundiss. Irroretur cum Sp. ¶ i atque siccetur. Repetendo hoc (4.) Dein tantum affundatur Sp.

¶ i q. s. ad extractionem. Digeratur usque dum colore rubicundo tingatur, sæpius vero agitetur. Extractio lento calore redigatur ad mellaginem, quæ soluta aq. pluv. destillata & filtrata præcipitetur cum ¶ i. Sic habebis magisterium albissimum, quod probè edulcorandum.

Vires ex ipsa descriptione cuius patet, prodest in morbis quam plurimis hypochondriacis, hepaticis &c.

Ex commun. Cl. D. Joëlis Langelot.

V. SVBLIMATIO.

Hinc

1. Flores ex ¶ crudo.

Sublima limaturam ¶ cum *, (vide in *.) & elevatur quoque portio ¶. hæc à * elota, habere vim sclopetantem, æque ac ☉ fulminans dicitur, sed erroneè.

2. Flores ¶ ex crystallis.

3. Crystall. ¶ (cum ¶ nitrosa fact.) sublima cum *, & habebis flores rubicundos, quos edulcora. Kestl. lib. 1. cap. 63.

Vires. Vim maximam habent in lienis & mesenterii obstructione.

VI. SALIFICATIO.

Sal ¶ duplicis videtur esse sortis, subdulce scil. & ¶ latum.

1. Sal ¶ subdulce.

3. Limatur. ¶ irrota * optimè, ut pasta inde fiat, quæ siccescat: siccatam tere ac irrota iterum, &c. idque repetere multoties. Tandem effunde phlegma aceti, coque bulliendo & filtra; humiditate in MB abstrah-

tracta, digere cum ∇ Crystallisque
serva pro usu.

Vires. *Vim habent incidendi & aper-
iendi, obstructions etiam contumaces,
viscerum & uteri. Vide in Epistol. Gre.
gor. Historiæ observationibus annexis,
lib. I.*

2. Idem Sal assequi poteris vi ∇ sim-
plicit, loco \times ac phlegmatis ejusdem
adhibita, sed quantitate minimâ.

N. Succum ferrum sale abundantissi-
mum est, ideoque reliquis in salis hujus
confectione præferendum.

2. *Aliter.*

R. Calcem seu croc. \odot [per ∇
factum] extrahe Sal cum aqua, filtra,
coagula, ac repone ad crystallifandum,
vel inspissa prorsus. Salem \odot licum
quem nactus fueris solve denuo aliquo-
ties & coagula, sic habebis Sal \odot sub-
dulce.

N. Filtratio siquidem fieri nequit, quin
charta vi corrodente corrodatur, dilui po-
test solutio aquâ fontana, quo minus acris
& filtratura aptior evadat.

3. *Aliter, Sal Basilianum.*

R. Materiam in Tincturâ præpara-
tione residuam, (c. gr. in Tinctura Ba-
siliæ,) affunde ∇ mellis corrosivam, ac
extrahe Sal. com. s. a. Hinc abstrahere
 ∇ m mellis, edulcoraque cum aqua fon-
tan. per distillationem iteratam abstra-
cta. Tandem clarifica cum ∇ Thold. in
Halograph.

Dosis gran. 6. 7. 8. &c.

3. \odot m \odot is ex cementato.

R. Calc. \odot (cementatam cum Sul-
phure, ut supra,) extrahe Sal. com. ut
moris per ∇ calidam, filtra & crys-
tallisa, s. a. Croll.

5 \odot ex soluto \odot .

R. Limat. \odot solve in \odot \odot i rubr.
p. i. ∇ æ font. p. ij. filtra calidè, & cry-
stallisa s. a. Tholdius.

N. Simili modo & per alios liquores
acres crystalli \odot us exhiberi possunt, de
quibus in Crocorum præparationibus,
quippe nihil aliud sunt quam ipsemet Cro-
cus, quem ipsum vel sola exiccatione ad
ignem referunt.

Sal \odot is purgans.

R. *i. Limat. \odot is p. æq. misce, le-
niter terendo in marmore, inde cucur-
bitæ fictili & \triangle primo lento \triangle dein
fortiori, sensim & per gradus \triangle augen-
do. Tandem refrigerare sine, factoque
vasè, partem superiorem albam reserva,
novæ sublimationi cum recenti limatu-
ra \odot peragenda; Partem mediam Cro-
ceam similiter serva (sunt flores \odot is
diaphoretici.) Denique partem quæ
in fundo remansit (∇) exime & modo
vulgar. Sal. com. extrahe, idque solven-
do & coagulando purifica, clausoque
vitro reserva.

Vires. *Vim obtinet purgandi.*

Dosis \mathcal{B} . ad \mathcal{B} in cochl. 1. aut 2. Sy-
rupi violarum laxativi, &c.

N. Quando Sal. com. prædictum in
syrupo violarum solvitur, necessum est ut
bene agitetur, donec Syrupus totus spu-
ma evadat, qua stet per noctem, ut clare-
scat,

CAPVT XII.

385

scat, iterum. Tunc additur pro libitu ali-
quid clareti laxativi.

Ex commun. amici Hamburg.

VII. LIQVATIO.

¶ per se minimè liquefcit, ve-

rum si in crocum [calcinatione hu-
mida,] redigatur, aliquo modo liqua-
bilis evadit; unde Liquor seu Balsa-
mus, medicamentum in vulneribus a-
ptissimum.

CAPVT XII.

De Cupro.

Cuprum, alterum Metallum, ex
ignobilioribus duriusculis est,
constans (secundum Theophrastum)
ex Sulphure purpureo, Sale rubro, ac
¶ rio citrino.

Dicitur ¶, quod cum venere Cæ-
lesti in Macrocosmo, cumque genera-
tivis partibus in Microcosmo sympa-
thiam obtineat, dicitur & Æs, German.
Rupffer.

Vires. Præterquam quod partes ge-
nerativas peculiariter confortare credi-
tur, variis abundare facultatibus estima-
tur, adeo ut sint qui dicere non verean-
tur, nullum metallorum salubriorem spi-
rare auram quam Cuprum. Et hinc Ma-
joribus ac præcipuè Hippocrati præter re-
liqua frequentissimo in usu fuit. Nos reli-
cto Cupro crudo, præparationes libabimus,
qua sunt.

I. PURIFICATIO.

Purificatur à sordibus superficialis,
si imponatur hor. 7. 8. 9. &c. in ∇ ⊕ li-
mixta cum ✕.

II. CALCINATIO.

unde Crocus.

1. Reverberatoria.

Fit more communi, limaturam, scil.
cremando.

N. Lamina ¶ is reverberantur ca-
lore fornacis sigulina in as ustum, quod
facili contritione in calcem reduciuntur.
Begin.

2. Immersiva.

Solutio fit in liquore acri.

E. gr.

∇. ~ Sulphuris, ~ ⊕. i. & similit.

Sic:

Dissolve ¶ m in ∇, ac præcipita
per ∇ m tepidam infusam, vel per par-
ticulam ¶ is, Cæve injectam. Be-
guin.

3. Vaporosa: unde Ærugo, seu
viride aris.

Suspendantur laminæ ¶ is. ut vapo-
ri Vini & racemorum objectæ sint, sic
adhærescet Crocus pede leporino ab-
stergendus.

4. Illinitionis.

Illine laminas æris liquore acido seu
acri.

N. 1. Quinimo sola ∇ simplex, tantil-
lo Sal. com. vel ✕ imprægnata aruginem
extrahit.

Kkk

N. 2. Pa-

N. 2. Paracelsus solvit salia (Sal. com. Sal. nit. & simil.) in vesica, atque solutum liquorem laminis illinit. libr. de mort. rer. natural.

5. Cementatoria.

Fit cum Sal. com. & Tart. &c.

R. Laminas Q is, F. S. S. S. cum Sal. com. præparat. calcina paulatim leviter igniendo. Postea ignitas in aquam injice, atque à nigredine benè elue, iterumque F. S. S. S. calcina, ac elue ut prius. Tandem coque ac repone, ut subsideat crocus, quem edulcora ∇ a.

Vires. Insevit Chirurgia, ingreditur Emplastrum Oppodeldoch. Gluckr.

N. Eodem modo cementatur quoque cum Sulphure, hor. 3. vel 4. inque asustum reducitur Officinarum; calcinatur isidem & limatur a Q cum Tart. simili modo quo ad exhibendum Θ m calcinare docuimus.

III. DESTILLATIO.

Destillationibus iisdem Q subijci potest, quibus & Unde & ∇ m, Spiritum, Olea, Mannam, &c. exhibere aptum natum est, inprimis tamen destillationi subijcitur Θ m Q is cujus spiritus adeo famosus est, ut peculiari nomine Acetosus esurinus Paracelsi nuncupetur: Viresq; quæ spiritui Θ i vulgaris adscribuntur, huic efficacius competunt.

1. Spiritus & Oleum Θ i Q is
S. Cloff.

Fiat Θ lum Q is methodo Crollianâ. Hujus lb. x i i. in ∇ conficiuntur

& Δ moderatè destillatur phlegma omne, id quod horis circiter 6. perficitur; Cohobeturque destillationibus ad minimum super Colcothar. proprium, ut mediante hac fermentatione ∇ us volatiliores secedant promptius, tum demum augeatur Δ per gradus per 5. & continuos minimumque corp. fixi in ∇ remanet. Spiritus albos à rubris separa atque seorsim rectifica.

Vires. Spiritus Q summum est adversus Epilepsiam Sympathicam remedium, præmissâ purgatione cum floribus rubris Q ij. Dos. à gutt. 8. ad x. in jusculo acidis succis exasperato, alias vomitum excitabit.

2. Spiritus aurei coloris.

Fit ex ∇ cui super funditur vel spir. Q extillatus, vel ∇ Tartarizatus, digerendo donec Tincturam extraxerit, evocam menstruum, reliquum pelle per ∇, egredietur aureus Spiritus.

IV. EXTRACTIO:

1. Tinctura Basiliana.

R. Virid. æris q. v. solve in bona quantitate ∗, filtra. Hinc abstrahe ad siccitatem (alias crystallifabitur) nanciscerisque viride æris purificatissimum extrahe f. a. Tincturam Smaragdinam cum succo ex racemis immaturis expresso, donec nihil amplius coloris exhibeat.

N. Remanet corpus, quod reservetur ad Salis Q is confectiorem. Tholdius.

2. Alia seu flores æris.

R. Ærug. q. v. extrahe cum ∗; decanta & abstrahe ad siccitatem, edul-

edulcora optimè aquâ calidâ.

Vires. *Mundificativum summum est in vulneribus, unde & Emplastrum Oppodeldoch ingredi solet. Wirtzius in Chirurgia.*

N. Simili modo fit & Θ m Φ is per Crystallisationem.

3. Alia Balsamus Φ is dicta.

R. Lamin. Φ , affunde \sim Terebinthin digere & colorabitur colore viridi.

Usus ejus est in Chirurgia.

4. Alia.

R. Limat. vell lamin. Φ lb. iij. vel iv. irrorâ \times siccescat lentè, idque repete multoties. Hinc affunde ∇ calidam, decanta ac filtra per chartam, (& remanebit in charta terra flava, alii usui reservanda.) Filtraturam coagula l. Δ . ad mellis consistentiam.

R. Hujus Tincturæ quantitatem satis magnam, inde cucurbitæ atque $\times\phi$ o leviter imposito, da ignem lenem, & quando fervere incipit tolle $\times\phi$ moveque bacillo, ut refideat, idque repete, donec amplius non fervereat. Hinc firma & annecte firmiter $\times\phi$ m, (luto, & simil.) destillaque ex arena in recept. capaciss. Δ gradatim adhibito, sic prodibit primo, spiritus albus acidus paulatim flavescens, & rubescens cum nebula: urge, donec nihil amplius ascendat, (est opus unius diei.) Destillatum rectifica in cucurbita oblongi colli ad siccitatem, igne moderato, ne quid flavi & rubei ascendat. Ex restante ma-

teria extrahe s. a. Tincturam cum ∇ rectificato. Hanc destilla, & quia ascendit quoque Tinctura, cohoba, donec figatur: hinc coagula ad consist. mellis.

N. Ex materia seu terra illa remanenti, ulterius calcinata, extrahi potest Sall. commun.

Vires. Tinctur. præstantissimum medicamentum est in Epilepsia, aliisque morbis plurimis, cum liquore convenienti exhibitum.

Alia Manna dicta.

Manna simili modo parari potest ex Minera Φ is, & c. Sicut Manna ϕ , ex minera ϕ .

Quinta essentia Φ is.

\odot post expulsionem \sim us albi & rubei olei residuum, expone aeri pluvioso, ut humescat, (aliàs parum salis obtinebis) perfundatur phlegmate suo, eliciatur sal ut moris est, cujus pars una confundatur cum part. duabus spir. & olei Φ is, stent in digestionem per 14. ϕ . Tingatur colore rubeo.

Vires. Hac Tinctura levissimo Δ continuo fixata & coagulata, est summum arcanum ad morbos cerebri sang. depurandum, febresq. omnes contin. & intermitt. S. Closs.

V. SALIFICATIO.

1. Sal:

Sal Φ is Θ -tum ex viride æris lixivari potest beneficio \times , nimirum $\times\phi$ o aliquantulum abstracto, residuum

Kkk 2 um

um frigori exponitur, sic congelantur
Crytalli.

2. *Aliter, secundum Thold.
ex Basil.*

℞. Residuam materiam, ex qua Tin-
ctura Basiliana extracta est, exicca, &
affunde ∇m mellis, ut extrahatur: Sal
abstrahe tandem ∇m mellis, & digere
cum V.

Vires. Sal ℞ calfacit intensius quam
reliqua Metallorum salia, corroborat
ventriculum, cruditatesque inibi emen-
dat, proinde flatibus, aliisque affectibus
inde oriundis, v. gr. colico & simul me-
detur; uterum frigidum calfacit ejus sus-
focationem sanat, menstrua promouet, re-
num quoque morbis succurrit.

Dosis gran. 3. ad 8.

3. *Aliter.*

Calcina limaturam ℞ is cum Sul-
phure, (eodem scil modo. quo supra
∇m calcinare docuimus,) hinc elixivia
sal coquendo cum ∇ fontana: aqua hac
evaporata relinquitur sal, seu ∇m
℞ is.

Vires. In servare poterit loco ☉, ac
proinde eadem inde Medicamenta parari
possunt quae in ☉o dedimus.

VI. *SVBLIMATIO.*

Sulph. ℞.

☉ vel ☉ sublimatur cum *co e-
dulcor. V. infra.

Flores ℞

Fac lixivium ex ℞. ij. ♀ & ℞. * hoc
coagula in salem, quem M. cum part.
iij. boli communis, & spiritus albosi e-
duc instar ∇, Δ per gradus aucto, Re-
ctificentur.

℞ Hujus menstrui part. iv. limat.
℞ is (aut quod melius Virid. Aeris. part.
i. pone inter ♀ vase obturato, solve-
tur metallum insensibiliter, affunde a-
liud, tantisper, donec feces nigrae & le-
ves tantum supersint, aq. solventem ab-
strahe, quod remanserit urge Δ aperto
in cucurb. ita elevabitur metallum in
flores subsidio resolubiles in Balsamum
viride.

Vires. Usus ejus est in Ulceribus ca-
coethicis, si verò eosdem à m-bus *co
vindicaris, tunc secure & absque morsu
Vulnera & ulcera quavis exiccant. Empl.
& Unguentis permixti.

Ex commun. ejusdem S. Crostae.

Oleum Virid. Aeris causti
cum ejusdem.

℞ Virid. Aeris part. i. Sal. nitr. part.
ij. ponatur in catillo, incendantur car-
bone donec deflagarint, quod rema-
net solvatur in cellâ per deliquium, vel
in vesicâ suillâ diligenter claurâ in aqu.
demersa. Valet ad pustulas ℞ eas & ver-
rucas absumentas.

De Plumbo.

AD tertiam progredimur Metallo-
rum Classē, quæ Metalla igno-
bilia minus dura continet, Plumbum
scilicet ac Stannum.

Preparationes sunt.

1. Purificatio. 2. Calcinatio. 3. Sub-
limatio. 4. Destillatio. 5. Extractio,
quibus addi possunt Mercurificatio,
Salificatio & Liquatio.

Plumbum Metallum est vilissimum,
constans ex Sulphure indigesto, Sale
aluminoso ac ☿io, naturam ♀ialem æ-
mulante.

Dicitur Saturnus, quia tūm ma-
crocosmico, tūm microcosmico Sa-
turno, id est lienī consecratum statoi-
tur. Græcè μόλυβδος Germanicè
Bley.

Vires, Refrigerat, adstringit, increas-
cat &c. libidinem reprimat, ulcera carni-
bus implet, cicatrice obducit excrecentiis-
que liberat, ulceribus cheroniis, que vo-
cant malignis, cancris & putredinosi;
tūm per se, tūm quibusdam aliis permi-
stum, convenit.

I. PURGATIO.

Fundatur H, dumque fluit, injice
aliquid ceræ vel axungæ aurigarum
(Wagenschmier) ut efflagraret, hinc
effunde in aquam (calidam.)

II. CALCINATIO.

1. Incineratoria.

Funditur plumbum, auctoque igni
ut olla candeat, continuâ agitatione
reducitur in cinerem, seu calcem cine-
ream.

2. Reverberatoria.

Unde Minium Officinarum.

Calx illa H i continua agitatione re-
verberatur ulterius ut rubescat.

N. In reverberatione cave ne iterum
fluat, alioquin in plumbum de novo con-
vertetur.

3. Cementatoria.

Unde Plumbum ustum Offic.

Fiat S. S. S. ex H i braetis & Sulphu-
re pulverisato, uraturq; hac ratione H:
post ustionem sæpius abluatur & resic-
cetur. Et hoc est plumbum ustum Offi-
cinarum, quod lavari potest, ut Cad-
mia, Dioscorid.

4. Immerfiva.

Et si H us beneficio cujuslibet li-
quoris acidi calcinari possit, quales
sunt, R, Sal. communis, Sal. nitri,
O, i, ☿ in Officinis contenti rarissimè
reliquis utimur.

Unde

1. Saccharum sive Sal H i.

2. Calcis H i, vel minii, q. v. affun-
de ☿, stent aliquandiu, extrahatur-
que f. a. decantatos liquores filtra,
humiditatemque abstrahendo coagu-
la: sic habes Sal H i, quod iteratis

Kkk 3 solutio-

solutionibus ac coagulationibus, (primo in ✕, dein quoque in ∇,) purificari, & tandem ad crystallifandum reponi poterit, rejectis in operatione fecibus.

N. 1. Quidam à Sale illo Hi ✕ aliquoties (3) cohobando abstrahunt, hinc affundant V, cohobantq, iidem vicibus tribus.

N. 2. Simili modo & ex H granulato sal elici potest, quod præstat priori.

N. 3. Si ✕ acuaveris u O i, vel Sal. nitri facilius negotium perficitur.

N. 4. Sal Hi crystallifatum si in celam reposueris, liquecet paulatim, atque hac ratione O Hi per deliquium acquiri potest.

N. 5. Fit ex hoc Sale & Balsamus Hi, quem vide in Lithargyrio.

Aliter.

R. Laminas aliquot Hi tenuissimas, suspende partim in cucurbita supra ✕, partim quoque ipsi ✕ immerge. Hinc destilla cum cohobiis: destillatum hoc, cum eo, quod in fundo remansit, filtra, addendoque cerussam, quæ laminis adheret, digere aliquamdiu: tandem lenissimo calore abstrahe aliquotam ✕ partem, residuumque repone ad crystallifandum s. a. crystallos collectos purifica solvendo, coagulando. *Kesler. lib. 1. cap. 17.*

2. Magisterium Hi.

Solutioni Hi instilla O Tart. p. 1. & præcipitabitur.

Vires. Saccharum & Magisterium

(utriusque enim eadem ratio est,) intra corpus sumptum, frigiditate sua libidinem extinguit.

Dosis gran. 4. 5. 6.

Extrinsecus, arceat libidinem, si umbilicus & priapus coinungantur. (N. Si vicissim mederi velis, utere Balneo Laconico, & inunge umbilico O nucis moschata destillatum.) Mira quoque præstat in ulceribus corrosivis, malignis, cancerosis, impetiginibus, ambustis ac inflammationibus. Dissolvit tumores duros & scirrhosos, applicatur commodè contusionibus, conferitque inflammationibus rubediniq, oculorum, in ∇ rosarum & euphrasie vel ciliis quoque impositum. *Croll. Beg. Senn. in Inst.*

N. Sal Hi cum Sal. nitri in Crystallis concrevit asthmaticis proficuos, vide c. 23. sub titulo Sal. nitri Saturnisati.

3. Aliud Magisterium Hi. Lac Hi dictum.

R. Solve laminas Hi in u O i rectificat. vel ∇, ex Sal. nit. & O am) decantata: solutioni affunde V rectificat. vel aquam salis, (i. e. aquam in qua sal solutum) & præcipitabitur H us instar nivis, præcipitarum edulcora & exicca.

4. Liqueor lacteus Hi ad ulcera S. Closs.

Imbibe ℥j. salis Hi ni cum Dj. Ol. Sulp. campanarii. stet per aliquot & in frigido, iterumque eadem quantitate O irroretur & sulphurari permittatur in phialâ, quam reple ℥iv. aqu. comm. & agita ut lactescat.

Vires.

Vires. Hoc liquore lacteo imbuantur
pittacia siue splenia dupl. & applicentur bis
aut ter in & calide super ulcera dysepuloti-
ca cito cicatrice qua obducentur.

5. Calcinati Vaporosa: unde
Ceresa.

Suspendantur lamellæ Hi supra ✕,
ut vapores ab aceto elevati circumeant.
Sic adhærescet paulatim Ceresa, quam
derade, &c.

N. Sublimationem in Mercurificatione
videre licet.

III. DESTILLATIO.

Vnde

1. ✕ Hiardens.

2. ☉ flavum.

3. ☉ rubrum.

℞. Sacchar. Hi (vel potius ☉ Hi
per deliq. destilla per retortam vitream
lutatam in excipul. capaciss. juncturis
bene clausis, Δ gradatim adhibito, do-
nec rubræ guttæ cadant, nihilque am-
plius extillet.

N. Destillatus hic liquor quatuor di-
versamensrua exhibere aptus est. Spiri-
tum scil. ardentem, ☉ flavum, phlegma,
& ☉ rubrum: quorum separatio fit per re-
tortam vitream in MB vel cinere, recepta-
culis scil. pro diversitate liquoris extillantis,
mutatis.

Cognoscitur autem diversitas liquoris,
✕ ardens prodit sine ullis venulis in collo
retorta apparentibus, ☉ flavum, cum ve-
nulis obliquis, cen vinum ardens: phlegma
cum venulis rectis: relinquitur ☉ rubicun-
dum in fundo: phlegma separatur ab ☉ fla-
vo seorsimque suscipiendum est.

Vires. ✕ sudorificus est, hinc prodest
in Peste, Melancholia Hypoch. Febris ar-
dentibus, Lue venerea, & sim.

Dosis gut. 2. 3. Tentzel.

N. 1. Venereum appetitum infringit.

N. 2. ☉ flavum & aliquor digestum
rubescit.

N. 3. Cum spiritu & phlegmate sol-
vuntur & precipitantur perle ad tinctu-
ram inde conficiendam. Vide tincturam
Perlarum.

Cum ☉ flavescere sit solutio. ☉ vide
de ☉.

☉ rubicundum mundificat ac sanat
vulnera. stillatur.

☉ mundificat idem vulnera.

Vide Beguin. lib. 2. cap. 4. Hartmann.
in Croß. Sennert. Institut. Kesler. libr. 4.
cap. 57.

4 ☉ Hi balsamicum.

℞. Balsamum Hi Terebinthinatum,
destilla per ☉ igne nudo gradatim ad-
hibito. Prima stillat ✕. Terebinthina,
tandem ☉ Hi balsamicum, suscipe se-
orsim.

Vires. Maximam est virium in can-
crosis, asthomenis & ceteris malignis ulce-
ribus.

V. SVBLIMATIO.

Vnde

Sal Hi volatile.

℞. Min. Hi. q. v. solve in ✕ solve
quoque sal fusum in ∇. com. Utrum-
que confunde. Sic ex templo ☉bitur
pulvis albis qui probe edulcorandus &
exiccandus.

N. Hoa

N. Hoc Sal lamina ferrea radenti impositum liquefcit instar cœra neque effundit.

Ex communicatione Cl. D. Joelis Lange-
lor.

V. EXTRACTIO:

Vnde

1. Sulphur Hi, seu ☉ supernatans.

℞. Mannæ Hi, circula aliquamdiu cum V rectificatiss. abstrahæ V gradatim: sic ascendet tandem & ☉ Hi, supernatans.

N. Si ☉ hoc cum V denuò circules tandem fragrantissimo imbuetur odore.

Vires. Maximarum est virium in affe-
ctibus pulmonum, phthisi, &c. Dn. D. Pau-
lus Keller.

2. Tinctura.

℞. CrySTALL. Hi cum ✕ fact. extrahe cum ☉ juniperi, ac rubescet ☉ abstrahæ, si placet, & serva, vel digere cum V, iterumque abstrahæ.

N. Remanet materia post extractionem sali extrahendo idonea.

3. Alia.

℞. CrySTALL. H (cum ✕ factor. & edulcorator.) q. v. extrahe cum V, filtra, digerendo defeca,) subsident enim feces,) abstrahæ tandem V, & remanet Tinctura in fundo rubra. Kesler. lib. 4. cap. 70.

Dosis 2. 3.

4. Alia Tinctura Hi elaboratior.

℞. Sal Hi crystallif. q. v. affunde V pluvial. sæpius (8.) destilla-

tam, solveque quoad poteris, & decanta. Decantatos liquores destilla in MB ad siccitatem. Hinc affunde m mellis, circula per mensem, ac destilla cum cohobis, multoties repetitis. Tandem abstrahæ mellis m, remanentique Essentiæ, adde Sal. com. ex ☉ Hi extra-
ctum & cum V Tartarifato, per mensem unum ac alterum circula. Hinc V abstrahæ, remanebitq; Magisterium seu Tinctura H rubicundissima.

N. Hic inferere placet quæ Eizlerus de H habet in Isagoge sua: Ex plumbo, inquit, consciuntur medicamenta facientia ad longevitatem: Calcinetur plumbum per vapidi attentionem, & per menstruum debitum extrahatur tinctura. Hæc postmodum abstracto menstruo per debitam calcinationem & circulationem convertitur in lapidem rubicundum pelucidum.

Ufus. Præstantissima est Medicina in Mania, Melancholia, Quartana, Phthisi, Lienem aperit, in Melancholia Hypochondriaca apprimè conveniens est.

5. Alia Tinctura, Manna Hi dicta.

℞. laminat. q. v. extrahe Tincturam cum u Hi essentificato, filtra & abstrahæ.

6. Cremor Hi S. Cloß. Sinde Tinctura.

℞ ✕ partes x. Sal. communis part. ij. mineræ Hi in alcool redact. part. i. Digere per octiduum in E, vel plus donec

CAPUT XIV.

393

donec dulcescat ✕ solum filtra & inter exhalandum sæpius cochleati vitro subleva cuticulam seu Cremorem glaciaturum nivis instar splendens, dum ejus suffic. quantit. habeas, reliquum crystallizetur & ad alios usus servetur.

7. Lapis & Tinctura.

Cremorem hunc indito vasi fixatorio H.S. in capellâ. Eda Δ primo leviss. per 40. &, cavendo ne fluat materia (ut in sale H vulgari accidit inevitabiliter) quibus elapsis proba super laminam candentem, an fluat cum fumo, si sic continua Δ in eodem gradu, donec fumare desinat, & citrinari incipiat, tūm Δ auge dum crocescat, auge fortius ad rubedinem usque totalem pulv. de quo Tinctura cum V non difficulter postea habetur.

Vires. Valet ad morbos Hinos.

8. Tinctura facilior.

℥ minii Hi part. v. silicum calcinat. part. ij. terantur diutissimè, fluant, in tiglio Δ per gradus adhibito donec in lapidem Rubini æmulum colliqueſcat, qui tritus Tincturam suam in V Tartarifatū deponit. Ex comm. S. Cloſſ.

N. Hoc Rubino Hni vel sequenti vitro Hni videtur intelligendus Glauberus prima parte furnorum p. 80. ubi calcem politam Hni miscet cum Sal. com. Tartari & inde destillat Spiritum gradatorium, & liquorem viridem per deliquium ex ② excipit. Vel fiat Rubinus ex calce Hni

sive minio ut est in pag. 151. secunda part. Glauber.

6. Tinctura ex Vitro Hi.

Hnus vi expressivâ Δ folium super testâ probatoriâ redigitur in gummi flavum coloris arantii, transparens, fusile non vaporans in Δ, estque aqua illa viscosa mineralis quam Rhodianus ait omnium metallorum colores, odores & sapes ad se trahere, cum conservatione facultatis vegetativæ (vide sis Bequinum tit. de spiritu ardente Hni) quod sic fit. Spiritus metallorum: Misce calcem cujuscunque volueris metalli cum hoc Gummate Mariæ, mixturam arte fusoriâ redige in Encauston sive Smaltum opacum, quod in pulv. reductum facili Tincturam suam ✕ communicat, scil. ℥ & ℥ subflavum colorem, Hnus ex luteo virescentem, ♀ parasitum, ♂ sanguinem, ○ hyacinthinum impertitur. Solvente verò abstracto, restitans inde gummi mittitur in ① extillaturque fumus albus, opacus, tactu frigidus, quod tandem in Oleum abit naturæ vegetativæ, Basil. Vi generius.

V. MERCURIFICATIO.

Vnde

1. ☿ius Hi.

℞. Sal. com. Hi, q. v. ☿ * p. d. ad emin. 2. digit. digere in cinere & ② 14. Dein destilla & tandem auctiori Δ sublima. Florestere optimè cum ✕ Saleque com. ac habebis ☿m currentem Hi. Kesler. lib. 1. cap. 29.

LII

2. Ali-

2. *Aliter.*

℞. Calc. h. (per ∇ ex \oplus & Sal. nit.)
optimè edulcorat. Crystall. Sal. nitr. pu-
rif. ana. sublima per cucurbitam tabula-
tam, flores tere cum \oplus .

N. *Antequam affundatur ∇ , digerenda est limatura \oplus & ρ (14) cum lixivio, ex \ast Sal. com. Tart. & Ψ in ∇ vel \ast quo lixivio dein evaporato, terendus est supra Porphy. Rosler. li. 4. c. 82.*

3. *Aliter.*

Fiat lixivium ex ciner. clavell. ℞. r. ciner. sarment. vitis, ℞. iv. Ψ , ℞. i. silic. ust. ℞. ij. cum \ast . In hoc lixivio solvetur limat. Et quando lixivium lactescit, injice Borrac. 2. (scil. respectu \oplus injecti) ut solvatur: dein destilla gradatim, extillabit tandem in receptaculum \oplus currens.

4. *Aliter.*

∇ aqu. \ast ci sublimati & in cella refecti ℞. ij. ol. Tart. spir. Sal. nitr. ana. ℞. ss. M. digere per biduum in lapidem.

∇ hujus lapidis pulveris ℞. j. laminarum hni ℞. ij. laminæ solvantur in ℞. iv. ∇ us Sal. nitr. solutio projiciatur super la-

pidem putrescat per mensem aut ultra, abstrahatur ∇ us usque ad liquorem cum cohobio terno, tandem detur Δ ateriorius ut calx hni ascendat, quam digere cum ∇ fortificato \ast co & sale Tart. per diem naturalem, agita inter digitos, & calx ad vitam excitabitur.

SALIFICATIO.

Sal h. verum.

℞. Materiam quæ remansit post extractionem cum \oplus juniperi peractam, sicca optimè, ut oleositas penitus consumatur: extrahie Sal. com. cum \ast [sic extrahitur Sal. com. quod ante extractionem impediatur, quo minus resolvi poterat] abstrahie \ast ac repone ad crystallisandum, Crystall. clarifica abstrahendo ∇ serva. *Basilius in Test. & hinc Tholdius.*

Vires. Refrigerat vehementer & exsiccat, proinde semen extinguit.

Dosis g. 4.

Extrinsècus medetur oculorum rubedini, ulceribus, & totius corporis.

N. Si Oleum seu Liquorem expetis, per deliquium id ex sale habere poteris.

CAPUT XIV.

De Stanno.

STannum est Metallum molle, album, splendens cum livore quodam, constans ex \oplus io puriore (in genere ignobiliorum,) molliore fugacioreque quam Metalla duriora, fixiora vero quam plumbum, & Sulphure

albo minus maturum

Dicitur Hermeticis Jupiter, quod Jovi macrocosmico sympathice conveniat, & proinde Jovi microcosmico, id est, Epatis: nonnullis, plumbum album. Germ. Zin/Weißbley.

Vires:

Vires. Praterquam quod Epati conuenit, uteri morbis peculiariter quoque dicatur.

I. PURGATIO.

Funditur ad ignem, atque interfundendum superinjicitur aliquid sevi, cereæ, vel mellis, ut comburatur. Hinc effunde in ∇ m calidam.

N. Purgari quoque potest per sublimationem, vide infra.

II. CALCINATIO.

1. Incinerationis, &c.

2. Reverberationis.

Fiunt eodem modo, quo h calcinare docuimus.

3. Immersionis,

Fit itidem immergendo, liquoribus acidis ac corrosivis, ut in h, usitatissimè tamen per \times .

Unde

1. Sal ∇ is.

Vide Saccharum seu Sal h, ad cuius modum ut parari & crystallisari, ita & cum ∇ exaltari poterit.

N. 1. Nisi ∇ optimè fuerit reverberatus nihil effeceris.

N. 2. Simili modo & ex floribus Sal conficere licet.

Vires. Prestantissimum ac presentissimum est remedium in uteri suffocationibus, quas admiraculum compescit, tam intrinsecus quam extrinsecus adhibitum. Commendatur itidem extrinsecus ad omnia ulcera fetida, fistulas, canerum, & alia esthiomena.

Dosis g. ij. iij. &c. repetitis vitibus.

2. Magisterium.

Fit quoque simili modo per præcipitationem. *V. Myns. armam.*

N. Paravi quondam Magisterium ∇ is solvendo scil. reverberatum in \times præcipitandoque per ∇ m ∇ is, verum cum alia vice, idem ex calce ∇ is, à Stan-nariis emptam meditarer, nihil effeci. Præcipitatio autem subsequuta est instillando urinam.

Vires. Eadem sunt cum priori.

4. Calcinatio Vaporosa.

Similiter quoque in h o dictum peragi potest.

III. DESTILLATIO.

Destillationi quoque eidem obedit, cum h o, unde lectorem eò remittimus.

Hinc

1. ∇ Diaphoreticus Beguini.

R. ∇ optimè limati vel calcinati, \mathfrak{z} ij. \mathfrak{z} t; \mathfrak{z} iv. Misc. & destilla per retortam, ex arena vel igne nudo gradatim adhibito, idque in excipulum ∇ semiplenum & præcipitabitur pulvis, quem lava, exicca & ferva.

N. 1. Cum incipit destillare ignem suppressum adhibe, ut calor sit moderatus.

N. 2. Pulveris huius origo potius ∇ is adscribenda quam ∇ is. Sunt tamen qui statuunt pulv. hunc nil esse aliud quam partem puriorem ∇ per ∇ m salinos & ∇ latos calcinatam solutam, atque extillantem, cum per fusionem abeat in Regulum ∇ ut ille in Regulum ∇ y redibat. Hinc Antihæticum Poterij.

N. 3. *Aqua residua* ~u ~i phi-
losophico impraguata, destillationi subji-
cipoterit, ut inde habeatur ~u ~i phi-
losophicus, modo supra in ~u ~i de-
scripto.

N. 4. Si post extillatum butyrum lo-
viale ignem suppressionis per gradus de-
deris, tunc in collum ~ sublimabuntur
floris argentei.

Dosis. g. 4. s. 6. Reg.

2. Sulphur ~ is, seu ~ superna-
rians.

Elici potest ex Manna ~ is; modum
vide in ~ o.

N. Eadem ratione quoque fragrans
reddi poterit.

3. Gummi ~viale sublimatum & O-
leum S. Closs.

R. Limat ~ ~ij. ~ ~ti ~vi. M.
manu celeri, pone in ~ collo per am-
plo instructam, pelle per ~. ~um sem-
per fumosum, postea butyrum, inde-
que ~ vivus in copia exhibunt tandem
adhibito suppressionis igne elevabitur
tota ~ substantia, gummatiss grisei ac
præduri specie, paucis admodum fe-
cibus rubris in fundo subsistentibus.
Hoc gummi statim pulverisandum est,
aliàs subsidio humescit, deinde super ta-
bula ~ stanno obductâ collocandum
in vinariâ ubi colliquescet in oleum fla-
vum.

4. Sulphur ~.

Id quod remanet non colliquatum
super laminâ ~. M. cum fecibus supe-
rioribus affunde ~ digere per quadri-

duum abstracto ~ reperies Sulph. ru-
brum ~ is instar Minii.

5. Sal ~.

Resolve hoc Sulph. in aq. communi,
vel per se, in humido lique scat, filtra.
coagula solve. iterum erit coloris Sma-
ragdini cum quadam dulcedine.

Vires. Oleum numeratur inter sol-
ventia metallorum, Sulph. & sal exter-
nis tantum usibus inserviunt, spiritus ve-
rò ~ (quem idèd semper fumosum vo-
cavi, quod in nullo vase absque effuma-
tione sensibili possit contineri) Gan-
grienasolo attactu curat.

6. Crystalli ~ ejusdem.

R. Superioris ~us fumantis ex
~ instar aquæ claræ proliciti quantum
videbitur, affunde per vicesparum V
tincturâ salis Tartari impragnati, ele-
vabuntur bullæ cum strepitu & fumo,
perge instillando, donec cesserit rumul-
tuatio, pone vas inter calidos ~, & fiet
coagulatum nigrum picis instar, da ig-
nem ~ationis & surgent Crystalli albi
fusiles velut cera.

*Qui Vlcera scrophulosa cancrisæque
curant inurendo profundam Escharam,
quâ sublata, balsamo Sulphuris ad cica-
tricem perducuntur.*

V. SVBLIMATIO.

R. Calc. ~ [e. gr. per ~] sublima
per ollas cucurbitæ tubulatæ impositas,
admodum quo flores ~ ii parantur.
Nimirum calx illa per vices injicitur,
tubulique foramen ab injectione ob-
tutatur.

N. i. Pa-

N.1. Parum interest, an calcem vel limaturam Φ is receperis.

N.2. Flores hi nihil aliud sunt, quam Φ depuratum.

V. EXTRACTIO:

Vnde

Tinctura Basiliana.

Φ . Laminas Φ is, cementa cum pumice, (terna calcinatione restinctoria in Vino,) calcinato, subtilissimeque pulverisato, in Φ bulo benè lutato & clauso, Φ ρ (5.) per gradus Δ . Deinde derade pulverem de laminis, eique extrahe sa. Tincturam cum \times . Postmodum abstrahe \times , & habes Tincturam Φ i. Tholdius.

VI. SALIFICATIO.

Vnde

Sal verum.

Φ . Residuum ex quo beneficio \times Tinctura prior Basil. extracta est, affun-

de ∇ m mellis, stentque per aliquot Φ ρ . Sic elicitur Sal, quod abstracta postmodum ∇ a mellis, fit conspicuum. Tholdius.

Vires. Conducit ad Epilepsiam, Melancholiam, Veruginem: Catarrhos exiccat, præcipuè qui ad oculos destilant.

Dosis. 6. ad \mathcal{D} j. vel \mathcal{D} ij.

VII. MERCVRIFICATIO.

Missa est mihi descriptio Φ ii Φ Mompelio pro certissimâ, quam in Cent. 1. Kesleri artic. 22. postmodum reperi, ideoque eam non adscripsi. Si quid Φ iis metallicis tribuendum est, hæc certè non erit momenti minimi, cum in eâ Sulph. impurum comburatur cum Sal. nit. deinde pars Φ alis ascendat per ∇ ationem, quæ tandem putrefactione & ebullitione in Φ um currentem reducitur. S. Cloff.

CAPVT XV.

De Mercurio.

Metallis subjungimus Mineralia Metallis finitima, quæ si Semi-Metalla appellare libet, non magni refert. Suntque Φ \mathfrak{H} \mathfrak{G} .

Mercurius nihil aliud est, quam liquor mineralis, seu metallicus volatilis, metallis & præ aliis \mathcal{O} iavide adhærescens.

Dicitur Argentum vivum, Hydrargyros. Arabitè Zaibar, vel Zibach. Barbaricè, Azock, Azoth. Germ. Quecksilber.

Est nativus (de quo hic,) & artificialis, è metallis extractus, qui & Mercurius corporum dicitur.

Nativus Virginensis etsi nonnunquam per se ipsâ naturâ operatrice, separatus inveniatur: plerumque tamen ex terra minerali, quam cinnabarim vocant, vi ignis evocatur. Vide Φ ex plantis apud Borell. c. 3.

Deleſtus.

Mercurius non æque bonus omnis exiſtit, ſed variat, tùm ratione matricis, ſeu loci natalis, tùm ratione inquinamentorum quibus nonnunquam per ſe in terrâ conſpurcatus eſt, nonnunquam & à malevolis adulteratus venditur.

Natali loco cenſetur optimus, qui eruitur è mineris vicinis auro vel argento, & hinc præfertur Hiſpanicus & Ungaricus.

Inquinamentorum ratione prævalet, qui minus ſcater, commixtione aſenicali, antimoniali, ſaturnina, cadmioſa, quibus nonnunquam in terræ cuniculis venenofus redditur, hinc & qui minus falſaria artificis manu adulteratus eſt: adulteratè enim eum adeò exactè norunt, (plumbiſcil. & Q ii beneficio Biſmuthique commixtione,) ut quoque ſimul per corium tranſire æquè ea queant, adeoque difficile ſit fucum cognoscere. Ea propter ne qua incautus decipiaris, non è re erit, hæc bonitatis ſigna obſervare.

1. Mercurius cenſetur bonus, qui per retortam propulſus nihil recrementi relinquit.

2. Qui in cochleari argenteo evaporationi ſuper prunis expoſitus maculam cochleari relinquit flavam, aut albicantem, non nigram aut ſuſcam.

Vires. Internè mundificat ſanguinem ab inquinamento, præcipuè venerico: Fugat lumbricos, difficilem promoyet par-

tum, &c. Externe inunctus, ſanat ſcabieſem omnis generis, fugat pediculos, reſolvit duros tumores. De collo ſuſpenſus, præſervat à peſte, & (ut nonnulli volunt,) ab incantatione, fascinationeque. Imo quoad ejus præparata, nulla res in Officiis eſt, ſi Q excipias, ex qua major medicamentorum ſupellæx elici poſſit, quam ex Q io . Suppeditat enim purgantia, ſudorifera, mundificantia vulnera, acrimoniam, (præcipuè in Gonorrhæa,) lenientia, ut parabit in formis medicamentorum inde paratis.

Uſus Q ii crudi internus & externus eſt. Intrinſecus tamen rarius adhibetur, extrinſecus ſæpius. Modus applicandi intrinſecus eſt in pilulis, e. g. Barbaroſſæ. Quinimo cum certo quodam ſucco pulveriſari ac exhiberi poteſt.

N. ſi Q m , (ſive crudum, ſive præparatum,) exhiberi intrinſecus volueris, convenientius in pilulis exhibetur, quam in alia aliqua medicamenti forma, ne dentes ſcil. quibus noxiuſ eſt, tangat.

Uſus externus eſt in unguentis, (in quibus penitus diſparet,) in Emplaſtris (que in ſcabie) complicaturis ſaltem articulo- rum adhibentur. Sed cave ne nimium adhibeas. Etenim cum ſalivatione oris putredinem inducit, loco quocunque applicatus, id quod de præcipitato ſimiliter obſervatum eſt.

Præcipitationes Q ii ſunt.

1. Purgatio. 2. Calcinatio & Præcipitatio. 3. Sublimatio. 4. Deſtillatio. 5. Extractio. 6. Liquatio. 7. Salificatio.

1. PVR.

I. PURGATIO.

Purgatur Φ . i. Expressione, per corium, qua fecibus crassis in corio remanentibus Φ transit.

N. Et metalla si bene admixta sint simul transeunt.

2. Lotione.

Lavetur autem vel per \times simpliciter, aut cum Sal. comm. mixtum, vel per lixivium calcis vivæ, & cinerum clavel-latorum, vel etiam per lixivium saponariorum, sæpius nimirum cum his agitando, & vicissim à sordibus eluendo.

Quinimo purgatur quoque agitatio-ne forti cum Vin vitro obturato, separatur enim nigredo ad latera.

3. Destillatione.

Nimirum destillatur in arena per retortam igne sat forti, id que per se, id est, sine additione, vel addito sale Tartari, calce viva, & simil. Optimè vero purgatur amalgamando cum metallis perfectis, ac postmodum per retortam, à corpore admixto separando.

N. i. Sequestrari quoque potest Φ purissimus, per reductionem ex Φ 30.

N. 2. Purgationes quòs sæpius iteraveris eo puriorem Φ m colliges.

N. 3. Optima purgatio fit à metallis perfectis aliquoties cohobando.

III. CALCINATIO & PRÆCIPITATIO.

Calcinatio Φ ii comunitè præcipitatio dici solet, voce tamen minus acou-

rata, & nimis stricta, quippe quæ solam secessionem ad fundum sonat: nihilominus tamen morem hunc sequar, calcinationemque Præcipitationis voce exprimam, adeoque Φ scalcinatus nomine Præcipitati veniet, qui vel sine Metallis vel cum Metallis.

Est itaq, sine Mer.

1. Præcipitatio Φ ii per se.

Φ . Φ puriss. ʒij , vel q. v. injice in phiolam, (peculiariter in hunc usum factam, infernè scilicet latam, supernè compressam, intus rostro angustissimi orificii in ventrem usque producto,) ut tantummodo fundus operiatur: phialæ exactè ad æquilibrium in arenam collocatæ, [ut Φ æquali crassitie ubique fundum tegat,] subdatur Δ primo lentus, post fortior, donec Φ in pulverem rubicundissimum iustar cinnabaris conversus sit: hunc ablue Δ is cordialibus, vel V.

N. Labor est multorum dierum (30.)

Vires. Sudores valde movet, luem & sexies vel septies exhibitus penitus eradicat. Febres omnes tollit. Lumbricos eliminat.

Dosis à g. iv. ad vj.

N. i. Ut plurimum vomitum quoque movet sat violentum.

2. Præstantior erit præcipitatus, si fiat cum ʒi . ʒi , vel Ca .

Sennert. Instit. Hartman, in Croll. Tentzel. Beguin.

3. Potest quoque præcipitari eadem ratio

ratione & amalgama \odot is & \odot a, de quibus Crollius. Præcipitari aliquando, inquit, amalgamata \odot is & \odot a, seorsim per duos annos, & quamvis pulverem rubicundum nancisceretur, tamen nondum erat debite fixus, nec usum Medicum commodè adhiberi poterat, sine ulteriori præparatione. Hac Crollius.

Verum me hercle quia præcipitatus per se exhibetur, quid vetet, quo minus præcipitatus hic \odot ris, \odot risve exhiberi possit, non video.

2. Φ præcipitatio per silices.

R. Φ ii puri \mathfrak{z} ij aut ad summum \mathfrak{z} ij.

Silicum magnitud. fabar. \mathfrak{lb} . ij.

Detine in Δ e arenæ, [aliquoties circumvolvendo, ac Φ m lateribus adherentem detrudendo,] donec Φ planè fuerit præcipitatus, & silicibus adhærescat: Hinc Φ m à silicibus concussione separa ac serva.

Vires ac Dosis convenit cum præcedenti.

Hartman. in Croll. Kesler. lib. i. cenzur. 50.

3. Φ fixatus, Panacea.

R. Φ viv. purg. \mathfrak{z} ij. Sulph. citrin. \mathfrak{z} ij. \mathfrak{z} ij. Misce exactè; donec nihil Φ appareat. Postea sublima, sublimatū semper de novo cum fecibus tritum sublima iterum, tandem auge Δ , ut cande-scat: Id quod in fundo remanet fixum, medicina est secretissima.

Vires. Omnes humores noxios exci-

cat, perque diaphoresin expellit.

Dosis \mathfrak{ss} . \mathfrak{ss} . \mathfrak{z} ss.

4. Φ præcipitatus per \odot Sulph.

R. Φ ii, purgat. \mathfrak{lb} . i. \mathfrak{lb} . affunde \odot Sulph. per camp. \mathfrak{lb} . i. digere per dies (2.) in arena, ac destilla postea per \odot m vitream, cum cohobis tribus. Quarta vice, si libet aliquid recentis \odot Sulph. affunde, Δ mque in fine auge, ut \odot incandescat: sic massam habes albam, quam postquam aqua calida abluta fuerit, tere, inque phiola saltem gossypio obturatâ, Δ i arenæ vehementissimo per \odot (octo) committe, ut si quid vivi super sit Φ ii, sublimetur. Hunc denique Φ m fixum trina desuper ∇ incensione ulterius correctum serva.

N. Eodem modo poterit quoq; Φ præcipitari cum \sim u \odot i.


Vires. Purgat omnes vitiosos humores, resolvit catarrhos, contra infirmitates ex humorum putredine remedium est, quo in morbis deploratis vix experiri licet præsentius: Hinc utile est in Hydrope, Podagra, Lue Venerea, Venenis, Peste, Febribus, Ulceribus malignis, Scabie.

Dosis à gr. 3. ad 6.

Croll. Sennert. in Institut. Beguin. Vntzer. de Φ .

5. Φ præcipit. per \odot \odot i rubic.

R. Φ purific. q. v. digere cum \odot \odot i rubicundo, donec sub forma liquida penitus Φ lateat: Abstrahe \odot per

per  in arena, & restabit præcipita-
tus in fundo.

N. Ex hoc fit vitrum ☿ ii, quod vide
infra.

Disput. Chymico-Med. Hartmann. 7.
th. 127. Basil.

6. ♀ precipit. per m Sal. nit.

♂ *ius Corollatus.*

℞. ☿ purificat. ℥m Sal. nitri, opti-
mè rectificat. ꝑiv. digere, ut solvatur
penitus ☿. Hinc abstrahē ℥m Sal.
nitri [in arena per phialam longi colli,]
☿io relicto trito affunde denuo tantun-
dem novi ℥m Sal. nit. ac abstrahē, idq;
vel tertiâ vice, videbis in fundo ☿m co-
rallatum elegantem, quem Δ l. paulu-
lum igniando calcina.

Dulcis est & sine corrosiva facul-
tate.

Usus idem est, qui Corallini & quidem
felicior. Croll. Hartm. in Croll.

7. ♀ precipitatus per ∇
ovorum.

℞. ☿ purific. q.v. affunde ∇ de-
stillatum ex ovis ad duritiem coctis, &
præcipitabitur in pulverem. Huic pul-
veri affunde sæpius ∇ eandem, destilla-
tam scil. à putaminibus oyorum calci-
natis, cohobaque igne cinerum, donec
☿ sit conversus in pulverem rubrum &
dulcem.

N. Paracelsus vocat Balsamum.

Vires. Curat ulcera colli vesicae, etiam quae astimantur incurabilia, sanat vulnera & ulcera externa. Vnt-zer.

8. *Precipitatus per Tincturam Smiridis,
Precipitatus miraculosus
dictus.*

Calcina Smiridem Δ violentissimo, donec virescat, & lateribus \times buli adhærescat, [aliquo horarum spatio fiet,] Extrahe dein Tincturam per \times vel ∇ opt. decanta & abstrahæ ad oleositatem.

R. Hujus Tincturæ ℥j. ℥ii ℥iv.
confunde, & præcipitabitur ☿ in mo-
mento: ☿ in hunc, l. Δ in + bulo
candefac per horam; postea edul-
cora.

Vires. Purgat leniter αἵμα καὶ κίτω.

Dosis gran. 3. 4.

N. Quis hic purgat tantummodo per
inferiora, si horis duabus igniatur, sin vero
horis quinq; vel sex, evadit fixus ac dia-
phoreticus.

2. Aptior erit Smiris ad Tincturam eliciendam, si aliquoties in ∇ antea extingatur.

Beg. Gluckr. Kes. lib. 3. c. 42.

De solutione in ∇ communi.

9. *Præcipitatus com-
munis.*

R. ☿ puriss. p. i. ♀ p. ij. solve ac
præcipita, affundendo scil. ♀ am sal-
sam vel abstrahendo ♀ per destilla-
tionem cum cohobiis tribus. Præci-
pitatum edulcora iteratis ablutionibus,
vel reverbera, ut à spiritibus ♀ libere-
tur.

Vires. Purgat per inferiora & superiora.

M m m

Dosis

Dosis à g. 6. ad 12.

Beg. Hartm. in pract.

10. *Præcipitatus albus S. Cloff. Vomitivo Catharticus.*

Solve $\mathfrak{z}\text{ij}$. \star ci in lbss . aq. font. & in eam projice $\mathfrak{z}\text{ii}$ anti in pulv. redacti $\mathfrak{z}\text{ij}$. Stent in loco calido, & intra bihorium fiet dissolutio integra. \mathfrak{z} anti cui guttatim superfundes \mathfrak{z} Tart. deliquiosi $\mathfrak{z}\text{j}$. aqua evadet lactea, sine subsidere, aquam decantatâ pulvere al-bissimo, quem phlegmate mellis bis aut ter elues aut aq. communi calente dulcorabis.

Dosis $\mathfrak{D}\text{ss}$. gr. xij. cum $\mathfrak{z}\text{j}$. Confect.

Hamech. in Siphylide, elephantiasis tinea, scrophulis, decantatâ aquâ laventur loci scabiosi & Erysipelata præsertim \mathfrak{z} ea, sic citò curantur.

11. *Præcipitatus dulcis.*

Miscetur \mathfrak{z} us crudus cum an. præcipitati rubri, superfuso ∇ ex arte dulcificati & in calore arenæ detinentur per 20. \star , sic enim sese mutuo coagulant & mitescunt.

CORRECTIO seu RECTIFICATIO PRÆCIPITATI.

1. Dissolve præcipitat. bulliendo in \star acri per hor. 6. &c. [ut totus dissolvatur,] dissolutioni superfunde ∇ vel \mathfrak{z} Tart. & præcipitabitur denuo, ab-lue igitur & sicca.

Dosis. g. 4. 5. 6. Vntzer.

2. Digere præcipitat. per diem cum spiritu \mathfrak{D} -i, hinc abstrahere Δ forti, (a-li cohobant aliquoties,) super \mathfrak{z} m

affunde ∇ ad eminent. digit 2. digere (2.) & decantaque alium ∇ denuo affunde, idque tertiâ vice repete. *Sennert. Institut.*

Vires. Purgat per inferiora.

N. Alij abstrahunt ∇ & cohobant aliquoties.

3. Imbibe præcipitatum communem, [flavum vel album ∇ a rosarum aliquoties ablutum,] cum ∇ opt. ac camphora ana, vicissimque ∇ l. Δ evoca.

Vires. Purgat per inferiora, præcipue materiam febrilem. Utilis quoque est in Peste morbisq. Epidemiis.

N. Ante Paroxysmum cum Theriaca exhibetur.

Dosis à gr. 3. ad 6. Hartm. in Croll.

4. Vis vomitiva Præcipitatorum \mathfrak{z} orum infringitur etiam, si in u -fluminis solvantur, reverberentur leniter & per aq. ovorum sæpius cohobatam figantur.

12. *Præcipitatus incarnatus.*

\mathfrak{z} . $\mathfrak{z}\text{j}$. solve in ∇ $\mathfrak{z}\text{ij}$. solutioni adde ∇ calidæ $\mathfrak{z}\text{ij}$. ac infunde postea urinam sani hominis recentem, & præcipitabitur \mathfrak{z} incarnatus ∇ a eluendus. *Hartm. in Croll.*

Vires. Solam secessum movet.

Dosis à gran. vj. ad x.

14. *Præcipitatus luteus.*

Fit, si loco urinæ, solutioni priori instillaveris \mathfrak{z} Tart. p. d. sic præcipitabitur \mathfrak{z} luteus, quem similiter lotionem edulcora. *Hartm. in Croll.*

Vires.

Vires. *Vires & Dofin eandem cum priori obtinet.*

14. *Alins & præcipitatus Solaris fixus, dulcificatus.*

R. & purific. solve in ∇ [ex \odot lb. ij. & Sal. Nit. p. i.] abstrahere & cohobare vice tertiâ: Hinc affunde \sim m \odot iretifica, destillaque cohobando (6.) postea affunde ∇ , cohobaque eundem aliquoties (decies) præcipitatum edulcora ∇ is cordialibus ac seival. *Kesler. lib. i. c. 2.*

15. *Præcipitatio & ij egregia.*

Fac ∇ ex Sal. Nit. lb. ij. \odot , lb. i. \odot non calcinat Zk Sal. Com. Zvi . In hac vel communi ∇ solve & ii purgat quantum ∇ solvere potest; [alioquin non libenter fit præcipitatio,] solutioni affunde ∇ fontan. frigid. Zii . iij. stent aliquot horas extra Δ , ut præcipitetur & post affunde multum ∇ æ frigid. atque repone ad subsidendum, præcipitatum edulcora, iterata ablutione, ac digere in vitro lati orificii sive XXl . Δ . ad siccitatem. Exiccato huic præcipitato affunde denuo X acerr. p. iv. digere in MB per diem unum ac alterum in cucurb. probè obturata, tandemque ut ante in vitro lati orificii exicca. *Hartman. in Croll. Sennert. In- stant.*

Dofis gran. i. ad v. vel vj.

De Præcipitatis cum metallis.

1. *Præcipitatus Solaris.*

R. i. \odot puri & linat. vel lam. redacti ZB solve in ∇ ex Sal. Com. [sine \ast] facta.

R. 2. Vitri. Zi hyacinth. ZB solve in ∇ .

R. 3. & ii purgat. Zii . solve similiter in ∇ .

Solutiones omnes confunde, abstrahereque ∇ per XX : hinc novam ∇ affunde, sæpiusque identidem evoca, idque tantisper, donec præcipitatus in ignita ferrea lamina nullum penitus tumum de se emittat. Postea præcipitatum totum calcina sub regula, ut \sim ∇ omnes dissipentur. Tandem ab eodem ∇ sexies destilla, atque denuo \odot m sub regula lentè igniendo calcina.

Vires. Summum est remedium mundificativum sanguinis ac totius corporis in lue venerea. Magnum quoque fert solamen in Hydrope, pellu aquam per urinam, exiccat fontem. Prodest quoque in caduco, colica quariana: ulceribus malignis ac cancerosis subvenit, & simil. Hartm. in Croll.

2. *Præcipitatus Solaris regulinus, seu diaphoreticus.*

R. i. Regul. Z . Zj . solv. in ∇ vel ∇ .

Confunde & abstrahere ad siccitatem in arena. Hinc edulcora aquâ & spiritum & aliquoties (septies) desuper cohoba, subinde novum spiritum affundendo. Tandem edulcora denuo, ac ∇ ternâ vice inde destilla, ad siccitatem pulveris flavi.

Mmm 2 Vires.

Vires. *Præstantissimum est sudorificum in omnibus morbis, qui diaphoresin requirunt.*

Dosis gran. 3. 4.

N. *Vi regulus eò feliciter solvatur, im-
bibe aliquoties ejus pulverem R, hinc
solve.*

3. Hercules Bovii.

Huic finitimus est Hercules [potius aurum vitæ,] Bovii qui nihil est aliud quam ☿ præcipitatus ☉laris cum vitro ☿ ii conjunctus.

Nimirum.

R. ☉ purific. ʒi. ☿. purific. ʒiv. utrumque solvit seorsim in R. Solutionem utramque confusam destillat (Δ graduali, & in fine aucto (per retortam: præcipitatum quod in fundo remansit, ut & sublimatum, quod parietibus, vel collo retortæ adhæret, solvit iterum in R nova, & destillat, idq; repetit tantisper, donec tota materia in præcipitatum convertatur. Postea calcinat supra ferrum ignitum ad figendos spiritus corrosivos, & denique edulcorat.

Vires. *Ex mente Bovii omnibus aliis catarrhicorum speciebus, antecellit: Estq; domitor vermium, Luis ☿, Petechiarum, Pestis, Quartana, & aliorum incurabilium morborum.*

Dosis à g. 3. ad 6. vel 8. cum Saccharo rosato, & in ovo vel brodio, vel in pulvis, imprimis, si conjungatur cum Scammonio, & humectetur V vitæ, quæ desuper comburatur. Tentzel. sect. 3. panchymag. Mercuriali.

4. Aurum vitæ, Hartmann.

1. R. ☉ purgat. ʒß. solve in R ʒij. servando solutionem in calido.

2. R. Mercurii crud. purific. ʒvi. solve in V commun. lb. i. utramque solutionem mixtam, [quæ mixtione apparebunt omnia nigerrima,] ex arena per XX. l. Δ. gradatim aucto, destilla, donec, quæ in fundo, rubescant, & cucurbita tandem subtus candeat: Exemptum dein pulverem sub capula in catillo, subinde cum ferreo baculo calcina, donec, ab V probè evanuerint; Ablue postea Δa dulci omnem falsedinem & extremò V correctum ab eodem sæpius per cohobia destilla.

Usus ejus egregius est in Peste, ut & aliis morbis quàm plurimis.

N. *Fie R ad hoc opus.*

R. V is ex ☿ Sal. Nit. & O ana factæ ʒiv. * ʒj. Misc. & destilla per alemb. ex arena.

5. Aurum vitæ S. Closs.

Fac aâa ex Regulo ☿tis stellato & ☿io, lava hunc pluries, & exprime per pannum, secundo fac aliud aâa ex ☉ & superfluum ☿um itidem exprime, tertio ambo aâa commisce, ita ut sint Reguli ☿tis & ☉ ana ʒß. ☿ ii ʒij. aut circiter, quarto superfunde Ol ☉li. digere dum colorem ruberrimum acquisierit, quinto Tincturam inde extrahe cum V extractam, circula per mensem, tandemque rectifica.

Vires.

Vires. Purgat suaviter & sudores copiosos movet.

Dof. à gr. 8. ad 3℔. gr. 12.

6. Aurum vite aliud.

℞. ☿ purific. 3℔, ☉ puriss. laminat. 3℔. F. amalgama quod abluatur ✕, donec omnis nigredo ablata sit.

Postea impone in ☉m, & affunde ☿m, [ex ☉. p. ij. & Sal. Nit. p. i.] digereque [in cineribus vel arena,] ut solvatur ☿ & ☉ in fundo sub forma pulveris remaneat: dein destilla augendo in fine Δm, ut fundus retortæ incandescat, omnesque spiritus corrosivi prodeant. Vasis refrigeratis, tere materiam, abstractamque ☿ miterum affundendō cohoba, & inveniens in fundo pulverem rubicundum, quem collige, abijciendo quod ad latera retortæ fortè fuerit sublimatum. Hinc candefac laminam ferream, cui optimè candescenti, insperge pulverem illum Mercurialem, non modo ut optimè exiccetur, sed & ut id quod volatile restat, evaporet. Hinc aufer & reserva in vase clauso.

Vires. Purgat per secessum lentè sine omni etiam vomitu, nisi scilicet ventriculus, impuritatibus repletus sit. Summum arcanum est in Hydrope. Lue gallica & omnibus cutaneis affectibus, atque destitutionibus, ut & ubi corpus scatet pituitosis humiditatibus.

Dofis à g. 3. ad 8. cum Terebinth. pau-xillo aut extracto aliquo. Hartmann in pract. p. 12. Confer. Sennert. in Instit.

7. Precipitatus viridis seu venereus.

℞. Mercurii purificat. 3℔. solve in ☿ commun. in eadem ☿ solve & ☿ is 3℔. conjunge solutiones ac abstrahe in arena, urgendo in fine Δm, ut maxima pars spirituum tollatur. Precipitatum exicca ac digere cum ✕, in MB ☿ ac ☿: ultimo fac bullire, ut purissima pars Mercurii in ✕ solvatur. Hinc decanta & abstrahe atque sicca sine lutione.

Vires. Est specificum in Gonorrhæa virulenta; quam nimiam tollit, insufficienciam promovet, ideòq; singulis diebus continuandus ejus usus est, donec omnis fluxus sedatus sit.

Dofis à g. ij. ad viij. Hartmann. in Croll.

N. Signum boni precipitatis est, jâ aurum fortiter cum eodem fricatum, non dealbetur, ut solet ex contactu Mercurii.

Huc

8. Vitrum Mercurii

☿nare.

℞. ☿ præcipit. [per ☿ ☉ i rubic.] 3℔. ☿ calcinat. & ✕ ana 3℔. Misc. & sublima. Sic ascendit ✕, relictis in fundo Mercurio & ☿a instar auri purissimi, inde ✕bulo & daignem fusionis, ut in vitrum simul abeant. Vid. Dissput. Chym. Med. Hartmann. 7. th. 127.

9. Vitrum ex ☿ vite, sive Succinum ☿ij.

℞. ☿ m vite, abstrahe per ☉m partes Mmm 3 tes

tes minus fixas, reliquum fundatur igne forti in vitrum, quod transparens opacum, vel si diutius in igne contineatur, Hyacinthinum evadit.

N. 1. Dicitur alius succinum ꝑ ij, quia nihil aliud esse videtur quam vitrum ꝑ ij, non ꝑ ij.

2. Si abstractio partium minus fixarum fortius urgetur, extillat vicissim liquor instar butyri ꝑ ialis.

III. SUBLIMATIO.

1. Mercurius sublimatus Officinarum.

R. ꝑ in ꝑ. solut. ꝑ i exiccat. Sal. Com. decrepit. ana Misc. exacte & sublima ex cucurbita humili, *Gluckratb. in Beguin.*

2. Alter optimus pro ꝑ dulci consiciendo.

R. ꝑ purific. ꝑ rubific. Sal. Com. decrepit. ana lb. i. Sal. Nit. ꝑ ix. Misc. exacte aspergendo modicum *, sublimaq; ut dictum.

jam denuo.

R. ꝑ ti illius lb. i. Sal. Com. decrep. ꝑ xii. ꝑ rubific. ꝑ iv. M. sublima.

iterum.

R. ꝑ ti illius, lb. i. Sal. Com. decrep. ꝑ xii. M. sublima.

N. Puriozem Mercurium ꝑ m si desideras, reitera adhuc sublimationem, sed sine additione. *Beg. Untzer.*

3. ꝑ tus Regulinus.

R. ꝑ purificat.
Regul. ꝑ ii ana lb. ꝑ.
ꝑ i rubific. ꝑ iv.
Sal. Com. fus. ꝑ vi.

Misc. & sublima ex sublimatorio vitreo, de super defendendo ꝑ: sublimatum misce cum ꝑ, ac sublima denuo, idque vice tertiâ.

Vires. Inservire commodè potest Mercurio dulci, aliisque Medicamentis, ex ꝑ, præparandis.

4. ꝑ dulcis vulgaris: Draco mitigatus.

R. ꝑ ti ꝑ viii. ꝑ crud. purific. ꝑ vii. Misc. exacte in mortario lapideo, vel super porphyrite, donec Mercurius vivus amplius conspici nequeat. Hinc sublima calore arenæ in Phiola leniter saltem obturata & sublimabitur totus ferè Mercurius, adhærescitque lateribus Phiolæ, remanentibus in fundo fecibus, quas una cum nigricante materia collo phiolæ adhærente rejicet. Hinc sublima denuo, idque vice tertiâ, rejectis semper fecibus, ut dictum.

N. 1. Si purum insipidumque secundâ sublimatione obtinueris, acquiesce, multâ enim sublimatione infringitur vis purgatrix.

N. 2. Alij addunt quoque Colebotar.

N. 3. Optimum Mercurium dulcem conficies ex ꝑ to regulino, & Mercurio ꝑ ij.

Hartmann in Croll.

Vires. Omnes humores noxios sine perturbatione blandè expurgat, unde vel infantibus exhiberi poterit.

Dosis: Dari quidem potest ad ꝑ lb. Verùm ut eò citius operationes suas perficiat, nec diu in corpore delitescat, acni solet

solus purgantibus aliis fortioribus, e. gr. Diagrid. Trochisc. Alhand & simil. Daturque cum iisdem à gran. 8. ad 15. & plux.

Hartmann. in Croll. Sennert. in Instit. Tentzel.

3. Alius.

2. Mercurii in aqua soluti & edulcorati.

Mercurii crudi ana.

Sublima aliquoties ut dulcis fiat.

Vires. Lentè purgat per inferiora,

Dosis à gr. 6. ad 12.

N. 1. Eodem modo dulcescit & Mercurius precipitatus luteus si per se sublimetur, dulcesciturque leniter alvum movet. Dosis gr. 8.

2. De usu: Ex omnibus hisce Mercurius dulcibus potest parari una milissima ad inflammationem, fistulas & ulcera maligna, non tantum detergenda, sed etiam cicatrifanda, præcipue in Lue venerea, valet etiam ad scabiem, sine noxa penitus curandam.

Nimirum:

Projicitur Precens, in aquam bullientem, relinquiturque aliquamdiu, hinc filtratur, in filtraturâ lb. 1. dissolvitur bulliendo Mercurii dulcis, q. s. colatur & servatur. Fallopius vocat in aluminis. Hartm. in Croll.

6. Sublimatum dulce Talcosum

S. Closs.

Fit si M. cum Sal. Nit. irrorando guttulis aliquot 8. Sal. Com. hæc tria constituunt Axungiam Talcosam fluentē.

Vires. Suaviter purgat absq. vomiti-

tu. deobstruit & refrigerat, estq. securum febrium intermittentium solamen.

7. Lanugo perlata siue q. argentei ex inventione S. Closs.

1. Facta est Rex ana Sal. Com. & Sal. Nit. triplo boli communis ad modum 2. in lb. 1. hujus spiritus solutæ fuere q. crudi 3x. & abstracta ad duas tertias, collecti fuere crysalli probèque edulcati 3. perfusi sunt iisdem Tartarificato ad 3. digit. supereminentiam sicque per mensem in putrefactione, MB steterē. 4. materiâ in coniectâ eductoque V. pars quædam sublimabitur. 5. auctiori, pars in rubrum abibat Præcipitatum. 6. ambo- bus iterum confusis affundebatur, & post digestionem unius diei ac filtrationem calidam, tota materia soluta in floccos argenteos gossypio perlato fulgentique similes fuit conversa in- clarescente menstruo. 7. hos flores cochleari vitreo, detraxi & in chartâ bibulâ quadrupl. exiccavi, ita enim splendorem non amittunt. 8. cum alio super resistantem materiam con- jecto novos flores collegi, idque ter quaterve repetii.

Vires ex Untzero repetenda, qui lon- gè operosior nobis methodum aliam reliquit in Anat. 9. p. 255. Ubi enim illic per grana & scrupulos abraduntur flores, hic per uncias & libras congerun- tur.

Dosis eorum est gr. vj. in formâ pi- lul. cum pauxillo Extracti liquir. Educta absq.

absq. violentiâ humores vitiosos in febre
quotid. scabie, Leprâ.

8. *Mercurius ðus rubens non cor-
rosivus, Arcanum Coralli-*

nitri.

℞. Mercurii optimè purgati,
℔b. i.

Sal. Nit. optimè purificat.

Ⓞi, ad rubed. calcinat. ana, ℔b. ij.

Pulverisentur & misceantur opti-
mè, subinde irrorando & incorporan-
do cum ✕ acerrimo, donec dispareat
penitus Mercurius. Hinc sublima ex
arena, in cucurbita lutata, cum capi-
tello, & exit primum phlegma, dein
auctiori Δ, viginti quatuor horas con-
tinuato, sublimabitur, sublimatum
proximè à materia rubeum, paulo al-
tius flavum. Utrumque rubeum ac
flavum, cum Sal. Nit ℔b. i. & O leni-
ter calcinati, ℔b. i. misce impastaque
cum phlegmate ✕, sublimaque denuo
ut prius (horis duodecim,) & ascen-
dit iterum sublimatum rubicundum
ac flavum, collige singula seorsim, ru-
bicundum elue ∇is cordialibus, ac
ab eo efflagrare sine V; flavum calcina
igne mediocri, ut rubescat, hinc elue
similiter ac corrige cum V desuper ac-
censo.

N. Feces nigricantes cum Mer-
curio in capitellum ascendentes, abjician-
tur in singulis sublimationibus.

Vires. Purgat, per inferiora preci-
piuè magnumque secretum in Hydrope,
morbo Gallico, Podagra, Scabie, Vlc-
eribus, Cancro, &c. Crollius.

9. *Modus compendiosior, Laudanum
Mercuriale, sive Metall-*
cum.

℞. Salis extracti ex Ⓞo ∇is, (ex
Ⓞ & Sal. Nit. ana fact.) ℥vi.
℥ purific. ℥ij.

Sal. Nit. purific. ℥ij.

Pulverisa ac misce optimè impa-
stando cum ✕ sublimaque, ut dictum,
sic ascendit pars quædam alba, quæ-
dam lutea, quædam crocea, quædam
rubicundissima, collige croceam ac ru-
bicundam, abjectis cæteris, sublima-
que denuo per se ex arena igne sat forti,
ac omnia rubefient: hinc elue ac cor-
rige V supra accendendo.

Vires. Easdem habet cum preceden-
ti. Hartm. in Croll.

10. *Manna Mercurij, seu Mer-
curius dulcis Ⓞlaris.*

℞. Mercurius dulcis vulgaris,
q. v. tantisper sublimationibus itera-
tis eleva, donec in fixos abierit
Crysallos, postmodum in liquorem
solvito.

℞. Hujus part. iij. Ⓞ calcin. p. i.
Misc. ac digere per mensem, coh-
ba donec in cucurbita instar ceræ
fluat.

Vires. Ad summum Medicina gra-
dum Mercurius ita redactus est, & in
Epilepsia, & morbis Veneris admiranda
virtutis. Tentz.

N. Ego met Mercurium dulcem ter
sublimatum miscui quondam cum Da
folia-

igne primo leni, dein auctiori, &c. Primo ascendit fumus citrinus, paulatim rubescens. Quando itaq; fumus nigro-rubeus ascendere incipit, urge igne violentissimo horas quatuor vel quinque, & sublimabitur cinnabaris, adhærescetque lateribus, quàm exire, rejectis fecibus in fundo & capitulo.

Paracelsus in Chirurg. lib. i. manual.
pag. l. 702. Brendel.

Aliter.
℞. Sulphur ℥ij. ꝯ ℥iv. M. ac Sulphur
aliquantulum efflagrare sine, ut pulvis
remaneat niger; hinc sublima semel
ac iterum, ut cinnabarim nanciscaris
rubeam.

13. *Panacea* ☿ ii *purgans.*
 ♀ ii vitæ b. ij.
 ☿ ii vivi in destill. butyri ♀ ii
 provenientis p. i.
 Sublima ut ☿ m dulcem.

Dosis gr. v. ad viij.
N. ♀. visa ad hoc opus fit ex ♀. p. ij.
♂ optimi vel reguli p. i. destillatur &
etur ∇ com. ut moris & de supra flagret
aliquoties Spir. junip.

Cl.D.D. Joh.C.Fauf.

IV. DESTILLATIO.

℞. ꝯii puriss. ☿ anti ana Misc. exactè in mortario lapideo, & destillentur per 6m vitream ex arena Δ primo mediocris: sic liquor seu butyrum ꝯii instar glaciei egreditur, qui si con- crescat in collo, ne id obstruat, admo-
Nnn ve

ve cautè carbonem, ut lique scat. Finità destillatione liquoris, auge Δ , daque ignem suppressionis, (id est, supra ☿ .) & sublimabitur cinnabaris § ii . (de qua vide suo loco, in sublimatione § ii .) Liquorem egressum rectificaper retortam vitream.

N. 1. Praestat hoc ☉ Cinnabari sua
ante rectificationem impregnare. Nimi-
rum, Cinnabarim tritam adde dicto ☉,
stentque in digestionē (hor. 24.) vitro clau-
so in cinere, sic fiet unio; hinc rectifica
per ☿.

N. 2. Felicior procedit destillatio Δ
aperto, sed sensim & successivè aucto. Item
si ∞ cum materia ante destillationem
in cellam per triduum reposueris.

N. 3. Alii &c. Reguli S & Q tri ana
singula seorsim trita miscent, & ut concre-
tionem in collo praeaveant, ad liquef-
cendum in cella reponunt, Liquoremque de-
inde destillant.

N. 4. Beguinus eodem modo ex ☿ & ☿^{ri}
p. y. ☿ limat. p. 2. ☿ elicit, unde pulvis fit
precipitatus, quem vocat ☿ diaphoretici-
cum. vide in ☿.

Vires. *Usus hujus Olei glacialis per se est externus solum, in gangrana & sphacelo, in quibus si pars mortua illi- zione hujus Olei circumlinatur, non ser- pit ulterius putredo, sectioque feliciter per- agitur. Simili ratione Carbunculus pe- stilentialis oleo hoc circumlitus paulatim emoriendo excutitur, adeoque aptus red- ditur, qui postmodum Emplastris aliis obe- diat. Usitatum itidem corrosivum Chi- rurgis existit.*

Ex hoc O_2 fit & MERCURIUS
VITÆ & BEZOARDICUM MINE-
RALL.

I.

Mercurius vita.

℞o præcedenti sive Butyro ꝑii. infunde aquam ac statim pulvis albus precipitabitur, qui abluatur donec nullam amplius acrimoniam sapiat, deinde exiccetur.

N.1. Candidior ac purior erit. 1. Si ad
destillationem butyri, loco B ii crudi, re-
gulum ejus receperis. 2. Si per O illud
rectificaveris.

N.2. Appellatur & Pulvis Angelicus,
Pulvis Algoreth, Aquila alba.

Vires. Totius corporis, & præcipui prima regionis humores noxios, per secessum ac vomitum expurgat, Ususque insignis est in Peste, Capitis morbis, Lue venerea, Ulceribus malignis, Febris, Arthride, Hydrope, ubi & plurimum sine vomitu operatur.

*Dosis à gran. ij. ad iv. Macerare quo-
que licet gr. ij. ad iv. in haustu vini, eum-
que filtratum exhibere.*

Sunt qui infusionem Mercurii vitæ
in promptu habent.

Nimirum:

R. ☿ vitæ Disß.

Vini generos. ℥xviii.

Dosis ℥j.

N.1. *Vitriolus purgatrix huius ♀ ut ♂ vitri
♂ ij nunquam exhauritur.*

N.2. Tridianum ejus usum saepe pro-
videntiam ani periculosam excitasse com-
per-

perium est, cavendus itaque nimis ejus
usus.

*Croll. Senn. in Instit. Beguin (qui R. &
p. 1. & p. ij.) Sal. in Ternar. Emet. Res. I.
c. 26. Tentzel.*

Quia autem hic Mercurius vitæ sat
violenter operationes suas, ac inprimis
per vomitum perficere solet, solliciti
fuere Medici de hac violentia certis
modis corrigenda, deque viejus vomito-
ria mitiganda.

Hinc

1. R vitæ correctus.

R . M vitæ in phiola Δ arenæ fove,
donec rubere inceperit, postmodum ∇
sæpius ab eo abstrahere.

Vires. Purgat sat commodè per alvum,
impuritatesque quascunque educit.

Dosis g. 4. 5. 6.

2. R vitæ Catharticus.

1. R vitæ cum Sale commun. aliquo-
ties diutiusque teratur, & salsedo postea
per ∇ commun. abluatur; sic solam vim
per secessum purgandi obtinet. *Hartm.
Senn. Tentzel. Agricola.*

2. Sal. nit. ad Δ fuso adde R m vi-
tæ, sensim injiciendo & agitando; post
refrigerationem, Mercurium in fun-
do instar Reguli invenies, quem è
dulcora.

Alii hanc Correctionem paulò aliter
absolvunt.

Unde

3. Laxativum minerale.

Fit, si Sal. nit. fusi ad Δ . Zij . Mer-
curii vitæ, Zß . circiter, vel Zj . paulatim in-
jeceris: & postea omnem salsedinem

∇ a ablueris. Pulveri huius exicca-
to denuo adde Sal. commun. duplum
& tere diligenter in marmore per ho-
ras duodecim. Tum rursus aquâ dolci
elue.

Dosis à g. 6. ad 12.

N. Injice primo Zi . atque cooperi sta-
tim, donec fumus cesset, possit perge inji-
ciendo, Zj . &c.

N. 2. Habetur egregius R vitæ
 \odot aris per inferiora purgans in Anatomia
 R ij Untzeri qui fit ex Oleo R ij S M
Sal. nit. super calcem \odot affuso, donec Tin-
cturam attrahat quod postmodum cum
 \ast co aut \odot Tart. precipitatur.

II.

Bezoardicum minerale.

1. R Diaphoreticum Crollij seu Bezoardi-
cum Minerale simplex, seu Offi-
cinarium.

R . Butyr. R ii rectificat. e. gr. Ziv .
affunde guttatim M Sal. nit. rectific.
 Ziv . (alii ∇), abstrahere deinde M Sal.
nit. iterumque affunde M Sal. nit. no-
vi, Zj . idque tertiâ vice repetatur. Præ-
cipitatus hic postea teratur, abluatur &
igniatur.

N. Crollius butyrum hoc facit ex
 R ij p. 3. & R M ti, (nempe R parati per
 \odot m & Sal. com.) p. 1. sed sufficit proportio
anatica.

Vires. Magnum est Alexiterium sa-
luberrimumq; remedium Bezoardicum,
quod sudores provocando magnos effectus
monstrat in omnibus pestilentialibus &
venenatis affectionibus.

Dosis à g. 6. ad 12. vel ultra.

Nnn 2

Quer-

3. Bezoardicum Solare Crollianum.

℞. Butyri ꝯ ii. lb. β. solve affundendo sensim ~ Sal. com.

℞. ☉ fin. ꝯ β. solve in ℞.

Utramque hanc solutionem claram confunde, abstrahæque menstruum gradatim, abstractum iterum affunde, cui adde ~ Sal. com. nov. ꝯ j. abstrahæ, idque repete aliquoties.

Calx hæc dulcoranda & ignienda est.

Vires. Vires huius Bezoardici summis Crollius effert laudibus in Lue venerea, Peste, Podagra, Hydrope, Febribus, obstruct. Lienis.

Dosis à gr. 3. ad 8.

N. Hoc Bezoardicum licet suis hand careat viribus, attamen ob corporeitatem, quam ☉ adhuc obtinet præstantius censetur, quod sequitur. Videlic.

4. Bezoardicum Solare verum.

Fit eodem ferè modo.

Nimirum:

Si loco ☉ illius corporei, substituat in spiritualement substantiam exaltatus? de qua exaltatione vide in ☉ Volatilisatione, vel Tinctura ☉.

Nempe:

℞. 1. ☉ illius spiritualis ꝯ β. solve in ℞.

2. Solve in eadem butyri ꝯ ii rectific. ꝯ iv. (vel ut alii vj.) utramque solutionem confunde, abstrahæ menstruum per ☉, destillationibus sæpè repetitis: Postea per calcinationem

nem sub regula (unter einem Muffel) reduc in gerem violaceum, si lenis, vel in purpureum, si intensior calcinatio instituatur.

Vires. Vires easdem obtinet, quas prius, sed efficaciores.

N. 1. Hartman. in Croll. Sennert. in Institut.

℞. Aurum (per ~ Sal. com. bezoardicum,) spirituale redditum, iunge cum butyro ꝯ ii, in ~ Sal. com. vel ℞ soluto repetitis destillationibus unientur ac figentur: abstrahæ tandem, & habebis interveniente calcinatione Bezoardicum solare purpurei coloris magnarum virium.

Dosis eadem quæ priorum. à gran. 2. ad 10.

N. 2. Tentzelius solutionem illam ☉ olei formem edulcorat, superfundendo & abstrahendo aliquoties acetum forte. Postea extrahit Tincturam, Menstruo Basilii affuso digerendo per mensem, &c.

Hinc

℞. Tinctura huius à menstruo separata p. i. Butyr. ꝯ ii in ~ Sal. com. solut. p. vj. vel viij. Miscet ac unit cahobando ultimo calcinat.

5. Bezoardicum Lunare 1.

℞. Butyri ꝯ ii, in ~ Sal. com. solut. ꝯ iv.

Tinctur. ☉ viridiusculæ ꝯ β.

Junge ac destillando aliquoties ad siccitatem fige.

Vires. Bezoardicum hoc viridiusculum nilissimum est, ad capitis affectus,

Nnn 3

præfer-

præsertim ad Erysipelas capitis muliercularum.

Dosis à g. 6. ad 12.

Tinctura Cæ fit.

¶ In solvendo in V, hanc rursus abstrahendo, & Tincturam per Vi extrahendo, vide suo loco.

6. Bezoard. Lunare 2.

℞. Extracti Cœrulei Cæ, (ex C cum Sulph. calcinata per m urinæ extracti,) soluti in V. p. i.

Butyri ꝑ ii, iidem in V soluti, p. x.

Junge ac destillando vel circulando uni.

Habes Bezoardicum Lunare ejusdem, vel etiam majoris virtutis.

7. Bezoardicum Lunare 3.

℞. Extracti seu Tincturæ Cæ, (mediante ✕ extractæ ex Cæ in V soluta & instillatione ol. Tart. p. d. præcipitata.

Et Butyr. ꝑ ii, procede ut supra.

8. Bezoard. Lunare 4.

Præstantissimum fit Bezoardicum Cære, si Cæ cum m Sal. nit. in m redacta & cum butyro ꝑ ii, s. a. in pulverem fuerit fixata.

9. Bezoardicum venereum.

Ex squama aris elicitur Tinctura cum butyro ꝑ ii rectificato, dein figitur per m Sal. nit. ut in prioribus dictum.

10. Bezoardicum ☿iale.

Ex croco ☿ per reverberationem extrahe cum butyro ꝑ ii Tincturam

dein fige per m Sal. nit. more usitato.

Vires. Est specificum in omnibus fluxionibus ventris, præsertim ab Epate originem capientibus.

Scheunemann in Hydromant.

11. Bezoard. ☿iale.

℞. Reguli ꝑ ii sine ☿ facti ꝑ ii. huic fuso, (in +bulo,) adde Jovis Anglici puriss. similiter fusi, ad ꝑ ii, ut fiat de novo Regulus, postea laviga, & admisce diligenter ☿ æti, ꝑ v. Destilla ex ☿, Butyrumque inde destillatum cum m Sal. nit. ternis destillationibus fige, postea calcina, ignitumque in V extingue, & exicca, fit pulvis Gryfens.

Vires. Potentissimè movet sudores, insuper ad obstructions Epatis Polychreston non contemnendum est.

Dosis à g. 2. ad 6. vel 8.

12. Bezoard. Hninum.

Cum Butyro ꝑ ii non rectificat. extrahe Tincturam ex vitro H, atque cum m Sal. nit. dicto modo fige.

Vires. Prodest in affectibus Lienis.

Dosis ad g. 6.

N. Vitrum H fieri potest ex minio & silicibus.

13. Bezoard. Mercuriale.

Fit eodem modo qui Bezoardicum Saturni, ex vitro scil. ☿ ii vitæ & butyro ꝑ ii.

De omnibus hisce Bezoardicis legi potest. Hærem. in Croll. Tentz. in Exeg.

Nos ad destillata revertimur, inter quæ sequitur.

2. m seu

2. $\text{sen } \odot \otimes \text{ ii album dia-}$
phoreticum.

$\text{R. } \otimes \text{ ii tenuiter pulverisati, p. i.}$
Argillæ rubr. p. iij. Misc. & fac cum
 ∇ communi globulos in umbra exic-
candos, destilla dein ex \odot vitrea per
 \otimes m Δ e suppressionis, (gradatim ta-
men) horis duabus adhibito, prodite ele-
gans sen , quem serva.

N. Si quid \otimes ii sublimetur, cum re-
centi argilla misce, & procedent antea.

Vires. Diaphoreticus est. Dos. gr. i. 2. 3.
vide spiritum sequentem.

Rhenan. chymotech. l. i.

3. $\text{sen } \odot \otimes \text{ ii rubrum.}$

$\text{R. } \otimes \text{ ii. tenuiter pulverisati. Li-}$
matur \odot ana, Misc. ac resolve per de-
liquium in \odot flavum, quod diligen-
ter collige. Residuo (quod non solu-
tum,) affunde Δ m comm. ac extrahe
Sal. com. Sal purificatum & coagula-
tum denuò \odot o junge, fietque auri vel
crocei coloris. Destilla in \otimes ex cucur-
bita humili per $\times \times$ brevis rostri, primo
exibit phlegma, quod seorsim colliga-
tur, auctiori deinde Δ ascendit rube-
do, quæ partim in excipulum (quod mu-
tatum sit,) destillabit, partim in $\times \times$ o &
rostro, butyri instar adhærescet: Urge
 Δ m, donec nihil amplius ascendat, tunc
cessa.

Phlegma destilatum una cum ru-
bedine ad spondilia cucurbitæ eleva-
tæ, redde capiti suo mortuo, reitera-
que destillationem per $\times \times$ eundem
vix incalescente $\times \times$ bico, (imo vel à
vaporibus,) liquecet rubedo in $\times \times$,

hærens, extillabitque rubicundissimè
in Excipulum: postquam rubedo hæc
extillaverit, mutato Excipulo suscipe
phlegma subsequens, ac postea rube-
dinem reliquam igne auctiori, ut ante
collige, idque repete tot vicibus, quot
opus fuerit.

Vires. Utriusq; hujus spiritus magnus
est usus in primis verò rubei: expediunt per
sudorem quodcumque in corpore noxium
fuerit, aliisque Medicamentis difficulter
cedit. In Lue Gallica pustula hujus usû
sponte cadunt, tubercula minuantur, dolo-
res sopiuntur, ulcera fetida manantia
exiccantur & consolidantur.

Dosis gr. i. 2. &c. in ∇ Theriacali
mistura simpl. sen Guajaci. Decocto,
& simil.

Hartm. in pract.

4. \odot Mercurii diaphoreticum
dulce.

$\text{R. } \text{R. t. q. v. solve in } \times \times$, digere ac
abstrahere $\times \times$ ad siccitatem, residuum in
 \odot digere cum ∇ rectificatiss. donec
fiat crassus liquor. Hinc destilla ex \otimes .
 Δ forti, & prodibit liquor instar la-
ctis. Lacteam hunc liquorem reafunde
materiz in fundo relictæ, destillaque
denuò. Sic extillat \odot album ac fra-
grans sine corrosione. Kest. lib. 2. c.
30. lib. 4. cap. 35. vide etiam Liquores
Mercurii.

N. Alii contenti sunt solâ digestionem
ac destillationem cum ∇ peracta. Kest. lib. 2.
c. 29. lib. 4. c. 34.

Vires. Curat ulcera maligna, cancro-
sa, præsertim Renum & Vesicæ.

Ufus,

Ufus, tam internus, quam externus est.

5. *Oleum fragrans. Astrum dictum.*

R. Mercurii septies sublimati, totiesque per Ψ revificati. q. v. solve in \sim Sal. com. calore mediocri: dein abstrahere \sim Sal. com. edulcora optime coquendo in \times , ut corrusivus sapor eluatur: postmodum abstrahere quoque \times , & denuò elue, affundendo ∇ in pluviam stillatitiam, hinc exicca, & digere aliquandiu cum ∇ rectificatis. ana. Postea pelle simul per \oslash in Δ , initio leni, dein fortiori: corpus residuum serva pro conficiendo inde sale: Extillato vero deme ∇ in MB. Et remanebit in fundo Mercurii fragrantissimum, quod est astrum Mercurii. *Basilins.*

Vires. *Diaphoreticum est & peculiariter curativum Luis venerea: easdemque vires obtinet, quas Sal. com. & i ex corpore residuo paratum. vide infra.*

6. *Aliud Oleum & diaphoreticum fragrans.*

R. \oslash ti p. i. \times fixi, (in liquorem, p. d. redacti & mundificati,) p. iij. solve p. d. Liquore imbuatur charta bibula: Charta sic perfusa matracio vitreo includatur cum suo \times & recipiente: destillando liquorem Mercurialem Δ arenæ elice. Hunc si rectificaveris, dulcissimum odorisque fragrantissimi ac gratissimi, moschum redolentis, nancisceris oleum.

Vires. *Apertissimum est in sudoribus ciendis.*

Quercetan. in Tetrad. In descriptione Panaceæ &ialis.

7. *Oleum Mercurii Saccharatum, Spiritusque.*

R. \oslash \pm . i. Sacchar. p. iij. Misc. optimè ac destilla per \oslash vitream luto obductam in receptac. capax. Primo accende paulatim carbones supra \oslash , ut calefeat: hinc accende & infra ac continua Δ in lentum dies 2. aut 3. Quod extillavit committe destillationi MB. Exhibet \sim Mercurii subacidus, \oslash Sacchari remanente in fundo.

N. Lente procedas memento, ne operam ac oleum perdas. Saccharum enim astu nimio irritatum, vi sibi exitum quarere solet.

Ufus. *In Ulceribus, Vesica, aut aliis Affectibus, ex morbo Gallico relictis, magnis est solatii.*

Dosis: spiritus exhibetur gut 3, 4.

V. EXTRACTIO.

Unde

1. *Sulphur seu Tinctura Mercurii Aquila celestis.*

R. \oslash t. (cum Sal. com. & \oslash o elevat.) q. v. affundo \times , stent per septimanas aliquot, ut extrahatur flavedo. f. a. Decantatos liquores destilla ad siccitatem, & habebis pulverem rubeum, qui verum Mercurii Sulphur.

Vires. *Paracelsus maxima huic attribuit praconia, in curanda Podagra. Epi-*

Epilepsia, morbo Gallico, &c. Quorum radicem per sudorem expellat.

Dosis g. 3. 4.

2. Alia.

Rz. Vitri Mercurii (quo succinum ꝯ ii vocatur,) extrahe cum ✕ decanta & abstrahe.

Vires. Sudorem movet.

Dosis g. 2. 3.

N. Ut virum illud, non est nisi virum ꝯ ij: Ita Extractio hac non nisi ꝯ ij. censenda erit. Vid. Bittich.

3. Oleum Mercurii ꝯ ialis.
Tinctura.

Rz. Mercurii ex ꝯ fact. part. i. ꝯ. Q. i. rubr. rectificatiss. p. iv. abstrahe leniter, ut cum Mercurio maneant, dein auge Δ , & sublimabitur aliquota Mercurii pars. Sublimatum rede Mercurio in fundo, tantundemque novi ꝯ i. Q. i. adde abstraheque & sublima, idque vice tercia: tandem tere, & affunde triplum V rectificatiss. circula, sic fiet separatio, & Mercurius in ꝯ abibit supernatans. Hinc separa ꝯ idque circula & cum ✕ acerrimo. Sic ꝯ recipiet ponderositatem, fundumq; petet, & quod noxium in ✕ erat ✕ o immixtum manet.

Vires. Basilii maximis encomiis ꝯ hoc celebrat, vimque ei attribuit corroborandi Cerebrum, curandi Apoplexiam, imò loco Panacea habet.

VI. LIQVATIO.

1. Unde Liqueor.

Rz. ꝯ t. q. v. digere in phiola vi-

tre calore mediocri, & (40.) hinc solve per deliquium.

Vires. Curat Ulcera ac Vulnera maligna, instillatus.

Alius Liqueor Mercurii precipitati.

Rz. ꝯ per ∇ precipitat. q. v. affunde V opt. digere & cum acer factus fuerit, decanta. Hinc affunde alium, donec acrimonia sublata, & calx attenuata sit. Tunc affunde ✕ digere, decanta, affunde novum ✕ idque toties, donec totus pulvis in ✕ abierit: abstrahe ✕, pulveremque reponere in cellam ad liquefendum cum aqua Chelidonia.

N. Quod si ✕ calci huius insufficiens fuerit, denuo calcina.

3. Alius.

Rz. ꝯ t. q. v. solve in ∇ , (ex Sal. Nit. p. ij. & ✕, p. i. destillata,) digere vase clauso, postea destilla: residuum tere, rursusque aquam affunde, idque tantisper reitera, donec omne sublimatum in fundo fixum remaneat. Fixum hoc sublimatum per ꝯm unam ac alteram leviter reverbera, dein tere, digere cum V, abstraheque cohobando, donec in ꝯ i. formam abeat. Utitur.

Vires. Confert Podagricis, lue veneræ infectis, Cancro, Fistulis, & omnibus ulceribus sordidis, putridis atque inveteratis, sive intrinsecus, sive extrinsecus adhibeatur.

N. Sic quoque figitur per ✕, fixumque per V dicto modo in mucosam
Ooo pin-

pinguedinem abit: qua si ex arena gradatim destilletur igne fortissimo, lacteum humorem sudat, digere hunc ac destilla, accipiesq. ☉ candidum & suave.

Vires. Usus ejus tam internus est ad Renes exulceratos, atque calculum, tum externus ad ulcera.

4. Alius, ☉ & ☿ diaphoreticum dulce

℞. ☿ ti puriss. q. v. tere & solve, p. d. super tabulis ferreis stanno obductis. Liquori affundatur ☿, fiat destillatio, cohobi stories repetitis, donec ☿ acescere incipiat. Tandem abstrahere leniter ☿, manebitque in fundo ☉ Mercurii dulce. Hartmann. in pract.

Dosis à g. 2. ad 6.

N. Alij pellunt igne fortiori ex arena, nantiscanturque lacteum liquorem, qui rectificatus per ☿m evadit fragrantissimus sine corrosione. Vide supra in destillatis.

5. Liquor ☿ Jovialis.

℞. ☿ crud. ℥ is ana ℥ij. F. āāā. Huic adde Mercurii aliquoties sublimati ℥iv. Tria solvantur per deliq. Liquorem digere cum ☿ per mensem. Postea abstrahere ☿m de lenissimo in MB ne ☉ simul. ascendant. F. cohobatio quater vel quin-

quies. Ultimo remanebit in fundo ☉ & ☿.

Vires. Potest adhiberi intrinsecus & extrinsecus.

Dosis g. 2. ad 6.

6. Liquor. ☿ & ☿.

*Sublima ☿ ti ℥j. cum ana *ci adde ☿ ad eminentiam 3. digitorum, digere simul per 6. ☿ & per ☿ pelle. Post ☿ egredietur Oleum, quod in frigido coagulabitur in massam albam quæ in cellâ posita resolvetur in liquorem ☿em dissolventem, eumque in volatilitatem adducentem.*

Exs. Cloff.

VII. SALIFICATIO.

℞. Corpus ex præparatione ☉ i ☿ i fragrantis residuum (vide supra) affunde idem illud ☉ fragrans, digereturq; & extrahetur sal ☿. Extractioni decantata, affunde ☿ quantitatem bonam, demum abstrahere ☿ in cinere, & ascendet post ☿ & ☉ ☿ii relicto sale in fundo.

Vires. Summum est & efficacissimum arcaxum in extirpanda Lue venerea, etiam radicata & inveterata, sanguinem mundificat, adeoque omnis generis ulceribus sine ☿ cum malignitate conjunctis medetur, scabiei confert, impetiginem sanat.

Dosis g. 1. ad 2. vel 3.

De Cinnabari.

Cinnabaris duorum generum Officinis in usu est, factitia scilicet & nativa, siue mineralis. Factitiam descripsimus in sublimatione Mercurii. Nativa est terra mineralis lapidescens, rubicunda, constans ex Sulph. & Φ io vivo cum terrestri materia instar lapidis, compactis Germ. *Zinober*.

N. Dioscoridis dicitur *Minium*, quippe ex *Minio* Mercurium vivum elici, affirmat. Nec obstat, quod contrarium verbotenus dicat, nimirum suam Cinnabarim à *Minio* diversissimam esse. Etenim quid Dioscoridis Cinnabaris fuerit, nondum certo constat. Sunt enim qui sanguinem Draconis intelligunt, alij *Minium* Officinarum ex plumbo factum.

Reperitur in diversis Europæ locis, in Ungaria, Germaniæque locis variis; Prope Alsheimium Palatinatus, &c. Modusque Φ minde eliciendi, vel rusticis non ignotus est. Ollam cinnabari implent, eamque olla alteri, interposita pertusa lamina ferrea, ore converso imponunt, lutoque circumlito vi ignis circularis Mercurium vivum ex olla superiori in inferiorem defluere faciunt, ad modum quo destillatione per descensum dicta perficitur.

Eligenda quæ gravis Mercurio & Sulph. præstantioribus, adeoque Un-

garica, utpote quæ naturæ solaris.

Vires. *Usus ejus internus, præterquàm quod Antilepticis (pulu. Cratonis) nonnunquam permixta deprehenditur, quod sciam nullus est. Extrinsecus autem adhiberi potest ad sanandam Luem veneream, scabiemque aliam, in suffimentis, &c.*

PRÆPARATA.

Præcipitatus Diaphoreticus Hartmanni.

1. Cinnabaris solvatur in sua principia.

2. Principia illa purificata denuo conjungantur, reducanturque in pulverem.

Processum Hartmannus satis prolixum exhibet, in fine Commentariorum in Croll.

Hunc brevioribus sic habe.

Solve sensim Cinnabarim, (Ungaricam,) in magna quantitate. Sal. Com. is supra Φ ana Δ fortissimo cohobari: (coloris hic erit rubicundissimi,) Solutionem à Sulphure combustuli supernatante, ut & à fecibus residentibus separatam destilla ex cucurbita in Φ , & extillabit menstruum principiis Cinnabaris in cucurbita relictis, quæ hac operatione apta reddita separationi: Abstracto igitur menstruo, Δ que aucto, Mercurius albissimus ascendens lateribus

bus cucurbitæ adhærescet, manentibus in fundo Sulph. & Sal. Com. Collige Mercurium dictum seorsim, purificaq; quam optimè; videlicet

1. Solvetur & ebulliendū in ☿, hinc solutio à fecib. suis decupelata committatur destillationi, ut ☿ abstrahatur.

2. Procede eadem ratione cum Mercurio remanente, adhibeque loco ☿ pluviam vel rorem majalem stillatit. idq; 3. vel 4. donec nimirum ☿ plane albiſſimus remanserit. Hunc digere cum ☿ rectificatiss. per mensem.

Interea separa reliqua principia, (Sulph. & Sal. com.) & clarifica. Nimirum Sal. Com. elixivietur, s. a. affusâ ☿ pluviam stillatit. calidâ, depuratumq; digeratur cum ☿, tandem ☿ ad apparentiam cuticulæ supernatantis abstracto finatur coagulari.

Sulph. itidem aliquoties cum ☿ stillatit. calida, lotum & exiccatur, simili modo cum ☿ digere, eundemque postea abstrahere.

Posteaquam itaque Mercurius, in ☿ sufficienter fuerit digestus & solutus, (rubescit enim totum illud compositum eleganter,) destilla ex ☿ in Excip. capaciss. Δ ☿ gradatim adhibito, eliceque primo ☿, hinc urge, & prodibit ☿ Mercurii (hinc inde sese extendens & sublimans instar Crystalli.) Peractâ destillatione relinque per 8 viginti quatuor. Sic solvetur ☿ Mercurii Crystallificatus in ☿. Separato tandem ☿ in MB. rema-

net ☿ Mercurii in fundo cinericei coloris.

Habitis his principiis, ad conjunctionem progredere.

Solve Cinnab. Ungatic. 3vi. ☿. Sal. Com. cum ☿ acuato ut supra, sequestratisque fecibus solutionem decantatam destilla ad oleositatem: hinc affunde recentem ☿, vicissimque destilla, idque fac 5. vel 6. vicibus. Postea digere in MB. ☿ (14.) Tandem abstrahere Δ l. ☿, donec ☿ albicantes prodire inceperint, tunc mutato Excip. cape eos simul cum ☿, urgeque ☿, usque ad ignitionem vasis, ☿ hanc serva. In hujus ☿ 3vi. solve Sal. Com. suprafacti 3ij. ac circula aliquamdiu in MB. Postea imprægna Sulph. 3ß. ☿ illa, in qua Sal. Com. solutum, idque pervices, (semper affundendo 3iß) donec Sal. Com. 3j. cum Sulphure fuerit copulata (ex pondere id cognoscere licet,) ac ex ambobus factus sit viscosus quidam liquor. Hujus 3ß. adde 3ij. ☿ Mercurii supra præparati, inque Phiola H. cl. digere in Athanore, prudenter adhibitis Δ gradibus, donec omnia in pulverem subicundum fuerint versa, id fiet mensib. trib. vel quatuor. Pulverem hunc corrige cum ☿ & serva.

Vires. Est Medicina universalis, in quolibet morbo exhiberi idonea, balsamū internum ad expellendum intro hospitantem hostem, vel per alvum, vel per sudores mirifice adjuvans.

Dosis. ʒ. i. vel 2.

CAPUT XVII.

De Antimonio.

ANTIMONIVM est corpus minerale, naturæ Metallinæ finitimum.

Constans 1. ex Sulphure minerali, partim purissimo naturæ solaris, eoque in rubedine fundato, partim combustibili, (instar alterius sulphuris.)

2. Ex copioso Mercurio metallico indigesto, fuliginoso, (coagulato tamen, magisque cocto, quam est Hydrargyrum,) participante de natura Hnina.

Et 3. ex substantia quadam terrestri & salina per pauca.

N Quod in Officinis prostat, liquefactione ex minera est fusum, inq. formas pyramidales ut plurimum effusum. Minera quoque etsi interdum proster venalis, attamen rara est.

Dicitur Hebraice Zaddah. Græcè *Σίμμις* *Σίμμις*. Arabicè Aitmad seu Atimad. Latine Stibium, Antimonium. Germ. *Spießglas* / *Rawspießglas*. Barbar. Anistini, Alcosol Othi. Enigmatic. Lupus, quod scil. omnia metalla præter Solem absumat: Proteus, quod omnes colores Vulcani beneficio induat. Radix metallorum quod omnibus metallis q. adiaceat vel quod à nonnullis minera statuat metallo-

rum. Saturnus Philosophorum à devorando, tum quod Hi, id est, Plumbi naturam redoleat, tum quoque quod lapidem Philosophorum inde parere somnient. Magnesia Hi, eadem ratione.

Delectus.

Variis in Regionibus eruitur 8. Nostraque Germania ejus ubertatem passim præbet. Maximè tamen laudatur Ungaricum & Transylvanum, utpote quod Sulphure puriori dotatum, aurique minera imbutum est. Striusid splendidioribus & longioribus, obscurâque rubedine, (quæ bonitatem ejus arguit ob Sulphuris abundantiam,) reperitur. Hujus nimirum meminit Paracelsus sub titulo rubentis Leonis, & Basilus Monachus in Curru triumphal. sub Orientalis nomine Et hoc maxime ad Medicamentorum elaborationes eligendum est.

Artifices insuper variis modis bonitatem Antimonii explorant. Quidam Charta luteo colore in Pharmacopolijs tincta, denteque apri rite lævigata id affricant, certitudinisque notam, rubram lituram, inductione illa post se relictam statuunt: Alij for-

tissimo aceti ℥ u drachmas aliquot benè pulverisati Antimonii imbibunt, inq; lamella ferrea vel figulina ad lentum ignem, ne ℥ fluat, evaporare sinunt: quod si post evaporationem pulvis Antimonii rubens relinquatur, ulterius de ejus certitudine non dubitant. *Vide Basilic. Antimonii Philippi Moltheri, qui se Hammerum vocat.*

Vires. De viribus Antimonii audiamus Quercetan. in tetrad cap. 31. In Antimonio, inquit, sunt sexcenta proprietates, varia ac prestantes, ut preparantes, expurgantes, vomitiones concitantes, & id genus alia, ut nunquam satis laudari queat hoc Medicamentum. Crudo adhibuerunt Veteres vim adstringendi, exiccandi, meatus corporis obstruendi, excrementias carnis absumendi, cicatrices obducendi, oculorum ulcera & sordes mundificandi, unde & ad Collyria in primis commendatur. Sunt & qui ad Epilepsiam arcendam exhibent, etiam in ipso paroxysmo. Unde pulv. niger Waldecc.

PRÆPARATA.

Præparationes quib. ℥ subjicitur sunt: 1. Calcinatio. 2. Sublimatio. 3. Destillatio. 4. Liquatio. 5. Extractio. 6. Infusio. 7. Salificatio. 8. Mercurificatio.

Calcinatio est tum sicca, tum humida.

CALCINATIO SICCA.

Unde

1. Vitra, Croci, 3. Diaphoretica,
4. Reguli.

1. VITRA ANTIMONII.

1. *Vitrum Antimonii Hyacinthinum.*

2. ℥ pulver. calcinetur in vase figulino amplo ac lato non vitreato continuo scil. materiam rudiculâ movendo, ne concreascet, quod si id præter spem evenierit, denuo pulverisare oportet. Deducendus est hic labor Δ que augendus, vel in tantum, ut vas paulatim igniatur, materiaque cinereum seu griseum acquirat colorem, nec fumum (â quo diligenter cavendum,) amplius emittat.

N. Ex hac calce fit diaphoreticum laudabile ac singulare pestis præservativum. Similiter in ℥ igniatur, ut ex albescente colore fiat pulvis ad flavedinem inclinans.

Dosis g. 3. infusa in vino, datur cum succo calendula.

Calx illa in ℥ benè & satis fusa, (quod immisso stylo ferreo, experiri licet,) effundatur in tabulam lapideam, vel pelvim æneam, ut in vitrum abeat. Vitrum si adhuc nigrum ac opacum fuerit, reiteranda est fusio, donec pellucidum ac hyacinthinum colorem nanciscatur, in qua fusione aliquid Antimonii crudi Matthiolus admiscet. Sed vereor ne pelluciditatem depraverit. *Vide Basilium in curru triumphali Antimonii.*

N. 1. Calcinationem maturandi gratia licet Sal. Com. dimidium (vel ana) addere, id quod post absolutum calcinatio-

nein aqua fervente & drin^{ti} infuper af-
fuso abluendum.

2. Fusionem ut promoveas Borracem
addere potes, nempe ad lb. 1. Borrac. 3℔.
nec est quod inde periculum metuas: Ete-
nim post habito, quod Borrax exhalet, con-
stat quod Borrax sine noxa intro ad 3℔.
exhibeatur.

3. Tempus vitrificandi eligunt non-
nulli, quo ☉ ☽ ☿ in ☿ vel ♀ (signis in-
queis) existunt.

4. Accenseri potest vitrificationi &
illa operatio, qua & levi opera ignis, vi-
tri formam, licet absq; perspicuitate in-
duit, & io scil. in ♄ bulo liquato imin-
guntur ferrei baculi, decutiturque quic-
quid adhaerit, atque hac ratione totum
& extrahitur. Extrahitum & contusum
denovo liquatur, extrahiturque ut ante,
idque toties, donec & optime pulverisa-
tum rubicundo, purpureum colorem ac-
quirat.

Dosis & usus cum simplici vitro com-
munis est.

Rectius tamen ☿u Sulphuris, ☿li,
vel proprio aceto aliquoties cohobatum,
ut evanescente purpureo colore, albicans
evaserit, exhibetur. Valde enim ejus vis
emetica hac correctione emendatur, ut so-
lam per alvum deturbandi vim postea ob-
tineat. Verum februm curativum.

Dosis g. 3. ad 7. in ☿ centaur. min. vel
simili. Molib.

2. Vitrum ex Minera.

℞. Minera & opt. Sal. Nit. puriss.
ana calcinentur optime ac fundantur in
vitrum. Basil.

3. Vitrum Antimonij flavum.

Fit ex Regulo. Vide suo loco.

4. Vitrum Antimonij rubrum.

NB. Si vitrum antimonij miscueris
cum Sulph. citrino, ac fudetis in vi-
trum, hoc ipsum rubescit. Alii fundunt
cum ☉☉, sed præstat ab hoc abstinu-
isse.

5. Vitrum album.

℞. Antimonij, p. 1. Borracis, p. ij.
vel i v. funde aliquamdiu, sic assumit
primo colorem citrinum, postea al-
bum. Effunde ut in vitrum abeat.
Basil.

Vires. Vitrum Antimonij humores
crassos, viscidosque ejici, in ventriculo vi-
cinuq; locis superfluos, idq; per vomitum
ac per alvum. Resistit quoque venenis in
peste, præcipue si cum ♄ propinetur, quip-
pe hac ratione & sudorem ciet utile quoq;
est in febribus putridis ac malignis, Hy-
drope, &c.

Usus & Dosis. Datur à g. 2. ad 4. in
infusione à g. 3. ad 6. vide de hac infusio-
ne infra.

6. Vitrum & nigrum extemporaneum

8. Cloff.

℞. Minera ☿ ii 3ij. Liquefcat in ♄
tum injice per cochlearia aliquid de
mixtura ex Sal. Com. decrepit Sal. Nit.
& ☿☿ communis composita ana 3ij.
absumptis pulver. affundatur & in pel-
vim aut mortarium calens. Habebis vi-
trum nigrum purificandis metallis a-
ptiss. Si ☿ ni 3℔. addatur, repurgabit ☉
instar Reguli & ii.

7. Vitrum Antimonij Diaphoreticum.

Vitrum § ii Diaphoreticum evadit, si pulveratum sæpè maceratur, cum \times sæpèque fundatur. Libav. lib. 2. Alch. tract. 1. c. 23.

8. Vitrum Regulinum.

Calcina Regulum pulverisatum, (continuo agitando; ne fundatur,) donec fumus cesset; hinc funde & effunde. Sic in vitrum evadet quam elegantissimum.

N. Si Com. Salem addideris, citrinescit vitrum.

Hujus dosi major exhiberi potest quam precedentium.

9. Vitrum Antimonij Solare \odot transparent.

R. \odot puriss. § ss. § Ungar. § viii. Funde ad Δ , ac effunde (cavendo ne in Regulum abeat,) mixturam pulverisatam calcina per se, (ut calcinetur § in præparat. vitri,) donec non amplius fumiget. Deinde funde fortiss. Δ , effundeque in pelvim, ut abeat in vitrum transparent rubicundum.

N. Invenies in fundo \times buli \odot dimidia parte diminutum.

Hartm. in Croll. Kest. 3 c. 30.

Ex hoc fit infusio cum V , quam Tincturam vocant.

10. Aliud ex Regulo.

R. \odot opt. § ss. Reguli § viii. Fundantur, pulverisentur ac calcinentur sine fusione, donec fumus cesset. Dein liquecant Δ fortiss. effundanturque ut vitrescant.

N. Hinc calcinationi finitima est calcinatio Antimonii crudi, cum C. C. us. Nimirum levigantur simul optimè § & C. C. usum, proportionè anaticâ. Hinc comituntur igni, ut calcinentur.

Vires. Sudores prolicit.

Dosis gran. à 3. ad 5. vel 6.

Quoniam Vitra § ii violentius ut plurimum operationes suas proficere, adeoque corpus anxie affligere solent diversæ institutæ sunt correctiones, quibus violentia ea aliquo modo infringi mitigarique queat; ideoque.

1. Corrigitur vitrum Antimonij.

Correct. 1.

R. Vitrum antimonii teratur subtiliter, aliquotiesque affundatur \times atque iterum exiccet. Hinc fit Electuarium Antimoniale, seu Pilulæ Antimoniales Crollii. Vide lib. 2.

Correct. 2.

R. Vitrum § , digeratur aliquamdiu in \sim . Sal. Com. extractioni decantatæ, affunde ∇ commun. ac residet § sine violentia vomitum ac secessum ciens.

Dosis g. 2. 3. ad 6. Clariss. Dn D. Petrus de Spina.

Correct. 3.

R. Vitrum § , q. v. solve in Q Tart. per deliq. solutioni instilla \sim Q i; ac concrecent illico Cryalli exiccandi.

Dosis g. 3. 4.

Correct.

Correct. 4.

Vitrum δ purgans.

\mathcal{R} . Vitri δ . pulv. \mathfrak{zj} . \sim vel \odot
 \odot -i. (vel Sulph. per camp.) \mathfrak{zj} . Misc.
 exactè acexicca lento Δ . Repetatur id
 septies vel ultra, semper \sim \odot -i \mathfrak{zj} . ad
 miscendo.

N. 1. Prestantior fit hic pulvis, si in
 extracto Mastich. (ex Mastich. & V)
 per ϕ 3. maceretur, ac V postmodum de-
 super accendatur, penitusque exhalet. Pul-
 vis residuus l. Δ cinerum in patella vitrea
 (horis 12.) exsicceatur.

Vires. Purgat per inferiora.

Dosis a g. 3. ad 5.

N. 2. Si pulveris hujus \mathfrak{zij} . vel pul-
 veris prioris non macerati. \mathfrak{zij} . in Electua-
 rio Antimonii Crolliano vitro ibidem sub-
 stituatur, prestantius id ipsum evadet.

N. 3. Fiant & inde Pilule Antimo-
 niales ad febres. Hartmann. vid. libr.

Correct. 5.

5. Fit per separationem Sulphuris
 \odot -calis. Vide in infusione ∇ bened.
 Brendelii.

Correct. 6.

 \sim \odot -i purgans.

\mathcal{R} . Vitrum δ pulv. q. v. affunde
 \sim \odot -i non rectific. ad emineat.
 durum digitorum. Digerantur ali-
 quamdiu calore leni, sic fit extractio
 nigropunicea.

Vires. Purgat per inferiora.

Dosis gut. 6. 7. 8. 9. 10.

Hartmann. in Croll.

N. 1. Eodem modo corrigi potest per
 \sim Sulph. vel \star proprium.

N. 2. Ex Tinctura illa nigropunicea
 (sc. per \sim \odot -i extracta) paratur
 Tarr. album \odot -latum purgans, quippe vir-
 tute δ ali impregnatum, affundendo ei
 duplum olei Sulph. coagulatumque siccando.

II. CROCI Metallorum.

1. Crocus Metallorum

vulgaris.

\mathcal{R} . δ ii Electi, Sal. nitr. puri an. sigil-
 latim trita atque exactè mixta inflam-
 mentur in \star , vel mortario aëneo, re-
 manebit materia ob colorem hepati
 haud dissimilem, hepar δ ii dicta. Hæc
 edulcorata ∇ calida, dicitur Crocus
 Metallorum.

N. 1. Si ∇ a, in qua hepar δ ii edul-
 coratum, acetum instillaris, precipitem
 dabis Crocum subtiliorem, seu ut aliis pla-
 cet, Sulph. auratum.

N. 2. Inflammatio (quam & denota-
 tionem vocant) fieri commodius poterit, si
 materiam paulatim ac per vices injeceris
 primaque vice vel carbone virvo, vel ferro
 ignito materiam incenderis.

N. 3. Ex ∇ , edulcorationibus illis im-
 pregnata si aliquantulum evaporaverit.
 Crystallos Sal. nitr. vel lapidem Prunella
 δ ialem colligere potes, cujus usus idem
 qui lapidis Prunella dicti: Exhibet itidem
 insigne causticum.

N. 4. Sunt qui Sal nitr. Tarr. ac δ
 inclusa, crucibulo comburunt, relicto solo
 foramine, combusta conijciunt in ∇ cali-
 dam, ut impregnetur. Hinc decantant
 atque inperfo \star precipitant. Sic Cro-

Ppp

cum

cum Metallorum nanciscantur subtilem, magis fixum, quem ulterius in ∇ mace-
rati.

2. *Crocus Metallorum Rulandi.*

Crocus Metallorum Rulandi quisnam sit & quomodo conficiatur? variè agitur. 1. Quercetanus ferè in opinione est, Crocum illum Rulandi non esse diversum à Croco Metallorum vulgari: Hartmannus ab hoc non nisi levi discrimine distat, quod in præparatione situm est: nempe Sal. nit. fluenti & ab Δ remoto, sine inflammatione admiscet \S spatula ferrea continuo agitando, donec omnia probè sint mixta, quæ tandem accendit.

N. Si qua inflammatio acciderit, subsiste, justam Sal. nit. refrigerationem expectans.

2. Tentzelius in sua Exegesi ex Libavio hunc præfert, quem & Mylius in Basilica Chym. pro sincero habet.

R. \S ij. Sal. com. Sal. nit. \bar{a} .

Minutissimè seorsim trita indantur catino, luto probè minuto, (foramine tamen parvulo, in media summitate, spirituum arsenicalium exhalandorum gratiâ, relicto;) inque furnum anemium collocentur, Δ e folium, si libet, adhibito, donec omnia sufficienter fluant, tamdiu continuando, quamdiu fumus per foramen prorumpere non desinit. Quando vero desierit, Δ m probe ad $\frac{1}{4}$ horæ ad-

auge, dein exime ubi \S forma vitri cinnaberini in fundo à sa'ib. supereminentibus instar Reguli à scoriiis sequestratum sese, malleo facilè detruncandum atq; terendum dabit. *vid. Hartm. disp. Chymiatrico Medicas.*

N. Eiusdem cum superiori est usus, nisi quod deorsum colluviem vitiosorum humorum deturbare potissimum solet.

3. Brendelius Vitrum Antimonii pro Croco Metallorum Rulandi vendit.

4. Alii Regulum, quippe qui nonnunquam, vel sponte sua in præparatione vitri \S in globulos parvos abit. Sit ut sit: quodlibet horum haudcirra magnam utilitatem in usum Medicum vocari aptum est.

Vires. Utriusque Croci idem esse poterit usus. Nimirum in doloribus capitis ab impuritate ventriculi, (qua non raro concitantur, Epilepsia, pleuritide, Melancholia, Hypochondriaca, Febris, tum continuis, ac præcipuè Ungarica dicta, tum intermittentibus. In peste, præservatione ab Arthridide, coagulatione sanguinis, &c. In quibus omnibus cum convenienti ∇ a exhibitus purgat per vomitum, ac nonnunquam per secessum.

Usus præterea ejus insignis est in Clysterib. Nimirum \S B. vel \S j. ebullire finitur, in aqua convenienti vel vino: Colatura admiscetur brodio vel decocto simplicium mollientium, optimumque Medicamentum in colica exhibet.

Dosis

Dosis interna est à g. 3. ad ʒ. Ego vix 6 gr. transcendendo.

Crocus ʒi Regulatus.

Fluat regulus ʒii cum pari pondere Sal. nit. fusaque materia remoris scorriis in lateribus eluatur à nitrosa falsedine, postea ex coetur, & cum affusione V aliquoties humectetur & decanteretur. Ex comm. Greg. Horstii.

Vires. Longè minus per vomitum. magis vero per alvum movet ad gr. x. cum Zibebis laxat tribus exhibetur, vel cum diagrid. correcto per fumum Sulph. & ʒodulci.

III. DIAPHORETICA.

1. ʒ Diaphoreticum vulgare.

ʒi. ʒii opt. Sal. nit. pur. ʒi. Exactè mixta calcinentur detonatione, [ut in Croco Metallorum vulg. dictum] ternâ, seu donec amplius detonationem recuset, (post singulas detonationes materiam edulcorare oportet, edulcoratumque & exiccatum denuo cum Sal. nit. añ. miscere.) Tandem ʒium diaphoreticum candidissimum exicca pro usu.

N. Vñlla edulcoratoria si evaporet, reddit Lapid. Prunella ʒialem, de quo in Sal. nit.

Modus compendiosior.

ʒi. 1. ʒ crud. Sal. nit. pari añ. Immitte in + cui aliud + inversum in fundo perforatum imponatur, luto inferiori + annexum: ignem da circularem, quo materia accensa paulatim calcinetur, fumumque per foramen expiret: ignem per horam continua,

qua præterlapsâ, materiam pulverisatam V calida edulcora.

2. ʒi. Materie hujus edulcoratæ part. ij. Sal. nit. puri p. i. vel ana. impone crucibulis, ut in priori operatione:

N. Sic ʒ diaphoreticum præparavi aliquoties sine ulla molestia sudorem movens.

Alii Sal. non abluunt, sed massam tritam cum pondere æquali Sal. nit. ut ante misceant: Alii addunt Tart. vel Sulph. ʒi misceant.

Basilus circulat insuper hoc ʒ diaphoret. cum V. quem dein desuper incendit, &c. dein reverberat atque pulverem resistentem per deliq. resolvit.

Vires. ʒ hoc diaphoreticum resistit corruptioni, mundificat sanguinem, conducit adversus omnes obstructions licet inveteratas, Hepatis, Lienis, Mesenteris, aliarumque partium internarum: adversus retentionem mensium, cachexiam virginum, suffoc. hyster. Hydropem, Melanchol. hypochondriacam, Luem & ulcera tam interna, quam externa, Scabiem: præsertim confert & in febr. malignis, Exanthematib. & variolis, rumpit interna apostemata, verum non subito, sed paulatim operationes suas exercit.

Dosis à g. 10. ad 25.

2. Flores ʒi fixi, seu diaphoreticum.

Fit si ʒ Diaphoreticum procedens in V horis aliquot coquatur, deco-

Ppp 2

Quam

Etumque filtretur, sic præcipitabitur nempe pulvis subtilissimus ad fundum (maximè si ✕ insperferis) virtute priorem superans.

N. Hic pulvis Basilio Valentino in curru suo triumph. dicitur Flores ☿ ii fixi seu pulvis albus ☿ ii quem commendat ad interiora apostemata, ut & in Lue venerea, in qua cum spiritu Guajaci exhiberi poterit.

Præterea in iisdem affectibus conveni præcedens diaphoreticum pulvis hic majori cum utilitate exhiberi aptus est.

Dosis g. 15. quam dosin vel quinquies Valentinus singulis diebus exhibet.

3. ☿ Diaphoreticum Tartarisatum.

Flores ☿ ii Tartarisati, FF.

℞. ☿ Diaphoret. vulgare. Sal. Tart. ℥iij. M. fluant in tigillo hor. 4. dein tere ac dissolve per deliq.

Hinc

℞. Olei hujus ℥ij. spir. ☿ i ℥j. in stilla guttatim & præcipitabitur pulvis, quem sicca & serva.

Dosis à g. 5. ad 10.

IV. REGULI.

i. Regulus Antimonii simplex.

1.

℞. Sal. nit. ac Tart. ana, calcinentur seu fluant in ✕ vi ignis.

℞. Materię hujus calcinatę, ac Antimonii ana misce ac committe iterum in ✕ igni fortissimo, quo instar aquę fluant.

Funde postea in calicem fusorium

vel mortarium æneum sevo illitum, id. que movendo, Reguli separationem & subidentiam promove. Omnibus refrigeratis Regulum à Scoriiis separa.

2.

℞. Antimonii elect. lb. ij. Tart. alb. ii. Fundatur ☿ & postea adjiciatur paulatim Tart. lbijß. circiter, linquatur in fluxu per tempus. Deinde fac Regulum, separaque Scorias, Regulum purifica, iterum fundendo, & dum fluit, reliquum Tart. addendo.

3.

℞. Calcem Antimonii cineream per se factam, (vide in præparatione vitri ☿) fluat ad Δ 8 integra, dein moveatur ab igne & reponatur ut refrigerescat. Agiturque refrigerando, ut Regulus deorsum vergat ad fundum sedens.

N. 1. Alii admiscendo carbonem pulverisatos majorem Reguli quantitatem sibi pollicentur.

N. 2. Ex Scoriiis fit Sulph. auratum, suo loco.

N. 3. Regulus quomodo fixetur, vide de floribus ☿ vel in destillatione Reguli.

N. 4. Tempus fusionis optimum censetur, ☾ crescente præsertim ☉ in ☿ constituto, atque insuper sereno Cælo. Experientia enim docuit tunc temporis majore felicitate Stella fusionem succedere.

2. Regulus ☿ alii.

℞. ☿. ℥ix. circiter, appone igni donec

nec incipiat liquefcere. Huic adde Antimonii ℥viii . auge ignem ut fluant. Post injice Sal. nit. M. f. & cum ceſſaverit ſtrepitus, funde in vaginam fuſoriam, (Gießpouſſel) vel in mortarium, ſic & Regulus ſimul uniti in fundo coaleſcent.

Fit & ſi in ſecunda fluxione, Ois li-
maturam vel fruſta injeceris.

N. 1. Regulus hic ſi aliquoties fundatur (in quibus fuſionibus ſemper aliquid Sal. nit. vel & Tart. injiciendum.) & a ſcoriis ſeparetur, tandem ſtellam contrahit ſolis radiantis inſtar, imo vel multis ſtellis ac ſi terra aquis circumdata eſſet Regulum ſignatum vidi.

N. 2. Plures regulum preparandi mo-
dos habet. Sennert. in Inſtitut. l. 5. p. 3.
ſ. 3. n. c. 19.

N. 3. Ex Scoriis fieri poteſt vitrum
Sala.

N. 4. Si Regulum in ℥viii ſolve-
ris, ſolutionemque aliquoties maceraveris
ac deſtillaveris, tandemque inſpiſſaveris,
optimum habebis caſtoreum ardo ℥xj
nato blandè noxia expellens.

Dofis gran. 2. 3.

Tentzel. de ℥viii 8.

Vide ſis etiam Tincturam ex Regulo &
& ♀.

3. Regulus Iovialis.

Fieri poteſt, ſi Regulum ſine ♂ fa-
ctum, denuo ad ignem fuderis, duran-
teque fuſione ℥ adjeceris.

4. Regulus Ois .

N. O part. l. ℥ p. iv. vel vi. fun-
dantur & effundantur ut moris in Re-

gulum a ſcoriis ſeparandum. Scorias
adjecto ℥io crudo, funde iterum ſu-
perinjiciendo cum fluxerint parum de
ſcobe & ac affundendo denuo, ut Re-
gulus ſubſideat. Sic poteſ vice tertia
procedere, vel donec nihil amplius Re-
guli appareat.

N. Similiter fit & Regulus Caris .

5. Diaphoreticum Regulinum ſeu Ceruſa
 ♂ialis & exinde Ceruſa ♂ialis
diaphoretica.

N. 2. Reguli p. l. Sal. nit. Cryſtall. p. iij.
ali añ.] fluant ſuper carbones pet gm ,
dein edulcora, ſeparando Reguli gru-
mos, qui in fundo colliguntur. Pulvis
l. Δ . exiccatus dicitur Ceruſa ♂ialis .
Hunc pulverem ſi denuo cum Sal. nit.
calcinaveris, vel ſine fuſione ad citri-
num colorem reverberaveris, planè fit
diaphoreticus, diciturque ceruſa dia-
phoretica.

Vires. Ceruſa Intriſecum maxima
cum utilitate aſſumi poteſt in curatione ul-
cerum inveteratorum, ſcabierum aut pu-
ſtularum pertinacium, continuis 3. 4. aut
pluribus ſeptimanis, quotidie ſc. aſſumen-
do. Diverſimodè operari conſuevit. Nam
in quibuſdam duabus vel tribus primis
diebus naufeam aliquam producere ſolet,
cum tenebra expuitione, reliquo tempore
inſenſibiliter operatur: Aliis alvum laxat
moderatè, aliis ſudorem eicit, aliis pror-
sus inſenſibiliter, & non niſi in fine tan-
dem manifeſtas operationes edit. Extrin-
ſecus deſiccat, ſtringitque moderatè abſter-
git & aperit.

Dosis intro \mathfrak{B} . ad $\mathfrak{Z}\mathfrak{B}$. 4. aut 5. hor. ante prandium.

Cerussa Antimonii diaphoretica citra rursus eandem operationes & quidem majori cum fructu operatur.

Dosis eadem. Vide Salum. in Anat. Antimonii.

6. Cerussa Antimonii Solaris.

\mathfrak{R} . Regul. Antimonii $\mathfrak{Z}\mathfrak{j}$. \bigcirc purg. $\mathfrak{Z}\mathfrak{j}$. Sal. nit. $\mathfrak{Z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. calcinentur in \times bulo sine fusione. Scilicet Regul. abicit in pulverem citrinum, \bigcirc vero pondere immixtus invenietur. Pulverem dulcoratum, si libet, denuo calcina.

Vires. Sudorem citet.

N. Curiositas humana adveniens quoque calcinationem per calorem Solis celestis, quem Magicum appellant.

Nimirum.

Concentrentur radii Solares in \mathfrak{B} pulveris. beneficio speculi in censis hic brevi tempore fumus ex \mathfrak{B} ascendet. Antimoniumque album evadet.

N. 1. Pondus Antimonij post calcinationem auctum potius, quam imminutumprehenditur.

N. 2. Flores Antimonij hac ratione facilius calcinantur, quam \mathfrak{B} crudum.

CALCINATIO HUMIDA

Unde.

PRÆCIPITATA.

1. \mathfrak{B} Rubeum fixum.

\mathfrak{R} . Antimonij elect. q. v. affunde \mathfrak{R} . stent aliquandiu in digestionem, donec calx in fundo alba appareat. Postea abstrahe \mathfrak{R} per distillationem,

(vel decantationem,) vel & affundendo Δ præcipita, calcemque elue ∇ repida, donec \mathfrak{R} non amplius sentiantur. Pulverem siccatum reverbera in \times clauso hor. 6. (\mathfrak{O} 3. Basil.) fietque rubeus.

N. Reverberatio hac minori molestia in fornace sigulina absolvi poterit.

Vires. Felicissime purgat. aque deorsum quam sursum, idque non tam naturâ suâ, quam humoris biliosi circa ventriculum stabulantis, quinimo in nonnullis per diaphoresin operatur.

Dosis g. 2. 3. 4. & plura.

Basilus decantat solutionem ∇ , decantatam destillat ad siccitatem pulveris, cui affundit ∇ pluviam: digeritque ut fiat extractio rubicunda: hanc iterum filtratam, destillat ad siccitatem: Ex pulvere rubeo remanente extrahit cum \times tincturam rubicundam, abjectis fecibus albis, \times iterum abstrahit, pulveremque relictum reverberat \mathfrak{O} 3. postremo extrahit tincturam cum ∇ , fecibus iterum rejectis tandem abstrahit ∇ ad siccitatem.

Vires. Summarum est virium in resolvendo cruore coagulato, in rumpendis Apostematibus, in curanda Lue venerea. Basil.

1. Præcipitatum vitrum.

Solvatur vitrum Antimonij in \mathfrak{R} seu in ∇ , vel in \mathfrak{O} Sulph. aut in \sim u Sal. com. dein menstrui abstractione fiat præcipitatio.

N. 1. Ex præcipitato illo \mathfrak{B} antequam reverberetur, extrahi possunt Sulph. \mathfrak{O} 3.

¶ *Antimonii de quibus suis locis. Sala de ☿.*

N. 2. Si Antimonio grosse contuso affuderis \mathcal{R} , & reposueris aliquamdiu, extrahetur Sulph. Antimonii, partim supernatans, partim frustula Antimonii obducens. Hoc Sulph. in lixiuio Tart. soluitur, si inibi decoquatur.

3. Precipitatum Antimonii diaphoreticum.

R. Croc. Metall. \mathfrak{z} ij. impone destillatorio vitro oblongi colli, quod calenti ∇ immergatur, hinc affunde sensim \sim Sal. nit. \mathfrak{z} xi i. moveque sepius ne ☿ fundo adhæreat. Conserva id calidum, donec \sim Sal. nit. non amplius labore, & ☿ redactum sit in pulverem album. Dein vase exactè clauso, digere in MB septiman. 4. aut 5. ac tandem separa \sim Sal. nit. in \odot , pulveremque spatula lignea agitando, exicca ad Δ , donec nullus amplius fumus exhalet. Hinc ablue & relue ∇ is cordialib.

Dosis à g. 4. ad 12. Sala de ☿.

4. Precipitatus Regulus. ☿.

R. Flor. Regul. ☿ (cum * sublimat. & edulcoratos) solve in \mathcal{R} , (ex Sal. nit. & * destillat.) digere ac tandem per iteratas cohobationes precipita. Precipitatum ablue & reverbera ut \sim \mathcal{R} , separentur, continuo spatula ferrea agitando, donec acquirat colorem flavum. Quercet.

II. SVBLIMATIO.

Vnde

FLORES & CINNABARIS.

1. Flores Antimonii Crudi, vel minera Antimonialis.

R. ☿ crudi triti, q. v. pone in cucurbitam fictilem, quæ in \odot in ponatur satis profunde. Cucurbitæ adapta alembicum cæcum vel rostratum cum excipulo, aut si mavis connecte ollas aliquot (Num. iij. vi. vel plures,) sese invicem excipientes: Ignem gradatim admove, ne sit nimium fortis, nec debilis nimis. Si enim fortior sit, funditur Antimonium, nec sublimatur, si vero debilior, non ascendunt flores. Si rectè Δ m rexeris, colliges triplices flores, albos, flavos & rubros. Sen. Instit. Phlegma antimonii in appositum excipulum colligi poterit.

N. 1. Felicius ac compendiosius proceditur.

Primo si cucurbita tubulum seu canalem in latere habeat, per quem ☿ tritum paulatim & per vices, (singulis horis parum,) in cucurbitam (gradatim ignitam, injiciatur. Liquefit enim statim ☿ abique ferè penitus in flores.

Secundo si cucurbita obliquè fornaci imponatur, ut tubulus perpendiculariter ascendat.

Tertio, si in anemio sublimatio instituat, ac Antimonii \mathfrak{z} ij. \odot . a \mathfrak{z} ij. admisceatur. Alii admiscunt carbonem contusos, eliciuntque Sulph. remanente in fundo materia cærulea, in qua ☿ Antimonii.

Quarto, alembici vertex foraminulo sit pervius. Et hoc benè notandum est nisi sine frustrari velis.

N. 2. Pa-

N. 1. Parari possunt & flores Antimonii per ∞ binis rostris ante scil. & retro connexam, quorum rostrorum antea apponitur excipulum amplum, per posticum autem inflatur ventus, vapores seu flores ab ∞ elevatos in excipulum deducens. Kest. i. cent. 31.

N. 3. Non è re foret, si excipulum foramen haberet canalem vè, quo acidum phlegma in aliud excipulum suppositum deflueret. Quia mo excipulum nisi pervium fuerit, foramine statim egressus idoneo in cassum laborabitur.

2. Flores Reguli.

Ex Regulo eodem modo quo ex ∞ crudo flores elevari poterunt.

3. Flores cum additamento, scilicet compositi.

Ex ∞ crudo, regulo & vitro.

R. Antimonii \ast an. misceantur exactè & sublimentur per ∞ m.

N. Sufficit alembicus sine ollis: eleventurque flores rubei, qui à calida edulcorati albescunt.

Vires. Vomitus movent, mitius tamen quam simplices flores.

Dosis gr. 4. ad 6.

N. 1. Resistit horum florum usus Maniacos, Melancholicos, Quartanarios, vide Epist. tract. 1. observ. Horstii annotations.

N. 2. Si ∞ h. dulce gr. 12. gr. 2. horum flor. addideris, fortiterq. simul contriveris, ferè sine vomitu per secessum serosa & biliosa edunt.

N. 3. Eodem modo fiunt & flores ex

Reguli & \ast vel ex vitro ∞ & ∞ \ast equal. partib. Basil.

N. 4. Quod in summitate cucurbita invenitur, adde fecibus in fundo relictis, additoque paulillo \ast sublimationem repete, habebis flores flavos.

4. Alter, Sulph. Antimonii secundum Basilium.

R. Antimonii opt. lb. 1. \ast 3iv. sublima, sublimato admisce antimonii 3v. sublima iterum: hinc edulcora & habebis Sulph. combustibile. Basil. in Cur. Tr. p. 217.

N. Sunt qui loco \ast . R. Sal. com.

5. Flores ∞ & ∞ lati.

R. Florum antimonii rubeor. 3iv. Flor. Sulph. (sublimatorum ad perfectam albedinem) 3ij. Colchotar. 3xii. mixta sublimentur ter, & habebis flores rubicundissimos. Quercetan. in Teirad.

N. Basilium non addit Sulph.

6. Flores Reguli spiritum ∞ ac ∞ is. impragnati.

R. Reguli stellat. atque \ast [à ∞ ter sublimat.] an. sublima bis ter vè, hinc edulcora & exicca, tandem denuò à colchotare tertio eleva.

Vires. Purgant blandè, conferuntque ad omnes febres intermitentes.

Dosis aliquot gr. Querc. in Teir.

N. Flores hic cum \ast sublimati, & nondum ab eodem edulcorati, resolvuntur in liquorem magnarum virium in vulneribus. Basil.

De usu florum antimonii in genere nota-

nere notare expedit, quod sc. quoniam violentos vomitus ferè proritant, optima correctione opus habeant, sine qua non facile ac tutum erit, eos in usum Medicum vocari.

Sunt nihilominus qui exhibent g. 2.

3. 4.

*Sic igitur
Correctio florum Antimonij.*

℞. Flor. Antimonij alb. ℥j. Sal. Com. Tarrati — u ✕ impragnati ℥i℔. Liquefiant vi Δ in massam rubram. Affunde massæ huic tritæ V (▽ vitæ,) aromatizatum, additis Salis vel Magisterij Perlarum ac Corallor. an. ℥ii. Digerantur calore cinerum ♂ ♀ 2. postea abstrahatur V ad siccitatem, remanebit in fundo ♀ optimè depuratum, fervetur in vitro clauso, quia in aëre resolvitur.

Vires. Opitulantur morbis, ab atrabile oriundis, per alvum, per superiora, per insensibilem respirationem noxia copiosè expurgantes.

Sal. Com. Tart. ✕ impragnatur hoc modo.

℞. Sal. Com. Tart. [frequenti solutione ac coagulatione summè depuratum] solve in ✕. Hinc abstrahere humiditatem lento igne, novumque ✕ affundendo, iterum solve ac abstrahere. Operationes solutionis ac abstractionis repetendo, donec ✕ extillet aciditate sua non amplius spoliatum, (quod octava vel nona imbibitione ac destillatione fiet.) Exiccetur post-

modum; sic habes Sal. Com. Tart. impragnatum.

N. Huius usus quoque est in Magisterio Tart. purgante.

V aromatizatus, seu ▽ vita aromatizata.

℞. Galang.
Gallia mosch.
Caryophyllor.
Cinamom.
Macer. an. ℥℔.
Croc. ℥iij.

Ex mediocriter tritis fit extractio cum V optimè rectificato, donec amplius non tingatur. Tinctura decantata est V aromatizatus.

Vide de his Crollium.

Correct. 2.

Circulentur per mensem cum V mellito, sic omnem deponunt violentiam, retinebuntque solam deijcendi facultatem.

Dosis à g. 5. ad 7. vel ad summum 10.

V mellitus.

V affundatur melli, stet aliquamdiu, postea destilletur: In fine augeatur Δ, ut — quoque mellis transeat & jungatur. V.

Correct. 3.

Exponantur flores in scutella vitrea; charta supernè duntaxat tecta, mediocri calori (fornacis) per mensem unum ac alterum, quotidie bis (ne non agitati nigrescant) agitando: Flores manent quidem rubei, sed tamen benè poroli & leves, Sulphure fœtido ad papyrum elevato.

Qqq

Vires.

Vires. *Movens sedes duntaxat sine vomitu satis benignè.*

Dosis à g. 5. ad 8. vel 10.

Correct. 4.

Mitiores etiam fiunt, si aliquamdiu cum Sal. Com. conterantur & postea iterum ∇ dulci dulcorentur.

7. Flores Antimonij diaphoretici.

R. Flores ⚗ irriga ⚗ Sulphuris & calcina in ⚗ clauso Δ carbonum.

Sala in anat. Antimonij, s. 3.

N. Alij affundunt —m ⚗ , quo iterum abstracto edulcorant ac calcinant, ut materia igniatur.

8. Flores fixi.

Flores Cheiri Paracelso.

R. Flores Antimonij fige sublimationibus, toties iteratis, donec nihil amplius sublimetur.

N. 1. Flores relictæ in fundo, materia, denuo in singulis sublimationibus semper admiscendi sunt.

N. 2. Hi flores in cella per deliquium in ⚗ solvuntur, quod ∇ destillata quinque eluendum.

Fixantur flores hoc modo

Formetur pila rotunda terrea cum foramine, per illud immitte Ψ & reple ad medias, postea immitte quoq; Nodulum floribus ⚗ albis repletum, tum circum circa novam Ψ vivam agglomera, ad plenitudinem usque globuli integram, tum ostiolum luto obducito, globulumque in furno lateritio ad reverberandum collocato, & per biduum urito..

Vires. Flores fixi clementius purgant & sudores copiosos movent.

Dos. gr. 8. ⚗ . Est S. Closs.

9. Cinnabaris Antim.

Fit, si post butyri Antimonialis destillationem Δ fortis & suppressivonis quoque, (i.e. super ⚗) horis aliquot detur. Quippe cinnabaris Antimonii hac ratione collo — adhærescit, quam collectam sublimatione una ac altera purificare poteris.

N. 1. Si desideras potius cinnabarim, quam butyrum Antimonij, da statim Δ fortem.

N. 2. Ex hac paratur ⚗ diaphoreticus, qui in Epilepsia & vertigine præstantissimus. *Vide lib. 2.*

III. DESTILLATIO.

Vnde

ACETA, OLEA, SPIRITUS, &c.

1. Acetum Antimonij.

R. Mineram Antimonii tere ac elice ⚗ per —m , prolectum funde super mineram novam, digere — (23.) hinc destilla iterum per —m , idque repete, donec quantitatem cupitam acquisiveris.

N. Parum ⚗ fundit, adeoque labor sat radiosus est.

Aliiter.

R. Miner. ⚗ lævigat. affunde ∇ pluvial. destillat. ad eminent. digit. aliquot, digere vase H. cl. in fimo equino, donec incipiant fermentari ac spumam ejicere: Dein abstrahe ∇ m, augendo ∇ m in fine, sublimatum redde capiti suo mortuo, & reafusa ∇ , quæ abstra-

abstracta erit, fiat cohobatio toties reiteranda, donec prodeat liquor acidus, instar ✚.

Vires. *Inseruit Tinctura Antimonii extrahenda, refrigerat efficaciter sanguinem, in febris præcipue maligna & Ungarica, si cum Lap. Prunella & ∇ destillata conveniente misceatur: curat inflammationem ex pulvere nitratu ortam cum saccharo H.*

N. 1. ✚ hoc ∫ij melius evadet, si pulverisata nova minera ∫ij id affuderis ad emin. dig. 3. circulariter q. (8 12.) sic tingeretur rubro colore magis, acescet: tum effunde & abstrahere per MB sic ✚ ∫ij exhibet clarum, & rube dinem post se relinquet in fundo. V. Basil. p. 223.

N. 2. Acuari potest hoc ✚ suomet Sale.

Nimirum.

R. ✚. antimonii ℥iv. Sal. Com. antimonii ℥ij. solve ac destilla per F.

Dici poterit ✚ antimonii alkalifatum, si ve radicatam.

N. Felicius forsitan processeris, si Sal ∫ in ✚ solveris atq. ex argilla & solutione hac massam & exinde globulos formare vis, eosque per ∇, ut Sal. Com. sollet, destillaveris. Bas. p. 222.

Aliud.

Acetum ∫ii in majori copia obtinebis, si super cratem ferream mineram ∫ ii frustulatim imponas, superstructo Aludele cum pluribus ollis perviis & XX, subministrando carbonem in alia focaria accensos, ne acetum à carbonum vaporibus inquinetur. Ex S. Gloss.

N. Cum hoc aceto ∫ ali paravi posunt flores fixi si ve ∫ diaphoreticum de quo Poppus in Hodoget. pag. 145. & sequentibus.

2. ∫ Antimonij per se.

R. ∫ quantitatem satis magnam pone in putrefactionem, dein educ ∇, quam vicissim affundendo, putrefactionem ac postea destillationem reitera, idque toties donec exurgat tandem ∫, seu liquor oleagineus.

N. Nancisceris potius ✚ quam liquorem oleagineum.

Vires. Dissolvens est egregium. Poter. in Pharmacopœia.

3. Aliter,

R. Miner. antimonij, q. v. misce cum ∫. pelle per ∇.

4. ∫ Saccharatum.

R. ∫ lb. ℥. Sacchar. cand. ℥ij. M. opt. & destillentur per ∇ in F. ∫.

Beginius.

R. Antimonij, sacchari candi ana ℥iv. O. ust. ℥j.

Utile est ad externos & internos morbos.

N. Ex hoc ∫ o fiunt Pilula febriles ad Quartanam, quas vide l. 2.

5. ∫ ∫ Saccharatum Sennerti.

R. Antimonij lb. ij. Sulph. ℥ij. M. pone in ∆ circularem ut liquecant, atque ita ∆ per hor. 4. vel 5. continua: dein auge ∆, ut Sulph. accenda-

tur & exhalet; hinc pulverisa ☿, affundeque ☿ digeranturque ☿ 8. dein destillentur, donec guttæ rubræ ascendere incipiant, tunc muta recipiens.

℞. ☿ relictum in fundo ℞. 1. sacchar. cand. ℥vi. V opt. ℥ix. Destilla per ☿, (in receptaculum in quo sit ☿, quo primo exillatit.) Δ forti, donec nihil ☿i vel vaporis amplius appareat. V in B. abstrahæ ad remanentiam. 4x. partis.

Vid. Sennert. Institut.

N. 1. Melius sit hoc ☿, si digeratur aliquamdiu cum V novo, fecibusq; per colaturam separatis à colatura V per destill. abstrahatur.

N. 2. In eliciendo ☿o saccharato lente procedere memineris, ne nimia ebullitione sine optato frustreris.

N. 3. Sicum V vite aliqua, vel V rosarum, in qua moschus vel ambra soluta sit, addita V cinam. digeratur, atque aliquot cohobis cohobetur, movet alvum sine vomitu ac molestia, utileque Medicamentum exhibet in Hydropo.

Dosis p. 3. ad 6.

6. Oleum Antimonij Saccharatum Quercetani.

Antidotus Panaretos.

℞. Miner. ☿ ad albed. calcinata ℞. ℞. sacchar. cand. in formam syrupi cum circulato minore (V opt.) transmutati ℞. 1. Misc. Digerantur ☿ 8 (4. vel 5.) in B, dein per gradus Δ destillentur.

Elicitor primò circulatum minus, secundò liquor albus, tertio flavus, quartò rubicundissimus, instar sanguinis, dulcisque Balsamus; collige singula seorsim vel separata ab invicem.

Vires. Liquor albus opitulatur can-
crosis ulceribus & externis morbis.

Liquor flavus idoneus est vacuationi per alvum & vomitum.

Liquor rubicundus ternis aut quaternis cohobitationibus rectificatus & absolutus V cordialis, admirandas prestat curationes in Lepra, Morphaea, Apoplexia, Epilepsia, Peste, in V appropriatis exhibitum.

Dosis à gr. 3. ad 6. Quercetan. in Tetr.

N. Eodem modo & ex Croc. Metall. & Sacchar. anacum V digestus, ☿ preparari potest.

Dosis gr. 4. 5. 6. 7.

7. Oleum ☿ij Saccharatum Fausi.

℞. Croc. metallor. pulveris
Sacchar. cand. an. ℥iv. vel Sacchar.
℥vi.

Spir. ☿i rectific. ℥ij.

Vini ℥℞.

Digere ☿ 8. (8.) postea destilla in ☿ per gradus Aufer phlegma in MB lento.

N. Eodem modo extrahitur oleum ex Sulph. ☿ij Orato; produ liquor crassus, qui extrahendus aliquoties affusores. V quo rursus ad mellaginem separato, en
demum

demum per \oslash pellenda in oleum.

Dosis à g. 8. ad \mathfrak{ss} . in morbis fluidis.

Cl. D. D. Ioh. C. Fausf.

8. Oleum Antimonij Saccharatum Basilij.

Rx. Vitæ. \mathfrak{z} lævigat. affunde agrestam, digere aliquot \mathfrak{z} , dein (abstracta agresta ad siccitatem,) admisce sacchari cand. æquali pond. cum modico $\mathfrak{+}$ ti, destilla per \oslash m gradatim, tandem \triangle fortiss. prodibit \mathfrak{z} rubicundum, cum \vee exaltandum.

Vires. Prodest adversus Epilepsiam.

Dosis gut. aliquot. Basilij in curr. triumph.

9. Oleum seu Liqueor \mathfrak{z} mellitus.

Rx. \mathfrak{z} crud. pulv. \mathfrak{ss} . Mell. opt. \mathfrak{ss} . iij. Bulliant. simul, moveanturque spatula, usque dum substantia aquosa mellis evaporaverit, & remanserit materia quædam nigra. instar picis, quæ digitis friari queat. Hanc destilla per \oslash m \triangle nudo gradatim, in excip. amplum, hor. 24. & prodibit liqueor imprægnatus facultatibus antimonij, cum aliquot floribus à liquore separandis.

Vires. Liqueor iste est corrosivus & penetrans, summo opere mundificativus præfertim in ulceribus, absorbet enim excrementas, &c. Adversus gangranas præstantissimum quoq; existit remedium. Vt eo possumus aut solo aut commixto melli rosato, unguentis, pulveribus ∇ , &c. Sala de \mathfrak{z} .

N. Liqueor hic $\mathfrak{+}$ Philosophici vices supplere poterit, in præparatione Tinctura Antimonij \mathfrak{z} ωφιδ \mathfrak{z} dicta

10. Aliud Magist. \mathfrak{z} ij.

Rx. \mathfrak{z} opt. \mathfrak{ss} . \mathfrak{ss} . O. ust. \mathfrak{z} iv. Bol. arm. \mathfrak{ss} . \mathfrak{ss} . Sal. Com. \mathfrak{ss} . \mathfrak{ss} . omnia seorsim trita misceantur, destillanturque \triangle nudo. Sic prodibit primò phlegma, secundo \mathfrak{z} albicans. tertio \mathfrak{z} rubescens. Siquid collo adhæreat glaciei instar, admove cautè ferrum candens, ut solvatur. Rectifica per \oslash m: In rectificato hoc \mathfrak{z} o solve \mathfrak{z} foliatum: Solutioni postmodum affundes \vee circulabisque sept. 6. circiter, & subsident feces, à quibus decanta \vee , cui si affuderis ∇ destillatam præcipitabitur \mathfrak{z} albus, edulcorandus & reservandus. Dicitur Magisterium Antimonij.

Vires. Purgat suaviter per vomitum.

Dosis g. 3. Kesl. 1. c. 68.

N. 1. Pulvis ille correctus cum \mathfrak{z} Sal. Com. evadit sudorificus: vide infra Tincturam Regulo \mathfrak{z} , N. 13.

N. 2. Magisterium hoc \mathfrak{z} ij Kesleri nil est aliud quam \mathfrak{z} us vite ex butyro. Ita Hartmannus in Croll. parat. ex floribus albis \mathfrak{z} \mathfrak{z} Sal. Com. \mathfrak{z} Glaub. in secunda parte p. 92. aliud concinnat ex Sal. Com. \mathfrak{z} \mathfrak{z} lo. Hi omnes modi in unum recidunt certo experimento.

11. Oleum Antimonij glaciale, ex \mathfrak{z} \mathfrak{z} 10.

Vide in destillat. \mathfrak{z} ij.

Q99 3

12. Aliud

12. Aliud Oleum Antimonii glaciale, seu Butyrum ζ ij, & exinde Antidotus

$\pi\omicron\lambda\upsilon\chi\eta\varsigma$ ζ ij.

\mathcal{R} . Reguli \odot stellat. $\text{lb. i. } \mathcal{L}$ r. lb. iij. M. exactè destilla per \mathcal{O} m, (vide in destillatione \mathcal{R} ij.) \odot glaciale destillatum rectifica una ac altera destillatione, feces semper rejiciendo. Hinc affunde \mathcal{M} hydromelitis vinosi, cohobaque, ut tandem crebris istis cohobationibus \odot illud dulcescat. Tandem abstrahere ∇ ad consistentiam \odot i.

Vires. \odot hoc exquisitissimum, ac pretiosissimum est Remedium, multis curandis agnitudinibus, iisq. gravissimis aptissimum. Quin & domitor est februm tertianarum, quotidianarum ac in primis quartanarum. Blande enim vomitum multis concitat, aliis alvi solutionem citra vomitum, eamque vim habet, ut radices & seminaria mali prorsus eruncet & evellat.

N. \mathcal{M} hydromelitis vinosi separatus, si vitriolica aciditate (\mathcal{M} ζ i) impregnetur, summum est diaphoreticum, & longè ab aliis vulgaribus aliud.

Dosis cochl. f. vel r. per se vel in liquore conveniente. Querc. in Tetr.

13. Aliud Oleum Antimonij Crystallinum ex floribus.

\mathcal{R} . Flores antimonii, ∇ is, (ex \mathcal{O} ad flaved. calcinato & Sal. Com. an. lb. iij. argillæ lb. vel vi.) dephlegmato à M. & destilla in MB, sic tantum prodit phlegma, & sique cum floribus coeunt. Affunde novam ∇ arque

denuo evoca, idque repete, donec flores nihil spirituum amplius retinere queant. Tunc destilla per \mathcal{O} m primo excipiendo seorsim humiditatem aqueam, dein mutato Excipulo \odot albicans, ac ponderosum, instar butyri antimonii relicto ∇ inutili.

Vires. Idem ferè est cum butyro Antimonii: Inservit solutioni \odot is, & est basis precipitatis purgantis, ut & vomitorii. Hartm. in Croll. p. 224. Sennert. Instit. l. 1. p. 3. f. 3. c. 17.

Nimirum.

Rectificatur oleum hoc per Retortam: hinc duplex inde paratur precipitatum, alterum $\alpha\pi\epsilon\kappa\alpha\ \kappa\alpha\lambda\omega$, alterum $\kappa\alpha\tau\omega$ solum purgans: prius fit; oleum id instillando in \mathcal{S} ∇ m pulv. pulveremq; ab acrimonia sua lotionis beneficio liberando: posterius fit oleum id cum an. ol. Tart. p. d. mixtum (\mathcal{O} 2.) repouendo & hinc similiter flores edulcorando.

Dosis à g. i. ad 4.

14. Oleum Antimonii compositum ad Vulnera.

\mathcal{R} . Antimonii Sulph. an. p. ij. * vel Sal. Com. \square p. i. Ψ p. iv. destilla Δ forticum tribus cohobiis, quod sublimatum erit, semper ∇ reddendo.

Vires. Mundificat optimè vulnera inveterata. Basil.

15. Aliud Oleum.

Fit ejusdem qualitatis \odot , si \mathcal{S} cum \mathcal{M} Sal. Com. imbibetis, ac postea destillaveris, Tentzelius.

16. Ali-

16. *Aliud, Balsamus Antimonij dictum.*

R. ꝯ lb. ij. Sal. Com. Tart lb. ꝯ. Sal. Nit. ꝯiv. Fluant in ꝯ forti, effundanturque in tabulam lapideam.

R. Massam hanc & ꝯ ꝯij. misce & affunde ꝯm terebinth. ad eminent. 4. Digit. Digere vase clauso ꝯ ꝯ aliquot, sic ꝯ Terebinth. rubro colore tingetur. Postea adde filices contusos ad spissitudinem aliquam, destillaque per ꝯm.

NB. Ubi guttae flavæ apparere incipiunt, muta receptaculum, & auge ꝯ atque extillabit ꝯ rubrum. *Sennert.*

Vires. *Magnarum est virium in diurnis ulceribus.*

N. Vide etiam Balsamum Antimonij Reguli. In *Tincturis ex Regulo*, 17. *Balsamus Vulnerarius*

Basil.

R. ꝯ. opt. lb. i. Salis Communis vel ꝯ lb. ꝯ. Argil. lb. vi. M. & destilla ꝯ fort. per ꝯm, & prodibit tandem ꝯ quod dephlegma ad remanentiam ꝯ veris rubei, hunc solve per deliq.

Vires *Summarum est virium ꝯ arcanum summum in vulneribus inveteratis.* Basil. in C. *Triumph.* vide etiam *Balsamum Reguli in Tincturis.*

N. 1. *Keslerus.*

R. Antimonij ꝯ, (vel Sal. Com.) ana. ꝯ ust. lb. ꝯ. destillaque sine argilla.

Alii.

R. Solum ꝯ & ꝯ, (sine ꝯ & ar-

gilla) vel Sal. Nit. *Vide Basil. in repetit. lapid.*

Alij.

R. Antimonij, partj i. Sal. Com. p.

1. Bol. armen. p. ij.

N. 2. *Processus est plurimum (3.) dierum, instituendaque est destillatio per gradus.*

N. 3. ꝯ hoc precipitari potest cum ꝯ. *Præcipitatum elotum exhibetur, à g. 3. ad 6.*

18. *ex Regulo.*

1. Figatur Regulus, [quod fieri potest multoties iteratis sublimationibus, sive in ovo Philosophico id fiat, sive in cucurbita, quotidie scil. id quod sublimatum est ad fundum detrudendo.]

2. Regulus fixus ponatur aliquamdiu (ꝯ 6.) in cellam ut solvatur, ꝯ illud filtra & coagula ad spissitudinem. Hinc repone iterum ad liquefendum, filtra coagula ac solve iterum ac cum triplo Tripolæ mixtum destilla per ꝯm. Sic primo prodit ꝯ albus, dein rubeus: rectifica.

Vires. *In febribus omnibus intermittibus, ut ꝯ in quartana virium est summarum, mundificat ac sanguinem per diaphoresin, atterit calculum Renum ꝯ Vesicae, materiam Podagricum discutit, dolores vel extrinsecus applicatum lenit. Dosis à g. 3. ad 5.*

19. *Aqua Antipileptica ex Croco Metall. Quercet.*

R. Croc. Metall. misce cum cru-

sta

sta panis pulverisata, ac elice ∇ m per cornutam ad Δ m satis magnum.

Vires. Hanc pluri facit *Quercetanus* in Epilepsia, quam reliquas suas Antiepilepticas omnes è vegetabilium familia desumptas.

Ego huic labori ζ ac ρ 3. integras frustra impendi, primò exivit phlegma, secundò \sim nebulosi prodierunt, tertio striz seu \odot rubicundum, omnia autem in parva quantitate.

20. ∇ Stimmi Sulphurea. Clyffus alias.

\mathcal{R} . ζ elect Sal. Nit. pur. Sulph. pur. à (lb. i.) propellantur per \odot m, in ventris capacitate superiori tabulatam, in receptaculum amplum ac capaciss. rostro firmiter annexum, in quo infusa sit aliquota ∇ x pars: Injice materiam sensim per vices, tubulumque propedem obtura, videbis materiam injectam paulo post incendi, receptaculumque nebulosis vaporibus repleri, quibus sensim ∇ x illi comixtis receptaculum pellucidum redditur, quo apparente, injice iterum, &c. ∇ m spiritibus destillatis imprægnatam filtra, vel si placeat, & adustionem sapiat à phlegmate in MB libera. Glauberus \mathcal{R} . ζ lbj. \odot lbij. Sulph. ζ iij.

Vires. Crassam Tartareamque mulaginem ubicunque locorum delitescat in corpore attenuat, ac per emunctoria convenientia expurgat, per alvum scilicet, per \square m, per sudorem, per salivationem: Unde utilissimum Medicamentum audit in obstr. Epatis, Lie-

nis Mesenterii, Uteri, in affectu Hypochondriaco, Colico, & simil. præferum scum Crystallis ζ i acuatur. Miscetur, cum ∇ font. vel alio liquore convenienti, ad gratam aciditatem, bibiturque pro libitu.

21. Aqua Stimmi Tartarea.

Fiteodem modo ex ζ . Tart. & Sal. Com. an. quibus si aliquid Sulphuris admiscetur, melius destillatio procedit.

Vires. Prodest itidem in obstruccionibus, maxime autem expellit per sudorem materiam in habitum corporis delitescentem.

N. 1. In utriusque ∇ x destillatione colligi possunt flores quia Sulphure per sublimationem liberati in usum venire quoque possunt.

N. 2. Ex \odot fit ζ diaphoreticum, si semel ac iterum cum Sal. nit. ana calcinetur & dulcoretur, vel ex eodem Sulph. auratum extrahi potest, si cum lixivio forti coquatur. Vide Sulphur. Antimonis.

22. Spiritus ζ ij compositus S. Closs.

\mathcal{R} . Sulphuris ζ alis (Clossæan. vid. infra) part. 1. colchotaris \odot sip. ij. M. & ter aut quater aceto perfunde destillando cum cohobio. Tandem ultima vice repone pulveris in amphoram terream tabulatam (vitrea enim disrumpentur) cum Recip. amplo, urge Δ in reverberio clauso spacio tridui integri, ut fieri solet in destillando \odot li & spiritum ab \odot separa atque rectifica.

Vires.

Vires. Inservit utrumque figendo ☿ & ♀.

IV. LIQVATIO.

Liquor seu Balsamus ex scoris Regulis.

℞. Scorias Reguli, (sive simplicis; sive compositi,) expone aëri humido, sic solventur propter Salia Tart. & Sal. nit. admista.

Vires. In Chirurgia usus est insignis, praesertim in fistulis & ulceribus scabundis.

2. Liquor ex Sale vitri Antimonij.

Fit si id in albumine ovi ad duritiem cocti, vel Raphano, vel Bryonia excavata in cella resolvatur.

Vires. Liquor hic assumptus intrinsecus Quartanam, Podagricas defluxiones, & Paroxysmos efficaciter compeſcit: In Chirurgia, vulnera, fistulas absque mordacitate tamen à putredine conservat & sanat.

Dosis ʒ℞. ad ʒi.

V. EXTRACTIO.

Unde

SULPHURA & TINCTURÆ.

SULPHURA sunt Extracta crassiora.

TINCTURÆ sunt Extracta magis elaborata.

DE SULPHURIBUS.

Sulphura hæc extrahuntur ut plurimum cum lixivio forti, vel & cum ☿. Bas. p. 218.

Lixivium forte ad Extract.

1. ℞. Sal. com. Tart. ♀ & Sal. com. ust. ana. F. lixivium filtratione clarificandum.

2. ℞. E. clavell. ♀. & E. comm. F. lixiv.

3. ℞. ♀ lb. ▽. lb. xv. F. lixiv.

1. Sulph. ex Minera Antimonij, vel ☿ crudo.

℞. Minera ☿ lb. iij. v. & c. vel in defectu minera.

℞. ☿. crud. tere minutiss. & superfundelxiv. forte, (ex ♀ & ▽) digere 6, vel 7. ut fiat Extractio: Extractionem filtra, & leniter bulliendo reduce in ʒverem rubeum. Hartman. in pract. Kesl. 2. c. 18.

N. Si experiri volueris, an aliquid Sulph. supersit in materia, transfunde nonnihil extractionis in vas aliud, instillaque ☿ sic precipitabitur Sulph. ad fundum.

Vires. Inservit extrahenda tinctura, purgat item supra & infra.

Dosis g. 2. 3. 4. 5.

2. Aliter.

℞. ☿ pulver. p. f. coque in lixivio forti, præcipitaque ▽ pluviali (imprægnata ☿ hinc edulcora.

Vires. Tutius agit per vomitum quam crocus Metallorum.

Dosis g. 3. 4. 5. Beguin. & Quercetan.

R r r

3. Nix

Nix Diaphoretica § ij
S. Cloff.

℞ Sulph. § ii hujus descript. vel Sulph. aurati diaphoret. § j. Ol. Oli § ij. M. in ℞, fiet massa nigra ut pix, fermentetur per noctem, postea per reverberatorium exhibet aqua acidula & in fundo manebit pulvis albus excellens Diaphoreticum, valet etiam ad vermes, cum pomata vero sequenti fit inde Cosmeticum præstans hoc modo.

℞. Axung. porci lb. j. Exvi vervec. circarenes colle. lb. ij.

Ireos flor. § iv.

Garyoph.

Coriandr.

Benzoin.

Styrac. calam.

Calam. aromat. an. § ij.

Florum lavend. quart. vi.

Bull. cum rasur. pomorum curtū pendul. cum pellic. lb. j.

Aq. ros lb. iij. in MB per horas xii. in vase vitreo.

Colentur in vas vitreatum ubi refixerint, aqua & feces diligenter amoveantur, cum calore miti iterum liquecat, effundatur in mortarium calens, ubi tamdiu agitetur, donec in Pomatam albam, levem & boni odoris (addito moscho) abierit, cujus singulis uncis immiscebis § ii Cosmetici § j.

3. *Sulph. ex § calcinato.*

℞. Antimonii, Tart. ā, mixtaliquefiant ad Δ postea effunde in ollam

plenam ∇ calida, stentque per 8 m, dein decanta ac præcipita Sulph. instillatione § i, vel sola coctione adhibita.

N. 1. *Alij fundunt solum §, idq sum effundunt dicto modo in ✕ acerrimum, vel in Sal. nit. acuatum: Hinc decantant, præcipitatumq. § e rem colligunt.*

N. 2. *Nisi me felicior fueris, nihil efficies, cum nihil sit quod Sulph. § ij foras attrahat.*

Alij.

℞. 8 p. i. fundunt, fusoque injiciunt antimonii p. ij. atque dicto modo effundunt in ✕.

4. *Aliter.*

℞. Antimonii p. ij. scor. 8 (Hammerschlag) p. i. & Sulph. ā. M. & injice sensim super Sal. nit. & Tart. ad Δ fluentia, hinc fluent simul optimè, dein extrahe Sulph. coquendo in lixivio forti, præcipitaque instillatione ✕.

Vires. *Purgat per alvum.*

Dosis g. 4. 5. 6. 7. 8.

5. *Sulph. ex Croco Metallorum.*

Fiteodem modo: Hepar scil. antimonii coquatur in lixivio forti, vel sola ∇, (ut in edulcoratione Croci Metallor.)

6. *Aliter.*

℞. § & Tart. pulveratorum an. lb. iij. camententur per 4. aut 5. horas, vase probè incandescente, quod tandem projicies in mensur. 2. aceti & per horam unam aut alteram ebullire fines, cola ✕, & coagula in pulverem.

Ex S. Cloff.

7. *Sulph.*

7. *Sulph. ex scoris Reguli: Sulph. auratum Antimonii.*

℞. Scorias à Regulo separatas, easque coque in lixivium, trajiceque per chartam, colaturæ insperge ✕, & præcipitabitur Sulph. auratum antimonii, quod decantato lixivio edulcorandum.

Vires. Movet vomitum, ac interdum secessum.

Dosis g. vj.

8. *Sulph. ex Regulo Antimonii Zali.*

Fiat Hepar ex Regulo Zali & Sal. nit. Hoc Hepar sine ablutione coque in lixivio forti, ut abstrahatur Sulph. decanta & præcipita instillatione ✕.

Quercet. in Tetrad.

9. *Aliud.*

2. ℞. ♂ crud. per ℞ præcipitatum & edulcoratum, coque bulliendo in lixivio Tart. decantaque, lixivium tinctum evaporet, sic remanebit in fundo Sulph. antimonii cum Sal. com. Tart. sublima illud Sulph. addito sabulo, & sublimabitur Sulph. antimonii purum. *Sala de ♂.*

10. *Sulph. ex Cinnabari Antimonii, Sulph. Antimonii verum.*

Cinnabaris antimonii pulverisat. coquatur ebulliendo in lixivio fortissimo, (ex cineribus clavell. & Ψ ā, vel ex Sal. com. Tart. & Sal. nit. Ψ ā,) per 8. 3. vel 4. Decantetur dein lixivium à ♀ vivo, qui currit in fundo, filtreturque, hinc reponatur, ut Sulph. subsideat coloris rubei, quod à lixivio se-

paratum edulcoretur sæpius ∇ a commun. calida; dein leni calore exiccetur, habes Sulph. antimonii genuinum.

Hinc paratur.

Panacea Sulph. Antimonii veri.

1. ℞. Sulph. jam descript.

Regul. antimonii an. ʒj.

♂ Sulph. per C. vel ♂ ♂ rectificatiss. ʒiij.

Digere per aliquod ♂ (8.) in loco calido, deinde destilla ex ♂ per ∇ vitream, ter ad minimum cohobando; urge postremo Δ e quarti gradus 8 12. & erit totaliter fixum, quod exime & cum ∇ rosar. lava & exicca.

N. Præstat materiam ∇ fracta exemptam sub regula 8 5. 6. revertere.

℞. Hujus pulver. ʒj.

2. Mag. vel Sal. com. Coral. ʒij. M. exacte.

Vires. Est instar panacæ: habet nimirum in se vim diaphoreticam ac sanguinem mundificandi, ideoq; quibuscumque morbis per sudorem sanabilibus inservire potest, præcipue Lui venereæ, scditiq; cutis. Repetenda est Dosis sæpius in quibuscumque morbis, præsertim vero in Epidem. & malignitatem aliquam secum vehentibus.

Dosis à gr. 10. ad 15. & 20.

Hartman. in Croll. in præct. Agricola de ♂.

DE TINCTURIS.

De Tincturis ♂ ii notare in genere expedit, quod monente Basilio, ✕ in

Rrr 2

priori

priori extractione adhibitum, \sim purgantes figat (ita ut per \square m sudores & ptyalismum duntaxat operentur, etiam si postmodum per ∇ extrahantur,) & contra ∇ vim in eadem dejectori-
am augeat. *Basil.*

Tinctura antimonii nihil aliud est, quam portio aliqua antimonii, idoneo menstruo soluta & exaltata, eaque potissimum sub colore rubeo.

Absolvitur Tinctura preparatio ple-
rumque duabus operationibus: Ex-
tractione scil. & Exaltatione. Hæc ferè
non nisi ∇ perficitur, illa potissimum
 \times , quod plerumque acuitur aliquo
 \sim u acido.

1. Tinctura ex g crudo.

R . 1. g pulv. extrahe Tincturam
rubicundam s. a. cum \sim u g i Philo-
soph. digerendo in F bus, hinc decan-
ta, decantatas Tincturas confunde, ab-
straheque \sim m g i in MBI . Δ . donec
guttae flavescent.

2. Tincturae in fundo remanenti
affunde ∇ m. rectificatum, extrahe-
que ∇ i. Δ MB , donec iidem gut-
tae flavescent. Tunc mutato recipi-
ente, igne fortiori propelle Tinctu-
ram.

Vires. *Balsamum mirum est, quo uti
possumus ad vulnera curanda, tam inter-
na, quam externa movet sudorem, non-
nunquam etiam secessum & vomitum:
emendat Symptomata veneni, Lepra. Fa-
ber Monst.*

Alii pro menstruo utuntur ∇ , ex
 g Viridi. Aëris & O plumos.

2. Alia, Balsamus vite Ba-
silij.

R . g crud. q. v. extrahe Tinctu-
ram rubic. cum \times radicato, digeren-
do per \square m, filtraturam digere iterum
per \square m, & nigrescet. Abstrahe \times ad
ficcitatem, edulcora & circula cum
 ∇ opt. ad eminen. 3. vel 4. digit. per
 \square m unum ac alterum, vase clauso: de-
cantata dein & destilla ex F ce, & prodi-
bit ∇ imprægnatus Tinctura antimo-
nii: circula o p 10. circiter, & subsi-
debit Tinctura, quam per Tritorium à
 ∇ separa.

N . Candefac primum g : hinc in-
jice in \times .

Vires. *Summarum est virium, mun-
dificat sanguinem; curat Morphaam,
scabiem, exsilarat spiritus.*

3. Aliter.

R . g crudi q. v. extrahe Tinctu-
ram rubic. cum \times antimonii digere-
ndo aliquamdiu, decanta, abstra-
heque \times & pelle Tincturam per XX
ex g .

Vires. *Summè prodest in Morphaa
L. V. & c. Basil.*

4. Alia, Manna Antimonij
dicta.

R . Antimonij pulveris. extrahe Tinctu-
ram cum \sim u antimonij essentific-
cato: filtra ac abstrahe. Hinc digere
cum ∇ ac abstrahe:

\sim antimonij essentificatus prapa-
retur ex Magnesia, acuatque nativo
suo sale.

Integrum equidem adscripsissem Processum, verum cum id forsitan Dn. D. Paulo Keller, cui illum acceptum fero, ingratum foret, descriptionem quam dedi, eamq; vel Tyroni Chymia satis perspicuam, aequi bonique consule.

Ex ☿ calcinatio.

5. Tinctura ex vitro Antimonij, Magisterium Antimonij Sala: ☿ vitri Antimonij Basil.

R. Vitri. ☿ 3℔. lavigato, affunde ✕ acerrimum, vel acuatam ☿ u Sal. com. (alias in cassum laboraveris,) ad eminent. 2. aut 3. digit. digere in ☿ calore, qui manu absque adustione tolerari possit ☿ 2 30. circiter) quotidie semel aut bis agitando, &c. Tinctum liquorem decanta & abstrahere ✕ ad coagulationem usque subfuscā & acrem, (ad siccitatem ☿ eris, Basilus.) Hæc exposita Aetri dissolvitur in liquorem, qui vitreo vase probe obturato servetur, ne liquefeat & evaporet. Sala, Tholb. in Halograph. pag. 196.

Huic affunde V ac extrahe iterum, decanta à fecibus, tandemque V abstrahere. Dicitur Alexiterium antimoniale. Basilus in Curr. Triumph. qui ☿ erem ante V affusionem edulcorat V de stillatæ iteratis abstrationibus.

N. Hæc Tinctura quandoquidem difficulter retineri queat, quin liqueat, paratur exinde Bezoardicum quod.

R. ☿ hujus antimonialis, ad mel-

lis consistentiam inspissari 3j. C.C. ust. præparat. 3j. M. exactè & exicca lentè.

Vires. Utrumque conducit ad obstructions omnes inveteratas Hepatis, Lienis, Pulmonem, &c. Item adversus mensium retentionem, Leucophlegmasiam virginum, Ictericam utramque, Hydropem, Phthisin, Asthma, Pleurisin, Cachexiam, Melanch. Hypochondriacam; Itemque ad ulcera, tam externa, quam interna, Scabies quascunque & pruriginis; Luem ven. Febres pestilentiales, continuas, putridas, &c. Morbillos, variolas: noxia expurgat per sudorem, ☿ m, salivationem: usus ejus continuari potest. Basil. Tentzel.

Dosis Tinctura à g. 3 ad 9. in vino malvat. vel alio liquore. Bezoardici à g. 4. ad 12. &c.

Acetum ad hoc opus idoneum, huc refer ex destillatione +. Eodem modo eadem Tinctura parari potest, si loco ✕ sumatur V ex ☿ Sal. nit. ☿ à ℔. 1. ✕ 3iv. ✕ ℔iij. qua digesta ☿ antur per ☿ m, ut V ☿ si solet. Liquor rectificatur ab æquali pondere Sal. com. Kest. 1. c. 30.

N. Pulvis ille, ante affusionem V albumini ovorum coctorum impositus, in liquorem convertitur, vulneribus recentibus & inveteratis malignisque sanandis utilissimus. Basilus.

6. Alia Tinctura ☿ vitri, ex minera facti.

Extrahe primò cum + proprio, decanta ac abstrahere.

R et 3

Extra-

Extrahe secundò cum Ψ opt. decanta (reje $\text{\textcircled{c}}$ tis fecibus,) ac circula.

N. Si Tincturam hanc per \boxtimes unum ac alterum circulatum $\&$ veris, conseq $\text{\textcircled{c}}$ ueris \odot seu Essentiam Antimonii omnium fere morborum Panaceaam, ex qua lapis ignis.

Dosis gutt. 8. Basil.

7. Alia ex vitro $\&$ ii \odot Ari.

R. Vitri antimonii Solaris, q. v. affunde Ψ rectificatiss. ad eminent, digitorum 4. digere in vase clauso, & extrahetur Tinctura rubicundissima, quam serva, & adhibe sine abstractione.

Vires. Movet sudorem citra vomitum ac nauseam, mundificat sanguinem ab omnibus impuritatibus & seculentis Tart. Salem microcosmicum resolutum (ex quo hydrops) coagulat, & phlegmate noxia ex corpore exterminat, Podagricos juvat, praesertim, si cum arcano Filicis fuerit propinata. Dolores artuum ex Lue Vener. tollit, ut & ipsam Luem Ven. cum decoctis convenientibus; curat ulcera. In Pestis & aliis morbis Epidemicis magnum exhibet solamen.

Dosis à Zij. ad Zij. vel plures.

N. 1. Post Extractionem qua $\&$ \odot fieri serè potest, remanentia denno fundi potest in corpus Solare album. Hartm. in Croll. Kesl. 2. c. 30.

N. 2. Quandoquidem vis dejectoria \boxtimes v. refranatur, non absre foret, primo hanc Tincturam cum \boxtimes (ut in precedenti preparatione) extraxisse.

8. Alia, ex vitro Antimonii solari.

R. Vitri antimonii part. ij. \odot per $\&$ purgat. p. 1. fundantur simul, dein extrahatur Tinctura cum \boxtimes radicato; quo iterum abstracto, circuletur Tinctura cum Ψ per $\&$ \odot (8.) abstrahere vicissim Ψ , ac si placet auctiori Δ Tincturam per \boxtimes propelle depresso-rem, eamque seorsim collige.

Vires. Medicina Diaphoretica est longè excellentissima. Purgat etiam satis promptè si Basilio credimus, addito Extr. Rhabarb. Hartm. Tentzel.

9. Tinctura ex Croco Metallorum Bickeri.

R. Croc. Metall. q. v. extrahe Tincturam s. a. cum \boxtimes acerrimo, decanta tinctos liquores & abstrahere \boxtimes ad spissitudinem mellis.

Vires. Purgat & movet sudorem vehementer.

Dosis à g. 6. ad 12.

N. Ex remanente Antimonio, ex quo Tinctura scil prole $\text{\textcircled{c}}$ ta est fit Sal. com. Antimonij dulce. (vide suo loco.) Hoc Tinctura admixtum, efficacior em reddit. Bicker. in Epist. Clariss. Horst. vide hujus observ. l. 1. s. 1.

10. Alia.

R. Hepar antimonii, (i. e. Crocum Metallorum à Sal. nit. suo nondum edulcoratum,) calcina per gas aliquot. (12.) & evadit pulvis albus, dein expone in cella, ut in liquorem abeat. Ex hoc liquore extrahe Tincturam cum

cum V opt. rectificat. decanta & ab-
strahe.

N. Sal. nit. Partim sponte in cella coa-
gulatur parim quoq; in extractione sub-
sident, ubicunque ergo separa.

Vires. Vires & Dosis eadem cum
precedenti.

N. Tinctura hac est Viri Experien-
tissimi ac benè de Rep. Chymica meriti,
Du. August. Weis, Pharmacopai apud
Wormatienses spectatissimi.

11. Alia S. Clossai, quam vocat Oleum
S. y febrifugum & Antiplen-
riticum

℞ Reguli ♂ per speculum ardens
incinerari q. v. Superfundatur ℞ us
℞ li ad extantiam unius digiti, dige-
re per biduum, solutionem inclina, a-
lium ℞ um ℞ li affunde, evacua om-
nes solutiones M. & ex Ephlegma
extrahe, restabit Ol. liquidum quod in
V dissolves, alterâque vice extrahes.

Dosis. gr. 4.

12. Tinctura ex ♂ Tartar-
isato.

℞. ♂ crud. Tart. a misce & calcina
in anemio, donec Tart. penitus combu-
stus sit, elue dein Tart. ∇ calida, ac
extrahe ex ♂ remanente Tincturam f.
cum V: abstrahere V & remanet Tin-
ctura ♂ in fundo. Basil.

N. V abstractus cum Tinctura non
potest iterum misceri, sed supernatat
semper.

13. Rubinus Antimonij ♀ alis.

℞. ♂ elect. Tart. a fundantur simul.

Dein.

℞. Hujus massæ ℞ ij. (potius Regu-
li) ♀ ii opt. purgat. ℞ j. ♂ i ℞ ij. M.
diligenter, digeranturque l. calore, do-
nec siccescant: Dein extrahe s.a. Tin-
cturam rubicundissimam cum V: de-
canta & abstrahere Vm ad consistentiam
mellis, sic habebis materiam, quæ fri-
gori exposita indurefcit in lapidem in-
star rubini. Clodius.

14. Tinctura ex Regulo ♂ aut ♂
Antidotos Pantagagos.

℞. Calcem Reguli ♂, aut ♂, sol-
ve digerendo aliquot ℞ cum ℞ u
℞ tandemque destilla ∇ fortiss. &
prodit ♂ crassum, cui rectificato af-
funde V, opt. circula, destilla cum co-
hobis tribus, semper feces rejicien-
do. Tandem liquor servetur accura-
tissime.

Vires. Repurgat sanguinem, appe-
titum excitat, viscera corroborat, era-
dicat cachexiam, malanchol. hypochondr.
Iterum, hydropem, idque leniter pur-
gando.

Dosis gutt. aliquot 2. 3. &c. Quercen.
in Tetrad.

Potest etiam in præcipitatum, &
calcem albam, rubram, imò etiam sta-
vam redigi.

Cujus Dosis gr. 3. 4.

15. Alia Balsamus Reguli, &
exinde Tinctura.

℞. Regul. pulver. q. v. vigere in
MB. cum ℞ u Terebinth. & rube-
scet, decanta, abstrahere affunden-
do ∇.

do ▽. (vide Basil. Sulph.) dein solve in
V digere & abstrahe.

Vires. Optimum est remedium in af-
fectibus pulmonū, phthisi, asthmate, tussi,
si frequenter adhibeatur.

Dosis g. 3. 4.

16. Tinctura ex ♂ calcinato cum
Lap. prunella.

R. Lap. prunell. ad porositate[m]
usque per Sulph. depurati, Antimonii
ān. M. & committe igni reverberatorio
♂ (s.) ut ♀bulum semper sit igni-
tum. Ex antimonio hoc edulcorato
extrahe Tincturam s. a. per ✕, hinc
decanta, & abstrahe ✕. Tincturam
remanentem exalta, ut moris, per V
Kesler.

Vires. Purgat per secessum, (potius per
sudorem.

Dosis g. 2. 3. 4.

N. Air in extractione cum ✕ resi-
dua, si dulcoretur, sistit omnes alvi flu-
xus.

Dosis g. 8. 10.

17. Tinctura ex ♂ rubeo
fixo.

R. Antimonii rubei fixi, (vide in
calcin.) q. v. extrahe Tincturam rub.
digerendo cum ✕, decanta & ab-
strahe ad siccitatem. Postea extrahe
cum V similiter procedendo uti
cum ✕.

N. Basilus reverberat materiam an-
tequam secundam extractionem cum V
scil. aggrediatur.

Vires. Summarum est virium in re-
solvendo crure, in rumpendis aposte-

matibus in curanda Lue Ven. &c.

Dosis g. 3. 4. Basil. in curr. Triumph.
Baco de ♂, qui vel pro Panacea ferè ven-
ditur.

18. Tinctura ex Floribus Antimonii
Lilium Paracelsi.

R. Antimonii ✕ an. propellantur
per Om, ut nil nisi feces remaneant.
Ex floribus his optimè edulcoratis, & in
reverberatorio aliquamdiu vase clauso
per colores ad rubedinem reverbera-
tis, extrahe Tincturam s. a. cum V recti-
fic. eamque rursus tandem abstrahe ad
consistentiam olei.

Vires. Medicamentum est restau-
rativum totius corporis, sola humorum
correctione agens, mundificat corpus ho-
minis supra omnia arcana: utile insuper
in obstructionibus Epatis, Hydrops, Morphaa, Lepra, in morbis Liens, uti
Scorbuto, & simil. movet menses, & si Ba-
silio credimus, purgat leniter per alvum,
cum extr. Rhabarb. ac Tinctura Corallo-
rum.

Dosis g. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Paracelsi. l. 2. ma-
gna Chirurg. Basil. in curr. triumph. (vo-
cat Elixir Antimonii,) Hartm. in diss.
Chymico-Medic. 7 thes. 129. Querc. Po-
ter. Sala in Anat. ♂ (qui quoque flores
ruberos obscuros cum ✕ sublimatos aque
efficaces censet, ut & flores reverberatione
ad eundem colorem redactos.

19. Aliter, Arcanum Antimo-
nii Basil.

R. Flores illos edulcoratos (etiam
nondum reverberatos) affunde ~

⊕i

⊕ rectific. circula, donec benè uni-
antur: dein propelle simul, ac affunde
V. circulaque subfidentibus fecibus
separatis, Tincturam adhuc semel re-
ctifica.

Vir. s. Confortat ventriculum, noxios
humores consumendo, appetitum excitat,
tollit melanch. hypochondr. suffocationem
uteri, colicam & simil.

Dosis gr. 1. ac altera. Basil.

20. Alster.

Elixir ☉ are ☿ in alias Elestrum.
seu Lili. Parac.

℞. Reguli ♂ii (ex ♂io vitæ cum
pari pondere Tart. & ana Sal. Nit. per
detonationem facti) par em 1. auri
purgati tantundem, fluant simul & pul-
verentur, adde ✱ ci quadropham pon-
dus, sublima toties donec Astrum ♂ii
ascenderit, in fundo autem terra fatua
& inutilis remanserit, elue salledinem
✱ ci & restantes in fundo ☉ & ♂ii flo-
res pone in Ovum Hermeticum in ca-
pella fixatoria, da Δ talem ut in fluo-
rem non adducantur, sed ex flavis citri-
ni, tandem verò ex citrinis castanei co-
loris fiant. Hæc fixatis floribus affun-
ditur ✱ Alkalif. & postmodum V ad
extrahendam Tincturam uti latius tra-
ditur Artic. de Tincturis ♂ii & in An-
tidoto ζωοφιλω Querc.

Vires. Summa Medicina perhibetur
esse in Ictero nigro, podagra, hydrope.

Dosis instar grani coriandri bis in die
ad curationem in Syrupis, ad preserva-
tionem semel in mense.

21. Alia, Basil.

℞. Flor. Antimonii rub. q. v. extra-
he digerendo cum V ac abstrahere.

Vires. Purgat leniter, tollit febres ter-
tianas & quartanas.

Dosis gr. 1. & ij.

22. Alia ex floribus:

Antidotus ζωοφιλω Quercetan.

℞. Flores Antimonii, (nimirum
qui ex Antimonio Ungarico per se ad
albedin. calcinato, cum ✱ sublimati
sunt & edulcorati,) q. v. extrahe cum
✱ Philosophico. Tincturam rubic. sa.
tempore sat longo. Decantatos liquo-
res tinctos destilla ad siccitatem. Ex
pulvere edulcorato extrahe iterum
Tincturam pellucidam cum V vitæ
Coralliorum (— Corall. inflamab.)
tandemque propelle fortissimo igne
per ☿ ☿ rubrum cum ipsa V vitæ,
reserva citra separationem.

Vires. Est verum vite Balsamum,
nunquam satis laudandum. Exhibetur
cum appropriatis, in Epilepsia, Apoplexia,
Paralyti, Pestiferis morbis, Lepra, Mor-
phaa, mundificat totum sanguinem.

Dosis gutta aliquot. Quercet. in Teer.

✱ Philosophicum pro hoc opere vide de
✱.

23. Tinctura ex floribus Antimonii

⊕-latis.

Antidotus Lysippyretos.

℞. Flor. ☿ ⊕-lator. rubicundiss.
Extrahe cum —u ☿ is, deinde
cum vero Hi æthereo —u.

Sss

Vires

Vires. Vera est Antidotus contra febres omnis generis, uti & pestiferas.

Dosis gutt. 4. 5. in liquore convenienti. Quercet. in Tetr.

24. Tinctura ex floribus Reguli
Antidotus parvægens &.

℞. Flores Reguli rub. q. v. reverbera vase clauso vitreo & 3. 4. continuos. Deinde extrahe tincturam s. a. cum ✕ radicato. Decantatos liquores libera à suo menstruo per destillationem. Postea nova fiat extractio cum V. Tandem denuò V ac siccitatem usque abstrahatur.

Vires. Totam sanguinis massam emendat, Morphæam, Lepram, Scrophulas, Luem Ven. persanat: instaurat & auget nativum calorem, visciditates ventriculi absumit, ac corpus omnibus excrementis expedit. Colicis est aptissima medicina, nec non præfocationibus matricis si Reguli & loco, Regulus ꝓ ad parandos flores substituitur. Quercet. in Tetrad.

25. Alia ex floribus Reguli &
præcipitatis.

Antidotus Isochrysos.

℞. Præcipitados fl. Reguli. & ad flaved. reverberatos, extrahe Tincturam cum ✕ Philosophorum s. a. relictis quibusdam fecibus albis in fundo. Menstruo per F separato remanebit in fundo & levissimus rubei coloris, quem reverbera 2. aut 3. Dein affunde M Junip. digere. Sic ferè & convertetur in Tincturam rubicundissimam.

Vires. Admirandarum virtutum est, adeoque ipsi auro potabili equiparanda. Apostemata interna omnia aperit atque curat, sanguinem concretum dissolvit, corruptumque purificat, ad Leporam, Scrophulas, L. Ven. Pestem, infinitosque alios morbos magnum remedium exhibet.

Dosis gutt. 6. 7. 8. 9. 10. Quercetian. in Tetrad.

26. Tinctura ex Ol. Antimonii
Saccharato.

℞. O i illius q. v. affunde ✕ ad eminent. 3. aut 4. digitor. digere ac tandem abstrahe, sic relinquitur Tinctura in fundo rubicundissima. Gluckraht.

N. Kesler. 2. c. 4. extrahit cum V, eumque vicissim abstrahit.

Vires. Purgat per inferiora.

Dosis g 3.

27. Tinctura ex Sulph. Antimonii.

℞. Sulph. ex & crud. (primi modi) q. v. extrahe s. a. cum V non usq; adeo forti. (Alcohol non extrahit) Decanta & destilla cohobationibus 7ies repetitis per XX. Tandem propelle per M vitream ex ☼, addito quoque igne suppressionis, ac prodibit in forma rubicundissima O antimonii dulce: abstrahe V per MB ac remanet in fundo Tinctura.

Vires. Confortativum est summum, movet sudorem, præservat à Podagra.

Dof. g. 1. ad 4. Hartm. in Pract.

N. Operatio hac, quia expertis non successit, aliud eligere menstruum suadeo,

deo vel acnere ✕ addito Sal. Nit.
aut ☉, & simul.

28. *Aliter.*

R. Sulphur ex ☿. (secundi modi,) q. v. extrahe f. a. cum Sal. Com. quo iterum abstracto, digere cum V, eumque denuo vicissim abstrahe.

Vires. Sudorem ciendo contracturam artuum, imprimis ex colica eausatam, feliciter curat.

Dosis gr. ij.

29. *Tinctura ex Sulphure Antimonii Aurato.*

Extrahe cum V, decanta & abstrahe ad consistentiam mellis.

Vires. Sudorem provocat, purgatq; imprimis per alvum absque molestia, non primo, sed tertio demum die.

Dosis g. 4.

30. *Tinctura ex Sulph. Reguli & alii Antidotus Soterios Querc.*

Ex Sulphure dicto edulcorato extrahe tincturam f. a. cum vitriolica hydromelitis vinosi aciditate, alkalifata scil. proprio Salē Com. (i. e. cum ✕ ex melle & dein acuato cum suo Sale,) abstrahe menstruum & circula ad aliquot ☉ cū flagrantē Juniperi Sal. Deinceps per ☉ crebris cohobationibus destillabis, & Sal. Juniperi, separabis, ut restet in fundo Destillatorii liquor suavissimus.

Vires. Omnium affectuum Pulmonum aque salutaris Medicina ac Balsamus utilis in Phthisi Dyspnœa, Asthmate, Pleurisi, Peripneumonia, &c. In summa, saluberrima est Medicina,

quam plurimis, gravissimisque morbis profligandis apta.

Dosis à gutt. 3. ad 6. plures. Querc. in Tetr.

31. *Tinctura ex ☿ Antimonii cum ☉ Antidotus Soterios Querc.*

R. ☉ per ☿ purgat. p. i. ☿ antimonii p. vi. F. āāā. Ex hoc āāāte abluto & purgato extrahe Tincturam pelucidissimam instar rubini f. a. variis cohobationibus cum circulato minore Paracelsi eam exercebis, circulatūque postea separabis, ut Tinctura restet sola.

Vires. Pretiosissimum est donum Dei adversus Pestem, Lepram, Morphaam, & id genus alios morbos gravissimos.

Dosis gutt. 3. 4. 5. ex theriacali. Quercet. in Tetrad.

32. *Tinctura ex ☉ seu Crystallis Antimonii.*

R. ☉ seu Chrystallos antimonii viridiusculos, superfunde ☉ frigidam copiosam, & præcipitabitur ☿ albus, qui reverberatione evadit citrinus ac dein rubeus. Ex hoc extrahe f. a. Tincturam rubicundam cum ✕ Hoc iterum abstracto, reiteratur solutio cum V, quem quoque vicissim tandem abstrahe: Thold. in Halograph.

33. *Tinctura magisteriata Lapis Δis Basilii.*

R. Tincturæ Antimonii, (ex vitro quod è minera factum.) ℥. ij. Sal. com. antimonii. ℥. ij. Misce ac fac coire circulan-

culando cum V, (per ☿ ad minimum,) dein abstrahere in MB V ad siccitatem, & postea fortissimo Δ, elice per ☿ rubicundum, ☿ hoc rectifica iterum MB, ut quarta pars exhalet.

℞. Hujus ☿ i rectificati.

☿ ii antimonialis præcipitati, (scil. per ☿ m ☿ i ☿ is.) an.

Digere in vase H. clauso aliquamdiu, sic solvetur primum præcipitatum, dein unientur omnia, & exhibebunt, ☿ erem rubeum fixum & fusilem.

Vires. Tinctura hac aquipollet viribus ☿ Basil. in C. Triumph.

N. ☿ præparationem habes infra.

VI. INFUSIO.

1. Infusio ☿ crudi.

℞. Antimonii crud. lavigati ℥℥. Δx-℥x vel Vini ℥iij. iv. macerentur per noctem, colenturque.

Vires. Colatura illa purgat supra & infra Poter. in Parmac.

2. Infusio Vitri Antimonii Spenswasser.

℞. Vitri. ☿ ℥j. vel ℥ij. vini generos. lb. iij. vel iv. vitro benè firmiterque cooperulato, aliquamdiu insolantur, donec nempe liquor citrinum colorem induat, postea filtratur liquor, & vicissim in vitro benè clauso, asservetur.

Vires. Datur ad vomitiones cientes, magno cum fructu, præsertim in iis

morbis, qui non aliter quam vomitionibus curari possunt & volunt, quales sunt rufes pleuritides, angina, anorexia, ructus, atque infiniti alii in prima regione ventris hospitantes. Vide & in Vitro. ☿.

Dosis à ℥j. ad ℥v. Haremann. in Crost.

N. Sunt qui frustum vitri ☿. pondere ℥ij. ad ℥℥. sine pulverisatione in Cerevisia vel Vini haustu aliquot ℥as, prout scil. operationem magis vel minus efficacem expetunt, macerant, decantatumque liquorem propinant.

N. 2. Admirandum est in infusione Vitri Antimonii non exauriri ejus vim emeticam, sed pene in infinitum vitrum id posse infundere, ut nihil planè virium vel admodum paucillum decedat. Quinimò, quod idem, si qua imbecillius redditum sit, nova fusione pristinas vires recuperes. Vide Straussii Pulv. Sympather.

3. Alia infusione vitri ☿, quam pro Aqua Benedicta Rulandi habet Brendelius.

℞. Vitri. ☿ (per se sine addit. facti,) ℥j.

Vini generos. vel Malvat. lb. i. vel ad summum lb. iij.

Macerentur in loco non admodum calido, donec cutim contrahat vinum. (Hæc cutis nihil aliud est, quam residua portio Sulph. ☿ calis, à qua oritur illa vehemens vomitio, relicta à calcinatione antimonii,) cute ea per filtrum ab infusione separata & abjecta, longè mitius quam ante hæc, ope-

operationes suas exercet aqua benedicta. Brendel. in Chymia.

4. Infusio Croci Metallorum, Aqua benedicta Querc.

Rx. Croc. Metall. Ungar. ℥j.
Aqua Card. bened. lb. ij. vel iij.
Cinam. ℥ss.

Macera per biduum aut triduum, dein transcola & serua usui.

Dosis ℥ss. aut amplius.

5. Aqua benedicta Rulandi.

Rulandus ∇ suam benedictam ita describit: Crocus noster Metallorum maceratur per 8 m, vel urgente necessitate ebulliat à lentis magnitudine ad pisi quantitatem in ∇ vel Vino, vel Cerevisia, vel ∇ mulla, vel denique in liquore morbo conveniente, de quo capitur post infusionem ab ℥ss. ab ℥ij. colatum deinceps bibitur frigide vel calide.

Verum quis ille Crocus Metallorum Rulandinus sit, ambigitur, de quo vide in Croc. Metall.

Sit ut sit, sufficere tibi potest illa Quercetani, vel si mavis.

Rx. Croc. Metall. (sive vulgaris ille sit, sive Hartmanni) gran. iij. ad ℥ss.

Vini generos. vel Vini malv. vel Hydromel. vel Cerevis. vel convenientis liquoris ab ℥ss. ad ℥ij.

Macerentur & necessitate urgente bulliant, colenturq; per chartam. Nota Valai observ.

Vires. ∇a benedicta utriusque usus

proficius est in dolore capitis, ab impuritate ventriculi, (sæpè enim is accidere solet, in Epilepsia, Pleuritide, Melanch. Hypochondria, Febris, Peste, Arthritide, coagulatione Sanguinis, &c. In quibus omnibus cum liquore appropriato exhibeatur.

Usus præterea ejus insignis est in Clysteribus.

Nimirum.

℥ss. ad ℥j. ebullit in ∇ conveniente vel Vino, colatura admiscetur Juri vel Decocto simplicium mollientium. Optimum Medicamentum est in Colica. Vide Riverium.

Huc

6. ∇ Ophthalmica ex Croco Metall. vide l. 2.

7. Syrupus Vomitivus. V. l. 2. c. 64.

8. Vinum Hippocraticum purgativum. V. l. 2. c. 84.

9. Oxyssaccharum Vomitivum. V. lb. 2. c. 84.

10. Spiritus vite aureus Rulandi.

N. De hoc ∇u, variae Medicorum opiniones: Quercetanus è familia Metallica desumptum illum existimat, in Pharmac. rest. c. 17. Alii nihil aliud esse opinantur quam infusum Trochiscorum Albandal, quod vide in Colocynth. Tenzelius Spiritum Vite aureum à rubro diversum facit, aureum constituens infusum Troch. Albandal: Rubrum verò

ex terra sancta (Antimonii) paratum autumat.

VII. SALIFICATIO.

1. Sal § ii.

℞. §. Ex quo Tinctura prolecta est, five ex Croco metalli, five ex vitro,) calcinetur in fornace figulina & 4. donec in ℞m penitus vertatur. Ex ℞ hoc extrahe Sal. Com. cum ✕ decantaque. Hinc abstrahē ✕ & clarifica solutione ac coagulatione, ut moris iterata.

N. 1. Nisi § primā vice probè calcinatum fuerit, adhuc semel calcinari poterit.

N. 2. Eadem calcinatio absolvi potest, si § cum Sulph. ana misceatur & comburatur, donec Sulph. penitus efflavit.

N. 3. Quinimò ✕ Antimonii super § fufum Sal subdulce elicit.

Vires. Equipollet viribus Sal. Com. ex ☉; mundificat sanguinem, expurgat corpus ab omnibus impuritatibus, curat Luem Ven. prodest in Podagra, rumppit Apostemata, sugat Febres; extrinsecus mundificat ulcera maligna.

Dosis g. 4. Thold. in Halogr. vide etiam observ. Hörst. l. 1. in Epist.

2. Aliter.

℞. Reguli pulv. q. v. præcipita per se, in sublimatorio semper quod sublimatum est, materiæ quæ in fundo est, reddendo. Regulus ita in ℞erem rubrum conversus ponatur in cellam ad liquefendum: liquorem dephlegma aliquantulum, ac reponē ad crystallifandum: Crystallos purifica.

N. Hi Crystallici triplo tripola per ☉m destillati, exhibent primo ☉m album, dein rubrum, quem rectifica in MB vel VB.

Vires. Prodest hic ☉m in febribus, præcipue quartana, atterit calculū vesicae, promouet ☉m, præservat à Podagra, extrinsecus illitus, mundificat ulcera maligna Basil. 3. Aliter.

℞. ☉m ☉i rectificatis. funde super mineram Antimonii, stent in digestionē septimanas aliquot, (6.) sic solvetur § in massam rubiam, teterrimi fætoris. Hanc inde ☉æ, pelleq; igne nudo in receptaculum sat amplum, (uti fit in ☉atione ☉m. ☉i,) sic prodibit primum ☉☉, hinc ☉m antimonii rubeo colore. Receptaculum tandem vesica probe oclusum reponē in cellā & (14.) sic concrefcent Crystalli rubicundi, quos exime & sicca.

N. 1. Aquam residuam rectifica, & habebis ☉m ☉i ut ante.

N. 2. Ex Crystallis his fieri potest ☉m ut ex Sale communi.

Vires. Crystalli hi obstructiones referant, à viscosa ac tartarea mucilagine subortas, purgantque per alvum. Hinc usus præcipui in effectū hypochondriaco, tertiana, pleurefi, & simil.

Dosis g. 4. 5. Agricola.

VIII. MERCURIFICATIO.

☉ Antimonii.

℞. Sal ☉ volat. ✕ Sal. Com. Tart. ā. 3j. M. & affunde ✕ acerrimum, digere vase H. cl. per ☉m, dein destilla in ℞e ad siccitatem: Siccis his salibus adde Tri.

Tripolæ triplum, eliceque Σ per
 Δ forti.

\mathcal{R} . Ergo Regul. levigat. \mathfrak{Z} viii. affun-
 de Σ tuum destillatum, digere \mathfrak{Z} ies
 3. dein abstrahel. Δ phlegma, restan-
 tique materiæ admisce quadruplum li-
 matur. \mathfrak{O} , destillaque Δ fortissimo ex
 Δ in excipulum ∇ a semiplenum ac
 videbis \mathfrak{O} in fundo currentem. *Bas-
 fil. in curru Triumph.*

Ex hoc fit \mathfrak{O} seu Batyrum \mathfrak{O} , de
 quo in \mathfrak{O} to.

N. *Alium modum exhibet Basilius
 in repet. Lap. Phil.*

Nimirum:

\mathfrak{O} macerat aliquam diu in Spir. Sulph.
 imprægnato \ast . Hinc sublimat, subli-
 matumque in sartagine ferrea agitat ad
 acquirendum \mathfrak{O} m.

Alius modus.

\mathcal{R} . ∇ . Pluviz destillatæ cum \ast af-
 funde antimonio crudo pulverisato di-
 gere per \mathfrak{O} (8.) Hinc decanta & eva-
 porare finito, habebisque \mathfrak{O} erem albi-
 cantem dulcem, qui ad Δ m fusus \mathfrak{O} m
 exhibet nobilissimum, nihilque aliud
 est quàm \mathfrak{O} ius antimonii, de quo *Joh.
 Agricola.*

CAPUT XVIII.

De Recrementis Metallicis Naturalibus.

Metallinorum corporum enoda-
 tionem excipit anatomia Recre-
 mentorum Metallicorum.

Duplicis hæc sunt sortis; Naturalia
 & Artificialia.

Naturalia voco, quæ Natura opera-
 trice, dum in gremio terræ Metalla ge-
 nerabantur, ex materia ad generatio-
 nem eorum inidonea, extiterunt.

Talia sunt:

Cobaltum, Chalcitis, Misy, Sory &
 Marcasita, seu Bismuthum.

1. *Cobaltum.*

Cobaltum, cadmia nativa, fossilis,
 metallica, est minerale terreum, colo-
 re ferè nigrum, æris vel argenti parti-
 cept. Germanicè, *Robold/ Mucken-
 pulver* / quia Muscæ ejus gustu peri-
 muntur.

Foditur copiosè haud procul Gos-
 laria.

Vires. *Vi caustica & erodendi pollet
 tanta, ut fossorum manus & pedes exul-
 ceret: adeoque inter Venena recensetur,
 quippe intus haustum animalia quaque
 perimit.*

2. *Chalcitis.*

Chalcitis est minerale simile æri,
 friabile nec lapidosum, Sory tenuius,
 Misy vero crassius, tractu temporis ex
 Sory factum.

3.

Misy est minerale, colore aurum
 imitans, aureisque scintillis dum fran-
 gitur, splendens, natum super chalciti-
 um & ex chalciti, non secus ac ærugo
 nascitur super æs & ex ære.

N. *Misy*

N. *Myfi* est efflorescentia chalcitis.

4. *Sory*.

Sory est minerale lapidosius, & vehementius compactum; crassissimum, friatum scintillas mifeos emittens.

N. *Chalcitis*, *Myfi* & *Sory* mineralia sunt, inter se origine & viribus conjunctissima. Nimirum, ex *Sory* fit *Chalcitis*, ex hac *Myfi*, videatur *Matthiolus* in *Dioscoridem*, qui inter recentiores primus quid illa sint, demonstravit. Verum adhuc dum *Officinis* nostratibus in usum non veniunt, quæ *Chalcitis* loco *Colchotar Theriaca* immiscet, cum tamen genuinum *Myfi*, adeoq; & genuinam *Chalcitin*, monente eodem *Matthiolo*, *Ducatus Brunsvicensis* suppeditet.

Vires. *Adurunt* & *Escaras* efficiunt, attamen & nonnihil quoque adstringunt. Differunt tamen inter se tenuitate & crassitie, *Sory* partium est crassarum, & proin minus penetrat, *Chalcitis* tenuiorum, *Myfi* tenuissimarum.

5. *Marcasita* s. *Bismuthum*.

Marcasita est *metallum* Metallicum, in generatione metalli ex portione aliqua ad generationem Metallum inepta productum, inque corpus minerale albicans, durum ac fragile mutatum. Germanicè *Wismuth* / *Marcasith*.

N. Differt à *Cachymia*, quod illa ex parte magis volatiliori constet, quæ primo scilicet, dum *Metalla* generabantur, se-

questrata fuit, hæc ex portione magis fixa atque ultimo segregata.

Vires. *Recremento* *Respondent*.

Usus rarissimus & non nisi exter-

PRÆPARATIONES ET PRÆPARATA.

I. CALCINATIO.

Unde

Magisterium Marcasite.

R. *Marcasitæ* pulveris. q. v. solve in ∇ . [ex *Sal. nitr.* & *Sal. Com. a.* fact.] præcipitata cum ∇ , præcipitatum edulcora & exicca. *Beguinum*.

Vires. *Confert* ad cutis vitia, *lychenes* scil. *impetigines*, *scabiem* manuum, & simil.

II. DESTILLATIO ET SUBLIMATIO.

Unde

Oleum sive *Liquor*, *Sal* & *Flores Marcasitarum*.

R. *Marcasitæ* crudæ qualis ex fodinis eruitur, q. v. e. gr. lb. x.) pulverisâ maceraque cum *Vino albo* generoso q. f. ρ (3.) hinc deple, atque novum vinum affundendo, iterum macera, toties id repetendo, donec mens. 20. affuderis: Decantationes omnes tandem affunde *Marcasitis* ac destilla ad siccitatem, hinc obtura rostrum alembici, daque Δ m fortiolem & sublimabuntur *Flores argentei*.

N. Li-

(N. Liqueor fit, si flores argenteos per deliquium in cella solveris.)

Destillatum porro lento calore coque, vel, si \sim appetis, destilla ad remanentiam mensuræ 1. reponeque aliquamdiu. Hinc coque iterum ad medietatem circiter, reponeque ad crystallisandum.

N. Crystallisationem promovere potes imponendo stramina.

Vires. *Utrumq; & & sal magnarum sunt virium in ulceribus cancris, fistulis, aliisque affectibus malignis, Paracels. l. de 5. essentia metallorum.*

Aqua Marcasita.

R. Miner. Magnesæ, i. e. Bismuthi crudi ignem non experti, q. v. destilla per \sim , & nancisceris ∇ m albam, quam vel tertia vice rectificatam serva.

Vires. Perhibetur extrahere animam auri, relicto corpore albo. Revivificare item dicitur herbam quamcunque aridam, si radice ei imposita maceretur. Quinimo si cum ∇ destillata herba cuiuscunque confundatur, atque cum modico salis ejusdem herbe maceretur, formam herbe ejusdem apparere ajunt. Eadem ∇ cum proprio sale (ex \times o) alcalisata dicitur \odot m ad miraculum usque resolvere. Fides sit penes expertum.

N. Aqua Marcasita clauso vase asservata, novilunio dicitur augeri, plenilunio e contra imminui. Andr. Orthelius in Lumine suo Chymico.

III. EXTRACTIO.

Unde

Extractum Marcasita aurea

S. Cloff.

R. Marcas. auri (leucophæa obscuris punctis trajecta optima censetur) pulverisetur & imponatur testæ vitreæ, calcinetur vi Δ hinc & inde materiam radiculâ ferreâ agitando, donec non fumigēt amplius & Sulphur ejus impurum omnino combustum sit, tum per incerniculum agatur, & inde tinctura per aren. destill. alkalifatam proliciat. Evaporato menstruo restabit materia mellita.

Vires. Cum mica panis subigitur, formanturque pilule ad pisi magnitudinem. Detur unica pilula pondere gr. vj. ad repurgandum corpus in febribus intermitentibus.

2. Extractum aliud valdè nobile.

Eadem Marcasita præparata uti dictum M. cum part. xii. cremor. tartar. Bull. in cacabo ferreo cum magnâ quantitate aq. communis, dum tingatur aqua. quæ postea filtranda & evaporanda est ad consistentiam lapæ, & cum ∇ denuò circulanda in Essentiam.

Vires. Serum purgat potentissimè, hydropicos ad miraculum juvat.

S. Cloff.

N. I. Infusio simplex 3j. Marcasit. in 3v. vini albi adhuc fortius hydropicos evacuat instar 8j.

T r

N. 2.

N. 2. Si ex floribus Marcast. vel ex rum vel vitri & ij fit extractio, res feliciter erit successura.

CAPVT XIX.

De Recrementis Metallorum artificialibus.

Recrementa Metallorum artificialia voco, quæ separantur è Metal-
lis, dum in fornace funduntur & pur-
gantur.

Suntque:

1. Cadmia. 2. Diphryges. 3. Lithar-
gyrium. 4. Molybdæna, s. Plumbago,
5. Tutia, s. Pompholyx & Spodium.

I.

CADMIA.

Cadmia { Nativa { metallica, v. Cobaltum.
 { metalli experts, v. Lapis calaminaris.
 { Factitia, de qua hic.

Cadmia factitia est corpus densum,
ex fuligine æris, dum in fornace confi-
citur concretum, adhærens lateribus,
camerisque fornacum, vel & in partem
infimam delabens.

Dicitur *καδμεία*, Arabicè *Climia*, vel
Chlimia.

Triplicis id fit generis, nominibus
à re quam repræsentare videtur sum-
ptis.

Botritem appellant, quæ uvæ speci-
em refert: Ostraticem, quæ testis simi-
lis est: Placitem quæ crustis.

Botritis reperitur in fornacis parte
media: Ostracitis in infima: Placitis in
editiore.

N. 1. Sunt qui Capnitern & Calami-
tem addunt.

Capnitern, quæ in ipso fornacum ore
reperitur, tenuissima, exusta & nimia

tenuitate simili favilla. Verùm hæc à
Pompholyge vix vel parum differre vide-
tur.

Calamitem vocant, figura Calami,
quam à pertica ferrea acquirit. Nimi-
rum decutitur hæc à ferreis perticis, qui-
bus Cadmia, dum assusum iis agitur,
adhærescit.

N. 2. Quin & Cadmia paratur ex Py-
rite Lapide in fornace usso.

Optima est Botritis, densa, modicè
gravis, & in levitatem magis clinans,
racemosa facie, quæ fracta cinerulenta
est. Diosc.

Vires. Leniter desiccatur, abstergit, ul-
ceribus humidis & putrescentibus confert,
eademque ad cicatricem ducit. Adhi-
betur autem Botritis & Placitis imprimis
in affectibus oculorum, reliqua in ulcere-
bus aliis.

PRA-

PRÆPARATA.

1. Tutia (potius Cadmia) præparata Officinarum.

Igniatur & extinguitur cadmia in ▽ rofarum, idque ternâ vice, hinc lavetur ut Pompholyx.

2. Collyrium album Galen.
v. Dispens.

N. Præstat in Collyrio hoc, ut & in aliis loco Cadmia adhibere Pompholygem seu Tutiam. Nec audendi sunt, qui Cadmiam & Tutiam confundunt, Tutiamque faciunt quæ Tutia minus legitime, rectius autem Cadmia species est.

3. Unguentum de Tutia Nicolai.
V. D.4. Emplastrum de lapide calaminari.
V. D.

II.

DIPHRYGES.

Diphryges est genus recrementi metallici, quod subidet, dum in æs fornace fusum ▽ frigida perfunditur.

Vires. Mustam habet facultatem, constringit enim in se quiddam & mediocriter astringens & mediocriter acre; quamobrem ulcerum rebellium optimum medicamentum est.

Usus in officina est rarissimi.

III.

LITHARGYRIUM.

Lithargyros, Lithargyrium Officinis, spumosum excrementum est, è purificatione argenti, quæ per plumbum fit, residuum.

Duo ejus genera communiter sta-

tuuntur, videlicet Lithargyrium argenteum, quod coloris albi, & aureum, quod flavi coloris existit. Verum non nisi coctione differunt, aureumque magis coctum est, quàm argenteum. Germ. Gleet.

N. Nihil aliud est, quàm H.

Vires. Siccat & refrigerat moderatissime adstringit, reprimi, occludit, cava explet, extergit, sarcoticum est.

PRÆPARATIONES.

Præparationes easdem cum H pro re nata tamen suscipit. Unde Medicamenta quoque eadem suppeditat, quorum tamen præcipua sunt.

1. Sal Lithargyrii, Alumen H i Paracelso.

Paratur beneficio ✕, non secus ac Sal H i: decantatur solutio, filtratur ac inspissatur.

Vires. Ex præcedentibus collige, & si libet respice ad Sal H i: Internè exhiberi quoque poterit in diarrhæis, dysenteris, reliquisq; morbis resolutis. Intestina læsa ac ulcerata sanat ac consolidat, sanguinem astuantem refrigerat.

Dosis ʒ℥. cum Theriaca vel alio Ele-ctuario sudorifico sine anodyno.

2. Magisterium.

Præcipitetur solutio cum ☉ tartari.

3. ☉ Lithargyrii rubrum.

R. Sal Lithargyr. Sal. com. decrepitat. ā. M. ac destilla per ☿ m.

Vires. Curat vulnera oculorum, ☿ nigrum inspergitur vulneribus.

Tit 2

4. Ex-

4. *Extractio seu Tinctura Lithargyrii
Therebinthinata, aliàs Balsamus
Lithargyrii Therebinthi-
natus.*

Rx. Sal Lithargyr. ℥ij. — There-
binth. ℥iv. macera in Fibus calidis &
rubescet.

Vires. *Mirarum existit virtutum
in Chirurgia, convenit ulceribus invete-
ratis, ut & tumoribus: curat vulnera,
eadem ab accidentibus preservat, praci-
pue si addatur Camphora ℥B. succur-
rit iidem fistulis, cancro, morphaeis &
aliis.*

2. *Balsamus seu unguen-
tum.*

Rx. † Sale Lythargyrii imprægna-
tum, misce cum ☉ (præstat in morta-
rio plumbeo,) sic coagulatur in lini-
mentum.

Vires. *Confert inflammationibus,
ambustis, podagraque calida, & simil.*

N. Eodem modo fit & Balsamus Hi,
ex † oleo sale Hi imprægnato, & ☉ oliva-
rum.

6. *Liquor.*

Rx. Sal vel magisterium Lithargyrii,
solve per deliquium.

IV.

MOLYBDÆNA seu PLUM-
BAGO.

Molybdæna f. Plumbago duplex
Dioscoridi est: nativa & factitia.

Illam nihil aliud esse videtur, quam la-
pis f. Minera plumbi, seu potius Minera
plumbi & argenti simul.

Factitia est species Lithargyrii, vi-

delicet est illud recrementum quod
in argenti, aurique purificatione cum
plumbo, mineravè plumbi instituta,
fornacis solio concretum & perustum
adhærescit.

Vires. *Similem Lithargyro vim
possidet, ad frigidum paululum recedens,
sed nec abstergentis facultatis est parti-
ceps.*

N. Utraque celerrime funduntur.

V.

TUTIA seu POMPHOLYX &
SPODIUM.

Pompholyx est favilla tenuissima &
volatilis, quæ dum æs in fornacibus per-
ficitur, supernæ earum parti adhære-
scit. Arabicè Tutia. Latine Bulla, Offic.
Nil, vel nihili album, German. Weiß
nicht/ Augen nicht.

N. Coit ibidem in glomusculos velle-
rum similes, contactaque farina modo di-
ssergitur. Eodem modo & Cadmia, vi
ignis violenti in favillam sentutiam redi-
gi potest. Vide Diosc.

Spodium est favilla eadem ob gravi-
tatem in pavementum decedens. Græcè
σποδίου & σποδίου. Latine spodium Græ-
corum Offic. Nil vel nihili gryseum.
Germ. Grau nicht.

N. Dicitur Spodium Græcorum ad
differentiam Spodii Arabum, quod nihil
aliud esse, ait Avicenna l. 2. canon. tra-
ctat. 2. c. 617. quam radicem alcanna
combustam, cuius vires refrigerent & ex-
iccent styptica sint & confortent cor, con-
ferant tremori cordis & syncope ex cho-
lera suborta, &c. Hoc igitur cum nobis
desit,

desit; Officina nostrates, Ebur usum ejus loco vendunt, cen viribus similibus praeditum.

Vires. Pompholyx Medicamentorum propè omnium, quæ citra morsum desiccant, (si loca fuerit,) præstantissimum est, quamobrem ad ulcera cancrofa idonea existit, ut & ad alia omnia maligna. Inditur Collyriis, quæ ad oculorum imponuntur fluxiones, quaque bullas seu pustulas in eis natas curant.

Spodium Græcorum uti specie à Pompholyge non differt, ita & viribus inter se conveniunt.

2. Unguentum nihili ad oculos. *V. Aug.*

3. Aliud ad oculos. *V. Aug.*

4. Diapompholygos Nicolai. Nihili dictum.

De Tutia.

N. Hic recipienda Cadmia.

N. Legitima hæc Pompholyx ac Spodium raro in Officinis nostratibus extant, unde ejus loco Cadmia uti solent, verum opera pretium est, de legitimis comparandis esse sollicitum.

PRÆPARATA.

1. Tutia lota.

R. Pompholygis q. v. indelinteolo modicè raro agitaque in limpida, ut tenuior ac utilior tutiæ pars aquæ immisceatur, & nil in linteolo remaneat, præterquam quod inutile est. Hinc residere permittitur, ac aqua decantatur.

CAPVT XX.

De Salibus in genere.

Salia nihil aliud esse quàm corpora mineralia in ∇ solubilia ac denuò in salinam crystallinamque formam coagulabilia, libro primo dictum est: hoc loco ulteriorem eorum enodationem aggredientes, quatenus ea medicam provinciam subeant, referemus.

Salia quæ medico usui inserviunt, adeoque præparatis inde parandis materiam suppeditare apta sunt, triplicis quidem sunt generis, pro triplici scil. mundi regno, minerali, vegetabili

animali; attamen hoc loco primariò non nisi de mineralibus agere convenit, iisq; nativis solis, ad quorum normam tamen & artificialia; sive è mineralibus, sive vegetabilibus, sive animalibus elixiviata illa fuerint, facillè dirigi poterunt.

De horum Salium origine sic sentio: Macrocosmus non minus ac reliqua duo mundi regna sua sustentatur vivitque nutritione. In hac redundat perittoma salinum, respondens falluginosis excrementis, in animalium

Trt 3

urina

urina, sudore, catharro, & simil. deprehensis. Dictum perittoma macrocosmicum salinum, in globo hoc inferiore congregatum, variam pro varietate matricum inducit speciem, non secus ac excrementum illud salinum in animalibus differens evadit.

Hinc

Sal	{	Commune,
		Gemina,
		Nitri,
		Alumen,
		Ammoniacum,
		Vitriolum.

Quibus & arsenicum addere licet, quod tamen inter Salia & Sulphura ambigit.

Eligenda sunt Salia hæc in genere loco natali celebriora, tum puriora, nitidiora, & si natura ferat crystallina.

PRÆPARATIONES.

Præparationes quibus Salia subjiciuntur, sunt 1. Purificatio. 2. Calcinatio. 3. Destillatio. 4. Sublimatio. 5. Fixatio. 6. Liquatio.

I. PURIFICATIO.

Salia, quia plerumque heterogeneis, scatent, minusque syncera existunt, depurari opus habent. Depurationis hujus modus pro varietate salium varius quoque institui potest. Potissima tamen ratio salium purificandorum consistit in solutione. soluti filtratione, filtrati exhalatione adeoque salis concretione vel crystallisatione.

Solvuntur Salia non nisi in liquore aqueo, (non sulphureo aut pingui, & proin nec in Ψ rectificatiss.) Liqueor hic, nisi specialis accesserit admonitio, adhibetur vulgariter ∇ fontana, in qua sal quodlibet maximè si tepesciat, dissolvitur; dissolutum per chartam trajicitur, ut fecibus in charta relictis syncerum transeat; Hoc postmodum humiditate, ad siccitatem usque abstracta, condensatur, vel s. a. cum aliquota liquoris portione crystallifatur.

II. CALCINATIO.

Calcinantur Salia per ignitionem, idque vel sine, vel cum fusionem: & interdum accedente subindè materia servili, de quibus speciatim in singulis.

III. DESTILLATIO.

Salium destillatio, quia ut plurimum in fixiori graviora sunt, per Ω m peragitur, eamque vel simplicem, vel tubulatam: vitream, vel terream, idque igne tum arenæ, tum nudo; pro fixitate scilicet majore vel minore liquoris eliciendi adhibito.

Per Ω m tubulatam destillatio hoc modo peragitur.

Ad manus habere decet Ω m terream fortem, quæ in superiore ventris sui medietate tubulum habeat foramine pervium, quo materia per vias injici, quodque post injectam materiam obturari firmè possit. Ω m hanc (si lubet loricatam) luto in fornace destillatoria obfirma, ut tubulus emi-

emineat, fumariis tamen uno ac altero relictis. Hinc rostro apponere receptaculum capacissimum, (quia cum impetu irruentes amplum requirunt spatium,) juncturis firmiter luto firmatis. Luto lento exiccato accende primo lentum ignem, hinc fortiozem, ut incandescat. Tum injice materiam paulatim per tubulum, foramenque vel luto, vel bacillo stupha humida circumdato obtura, donec illi impetuosius coagulati [aquæ in receptaculo immixti] sint, receptaculumque clarescat. Hinc iterum injice, obturaque ut dictum. Et sic paratur Clystus.

Vide de huius figuram appositam.



N. 1. Commodum erit aliquotam aqua partem receptaculo infundere, cui scilicet impetuosius illi immisceri, adeoque condensari possint.

N. 2. Salia simpliciora citra fluxum seu fusionem destillari volunt, quæ res inter destillandum vi caloris fundantur, duplum, triplum, &c. vel arena, vel sa-

rina, laterum, vel argilla sicca, humidè commisceri solet, quorum beneficio fusio illa præcaveatur.

IV. SUBLIMATIO.

Sublimatio non nisi Sali ammoniaco peculiariter ac præcipuè competit, ut & arsenico. Flores enim Salis communis uno & eodem destillationis actu acquiruntur.

V. FIXATIO.

Fixantur Salia diversimodè, de quo speciatim suis locis.

VI. LIQVATIO.

Liquari possunt Salia, si vè aëri humido exponantur, vel liquore aqueo aspergantur.

Forma Medicamentorum seu PRÆPARATA.

Salina sunt.

1. Crystalli seu Sal purificatum.

N. Crystalli Salis, si simpliciter præscribantur, nihil aliud denotant, quàm Sal crystallisatione purificatum, sic consuevitur Crystalli Salis nitr. &c.

Excipe Crystallum salis comm. dulces de quibus in Salis cap. sequenti.

2. Sal calcinatum.

3. De- (Phlegma.

stillatum} Spiritus.

unde. } Oleum.

4. Sublimatum. Flores.

5. Fixatum.

6. Liqueor-Balsamus.

CAPUT XXI.

De Sale communi.

SAL commune nihil aliud est quàm salugo ∇ æ salæ, [marinæ scil. vel fontanæ,] quæ salugo humiditatis aqueæ evaporatione inspissata remanet.

Dicitur, Basilio Monacho: nobilessimum ac optimum aroma. Græcè $\alpha\lambda\varsigma$. Arabicè Melich, Melha, Germanicè *Salk/Ruchen-Salk*.

Duplex Salis hujus genus occurrit, marinum scil. & fontanum, utriusque diversæ sunt species.

Primas autem Sal marinum sibi vendicat, ac præcipuè Hispanicum, in cuius tamen defectu satius est sal fontanum, quod ad manus est, in præparationibus nostris recipere, quam aliud Salis genus cum sumptu acquirere.

Inter fontana tamen maxima quoque diversitas est, reliquisque laudem præripere videntur Hallense ac Lunæburgense, quibus tamen haud multum cedit, quod in Patria mea Uffleniæ Westphalorum paratur.

Vires. Calefacit, exiccat, abstergit, dissolvit, purgat, adstringit leniter, consumit superfluitates, peneirat, digerit, aperit, incidit, Venerem stimulat, putredini, venenisque resistit.

Hinc convenit. Internè in cruditatibus ventriculi, appetitum prostrato, ob-

structionibus alvi & urina, colicis doloribus, &c.

Externè, in ulceribus putridis ac serpentibus mundificandis, in tumoribus simplicibus & pestilentialibus discutendis, in combustionum eruptiones extrahenda, in pruritu & scabie exiccanda, in sugillationibus, sanguineque extravasato resolvendo ac discutiendo, in dolore dentium, colico, cephalico, arthritico, & simil. mitigando, in oculorum pterygio absumendo.

N. Ad Salis hujus communis naturam accedunt Salia artificialia, ex vegetabilibus ac animalibus incineratis scil. elicita, unde & iisdem ferè præparationibus subijci queunt.

PRÆPARATIONES.

Præcipue sunt:

1. Purificatio. 2. Calcinatio. 3. Destillatio. 4. Sublimatio.

PURIFICATIO.

Purificatio Salis com. M. fit modo vulgari, solvendo in ∇ ac crystallifando.

N. Si solutio hæc ac crystallisatio aliquoties aliquo modo repetatur, tandem Sal com. dulcescit, Sal sapius.

III. CALCINATIO.

1. Decrepitoria.

Sal calore irritatum crepitare solet.

let. Quare ne crepitando vas destillatorium disrumpat, operæ precium erit, idem decrepitare, i.e. ad Δ m calcinare, donec amplius non creper.

2. *Fusoria.*

Funditur Sal in \times bulo, sine aliquo artificio, Δ e saltem satis forti adhibito.

Aliiter cum Ψ .

\mathcal{R} . Sal. Com. Ψ an misce ac in anemio calcina igne violento, ut concreseat. Hinc extrahe Sal cum ∇ commun. ac coagula.

Vires. *Basilus Sal. Com. hac ratione cum Ψ ter calcinatum.*) singulis vicibus cum nova Ψ anaticè mixtum) adhibet in Tinctura \mathcal{C} conscienda. Vide de \mathcal{C} .

DESTILLATIO.

Destillatio Salis exhibet acidam ∇ , phlegma, sal volatile & spiritum.

Nimirum:

\mathcal{R} . Sal. Com. destilla per se ex \mathcal{O} , primò prodibit ∇ acida seu \mathcal{O} -lata; secundò phlegma, cum quo sal quoque armoniacus, seu volatilis sublimatur. Cessa à destillat. ac reponè \mathcal{O} in loco humido ad attrahendam ∇ m (vel aliquota ∇ æ parte irriga,) dein destilla rursum, sic exhibit \sim acidus. Hoc repete toties, donec torum Sal. Com. in \sim m conversum sit, quem in MB rectifica.

1. *Spiritus Salis, sive oleum Sal. Com. vulgare.*

\mathcal{R} . Salis commun. lb. ij. impasta vel malaxa cum argillæ figulinæ; bolivè armen. lb. iij. ad v. & ultra, inde forma orbiculos, quos ad duritiem exiccatos, impone \mathcal{O} æ terreæ, luto obductæ, vix ad medietatem implendæ: jungatur Recip. satis capax & servatis Δ gradibus, donec phlegma egressum sit, ultimo pelle forti Δ continuando eundem, donec \sim albi prodierint, \sim m hunc rectifica, phlegma, vel in MB abstrahendo, vel si mavis evaporando.

N. 1. *Sit terram sigillatam loco argilla sumpseris, præstantiorem elicies spiritum: Quinimo sal cum triplo arena vel farina laterum, vice argilla misceri potest.*

N. 2. *Quandoquidem in prima destillatione Salis portio minima in \sim m resoluitur, nonnulli \mathcal{O} in ∇ communi coquant, & Sal. Com. inde extractum, ut prius destillant.*

Alii Sal extractum cum \sim u illo priori miscent, aliquamdiu digerunt, & deinde cum bolo & sim. Quando, totam salis substantiam in \sim m transire faciunt. *Croll. Senn. in inst. l. 5. p. 3. c. 5. Beguin. Agricola.*

N. 3. *Impastatur Sal ne fluat, quippe si fluxerit, vix \sim ascendet.*

N. 4. *Alii.*

\mathcal{R} . Oust part. ij. Sal. Com. p. iij. Quantæ, verum \sim m Sal. Com. purum hac latione acquiri non videtur verisimile, imò in examine constat, ejusmodi

Uuu

 \sim vim

vim suam ab O potius obtinere, quam à Sal. Com.

Vires. Diureticus est & Lithontripicus tartareamque mucilaginem potenter resolvit, unde utiliter adhiberi solet in obstructionibus Epatis, Lienis, &c. in Hydrope, lictero. Extinguit sitim mirabiliter, absument corrodingo & sine dolore quicquid in vulneribus aut affectionibus alius putredine corruptum est.

Mixtum cum 88 Terebinth. Cera, Camomill. Verbasco. & sim. dolores podagricos sedat, topicos discutit, &c. Sanat quoque membrorum contracturam ac ariduram.

N. Ad eundem modum eliciuntur & ex salibus artificialibus vegetabilium, quorum vires licet ex plantis suis aliquo modo conjecturari possint, (e. gr. ex sale absynthii elicitur stomachicus, &c.) Attamen vegetabilium in genere omnes sunt acidi, instar Sal. Com. incidunt, resolvunt, &c.

2. Salis compositus.

℞. Sal. Nitr. puriss. & Sal. Com. decrepit. (vel fusi) ā M. cum dupla vel tripla quantitate, [ali qua quadrupla,] argillæ fixæ, & exinde more solito Δ nu-do in provoca.

℞. Hujus ℞. i. Sal. Com. fusi 3iv. digere aliquam diu, ut nimirum Sal. Com. adjectum solvi possit, & prodius per O m destilla. Augebis hac ratione ℞. m & fortiore reddes; quem eodem plane modo, cū novo Sal. Com. fuso, eadem quantitate sumpto; prohibito toties augebis, quoties pla-

euerit. Abstrahere ab hoc ℞. u phlegma, & deinceps eundem rectifica per O m.

Untzer. Agricola.

Vires. Maximarum est virium in Hydrope, intrinsicis & extrinsicis adhibitus, confertitidem in fistulosis vulneribus.

3. Spiritus Sal. Com. viridis.

℞. Fragmenta laterum, indantur ollæ; ignianturque in fornace calcata; ollæ huic alia superposita sit olla, sale aliquatenus adimpleta, quod ubi vi caloris liquefactum fuerit, pertunde fundum ollæ superioris, ut sal fusum in ignita defluat laterum fragmenta, cumq; iisdem misceatur. Ex his igitur Getur per O m ut moris. Sennert. instit.

N. Idem perfici potest, si sale in cella liquifaculo fragmenta laterum ignita imbuantur.

4. Spiritus Sal. com. corallatus.

℞. Sal. Comm. lb. iij. vel iv.

Corallor. tenuiss. tritor. lb. i. M. lavigando super prophyr. postea igne destilla vehementissimo in excipulum capaciss. & ℞. m salis accipies una cum ℞. u corallorum.

N. Addere potes & sabulum, ut fusio impediatur.

Vires. In affectibus cordis, palpiatione & sim. maximarum est virium.

Dosis. ʒss.

5. Spiritus Salis dulcis.

℞. Sal. Com. optimè dephlegmati V opt. ā M. qlentur ter vel quater, sic unientur inseparabiliter & dulcescent.

N. i. Ean-

N.1. Eandem dulcedinem consequi poteris, si vel ∇ , vel \odot Tartari, vel feces vini ab initio Qlationis cum Sal. com. com-miscueris.

N.2. Exuitur quoq; \sim Sal. com. vi corrodente ac velut maturefcit, dulcescit. vè si dephlegmatus vase firmissimè clauso trimestri spatio in ∇ bus continuo atque aquali calore tepentibus [qualis est \odot lis æstivus] digeritur.

Vires. Egregium præservativum est in peste, arcet enim omnem putredinem. Ventrículum cum visceribus reliquis in optima conservat dispositione.

Solvit corallia, &c. quin imo & \odot lis tincturam extrahit. Vide ∇ temperatam Basilii in ∇ l.4. class.2.

Uſus. Cum saccharo cando in formam Electuarii misce, singulisq; diebus jejuno ventriculo assumi poterit Hartm. in præf. loc. de pest. Senn. in hist. Tentz. Gluckrath, &c.

6. Aliter.

R. Sal. fusum, solve in ∇ pluvia destillata, filtra, inspissa, ac repone ad crystallifandum: Chryſtallos hos exemptos vicibusque aliquot, (10:) uti dictum solutos & crystallifatos, (sic dulcescent) imbibe cum ∇ , formaque globulos cum argilla, destillaq; ut moris, est.

Vires. Præter virtutes jam descriptas, insigne exhibet menstruum ex rob. serè omnibus tincturas extrahere idoneum: Insuper Herniam carnosam consumit, si quotidie iter illinatur, maneq; ac

vesperi ejus gutt. ex. assumantur. Agri-cola.

7. \sim Sal. com. dulcis compositus.

R. \sim Sal. com. compositi ac Alcohol Vini à M. ac uni circulando, cohobandoque.

Vires. Adeo resistit sibi, ut Hydropicè usu illius aliquamdiu à sibi liberi reddantur, prodest etiam Ictericis, Lumbricos potenter expellit, extrinsecus lenit podagram, si caute illinatur, imo quicquid de \odot l. spiritu vè Sal. Com. apud Paracelsum, aliosq; modernos Authores legitur, id ipsum huic potissimum adscribendum est.

Dosis g.6. ad \odot l. in vino vel alio Liquore. Harimann. in Croll. Tentzel. Untzer.

8. Spiritus Sal. Com. \odot lati diureticus.

Fit ex leviter calcinati \odot li & Sal. Com. toſti partibus æqualibus cum bolo vel Terra figulinâ globulis confectis, (meo damno expertus \odot lum his non sufficere ad cohibendum fluxum, fixitatemq; materiæ) more vero communi \sim usevocatur, qui postea per rectificationem à phlegmate liberatur.

Dosis gutt. vj. matutino tempore cum brodio decoctionis petrosel. Ex communicatione G. Horstij habuit S. Closs.

8. Spiritus Essentialis.

R. Salis Hallensis ad albedinem calcinati (qui hæc in operâ reliquis præfertur) \mathfrak{z} ij. Imbibatur \odot Sal. Com. mar. vel montan. ad consistentiam pultis liquidioris, fiat clauso vase digestio, quousque \sim us

Uuu 2

cum

eum Sale Comm. calcinato unitus sic-
catusque sit, affunde alium in bibendo
desiccandoque toties, dum sal ulterio-
rem proprii sui --- us incorporatio-
nem recuset, & ex colore aureo odore-
que suavi dignoscas, Q ationis tempus
instare, quam si per O instituas, exi-
bunt fumi albißimi, qui in aquam con-
vertuntur & rectificatione opus ha-
bent.

*Vires. Dicitur ex O tincturam abs-
que corp. dilaceratione allicere. Est insu-
per remedium sistendis in momento vo-
mitibus dicatum E certum, idque indis-
ferenter E in omnibus morbis.*

*Dosis gutt. 3. in Syrupo, juscule vel
vino.*

Ex commun. S. Clossai.

10. Spiritus Salis Comm. dulcis Oem
solvens.

Extinguantur fragmenta laterum
5. aut 6. vicibus in G Sal. Com. postea
destillentur, prodibit --- us subacidus,
qui in volâ O lis folia & margaritas sol-
vere creditur. 2. Flos Salis sive cry-
stalli Sal. Com. dulcescollo O post de-
stillationem affixi, longoque tempore
cum V digesti idem efficiunt. 3. Solus
 --- us sal. com. vi circulationis diutina
caudam suam devorat, id est, acidi-
nem suam innato suo balsamo dulci-
ficat. 4. Idem cum --- u ardente H ni
mixtus aliud menstruum dulce præbet
 O is solutivum. 5. Ex spiritu Roris
Masalis & sale calcinato fit alia aqua
solutiva, dulcificata longâ digestio-
nem & irrotationum serie, quæ Oem

in liquorem volatilem potabilemque
evehit.

Ex Communicatione ejusdem.

11. Crystalli Sal. Com. dulces, seu spiritus
Sal. Com. coagulatus.

F . O terrea, ampla & fortis, quæ in
superiore ventris capacitate fistulam
habeat in medium O æ corpus pone
desinentem. Huic O æ impone Sal
commun. vel quod melius Hispan. seu
marini lb. iij. vel iv. Receptaculum-
que adapta capacissimum, cui si libet
 V m infundere licet; adde Δ per gra-
dus, donec Sal. Com. fluat, tum per
fistulam guttula una vel altera V æ frigi-
dæ immittatur, ut (fistulæ orificio sta-
tim obstructo,) in O spiritum, copia
mediante humiditate elevetur, inque
receptaculum propellatur. Continua
hoc ipsum, donec Sal. Com. in --- m
ferè sit redactum. Dephlegmetur de-
in Q atum, evaporetque humiditas;
reliquum exponatur ad crystallisan-
dum, s. a. sic crystalli colligi possunt Sac-
chari dulcedinem referentes, solubiles-
que per deliquium.

*Vires. Sudorificum est, Hydropico-
rumque sitim non minus --- ac ille salis
dulcis compositus areet; quippe nihil a-
liud est, quam --- Salis coagulatus, unde
quoque essentialem humiditatem, qua
multum in Hydropicis exhauritur, ma-
ximoperè adjuvat, ventriculumque ac
viscerareliqua confortat, malignitatem
in peste, pestilentialibusque febribus po-
tenter discutit.*

Dosis

Dosis gr. ʒ. 6. 7. ad 10.

N. 1. Si ad Sal. Com. exsiccat. lb. j. addideris carbonem pulverisat. lb. ij. optimèque misueris, ex lb. j. Sal. Com. accipies Spiritus lb. j. Hartman. in Croll. Kesler. 4. cent. 79. Agricola.

N. 2. Crystalli hi cum O impragnati nobilissimum exhibent confortativum. Etque, si Crystallorum p. 6. cum O foliat. p. 1. aliquot Gas in ☿ sub tegula reverbantur. Agricola.

N. 3. Keslerus docet ☿ follem adhibere, cujus rei gratia ☿m habere duplicem tubulum oportet, alterum frigida immittenda, alterum folli intromittendo inservientem.

12. Flores Sal. Com.

Quemadmodum in succini destillatione flores, salis volatilis titulo elewantur, parietibusque ac collo ☿ adhærescunt. ita & ☿atione ☿ oleivè salis, tandem Δ is vehementia flores ascendunt, quos collige.

Ufus horum varius est, ad crassum phlegma incidendum, corruptosque humores à putredine vindicandos.

N. 1. Sunt qui cum ☿ sublimant, verum decipiuntur, si flores salis simpliciter inde sibi imaginantur.

N. 2. Funt etiam flores Salis, si in reificatione ☿ ac olei Salis id, quod residuum fuerit, fortiori Δ sublimes.

N. 3. Si ☿latio facta sit cum O, ☿m aëri aliquamdiu expositum, ac iterum ☿ationi subiectum, plus olei ac florum suppediabit, potest hoc aliquoties repeti.

13. Alius ☿ seu ☿ Sal. Com. unde Crystalli dulces.

☿. Sal. Com. marini crebris solutionibus [in ☿ pluvial. vel fontis destillata] filtrationibus & coagulationibus optimè purificati, lb. vi. adjice dissolventis ☿lati & mellisflui ex vegetabili & animali parati, id est, ☿ ex melle facti, q. s. præmissa digestionem destilla gradatim ac cautè, ex ☿ terrea vel vitrea, luto probè munita in receptaculum capacissimum. Sic elicies ☿ aqueos sulphureos ac ☿latos, dulces acidosque, qui firmissimè sal. reconditi inhærent, [gradatim ac cautè ☿atio hæc peragenda est. Oportet enim ut vas incandescat, purpureo tamè non claro colore, ne scil. sal. com. fluat, & in hoc gradu immorari decet ☿ 8.] post ☿ nebulosos, [in quibus primum ens metallorum resolutum est,] exhaustos, tandem ad collum recipientis sublimabitur terra foliata instar nivis albissima, vel etiam flava, [qui ☿ aut sulphur philosophorum nuncupatur.] ☿m destillatum, ut & terram conjunge, abstraheque phlegma solummodo insipidum ☿ calore lentiss. reliquum repone ad crystallisandum s. a. Et hoc repete, donec nulli amplius crystalli concrecant, & id quod extillat aciditatem sapiat. Tunc ab opere desistendum, & in fundo cucurbitæ quærendum verum Sal. Com. ☿ vitriolatum.

Vires. Crystalli hi, etsi sapore dulces, Uuu 3 ad

admiranda tamen sunt virtutis, adeo ut vel per seorsim, vel cum oleo suo debita proportionem permixti, verum sint. Solis menstruum ob dissolvens, quod proprietates ejus ob virtutes vitales, vegetantesque locupletat & exacuit.

14. \odot Sal. Com. rubrum.

R. Sal fulum \times o sufficienter impregnatum, misce cum filicibus grossè contusis & destilla ex \odot per Aren. prodibit primo \sim flavus, postea \odot rubrum.

N. Impregnatio illa fit ut moris.

Nimirum:

Sal. Com. fuso superfunde Acet. destill. & abstrahere per Aren.: iterum superfunde novum Acet. destill. & rursum abstrahere, hoc toties repetendo, donec materia optimè sit putrefacta & nigra.

VI. EXTRACTIO.

Unde

R. Salis calcinati q. v. solve in ∇ still. & coagula, idque repete tantisper, donec Sal purum sine fecibus dulce

reddatur.

Hinc

R. Hujus p. ij. Oult part. i. destilla Δ e nudo paulatim, donec \sim omnes propulsi sint, \sim in hunc rectificatus vicibus aliquot (4.) Dein ex \odot Sal cum ∇ destillata elicito, idque optimè solutionibus ac coagulationibus purificatum calcina in phiola ad rubedinem, (fit spatio \boxtimes .) Huic demum superfunde \sim priorem, digere, & elicies Tinctorum rubicundam, quæ nec recusat per \odot m propelli.

Vires. Sudorificum ac diureticum est insigne, tartareas mucilagines incidit, putredini omnigena resistit, corroborat itaque Balsamum nativum, adeoque usus præcipui est in peste, febribus, hydrope, calculo, (attingit nimirum.) obstructione Epatis, Lienis, &c. Quinimo & sanguinem mundificat, unde maximè prod-est, in cutis pruritu, doloribus arthriticis, & simil.

Dosis à \mathfrak{zj} . ad \mathfrak{zj} .

C A P V T XXII

De Sale fossili, seu Sale Gemma & Indo.

SAL Gemmae salis communis genus est, quod in fodinis lapidum frangitur, specieque Crystallorum splendens eruitur, unde gemmeum, à gemmis ob colorem nuncupatur, dicitur alias Sal fossile. Germ. Steinsalz.

Vires. Hoc est eisdem vires cum

sale commune obtineat, substituique eidem queat, rarioris tamen usus est in praxi Medica; crebrioris in Chymica ubi in solutionibus Metallorum Sali communi antecellit. Commendatur tamen peculiariter Foresti experientia ad stercora dura eliquanda, adeoque ad co-

lica-

lica tormina arcenda intus & extus l.

21. 5.

PRÆPARATIONES.

Omnes præparationes subire aptum est, quas Sal. Com. Attramen præcipua quæ illi in usum veniunt.

Sunt

1. Spiritus Salis gemma, Spiritus & fusibilis & ialis.

Fit eodem modo, quo Sal. Com. Nimirum, & miscetur cum triplo argillæ vel sabuli, &c. Gaturq; per Ann. igne nudo.

2. Balsamus Salis gemma seu Liquor.

℞. & ℥. ij. fluat ad Δ. & postea solvatur in ∇ pluv. destill. Filtratur coaguleturque. Has operationes liquefactionis, scil. solutionis, filtrationis & coagulationis tantisper repete, donec & ad summam subtilitatem

fuerit perductum, quod inde cognoscitur, quando ejus particula ad candelam admota, statim liquecit.

Vires. Arcanum summum est inrupturis, intus & extus adhibitum.

Intra corpus dantur quotidie gutta aliquot 3. 4. 5. cum Extract. consolidæ.

Extus fiat illitus, Harum. in præct.

N. Mentio quoque apud Veteres fit Salis Indi, de quo ambigitur, quid propriè sit. Sunt nimirum, qui contendunt non Salis esse genus, sed Saccharum, salis nomine insignitum (ob similitudinem quam cum sale habeat.) Verum enim verò rectius sentire videntur, qui id peculiare genus salis fossilis faciunt, ejusque loco cum raro vel nunquam in nostras regiones transportetur, Sal gemmeum recipiunt. E.g. in Pilulis de Lapide Lazuli, & simil.

CAPVT XXIII.

De Sale Nitri.

SAL Nitrum est Sal Sulphureum, seu Spho² 15⁰, salso-amarum ex terra pingui excoctum.

N. Etsi præter Nimirum antiquorum quod planè nobis in cognitum est, triplex dari possit. Nimirum 1. Quod ex terra extrahitur. 2. Quod mur. lapideis adhærescit. Et 3. quod scopulis seu rupibus adnascitur. Attramen Officinis nostris, non nisi unum usitatum est. Primum videlicet, idque excoquitur ex terris de-

sertis ac pinguibus, siue pinguedo illa à terra Archaeo sit immissa, siue aliunde introducta. Introducitur enim e.g. urinis atque excrementis animalium ac columbarum.

Chymicis dicitur Cerberus Chymicus, Sal infernalis, Sal Sulphuris, Hermes, Baurach, Algali, Sal Anderonæ, Anatron, Cabalatar, &c. Basilio, Serpens terrenus German. Salpeter // Salniter.

Eli-

Eligendum nitrum est crystallinum, purum. Tantò autem purius censetur, quantò minus salis communis particeps fuerit, participationem hanc experiri licet φλοζώδες.

Nimirum :

Mitte sal nitr. in carbonem ignitum, si omne avolaverit, purum judicatur, & è contra, si aliquid remanserit, quantum remansit, tantum de sale communi participare aestimatur.

Vires. De Nitri qualitatibus primis haut parum controversatur : Sunt enim qui calidum, sunt & qui frigidum id aestiment.

Ceteras Nitri vires quod attinet, vim habet putredini resistendi, sium ac astum comescendi, Tartaream saburram incidendi, coagulatos sanguinis grumos resolvendi, dolores mitigandi, (id quod præcipuè lapidi Prunella adscribitur.)

Hinc

Usus ejus tam internus, quam externus vulgatissimus est.

Interne solvitur in potulentis ac præcipuè in ∇ fontan. (3j. vel ʒiʒ. in mensur. 1.) exhibeturque in febribus ardentibus putridis, præcipuè in febris illa Ungarica dicta, in pleuresi, peripneumonia, in calculo renum & vesicae, in obstructionibus epatis ac mesarai.

N. Ubi alvus nimis laxa fuerit, vel ventriculus debilis, ejus usus non ita proficiuus erit.

Externè communissimus ejus usus est

in inflammatione faucium & Angina (nbi in gargarismis solvi solet:) in topicis anodynus ac refrigerantibus, ubi præcipuè solvitur in liquore, appropriatur & imponitur cum linteo : in combustionibus, ubi simili modo applicatur.

Dosis eadem quæ lapidis Prunella.

PRÆPARATIONES.

Præcipua sunt.

1. Purificatio. 2. Calcinatio ac Fixatio. 3. Destillatio. 4. Extractio.

PURIFICATIO.

Unde

Nitrum crystallisatum, seu crystalli nitri.

Nitrum crystallisatum quando simpliciter præscribitur, nihil aliud intelligi solet, quàm Nitrum sine calcinatione, solâ solutione ac crystallificatione purificatum. Solvitur autem in ∇ communi, crystallisaturque s.a. ut moris.

Depuratio Salis nitr.

Præter eam quæ à Keslero art. 61. centur. 1. describitur, fit quoque, si lb. xv. Sal. nitr. in mensur. unâ aq. comm. solvas in cacabo æneo super ∆ lignorum per dimidiam horam, si probè solutum est, remove ab ∆, & sensim per vices instilla ʒiv. aut circiter ʒi, tege cacabum pluribus linteis, & sine concrecere in diem alteram.

Ex S. Closs.

II. CLA-

II. CALCINATIO

Unde.

10. *Lapis prunella, Nitrum tabulatum, seu preparatum, fixum, anodynum seu crystallum minérale.*

℞. Sal. com. puri q. v. fundatur in ∇ bulo, superinijce aliquid Sulph. puri (melius & flor. Sulph.) quod ubi deflagraverit iterum aliquid Sulph. immitte, idque repete, donec super Sal. nit. ζj . injeceris $\zeta \beta$. ad ζj . & Sal. nit. planè purum fiat, tum effunde; & hic est lapis prunellæ vulgaris.

Nitrum hoc modo præparatum, si quas impuritates contraxit, purificari potest solutione & crystallisatione, ut supra dictum.

N. Præstat ∇m rosarum pro solvente adhibere.

Vires. Vires ac Dosis eadem quæ Nitri, imo quæ supra de Nitro dicta sunt, de lapide hoc prunella potissimum intelligi debent.

N. Dosis, Hartm. in practic. miscet hujus Sal. nit. preparati ζj . cum mensur.

1. Liqueoris seu ∇ a pro potu febricitantium. Ego vix \mathcal{D} . v. transcendendo nimirum aliquantulum debilitat ventriculum, unde & alvi fluxus concitare nonnunquam solet, aliàs à $\zeta \beta$. ad ζj . propinari sine noxa potest, præcipue autem cum Saccharo, quo amaror mitigatur, vide Sennert. Institut. Beguin. lib. 2. c. 11. Quercetan. in Pharmac. rest. & Alexiac. &c.

2. Nitrum fixum, aliud.

℞. Sal. nit. pur. ℔. iij. iv. Ψ . iv. M. & cementa \mathcal{S} s. vel 6. dein extrahe Sal. nit. affundendo ∇m calidam, filtrando & filtraturam inspissando.

N. Prima Crystallisatio Sal. nit. optima censenda est, continet enim nitrum purius & magis inflammabile, secunda, quæ fit per evaporationem ejusdem aquæ, usq; ad medias, minus sincera est, & Sal. com. fixi particeps.

3. Aliter.

℞. Sal. nit. q. v. affunde ∇m $\square x$, destillaque sensim, tandem adde Δm auctiorem ut fluat; Labores hos repete aliquoties, (\mathcal{S} . ad minimum,) semper novum ∇m affundendo.

N. 1. Alii pro ∇m $\square x$ substituunt ∇m Sulph.

N. 2. Nonnulli Nitrum levigatum impastant cum albumine ovi, exiccantq; ad Δm , tandem augent Δm ut Nitrum fluat: hinc effundunt.

Vires. Metalla reddit malleabilia.

4. Crystallum minerale saccharatum.

Fit, si Crystallo minerali in ∇ rosarum soluto Sacchari ana misceatur, idque fit propterea ne scil. urinosus sapor molestiam pariat. Fel. Wirzins. 4. Chirurg. c. 4. pro arcano habet in hamorrhagia vulnerum.

5. Nitrum perlatum.

℞. Sal. nit. \times solut. part. iij. vel iv. Sal. perlar. itidem in \times solut. p. ij. vel ana conjunge, coagulaque evaporando,

Xxx

ac

ac reponere in frigido loco ad crystallifandum.

Ufus. Egregium est cordiale & mitigat simul astum febrilem.

6. Nitrum corallatum.

Fit eodem modo ex sale scil. corallorum & Sal. nit. an.

Vires. Ufus idem est cum priori in febribus & virium restauratione.

7. Nitrum saturnisatum.

Fit eodem modo, nimirum, ex Saccharo Hi & Sal. nit. puro, seu lapide prunellæ.

Vires. Confert asthmaticis.

Dosis g. 6. vel 7. in ∇ aliqua convenienti.

N. Si cuiuspiam lubet nitrum vel lapidem Prunella tingere, solvat tincturam rosarum, violarum, santali, fl. Tunica & sim. in appropriata aqua, in qua nitrum sit solutum, reponaturque ad crystallisationem: Eodem modo & Saccharum crystallinum tingi potest.

Crystalli Sal. nit. sive Draco fortificatus.

Digere nitrum depuratissimum in \sim u Sal. nit. ut illius solvat quantum poterit, abstrahere, egredietur phlegma, alium \sim um suffunde, digere, & a, donec tam acer exeat, uti affusus sit, tum satis Draconem imprægnasti, liquorem in Ω residuum pone in cella ut lapillefcant, hos lapillos in aq. solve & denuò in Crystallum coge.

Ex commun. S. Closs.

Vires. Tart. materias expellunt hinc crystalli, sudores, sedes & Urinas mo-

vent, Dosis \mathcal{D} i. in aqu. appropri.

Terra foliata Sal. nit. S. Closs.

Candefac Sal. nit. in π & per vices injice carbonem vivum, ut Sal. nit. inardescat, continua donec flagrare desinat, quod restat solvatur in \times , filtratur, coaguletur, idque ter cum novo \times repetatur. Tandem solvatur in ∇ , qui postmodum \mathcal{Q} etur. In fundo erit Terra Talcosa nitri fusilis instar ceræ.

Vires. Obstructum Mesenterium & lienem liberat, suaviterque repurgat, extractis Rhabarb. & sena commodè additur ad virtutes eorum augendas.

Dosis \mathcal{Z} B. indistincto radic. aperitivorum.

Nitrum Θ um, seu Sal. dulcis Holstib. Panacea duplicata, Arcanum duplicatum.

Nihil est aliud quam Sal. com. ex \odot ∇ (ex Sal. nit. & Θ . an.) extractum, crebrisque solutionib. & coagulationibus ita depuratum, ut candidissimum existat. Hæc sublimissimè pulverisatum, & cucurbitæ lutatæ impositum, calcinatur ita ut liquefiat. Melioris liquefactionis ergo aliquota pars Sal. nitr. additur.

N. 1. Laborem hunc interdum 2. & 3. vice repetere convenit.

N. 2. Si vice tertiæ repetitio iteranda sit, expedit prius materiam solutione ac coagulatione à fecibus depurare.

N. 3. Aliis liquefactionis ergo \mathcal{B} . Lap. prunella p. 1. ad Sal. com. illius p. 2.

Communicata mihi fuit hæc descriptio

ptio diversis è locis & præ aliis ex illustr.
aula Holsatia Gottorp. unde & nomen il-
lis in locis obtinuit.

Vires. De viribus ita ad me Cl. D.D.
Joel Langelot scribit: Mille experimentis
salis huius efficaciam Aula nostra compro-
bavit in Melancholicis affectibus, febrib.
quibuscunque continuis & intermittenti-
bus, calculo, scorbuto, &c. Quin & so-
mnum conciliasse, præsertim in Melan-
cholicis non semel notavimus.

Dos. à ℥j. ad ℥j. Constituit illustriss. no-
stro descriptio quingentis imperialibus.
Libras aliquot quotannis absumimus.
Mynsichtus hic accepit, qui illud sub no-
mine Arcani duplicati vendit.

Ad salis illius part. 7. Calcis ☉ ritè præ-
paratæ p. 1. addimus.

Sal cachecticum Chalibeatum.

℞. Sal. com. illius puri (ex ☿ ☿) p. ij.
Sal. com. prunellæ p. i.

1. Fluat Sal. com. prunellæ in ☿ bulo,
hinc superinijce animam ☿is (sive illa
liquida sit, sive in forma pulveris) sic ru-
bescet. Si satis imprægnatum ac rubeū
videatur, conterendo admisce Sal. com.
illud ☿i, fiatq; pulvis subtilissimus. Hūc
inde cucurbitæ vitreæ, da Δ arenæ gra-
datim, tandemq; fluat instar aquæ (quo
diutius, eò melius.) Denique facto vi-
tro exime lapidem rubicundum.

Vires ac Ulus. Summè conducit (ut
& Sal Holsatie) in appetitū prostrato,
cachexia, febribus, nephritide, catar-
rhis, scorbuto, lue gall. contractura, para-
lysi, & ubicunque sanguinis emendatione
opus est, Somnum inducit & aliapra-

stat quamplurima, idque ut plurimum
insensibile transpiratione, nonnunquam
sudore sine molestia, aliis blandum mo-
vet vomitum, sed raro, aliis leniter al-
vum ciet.

Dos. à g. 6. ad ℥j. in liquore approp-
Ex comm. Amici Hamburg.

III. SUBLIMATIO.

Unde

Flores Sal. nit.

℞. Sal. nit. Sal. com. an. ℔. i. fluant.
Hinc superinijce carbonēs ignitos ac
superimponē fictile inversum ritè ada-
ptabile. Sic exsurgunt flores in futile su-
perius panno madido obducendum.
Candidos illos flores pennula absterge
& serva.

Vires. Efficax est medicina in febrī
tertiana aliisq; astibus. Joel Langel.

N. 1. Butyrum candidum purgativum
ex liquore Sal. nit. & salu ☿ vide in My-
rothec. Fabri p. 330.

N. 2. Arcanum Sal. nit. per calcinat 3.
& cum Tart. & solutionem cum ☿ addi-
tis spiritibus cinnamomi &c. Vide in Deo
datop. 177. 178.

IV. DESTILLATIO.

Unde.

1. Spiritus Nitri.

Sal. nit. eodem modo rectissimè
paratur, quo Sal. nit. nimirum Sal.
com. cum triplo aut quadruplo boli, ar-
gillæ vè siccæ, cum vel sine formatione
globulorum miscetur, perq; retortam
distillatur.

N. Loco argillæ recipi potest ☿.

Xxx 2

2. Mo-

2. *Modus alius.*

℞. Om in superiore ventris capacitate tubulatam [præstat habere ferream,] pone in fornacem ut tubulus emineat receptaculo adaptato capacissimo exactè Ox annexo. Hinc candefac Om ac injice Sal. com. per vices, tubulumque statim obtura. Sic Om in receptaculum irruet, ac subsidebit.

N. 1. *Subsidentia hac feliciter ac celerius fiet, si receptaculo ∇ infundatur, vel linteum frigida humectatum imponatur.*

N. 2. *Si quis flores in destillatione elevatos seorsim colligere velit, habere creditur quo S ium figere possit.*

Vide S Crystallus Sal. com. dulces.

Vires. Reprimit ac sedat effervescentiam Om Salis microcosmici, discutiendo ac resolvendo malignos, crudos, nitrosos, variareosque vapores: viscera referat, calorem p. n. infringit, movet insuper S sudorem, unde usus ejus insignis in colica, plenrifi, prunella, febribus aliis, præcipuè malignis.

Dosis Dj . ad Dij . Etc .

Usus ejus tùm internus, tùm externus esse potest, v. g. in gargarismis & similibus. In colica miscetur cum an. ∇ ut fiat mixtura Dij . ad Zj . quæ in haustu ∇ æ fontana exhibetur: Illini quoque potest umbilico cum O Nucistæ ac tantillo Zibetæ.

3. *Alius modus Kesleri.*

℞. Aluminisusti & Sal. nit. âM . ac destilla per Om . i. cent. S 6.

4. *Alius ejusdem cum Sulph.*

℞. Sal. nit. puri q. pl. impone Ox tubulatæ cum receptaculo capaciss. aliquota parte ∇ æ adimpleto, da Δ m ut fluat Sal. nit. postea fluenti superinjice per tubulum parum Sulph. puri, clau-deque orificium, &c. hanc injectionem Sulph. repete, donec Sal. nit. consumptum sit, sic prodibit liquor seu Om Sal. nit. instar butyri S ij. Om hunc Sal. nit. dephlegma ac rectifica, &c. Materia in O relicta suppeditat Sal. nit. fixum.

5. *Spiritus Sal. com. Bezoardici.*

Est Om Sal. nit. in præparatione Bezoardici mineralis butyro affusus, ac iterum destillatione in S abstractus.

N. Hic si celeriter urgeatur, extillat rubicundus commodumque menstruum præbet O solvendo ac volatilizando. *Vi-de de O .*

6. *Aqua caustica, seu aqua fortes.*

Aquarum fortium ut & regiarum (quas dicunt) magna passim est varietas. Fiunt pro diversitate scoporum & salibus mineralibus, ad scopum facientibus, O , Sal. nit. S , Sal. com. & similibus. Nos brevitatibus studio unica ac altera descriptione contenti remittimus tyrones ad Authores fusè de his tractantes, ut sunt. *Beguin. lib. 1. c. 3. Sennert. Inst. lib. 5. part. 3. sect. 2. c. 6. Libav. l. 2. Alchym. tr. 2. c. 27. Etc .*

7. *Aqua fortis communis.*

℞. O i

℞. Diexiccati. ℔. ij.

Sal. nit. ℔. j.

Tere simul & misce.

Destilla per ℞m loricatam, Δe aperto per gradus: est operatio horarum 12.

N. Geber. Lib. Invent. cap. ultimo, addit & ℔. O. destillatque: in destillata hac ∇ solvit ℔. ℔. * ad ℞ acquirendam.

Vires. Solvit C & Q.

8. Aqua Regia, Stygia Chrysulca Basilii.

℞. Sal. nit. part. ij.

* part. ij.

Silic. contus. p. iij. circiter.

Destilla per ℞m ignitam tabulatam, Vide in 8. destillationem ∇ a stimm. Q. rea.

Vires. Solvit O eumque per XX secum transportat. Basil. in Clavib. Tenzel.

N. Usitatissimus facilissimisque modus destillandi modernis est per cacabum seu ollam ferream, cui ceu alembico terrenum imponunt capitellum cum rostro, de-

stillantque igne aperto in receptaculum capacissimum.

9. Eadem ℞, alio modo destillata.

℞. Sal. nit. per se q. v. & cum tribus partibus silicum contusorum misce, destillaque igne libero per ℞m. Sic habes ∇m nitri: postea habeas E è quibus per aquam calidam extractum sit sal, ut omnis acredo lixivii auferatur, hos E misce cum *, sit autem * tantum, quantum antea erat Sal. nit. destillaque Δ libero per ℞m, Sic habebis ℞.

N. Si velis rursus ex B. vel Fibris per alembicationem destillare, sit clarior & lucidior. Ventzel.

IV. EXTRACTIO.

Unde.

Tinctura nitri.

Tinctura Sal. nit. ad eundem fieri potest modum quo Sal. com.

Vires. Insigne est corroborativum, diaphoreticum.

CAPVT XXIV.

De Alumine.

Aluminis genera usitatoria Officinae quinque nobis exhibent.

1. Rupeum [Gallis *Allun de Roche*.]
2. Plumeum seu plumosum; videatur Amiantus. 3. Scissile, [quod glebarum instar est & plumosum oblongum vocatur.] 4. Zuccarinum sive Saccharinum (ex O rupeo, albumine

ovorum & aqua rosacea.) 5. Alumen catinum.

Verum ut in omnibus locis ubi Aluminis simpliciter mentio fit, ita & in his nostris preparationibus, rupeum recipere fas est: quod nihil aliud scilicet est, quam salugo terræ mineralis naturæ saturninæ, constans ex
Xxx 3 spiritu

spiritu acido ac sale terrestri caustico.

Triplicis autem id originis est; vel enim 1. per se in venis suis invenitur, vel 2. ex ∇ is mineralibus excoquitur, vel 3. ex terra & lapidibus aliisvè mineralibus extrahitur.

Dicitur autem Rupeum, quia ex Rupe seu saxis confici solet. Item, Glaciale, quia glaciei conforme est, Græcè *συνιγία*. Arabicè Sceeb. f. Seb. Germ. *Alaun*.

N. 1. *Mentio apud Dioscorid. fit quoq; Aluminis rotundi & liquidi, verum cum nostratibus minimè ea usitata sint, omisimus: nec audiendi sunt, qui liquidum Alumen faciunt materiam aluminis rupei. Vide Matthiol.*

N. 2. *Alumen catinum, propriè aluminis genus non est, sed Sal ex Ebus lignorum quorundam extractum, optimeque reverberatum Germanicè Weido Wsche. Huc referri potest & Alumen fecum, quod paratur ex fecibus vini ustis & albefactis.*

N. 3. *Modum alumen rupeum conficiendi, si quis scire cupit, consulat Matthiol. Libav. in Alchym. &c.*

Vires. *Exiccat, adstringit, incrassat, &c.*

Ufus. *Ocrudi praeipue externus est, [quamvis ab Empiricis & internè profectus, imo universali exhiberi solet,] ac in primis in angina & columella laxata, putredine gingivarum, tumoribus pedum adematosis, &c.*

N. *Sunt, qui in dysenteria O exhibent.*

PRÆPARATIONES & PRÆPARATA.

1. Crystallisatio seu Purificatio. 2. Calcinatio seu Ustio. 3. Salificatio. 4. Destillatio. 5. Subtiliatio.

I. PURIFICATIO seu CRYSTALLISATIO.

Aluminis purificatio fit more vulgari, scil. solvendo, in ∇ pluv. calida, evaporandoque, donec cuticula in superficie appareat; hinc reponitur ad crystallisandum.

N. 1. *Hanc purificationem si bisterve repeteris, mitescit acerbitas O.*

N. 2. *Libavius solvit in \square , proceditque dicto modo, verum qui hac ratione O purum nancisci sperat, fallitur, quippe Sal \square e O mini se immiscuit.*

II. CALCINATIO seu USTIO.

Ustio aluminis quoque tonforibus notissima est.

Nimirum.

O coquitur ad Δ m, ut phlegma & exhalent, terraque mollis porosa remaneat.

N. *Hac terra idem est cum ω ex \S actione ω residuo.*

Vires. *Ustatissimum est Alumenustum in vulnerum excrescentiis carnosus consumendis, in putredine arcenda, &c.*

III. SALIFICATIO.

N. *Oustum, (vel ω aluminis,) coque*

que in ∇ , trajice per chartam; filtra-
tura evaporet & habebis Sal fixum O-
minis.

IV. DESTILLATIO.

Unde.

1. Phlegma ac Spiritus.

\mathcal{R} . O puri q. v. destilla per \mathcal{O} m in
 \mathcal{A} ac elicies initio l. Δ phlegma. Igne
postea fortiori, \mathcal{M} prodibit albissi-
mus.

2. \mathcal{M} dulcis O.

\mathcal{R} . \mathcal{M} O, rectifica aliquoties cum
 \mathcal{V} & dulcis atque jucundus evadit.

Vires. Usus ejus internus diureticus
est, pellit calculum, obstructions Lienis
aperit, astus in febris compescit.

Externus ejus usus admodum proficu-
us est, in vitis oris, inflammationibus ni-
mirum, Aphthis, & sim. curandis.

Dosis g. 4. vel 5. in vino vel alio liquore
conveniente.

Phlegma adhibetur ad vulnera mun-
dificanda, adstringenda, &c.

3. Magisterium, seu \mathcal{M} Ois
Magisteriatum.

\mathcal{R} . O puri q. v. impone in vitrum
asperge aquam & reponere ut dissolva-
tur.

Liquorem filtraturam depuratum de-
stillam in Fibis, ex cucurbita humili ad
siccitatem: solve denuo, modo quo
dictum, in liquorem, & destilla. Eous-
que solutionem & Qationem repete,
donec tota O substantia per \mathcal{X} tran-
scenderit.

Usus. Stypticum est nobile, quod vix
aadit Essentia ferri boli, sperniola, &c.

4. Saccharum O.

\mathcal{R} . O purificati q. v. destilla ut
eliciatur phlegma, quod affunde ite-
rum \mathcal{O} , & postquam 8 24. steterint,
denuo abstrahere: idque vicibus ali-
quor (5. vel 6.) tandem phlegmate
reservato solve \mathcal{O} per d. Liquor dige-
ratur \mathcal{O} (12.) coagulaturque in \mathcal{A} .
ad siccitatem: sic praparatum Saccha-
rum O.

Vires. Celebratur in pectoris morbis
prasertim ex minerarum halitu contra-
ctis, qualibus Metallurgi frequenter affli-
guntur; Odontalgiam sedat, gingivam im-
positum.

Dosis à gr. 5. ad 8.

V. EXTRACTIO.

Unde.

Extractum Aluminis,
alias.

Magisterium.

\mathcal{R} . O crud. lb. (vi.) coquatur in fictili
amplo, ut evaporet phlegma, Tandem
calcina ut penitus candescat. Hinc in-
jiciatur in \mathcal{X} O illud candens; Sic ex-
trahet \mathcal{X} Essentiam seu Magisterium
residente terra alba (quæ aqua ferven-
trabluenda & servanda) \mathcal{X} illud im-
pragnatum filtra, & abstrahere in MB ad
mellis consistentiam. Tunc exponatur
frigido ad crystallisandum. Crystallus
exime & sicca pro usu.

N. Crystalli tingi possunt rob sambuci
pro libitu.

Vires. Sudorem movent, conveni-
untque in scorbuto singulis septimanis
semel

semel ac iterum pro sudore exhibiti. (In febr. tertianis (ante paroxysmum aliquot vicibus iterato assumpti.)

Dosis à g. 8. ad 20.

Ex communicatione Amici Hamburg.

CAPUT XXV.

De Sale Ammoniaco.

SAL *nativum à majoribus descriptum, sub arenis Lybicus concrescit. Verum nostratibus non nisi artificiale cognitum est. Quod nihil aliud est, quam sal amarum factitium compositum, volatile, coctum ex ☉, sale fuliginis, Sal. com. vel ☿, & simil. Vide si placet modos conficiendi, apud Libav. in Alchym. & hinc apud Untzer. in tr. de Sale.

Dicitur & Sal armoniacum, Sal solare, Aquila cœlestis, alba ☿ialis fuligo, Sal ☿ialis philolophorum, Lapis Adir. Audix. Anacab. Alacab. Aliocab. Allocaph. Alcob. Alfol. Alfatide. Alinziadir. Alistiles. Alumonodig. Amizadir. Anoxadic. Azanec. Butrum. Hifazium. Lixandram. Misatis. Nestudar. Nusiadal. Nysæ. Obac. Raal. Salmiax. Turfies. German. Salmiax.

Eligatur candidum ac purum, vel nisi satis nitidum fuerit, purificari potest. Præstantius habetur * Venetianum ac Antverpianum, ex quibus tamen posterius priori cedit.

Vires. Internè vim habet diaphoreticam, præcipuè in febribus, maximè in febr. quartana, resistit putredini, &c.

Dosis ad ℥℥.

Externè adhibetur in Gangrena carne putrida absumenda, in Angina curanda (in Gargarismis,) Quinimo Barbitonfores aquam suam cœruleam, inde conficiunt in ☿ vase ad albuginem oculorum tollendam.

Nimirum:

*o in pelvi ænea Δm affundunt additoque modico Ψ simul optimè agitant. Vide l. 2. c. 49.

PRÆPARATIONES.

1. Purificatio, unde * Crystal-
lisatum. 2. Calcinatio. 3. Sublimatio; unde Flores. 4. Destillatio. 5. Liquefactio.

I. CRYSTALLISATIO.

* crystallisatum, nihil aliud est, quam * modo vulgari purificatum, i. e. in ∇ solutum, & post evaporationem aliquotam crystallisatum; ideoq; usus ejus cum priori idem est.

II. SUBLIMATIO.

Flores *.

Re. * trit. limaturæ chalyb. ā. q. v. mixta diligenter ex cucurbita in ☉ sublimes; sic relictis in fundo fecibus ascen-

ascendit * purum aliquota portinnu-
la \odot is imprægnatum.

R. * hujus Sal. Com. fusi in M. sub-
limaque denuo, sublimationem de no-
vo septies repete, semper \odot rejiciendo
& parem Sal. Com. fusi quantitatem
singulis vicibus admiscendo.

Nonnulli contenti sunt posteriori-
bus saltem sublimationibus (sc. cum
Sal. Comm. citra \odot peractis) * depu-
rasse. Verum quia \odot vim aperitivam
* insigniter acuit, operæ precium erit,
nec priorem illam sublimationem in-
termittere.

Vires. Flores hi ut operosiores, ita \odot
effectum præstantiores censentur, quam *
solâ crystallisatione purificatum, ideoque
felicius illorum loco adhiberi possunt in
quartana. Tollunt quoque perfecte cru-
ditates ventriculi, si in vino absinthiaco
vel decocto sassafras per aliquot & conti-
nuos propinentur, sudorque à sumpto
Medicamento procuretur.

Dosis gr. 3. vel 4. imò ad \mathfrak{ss} . \odot ultra.
Sennert. in Institut. Hartmann. in pra-
ctica, loco de crudis. ventriculi. Tentzel.
in Exeg.

N. Si cum limatura \odot fiat \triangle atio,
tunc arroditur \odot à sale, parumque ad-
modum sese sublimat; si vero cum bati-
turâ ferri non tritâ, tunc fere sal. omni a-
scendit colore ex flavo rubescendo.

III. CALCINATIO \odot FIXATIO.

Figitur cum Ψ , si anaticè (vel Ψ
i.) cum eadem mixtum \triangle e fortissi-

mo subito adhibito, addito quoque
solle fundatur, postmodumque aqua e-
luatur.

Usus ejus præcipuus est, pro liquore in-
de conficiendo.

IV. DESTILLATIO.

Unde.

Spiritus *.

R. * p. i. Erum q. i. v. M. atque
destilla ex \odot per \times . sic. prodit \sim *.
quem rectificat è cucurbita altio-
ri.

2. Aliter.

Solve * in ∇ calida, ea qua pota-
to lateres ignitos, ut in ∇ m illam * co
imprægnatum penitus imbibant. Hinc
destilla per \odot m igne arenæ, vel igne a-
perto.

3. Aliter.

R. * sublimati q. v. asperge ∇ re-
ctificat. ut humectetur, hinc digere va-
se clauso in MB ut resolvatur. Solu-
tiones decanta, è cucurbita oblonga in
MB \mathfrak{q} a ad dimidium: ∇ \mathfrak{q} tam rur-
sus affunde & \mathfrak{q} a: tandem ∇ auctio-
re omnes spiritus per \times propelle & re-
ctifica.

Vires. Est Diaphoreticus incisivus,
diureticus.

Dosis gr. 3.

Ioh. Rhenan. Chymotechn. l. i.

R. * q. v. misce cum argilla, aut hæ-
matite, ac exinde fac globulos, \mathfrak{q} aque
per \odot m ut moris est Clar. Dn. D. Hel-
vic. Dieterich.

Yyy

Vires.

Vires. Hic * i ~ affusus solutionibus Metallicis cum ∇ factis, indeq; per X abstractus secum alias corrosivas aquas transportat. Itemque Atana & obstructionibus felicissimo cum successu exhiberi poterit, solvit iidem calculum.

Dosis a gr. 3. ad 6. vel 10.

Extrinfecus anaticè cum V mixtus & plumaceolo loco dolenti podagrico aliquoties illitus, dolores ad miraculum restringit, precipuè si in eo tantillum Camphoræ fuerit solutum. Sennert. Institut. Hartman. prax. loc. de Arthrit. Tentzel. in Exeg.

Spiritus * i urinosus.

In * co duplex ~ us reperibilis est, scilicet Spiritus Urinæ & Sal. Com. Ille facile elicitur vel additis cineribus anaticâ proportionè, aut Ψ, Sal. Nit. fixo, fale Tart. Modum vide pag. 159. secundæ partis Glauberi. Quem verò describit idem author pag. 158. cum Lapide Calaminis non ita feliciter cessit, fortè propter impuritatem Calaminæ, est enim una alterâ longe melior. Spiritus aureus ejusdem naturæ cum Sal. Com. sic prolicitur.

Spiritus acidus * cî

S. Cloff.

Solve * in aqu. comm. ita ut aliquid in solutum restiter, hac solutione imbibe folia plura charta Emporeticæ in globulos sive pilas molles conformatæ, quas in cucurb. conjice & ex ☼. vel reverberio clauso propelle spiritum coloris aurei summè aci-

dum, qui per rectificationem albescet.

Vires. Spiritus hic est penetrans admodum & subtilis à commixtione salis volatilis □ unde summe Diaphoreticus est & Colicam sedat.

Dosis gutt. 6. 8. in vino.

N. L. Cave ne vehementiori Δ charta comburatur, alias denigrabitur ~ us extillans, cum putore usionis, sit ergo Δ gradualis.

2. Cave ne ☼ ~ tum addas, ut facit Querc. in Teirade titulo de Panacea ☼ y, sic enim prodit unâ cum ~ u salium fuligo quadam ☼ alis, à qua (si detur hic ~ us intra corpus) gula constringitur, cum signis instantis Convulsionis, post absolutam autem destillationem si detur Δ ~ ationis, tunc combustâ papyro nancisceris ☼ um dulcem.

Spiritus alius fugaciss. * cî.

R. Calc. viv. q. v. inde Cucurbitæ in MB impositæ. Hinc affunde * cum in ∇ dissolutum, idque paulatim & per vices, alembicum semper reaptando. Quando omne superfluum fuerit, Receptaculo & Juncturis probè munitis destilla lentissimo Δ. Sic prodit quidem Spiritus aliquali phlegmate dilutus, sed qui unica rectificatione dein fugacissimus redditur.

Usus ejus est in variis morbis. Utimur tamen precipuè in morbis capitis: Epilepsia, Apoplexia, gravitate auditus, &c. In morbis uteri: Retentione mensum, difficultate conceptionis, singulari quo-

quodam instrumento eñ applicando, cui si
vola manus calens admoveatur, statim o-
peratur. Joel. Langel. Instrumentum il-
lud est vitrum strictioris orificij, quod in-
ruditur in vulvam.

V. LIQVATIO.

Unde.

Liquor seu oleum *, per de-
liquium.

R. * purif. q. v. impone albumi-
nibus ovorum coctorum, ac repone
ut solvatur per deliquium. Kester, 1.
cap. 19.

CAPVT XXVI.

De Vitriolo.

Vitriolum est Sal minerale metallis
proximum, ac præcipuè Cupro,
&c. Græcè Χαλκανθρον, Arabicè Cal-
cantum, Calcant, Alcalcadis. Latine, A-
tramentum futorium, Vitriolum. Ger-
man. Vitriol/Rupffertwasser.

Varia sunt ejus genera, pro natu-
ra mineræ, quam in se continent, diffe-
rentia. Præcipua autem quorum hoc
tempore est existimatio. Sunt 1. Cæ-
ruleum, Sapphyri instar, compactum,
ut Saccharum candum, tactu siccum,
Hungaricum vocant, vel Cypreum.
2. Subviride, herbacei coloris, magis
granulatum, grumofumque instar Sal.
Com. paulum unctuosum, manuique
tangentis adhærens, quale Goslarien-
se, Suecicum, &c. 3. Album, in formam
parvulorum panum effictam, tactu sic-
cum.

Ex his itaque generibus, (nisi pe-
culiariter monitus sis) secundum eli-
ge, & ex hoc, quod plus de 8 quam
de 7 participiat, nimirum quod cul-

tro affricatum rubeo colore inficit, ca-
vendo tamen Vitriolum minutum sub-
cæruleum, pallidulum & aquosum, ma-
nusque tangentis madefaciens, quod
passim venale prostat.

Vires. Vitrioli usus tantopere fructuo-
sus existit, ut Paracelsò (in naturalibus)
ac Phadroni tertia pars Medicina habeat-
tur, imò totam Officinam in eo latitare
prohibet. Quercetanus in Tetrad. Galeno,
calfacit, siccit, adstringit vehementer,
constipat, vomitum ciet, lumbricos fugat.
Extrinsècus Errhinum exhibet naribus
inditum.

PRÆPARAT.

Sunt

1. Purificatio. 2. Calcinatio. 3. Destil-
latio. 4. Sublimatio. 5. Præcipitatio. 6.
Salificatio. Extractio.

I. PURIFICATIO.

Purificatur ☉m à fecibus, tum su-
perficiariis, tum exactius inhærentibus:
Illud fit sola solutione, filtratione ac
crystallisatione: Hoc interveniente in-
super digestionem.

Yyy 2

Hinc

Hinc

1. *Vitriolum album vomitivum.*

Solve Θ -m album in ∇ , filtra & evapora, donec quasi crusta supernatans appareat, postea ponas in locum frigidum, & concresecunt crystalli, quos posthabitis fecibus, quæ subsident, exime: ∇ -m iterum evaporare fines, reponesque ut antea. Hic labor penitus tertio reiteretur, coagulando scilicet, & dissolvendo, ultimo ter eodem modo procedatur cum ∇ rosarum. Crystalli tandem supra calorem lenem exiccati, redigantur in ζ erem album.

Vires. *Est lene vomitivum operaturque feliciter in febris affectibus ventriculi, catarrhus, lumbricus, peste, & epilepsia, &c.*

Dosis à \mathcal{D} j. ad \mathcal{Z} j. in Vino, Insculo, vel alio Liquore.

N. 2. ∇ centaurii, vim ejus emeticam maxime promovet. Croll. Beguin.

N. 3. Quatuor sunt Θ -la vomitiva apud Chymicos seu Gilla. Primum fit ex Θ -lo ceruleo dissoluto & precipitato cum Ol. Tart. separato Sulph. filtratur solutio & cogitur in crystallos. Hæc Gilla est omnium vehementissima & acris valde. Altera fit ex Θ -albo modo jam dicto, quæ ad tantam malitiam non accedit 3. est Θ - \mathcal{Z} is aut \mathcal{O} paratum ad mentem Crolli illi inest dulcedo styptica, præsertim si bis aut ter in phlegmate \mathcal{O} resolvetur & rursus coaguletur, huic minor

violentia inest. 4. Gilla est omnium innocentissima puerulis vomitu indigentibus dicata, quæ fit ex Θ - \mathcal{D} -li post extillationem spirituum & olei, diciturq. Sal Θ -li, vide infra. Omnia hæc Θ -la intra quadrantem horæ vomitus excitant.

2. *Vitriolum Hemetico-purgans.*

N. Θ -m Roman. [vel quodvis aliud ex tribus illis supra commemoratis.] q. v. pulverisatum in loco calido, radiusve solaribus in ζ erem album exicca. Postea solve in ∇ centaur. min. filtra, & in loco frigido ad crystallisandum reponere: Crystallosexiccatos (servato tamen colore cæruleo) serva in vitro probe occluso.

Vires. *Purgat per vomitum, & secesum eximium existens in febris pestilentibus Medicamentum.*

Dosis à gr. 20. ad 31. & plur. in liquore vel ∇ appropriata, Sala de Θ -Gluckrath in Beguin.

Purgatio defacatoria.

Solve Θ -m in ∇ vel rore majali. [filtrato, vel quod melius, destill.] solutum cola, collatum colloca in digestionem, [per mentem] sic ad superficiem & fundum rejiciet feces, quas separa. Iterum ponatur in digestionem tamdiu, donec nullas feces amplius rejiciat.

Inservit multis preparationibus.

Coagulum Θ -S. Closs.

\mathcal{Z} Salis Θ -li in aqu. solut. filtratæque, Tart. calcinati itidem in aq. resolutur.

lut. ana part. xq. Coniunge ambas solutiones & coagula in hac.

Vires. Desiccatum purgans prabet, non ita vomitivum.

Dos. à ʒ℥. ad ʒj. & ʒj. in febris. Intermitt. & ad educendam Melancholiam.

Sal. li. nitratum
S. Closs.

R. & Sal. nit. per purgati an. ℥j. M. colloca in ollâ Δ sustinente, operculo suo munita, inter prunas ardentes per 7. aut 8. horas. Quod restat materiae bulliat in aq. communi ad dissolutionem usque, filtretur, evaporet ad cuticulam, tum in frigido crysallos expecta vomitorios, quorum.

Dosis erit à ʒj. ad ʒj. & ʒj. in Cachexia, hydropo, circulo suffocatione matricis, mensium retardatione.

II. CALCINATIO.

1. Vitrioli calcinatio aperta, unde Colchoiar.

R. & calcina. i. est coque & combure in vase terreo, donec omni humiditate privata, rubescat.

N. & m. Calcinatione hac ultra dimidiam partem pondere imminuitur.

2. Calcinatio & i. clausa.

& m. crebris solutionibus & coagulationibus optimè depuratum, lenique calore exiccatum, pone in Matracium firmum sigillo Herm. munitum. Matracium hoc in ☿ calidis colloca, qui solis æstivi calorem non

superent: stet ita donec per flavedinem in rubedinem instar sanguinis convertatur. Labor est 20. & p. circiter Beguin.

N. & m. rara stratificatione sternendum est, ne stratum illud crassitie cultelli in dorso densius sit, [nicht dicker als ein Messerruck dicke/] plura ergò Matracia, nisi in cassum laborare volueris, habere expedit.

Inservit variis preparationibus.

III. DESTILLATIO.

Unde.

Destillata aquosiora.

1. Ros & i.

R. & m. crudum, elice rorem calore MB ferventis cucurbita non adeo alta adhibita.

Vires. Valet arduos capitis dolores, mitigat sanguinem adustum, corroborat viscera Sala.

Dosis ʒj. continuatim, ad aliquot dies.

2. Aqua & i. secunda.

Post extillationem roris transfer cucurbitam cum restante & o ad ☿. m. & destilla, quoad Vari potest.

Vires. Conducit ad purgandos renes, lenit corrosiones internas, ☿ & sudorem proritat. Inflammationem plagarum corrodentium aliquantulum calafacta sedat, lenit & mitigat dolorem, & ad consolidationem confert; (infusa gutta una ac altera Ol. Tarr. ut mardacior)

γγγ 3

fiat,

fiat, scabiem siccam mundificat, & carnem solidiorem efficit. Sala.

3. Phlegma Θ -i acidum.

R. Θ -i cærul. q. v. destilla ex F bus per X cohobaque aliquoties, (7.) supra O ultima vice fortius urgendo.

N. ∇ a illa suavem acquirit odorem, si post ultimam Q ationem aliquamdiu calore moderato circuletur.

Vires. Est arcanum ad capitis dolorem & epilepsiam. Hartm. in Croll.

4. Spiritus Θ -i volatilis.

R. Θ -i defecat. & exiccati q. v. destilla gradatim per O m Δ nudo, ut simul post phlegma subsequantur — , quantum fieri potest omnes. Liquori egresso adde part. ij. ∇ a pluvialis destillat. & in MB nova destillatio instituitur; tunc subtilissimus — Θ -i cum ∇ elevatur, relicto acidissimo oleo in fundo.

N. 1. Si volupe sit — Θ -i volatilem purum obtineri, aufer Excipulum dum instrumenta adhuc calent, statimque in MB aqua ferventis, probè adaptato alembico & recipiente parvo, cautè colloca. Videbis statim volatilem — in Excipulum transire, quem seorsim collectum, diligenter serva Ex 6. vel 8. H Θ -i vix Zij . ad summum Zß . acquiri potest.

N. 2. Hæc est illa volatilis Θ -i quam Theophrastus passim præcipuè cutem pari. 3. de morb. ament. iv. 2 commendat ad Epilepsia curationem. Hartmann. in Croll.

Vires. — ille ∇ a pluviali immix-

tus summe penetrans est, in febris Ungarica, aliisq. ardentibus febribus efficacissimè operari solet.

Alii Q ationem hanc ex cucurbita loricata perficiunt, octies plus minus cohobando.

Alii ad nonum usque Alembicum fortissimo Δ pellunt: scil. alembico altero alteri exactè imposito, ut in sublimatione flor. G lifieri solet, qua ratione penetrantissimus elicitur Θ -i — , ad fugandam epilepsiam præstantissimus. Hartm. in Croll. Senn. Inst. Tentzel.

Alii addunt Θ -o optimè purificato V m, ut fiat pasta; eliciuntq. per O m. 1. V . 2. Θ -i phlegma. 3. — Θ -i Tandem separant V m in MB à Θ -i phlegmate: & — Θ -i per F dephlegmant: vel phlegma cum — u ab oleo fixiori per Z . proliciunt: postea in F dephlegmant, Senn. Inst. Tentzel. vide & seq.

5. Spiritus volatilis Θ -i.

Solutum Θ -lum in aq. durâ coque in lebetæ ferreo per 2. aut 3. horas, adjecta Zj . aut alterâ limat. O tis ad libras singulas soluti Θ -li. Remove ab Δ & ochra limituræ sese implicabit post refrigerationem, id ter repete cum novâ limat. singulis vicibus Ter. ochream separando. Crystallòs vero Θ -li restantes impone O lutatæ, dando ∇ per gradus, usque dum vapores albi recipians oppellant, tunc cassâ, phlegma à spiritu acidulo per rectificati- nem in MB separa & serva, Sed parum habe-

habetur hac viâ. Quare Glauberum sequor secundâ parte furnorum p. 95. verum cum vasa illius sive terrea sive ferrea, sint porosa, neque per ea tota spirituum & olei quantitas exhauriatur, ego post absolutam impetiosi phlegm. & uuum alborum rationem subsistere soleo post 12. horas & quod Colchotaris super est conjicio in vitream optimo luto instructam, admotoq; eodem Recipiente phlegma & spiritus r. exceptos continente, hoc opus quando redintegro, aperto Δ cum carbone terræ subtus & supra administratio, idque per 8. & minus continuo, imò si ad xii. extendi posset, melius foret, præsertim si G-lum optimæ notæ fuerit, quale est Ungaricum, tunc enim, (nec ferè prius) spiritibus suis volatilibus, ac dulcedine sua totaliter privatur. Tandem separatio spir. Volatilis ab Oleo dulci instituitur, ut vult Glauberus in secunda parte p. 10.

Vires. Spiritus volatilis ibidem videtur est. Olei dulcis virtutes plures quoque sunt: fœtur & lienem egregiè deobstruit, valet in febribus ardentibus, dosi majore quæ ad ℥j. extenditur (propter dulcedinem) in haustu cerevis. figit quoque & in pulv. album firmè fixum.

N. 1. Si ritè operatus fueris, tunc ex ℔. xij. G-lum Hungar. ℔. v. olei nancisceris.

N. 2. Sal Vitrioli ex hoc beneficio phlegmatis elicitum pro vero ac genuino habendum est, reliqua salia, quæ post tri-duanam rationem emunguntur, nila-

liud sunt quam Vitriolum resolutum nondum satis m-bus acidis orbum ac privum. Potest tamen inde haberi Sal syncerum, si ad albedinem reverteretur, & postea more communi extrahatur.

N. 3. Habes aliam Spiritus volatilis methodum in Helmontio sub titulo Ignis Quis, unde Diaphor. Parac. paratur.

6. Spiritus Vitrioli, vulgari modo destillatus.

R. Si ad rubedinem calcinati, (vel ex ratione roris & v. secundæ residui) ℔. vi. vel q. v. destilla Δ enudo ex benè lutata, in Recipiens capacissimum, commissuris exactè clausis, adhibitoque Δ gradatim. Post tres ferè Gas phlegma stillare incipit, quod tandem paulatim aucto Δ circiter 8 6. vel 7. albi nebulosique subsequenter. His apparentibus continuandus erit Δ, paulatimque augendus, donec nulli amplius egrediantur, quod cognosces, si Receptaculum pellucidum appareat. m dephlegma in MB, donec guttæ acidæ exstillare incipiant, postea rectifica eundem per om vitream in Fere, sic exhibit clarus, in v. verò manet o rubicundum & acre.

N. Si citra jacturam aliquam spirituum (in calcinatione forte evanescentium) ut & citra corrosivi olei admixtionem, (quo alias vix m planè liberari poterit,) destillationem expetis, procedere monet Dn. D. Brendelius (in Chymia sua ubi & rationibus id culcare conatur,) modo qui sequitur.

R. Vi-

R. Θ -i opt. crud. q. v. (lb. xii.) inde Ω æ, Excipulo capacissimo firmiter connexæ, (ita tamen ut foramen in commissura relictum sit, spiritibus volatilibus ac impetuosus exitum concedens,) destilla ut moris, lentè, donec impetuosus illi \sim fuerint egressi, (id quod cognosces, si collum refrigerat;) dein obtura firmiter foramen illud, ac auge Δ m, pelleque § 12. (non ultra, alias \sim m inquinabis oleo corrosivo graviori.) Hinc dephlegma ac rectifica, & habes \sim m Θ -i optimum.

N. Spiritus in calcinatione evanescentes, vix ac ne vix opera, dicto modo, adhibita equivalent. Ideoq; nisi \sim m quoq; volatilem expetis, vulgaris modus satisfacere potest. In quo nota tamen, ne nimium initio calcines, nec nimium Δ m in destillatione urgeas. Etenim ut in omni ferè ratione, ita in hac paulatim crassius, &c. propellitur.

Alii addunt Sal. nit aliquid, sed Ω -atum hoc potius ∇ , quam \sim Θ -i nomen meretur.

Vires. \sim Θ -i est diareticus, diaphoreticus, incidens, attenuans, putredini resistens, &c. Hinc utilis in febribus ardentibus, obstruct. Epatis, Lienis, & Mesenterii, appetitu prostrato, &c. Quinimo cum liquore vel vino mistus lenit Odontalgiam, (gingivis impositus) prodest & ejus illitus in tinea capitis, aliisq; generibus scabiei & pruritus cum ∇ chelidon. mixtus,

Dosis a g. 3. ad \mathcal{B} . vel ad \mathcal{D} j. in liquo-

re vel adhibetur in potibus quant. suff. ad aciditatem gratam.

7. Spiritus Θ -i dulcis, sen \mathcal{O} Θ -i dulce.

R. Θ -i benè calcin. lb. iij. superfunde \times , ut benè supernatet; digere decanteque & affunde novum \times , idq; quinquies vel sexies, semper, & aliquot digerendo. Aceta illa imprægnata destilla, donec \sim m Θ -i tetigerit Ω andi ordo. Tunc inde in Ω m adjectis sabuli puri manibulis duobus & liquor Θ -i emanans dulcem referet laporem. Temzel. Kesler. 3. cent. 27.

Vires. Prodest in calculo, tartareis morbis, catarrhis, &c.

Dosis \mathcal{D} j. in liquore conveniente.

8. Alius.

R. \sim Θ -i vulgar. (rectificati,) lb. j.

Θ -i Θ -i [ex quo Sal. Com. sit extractum] \mathcal{Z} iv.

Destilla per Ω m vitream in \mathcal{A} . in receptac. satis capax; sic prodit \sim subdulcis, quem si dulciorem cupis, circula cum ∇ & 4. aut 5. dein abstrahe ∇ , sic habes \sim m Θ -i dulcem.

N. Dulcescit etiam sola circulatione cum suo phlegmate, vel si aliquoties à scoris \mathcal{O} (semper novas scorias sumendo,) \mathcal{Q} etur.

19. Spiritus Θ -i Philosophicus, vulgò Cohob. \mathcal{G} ij.

R. ∇ , qua \mathcal{Q} vitæ edulcoratus est, evaporet leniter MB, donec apparere

rere Incipiat liquor flavus & acidus Liquor hic est Spir. Φ -i philosophicus, qui per Ω m à terrestri materia rectificari potest.

Vires. Potioris est virtutis, quam qui vulgari modo conficitur. Medetur Febribus, Luem Φ mitigat, Lienem & Meseraicas solvit, ventriculum debilitatum, & à phlegmate crasso infarctum confortat. In Melancholia hypochondriaca, Epilepsia, omnibusque affectibus capitis mirè prodest. Extrahuntur & ejus ministerio Tinctura mineralium, corallica & perla dissolvuntur. [Idem acuat] Ω m Sal. com. solvit Ω m.

Dosis. 3. 4. ad 8. in haustulo vini vel liquore convenienti. Hartman. in Croll. Kesh. l. 1. c. 26.

10. Spiritus Φ -i Tartarisatus, alias Liquor Diana.

R. Φ -i Ungarici ad albed. calcin. p. ij.

Tart. ad nigred. calcin. p. i.

Pulverisata invicem misce & Ψ paulatim per conspersa, destilla per cucurbitam (Ψ imposito) forti Δ e, cohobaque: deinde rectifica liquorem egressum in Φ , seorsim capiendo, & Ψ m & liquorem reliquum.

Vires. Egregias vires exhibet ad sudandum in omnibus internis obstructionibus, in sanguine grumoso, contra scabiem, ad mundificandam & lavigandam cutim.

Dosis à 3i. ad 3j. cum brodio, aut cum pauxillo vini Hispanici. Datur.

que per 3. auroras continuas si libet. Tenzel.

11. Spiritus vel ∇ aperiens Penoti.

R. Φ -i Ung. ad rub. calc. lb. iv.

Silicum è fluviis collect. & optim. calcin. lb. j.

Tart. ad albed. calcin. lb. i.

Mixta, inque tenuissimum Φ erem rusa liquecant in cella aliquantum in liquorem, quem destilla ex Φ per Ψ , cohobatque ter, Φ atum liquorem singulis vicibus Φ in Φ erem redacto, affundendo. Extremo per Ω m Δ e aperto pelle, sic initio lento Δ e primum phlegma extillat, postea vero Ω m acidus auctiori Δ e elicitur. Ex Φ o calcinato Sal. com. extrahe, & cum eo [ablato prius phlegmate per B.] Ω m acidum digere. Tandem cum argilla in pastillos redige, atque ex Ω Δ e nudo, gradibus tamen observatis, Ω m alkalifatum provoca.

Vires. Usus ejus insignis est in obstruct. Epatis, Lienis, Mesenterii.

Dosis à 3j. ad 3j. vel ij. in vino vel alio liquore convenienti. Hartmann. in pract. loc. de obstruct. Epatis. Sennert Insistit.

N. Dicitur Antihydopicum Musfetti, summeque celebratur in Hydrope, cujus fomitem per alvum ac urinam, spiritus etiam nondum alcalisatus educit. Datur cochlear unum jejunantibus singulis vel alternis horis aqua appropriata injectum. Horning. in Cista med. Ep. 122.

Zzz

12. Spi-

12. Spiritus Θ i mellis-

tus.

\mathcal{R} . Θ i Sole albificati lb. ij. mellis cum favo, lb. i. Misc. exactè ac destilla ut moris.

Vires. Lenit dolores Podagricos: si adsit inflammatio misceatur cum \mathcal{R} o, alias cum vino. Med. dest.

13. Spiritus Vitrioli diaphoreticus.

\mathcal{R} . \mathcal{R} o Θ i vulg. \mathcal{Z} vi. Sal. com. Tart. C. C. ust. \mathcal{A} \mathcal{Z} ij. M. in mortario vitreo digerantur aliquantulum: dein destilla ex \mathcal{O} in recep. capaciss. donec omnis humiditas extillarit. Qato liquori adde \mathcal{V} an, reservaque in vase benè obturato.

Vires. Purificat sanguinem, abigit que scabiem ac prurium, aperit obstructions; sudorem provocat in peste, venis, hydrope, icteritia, & contracturis, &c.

Dosis à \mathcal{D} j. ad \mathcal{Z} ß. continuari potest ejus usus ad libitum sine periculo. Sala in Anat. Vitrioli.

SPIRITUS VITRIOLI ANTEPILEPTICI.

14. Spiritus Vitrioli Antepilepticus puerorum Hartmann.

\mathcal{R} . Vitrioli Ungaric. depuratiss. lb. iv. adde \mathcal{Q} æ puerorum sanorum recenter collect. lb. iv. i. Digere vase clauso aliquamdiu in MB, postea ex eodem vase destilla ad siccitatem duplex phlegma, quorum primum infi-

gne est paregoricum ad dolores podagricos, aliosque suaviter demulcendos, alterum est insigne ophthalmicum, ad quævis oculorum vitia utilissimum, \mathcal{O} pulverifat. ex \mathcal{O} valida terra, Δ e nudo, sed tamen ab initio valde lente in excipulum capax urge, prodeuntibus confestim spiritibus liquor promanat pretiosissimus sulphurei odoris & austeriusculi saporis, qui per \mathcal{O} m semel atque iterum rectificatur atque reservatur.

Vires. Omnem puerorum Epilepsiam radicitus tollit.

Nimirum:

\mathcal{R} . \mathcal{D} j. ∇ radic. Pæon. & flor. Til. an. \mathcal{Z} j. M. de hac mixtione exhibe in paroxismo [prius membris contractis & revulsis, reductis,] cochl.ß. & paulo post recollectis sensibus denuo aliquid exhibe, atque ita etiam tertio id repete, non omissis interea quæ cerebrum confortant, sc. magist. perlar. corall. cranii humani & simil. Hartm. in Croll. Senn. in Instit.

N. Fit quoque \mathcal{O} efficax contra Epilepsiam.

Si Sal \mathcal{Q} æ in Sp. Θ i dissolutum per \mathcal{R} o m \mathcal{Q} etur.

15. Spiritus antepilepticus Basilij.

\mathcal{R} . Virid. æris, q. v. superfuso \mathcal{X} calido extrahe, & decanta: Liqueorem per \mathcal{X} abstrahere. Reliquum in ∇ pluviali solvè, filtra, coagula ad tertiz partis remanentiam: reponè in loco frigido

frigido ad crystallifandum, Crystallus toties collige, quoties ∇ a ulterius coagulata & reposita illos dabit.

\mathcal{R} . Hos Crystallus destilla ex \mathcal{O} fortiter & prodibit ∇ subviridis, quando incipit subnigra apparere cessa, ∇ mque illam subviridem dein per \mathcal{O} m destilla & extillabit clarissima.

Usus ejus non modo in Epilepsia, sed & in calculo valde nobilis perhibetur.

Dosis \mathcal{D} j in ∇ appropriata, Pæon. Fænic. &c. Tentzel. in Exeges. i.

16. Spiritus Vitrioli antepilepticus Quercetani.

Spiritus Vitrioli viridis dictus, in Tetrade.

I. \mathcal{R} . \mathcal{O} m: destilla ut habeas seorsim phlegma ab \mathcal{O} m, eaque in quantitate sufficienti.

In phlegmate macerentur (in MB & 4. vel 5.) semina Hyperic. & Pæon. flor. Lil. Convall. Tiliæ, Calend. Rorismar. Hyperic. Rosar. aliquid. Ebor. C. Ci Crani humani, visci querni pro libitu, fiatque expressio quæ \mathcal{Q} etur. \mathcal{Q} ato eo imbue vitrioli recent lb. 1. vel ij. \mathcal{Q} aque in MB ac cohoba quater vel quinquies: tandem adjice \mathcal{O} m vitrioli servatum, \mathcal{Q} aque ex cucurbita per serpentinis in MB fervente:

Si benè operatus fueris (inquit Quercet.) solus \mathcal{O} m cum virore elicietur penetrantissimus.

Dosis gutt. 15. vel 16.

Spiritus Vitrioli antepilepticus Paracelsi.

\mathcal{R} . \mathcal{O} m Ungaric. vel Roman. elice phlegma cohobaque toties super \mathcal{Q} , donec eo penitus imbuatur. Tunc admisce ∇ opt. rectif. digere \mathcal{O} m unum ac alterum vase clauso, hinc destilla, Δ nudo gradatim aucto, donec \mathcal{O} m prodierint omnes, Extillato Liquori (à fecibus segregato) adde $\frac{1}{4}$ ∇ æ theriac. Camphorata, denuoque bis vel ter destilla.

Vires. Exhibetur in paroxysmo & ante paroxysmum.

Dosis. \mathcal{D} ss. cum liquore convenienti. Vide Querc. in Tetr.

18. Spiritus Vitrioli Antepilepticus compositus.

Videatur l. 2. c. 52. Elyx. Crollij.

19. Spiritus Vitrioli coagulatus.

\mathcal{R} . Terram sigillatam strigens. affunde Sp. vitrioli, stent in loco calido, ubi refrixerint. simul coagulabuntur, inque calido iterum solventur, &c. Hunc \mathcal{O} m coagulatum, si placet, inde \mathcal{O} æ vitreæ & destilla ex \mathcal{O} m ab it Liquor minus acidus quam \mathcal{O} m vitrioli: cohoba vice tertia, & nil nisi phlegma extillabit, adeoque \mathcal{O} m vitrioli in \mathcal{O} manebit conjunctus cum terra sigillata, qui in loco humido iterum liquescit.

N. Alii \mathcal{O} m vitrioli cum Sal. com. proprio digerunt, & hac ratione coagulationem conantur.

29. *Aliter cum Crystall.**Sal. nitr.*

℞. Sal. nit. Crystall. phlegm. vitriol. lian. ℥vj. solve, ac filtra, abstrahèque cando ad siccitatem: dein affunde abstractum hoc Phlegma ☉o adjungendo Sp. vitrioli lb. ss. abstrahèque in ☉, tum phlegma, tum ☉-m nitri in forma vaporum rubicundorum egredientem, donec rubedo cesserit; postea repone Qatorium cum restituant; Spir. vitrioli loco frigido & coagulabitur.

N. Quia Sal. nit. & ☉-m nexu non adeo amabili uniuntur, hujus usum nulli suadeo.

DE OLEIS.

Olea hic aqueos, non pingues liquores denotant, adeoque à spiritib. nisi crassitie differunt.

Sunt

1. ☉o dulce.

℞. ☉-m purificatum, solve in ☉o Tart. p. d. ac abstrah. Materiam relictam solve cum ☉-u Sal. com. atque redige in massam cum cremore Tart. [vel cum Saccharo cando, aliove Sacchari generi.] Hinc pellatur per ☉m.

Vires. Diaphoreticum est insigne, polletq. vi leniter adstringendi.

Dosis à gutt. 1. ad 3.

N. 1. Parum Olei suppeditat.

N. 2. Metallis seu crudis, seu in calcem redactis eadem ratione per ☉-m Sal. com. ac cremorem Tart. Oleo elici possunt.

Ex commun. Experiment. Dn. D. Dieteric.

2. ☉o Vitrioli rubicund.

℞. ☉ ad flaved. calcin. p. 1.

Silic. grossè contusor. p. ij.

V q. s. ut f. pultis instar.

Destilla per ☉m, sic rubicundum ☉o prodit. *Gluckraht.*

Usus ejus potius est in Metallurgia, quam in Medicina. Poterit tamen ☉o intrinsecus exhiberi, vide supra Spirit. Penoti.

3. Aliud rubicundum.

℞. Colchotar. part. iv.

Vini alb. generos. p. ij.

Fac ebullire ad siccitatem usque, postea tere & ex ☉ Δ aperto destilla primo phlegma, postea applica receptac. capaciss. ac juncturis benè munitis propelle forti Δ ☉o, instar sanguinis, rubicundissimum, *Gluckraht.*

4. *Aliter.*

Vitrioli calc. destilla cum Lythargyr. & prodit ☉o vitrioli rubicundum quod Podagricis prodest.

5. Aliud ex Terra Vitrioli.

℞. Feces seu Terram subflavam ☉i siccitam, [vide infra] destilla per ☉m Δ reverberii, ☉o dabit rubicundum, penetrantissimum.

Vires. Dosis, gutt. 6. ad 10. ad plerosq. affectus capitis perutile est.

N. Gutta 15. 21. (annotantibus quibusdam) vomitus expediunt. Tentz.

6. 4.

C. Aliud \odot , ex Sulphure \odot li.

Rx. Sulph. \odot -i (dulc.) misce cum dimidia parte Sal. Tart. Destilla per \odot m ∇ mque, ultimo adde suppressionis & prodibit \odot rubrum.

N. 1. Huic \odot o si instillaris \times precipitabitur $\frac{1}{2}$ spadicei coloris, quem edulcora ∇ frigida hinc sicca & serva.

N. 2. Præstantius erit, si flores ex Sulph. \odot -i elevatos receperis.

Vires. Prodest, sed efficacius in iisdem affectibus, in quibus Sulph. \odot -i. Vide suo loco.

Ex hoc Præcipitato fit Essentia seu Tinctura.

IV. SUBLIMATIO.

Unde.

1. Flores ex Terra Vitrioli, Substantia cuprea Vitrioli.

Rx. Terræ vitrioli nigra, [ex qua Sal. com. extractum,] vel Terra \odot -i ochrea $\frac{1}{2}$ v. misce cum \times part. 2. Sublima initio \triangle e lento dein majori, donec nulum amplius fumum ascendere videas. Sublimato affunde ∇ m com. collocaque in MB tepido \S 24. unde subtilis $\frac{1}{2}$ in fundo subsidet, iteratis ablutionibus edulcorandus.

N. 1. Hic $\frac{1}{2}$ igni fusionis subiectus, comburitur partim, partim in bonum cuprum funditur. Vide Basil. in repei. Lap. Ph. p. 153.

N. Eodem modo & Terra \odot -i \odot -tra-elatur, unde Sulph. combustile \odot -is. Kest. l. 1. c. 44. Eodem modo fit ex \odot . Ita ex Sulph. \odot -i fit narcot. Mannagetta.

Virus Substantia huius cuprea est, mundare plagas putridas, incarnare & cicatrices inducere, Sala de \odot .

2. Flores ex Sulphure Vitrioli.

Rx. Sulph. vitrioli (dulce) sublimasine additamento ex sublimatorio humili, paulatim id injiciendo alembico scil. ablato & rursus reposito.

3. Flores ex Vitriolo crudo.

Fiunt eodem modo, cum \times .

V. PRÆCIPITATIO.

Unde.

1. Terra Vitrioli ochrea.

Rx. \odot -i pur. $\frac{1}{2}$ v. solve in ∇ font. stetque aliquamdiu: sic vel sponte sua subsidebit Terra \odot -i instar ochreae.

2. Sulph. Vitrioli dulce.

Rx. Vitrioli puri $\frac{1}{2}$ v. solve in ∇ calida, solutione affunde guttatim $\frac{1}{2}$ Tart. [alii lixivium ex Fib. clavell.] & precipitabitur Sulph. vitrioli, quod edulcoratum exicca.

Vires. Confert affectibus pulmonum mundificat plagas putridas, cicatricesque inducit. Hartman. in Croll. Sala in \odot -tr. Tentzel. Kestler. 4. c. 69. 3. c. 10.

3. Sulph. Vitrioli purgans.

Rx. \odot -opt. $\frac{1}{2}$ v. affunde phlegma vitrioli, vel ∇ , destillat, ad eminent. digit. 4. stent in digestionem, & subsidebit Terra, filtra: in filtraturam instilla \odot Tart. p. d. & precipitabitur Sulph. vitrioli; decanta Liquorem & edulcora Sulph. ∇ tepida, atque exicca. Kest.

Dosis à g. 5. ad 10.

Eodem modo fit & Sulph. vitrioli ☉ purgans; illud sic solvendo in phlegmate vitrioli, defacando & præcipitando cum Ol. Tart. *Kesl. 1. c. 38.*

4. *Sulph. Vitrioli fixum seu triale.*

℞. Limatur. ☉ puriss. sine omni fere, p. 1.

Vitrioli Ungaric. cærul. aut vitrioli ☉ is, p. ij.

Trita misce & imbebe indendo in vitrum cum ✕, ut supernatet digit. 2. Coque & coagula ad siccitatem Δ ☉: in fine ad candescentiam usque urgeatur. Huic fere affunde aliud ✕ ad eminent. 4. digit. ac extrahe colorem f. a. In hoc tincto ✕ delitescit Sulph. vitrioli combustibile, [quod evaporatione & dulcoratione experiri poteris.] Instilla ☉ Tart. p. sic Sulph. vitrioli ilico præcipitabitur & figetur. Edulcora ▽ com. *Hartmann. in Croll. Tentzel.*

Ex hoc Tart. vitrioli fiunt Anodyna. Laudani nomine insignita.

Præcipitabitur & ☉ spadicei coloris, si ☉ ex Sulph. vitrioli dulci destillato ✕ instillaris. *Vide ☉ ex Sulph. Vitrioli.*

IV. SALIFICATIO.

Unde.

Sal Vitrioli.

Vitriolum Ungar. cærul. in ✕ bu-
lo calcina, donec in fere obscure
purpureum abeat. Huic ita calcina-
to, affunde ▽ com. sensim agitando
ne in fundo conglomeretur, donec ▽

[quæ calida evadit, ac si calci vivæ su-
perfusa fuisset,] refrigerescat. Stent
ita 24. & postea filtra per chartam, fi-
atque exhalatio super Δ lentum, do-
nec sal in fundo reperiatur siccum &
coloris quodammodo incarnati. Hoc
pulverisando in albedinem vertitur.

Idem Sal potest extrahi ex ☉o vi-
trioli in ☉at. ☉ residuo.

N. 1. Si ☉ calcinatum non fuerit
nigropurpureum, sed tantum instar Bolis
Armeni, nihil extrahes præter ☉ ejus-
dem coloris ut fuit antea.

N. 2. Terræ residua (corpus exanime
vulgo) maxima est virtutis in Diarrhæa
& Dysenteria.

Vires. Sala vomitorium hoc ad
Cælum usque evehit, in Epilepsia, aliis-
que cerebri Symptomatibus ex corruptis
& acribus è ventriculo sursum actis va-
poribus ortis. Item in Pleuresia, Fe-
bribus pestilentialibus, Lypothymi, à
repletione humorum corruptorum, &
effervescencia bilis circa orificium ven-
triculi, in Epate, Liene, & Renibus ob-
structis.

Item Sal naribus inspiratum sternu-
tationem egregie ciēt, citra vim cere-
brum seorsis suis excrementis expe-
diens.

Dosis à ℞. ad ʒ℞. vel ʒij.

*Salain Tern. Emetolog. Querc. in Te-
trad. & in Pharm. rest. cap. de vomitivis
Senn. Inst. Beguin.*

N. Sal Vitrioli ex solo ☉o ex quo flo-
res Sulph. elevati sunt à ℞. ad ʒij. exhibi-
tus (in ▽ fenic. vel vino,) conciliat fa-
cillimè

exillimè vomitum, interdum & sedes, & sudores. Hartman. in Croll.

VII. EXTRACTIO.

Unde.

TINCTURÆ seu ESSENTIÆ
SIMPLICES & EX-
TRACTA.1. Extractum Vitrioli Narcoticum,
anodynum.

Rx. Vitrioli pulverisat. ac lento calore ad albedinem usque exiccat lbss. affunde \forall opt. rectificat, ℥xxx . [N. Nulla humiditas præter \forall accedat, vasque sit siccissimum, alioquin incassum laborabis.] Sepelito in fimum equinum per mensem. Decanta postea à fecib. absque perturbatione, & destilla in MB ad resistantiam usque liquoris flavi ℥o dato non absimilis. Tunc cessa, & quod prolectum est, serva. Liquorem restitantes benè occlusum quoque in usum repone, qui pretiosum Extractum est.

Vires. Extracti illius usus est narcoticus & anodynus, nec potentia opio cedit, sine periculo tamen reprimis & coagulat vapores subtilis venenosos, Epilepsiam causantes, idque specificè.

Dosis à gut. 6. ad 8. & 12. cum Liquore conven. Salain ℥ .

2. Essentia Sulph. Vitrioli.

Rx. Ferem spadicei coloris (vide ℥ ex Sulph. Vitrioli) digere cum \forall in loco calido, (vase clauso) ℥ 8. sic dulcissima Essentia Sulph. vitrioli tandem supernatabit in forma ℥ ei,

quàm à \forall separa per tritorium & serva.

Vires. Hac dulcissima Sulph. Vitrioli Essentia aequipollet viribus suis Tinctura ℥ y, & mirabiles effectus facit in ∇ Mellissa, noxios humores totius corporis expellit per insensilem transpirationem, venærem stimulat, uterum roborat, ejusq. motus inordinatos sistit, & in utroq. sexu prolificam vim seminis ad liberorum generationem operatur. In ∇ Petroselin i-dem bene præstat, sed insuper Hydropem curat.

Usus autem istius Essentia aliquamdiu continuandus est.

Dosis g. i. usq. ad 4. Hartm. in pract. loco de Lepra, Tentzel. de Sulph. Vitrioli Kesh. 4. c. 69.

2. Alia Tinctura, Manna Vitrioli dicta.

Rx. Vitrioli purificati q. v. extrahe Tincturam, digerendo cum ℥ u Vitrioli subtilissimo Essentificato, i. e. proprio Sale alcolifato, filtra, coagula, & habes Manuam seu Tincturam vitrioli flavam.

N. Hanc Tincturam, si cum \forall circula-veris, ℥ supernatabit, quod per XX ℥ a-tum, ac iterum cum \forall circulatum fragrantissimum evadit.

Vires. Nec minores vires habet, nec minorem laudem meretur, quam Essentia Sulph. præcedens.

4. Tinctura.

Rx. Vitrioli viridiusc. quant. satis magnam; educ phlegma ac ℥ m per E cum educto Liquore, ex ℥ o extra-

extrahe f. a. (etiam in loco frigido, sæpè tamen commovendo;) Tincturam viridiusculam, quam cautè decantatam destilla ad mellis consistentiam atque aëri frig. ut in Crystallos concreseat, expone.

N. Si menstruum ac extractionem requisitum deficiat, Ratione id abstrahere ad extractionem continuandam.

R. Crystall. proximè præcedentium lb. iij. vel iv. &c. circula cum V opt. rectific. vase H. C. Deinde destilla per XX ex ☿. Hinc cohoba. Insuper affundendo ☿m ☿i, & aque per ☿m gradatim & 4. ut extillet post ☿ & ☿ rubicundum V abstrahere in MB; ☿m ☿i, in Fere, & restat ☿ seu Tinctura rubicundissima.

Vires. Admirandarum est virium adversus omnes aggritudines, in crassiore materia sedem habentes. Quercetan. in Tetrad.

5. Tinctura Magisteriata seu Magisterium ☿i.

R. Tincturam præcedentem, conjunge cum proprio suo ☿u ☿i, (qui inde abstractus,) digere aliquamdiu, sic dulcescet. Quercet.

Vires. Remedium est nunquam satis laudandum idque præcipuè, si ☿ philosphicè solutum adjectum fuerit; prodest enim adversus Epilepsias, astralesque omnes affectus, Apoplexiam, Paralyzin, Vertiginem, Maniam, Ecstasin, Syncopen, Cachexiam, Hydropem, Calculum.

Dosis gutt. una ac altera. Quercet. in Tetrad.

6. Eadem Tinctura, Aliter.

R. Sal. com. ☿i (ex ☿o illo reverbato extractum ac) opt. depuratum, q. v. affunde ☿m ☿i (in præparatione Tincturæ reservatum,) ad eminent. 2. digit. digere ac destilla, hinc novum ☿m affunde, digere, destilla, idque repete donec pars volatilis superet fixam, secum evehat atque Sal. com. fixum volatilifet. Hoc Sal. com. ☿i sublim. imbebe ac incera cum ☿o seu Tinctura illa, digereque in Athanore per gradus ut uniantur, & per colores ad purpureum tandem deveniant. Est opus aliquot mensium.

Vires. Est Elixir seu Medicina universalis, summè penetrans ac fixa, ad curationem deploratissimorum morborum sufficiens.

Dosis gr. i. ac altera. Quercetan in Tetrad.

Mediante hoc ☿i lapide reducitur ☿ in suam primam substantiam, unde tandem exurgit Medicina universalissima. Vide ibidem in Tetrad.

7. Magisterium ☿i.

R. ☿i opt. q. v. Retur more usitato, ☿ cum ☿o per ☿m simul rectificetur. Cum phlegmate (vel ☿ ☿ar.) Sal. com. ex ☿o extrahatur, phlegma ☿ando à Sal. com. separetur, cum aliquot cohobiis & digestionibus,

Hinc.

R. Sal. com. p. ij. ☿ vel ☿ ☿i. p. i. Ponan-

Ponantur in phiola in MB, ut aquositas exhalet; idque tantisper repete, donec Sal tantum & ei imbiberit, quanti ponderis primo fuit. Hinc in phiola hermetice clausa 8. & digeratur, tandemque in E colloceatur 14. & ad coagulandum. *Sennert. Insistit.*

8. *Magisterium ex Tinctura & Spiritu Vitrioli.*

¶. Om in se calcinatum; extrahe tincturam affundendo ✕ optimum: ✕ tinctum decanta, & aque ad siccitatem, & manebit in fundo Pulvis rubicundus, quem pone in Om adhibito receptaculo grandi, dando Δ per grad. decentes, egredietur ~ flavus, postea rubicundus; continuetur Δ eodem gradu, donec appareant ~ albi, tunc cessandum. His spiritib. imbue Terr. in Om resistentem, (potius Sal Com. ex Terr.) digerendo, imbuendo, donec ~ & anima proprio corpori restituantur. Hæc tandem in vase H. clauso digere quadragint. & 8, donec figantur.

9. *Tinctura Vitrioli Cyprii seu Magisterium & is.*

1. Digeratur vitro clauso per duos menses Δ gradatim aucto, donec varii colores appareant, postea flavedo supremaque rubedo, hac enim viâ viriditatem Leonis custodies & ad exteriora vertes 2. Tincturam ab hoc Leone cum V extrahe. 3. Divide eam in partes secundas. Una desiccetur & sanguis restans in formâ pulv. figatur per gradus in Terram rubram. 4. Partem alteram Tincturæ liquidæ, putrefac. per 3. hebdom. abstrahere per cohobationem, cum reliquo V tincto eundem processum servando. 5. Liquorem remanentem urge per Om, donec Oleum benedictum exeat, quod aliquoties rectifica. 6. cape Terræ superioris fixatæ p. ij. Ol. benedict. Vitrioli part. i. sigilla vas. H. S. digere in cineribus, donec animam suam corpus receperit coagularitque, tunc novum Ol. suffunde, coagula ut prius per 10. &. Tandem fige ad quartum usque gradum Vulcani, & per 3. &. in fluore detine. Habebis Lapidem rubrum, fixum absque fumo, tingentemque summam medicinam.

Ex commun. S. Closs.

CAPVT XXVII.

De Arsenico.

REstant è mineralib. secundariis mineralia sulphurea ac inflammabilia.

Hæc sunt ex peritomatic ma-

crocosmico pingni, respondente in Phytologia, Oleis, Resinis, Gummatibus, in Zoologia pinguedini a-xungiaque abundanti, excrementis

Aaaa

tisv

risvè pinguedinem referentib. v. gr. aurium.

Suntq.

1. Arsenicum, 2. Sulphur, 3. Ambra, 4. Succinum, 5. Sperma Ceti, 6. Asphaltum, 7. Naphtha, 8. Petrolæum, 9. Carbo Petræ, 10. Gagates.

Arsenicum.

Arsenicum fuligo sive succus est mineralis, pinguis, inflammabilis.

Dicitur & Auripigmentum. Græcè *Ἀρσενικόν, ἀρσενικόν*. Arabicè Harnet & Zarnich, Germ. *weiß Mattenpulver / Hüttenrauch*.

Genera ejus tria recensentur, album videlicet, (Arsenicum in specie sic dictum, seu arsenicum Crystallinum,) Citrinum seu Flavum, (Risigallum Auripigmentum,) & tertio Rubeum Sandaracha.

Ex his album in Medicina usitatissimum est, fulvum rarè, rubrum rarissimè. Eligatur album Crystallinum, ponderosum, durum, purum, ad lacteum colorem tendens.

N. Arsenicum Crystallinum factitium est, fitq. sublimando ex auripigmenti scabe & sale anaticè mixtis, Auripigmentum & Sandaracha nativæ sunt, nec differunt, nisi quod Sandaracha auripigmento sit magis in terris excocta.

Vires. Inter Venena loco hand ultimo Arsenicum recensetur, nec immerito, quippe præter summam acrimoniam, tanta quoque malignitate vitæ nostræ Balsamo infestum est, ut non modo intus as-

sumptum, sed & extrinsecus adhibitum horrenda Symptomata introducat.

Qualia sunt.

Convulsiones manuum ac pedum stupiditates, sudores frigidi, palpitationes, deliquia cordis, vomitiones, corrosiones ac tormina, sitis, æstus, &c. *Exempla vide sis apud Salam. in Ternar. Bezoardic. c. 27. apud Schenck. & alios.*

Verum enim vero nec facultatib. caret utilib. quas intrinsecus in curanda peste reliquisque venenatis affectib. ut & in scabie maligna, canarosa, &c. conferre potis est, modo qua decet ratione præparetur.

Extrinsecus adhibetur ad partem quamvis pilis denudandam, nonnunquam & cauteriis, amuletisque admiscetur.

Auripigmenti & Sandaracha Vires eadem ferè sunt, nisi quod in Arsenico paulum sint mitigatiores, idque ob sal in præparatione ejus accedens.

N. Sandaracha Arabum est Gummi Juniperi.

PRÆPAR.

Præparationis scopus eò dirigendus est, ut acrimonia mitigata dulcescat, auraque maligna & volatilis separetur. Hic scope media destinata reperimus, sublimationem, fixationem, & liquationem.

SUBLIMATIO.

Vnde.

1. Arsenicum dulce.

℞. 〇〇 crystall. q. v. sublimaper se, dein-

deinde in ☿ opt. horar. 2. spatio de coque [sic enim sua nigredine & farina quadam levi atq; corrosiva spoliatur.] Postea cum squama aris, (Rupffer schlag /) iterum sublima. [quæ venenum illius crassius atque nigrius retinebit.] Tandem bis ac ter cum Sale commun. præparato sublima, postea perfecte dulcoretur.

N. Illius perfectio ex eo cognoscetur, quando Metallis injectum, candorem illis conciliat & indit perfectissimum, qui remanet etiam in iis, postquam ignita fuerint: Cum tamen ☉ crudeam eadem nigrefaciat, atque fumo quodam in festo, quem oculus & olfactus non sine noxa, & incommodo sentire possunt, continet & inficiat.

Vires. Tantum abest quod assumentibus noceat, ut quoq; benigne & sine ulla perturbatione ea venena expurget, quæ aliis Cathartici nullatenus cedunt.

Ufus. Daripotes illius sublimati substantia, in infusione ad pondus 5. 6. 7. 8. granorum. Querc. in Alexica.

Potest & per deliquium in ☉ redigi ulceribus uile.

Aliter.

2. Rubinus Arsenici diaphoreticus.

R. ☉ q. v. sublima bis vel ter in Arena, semperque separa & erem subtilissimum. qui in cucurbita instar farine volatilisa adhæret. Est enim ☉ i venenum, partem Crystallinam misce exactè cum flor. Sulphur. ana & sublima.

Vires. Est specificum in affectibus pulmonum ex crassis catharris. Datur quoq; ad sudorem ciendum, in morbis malignis & venenatis.

Extrinsecus si adhibeatur, curat omnia ulcera maligna curatu difficilia.

Dosis à gr. 5. ad 8.

N. ☉ hac ratione præparatum ad Dj. secundum Tentzelium exhiberi potest. Tentzel. in Exeg. Querc.

Eodem modo potest parari & Rubinus ex auripigmento æquali dosi, & ad similes affectus adhibendus.

Arsenicum sublimatum.

R. ☉ Sal. Com. tost. colchotar, limatur ☉ an. M. sublima q; dando Δ m per gradus, quod sublimatum est, tum novis speciebus misce, & ut prius sublima, idque repete. Basil.

FIXATIO seu CALCINATIO.

Unde.

1. ☉ fixum, & exinde ☉.

R. ☉ Crystall. [vel ☉ illius sublimati,] Sal. Nit. purific. an. [alii R. ☉, part. 2. Sal. Nit. part. ij. Alii ☉ Sal. Nit. Tart. an.] M. ac in jice per vices in ☿ bulum versa que spatula, [cavendo fumum,] donec cesset Ebullitio. Postquam cuncta injeceris, da Δ m fortiss. per 8. 4. 6. [alii ☿ integrum] Tandem edulcora, Sal. Nit. calida Δ separando remanebitque in fundo ☿ albusissimus ☉ i fixi. Basil.

N. 1. Feliciter hac calcinatio procedet inter duo ☿ bula luto connexa, cum spiraculo ad fumum egressum.

N. 2. Müllerus tertia vice calcina-

Aaaa 2

40-

tionem illam cum Nit. ana repetit, & erem
singulis vicibus ∇ dulcorando.

Vires. Inservit Oleo per deliquium
preparando ad vulnera, ut ss ss fixo
sudorifero.

Eodem modo potes procedere
cum Realgare argenti, Cadmia, & si-
mul.

R. ss ss arsenici fixi, q. v. imbi-
batur ss Tart. p. d. aliquoties, (ter.)
Denique dissolve materiam in aqua
vitæ ut extrahatur & separetur totus
Sal, & restabit ss alb. & fixus, quem se-
para.

Vires. Sudorem movet, datur cum
Theriaca.

Dosis. g. 3. 4. 5. Müllerus in miraculis
Chymicis. Querc. in Spag.

3. Regulus ss ss ss
s. Closs.

\mathcal{L} huius vel illius ss Sal. Nit.
& Tart. simul detonatorum per ac-
censum carbonem ss i. limat, & ss iv.
puly. carbonum ss i. M. fundantur in
 ss lo & regulus concutiendo ad fun-
dum depellatur, qui purior est quàm il-
le ss ii.

N. Ex hoc Regulo in flores ss ato per
putrefactionem cum salibus resuscitanti-
bus ss ss fieri volunt ss um ss corpo-
ralem. Fides sit penes Experientiam.

LIQVATIO.

1. ss ss ss Anodynum, Butyrum
 ss ss Liquor. ss

R. ss ss ss fixi, q. v. dissolvatur
in cella per deliq.

Vires. Conducit venenatis ulceribus in
Lue Venerea, Cancro, Serpigine, ani fi-
stulis, morfu canis rabidi.

Ufus. ss ss ss illius, [vel ss ss ss],
tantum in ∇ plantag. vel persic. solvi-
tur, ut mixtura ipsa gustu lingua tolera-
ri possit. Aquâ illa lavetur vulnus s.
ulcus.

N. Basilins in rep. L. Ph. addit Sal
Com. Tartari ss ad liquefcendum expo-
nit.

2. Aliter.

R. Butyr ss ss ss .
 ss Mirrh. ss j. Misc.

N. 1. Paracelsus l. de mort. rer. nat.
hanc ss ss fusionem cum Sal. Nit. lique-
factionemq. subsequentem in cella, mor-
tificationem vocat, atque ss ss Realgaria
 ss ss simili modo mortificari posse perhi-
bet.

N. 2. Quercet. in spagyr. preparatio-
ne preparationis ss ss datas anygmaticè
describit, quas enucleavi in Querc. redi-
vivo.

DESTILLATIO.

Spiritus ss butyrum ss ss .

Fit ex parte una ss ss & ss ss ti
part. ij. destillatis per ss , ut fieri solet
in parando butyro ss ali; primo egre-
ditur spiritus subtiliss. semper fumans,
& sub finem liquor crassus, qui in aqu.
communi præcipitatur vel in suo liqua-
mine servatur.

Vires. Spiritus dicitur, item solve-
re ra-

ve radicaliter, tincturisque ingressum prabere in corpora metallica. Butyrum vero est Septicum violentum Cancrorum ulceratorum eradicativum, debet autem ei par quantitas opii ad sensum doloris

obtundendum permisceri, & ex filo carpto circumcirca admoventi cum defensivis convenientibus.

Ex S. Clossao.

CAPVT XVIII.

De Sulphure.

Sulphur est Refina sive pinguedo Terræ, Chalcantosa aciditate gravida.

Dicitur, Arabicè Cibur vel Chybur, Crybit, Rabric. Albusao: Chymicis, Akiboth, Ahusal. An. Anerit. Anerick. Alerick. Kibrith. Kaprili, Lamare, Tifasum, Tin, Ulsfur, Græcè Θείον. Germ.

Schwefel.

Sulphur tum nativum, tum factitium Officinis in usu est.

Nativum ex terra effoditur, purum solidum, interdum scissile, venitque nomine Sulphuris vivi, seu άπύου i. e. Δm non experti. Huc spectant stiriæ native arifodin.

Factitium vel ex vivo Sulphure impuriore, pyritevè vi Δ educitur, vel ex aquis Sulphureis excoquitur.

Sulphur caballinum quod in Officinis dicitur, feces sunt coctione sulphuris vivi impuriore relicte & in urceos admixtis nonnunquam squamis & transfusa.

N. 1. Adhaerescunt quoque interdum q. stiria Sulphurea camino, ubi Δm ex sua venacoquitur, quæ nihil aliud sunt, quam Sulphuris flores ex Vitriolo dum

excoquitur, elevati. Horum copiam exhibet Succia sat magnam.

N. 2. Exhibet Chymia & Artificialia Sulphuris genera ex Q. & S. C. Hæc quidem longè reliquis præstant, verum quia rara & chara sunt, rarissimè Chymicis præparationibus vulgaribus subijci solent.

Delectus.

Eligatur Sulphur. purissimum colore virescens, facile inflammabile, luculenter ardens, fumumque magis cæruleum halans.

Vires. Calidum & siccum est pectori dicatum; aperit, incidit; putredini, veneno, venenatorumq; animalium moribus resistit, provocat sudorem, &c. Hinc conducit in Phthisi, Tussi, Asthmate, Pestilentia libuq; febribus. Extrinsecus discutit tumores duos, sanat lichenes duros, pruritus, &c. Fumus epilept. excitat & hyst.

PRÆPARATIONES.

1. Sublimatio. 2. Præcipitatio. 3. Destillatio. 4. Infusio & Extractio. 5. Liquatio.

Aaaa 3

1. SUB.

1. SUBLIMATIO:

Unde.

Flores Sulphuris.

Flores Sulphuris nihil aliud sunt, quam Sulphur à terrestribus excrementis per sublimationem purificatum.

N. Nonnunquam tamen & aliis imprægnantur.

Sublimatio Sulphuris fit in arena calore mediocri gradatim adhibito, ex cucurbita terrea, cui XX vitreus sine luto imponitur, ut auferri sc. ac post exemptos flores iterum reponi possit.

N. 1. Orificium cucurbitæ interea temporis, quo flores eximuntur probe tegatur, ne aëris irruptione Sulphur, [quod facile accidit] incendatur. Cuius rei gratia non abs re foret, duos in promptu habere alembicos, quorum alter alterius vicem sine mora subire possit.

N. 2. Alembicus ante impositionem ad Δm caleseat, quippe secus facile dissiliet.

N. 3. Rostrum XXi recipiens apponi potest, ad liquorem acidum, qui primo egreditur excipiendum, Liquore egresso rostrum charta obturare licet.

1. Flores Sulphur. simplices.

R. Sulphur. grossè (si libet) contusi q. v. impone cucurbitæ terreae, vel vice una, vel per vices, ac paulatim. Sublima q; in Arena, ut dictum, igne moderato. Primo exit aciditas, quam Excipulo excipe ac serva (de qua infra,) secundo, sublimantur flores flavi, &c.

N. 1. Alii admiscunt, Sulphuris lb. i. farina laterum lb. β. Alii à terra sigillata sublimationem instituunt, vel à bolo.

N. 2. Si Sulphur fortuito accendetur, farina vel cinere injecto extinguere flamma poterit.

N. 3. Cavendum ne ∇ nimium incendatur, adeoque non excedat calorem, qui alembico manum imponere permittit.

Flores Sulphur. Gl. ii.

R. Sulphur. flaviss. lb. i. Sal. Com. fusi & Θi calcinati an. lb. β. pulveriscentur & misceantur. F. Sublimatio ut dictum, dando initio ignem lentum, post aliquot horas (3. vel 4.) phlegma incipiet stillare & durabit per horas 4. vel 5.

N. 1. Δ augendus est sensim magnis carbonibus, ut tandem Catinus in quo arena continetur, rubeat.

N. 2. Calor si sit nimis excessivus, non flavo, sed nigro colore Sulphur ascendit.

N. 3. Alii.

R. Sulphuris Θi calcinati & Sal. Com. ana. quæ ponderum diversitas neminem turbet, modo Δ m rite adhibeat. Additamenta enim quo pauciora fuerint eo. Δ sufficit mitior.

Quercetanus non nisi colchotar anaticè addit, omisso Sal. Nit.

N. 4. Flores cum novo additamento Θi & Sal. Com. ut ante sublimari possunt, idque vel vice tertia, quippe quo sapius flores eleuantur, eo plus tenuitatis acquirunt, purioresq; evadunt, non tamen sine immixtione quantitatis.

Vites. Resistant putredini, cient sudorem

dorem, exiccant, &c. Hinc prosunt in peste, pestilentialibusque febribus, siue curandi, siue præservandi gratia adhibere libeat. Exhibentur quoque utiliter cazzarhosis, pulmoniacis, tussientibus, & similibus.

Dosis robusto ℥j. juveni ℥ss. in præservatione autem non excedimus ℥ss. Exhibemusque commodè cum Extracto Enule campane.

3. Flores Sulphur. gummati seu myrrhati.

℞. Flor. Sulph. composuit. ut ante ℥ss.

Colchotar. ℥vi.

Sal Com. fuli ℥v.

Mirr. Alexandr.

Thur. an. ℥iii.

Aloës succotr. ℥iv.

Mastich ℥ij.

Croc. ℥ss.

Omnia trita simul atque benè mixta sublima l. Δ. post horas aliquot, exime flores, rursus alembicum impone, Δm continuando per hor. aliquot (12.)

N. 1. Alii ℞. mox intro Sulphur. pulv. ℥b. i. Calc. & ana ℥v. Aloës Thur. Myrrh. à ℥ij. Floresq. cum novis speciebus 2. vel 3. vicibus sublimant. Senn. Inst. Paracels. volum. 1. p. 1046.

N. 2. Feliciter procedunt, qui floribus Sulphuris jam factis, species solummodo admiscunt. Vix enim quicquam citra combustionem ex gummatibus unacum Sulphure ascendet.

N. 3. Imponenda est materia per vires, si enim nimium imposueris, combu-

ritur materia sufficiens, 3. vel 4. digitorum crassitie, singulis vicibus imposuisse.

Vires. Efficaciores sunt quam simplices, tum exiccando, tum putredini resistendo.

4. Flores Sulphur. Saccharati.

℞. Fl. Sulphur. misc. atque sublimacum Saccharo candido.

Vires. Majus auxilium conferunt ad asthma, aliasque affectiones pulmonum, quam vulgares. Quercet. in Pharmac. rest.

5. Flores Sulphur. albi.

℞. Sal. Nit. purificat q. v. liquefeat in ✕, postea injice per vices Sulphur. pulveris. [ut in Lapidis prunella præparatione] idque tam diu, donec Sal. Nit. in ipso igne coaguletur. Ignem postea auge, operculatoque ✕bulo etiam Δ supra accende, idque continua, horis duabus.

℞. Ergo hujus Sal. Nit. fixi, p. 1.

Sulp. Elect. ij.

Misce optimè & sublima Δ Arenæ.

Vires. Lacti Sulphuris, viribus ac potestate æquivalent. Senn. Inst. Tentzel.

6. Flores Sulphur. Corallati.

℞. Corall. ℥b. i. Fl. Sulphur. ℥iv. tere minutissimè & misce: sublimaque ut dictum ∇m profluentem seorsim primo collige dein flores.

N. Sulphur sic secum trahere dicitur subtilissimam Coralliorum substantiam.

Vires. Habentur præstantiores quam vulgares Sulphuris flores, & si ex his Balsamus fiat Sulphuris, optimus pulmonum Balsamus perhibetur.

7. Flo-

7. Flores Sulphur. benzoinati

Fiunt duobus modis: Vel sublevando \times omni horâ interea dum sublimantur flores Sulphur. & in cucurb. 3j. pulv. benzoini projiciendo, vel collocando flores jam factos in patinâ terream vitreâ, in cujus medio scutella Terrea promineat, cui inditur ferum incensum igne, moxque injiciuntur particulæ benzoini, contegitur patella, ut fumus flores reverberet, sicque iteratur ferri accensio, & benzoini projectio, donec sit satis, quo facto teruntur flores Sulph. cum floribus benzoini exaggeratis, servanturq; tanquam odoris jucundi, majorumque virium

II. PRÆCIPITATIO.

Unde.

Lac Sulphuris.

Lac Sulphuris, Magisterium Sulph. est, seu præcipitatum.

N. Aliis dicitur cremor Sulphuris, alii Butyrum.

Paratur autem 1.

℞. Fl. Sulphuris, p. i.

Salis Tartari, p. iij.

Pone in vitro oris capaciss. (sive in olla fictili) in arenam collocato, affunde ∇ ad eminent. sex digitorum ita tamen, ut quarta pars vitri sit vacua, hinc bulliant, ut Sulphur solvatur, [quod 5. vel 6. horis fiet,] spatula lignea continuò agitando, donec ferè omne Sulphur solutum sit, liquorque

rubeus appareat. Hinc filtra calidè per chartam Emporeticam, ac effunde confestim vinum austeriusculum, [alii \times .] lentè, celeri tamen lapsu, tamdiu donec colorem lacteum acquirat, qui ad fundum paulatim secedit, nomine lactis: Lac hoc ad fundum præcipitatum, affuso liquore collige, abluè ∇ a & exicca, vel si placet, antequam plane exiccet, misceatur cum ∇ cinam. vel alia appropriata, ut fiat instar pultis vellactis, &c.

N. Si ∇ bulliendo evanescit, affundatur alia, sed fervida.

2. Modus compendiosior.

℞. Tart. & Sal. Com. Sulphuri liquefiant in \times o per d. simul liquefactis affunde aliquid aquæ calidæ, mox affunde in patinam ∇ calida plenâ & statim filtrentur, affundaturque paulatim vinum; sic totus liquor albescet atque lac ad fundum præcipitabitur.

N. Quercetanus dissolvit flores Sulph. in oleo Tart. dissolutionique affundit \times præcipitaque, &c.

Vires. Balsamum est pulmonum ac velut Δ consumens & exiccans. Exhibetur igne utiliter his qui molestantur Catharris, fluxu Capitis, Asthmate, Phthisi, Tussi, Colica, &c. Promovet expectorationem intercepti defluxiones ad articulos, ventosiates ventriculi ac intestinorum præcavet ac discutit.

Dosis. Tantum pulveris miscetur, ut vehiculum albicante calore tingatur, daturque mane & vespere cochl. i. Vehiculum sit appropriatus liquor, A
qua

qua scil. Cinamomi, Melissa, V &c.
N. Quercetanus exhibet ℥j. proca-
tharico.

3. Lac Sulphur.

S. Cloff.

Coque in cacabo ferreo Ψ part. ij.
Sulphu. pulver. part. i. cum maxima
quantitate aq. donec partes 3. aq. sint
consumptæ, ruboremque contraxerit
instar sang. ex Sulphure dissoluto, cole-
tur calidè per manicam refrigerari per-
mittatur, deniq; præcipitetur ☐ calen-
te, & decantato lixivio Lac. 10. aut 12.
aq. calidâ dulcoretur.

Vires, Eadem qua lactis Crolliani, ve-
rum quia interdum fallit, parumve præ-
cipitatur, hic modus infallibilis adinveni-
endus fuit.

III. DESTILLATIO.

Unde.

1. Spiritus Sulphur.

S. Cloffai.

Eligatur Sulphur. Leodiense coloris
virescentis minoris tubi sive magnitu-
dinis (Galli vocant du source verda pe-
tit canon) tale enim per se luculenter
ardet, locetur per magdaleones in scu-
tellâ intus & extus vitreatâ, accenda-
tur ad candelam, ut guttulæ liquati
Sulphu. & ardentes, alios magdaleones
incendant, huic scutellæ Campana ex
arte appendatur, ita ut verticem illius
flamma non attingat, nec etiam nimis
distet, (gignitur enim hoc oleum
ex reverberio flammæ subvolantis
contra aliorum opinionem) alias flo-

res acidios habebis, perge in substituen-
dis scutellis, donec fatis ~us campa-
narii habeas. Ex lib. 1. Sulph. nancisce-
ris ~us ℥j.

Spiritus. Oleum Sulphuris,
per C.

Habendum est vas vitreum latum
paropsidis vel patinæ instar, è cujus
medio surgat meta, [tripus vel aliud a-
liquid metæ vices supplens] supra me-
tam concha vel ☩ bulum statuatur
Sulphure repletum. Desuper campa-
na suspendatur vitrea, ea distantia ne-
flamma illam attingat; sic fumus ex
Sulphure accenso ascendens in campa-
na condensabitur, condensatusque ex
campanæ oris in suppositam patinam
decidet.

N. 1. Si conclave fuerit clausum, lo-
cusque ac tempus humidum, major olei
quantitas colligitur.

N. 2. Utile est campanam, initio ma-
desacere.

Alius modus.

Idem Oleum per retortam tubula-
tam destillari potest.

Nimirum.

Retorta tubulata, vel quæ inpo-
stica parte tubulum habeat, in forna-
cem collocetur, eique recipiens ∇æ
mensura adimpletum, ut in Clisso, sine
luto adapteretur. Postea ubi incaluit Re-
torta frustula Sulphuris partitis vicibus
injiciantur, & post singula frustula in-
jecta tubulus claudatur: Spiritus postea
seu Oleum in MB ab ∇ separetur & re-
ctificetur.

Bbb b

N. Si

N. Si prorsus aërem denegaveris, sine frustraberis, id quod mihi accidisse scias, qui lactescentem liquorem loco Spiritus obtinui, omnis aciditatis experientia.

Vires. Spiritus Sulphur, ut ferè nihil aliud est, quam spiritus Φ , ita & eandem cum ipso vires obtinet. Insuper est & contra Pestem, Asthma &c. utilissimeque extrinsecus adhibetur in procidentia anisi illius paucillum cum ∇ , v. gr. plantaginis miscetur, & spongia hoc liquore madefacta locus affectus tangitur.

Vide Senn. Inst. Beguin. Gluckrath. Tenizel.

N. Ex residuis fecibus si in copia collecta fuerint, Sal elixivari poterit.

3. Spiritus Campanarius facillimus S. Closs.

R. Sulphur. viridis vel alterius pulveris. Zij . us Sal. Nit. vel us ex Sal. Com. & Φ compositi (vide supra cap. 21.) ad supereminentiam 4. digitorum transversorum. Quæ ex Δ in F subitus & supra positus ad ultimam usque guttulam. Cohobetur 6. aut 7. (quo plus, eo melius) Reperies in Δ ultra Zij . use jusdem amaroris, naturæ, facultatisque cum Campanario, viribus nitratii haud imminutis.

N. Etsi ad siccitatem videatur secretum fuisse menstruum, nihilominus Sulphuri inhaeret Sal causticum, quod dio expositum in um Sulphuris resolvitur, novo quotidie succrescente, nec a Campanario ullatenus differente.

3. Aqua acida seu aciditas, vel Phlegma Sulphuris.

Aqua acida Sulphuris appellari potest liquor ille acidus, qui in sublimatione florum, initio (parcè tamen) extillat.

Vires eandem cum spiritui precedente obtinet, verum quia minus efficax, raro in usum venit.

5. Aqua seu Ens Balsami Sulphuris.

R. Aquam acidam, quæ extillavit in sublimatione flor. Sulphur Φ tor. rectifica & conjunge in MB bullienti, cum ∇ acida quæ extillavit in sublimat. flor. Sulphur resinatorum.

N. Hac ∇ (quæ lactei coloris) seorsim colligenda est, ne misceatur cum oleo subnigro, quod subsequi solet.

Ullus idem qui florum, in peste, febribus, colica, obstructionibus ac aliis affectibus pulmonum. Croll.

6. Ol. Sulph. Balsameum.

Balsamo Sulphuris Sal tostum addere atque per Retortam destilla. Senn. Inst.

7. Ol. Sulphur. Linatum.

R. Sulphur citr. [lb. i.] maceretur & solvatur in Ol. Lini, (lb. i. s.) & fiet massa concretis sanguinis instar. Refrigerata materia destilletur per Retortam & prodibit Oleum rubicundissimum.

N. Alii addunt Φ calcinat. lb. ij . Mil.

Vires. Prodest ad ulcera ac in bonos pessilemiales maturandos.

9. Ol. Sulphuris aureum.

℞. Sulphur aliquoties liquefacti & in ∇ effusi lb. pumic. lb. β. misc. ut fiat massa ac destilla lento Δ. [N. ne des ignem inferius, sed supra & ad latus,] sub fine auge ignem, & extillat oleum instar O.

Vires. Exhibetur utilissimè in Cachectis obstructionibusque viscerum, praeservat à peste. Clar. D. D. Iohann. Tileman. P. Profess. Marburg.

10. Ol. Sulphuris rubrum.

℞. Sulphur, lb. i. ℥. lb. ij. per Retortam pelle.

Vires. Idem maxima est utilitatis in bubonibus pestilentialibus maturandis.

11. Oleum Sulphur. verum S. Closs.

Resolve ℥ij. Sulphur. rufi in lb β. spiritus thereb. clari, id quod fiet intra o super F, solutionem rubentem decanta, alium affunde, digere, separa inclinationem, feces (quæ erunt per paucæ) abjice. Tincturas Quæ Δ Arenæ lentissimo ex magna O, donec ferè omnem m. um thereb. recuperaveris. Guttulis autem rubris apparentibus mutetur recipiens & Δ paulatim augeatur, egredietur Oleum coccineum cum fœtore intolerabili, qualis est latrinarum, ultimò O ferè incandescente, spissum & obscurè nigricans. Hoc rectifica & separa à m. u thereb. superstite. Oleum autem vase clauso digere per mensem in MB, ubi fœtorem deponet, evedetque verus Pulmonum balsamus.

Vires. Est egregium. Vulnerarium introsumptum, curat ulcera interna, resistit suffocationi matricis, pesti, colica, catarrhus fluentibus, asthmatis, empyemati, urinam provocat. Dosis gut 3. in syr. conven. vel ori vitello.

IV. INFUSIO.

Unde.

1. Balsamus Sulphuris Terebinthinatus, seu Rubinus Sulphuris.

℞. Fl. Sulphuris O. ℥. ℥ij. Spir. Terebinth. ℥vi. vii. Digerantur in vase vitreo, donec solvatur Sulphur & spiritus Terebinthinæ rubicundus reddatur. Hinc decanta ac serva.

N. Quod si hunc Balsamum à suo solvente, seu spiritu separare volueris, affunde ∇ & destilla, sic spiritus una cum ∇ extillabit, relicto Balsamo infundo.

Vires. Excellentissimam Medicinam præbet contra Phthisin, quippe valet ad ulcera pulmonum consolidanda, praeservat à peste, aliisque morbis contagiosis: infertur quoq, Tinctura Sulphuris, vide infra.

Dosis à g. 4. ad 7. scil. si à suo solvente separatus sit, vel ad g. 20. cum suo solvente. Quercet. in Pharm. rest. Hartman. in Pract. Sen. Inst. Beg. &c.

2. Balsamus Sulphuris compositus, Balsamus vitæ.

℞. Flor. Sulph. lb. i. Myrrh. ℥ij. Aloës succotr. ℥ij. croc. ℥ij. pulveris ac digere cum m. tu Terebinth. ad emiment, digit. 2. affuso, decanta.

Bbbb 2

Vires.

Vires. Efficacius operatur quam simplex.

3. Balsamus Sulphuris ad externa qui Rulando adscribitur.

℞. Fl. Sulphur. vel Sulphur. pur. ℥j.
Oleum rapar. express. vel nucum lb. 6.
Vinigenerosi ℥ij.

Macerentur & 8. V lento. aliquoties agitando. Postea coquantur lente ad vini consumptionem. Tandem cola & serva usui.

Vires. In variis morbis à Rulando Balsamus hic adhibitus est. Vide ejus 11. Cent. 92.

N. Balsamum Rulandi aliter describit Unzerus tract. de Tartar. Vide & Balsamum Sulphuris Qlatum in Angel. Salatract. de Qlo.

4. Tinctura Sulphuris.

Postquam à Balsamo cum Terebinth. separatus, fuerit [modum separandi habet in Balsamo] affunde V & extrahe V in MB, & habebis Tincturam; digere atque à fecib. subsidentib. decanta.

Vires. Prestantiores affectus habet quam Balsamus.

Dosis gutt. 3. 4. &c.

N. Extrahit quoque ex sulphure crudo Tincturam citrinam V optimè rectificatus.

5. Tinctura Sulphuris S. Closs.

Infer in candens tigillum per cochlearia mixturam ex Sal. Nit. lb. j. Sulphur. pulver. ℥iv. comburantur Δ. forti, donec strepitus cesset, & in massam rubram mixtura denotata com-

pingatur, cui in pulv. redactæ Spiritus Vini Tartarificatus affundatur, extrahaturque Tinctura.

Vires. In peste, febribus, scorbuto, obstructionibus hepatis, pulmonūq; morbis.

Dosis gutt. 8.

6. Alia Tinctura.

Fac Caputellum ex Sal. Nit. in aqua soluto, in cuius lb. vi. bulliat per 24. horas Sulphur pulver. lb. j. filtretur liquori rubeus, & præcipietur cum aceto, in quo decoctum fuerit V ex Qlo. In fundo residet pulvis scarlatinus, è quo tinctura modo superius tradito, vel per cum thereb. extrahenda venit.

Est S. Closs.

7. Crystalli ex Tinctura Sulphuris.

Postquam per cum thereb. & V tinctura fuerit prolecta, ut dicitur artic. 4. p. 166. abstrahendus est V, dum restiter tantum pars tertia illius, quæ in cellâ collocatur, ubi nascuntur crystalli, in quibus residet Q. Essentia Sulphuris, dissolvantur iterum in alio V, & denuò coagulentur, quò magis ac magis ab odore gravi immunes reddantur.

Dos. g. 4. in liquor. appropri. tabellis electuar.

8. Sal Sulphuris.

Vel fit ex V cum Campanariis, de quo vide Keslerum artis, §4. Centur. 1. vel ex carbone nigro levi & foliato Sulphure post extillationem Olei veri (vide præcedentem pag.) residuo,

hoc

hoc Δ miti reuerberandum est ad albedinem.

Uterque modus parum Sal. Com. praebet, sed efficax aduersus verminationem remedium.

9. *Essentia Sulphuris.*

Re. Miner. Sulphuris q. v. affunde ∇ . (ex \oplus & Sal. nit.) solve, quoad poteris, Hinc abstrahes solum ad siccitatem, edulcoratumque reuerbera ad rubedinem saturatam. Hinc extrahe Tinct. cum ∇ , digereque donec Ess. Sulphuris à ∇ separetur instar olei, fundumque petat.

Vires. Magnarum est virium ad arcendam putredinem.

Dosis gutt. 6.

N. In hac Sulphuris Essentia si Myrrha, Aloe, aromatavè infundantur, atq; Tinctura MB extrahatur, dicitur Balsamus mortuorum.

Basil. in repet. Lap. Ph.

V. LIQVATIO.

Sublimatur Sulphur in sublimatorio sat alto Δ forti, sublimatum exponere liquationi in cella, aliquamdiu, Basil. d. l.

CAPVT XXIX.

De Bitumine ac Ambra Grysea.

Bituminis nomen generaliter denotat quodcumque minerale pingue. Unde & diversas sub se species comprehendit. Ambra scil. Succinum, Sperma ceti, tum quoque Bitumen in specie sic dictum; Napham & Petroleum; Carbonem petrae & Gagaten. De quibus sigillatim brevibus.

De Ambaro.

Ambarum Ambra, sive Ambara generaliter duo bituminis genera denotat, quorum unum, Ambra nomen communiter retinet, & ad differentiam alterius, Ambra grysea dicitur Alterum, Succini nomen assumpsit, de quo loco sequenti.

N. 1. Est \mathcal{E} Ambra nigra, de qua

maxima est Authorum inter se dissensio. Sunt enim qui vera ambra nativa speciem faciunt, quae reliquis sit imbecillior. Alii factitiam statuunt ex moscho, Zibetta, ligno aloë styrase & ladanis. Alii Gagaten, sub titulo ambra nigra vendunt. Alii succinum colore ad nigrum vergens.

N. 2. Est \mathcal{E} ambra subalbida, i. e. Sperma ceti.

Ambra Officinarum bituminis quoddam genus est, ex fontibus ac alveis maris ad littus eructatum. Germ. wolriechend Umber.

Optima censetur Grysea (seu coloris cineri) à fordib. purgata, odorata, laevis quæque acu perfossa succum pinguem resudat. Improbatur

Bbbb 3 nigra

nigra, candida valde, utpote dubio procul adulterata.

Factitia facilis cognitu est, odore scil. (quo res, ex quibus confecta est, prodit) tum quoque colore (quo plerumque nigra est) adde quod ∇ imposita citius mollescat, quam nativa. Vide Hernandez.

Vires. Calescit, siccatur, resolvitur, cor cerebrumque roborat, spiritus vitales ac animales sulphurea sua ac suavi exhalatione suscitatur rescatq; Unde haud rarus illius usus est in globulis illis fragrantibus ad infectum aërem corrigendum, spiritusq; ab infectione tutandos, formati; quos globulos inde Poma Ambra vulgus appellat. de quib. l. 2.

PRÆPAR.

1. Essentia Ambra.

R. Ambr. gryf. p. i. Ol. amygd. d. p. ij. impasta, ac. digere & aliquot postea exprime. Expressioni affunde ∇ rectificatiss. digere ac. destilla per arenam. Sic elevabitur cum ∇ Essentia quoque Ambra, relicto oleo

amygdal. in fundo. Abstrahie igitur ∇ leni calore, ad consistentiam olei.

Dosis g. pauca.

2. Species Diambra, vide in D.

3. Poma Ambra, vide lib. 2. c. 75.

4. Ambra Essentificata.

R. Ambra gryf. opt. part. viii.

Mosch. odoratiss. p. i.

Sacchar. albiss. p. i.

Omnia pulverisata cum Spiritu Rosarum ardentererantur optimè diutius, sæpius aliquid de Spiritu rosarum affundendo, attemperando & rursum reponendo, utque siccescat. Hinc rursus ut prius teratur, & servetur.

Vires. Omnium viscerum confortativum maximum est imprimis vim procreandi promovet. Dosis instar pisi minoris in Vino vel alio liquore. Hartm. in pract. & in Croll.

N. Flores Ambra habet Keslerus sub nomine gleba bituminosa.

CAPUT XXX.

De Succino.

Succinum nihil aliud est, quam Succus bituminosus, seu Resina terræ & arborum vetustarum optimè digesta, exinde in mare traducta atque ibidem præcipuè concreta.

N. Dum bituminosa illa substantia adhuc liquida est, varia sese involvere solent, ut musca, formica, &c.

Dicitur Arabicè Ambra citrina, Electrum, Chrysoelectrum, Carabe; Glessum, Resina terræ, Paracelso) Agstein / Bernstein / Gentar.

Delectum.

Succini genera etsi plura vulgo numerantur, album scil. s. flavum, & nigrum;

nigrum; attamen non nisi duo Offici-
nis nostris eo nomine veniunt. Album
scilicet & flavum seu Citrinum; nigrum e-
nim non datur nisi particulis, ad nigre-
dinem aliqualem inclinantibus, id nomi-
nis imponere velis. Utrumque quam-
vis laudibus suis haud destitutum sit.
Attamen præstat album, utpotè magis
digestum. Elligendum id ipsum cân-
didum, syncerum, suave fragrans. Huic
succedit flavum, quod præstat pelluci-
dum, quodque præ aliis attritu, suavem
halat odorem, nigrius enim (quod
nonnulli succinum nigrum, alii am-
bram nigram faciunt,) vilius est. Fla-
vum ad albedinem reduci potest hoc
modo.

℞. Succin. flav. e. gr. ℥. i. pone in cu-
curb. terream validam, super adde salis
marini (sic eo cares,) salis gemmæ, aut
salis communis opt. ℥. ij. superfunde a-
quæ pluvial. q. s. ad solvendum salem:
quo soluto, insuper affunde recentem
▽ fluvial. ebulliant superimposito XX-
bico cæco, (ne ▽ subito exhalare pos-
sit, non tamen firmiter cucurbitæ ag-
glutinato:) & p. 14. vel donec coctio-
ne illa album evadat.

N. Ne ▽ deficiat, identidem, alia
feruens superadicienda erit. Harum. in
Croll.

Vires. Calefacit, exiccet, roborat, ad-
stringe leniter, capiti ac utero imprimis
dicatum est. Hinc adhibetur utiliter in
Catarrhis, Epilepsia, Apoplexia, Lethar-
gia, Verigine, Suffocatione ac Insultatione

matricis, profusio sanguinis ac seminis,
quod ad naturalem statum reducit: In
stercora albo mulierum. Caterum globuli
succino ad oculorum defluxiones miro suc-
cessu auxiliari dicuntur, annexi occipitio.
Iidem etiam collo gestati præpediunt, ne
destillationes in guttur ferantur. Baptist.
Port. Matthiolus.

Uusus. Præcipue albi, etiam internus,
quam externus esse potest. Internus exhibetur
ad ʒ. usque.

N. Alii commendant pro amuleto in
peste, si eo pulsus saepe fricentur.

PRÆPARATIONES.

1. Præparatio. 2. Solutio seu Præcipi-
tatio. 3. Destillatio.

I. PRÆPARATIO.

Unde.

Succinum præparatum.

Præparatio Succini vulgari modo fit,
cum ▽ appropriata lævigando.

N. Querteranus in Ph. rest. c. 26. mi-
scet Succ. pulv. cum ▽ hunc desuper ac-
cendit, continuo agitando, & hoc 4. repe-
tit, tandem humiditatem Δe separat
residuum Succinum pulverizat, & servat
pro usu.

Vires. Eadem quæ supra.

II. SOLUTIO & PRÆ- CIPITATIO.

Unde.

Ma.

*Magisterium, Extractum,
Tinctura.*

℞. Succini pulveris q. v. affunde
 W rectificatiss. solve, decanta, ab-
 strahere in MB, vel præcipita cum ∇
 font. & remanebit in fundo Magisteri-
 um.

N. 1. Paracelsus.

℞. Carab. q. v. affundit circulatum,
 digerit in Fribus & P (6.) Hinc
 abstrahit ac cohobat, idque toties do-
 nec in fundo ☉ appareat, lib. 5. Archid.
 p. 81.

N. 2. Dicitur quoque potest Tinctura, si
 in forma liquidiuscula adhuc adserve-
 tur.

Vires. Magisterium hoc, ut nihil ali-
 ud est, quam pars purior ac resinosa, à
 crassioribus, sola solutione separata, ita
 easdem cum succino efficaciares tamen o-
 perationes obtinet.

Aliter.

℞. Succinum pulverisatum &
 parum tostum, affunde ✕ ac extra-
 he, Extractum præcipita cum Spir.
 ☉.

Vires. Sudorificum est ac diareti-
 cum.

*Magisterium Succini dulce
fixum.*

℞. Succin. alb. pulverisat subtiliss.
 q. v. affunde ✕ ad eminent. 4. digit.
 ebulliant in arena aliquot dies (si e-
 vaporaret, affunde novum) ut rubescat
 ✕. Hoc filtra & abstrahere, sic manet

magisterium in fundo. Hoc solve in
 ∇ (rosarum) filtra & abstrahere, idque
 vice tertia, tandem præcipita cum Spir.
 ☉ vel succo citri.

Vires. Sudoriferum est insigne, admo-
 dumque conveniens in morbillis, pleuresi,
 confortat cor, &c.

Dosis à g. 6. ad 12.

N. Ita etiam paratur Magister.

III. DESTILLATIO.

Destillatio exhibet oleum, Phlegma,
 Spiritum ac Sal: perficiturque vel sine
 liquore, vel cum liquore affuso, per cu-
 jus virtutem scil. aliquantulum digera-
 tur ac solvatur.

N. Oleum non ascendit, quamdiu a-
 queum adfuerit vehiculum, ideoque si o-
 leum expetatur, sine ∇ destillatio peragi
 potest.

E. gr.

℞. Succin. grossè triti, q. v. e. g. lb.
 ij. vel lb. iij. possunt & filices contusi
 addi. destilla per OM vitream, ter-
 reamve igne gradato & caute adhi-
 bito. Exstillabit primo phlegma, post-
 ea oleum subtilius, tandem crassi-
 us, Salque volatile parietibus adhære-
 scit. Hæc singula si libet seorsim su-
 scipe.

N. 1. Alii digerunt primo Succinum
 cum aqua, (sic Crollius cum ∇ rosa-
 cea) hinc destillant. Verum dixi oleum
 non ascendit, priusquam humiditas a-
 quea consumpta fuerit, protrahitur itaq;
 nimis.

nimum labor citra utilitatem, qua sit alicuius momenti.

N. 2. Alii succinum optimè terunt, ut sit instar farina, hanc miscunt cum cinere optimè elixivato, destillantque igne adeo leni, ut intra momenta 20. vix guttula decidas. Sic eliciunt oleum album penetrantissimum, quod seorsim colligunt, mutato, cum flavum apparere inceperit, recipiente.

Haecenus olea ac spiritum confusum, destillando adeptus est; itaque destillatione seu rectificatione ulterius ea separare ac rectificare poteris.

3. Oleum omne vel singula seorsim, infunde in cucurbitam, cum s. q. aquae, addendo nonnihil Sal. Com. ac destilla per MB vel per vesicam.

N. 1. Alii affundunt oleo rectificando Acet. destill. digerunt & destillant.

N. 2. Si oleum illud crassius una cum super ☉ restitans rectificetur, oleum exiitque primo instar ☽ a limpidissimum quod subsequitur, subflavo colore praeclarum est.

Hinc extant

PRÆPARATA.

Officinalia.

1. Succinum præparatum: sit ex albo.
1. a. cum aqua.
2. Magisterium seu præcipitatum, vide supra Precipitatio.
3. Phlegma. In destillatione collectum (sed raro.)
4. Oleum succini albi.

1. rectificatum.

2. non rectificatum seu fætidum.

Oleum succini citrini.

5. Balsamus sit ex succini 1. Magisterio seu Extracto duriusculo. 2. Oleo, & 3. Sal. com. quæ excipiuntur Oleo nucistæ expr. præparatio.

6. Pilulæ de Succino v. l. 2.

7. Trochisci de carabe Aug.

8. Crytalli rufi & Sal volatile album Succini describ. à Kesi. centur. 3. artic. 12.

CAPVT XXXI.

De spermate ceti.

EST & aliud genus Bituminis, quod Sperma Ceti Officinæ vocant, alii Ambram subalbidam, alii florem maris seu salis veterum interpretantur, Germ. Walroth.

N. Colligitur in mari, cui cœu spuma

supernatat. Cuius autem originis sit, nondum inter se Authores conveniunt. Sunt enim qui esse semen volunt à Balena seu Ceto emissum, sed malè, invenitur enim in locis, ubi ne balena unquam prehensa sunt. Sunt ergo alii qui florem

Ccc c

salis

salis à Veteribus descriptum, nominant, adeoque spumofum quid salis marini perhibent. Verum & hi hallucinantur, primum quod cum veterum flore salis, qui ruber & liquidus describitur, minime conveniat. Secundum, quod sit citra vim absterforiam & salsam, quanto summa salis utriusque referret. Verisimilius ergo videtur, ut in reliquis Regnis duobus vegetabilium scil. & animalium excrementa suppetunt pingua: ita & in Regno Macrocosmico. Et hujus speciem esse pinguedinem hanc fursurosam, productam, vel exhalatione terra sulphurea, mari communicata, vel ex sulphureis particulis marino salis immixtis,

que agitatione fluctuum congregata, & in pinguedinem coacta sint.

Eligatur candidum, pingue, recens, non rancidum, &c.

Vires. Humectat, resolvit, anodynum est, proin vulgaris usus in coagulati sanguinis resolutione à casu vel similiter contracti. In torminibus colicis sedandis, ut & in torminibus ventris infantum mitigandis. In tussi tartaroque pulmonum demulcendo.

Dosis à ℥j. ad ℥j. vel ʒj.

Extrinsicus sunt qui cicatricibus exanthematibus illinunt, ut carne eas repleant.

CAPIT. XXXII.

De Asphalto, Naphtha, Petrolao, ac oleo Terra.

Aspthal- { Vera de qua hic
tos { Substituta, Asphaltos.
Officinatum, de qua lib. 4. Pissaphal-
tum.

Ἀσφαλτος & Ἀσφαλτὸν est Bitumen, (sebum, resina,) Macrocolmi, picis instar durum, &c. Supernatante primum aquis conspicitur, seu lacubus, hinc ad littora propulsum concrefcit, densatur, tenacissimumque redditur.

Præferunt reliquis Judaicum Bitumen, quod mortui maris) Ἀσφαλτὸς propterea dicti,) genitura, Germani, Judenpech.

Ejus verò probatio est, ut purpure modo splendet, (scil. in nigrore) sitque ponderosum & validum odorem vibret, nigrum autem & sordidum, vitiosum est.

N. 1. Quia rarissimum est, nostratibus ejus loco Pissaphaltos in usu est, quam vide lib. 4.

N. 2. Oleum illius Quat ut Succini.

Naphtha est colamen bituminis Babylonii, consistentia liquidum, ignis rapacissimum.

N. Nec & hac nostratibus usitata, sed oleo ejus Petrolaum usurpare solent.

Petrolaum, Oleum Petra, Stein-
öle /

ole / est liquamen (axungia Macroco-
smi.) pingue, liquidum, ē petris & sa-
xis effluens.

Vires. Calfac. & sic. tenuum parti-
um est, digerit, & resoluit, cerebro ac ner-
vos generi confert.

N. 1. Petrolæum in Italia regione Au-
tinenfi stillat candidum & rufum. In Si-
cilia fontibus innat. Apud Mejanum
pagum in tractu Parmensi album est. Ba-
bylonicum autem in suo fonte flagrare di-
citur, secus italicum.

N. 2. Rectificatio Petreoli fit in Ca-
pella vacua, ita habebis limpidissimum

nam, & infundo & vernicem seu Co-
lophoniam nigram, solidandis vulneribus
apissimam. Spiritus autem pernionibus
ulceratis confert, nervosque illiucum V
roborat.

Oleum terræ oleum est pellucido-
rubicundum, odoris fortis petrolæum
æmulantis, sed gratioris.

Ante paucos annos nobis innotuit ex
India orient. apportatum, ubi ex monte
quodam effluere dicitur.

Vires. Arthriditi vaga maximo est
solamini inunctum.

CAPVT XXXIII.

De Carbone Petra & Gagates.

Carbo Petreæ, carbo fossilis (Stein-
Kohlen.) Bituminis terreni genus
est fossilis, lapideum, friabile, ni-
grum.

Dicitur Carbo quod nonnullis,
præcipuè Anglis, ut & nonnullis Ger-
manicæ locis fomitem ignis præbeat.
Aliis terra ampelitis audit, ast male.

De Usu ejus Medico nihil adhuc,
quod addam, habeo, nullus tamen dubi-
to, quin oleum inde elici possit ad matu-
randa ulcera, emolliendosque tumores a-
ptissimum.

Gagates est genus terræ nigræ, lapi-
deæ crustosæ, adeo bitumine prægnans,
ut bitumen redoleat, & accensum pi-
cis verè modo flagret, nigerrimumque
emittat fumum.

Dicitur Gagates à Gaga Fluvio Cili-
ciæ, in cujus faucibus olim solum inve-
niebatur. Hodierno autem tempore
& in Germania frequenter eruitur.
Differt à carbonibus fossilibus, quod
hi nec flammam emittant, nisi folli-
bus excitentur, nec bituminis odorem
spirent. Gagates vero igni admotus
flagrat, odoremque bituminis exhi-
bet.

N. Sunt, qui succinum nigrum vo-
cant; cum succinum revera non sit, quip-
pe crustosus gagates est, succinum leve.
Alii Pissaspalum, sed malè, quippe hoc
fælitium quid est. vide lib. 4.

Vires. Emollit, discutit, Colicum mor-
bum sanare creditur, si in pollinem reda-
ctus septem diebus continuè ad ʒj. usque

propinetur. *Acetius flagrantem in vino
extinguit, idque cardiacis propinat.*

PRÆPARATA.

Oleum in cinere ex retorta vitrea
paratur ad modum olei succini, sed
igne paululum vehementiori. Oleum

hoc si liber, poterit rectificari, additâ
aquâ simplici.

Vires. *Commendatur Epilepticis,
Maniacis Paralyticis, Spasmodicis, Tetani-
cis, Arthriticis, ab utero suffocatis, nari-
bus illitum.*

Socius transmissum inferendum supra.

Ad pag. 320. lib. 3. capite 2.

Est & genus terræ exoticæ, colore purpureum, punctulis albis intertextum, ac si
situm contraxisset, sapore austeriusculum, masticam liquefcens, subdulcemque
post se relinquens saporem; CATECHU vocant, seu TERRAM JAPPO-
NICAM. *Hujus usum perhibent celebrem in exiccandis catarrhis, capiteque robo-
rando, si in ore detineatur.*

Particulam hujus obtinui à Pharmacopœo nostrate curiosissimo Dn. Mat-
thia Banfa.

Et sic ad finem perducta est Mineralogia.



PH
nodat
planis
cleat a
Succi
Gumm
primar
cundat
priorit
N.
cunqu
stretas
Anthon
tributa
Tempu



PHARMACOPOEIA
MEDICO-CHYMICA,
LIBER IV.
SEU

PHYTOLOGIA.



HYTOLOGIA est pars PHARMACOLOGIAE, quæ agit de plantis.

Classes Phytologiae sunt 4. Prima enodat alterantia primaria, quæ sunt, planta harumq; membra. Secunda, enucleat alterantia secundaria; uti sunt; Succis, Olea, Resina, Gummi, resina, Gummata. Tertia, exhibet purgantia primaria. Quarta describit purgantia secundaria: utraque eodem modo cum prioribus accepta.

N. Damus autem rerum quarumcunque 1. species usualiores ab aliis distinctas. 2. Nomina seu titulos, quibus Authores celebriores & famosiore eas rubricant, id est titulos tenus inscribunt. 3. Tempus ac locum natalem. 4. Delectum.

5. Officinalia Nativa, i. e. quid de rebus singulis crude officinale sit. 6. Vires. 7. Preparata usualiora, &c.

Rubricas seu titulos unâ cum authorum nominibus addimus, non modo ut ea facilius res quæ sita occurrat, atque à reliquis suis speciebus distinguatur, sed & innotescat, quinam authores & quanam illorum scripta ad ulteriorem rei cognitionem consuli, adiriq; queant. Sunt autem Authores præcipui; eorumque scripta.

Amati Lusitani Enarrationes in libros

5. Dioscoridis.

Andræ Cæsalpini de plantis lib. 16.

Augustanorum Pharmacopœia seu Dispensatorium.

Bartholomæi Garrichteri herbarium Germanicum in 8.

Caroli Clusii 1 historia rariorum plantarum. 2. Libri. 10. Exoticorum. 3. Corollaria in Dodoneum Gallicè à se reditum, ut & in Garzian, Monardem & Acoftam.

Caspari Bauhini 1. Pinax theatri

Aaa aa

bota-

botanici. 2. Nota in Matthiolum.

Castoris Durantis herbarium in linguam Germanicam à Clariss. Petro Usenbachio hujus Reipubl. Francofurtanae olim medico celeberrimo translatum.

Christophori Acoftæ historia aromatum & medicamentorum in Orientali India nascentium, qui est liber 9. Exoticorum Clusii.

Eurici Cordi Botanogalum.

Garzia ab Horto historia aromatum & simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascentium, qui liber est 7. Exoticorum Clusii.

Hieronymi Tragi herbarium seu libri 3. de stirpium usitatis nomenclaturis, &c.

Jac. Theodori Tabernæmontani historia plantarum germanica libri 3. edita.

Joachimi Cameratii 1. Hortus 2. Epitome Matthioli. 3. Matthiolus German. quem novis iconibus auxit.

Joh. Baptistæ Portæ 1. Phytognomica. 2. Villa.

Joh. Fragoſi historia aromatum, fructuum & simplicium aliquot ex utraque India delatorum.

Johan. Gerhardi historia plantarum Anglica.

Johan. Manardi libr. 20. Episto-

larum Medicinalium.

Leonhardi Fuchſii historia stirpium. 2. Ejusdem icones in 8. 3. Ejusdem de compositionibus medicamentorum.

Matthæi Lobelii historia plantarum, seu observationes & adversaria à Lobelio & Pena edita.

Nicolai Monardis simplicium Medicamentorum ex novo orbe delatorum, historia: qui liber est 10. Exoticorum Clusii.

Ottonis Brunſfeldi historia libri 3. comprehensa.

Pedacii Dioscoridis libri 6. de materia medica.

Petri Andreae Matthioli 1. Commentaria in Dioscoridem. 2. Ejusdem Epitome in 4.

Petri Belloni observationes libri 3. expressa cum notis Clusii, cujus Exotericis subjuncta sunt.

Prosperi Alpini de Plantis Aegyptiis liber.

Remberti Dodonæi historia stirpium pemptades 6. seu libri 30.

Valerii Cordi 1. annotationes in Dioscoridem. 2. historia stirpium. 3. Dispensatorium.

Et hi sunt Botanographi, quorum hac in parte fit mentio, omissis authoribus pharmaco-pæticis.

CLASSIS I.

CLASSIS I.

De Alterantibus primariis, quæ sunt Plantæ, harumque membra,
i. e. Radices, Folia, Semina, Cortices, &c.

I. Abies.

Abies { alba, id est, hæc præfertur.
rubra, vitæ, Picea.

Alba inscribitur Abies, Brunf. Trag.
Matth. Cord. in D. Lob. Cast. Tab. Lon.
Ger. Dod. (cui potius Pica.) Abies al-
ba & scemina, C. B. 2. Germ. Zhan-
nenbaum/weiß Zhannebaum.

Rubra insignitur, Picea Brunf.
Matth. Cord. in D. Lon. Lob. Cast. Tab.
Germ. Abies 1. & rubra, Trag. Abies
Dod. Picea major prima seu abies ru-
bra, C. B. Germ. roth Zhannebaum/
Fichte/ Fichtenbaum.

N. Adeo conformes inter se sunt, ut
nonnullis confundantur, differunt tamen,
1. quod folia Picea sunt nigr. ora, latiora,
molliora, leviora, minus pinguentia, ra-
mos circumquaq. vestientia. 2. quod Cor-
tex Picea sit nigrior, tenacior: abietis albi-
cantior, fragilior. 3. quod Picea rami ad
terram flectantur, secus ac abietis, &
Matth.

Virent perpetua fronde, nisi quod men-
se Maio foliis pristinis decidentibus, no-
va subinde renascentur. Montibus gau-
det saxosis.

OFFICIN. NAT.

Cortex (sed raro) Coni & Resina,

N. Innascitur & viscum abietis alba,
quod Plinii & Theophrasti (Stelin.) re-
putat Clusius.

Vires, Cortex exiccat, adstringit.

Ususque est præcipui externi in ulceribus
& ambustis.

Coni (strobili Zhanapffel/) exiccant
& adstr. Usus isdem sunt inprimis ex-
terni in inflammatione Epatis & aliarum
partium (Epihema) in verrucis (cujus
signaturam referunt) & clavis pedum
abigendis (lotione.)

Resina ab abiete duplex colligi po-
test, liquida & sicca. Liquida (lacry-
ma, oleum abiegnum) colligitur ex ru-
berculis (ceu ex Vomica) abietum no-
vellarum sed pauca: Hæc officinis Te-
rebinthina Venetæ titulo venit (de qua
class. 4.) sed perperam, siquidem illa
(abigena) acrior ac calidior sit. Sicca
ex Abiete & Picea colligitur: Hæc uti
Thus figurâ ementitur, ita & usum ejus
æmulatur.

PRÆPARATA.

Oleum still. Fit ex ligno per descen-
sum igne leni, sic extillat clarum.

N. Rari est usus. Poterit tamen adhi-
beri in odontalgia, aliisque affectibus loco
Terebinthina.

II. Abrotanum.

Αβρότανον, ἀβρότανον, ἀβύτανον. Germ.
Stabtwurk/ Girttwurk/ Gerttwurk/
Gartentheil.

mas, quod vulgariter nomen ab-
rotani retinet, & hujus loci est.
Est { scemina, Cupressus seu cyparissus
hortulana. Vides, l.

Aaaaa 2

Loco

PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. IV.

Loco gaudet temperato, præcipuè dum adhuc in ætate adolescente constitutum est, coliturque in hortis.

OFFICIN.

Ex Abrotani maris variis generibus solum officinale est angustifolium majus: Hujus extant in officinis *folia & gemma* seu *summitates* collectæ Augusto: huic succedit minus seu Abrotanum humile.

Majus insignitur Abrotanum mas, *Brunf. Dod. Matth. Lob. Cast. Tabern.* masculum majus, *Cam.* primum, *Trag.* vulgare mas, *Fuchf. Abr.* mas angustifolium majus, *Cass. Bauhino.*

Minus *C. B. 6.* Abrotanum 3, *Trag.* odoratum, humile densum, fruticosum, *Lob. humile Tab.*

Vires. *Calf. sic. incidit, aperit, sub-* astringit, *extergit, valide discutit, resistit* putredini ac veneno, morsibus venenatorum animalium medetur, vermes necat, urinam movet, impetus hystericos discutit, regium morbum solvit. Extrinsicus usus ejus famosus est in ossibus exiccandis, roborandisque, & quia pilorum signaturam summitates ejus amulantur, ad alopeciam tollendam maximopere commendatur.

PRÆPAR.

1. ∇ *Stillag.* Ex foliis ac summitatibus.

3. *Vinum:* Veteribus in usu fuit creberrimo, modò non item.

3. *Conserva:* Ex summitatibus & flor. paratur, ut conserva absinthii.

4. *Oleum:* infusarum summitatum in Oleum communi.

5. *Oleum stillatitium:* Ex summitatibus siccis.

III. Absinthium.

Ἀσινθιον. Ἀσινθιον. Arab. Asinthium, Aseneni, Sesunem Alhanlais, Barus, Buleigi Germ. *Wermuth.*

Est $\left\{ \begin{array}{l} \text{Vulgare rusti-} \\ \text{cum nostrate} \end{array} \right\}$ majus. *C. Bauhin.* N. 1. humilium montanum. *C. B. 2.*

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Ponticum} \\ \text{Vide loco sequenti.} \end{array} \right\}$ Majus insignitur. Absinthium ponticum seu Romanum officinarum *C. B. 1.* Absinthium *Matt. Cord. n. Dios. Lon.* vulgare *Trag. Fuchf. Lob. Cast. Tab.* commune *Cam.*

Humilium: Abs. ponticum montanum. *C. B. 2.* Abs. montanum *Cam. in. Matt.* seu Romanum *Tab.* tenuifolium ponticum *Galeno.*

N. *Vulgare majus, illud est quod passim nascitur. Montanum in certis tantummodo locis provenit, estque humilium commune. Et hoc si haberi possit, eligere monet Tabernam.*

Florent Julio & Augusto.

OFFICIN.

Rustici Absinthii *Folia ac Summitates.*

Vires. *Stomachicum imprimis est, hinc hepaticum & spleneticum: calf. 1. (ad 2.) sic 3. aper. atten. astringit, amarum est: hinc vermes necat, bilis edu-* cat.

CLASSIS I.

nit, crapulam discit, sudorem ciet, febribus (præcipue tertianis) convenit.

N. Capiti quia vapores crassos exhibet, pigritiem ac somnium inferre solet, minus tamen si prius per ∇ calidam trahatur leviterque exprimatur. Extrins. arcei Vigiliis (temporibus ac plantis pedum impositum) conforiat ventriculū, auditum acuit (suffitus aure susceptus,) &c.

PRÆPARATA.

1. ∇ . still. Ex summit. & fol. recentibus.

2. Spiritus. Destillatur ex summit. siccis ∇ affusâ fermentatis.

NB. Potest ad fermentandum Sal com. aut simile quid addi. *Sehn. in Inst.*

3. Succus expressus ac inspissatus. Fit, ex summitatibus siccis in ∇ coctis.

4. Vinum absinthies.

5. Extractum liquidum seu Tinctura. cum Spir. vin. facta.

N. Eiusdem efficacia Tincturam facili negotio assequi poteris, si summitatibus aquam vitæ affuderis parum accenderis atque hinc expresseris.

6. Conserua. Ex summitatibus paratur, l. a.

7. Syrupus composuit. Vide Dispens. August. & Noriberg.

8. Trochisci de Absinthio. Vide Disp. A. & N.

9. Oleum infusum Ex omphacio, & summit. absinth. cum Rosis. Vide D. Noriberg.

N. Angustani addunt quoque succum absinthii.

10. Oleum stillatitium. Cum aqua ac spiritu descendit.

11. Sal fixum. Ex incinerata planta l. a. elicitur.

12. Sal volatile. Ex succo l. a. confici potest, quod raro in usu.

N. Sunt qui absinthium hoc vulgare, veterum absinthium ponticum esse velint, adeoque & Romanum.

13. Trochisci de Absinthio. V. Disp.

IV. Absinthium ponticum.

Absinthium ponticum Officinarum C. B. 4. 5. Absinthium ponticum & tenuifolium, incanum, nobile. Abrotanum minus & 1. *Trag.* Abr. fœmina. *Fuchf. Lon.* Abr. album *Cord.* Absynt. ponticum. *Mart. Fuchf.* (in iconibus) *Tab.* Absl. tenuifolium. *Dod. German.* Welsch Bermuth / Garten Bermuth / Römisch Bermuth.

Vires. Epaticum est præ vulgari. *Calf. princ. gr. 1. sicc. in princ. 3. minus amarum est, astringit, valideque incid. exterg. disc. putredini resistit, educit bilem per urinam, proin convenit in omnibus affectibus Epatis, vesicæ, bilis, ventriculi tormina ventris & uteri sedat: minus commodè autem in mucilaginosi affectibus pulmonum, imprimis ob astringentem adhibetur. Extrinsecus discutit tormina ventris, adeoque & quæ partum subsequuntur: infantum vomitum compefcit, &c.*

N. Huic affinia sunt, quæ & in locum ejus substitui cum commodo possunt, absinthium ponticum repens, ut & absinthium

thium Nabathæum seu tenuifolium Austriacum. C. B. 4. & 5.

PRÆPARATA.

Præparata ejus raro pro usu extant, parati tamen possunt non secus ac ex absynthio vulgari. ▽ *stillat, spiritus, Succus, Vinum, Extractum, Conserva, Syrupus, Oleum infusum & destillatum.*

V. *Acacia vera.*

Acacia Dioscoridi frutex lignosus ac spinosus est, ex cujus semine maturo, ejusdem nominis succus exprimitur nigricans: ex immaturo; rubescens seu subfulvus. Et hic est vera veterum acacia, quæ Theriacam ingreditur, recipiendaque est, ubi acaciæ simpliciter mentio fit. Ex omnibus præstantissima perhibetur luteo-rubea odoris grati.

Vires. *Refrig. sic. crassarum partium est, incrassat, astringit.*

N. 1. *Succus hic cum rarus sit, substituitur ut plurimum Acacia Germanica.*

N. 2. *Dat & aliam Acacia speciem arbuscula quæ G. Arabicum profert, sed minus usitatam.*

XI. *Acacia Germanica.*

Ἀγροκοκκονιέα. *Prunus sylvestris, Bruns. Matth. Fuchs. Dod. Cord. in D. Lon. Lob. Cast. Tab. C. B. 1. alias Acantha, Arab. Schamuth, Schack Halepi. Germ. Schlehdorn.*

N. *Primus sylvestris transplantatione diligentique cultura evadit hortensis, fructusque fert grandiores, quos Germani vocant grosse Gartenschlebe.*

Floret primo vere; fructum fert matutum autumno.

OFFICIN. NAT.

Flores pruni sylvestr. raro Folia, rarissime cortices.

Vires. *Folia, fructus, cortices refrigerant, gr. 3. astring. incrassant. Usus præcipuus est in profluvio alvi, Uteri. Extrinsecus in Gargarism. balneis uterinis.*

Flores. *Resolvunt, Renum sabulum educunt, compressiones cardiacas leniunt, pleuriticam radicem resolvunt, alvum laxant.*

N. *Acressit nonnunquam muscus, qui specificè hernis conferre dicitur*

PRÆPAR.

1. *Conserv. Flor.*

2. ▽ *stillat Ex floribus elicita.*

MB.

N. *Alii cum vino destillant.*

3. *Syrupus: fit ex multiplici florum infusione, ut rosarum.*

Vires. *Purgat leniter, prodest in pleuresi, tussi sicca, renes expurgat, &c.*

4. *Succus seu Rob. prunor. sylvestrium solidius. Ex fructibus exprimitur, inspissatur, inque taleolas formatus aservatur pro acaciæ veræ substitutione.*

5. *Vinum. Ex fructibus maturis exiccatis. Nim. contusi hi rediguntur in globulos ac in furno exiccantur. Hinc infunduntur.*

6. *Fructus conditi. Fiunt cum mellis, P. ij. & Vini p. j. l. a.*

VII. *Ace-*

VII. *Acetosa.*

Οξυς, Λάπαθον, *Acetosa Satvr*
ampffer.

Major } *hortensis rotundifolia.*
 Minor ar- } *venfis.*
 venfis. } *Non Lanceolata minima.*

Ex his officinis major sylvestris, C. B. 1. in usu est, de qua vox acetosa simpliciter intelligatur. Huic tamen nisi præferre volueris, substituere non citra rationem poteris, hortensem rotundifoliam.

Major sylvestris insignitur *Acetosa pratensis*, C. B. 1. *Lapathum*, 4. *Diosc.* *Acetosa*, Lon. major, *Cast. Oxalis Trag.* *Matth. Fuchf. Dod. Lob. Tab. Rumicis* 4. genus. *Cord. in Diosc.*

Hortensis rotundifolia, C. B. 8. insignitur *Oxalis rotundifolia*, *Dod. rotunda*, *Tab. sativa Franca rotundifolia rebens*, *Lob. Acetosa rotundifolia repens*, *Cam. Acetosa rotundis foliis*, *Cam.*

OFFICIN.

Exhibent usui pharmaceutico. *Folia, Radices & Semen.*

N. *Radices asservantur ex cortice.*

Florent Majo, turgesc. semine Junio & Julio.

Vires. Cardiacæ imprimis est & Epatica: frigef. & sicca. aperit, resistit putredini, appetitum excitat, choleram reprimat, suum sedat, unde in febribus simplicibus ac pestilentibus usitatissima est, præcipue autem usu interno, hinc & externo adhibita.

PRÆPARATA.

1. *Conserv. folior.*
2. *∇ destill. Ex foliis.*
3. *Succus. Ex fol. rec. exprimitur, clarificatur ac coagulatur.*
4. *Syrupus. Ex succo & sacchar. August. 1/2. Norib. 1/3.*
5. *Conserv. Ex fol. rec. & sacch. 1/2. aut 1/3.*

VIII. *Acetosella.*

Trifolium acetosum, *Matth. Dod. Cast. Bransf. Oxys, Fuchf. Cord. Cam. Tab. Oxytriphylon, Trag. Lujula, Alleluja, Lon. Trifolium acetosum vulgare*, C. B. 1. *Buchampffer / Satvrlee / Guckguckstlee.*

Estque { *floribus albis.*
 { *floribus luteis.*

Floret Aprili ac princip. Maji. Locis gaudet nemorosis & arenosis.

OFFICIN. NAT.

Folia acetosellæ albæ.

Vires. Cardiacæ & Epatica est singularis, acetosa vires nisi superans saltem amulans, adeoque astum febrilem mitigat, suum sedat, &c.

N. *Ac-*

N. *Acetofella Lonic.* est acetosa arvensis lanceolata.

PRÆPAR.

1. *Conserv.* Folior.
2. ∇ *stillat.* Ex foliis.
3. *Syrup.* Ex succ. & sacchar. $\frac{1}{2}$. aut $\frac{1}{4}$.
4. *Conserva.* Ex foliis.

IX. *Acorus.*

Acorus verus, sive *calamus arom.* *Officinarum.* C. B. 1. *Acorus perperam* *Calamus arom.* *Officinarum.* *Monard.* *Trag. Matth. Cord. Lob. Acorum, Lon. Cam. Tab. Ger. Acorum, legitimum, Clus. hist. Germ. Calmus / Akerwurk.*

N. *Acorus officin.* dicitur vulgo *calamus aromaticus*, cum tamen *cal. aromat.* proprie sic dictus herba sit ab hac diversa. *Vide infra.*

Colitur in hortis, solumque gaudet palustri.

OFFICIN. NAT.

Radix. raro *Folia.*

Eligenda radix albicans sapore amara ac acris.

Vires. *Stomachicus* est, *calfac.* & *sicc.* in princ. 3. *partium tenuium* est, *atten. aper.* *Ufus* *præcipuus* in *obstruct.* *mensium*, *Lienis* ac *Epatis*, in dolore colico.

PRÆPARATA.

1. ∇ *Ex radice macerata.*
2. *Acorus conditus vulgaris.* Vide Augustan.
3. *Confecta radix.*
4. *Ol. stillat.* cum ∇ ascendit.

Elect. diacorum. Vide August.

6. *Extr. rad.* Coque in *Vino* *exprime* & *inspissa.*

Vires. *Plurimum* valet in dolore colico, *Dos.* *Scrup. j.*

X. *Acorus adulterinus.*

Acorus adulterinus, C. B. 2. *Acorus falsa.* *Cord. in Dioscor.* *Acorum adulter.* *Trag. falsum, Matth. Gladiolus luteis liliis, Eric. Cordi, luteus, Fuchs. (icon.) Lon. Acor. Officinarum, Fuchs. Acorus palustris, Lob. Iris palustris lutea, Tab. Pseudoiris, Dod. German. gelb Schwertel.*

Officinis raro *inservit usu*, eoque in solâ radice *effodienda* sc. Septemb.

Vires. *Exiccat*, *parum calefacit*, *attenuat*, *astringit*, *roborat*, *resolvit*, *vi peculiari* ad *nervosi generis* & *cerebri affectus* *commendatur*, ut & ad *dysenteriam*, *aliosque fluxus alvi* ac *uteri sistendos*. *Extrinfecis* ad *dysenteriam præcavendam*, *more nostratum*, *de collo suspendi solet.*

PRÆPARATA.

Nonnunquam inde paratum extat *Electuarium Stomachicum.* Vide lib. 2.

XI. *Adiantum.*

Adiantum, *Matth. Dod. Capillus* ♀ vulgo *Adiantum foliis coriandri* C. B. 1. *Adiantum nigrum, Cordi. Adiant. nigr. verum, Tab. Ad Album Plinii, magnum, Trag. Lugdunense, Cam. Germ. Frauwenhaar / Venushaar.*

N. *Adianti* vox pluribus plantis imposita

CLASSIS I.

posita invenitur. 1. Plante jam data. 2. Adiantum aureo, polytricho. 3. Ruta muraria. 4. Trichomani: de prioribus hoc loco, de posterioribus alibi.

Advehitur ex Gallia Narbonensi: Floret æstate.

OFFICIN. NAT.

Herba seu folia.

Vires. Caliditate & frigiditate temperatum est, exiccat, attenuat, aperit, extergit, pulmonum renumque vitij medetur, Epatis & lienis obstructions reserat, Urinam & menses ciet.

N. Sunt qui Trichomani easdem vires ascribunt, adeo q̃ substitui posse autumant: Alij Rutam murariam.

PRÆPAR.

1. Aqua. Exfol.
2. Syrupus simpl. Ex decoct. & sacchar. $\frac{1}{2}$. August.
3. Compos. Vide August. & Norib.

XII. Adiantum aureum.

Polytrichum aureum { majus. Hoc minus usuale.
medium. Hoc usuale.
minus. Nec hoc officinas subu.

Dicitur Polytrichum aureum medium, B. C. 2. nobile vel primum, Trag. aureum Aprilei vel 2. Lonic. Muscus capillaris, Dod. Adiantum aureum minus, Tab. German. gulden Widerthon.

OFFICIN.

Integra herba seu caulis cum foliis muscosis & floribus.

Vires. De viribus apud authores ni-

hil fere invenitur. Carrichterius tamen ad morbos incantatione introductos commendat, cuius rei gratia apud mulierculas celeberrima est:

Extrinsecus ob signaturam commendatur ad capillos generandos.

XIII. Agallochum.

Ευλαλον Lignum aloes, Lon. Tab. Agallochus seu Xylaloes, Cord. in D. Lob. Cast. Taurum Cord. b. C. B. 2. Paradisi/oder Aloes Holz.

OFFICIN. NAT.

Lignum cujus frusta raro magna ad nos advehuntur, ut plurimum enim in fragmentis nobis transmittitur, quæ optima crescunt nigro purpurea, venis cinerii coloris intersecta, amara, ponderosa, liquorem, si prunis, candentive ferro imponantur, exudantia, suavem ac acidulum fumum, si incenduntur, præbentia, bullulasque simul post se relinquentia, haud ita facile dispartentes: His adde haud postremum bonitatis signum, si aqua supernatatint.

Vires. Calfac. & succ. 2. confortativum est omnium viscerum, ac præcipue cerebri. Cordis ac Vteri; spiritus vitales ac animales recreat: hinc medetur Lypothymie, amaritudine sua lumbricos necat. Externe creber ejus usus est in cacuphis & Epithematibus cordialibus.

PRÆPAR.

1. Extractum. Fieri potest ad normam aliorum Extractorum sive Gummosum

Bbb bb

mosum solum id expetatur, siue simul viscosum: De quo vide lib. 2. c. 57.

Angelus Sala, R. Fragmentor. elector. pulveratorum (instillari potest inter pulverisandum. ▽ Rosar. ne quid avolet libj. digerit ac extrahit cum Spir. Vin. rectificatissimi libvi. vase clauso. in MB. & 3. digerendo. Decantato. dein liquori affundit ▽ Rosar. libj. abstrahit lentissimo calore Spir. Vin. Restantem Essentiam Resinosam lavat & exiccat, pro libitu coquit ad consistentiam, ut exinde trochisci formari possint.

Dosis gr. iij. ad x.

Residua feces aptae sunt quae admisceantur candelis pro fumo.

Quercetanus. Extractum hoc, seu gummi parat cum ▽ stillat. Hyperici aut Centauri atque pro peculiari remedio habet in lumbricis ac putredinibus arcendis.

2. *Species Diaxylaloes*. Vide Disp.

3. *Trochisci Diaxylaloes*. Vide Disp.

XIV. *Ageratum*.

Ayngator, *Matth. Cam. Tab. Cast.*
Eupatorium Mesuae, *Trag. Matth. Lon.*
mentha corymbifera minor, *Cord. hist.*
Costus minor hortensis. herba Julia,
Balsamita minor, *Dod. Ageratum fo-*
his, *ferratis*, C. B. 1. *Arab. Gafet.*
Leber. Balsam. / Kleiner Costen. Bal-
sam.

Colitur hortis, floret Junio.

OFFICIN. NAT.

Planta cum foliis & floribus.

Vires. *Calf. & siccatur*. gr. 2. *substan-*
tia tenuis, saporis aromatici, attenuat,
exterget, putredini resistit. Epatica est,
laxat alvum quam blandissime. Extrin-
secus ciet urinam, uterumq. emollit (*suf-*
fitu.)

PRÆPAR.

1. *Syr. de Eupatorio Mesuae*. Vide Disp.

2. *Pil. de Eupatorio*. Vide Disp.

3. *Trochisc. de Eupator.* Vide Disp.

XV. *Agnus castus*.

Salix Amerina Diosc. Matth. Vitex,
Trag. Dod. Cord. in D. Lon. Cam. A-
gnus castus, *Cast. Eleagnon. Theophra-*
sti, Lob. Vitex foliis augustioribus can-
nabis modo dispositis, C. B. 1. *Keusch*
Lam.

OFFICIN. NAT.

Semen.

Vires. *Calf. & siccatur*. insigniter disc.
mens ciet, appetitus venereos cohibet,
semen imminuit.

PRÆPAR.

Trochisci. Vide Dispens.

XVI. *Agrimonia seu Agri-* *monium*.

Agrimonia, Brunf. Dod. Lob. Cam.
Eupatorium, *Matth. Fuch. Cord. Cast.*
Tab. Vulgare Trag. Eupatorium Græ-
corum, *Lob. Cam.* (Arabum enim Eu-
patorium vel Ageratum est, vel Eupa-
torium Cannabin.) Eupatorium ve-
terum seu Agrimonia, C. B. 4. German.
Agermenig / Odermenig / Aldermenig /
Bruchwurk / Leberkletten.

Floret:

CLASSIS I.

Floret fere æstate integra crescit juxta sepes.

OFFICIN. NAT.

Folia & Summitates.

Vires. Epatica nobilissima in primis est, hinc splenetica vulnerariaque: calf. & sicc. 2. substantia est tenuis, aperit, deterg. subastr. corroborat Epar, ejusque fluxus coërcet, adeoque usu creberrimo venit in morbis ab Epatis imbecillitate subortis, ut sunt Hydrops, cachexia, &c. extrinsecus adhibetur sapissime in balneis & lotionibus.

PRÆPAR.

1. ∇ stillat. Ex fol. & flor. vel ex integra planta circa finem Junii collecta.

2. Succ. Ex fol. & flor.

3. Syrup. Ex succo.

4. Sal. com. ex cinere integræ plantæ.

XVII. Alchimilla.

Alchimilla, Trag. Dod. Lob. Tab. Ger. Vulgaris. Clus. hist. Cam. Pes leonis, Brunf. Fuchf. Lon. Brancha Leonis, Planta Leonis, (Dioscor. Psidium,) Stellaria, Matth. Cast. Germ. Sinauw / gülden Gänserich / Löwenfuß / unser Frauen Mantel.

Crescit loco udo ac humido, ac præcipuè in pascuis, unde & in hortos transplantari solet. Floret Majo & Junio.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Vulneraria est è nobilissimis non postrema, calid. & frigid. tempera-

ta; consolid. astring. exterget, sanguinem incrassat, proin utilis fluxus mensium, &c. Usq; adhibetur interno in potionibus vulnerariis, tum & externo.

PRÆPARATA.

∇ . Fit ex integra planta, collecta mense Junio cum floribus.

XVIII. Alkekengi.

Αλικακάβον, Halicacabum, Cast. vulgare, Fuchf. Hal. vesicarium, Cam. Hal. seu vesicaria, Cord. Hal. Solanum halicacabum, Trag. Matth. Lob. Solan. vesicarium, Dod. Alkakengi, Lon. Saxifraga, rubra & 4. Brunf. Solan. vesicarium 2. Bauhini. Judenkirsch / Borellen.

Crescit in vineis inter vires, locisque opacis, floret Junio, fructus fert ante autumnum.

OFFICIN. NAT.

Bacca, quæ colore ac figura cerasa rubra repræsentant, colligendæ, circiter finem Augusti.

Vires. Refrig. & sicc. 2. Nephritica, diuretica ac lithontriptica insignes sunt. Usus præcipui in calculo renum & vesicæ, in utero (bacca & folia) in sanguine coagulato.

PRÆPARATA.

1. ∇ stillat. Ex baccis.

2. Tinctura. Ex baccis cum ∇ propria.

3. Trochisci de Alkekengi. Vide Dispensat.

Alkermes vide Chermes.

XIX. *Allium*.

Σκόροδος Dioscoridi, *Arab.* Cham.
Allium, *Brunf.* Trag. *Matth.* Cord. in
Diosc. Lon. Lob. *Cast.* hortense, *Fuchf.*
 vulgare *Cam.* sativum, *Dod.* C. B. 1.
Rnoblauy.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. *Calf.* & *secc.* 4. incid. aperit,
 discutit alexipharmacum est. *Usus* pra-
 cipuus internus & externus in colica fla-
 tulenta, lumbricis, peste (cum ✕) tussi,
 calculo. *Extrinsecus* in scabie, urina ob-
 structione, apoplexia uterina (umbilico
 inungitur succus) tussi (inungitur plan-
 tis pedum cum axungia porcina.)

N. Dulcius sapit si plantetur & exi-
 stente sub Horizonte, eodemque tempore
 rursus effodiatur.

PRÆPARATA.

Electuar. de alio, *Vid.* l. 2.

Aloës lignum, vide *Agallochum*.

XX. *Alfne.*

Alfines varia à Botanicis exhibentur
 genera, è quibus potissimum usualis est
Alfne media, C. B. 11. *Alfne*, *Matth.*
Lob. *Cast.* *Alf.* major, *Fuchf.* media *Ta-*
bern. Ger. minor, *Cord.* *hist.* *Morsus*
Gallinæ, 1. *Trag.* Germ. *Hünerdarm/*
Hünerbiß/Vogelkraut.

Crescit in omnibus hortis & vinetis.
 Provenit hyeme, florereque ad mediam
 usque ætatem.

OFFICIN. NAT.

Folia vel integra herba, sed raro.

Vires. *Refrig.* & humect. 2. eisdem

vires obtinet quas parietaria, præterquam
 quod non adstringat: insigniter nutrire
 creditur, unde atrophica, phthisique labo-
 rantibus esca salutaris æstimatur.

XXI. *Althæa.*

Althæa Dioscorides & Plinii, C. B. 1.
Althæa, *Brunf.* Trag. *Matth.* *Fuchf.*
Dod. Cord. *Vulgaris*, *Cam.* *Clus.* *hist.*
Malva palustris, Lon. Lob. *Ibiscus*, *Cast.*
Tab. *Malvaviscus*, *Bismalva*, Ger. Ger-
 man. *Sibischwurk.*

N. Quatuor faciunt *Althæa* genera:
althæam simpliciter sic dictam, *althæam*
arborem scilicet, *althæam palustrem*, &
althæam Theophrasti seu *Abutilon A-*
vicennæ. Ex his primum officinis in usu
 est.

Crescit locis humidis, floret Julio
 & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia, *Radix*, (collecta Vere vel Au-
 rumno) *Semen*.

Vires. *Herba calida* est sicca (alio-
 humid.) gr. 1. (*Radix calida* in princ.
 2.) emollit, laxat, discutit, dolores lenit,
 tumores maturat, acrimoniam mitigat
 & corrigit. *Usus* præcipuus in affectibus
 vesicæ, pectoris, v. g. pleuritide, &c. *Vide*
Malvam, cum qua in qualitatibus o-
 mnibus convenit: Externis creberrimus
 ejus usus est in Cataplasm. Clysteribus,
 &c.

PRÆPARATA.

1. ▽. Ex foliis & floribus.

2. *Mucilago*. Ex radice extrahitur
 cocta cum aqua.

N. 1.

N. 1. *Utiliter hac adhiberi poterit pro trochiscis sublingualibus incorporandis.*

N. 2. *Ex mucilagine hac insigne Extractum cum Spir. Vin. parari poterit in lenienda faucium asperitate utilissimum.*

3. *Spiritus Althææ Fernel. V. D.*

4. *Unguentum Dialthææ simpl. Ex folis emollientibus. Vide Disp.*

5. *Unguentum Dialthææ Compos. Ex emollientibus & discutientibus. Galbano scil. & S. hederæ. Vide idem Dispensatoria.*

XXII. *Amaranthus.*

Amaranthus, Math. Am. parvus, Cam. purpureus, Fuchf. Dod. Lon. Cord. in D. Augustifolia simplici spicata pannicula, Lob. Amar. Vulgaris, Tab. Amar. simplici pannicula, C. B. 4. Circa, Trag. aliis, Flos amaris. German. Flor Amor/ Zausentschön/ Sammetblum.

Floret Augusto, colitur in hortis.

OFFICIN. NAT.

Flores.

Vires. Refrig. & siccatur modicè astring. Hinc usus in fluxionibus cunctis. E.g. expuitione sanguinis, diarrhæa, dysenteria, fluxu uterino, &c.

N. Sunt qui propinant ad lactis generationem juvandam.

XXIII. *Ami verum.*

Ἀμύρον, Ameos, Amios, Ammeos, cuminum Ethiopicum, Ammi, Brunf. Trag. Cord. in D. Lon. commune seu vulgare, Dod. Cam. Ger.

vulgarius. Lob. Ammioselinum, Tab. Germ. Ammen.

Adfertur Alexandria Egypti Venetias & in Germaniam.

OFFICIN.

Semen. Eligendum hoc est purum.

Vires. Calf. & sic. g. 3. tenuium parvum est, incidit, aperit. disc. Hinc convenit dolore colico & uterino, in mensibus & urina obstructis, in inflatione ventriculi, usque præcipue interni est, hinc & externi.

XXIV. *Amomum.*

Ἀμμόν, Amomum veterum quodnam sit, adhuc sub judice lis est. Sunt enim qui Rosam Hierochontis esse velint, ut Cordus: alii aliud quid esse contendunt. Clusius reseō nomine describit herbas, quas tamen cum Dioscorides amomo minima respondere confitetur.

Officinæ duplex semen sub Amomi nomine monstrant, quorum alterum majus nigrum rotundumque est instar granor. piperis rotundi vel cubearum, gustu minime acre, quod videtur veterum esse sison, sinon, &c. Alterum minutum semen & pallidum, utrumque raro in usum venit, locoque amomi veterum recipitur Acorus.

XXV. *Amygdala, seu Amygdala.*

Amygdala fructus sunt, amygdali arboris, lique vel dulces vel amari. De Amygdalo videatur, Brunf. Trag. Bbbbb 3. Deall

Dod. Cord. in D. Lon. Lob. Cam. Tab. Math. Cast. Germ. Mandeln.

OFFICIN. NAT.

Utriusque nuclei amygdala vel amygdalæ dicti.

Vires. Dulces nutritivæ sunt, temperate calidæ & humidae, humorum acrimoniam lenientes, & hinc dolorem & Vigiliæ ab acrimonia oriundas, demulcentes, adhibenturque præcipuè in Emulsionib.

Amara sunt calidæ & sicca. 2. attenu. aper. exterg. diuretica sunt, obstructioni jecoris, lienis, mesenterii, uterique conferunt. Extrinsecus lentiginem tollunt, si masticata illinantur, capitis dolori subveniunt (in frontalibus.)

PRÆPARATA.

Confect. amygd. dulc.

amarar.

Ol. Expressum amygd. dulc.

amarar.

Vires. Oleum dulce lenit, maturat, anodinum est, ususque præcipui colico ac nephritico dolore mitigando (propinarum dosi Unc. j. vel ij. cum manna, vel & elysmati infusum) infantulis recens natis creberrimo ad tormina Ventris compescenda cum saccharo penidiato exhibetur ad Drach. ij. quin etiam ad mitiganda tormina puerperarum usus ejus

XXVII. Anagallis.

Anag. { Aquatica. Vide infra.

{ Terrestris { Mas flore phœniceo, C. B. 2. }
{ Fœmina fl. cæruleo, C. B. 2. }
{ Lutea inusitata. }

ha officin. & hujus loci.

Mas

creberrimus est. Olei amari vires ex superioribus colligenda sunt.

N. Usui interno recens expressum adhibendum est, non rancidum: Exprimi-
tur autem tum sine igne, i. e. non calfaci-
endo ad ignem, vel cum igne.

XXVI. Anacardium.

Anacardium Math. Cord. b. Lon. Cast. Trag. Tab. Ger. Ger. Arab. Balado Anacardium, Elephanten Laus.

Fructus est arboris exoticæ, colore ac figura cor representans, præcipuè si siccatus sit.

Crescit in India Orientali.

OFFICIN. NAT.

Fructus sed raro.

Vires. Calf. & sicc. (non 4. nec 3. gradu) ut nonnulli volunt, sed remissius, Cephalicus est, memoriam ac sensus ac-
uens ac confortans.

PRÆPAR.

1. Elect. seu Confectio Anacardina, Vide Dispens.

2. Mel Anacardinum. Ex fructu re-
centi in ∇ cocto supernat. Vide Di-
spensat.

3. Oleum vel ex fructibus exprimitur, vel in corticis coctione supernat, sed rarissimum hoc est.

Mas insignitur Anagallis, Cord. in D.
Brunf. Trag. Matth. Fuchf. Dod. Lon.
Cast. Ger. Anag. phænicea mas, Lob.
Tab. Cam. mas, Clus. hist.

Fœmina dicitur Anagallis fœmi-
na, Brunf. Trag. Matth. Fuchf. Dod.
Lon. Cast. Ger. Anag. cœrulæa, Tabern.
Cam.

Dicuntur Gauchheil / Colmar
kraut / Vogelkraut.

Crescunt in vinetis, hortis ac arvis;
lutea tamen non nisi in sylvestribus ac
umbrosis locis. provenit.

Floret Majo & hinc per totam æsta-
tem.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus, sed raro.

Vires. Viraque calf. & sicc. amara
est, exterg. & subastr. Vide & pro vul-
neraria habetur; morsui canis rabidi sub-
venire à nonnullis commendatur: adhi-
beturque usu interno ac externo.

PRÆPAR.

1. ▽ Ex integra planta.

2. Succus. Raro extat, cum tamen
maxime commendetur in Errhinis.

XXVIII. Anagallis aquatica.

Anag. aquat.	{	folio subro-	{	major, C. B. 1.	} Ha usuales & præcipuè minor
		tundo.		minor, C. B. 2.	
		Latifolia	{	major.	
Angusti folia.	minor.				

Dicuntur Beccabunga, Betula Sium
aquaticum, Laver Germ. Bachbun-
gen / Wasserbungen.

Crescunt in rivulis. Florent Majo,
& Junio.

OFFICIN. NAT.

Folia, vel integra planta

Vires. Calfac. moderate humectat.

Usus præcip. in scorbuto, urinam, calca-
lum renum & vesicæ insigniter expellit;
menses ciet, fœtum mortuum ejicit. Ex-
trinsecus opitulatur phlegmonis & Erysi-
pelati; maculas faciei abstergit (cum sur-
süre) Vulneribus medetur (cum Sal com.)
& tela araneorum impositi.

PRÆPARATA.

1. ▽ Ex planta integra, vel succo e-
jus expresso.

2. Succus. Expressus & inspissatus:
qui raro extat.

XXIX. Anethum.

Anu Dov, anen Dov, Dill / Dillenkraut.

Aneth. { Hortense, hoc usuale.
{ Sylvestre.

Insignitur Anethum, Brunf. Trag.
Matth. Fuchf. Dod. Cord. in D. Lob.
Cast. Tab. Cam. Ger.

Crescit loco arenoso & aprico. Flor.
Jun. Jul. Aug.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores, & Semen.

Vires.

Vires. Calefac. in princ. 3. succ. in princ. 2. (radix calf. 3. succ. 2. complete) diger. disc. maturat, lenit dolores, auget lac, conciliat somnum, venereos appetitus minuit, singulini vomituique medetur. Et hac omnia prestat usu interno & externo. Inprimis tamen extrinsecus Clysteribus anodynis immiscetur, capitisque cataplasmatibus anodynis & somniferis (summitates cum oleo olivarum cocta.)

PRÆPAR.

1. ▽. Ex integr. planta. (rari usus est.)

2. Oleum infolatum. Ex fol. & flor.

3. Ol. stillat. Fit ex semine.

XXX. Angelica.

Hortensis seu sativa, Costus niger. C.B. 1.

Sylvestris { Major, C.B. 2.
Minor montana. C.B. 5.

Ex his in usu est prima; Nec contemnenda tamen & secunda.

Prima dicitur Angelica, Brunf. Lob. Cast. Tab. Angelica major, Dod. Angelica sativa, Trag. Matth. Dod. Lon. Ger. Angel. odorata, Cam. Smyrnum, Cord. in D.

Secunda describitur sylvestris major, C.B. 2. Angelica sylv. Trag. Matth. Fuchs. Dod. Lon. Lob. Cam. Ger. German. Angelickwurk / Heiligen Geists wurk.

Crescit sativa locis cultis, humidis ac pinguibus; Sylvestris major humidiora amat prata; Minor locis montanis opacis & nemorosis gaudet.

Floret Julio.

OFFICIN. NAT.

Radix colligenda initio veris.

Vires. Bezoardica & cordialis nobilissima est, Calf. 3. (sylv. maj. 2.) succ. 2. aper. atten. sudorifica & vulneraria est: menses movet, fetum expellit, suffocationi uteri maxime conducit, malignis morbis, Venenis, ipsique pesti medetur. Venena omnis generis per sudorem pellit, adeoque usu interno precipue, tum & externo adhiberi apta est. V.g. ad arcendam pestem (in amuleto, in sublingualibus) ad morsum canis rabidi (in cataplasma. &c.)

Dosis Drach. j.

PRÆPARATA.

1. ▽. Ex integra planta.

2. Succus. Ex radic. recent.

N. Potest & ex siccis radic. mediante coctione elici.

3. Extract. Fit cum Spir. Vin.

Dosis à Scrup. ss. ad Drach. ss.

N. Quercetanus extrahit cum Spir. Juniperi hydromelite Vinoso, &c. Vide Pharmacop. rest.

Condit. radix, l. a.

5. Oleum stillat. Ascendit cum ▽.

6. Balsam. l. a. cum oleo nucistæ preparato fit.

7. Sal. com. Ex incine, tra vel integra planta vel Caput mor. in destillatione remanente.

N. His adjungi potest rad. præparata quam dicunt, id est in aceto macerata. Verum enim vero, quis dubitat, infusione hac magnam virium partem,

men-

menstruo communicari, adeoque radici decedere.

XXI. Anisum.

Ἀνίσον, ἀνίσον, Anis.

Gaudet loco optimo & stercoreato; feritur mense Martio, floret Julio, semen maturefcit Autumno.

OFFICIN. NAT.

Semen, raro Herba.

Vires. Calf. sicc. 3. recens mitius est, atten. discutit, diureticum est, lac auget, pulmonicum ac stomachicum inprimis audit: Hinc usus praeipui, in instatione ventriculi, tussi, &c. Infantibus Scrup. j. exhibitum blandè per inferiora ac superiora saburram ventriculi intestinorumq; ejicit.

PRÆPAR.

1. Confectio ex semine fit.

2. Confectio Anisi laxativi simplex, Fit ammonii cum saccharo mixtione, vel maceratione anisi in ∇ in qua scammonium fuerit dissolutum.

N. Alii in infusione ḡ anisum conficiendum macerant.

3. Confect. anis. laxat. composit. Vide August.

4. ∇. destill. Ex herb. & semine.

5. ∇. vita Anisata. Ex semine cum Vino destillatur. Vide lib. 2. de spiritibus.

Fieri itidem potest spiritus, si remanentia ex destillatione aqua residua cum fœcibus cerevisiæ fermentetur vel simili.

6. Oleum stillat. cum ∇ ascendit.

N. 1. Ex aniso stillat aqua lactea, qua caloris solis exposita copiosius oleum ad superficiem mittit.

N. 2. Anisum diu macerare oportet. Sic dat ḡj. olei Unc. 8.

N. 3. Anisi destillatio lento igne peragenda est, quia nimirum volatiliior illa pars facilis est ascensu.

7. Sal. Ex incinerata planta vel remanentia destillationis.

8. Species Dianisi. Vide Disp.

XXII. Anserina.

Argentaria, Argentina, Dod. Potentilla, Brunf. Matth. Lon. Agrimonia sylvest. Anserina, Trag. Tab. German. Grensch/Genserich/Grünsich/Silberkraut.

N. Est sine sapore & odore.

Crescit passim herbosis locis, pratis, juxta sepes & vias. Floret appetente ætate, quo tempore & colligi apta est.

OFFICIN. NAT.

Folia vel integra planta.

Vires. Refrig. moderate, sicc. fortius. astring. constipat. Hinc sanguinis expuitioni medetur, diarrhaam ac reliquos alvutum & uteri fluxus compefcit: hamopticis & hamorrhousis subvenit: renum calculum insigniter atterit: vulneribus insuper admodum conducit. Externè famosa est in doloribus dentium mitigandis, putredine gingivarum arcenda, astu febrili sopiendo, quem potenter compefcit, si cum sale & aceto contusa plantis pedum supponatur, vel & carpi applicetur.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex planta integra.
2. ▽. Ex floribus.
3. *Conserua*, Ex floribus.

XXXIII. *Anthora*.

Anthora, *Math. Lon. Cast. Cam.*
Anthora, *Lob. Dod. Tab. Ger. vulgaris*,
Clus. hist. Aconitum salutiferum seu
Anthora, *C. B. 17.* Napellus Moysis,
Avicennæ, aliis *Antithora* (quod *Tho-*
ræ pharmacum sit,) *Heilgiff / Giff*
heil.

N. Sunt qui radicem *Contrayervam*
 faciunt Germanicam: alii *Zedoariam*
Arabum, *Avicennæ* scil. & *Serapionis*
 vide *Tabern. Herbar. lib. 1.* qui posterius
 mordicus asserere nititur.

Crescit in Alpibus Helveticis, in Sa-
 haudi, &c.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Saporis amari est calfac. & sic.
 cardiaca est: attemperat, absterget. Usus
 praeipui in morbis, ac iellibus venenatis,
 pesti specificè adversatur. & peculiariter
Radici Thora.

Dosis à Drach. β. ad Drach. j.

N. Educit insuper mucilaginem Tar-
 taream ac aquosam per alvum.

XXXIV. *Antirrhinum*.

Antirrhinum, *Math. Dod. Lob. Tab. Antirrhinum*,
 majus alterum folio longiore, *C. B. 2.*
German. Drant / Dorant / Bracten,
Haupt / Kalbsnasen / Hundskopff.

Crescit locis sabulosis. Floret Ma-
 jo, Junio.

OFFICIN. NAT.

Herba integra, i.e. folia cum flori-
 bus ac gemmis ramusculorum, quæ re-
 præsentant caput vituli.

Vires. Rariusus est in Medicina, nec
 adhibetur nisi à mulierculis contra spe-
 ltra, incantationes, veneficia, &c. idque
 tam præservandi quam curandi intentio-
 ne utrique satisfacit appensione, fumiga-
 tione, suppositione, oppositione, balneatio-
 ne. Vide *Carrichter. in Herbario.*

XXXV. *Apium*.

Macedonicum. Vide Petra-
selinum Macedonicum.

Apium. Veterum seu hortense, *V. de*
Élavos, *Petroselinum officinarum.*
Eppich. Palustre, *Apium officina-*
rum: de quo hic.
Montanum. Vide Petroseli-
num montanum.

Dicitur *Apium*, *Fuchs. Lon.* Palu-
 dapium, *Tab. Elæoselinum, Dod. Lob.*
Apium vulgare, Trag. Braunes Peto-
terlein / Wasserpetterlein / Wassermos-
reßen / Wassereppich / Wassermarek.

Crescit inter *Becabungam*: floret
 Julio.

OFFICIN. NAT.

Radix & semen.

Vires. Calef. & sic. ferè gr. 3. incid.
 aperit, unde & inter 5. radices aperientes;
 recensetur. Usus praeipui internus Uri-
 nam & menses movet, calculum pellit, re-
 gium,

Junus morbum solvit. Semen efficacius est quam radix, annumeraturque seminibus calidis minoribus. Utraque præcipuè interne usurpantur.

PRÆPARATA.

▽. Ex caule, fol. & floribus Junio collectis.

XXXVI. *Aquilegia.*

Aquilegia, Ugeley, Ugeleyen.

N. *Diversa reperiuntur species florum colore, vel plenitudine distincta: Officina-ria simplex illa flore caruleo, C.B. 2. vel 8. intelligitur.*

Dicitur *Aquilegia*, *Trag. Fuch. Lon. Dod. Cam. Aquileia, Math. Lob. Cast. Tab.*

Crescit sata in hortis, ac fundo pingui, nonnunquam in locis sylvestribus incultis. Floret Junio, & Julio.

OFFICIN. NAT.

Semen, tum Flores & Herba.

Vires. Calf. moder. sicc. i. aperit Epas & Lienem, ac inprimis meatum bilarium, unde regio medetur morbo; Ciet urinam & menses, vulnera consolidat, ventris tormina sedat. NB. Semen in expellendis morbillis ac variolis usus mulierculis est creberrimus. Extrinsecus frequens ejus usus est ad putredinem gingivarum scorbuticam emendandam, ulceraque oris fauciumque solidanda.

PRÆPAR.

1. ▽ *Stillat. Fit ex fol. flor. ac radice, Augusto collectis.*

2. *Conserua. Ex floribus quæ rari usus est.*

3. *Acetum. Ex infusione florum.*

XXVII. *Aristolochia.*

Aristolochia, Osterlucey, Hottwurz.

Est { *Longa, lange Hottwurz.*
Rotunda, (à radice rotunda,)
runde Hottwurz.
Clematicis.
Pistolochia.

Ex his officinales sunt longa & rotunda. Verum de (rotunda) notandum, quod officinis fumaria bulbosa illius loco usualis sit, quam vide suo loco.

Indigitatur *Aristolochia longa, Dod. Cord. in D. Lob. Clus. hist. Aristolochia longa vera, Cam. C.B. 3.*

Rotunda vocatur *Aristolochia rot. vera, Trag. Lon. Cam. Arist. rotunda, Math. Dord. Cord. in D. Lob. Cast. i. Aristolochia rotunda, flore ex purpura nigro, C.B. i.*

Utraque colitur in hortis: floretque potissimum Majo, & Junio.

OFFICIN. NATIVA.

Rotunda radix sola. Longa radix & Folia.

Vires. Utraque Cephalica, Epatica & Pulmonica inprimis est: calf. & sicc. 2. completè atten. aperit. Hinc prodest ad Tartaream mucilaginem resolvendam expectorandamque; ad menses ciendos, tumores internos rumpendos, venena discutienda. Insuper Longæ infusio ad scabiem exiccandam vel vulgo hic usitatissima est. Extrinsecus adhibetur usu creberrimo ad exiccanda & mundificanda vulnera.

Ccccc 2

Rotund.

Rotunda tenuiorum est partium quam Longa adeoq. efficacior, & in primis mensibus ac secundinis ciendis celeberrima: Calf. & sicc. 3. aper. attenuat.

PRÆPAR.

▽. Ex integra Aristol. longa, i. e. foliis ac radice.

XXXVII. *Armoracia.*

Raphanus sylvestris, Sinapi agreste 3. *Trag.* Rapistrum albo fl. erucæ foliis, *Lob.* album, *Tab.* Rapistrum fl. albo seu filiqua articulata, *C. B. 2. Heydenreich / Wildmerzettich.*

N. Sunt qui *Lampsanam Dioscoridis* putant.

Crescit in locis multis juxta rivulos ac in vallibus.

OFFICIN. NATIVA.

Radix sola.

Vires, Calfac. & sicc. mucilaginem tartaream incidit, attenuat, resolvit viscera aperit diuretica, lithonriptica & antiscorbutica est.

N. Lac imminuere dicitur.

XXXIX. *Arnica.*

Chrysanthemum latifol. nardus. Chalta 2. vel plantago alpina, *Lob.* Chalta alpina vel Damasonium, *Tab.* Alyssa *Diosc.* *Math.* aliis Lagea Lupi. Germ. Mutterwurk / Wolverley / Saxonibus.

Crescit in montibus ac pratis, floretque per totam ferè ætatem.

OFFICIN. NAT.

Planta cum floribus.

Vires. Calfac. & sicc. partium tenuium, sudorifica est & diuretica, nonnunquam & vomitoria. Proin Holsatiorum sticos contra grumosum ac coagulatum sanguinem vel & contra febrem in cerevisia coxisse ac cum successu propinasse, observavi.

XL. *Artemisia.*

'Agrestis *Diosc.* Artemisia vulgaris major, *C. B. 1.* Artemis. major. *Trag. Math. Cord. in D. Cam.* Artemis. vulgaris, *Clus. h.* Artem. Latifolia, *Fuchs. Lon. Dod.* Artem. mater herbar. *Lob. Ger.* Artem. vulgaris & Arthemisia altera polyclonos dicta, *Diosc.* Artemisia rubra & alba, *Tab.* aliis olus regium, herba regia. Germ. Beyfuß / S. Johannis Gürtel.

N. 1. Variat colore tum caulis tum floribus: una caule & flore rubro purpurascente, seu subpurpurascente: altera ex viridi albicante, vel suppalente (spadiceove.) Hinc dua figura *Tab.*

N. 2. Utraq. etsi interdum invenitur major interdum minor, attamen viribus conveniunt.

OFFICIN. NAT.

Summitates cum semine incluso: quin & tota herba, eaq. tum rubra, tum alba.

Vires. Uterina est, calf. 1. sicc. 2. aperit, discutit; menses, fœtum; secundinas pellit, sordes abstergit, adeoque usus celeberrimi est mulierculis, quæ eam adhibent internè & externè, adeo ut vix balnea seu lotiones parent, in quibus artemisia non contineatur.

N. Ru-

N. Rubra efficacior habetur alba, pro-
in & communior.

PRÆPARATA.

1. ▽. Ex summitatibus & foliis.
2. Ol. stillat. rarò extat.
3. Syrup. Compos. Vide Dispens. Au-
gust. & Norib.

6. Sal. Ex planta incinerata.

N. Sunt qui carbonem sacro Joh. Ba-
ptista die sub radice fossam, ad Epilepsiam
commendant. Exhibent autem tum in
pulvere, tum suspendunt de collo.

XLI. Arum.

Agor, Pfaffenpint / Deutsche In-
gber.

Est vel

{	foliis macu-	}	utrumque sine	
	latis.			discrimine offi-
	non macu-			
	latis.		cinale est.	

Prius dicitur Arum maculatum, ma-
culis candidis vel nigris, C.B. 2. Ari. 3.
genus, Trag. Arum nigricantibus lituris
signatum, Dod. Arum, Matth. majus fo-
liis aliis maculis notatis, Cast. Arum of-
fic. Lob. A. maculatum, Tab.

Posterioris vocatur Arum vulga-
re non maculatum, C. B. 3. Arum,
Brunf. Arigenus, Trag. Arum, Fuchf.
Cord. Lon. Tab. vulgare, Cam. majus,
Ger.

Crescit locis pinguibus & campestri-
bus. Folia erumpunt mense Martio, flo-
res Junio.

OFFICIN. NAT.

Radix, quæ recensrari usus est ob a-
crimoniam summam, exiccata autem

crebrioris. Colligenda radix est cum
germinare arum incipit mense scil.
Martio.

Vires. Calsac. & succ. 3. Galeno gr. ij.
(quod de Aro nostrati, quippe quod acri-
monia maxima & exulcerante sale pipe-
rino præditum, intelligi nequit,) Tartar-
um præcipue prima regionis, tum quoq;
pectoris & pulmonum peculiariter inci-
dit, resolvit & discutit. Proin usus ejus
creber est in cachexia, asthmate, &c. her-
nias curat, ciet urinam, obstructions vi-
scerum resolvit.

PRÆPARATA.

1. Radix præparata. Præparatum vul-
gò maceratione in Acet. stillat. atque
exiccatione.

2. Fecula. Fit l.a. Videlib. 2. Vide
Disp. August.

3. Pulvis Stomachicus Quercet. Cu-
jus basis est radix Vino præparata. Vide
lib. 2.

XLII. Asparagus.

Ἀσπάργου ῥίζα, ἀσπάργος, Spargen/
Sparschen.

Triplicis generis est, hortensis fa-
tiva, 2. Sylvestris. 3. palustris. Ex his
prior officinis in usu est. Cui substitui
in defectu potest secunda, utpote
quæ à prima non nisi sola cultura dif-
fert.

Dicitur Asparagus, Brunfels. Trag.
Matth. Fuchf. Cord. hist. Lon. Aspara-
gus altus, Fuchf. Tab. Domestica, Bel-
lon. Asparagus, Diosc. Asp. sativus, Cast.
Ger. Asper. hortensis, Dod. Cam. Asp.

Ccccc 3

dome-

domestices, Lob. Asparagusfativa, C.
B. 1.

OFFICIN. NAT.

Radix & Semen.

Vires. Radix est diuretica lithontri-
ptica & ex aperitivis s. illis famosis non
postrema. Calfac. & sicc. moderate, di-
scutit. Epar, Lienem præcipue & Rentes
infractu liberat ideoque in decoctis eò re-
spicientibus frequentissima est. Externe
adhibetur (in gargarismis) pro lenienda

Est {
1. Hortensis fol.
ac caule
2. Sylvestris.
3. Maritima.

Albanominatur Attriplex fativa, Trag.
Attr. fativa alba, Lob. Attriplex, Math.
Hortensis, Fuchf Cast. Attriplex fativa
viridis, Cord. in D. A. alba viridis, Lon.
Attriplex hortensis alba seu pallide vi-
rens, C.B. 1.

Rubra dicitur Attriplex rufo folio,
Cord. in D. Attriplex hortensis, Dod. hor-
tensis rub. Lon. Attri. fativa, Lob. Attr.
rub. Tab. subfativa alba, Ger. Attr. pur-
purea grandis, Cam. Attri. hortensis
rubra, C.B. 2.

Locis gaudent arenosis, crescitque
sylvestris passim juxta vias. Florent Ju-
nio, Julio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia sylvestris præcipue: hinc hor-
tensis pallide virentis. Semen rarioris
ususest.

Vires. Refrigerant 1. humect. 2. le-

odontalgia & laxitate gingivarum.

Semen eandem Vires obtinet, sed assus
est rarioris.

PRÆPARAT.

Δ. Fit ex integra planta cum baccis
rubris Septembrimense collecta, quæ
supra recenti herba rectificari potest,
sed rari est usus.

XLIII. Attriplex.

Melte/ Milte/ Molte/ Scheissmil-
te.

rubris.

viridi albescentibus. Hac præstantior reliquis est, licet nec
reliquæ contemnenda fuerint.
viridinigris.

nium dolorem: Hortensis insuper culina-
ris ac alimentosa est, sylvestris autem in
solvenda alvo celebris.

Usus officinalis præcipue externus
est, in clysteribus ac Epithematibus pa-
regoricis, v.g. antipodagricis, tum quo-
que in lotionibus pedum somni causa pa-
ratis.

XLIII. Avena.

Βῆρυς vel βρομύς, Avena, Brunf.
Math. Fuchf. Dod. Lon. Cast. Lob. Ave-
na fativa & prima, Trag. Avena vesca,
Lob. Ger. Avena vulgaris seu alba, C.B. 1.
frumentum, Cord. in D. Germ. Ha-
bern.

Avenæ semen culinare potius est,
quam officinale, nihilominus tamen
non exul prorsus est, sed adhibetur
tùm crudum, tum quoque in fari-
nam redactum. Crudum sacculo in-
ditur

ditur, qui ventri optimè calefactus imponitur ad dolores colicos & uterinos leniendos. Farina avenacea cum butyro cocta, conducibilis est in scabie capitis, exiccanda, &c.

XLV. *Malus Aurantia.*

Malus Nerantia, Pomeranzenbaum. Vitet per integrum annum. Videatur pomum Arantium, Trag. Aurantia mala, Math. Lon. Cast. Tab. Cam. Aureum malum, Clus. hist. Arangia, Cord. in D. Arantia, Lob. Malus anarantia, Dod. Arantia major, G. B. L.

OEFICIN.

1. Poma quæ simpliciter arantia, aurantia vel mala aurea, poma nerantia & anarantia, poma arangiae dicuntur: sunt quæ tùm acida, tùm dulcia, tùm vinosa seu media.

2. Cortices.

Vires. Poma acida & vinosa præferuntur reliquis, easdemq; virtutes habere reputantur, quas citria mala, imbecillius tamen: Cortices calidiores sunt ususque vulgari in torminibus ventris colicisque (à flatu subortis) inque dysuria corrigendis. Quinimo & febris fugi compertis sunt subsequente sudore.

Dosis Serup. i. ad Drach. i.

PRÆPARATA.

1. ▽. Ex floribus. Dicitur peculiariore nomine Nampha, Laufam vel Angelica.

Vires. Promovet sudorem, adhibeturque in odoriferis.

2. ▽. E corticibus.

3. Succus expressus. Ex pomis acidis, qui tamen rari usus est.

4. Sympus. Ex succo acido & sacchar. $\frac{1}{2}$. rari itidem est usus.

5. Condit. cortices. Ex corticibus recentibus (purgatis, amaroreque aliquantulum liberatis) & saccharo.

6. Conserv. Ex floribus apportatur ad nos ex Gallia, Hispania, Italia.

7. Electuar. seu Gelatina arantior. Ex corticibus exterioribus recent (l. a. amarore suo exutis) coctis vel & confusis, & cum malvatico saccharoq; mixtis.

8. Oleum stillatis. E. corticibus.

9. Balsamus. Ex oleo: ut alii Balsami.

10. Unguentum arantior. R. Pomum arantium accid. facto foramine, exprime succum, cum quo misce tantillum Theriacæ, croci & aceti, inde iterum poma ac coque sub cineribus: tandem exprime.

Vires. Fugat lumbricos infantum umbilico inpositum, compescit æstum cordis: inunctum, somnum blande conciliat temporibus illitum.

XLVI. *Auriculamuris.*

Pilösellä, pilösellä lüteä, Mäusöhrlein/ gelb Mäusöhrlein/ Nagelkraut.

Chirsuta.

Est Repens major (non hirsuta).

Errecta.

Montana, hispida, seu hispida.

vide suadecor.

Præfer-

Præfertur autem reliquis pilosella major repens hirsuta, C. B. 1. Auricula muris, *Brunf. Cord. in Diosc.* Auricula muris minor, *Trag. Lon.* Pilosella, *Matth. Lob. Cast. Tab.* Pilosella major, *Fuchs. Dod.* Pilosella repens, *Ger.* Pilosella major repens hirsuta, C. B. 1.

OFFICIN.

Integraplanta, seu folia.

Vires. *Calfac. & sicc. 2. astring. absterg. constip. sternutatoria est & vulneraria (intus & exius adhibita) dysenteriam, alvi uteriq; fluxus sistit, bilem astuantem sedat, & incrassat, hernias (infantum præcipue) curat. Extrinsecus medetur ulceribus oris (in collutionibus) hæmorrhagiam narium sedat (pulvis nari inditus.)*

PRÆPARATA.

▽. Destillatur in MB. ex integra planta collecta sine Maij vel circiter.

B.

XLVII. *Balanus Myrepfica.*

Βάλανος μυρεψικῆς Dioscoridi. Balan. myrepfica, *Corg. in hist. Tab. Ger. Bell.* Glans Unguentaria *Matth. Cord. in D. Lob. C. B.* Granum Ben, *Lon.* Ben parvum, *Monard.* Arab. Habel Ben. Fructus est arboris myricæ similis, magnitudine avellanæ nucis, intus nucleum continens pinguem & oleosum, veluti amygdalæ.

Vires. *Nucleus calf. 3. sicc. 2. terget, purgat supra ac infra, educitque bilem ac pituitam. Curat scabiam impetiginesque sanatur.*

N. *Mesues Ben duplex facit, magnum sc. ut avellana, quod Monardes avellanas purgatrices esse vult: & parvum ciceris magnitudine, ex quo oleum Itali conscriunt.*

PRÆPAR.

Oleum ex nucleis exprimitur & ad nos transfertur, titulo olei Balanini vel de Ben. Vide August.

Vires. *Emollit, discutit, nutritivum est, scabritiem, lentigines aliaque cutis vitia sanat, qualicumque tinnitui aurium subvenit (inditum auri:)*

N. *Oleum hoc quia rancescere nescit, commiscetur rebus fragrantibus. E.g. moscho, zibetta, coriisque illinitur ad fragrantiam impertiendam. Alij tamen ejus loco adhibent oleum express. nucleis cerasorum, in quo solutum Beniovinum. Heurn. in meth. prax.*

XLVIII. *Balsamum.*

Balsami planta frutex, seu arbuscula est, tres cubitos ad summum alta, folia alens rutæ foliis similia.

Dicitur Balsamum Syriacum rutæ folio, C. B. 1. Balsamum lentisci folio Ægyptiacum, *Bellon. obs.* Carpobalsamum veterum flavum. Carpobalsamum & Cassamum verum *Cord. Germ. Balsambaum.*

Nascitur sponte in Arabia felici, unde olim in Judæam, & hodie in Ægyptum translata, loco quodam occluso (Caryo vicino) quem Mateream vocant, colitur.

OFFI-

CLASSIS I.

OFFICIN. NAT.

Fructus (*Carpobalsamum*.) **Ramuli** (*Xylobalsamum*.) **Liquor Balsameus** (*Opobalsamum*.) de quo vide **Balsamum**, class. 2.

Fructus eligatur recens, plenus, ponderosus, gustu mordax: **Ramuli** probantur recentes, tenues, odorati.

N. 1. *Carpobalsamum* atque *Xylobalsamum* quia non nisi in compositionibus quibusdam veterum adhibentur, prostant raro atque non nisi vetustate obsoleta, unde loco *Carpobalsami* *Cubebas* adhibere receptum est, loco *Xylobalsami* *Lentiscum* recentem: *Xylobalsamum* autem nostrate, quod *Mechâ* Arabiae felicitis affortatur, esse idem cum veterum probat *Petrus Bellonius* in suis observation lib. 2. cap. 29.

N. 2. Est & arbor quaedam malo *punica* major, sponte in nova Hispania nascens, ex qua elicitur *Balsamum Indicum*, seu *Peruvianum*. Vide infra cl. 2.

N. 3. Sunt & arbores in *Tolu* Provincia inter *Carthaginem* & nomen *Dei* sita, *pumilis*, *pinis* similes, ex quibus elicitur *Balsamum de Tolu*. *Monardes*. Vid. infra cl. 2.

XLIX. Bardana.

Kletten Major, hujus loci.
Minor, loci sequentis.

Dicitur *Bardana* sive *Lappa* major, *Dod. Brunf. Trag.* *Personata* *Lon.* *Lob.* *Personata* major, *Matth. Cast.* *Personaria*, *Fuchf.* *Arcium*, *Cord. in D.*

Lappa major, *Arcium*. *Diosc. C. B. 1.*
Germ. groß Kletten.

Crescit passim juxta vias, & in Cœmeteriis. Floret Junio & Julio.

OFFICIN. NAT.

Radices, raro **Folia**, rarius **Semen**.
Vites. *Siccata*, est *pulmonica* (NB. *diuretica*, *diaphoretica*, *extergens*, *subastringens*. Hinc convenit in *asthmate*, *calculo*, *expulsione sanguinis*, in *vulneribus* *inveteratis*, *tumore lienis*, *aliarumque partium*, in *arthriticis morbis*, (quibus peculiari proprietate conferre statuitur.

Semen insigne censetur *Lithonripticum*.

Extrinscus imponuntur *folia* *vulneribus* *inveteratis*, *articulis luxatis*, *ambustis*, &c.

L. Bardana minor.

Ξάνθιον, *Diosc. παχύςτιον*, *Galen.* *Xanthium*, *Fuchf. Matth. Dod. Cord. in D.* & *hist. Lon. Cast. Tab. Xanth.* seu *Strumaria*, *Lob.* *Bardana minor*, *Ger.* *Lappa minor*, *C. B. 6.* *German.* *Klein Kletten* / *Bettlersläuse*.

Gaudet solo læto & pingui juxta mœnia & scrobes arefactas. Viget Julio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Radix **fructus** (*lappulæ*) & **herba**.
Vires. *Cal.* & *sicc.* *disg.* *gusta* est *amaro* & *subacri*. *Usus* *pracip.* (*secund. Matthiol.*) in *minera lepra educenda* (*cum Rhab. exhib. radix*) in *lipothymia*. *Extrinsc.* in *struma* & *tumoribus* *dis-*
Ddd dd *scuti-*

cutiendis (epithem.) in capillis luteo colore tingendis. Herba cancerorum ardore efficax est extinguendo.

L I. Basilicum.

Ὠκίμων, ὀκίμων. Basilicum sive Ocimum, *Brunf.* Basilica minor & baccharis Germanica, *Trag.* Ocimum medium, *Matth. Cast. Cam.* Ocimum mediocre, *Fuchf.* Ocimum seu basilicum medium vulgatius, *Lob.* Ocimum magnum, *Tab. Ger.* Ocimum vulgatius, *C. B. 6.* Germ. *Bassilien.*

Crescit in hortis. Floret Junio, & Julio.

OFFICIN.

Folia ac Semen.

Vires. *Calf. 2.* humect. diger. resolv. expurgat pulmones, menses movet, ideoque usurpari poterit usu interno & externo, sed rarius adhibuitur deprehenditur.

PRÆPAR.

▽. Ex integra fit planta collecta Junio.

L II. Behen album, Behen rubrum.

L III. Bellū.

Primula veris, Marienblümlein / Gänseblümlein / Maßlieben / Zeittosen.

(Major. *Trag. Matth. Fuchf. Dod. Cast. Cam. Ger. Lob. Tab.*
 sylvestris { Media. *Matth. Lob. Tab. Clus. Dod. minor Cast.*
 Est { Minor. *Matth. Fuchf. Tab. Ger. Lob. C. B. 7.*
 hortensis { simplex.
 prolifera.

Et si singulæ officinales esse non nequeant, prævalet tamen sylvestris, eaq; minor.

Binas officinæ nostrates radices monstrant nomine Behen: unam Behen rubrum appellant; alteram album. De utraque controversitur cuius sint speciei. Arabibus (ut Serapioni) sunt Behen radices, pastinacæ radicibus similes. Hinc scribit Haly Abbas, Behen & Pastinacæ sylvestris radices nullum inter se discrimen habere. E modernis Behen album aliqui Polimonii, sive Lychnidis sylvestris speciem esse autumant, quam Tabern. vocat herbam articularem; Behen rubrum alii Limonii maritimi, alii valerianæ rubræ, alii Bistortæ speciem esse autumant: aliqui vero Garzia & monente & reprehendente, zerumbeth esse statuunt. Hinc est, quod aliqui in descriptionibus Arabum substituunt Eryngium, alii Tormentillam, alii pastinacam sylvestrem, alii Angelicam, alii denique Caryophyllatam. Auctuarius & Myrepsus Behen hermodactylos esse volunt, forsitan avellanas purgatrices, de quibus vide supra: Balanus Myrpicæ.

Sylvestr. crescit passim in pratis & pascuis: hortensis colitur in hortis. Floret

Floret per integram ætatem, præcipue vero verno tempore.

OFFICIN. NAT.

Integra Herba cum floribus, sed raro.

Vires. *Vulneraria* est, calfac. & sic, moderate partium est tenuium: mulierculis nostris usitatum est, herbam cum floribus infantibus ad alvum laxandam exhibere.

N. *Bellis major* & *minor* §. 6. 7. Aprilis mane ante ortum Solis collecta valide emolliunt, attenuantque: eadem collecta mense Iunio, secundo die à plenilunio sub crepusculo noctis, plurimum valent ad hamorrhæam sistendam. Caricht.

PRÆPARATA.

▽. Fit ex integra planta florente, mense Majo collecta.

Ben, vide *Balanus Myrepica*.

LIV. *Berberis*.

Berberis, Brunf. Lon. Lob. Cast. Cam. Spina acida, Brunf. Dod. *Oxyacantha*, Trag. *Oxyacantha* Galeni, Cord. in D.

Tab. Crespinus, Maub. *Oxyacanthus* Galeni, Cam. *Berberis dumetorum*, C. B. 1. Germ. *Saurrauch* / *Bersich* / *Saurdorn* / *Reisselbeern*.

Gaudet locis, incultis, dumetis, &c.

OFFICIN. NAT.

Fructus (nomine *Berberis*) collecti Autumno.

Vires. Refrigerant & humectant. 2. partium tenuium, astringunt, appetitum excitant, roborant ventriculum ac Epar. Proin usus sunt frequentissimi in morbis, ubi refrigeratione & astrictione opus, quales *Diarrhæa*, *Dysenteria*.

PRÆPAR.

1. *Conditus fructus*.

2. *Succus liquidus*. Ex recentibus baccis expressus.

3. *Syrupus de succo berberum*.

4. *Rosula*. Ex succo & saccharo.

N. Fit sola *mistura sine coctione*. Vid. lib. 2.

5. *Trochisci*. Vid. Dispens.

6. *Rob. de berberibus compos.* Vide Dispens.

L V. *Betâ*.

Βιούλον, Dioscor. *Mangolt* / *Römisch Kobl*.

Beta { alba } Ha sunt officinales, præferturque rubra.
 { vulgaris }
 { rubra } radice rapæ, rapum rubrum.

Alba dicitur Beta, Brunf. Tab. Ger. Candida, Trag. Fuchs. Cord. in D. Dod. Beta alba, Maub. Lob. Lon. Cast. Cam.

Beta alba vel pallescens, quæ Cicia officin. C. B. 2.

Rubra vocatur. Beta rubra, Brunf. D d d d d 2 Trag.

Trag. Lon. Dod. B. nigra, Matth. Fuchf. & rubra, Cast. rubra vulgarior, Lob.

OFFICIN. NAT.

Radices, Folia & Semina.

Vires. Calf. & sicc. in princip. gr. 3. laxat alvum, ob nitrositatem, errhinum est. Usus ejus internus potissimus culinaris est, in acetariis, &c. Externus in errhinis.

PRÆPAR.

Succus Extorta herba & præcipue ex radice.

LVI. Betonica.

1. *Betonica alba vel primula veris.*

Hæc in usitata.

2. *Betonica vel Vetonica coronaria.*

Vide Cariophyllus hortensis.

3. *Betonica officinarum. De quâ hæc.*

Dicitur Betonica, Brunfels. Trag. Matth. Fuchf. Purpurea, Fuchf. Dod. Lob. Lon. Cast. Tab. Ger. Betonica vulgaris, Clus. hist. Vetonica, Cord. in D. Betonica purpurea, C. B. 1. Germ. Betonien/ braun Betonien.

Crescit in hortis ac pratis, locisque umbrosis: Floret Junio & Julio.

OFFICIN. NATIVA.

Folia (Majo legenda) & Flores.

Vires. Calfac. & sicc. 2. acris est & amara: discutit, atten. aper. extergit. in primis Cephalica est & Epatica, Splenetica, Thoracia, Uterina, nec non & vulneraria, & demum diuretica: hinc usum interno & externo creberrima venit, maxime in morbis capitis.

PRÆPARATA.

1. *Fit ex fol. antequam florescit, vel ex flor. in MB.*

2. *Conserva. Ex floribus.*

3. *Syr. Simplex. Ex succo & saccharo 1.*

4. *Compositus. Vid. in Dispensat. August.*

5. *Empl. ex Betonic. Vid. August.*

6. *Sal. com. Ex incinerata planta.*

LVII. Betula seu Betulla.

Betula, Trag. Monard. Dod. Lon. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. Germ. Birche baum.

Crescit in sylvis, locis gaudens asperis. Julus prodit Martio, quibus Aprili folia succedunt.

OFFICIN. NAT.

Folia, Cortex, Fungus, sed raro.

Vires. Folia calf. sicc. resolvunt, atten. absterg. aperiunt, amara sunt. Serum proliciunt. Hinc usus non minim. in hydropo, scabie, & sim. intus & extus adhibita.

Cortex item quia bituminosus, calfac. & emollit. Adhibeturque in suffutibus aëri corrigendo dicatis.

Fungus vi pollet adstrictoria; undamenta ejus hemorrhoidibus inspersa ad miraculum fluxum cohibent.

PRÆPARATA.

1. *Succus. Ex perforato caudice verno tempore profectus.*

Vires. Commendatur ad communicandos calculos Renum & Vesicae, maculasq. cutis abstergendas.

2. *Fit. è succo.*

LVIII.

LVIII. Bistorta.

Matterturb/
 Est, C.B.

{ Major radice { Alpina	{ minus intorta { magis intorta	} ha sine discrimine officinales
	{ Maxima { Media { Minima	

1. Dicitur Bistorta, Cord. in D. Matth.
 Dod. Cast. Bistorta foemina, Brunf. Bi-
 storta Britannica, Lob. Serpentaria fo-
 mina & colubrina, Fuchf. Colubrina,
 Lon. Colubrina & Dracunculus major,
 Brunf. Bistorta major radice minus in-
 torta, C.B.1.

2. Colubrina & Dracunculus mi-
 nor, Brunf. Trag. Serpentaria mas seu
 Bistorta, Fuchf. Bistorta. Con. minor,
 Tab. latifolia. Ger.

OFFICIN. NAT.

Radix & interdum Fungus.

Vires. Refrig. sicc. ad gr. 3. astringit
 valide, est austeriuscula, alexipharmaca,
 sudorifera, Usus praecipui in vomitu com-
 pescendo, in abortu praecavendo, &c. Ex-
 tern. in catarrhis exiccandis, fluxu uteri
 sanguineque vulnerum sistendo.

Fungus sanguinem in vulneribus ac
 haemorrhagia narium mire sistit.

PRÆPARATA.

V. Ex herba.

LIX. Bambax.

Arbuscula est exotica ferens fru-
 ctus instar nucis crinitæ, in qua semen
 latitat lanugine mollissima involu-
 tum.

Dicitur bombax officinar. Cottus

seu Cotta & bombax Serapioni. Xy-
 lon seu Gossypium, Matth. Xylon.
 Fuchf. Lon. Gossypium, Dod. Lob. Cost.
 Cam. Tab. Gossypium frutescens se-
 mine albo, C.B.1. Germ. Baumwoll-
 baum.

Copiam ejus plurimam producit
 Syria ac Cyprus.

OFFICIN. NAT.

Semen & Lanugo quæ Gossypium of-
 ficinarum, Baumwoll.

Vires. Lanugo calfacit & siccat: se-
 men pulmonarium est, insuffientibus &
 asthmaticis maxime proficuum, auget se-
 men.

N. Usus tum seminis, tum lanuginis
 rarus est modernis.

LX. Borrago.

Borrago, Brunf. Trag. Fuchf. (icon.)
 Dod. Lon. Cam. Buglossum, Matth.
 Fuchf. Cast. Buglossum verum, Cord. in
 D. Buglossum latifolium, Lob. vulgare,
 Clus. Buglossa urbana, Clus. hist. Borra-
 go floribus albis, Tab. hortensis, Ger.
 Buglossum latifolium, Borrago. C.B.1.
 Borretsch.

Crescit ut plurimum in hortis, tum
 quoque locis incultis, officinalisque
 est sine discrimine sive caeruleos ferat
 D d d d d 3 flores,

flores, sive albos, quæ hîc æque vulgaris, ac prior.

Floret mense Junio, Julio, Augusto, usque in Septemb.

OFFICIN. NAT.

Radix, Folia, Flores, (qui inter 4. cordiales famulos, recensentur.)

N. *Radix* asservatur exorticata.

Vires. Cordialis est è præcipuis, calf. & humect. 1. atram & adustam bilem corrigit, spiritus vitales ac animales fuligine atra biliaria inquinatos mundificat, unde & omnibus affectibus ex atra bile oriundis convenit, v. gr. hypochondriacis.

PRÆPARAT.

1. ∇ . duplex, 1. ex toto, 2. ex floribus.

2. *Conserv.* Ex floribus.

3. *Syrup.* Ex infusione triplici florum & sacch. Disp. August.

N. *Alij* R. succi ex fol. express. Unc. 8. flor. Recent. Unc. 1. vel Unc. 1.5. cum sacch. Unc. 4. coquunt in syrupum.

4. *Succus inspissatus*, sive essentia. Videl. 2. de succis.

LXI. Urfina.

$\Sigma\pi\omicron\upsilon\delta\upsilon\lambda\iota\omicron\nu$, $\sigma\phi\omicron\upsilon\delta\upsilon\lambda\iota\omicron\nu$. Spondylium vulgare hirsutum, C. B. 1. Spondylium, Lob. Matth. Lon. Cast. Tab. Vulgare, Dod. 8. Branca urfina, Brunfels. Frag. Cord. in D. Acanthus vulgaris seu Germanica, Fuchs. Bärenklaw / Bärwurz.

Crescit passim in locis humidioribus: floret Majo.

Folia sola.

Vires. Est è 5. herbis emollientibus calf. & sicc. aperit. Usus potissimum externus est in chysteribus alijsq; paregoricis, quarumcunque formularum, & non plurimum in cataplasmatibus.

LXII. Brassica.

$\kappa\epsilon\lambda\mu\beta\eta$, Caulis, Röl / Rölkraut.

Varia Brassicæ sunt genera, quæ his classibus comprehendi possunt.

{	Sativa	capitata,
		non capitata,
		crispa.
		Apinana, i. e. apii flores.
{	Sylvestris.	
	Marina, id est Soldanella.	

Ex his magis medicamentosa est, teste Matthiolo, non capitata, minutis caulibus, tenerioribus foliis, lævis, tenera, C. B. 1. Brassica alba vel viridis: huic succedit non capitata rubra.

Dicitur Brassica, Brunfels. Lævis, Matth. Cast. Brassica candida, Ges. hortens. lata alba, Lon. Brassica vulgaris sativa, Lob. Dod. Ger. Brassica prima Tab. Brassicæ sativæ majoris species altera, Trag.

OFFICIN. NAT.

Folia, Jus foliorum, Semen.

Vires. *Folia calf. & sicc.* citra acrimoniam, v. n. eraria sunt, ebrietatem arcent, astringunt & laxant, adeoque qualitatis mixta: Nimir. ut ajunt Salernitani.

Jus caulis solvit, cujus substantia stringit.

Extrin-

37

Semen eadem pollet qualitate cum fo-
liis.

Lock. de canle. Vide Dispensf.

Βύζλωσσον, Bi-
glossum, C. B.

{	Sativum	{	Latifolium	{	Vulgatum. <i>Vide Borrago.</i>
			Augusti- folium.		Peregrinum. <i>Hisp. inusit.</i>
{	Sylvestr.	{	Majus	{	<i>Hujus loci.</i>
			Minus		Minus
{	Sylvestr.	{	Majus nigrum	{	<i>Inusitata.</i>
			Minus 1. 2. 3.		

OFFICIN. NAT.

Flores, Radices & Folia.

N. Radix asservatur excorticata.

Vires. *Easdem obtinet quas Borrago.*

Eadem quæ Borriginis.

PRÆPARATA.

N. *Succus buglossa mucilaginosus*, adeoque difficilis est expressu: eapropter si nihilominus eundem desideraris, colloca in loca humida per noctem, hinc exprime.

Pera Pastoris, Tschelkraut / Hirtentäsch / Hirtenseckel / Seckelkraut.

[illegible]

major, *Tab.* Bursa pastoris major folio
sinuato; *C. B.* 2.

Media describitur Bursa Past. minor,
Tab. minima, Ger. C.B.2.

Minor est Pastorialis bursa minor,
Dod. minima, Lob.

CRC-

Crescit B. passim in locis incultis, Floret Aprili.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Refrig. & sicc. adstringit & consipat, hinc valet in hamorrhagia narium, expuitione sanguinis, diarrhaea, dysenteria, mictione cruenta, fluxu ni-

mio mulierum. Externe vulneribus solidandis à plebeis adhiberi solet, nec sine successu: uti & hamorrhagis narium (sub aliis & in nucha.) Quinimo adhibetur sapius in cataplasmatibus febrisugis qua carpis imponuntur.

PRÆPAR.

▽. Ex foliis.

LXV. Buxus seu Buxum.

μύρτο, Buchsbaum.

Arborefcens. Hujus loci.

Fruticosa.

Foliis rotundioribus. Chamepýxos, Trag. Hab. Hac utuntur ad areolas hortorum.

Insignitur Buxus, Brunf. Maub. Dod. Fuchf. Lon. Lob. Cast. Cam. Tab. Buxus vulgaris, Trag. Buxus arborefcens, C. B. 1.

Dosis: Exigua pilula Quercetan. in Pharmac. Rest. cap. 26.

C.

LXVI. Calamus Aromaticus Index.

Calamus Aromaticus officinarum. Vide Acorns.

Calamus Aromaticus Indus, est planta Indica & diversa ab Acoro. Super quo legi potest Garzias ab horto, lib. 1. Aromat. cap. 23. & annotationes Clusii in eundem.

Inscribitur καλαμῶν simpliciter & καλαμῶν μυρτίδος, Hippocr. & Galen. καὶ ἀρωματικός, Diosc. Oribas. Aegin. Aetio. Calamus Alexandrinus, Celso. Calam. aromaticus, Cord. in D. Fuchf. Gartz. Loc. Acoft. Calamus aromaticus Indicus, C. B. 1. inter arundines odoratas, German. wolriechend Calamus.

N. Rara planta est officinis nostratibus

Vires. Rari usus est in Medicina: sunt tamen qui oleum ex ligno destillant, summè narcoticum: idq, non solum summo perecommendant in Epilepsia, odontalgia (si dentis calpium ipsi intinctum in radicem dentis dolentis immittatur) dentibusque corrosis, verminatione, &c. sed & pro oleo Ligni Heraclei Rulantino vendicant. Videatur Quercet. Tetrad. p. 214. 215. 216. ubi buxum lignum efficacissimo sulphure narcotico scaterere docet.

Extractum Ligni. Vid. l. 2.

Vires. Insigne est sudoriferum & specificum ad Epilepsias, vermes, putredines.

CLASSIS I.

33

bus & non nisi Foliis solummodo arundinaceis (iisque raris) nota.

Substituunt itaque Acorum seu Calamum Aromaticum officin.

Vires. *Calfac. sicc. 2. acris est. Ususque praeipui in Uteri affectibus & nervorum doloribus. Garzias ab Horto.*

LXVIII. Calamintha.

Incana, ocymifoliis.

Pulegii odore seu Nepeta.

Vulgaris, vel officinarum.

Hac usualis.

C. B. Magno flore.

Exiguo flore.

Arvensis verticillata.

Dicitur Calamintha, *Math. Fuchs.* vulgaris, *Cam. Cal. montana, Dod. Cast.* Calam. montana vulg. *Lob. Tab.* Nepeta montana, *Cord. in D.* Mentha fativa rubra, *Ger.* Calamintha vulgaris vel officinarum Germania, C. B. 3. aliis calamentum. Germ. *Aefermünk/ Calament.*

Floret Junio & Julio, crescit in arvis.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. *Calfac sicc. & aperit, attenuat, discutit, extergit partium tenuium est, stomachica ac uterina imprimis, hinc & pectoralis atque Epatica: menses ciet, foetum ejicit, urinam movet, tussi medetur, Epas reserat.*

PRÆPAR.

1. ∇ . Ex planta integra Junio vel Julio collecta.

2. Sal. Ex cinere.

Syrup. compos. de calamintha. Vid. Dispens. August.

4. Spec. Diacalaminth. Vid. Disp.

LXVIII. Calcatrippa.

Videatur consolidida Regalis, *Marthiol. Cast. Cam. Tab. Ger.* Consolidida Regia, *Lob. Flos. Regius, Dod. Delphinum, Clus. Germe Rittersporn.*

Varia extant genera, quod colores, florum multipliciter, modumve nascendi differentia, adeoque alia est flore simplici, alia pleno, quædam hortensis, alia arvensis. Hortensis colitur in hortis, arvensis passim in arvis reperitur, præstantiorque habetur hortensis. Floret Majo, Junio.

N. Sunt qui calcatrippam pro Delphico Dioscoridis reputant, alii Cuminum sylvestre Dioscoridis esse volunt. Sufficit nobis scire vires & usum.

OFFICIN. NAT.

Herba & Flores.

Vires. Omnes calcatrippa species siccant, calore & frigore temperata sunt, subastringunt, vulnera consolidant, partum faciunt intrinsecus & extrinsecus adhibita.

PRÆPARATA.

1. ∇ . Stillat. Ex herba cum floribus collecta initio Junii.

Vires. Commendatur ad oculorum rubedinem & ophthalmias. Præsertim quæ è cœrulei coloris floribus prolecta est.

2. Conserva. Ex floribus.

Vires. Commendatur ad tormina ventris infantum, ut & ad ardorem stomachi.

Ecc ee LXIX.

LXIX. *Caltha*.

Calendula, Chrysanthemon, *Mingelblum*.

Est præcipue vulgaris. *Hæc officinalis.*
palustris. *Hæc officinis ignota.*

Indigitatur. *Calendula, Brunf. Trag.*
Dod. Cam. Caltha sativa, Tab. Caltha,
Math. Fuchf. Lon. Cast. Chrysanthemum,
Lob. Calendula simplici flore,
Ger. Caltha vulgaris, C. B. 1.

Crescit in hortis, florere incipit
Majo, floretque per integram æstatem.

OFFICIN. NAT.

Flores.

Vires. Flores Cardiaci censentur,
hinc Epatici calf. & sicc. 2. præcipue si
succis sint) aper. discut. sub. astring. men-
ses cient, partum promouent. (sumus
subditus parturienti.) sudores movent,
alexipharmaci censentur, ietero meden-
tur.

PRÆPARATA.

1. ▽. Ex fol. & flor. cum incipit flo-
rescere.

2. Acetum.

3. Conserv. Ex floribus.

LXX. *Cannabis*.

Est { *fœminina* } *Hæc usuales.*
{ *masculina* } *promiscue*
{ *sylvestris* }

Dicitur *Kavvaßis*, *Diosc. Cannabis*,
Brunf. Math. Dod. Lon. Lob. Cast. Cam.
Tab. Ger. major, Trag. sativa, Fuchf.
Cord. in D. C. B. 1. vulgo, Canapus, Ger-
man. Hanß/ zabmer Hanß.

Colitur in agris: Florer Julio.

OFFICIN. NAT.

Semen raro Herba.

Vires. Semen calf. (aliis refr. g.) sic-
catque, semen genitale imminuit (usu
continuo) suffopitulantur. Ietero sub-
venit: ac caput vaporibus replet.

Herba refrigerat & siccit, ambustis
convenit, aurium dolores (ab obstructione
natos) sanat (succus instillatus).

LXXI. *Capparis*.

Frutex est, exoticus, ex quo flores
antequam è gemmis erumpant decer-
puntur, conditique ad nos transportan-
tur.

Nominatur *Capparis, Trag. Mat-*
thiol. Gord. in D. Lon. Cast. Cappar. 2.
Tab. Capparis spinosa, Bellonii. Cappa-
ris retuso folio, Lob. Capp. rotundio-
re folio, Ger. Capparis spinosa fructu
minore, folio rotundo, C. B. 1. Germ-
Cappern.

OFFICIN. NAT.

Cortex radices inprimis.

Vires. Calf. & sicc. est spleneticus, a-
crius, amarus, austeriusculus, ideoque in-
cidens, aperiens, exterpens, subastrin-
gens. Prodest in affectibus Arthriticis,
hypocondriacis, & simil.

PRÆPARATA.

Conditi flores.

1. Conduntur + affundendo.

2. Sal. aspergendo.

N. Nocere creduntur stomacho imbe-
cilliori. Epatis contra & Lienis conferunt
obstructiones eorum referando.

1. Oleum.

CLASSIS I.

35

1. *Oleum Compos.* Vide Disp.
2. *Trochs. de Cappar.* Vide Disp.
3. *Extract. e corticibus Rad.* Fit secundum Quercetan. cum ∇ flor. Genistæ vel simili P.R. cap. 26.

LXXII. Caprifolium.

Περικλῦμενον, Matritylva, Voluctum majus, Lilium inter spinas. Waldwin. de/Spectgilg/Geißblat/Zaungilg.

Est { non perfoliatum } utrumque promissum
 { perfoliatum } sive officinale est.

1. Non perfoliatum vocatur Caprifolium, *Brusf. Lon.* Germanicum. *Dod.* Periclymenum, *Trag. Fuchf. Cord. in D. Cam.* Periclymenum non perfoliatum septentrionale, *Lob.* Periclymenum vulgare septentrionale, *Clus. hist.* Periclymenum non perfoliatum Germanicum, *C.B. 1.*

2. Perfoliatum dicitur Periclymenum, *Matth. Cast.* Periclymenum perfoliatum, *L. b Tab. Ger.* Periclymenum vulgare alterum, *Clus. hist.* Periclymenum perfoliatum, *C.B. 1.*

Crescit in dumetis, fruticibusque instar convolvuli adhærescit. Floret Maio, ac Junio.

OFFICIN. NAT.

Florès.

Vires. *Calß. & sic.* diureticum validum ac spleneticum est. Usus præcip. in asthmate & tussi. Externe exergit ulcera sordida sanat impetigines, aliasque cutis maculas abstergit.

PRÆPAR.

∇ . stillat. Ex floribus.

Vires. Confortat nervosum genus, auxiliatur asthmati, tussi, palpatum cordis: faciliat ac accelerat partum, oris siccitatem emendat (in gargarismis.)

Succus ex foliis raro exeat, insignis tamen efficacia est in vulneribus capitis ac crani curandis.

LXXIII. Cardamomum & grana Paradyfi.

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Gratum Paradyfi. | Cardamomum
C. B. |
| 2. Majus officinarum. | |
| 3. Medium. | |
| 4. Minus in officinis simpliciter Cardamomum dicitur. | |
| 5. Minimum. | |

Ex his officinis usualiora sunt Grana Paradyfi, quæ officinis Cardamomi majoris nomine veniunt: tam cardamomum simpliciter ita dictum, quod officinarum Cardamomum minus audit.

Grana Paradyfi inscribuntur Cardamomum majus, *Matth. Lon. Cast.* Gran. Parad. *Cord. in D.* Millegueta, *Lob.* Malaguetta, *Garz.* Cardam. Arabum majus, *Tab. Germ.* Paradyß, *Pörner.*

Cardamomum simpliciter dictum videatur, Cardamom minus, *Matth. Lon. Tab. Cord. in D. & hist.* minus vulgare, *Lob. Clus. in Garz.* Germ. Cardomölein.

N. De Cardamomo veterum disputatur
 Eeeee 2 tur

tur, utrum generibus his 5. contineatur. Sunt qui Cardamomum majus, veterum Cardamomum esse contendunt: alij contradicunt, obijcientes amaritudinem ac odorem gravem, quibus veterum Cardamomum celebre fuit, nostrum non iterum.

Eligitur utrumque quod est frangenti contumax, plenum, occlusum & caput odore tentans, gustu acre & subamarum.

Affertur utrumque in Europam Alexandriam Aegypti ac etiam ex India Orientalis Provinciis Malavar. Java & simil.

OFFICIN.

Fructus uterque Cardamomum scilicet & grana Paradisi.

Vires. Utrumque calfac. & sicc. (majus gr. 2. minus 3.) partes principes recreat, attenuat, flatus discutit, collisionem juvat, proin conducibilis eorum usus est in affectibus capitis, ventriculi & in primis uteri.

PRÆPARATA.

1. Ol. Cardamomi.

2. Confectio.

LXXIV. Cardiaea

Cardiaea, Math. Lob. Lon. Cast. Tab. Ger. Fuchf. Melissa sylv. Trag. Marrubium mas, Brunf. Marrubium Cardiaea dictum, forte primum Theophrasti, C. B. 1. Germ. Hertgespan.

Crescit juxta sepes & vias, locisque gaudet frigidis: floret Julio.

OFFICIN. NATIVA.

Folia.

Vires. Calf. 2. sicc. 3. attenuat, discutit, peculiariter medetur distensionibus hypochondriorum & cardia infantum (quem affectum cardiacum seu cardialgiam appellant,) ciet urinam & menses, pectus à pituita detergit, difficulter parientibus opitulatur.

PRÆPARATA.

1. ▽. Ex herba quæ præcipuè in usu est.

2. Ungnendum Cardiacum. Vide l. 2.

LXXV. Carduus Benedictus.

Dicitur Carduus Benedictus, Brunf. Trag. (cui & Acanthus Germanicus,) Math. Lob. Cast. Tab. Cam. Ger. Attractilis hirsutior, Fuchf. Acanthium, Cord. in D. Lon. Cnicus sylv. alter Theophrasti, Cord. in D. Cam. Cnicus supinus, Cord. hist. Carduus benedictus & attractilis altera species, Dod. Cnicus sylvestris hirsutior, sive Carduus benedictus, C. B. (4. Cnici.) Germ. Cardobenedicten / gesegnete Distel.

Crescit in hortis, floret Junio & Julio.

N. 1. Tempus sationi aptius est & crescente.

N. 2. Carduus benedictus si sub initium Iunij collectus fuerit, vulnera recentia mirabiliter curat, sin alio tempore, nunquam id præstabit.

OFFICIN. NAT.

Folia & Semen.

Vires.

Vires. *Herba Cardiaca*, alexipharmaca, ac sudorifera est ex usitatissimis, *Calf. & sicc.* 2. atten. aperit, disc. veneno ac putredini resistit, febres etiam inveteratas & quartanas curat. Laudatur à nonnullis peculiariter in Cephalæa clavo dicta, ut & in surditate, Extrinsicus rarioris est usus, adhibetur tamen nonnunquam ad gangrenam arcendam (in Epithem. vel cataplas.

Semen vires eandem obtinet, sed usu non æque crebro adhibetur, commendatur in primis ad Epar obstructum.

PRÆPAR.

1. Pulvis. Datur ad Drach. j.
2. ▽. Ex herb. integr.
3. Spir. Ex herb. fermentata.
4. Succus. Ex herba expressus.
5. Sal. com. Cinere.
6. Oleum stillatit.
7. Conserv. Ex foliis seu summit.
8. Syrup. Ex succo.
9. Extract. Ex foliis c. Acet. destill.

LXXVI. *Carduus Maria.*

Carduus Mariæ, Trag. Fuchs. ico. Lon. Calf. Ger. Vulgaris, Cam. Carduus Lacteus, Maub. Spina alba hortensis, Fuchs. Carduus albus & Chamæleon, Brunf. Carduus Marianus, Cord. in D. Tab. Carduus Leucographus. Dod. Carduus albis maculis notatus vulgaris, C. B. i Silybum, Lob Germ. Marien-distel / Fratrundistel / Bebedistel.

OFFICIN. NAT.

Semen in primis, hinc Folia & nonnunquam Radix.

Vires. *Pectoralis in primis Carduus Maria* censetur. *Calf. & sicc.* 2. substring. incidit, aperit: in ceteris amulatur *carduum benedictum*. Usus praeprae in plenitudine, Ictero ac hydropo.

Dosis seminis ad Drach. j.

N. Semen in emulsionibus crebrius est usus.

PRÆPAR.

▽. Ex herba tenella.

LXXVII. *Carlina.*

καριλίων λευκός, Apri radix, seu *Ebertwurk* / Brunf. Carduus panis seu pacis, Erivo Cord. Chamæleon albus, Maub. Cord. in D. Calf. Carlina herb. rior. Lob. Chamæleon albus Diosc. Lob. ico Clus. hist. Carlina humilis (vel altera) Dod. Carlina sessili flore, Cam. Carlina acaulos magno flore, C. B. i. aliis Carolina, Cardopatum. Germ. Weiß Ebertwurk.

Crescit in locis montosis, v. g. in Alpibus Helvetiæ & alibi.

OFFICIN. NAT.

Radix collecta tempore verno.

Vires. *Calfac. & sicc.* 3. est alexipharmaca, sudorifera, diuretica, emmenagoga, tinea ventris necat.

LXXVIII. *Carum.*

καρόν, καρόν, καρόν, Caros, Brunf. Trag. Carum, Fuchs. Carum, Cord. in D. Maub. Lob. Dod. Calf. Tab. Ger. Carvi, Lon. Cuminum pratense, Carvi officinarum, C. B. i. Germ. Weißkümmel / Feldkümmel / Mattkümmel.

Eccccc 3

OBEL

OFFICIN. NATIVA.

Semen.

Vires. Calfac. & sicc. 3. discut. atten.
Stomachicum est ac diureticum lactis abundantiam præbet. Hinc usus ejus insignis in colica, & vertigine, &c. cum interne tum externe applicatum.

PRÆPAR.

1. Confectum Semen.
2. Conduca Radix, sed raro.
3. ∇. stillat. Ex planta integr.
4. Ol. Ex semine sicco-l. a. destillatum.

LXXIX. Cariophyllus hortensis.

Videatur Cariophyllus, Lob. Tab. Ger. Cast. Matth. Cam. Lon. Cariophylla, Tab. Veronica, Dod. Betonica altilis coronaria. Tunica Fuchs. Mägelblümlein / Grassblümlein.

Hortensis, colitur in hortis varior. color. & discrepantis plenitudinis.

Est Sylvestris, qui rarius.

Florescit Junio atque in multam æstatem.

OFFICIN. NAT.

Flores potissimum rubri.

Vires. Moderato calf & sicc. Cephalici sunt ac cordiales. Usus præcip. in vertigine, Apoplexia, Epilepsia, aliisque capitis & nervorum affectibus. In syncope ac palpitatione cordis: fugant lumbricos, allevant partum: Extrinsecus adhibentur in vulneribus capitis: ex-

trahunt ossa cranij fissa; leniunt Cephalalgiam & Odontalgiam.

PRÆPARATA.

1. Succus inspissatus, essentia dictus. R. Flor. rubr. (cum primum gemmæ explicari incipiunt), resectisque albidis illis partibus conquassa irrorando, exprime, clarifica ac coagula lentissime.

N. Calore nimio perdit vires, nimia agitatione cum spatula amittit colorem.

Dosis. à Scrup. s. ad Drach. s.

2. Conserva ex floribus.

3. ∆ stillat. ex flor. cum herba lenissimo NB. calore.

N Ophthalmica insignis est, &c.

4. Syrupus. Ex infusione florum.

5. + Ex infusione florum. Vide lib. 2.

LXXX. Cariophylli Aromatici.

Charunfel Arabibus. Cariophylli, Matth. Tab. Cariophyllus, Cord. hist. Cast. Calafur Arabibus & plerisque Indis Cariophylli, Lob. Cariophyllus florens & Cariophylli, veri, Ger. Cariophyllus aromaticus fructu oblongo, C. B. 1. Antophylli dicuntur reliqui majores, Lon. Lob. Tab. Ger. Cariophylli maturi seu majores, Cord. hist. Cariophylli mares, Avicenna.

Fructus, seu si mavis flos est aromaticus exoticus, Solis radiis induratus & nigrefactus.

Duplicis sortis prostant: Nimirum

1. Cario-

1. Caryophylli dicti, qui discussi sunt antequam maturuerunt, unde & minores esse solent. Germ. Nelken.

2. Antophylli, Mutternelken/ qui maturitatem assecuti sunt: unde & majores existunt.

Delectus: Eligendi sunt suave fragrantēs, oleosam quandam humiditatem premendo exhibentes.

Vires. Cardiacum, Cephalicum ac Stomachicum in signe exhibent, calf. & sicc. 3. discut. Hinc profunt in Lypothymia, odontalgia, cruditate ventriculi, vertigine; arcēt quoque morbos malignos, uterinos, &c.

PRÆPARATA.

1. Confect. Fit. l. a.

2. ∇. ut ex aromatibus reli-

3. Oleum. quiseleiciuntur, vide l. 2. vell. 4 in Cinamomo.

N. 1. Caryophylli multum olei fundunt.

Vires. Oleum hoc denti cavo indatum odontalgiam mirifice lenit.

4. Extractum. Fit ex caryophyllis cum aq. stillat. & Spir. vin. l. 2.

5. Sal. com. Ex remanentiis incineratis elixiuiatur.

6. Balsamus. Fit l. a. ex ol. Nucistæ depurato ac ol. caryophyll. tingiturque pulvere caryophyllor.

7. Species diacaryophyllor. Vide Dispensator.

LXXXI. Caryophyllata.

Caryophyllata, Brunf. Trag. Lon.

Matth. Cast. Tab. Ger. Vulgaris, Lob. Cam. Clus. hist. Caryophyllata hortensis, Eufch. Herba benedicta, Brunfels. 4. Caryophyllata vulgaris, C. B. 1. alias Sanamunda. Herba benedicta. German. Benedictwurz / Benedictkraut.

Crescit locis incultis pinguibus juxta sepes.

OFFICINÆ.

Radix collecta mense Martio, quæ odoris fragrantis est (23. Martii circiter.) raro Folia.

Vires. Calfac. & sicc. 2. substring. robor. discut. cephalica ac cardiaca est. Usus præcipui interne in catarrhis exiccandis, sanguine coagulato resolvendis.

LXXXII. Castanea.

Κάστανος, Castanea, Brunf. Trag. Fachs Dod. Lac. Lon. Lob. Tab. Ger. Castanea minores, Matth. Castanea sylvestres Cord. in D. Cast. Castanea sylvestris, quæ peculiariter castanea, C. B. 1. Germ. Kastanien.

Castanea et si omnium glandium sint præstantissima, teste Galen. attamen præter membranam rubram, cortici ac catni intercedentem, nihil officinis exhibent.

Vires. Membrana sistit valenter immodicos alvi flores & sanguinis rejectiones (in vino austero sumpta.) Quin etiam cum pari pondere ramentor. eboris, albaæ feminar. profusa cohibet.

Dosis Drach. ij. Matthiol.

LXXXIII.

LXXXIII. *Centaurium*

minus.

Centaur. { Minus. De quo hic.
 { Majus. Est Rhaponticum
 vulgare. Vide suo loco.

Dicitur *Centaurium*, *Trag. Matth. Fuchf. Dod. Lac. Lon. Lob. Cam. Cast. Tab. Centaurium parvum, Lob. Ger. Centaurea, Brunf. Cast. minor, Brunf. Centaurium minus, C. B. i. alias febrifuga, fel terræ. Germ. Tausentgüldenfraut / Erdgall.*

Nascitur solo arido, & pratis sabulosis; Floret Julio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Planta foliis ac floribus referta, vel *summitates* solæ.

Vires. Spleneticum est & Epaticum, *Calf.* & siccat, amarum est citra mordacitatem, unde & leniter astringens, extergens, aperiens, vulnerarium: biliosos & pituitosos humores quam lenissime per alvum educit, serum per poros discutit. Hinc utile in febribus (unde & nomen habet, *lilero*, menstruis suppressis, *Scorbuto*, *Arthritide*, *lumbricis*, & specificè in *morfu canis rabidi*.

N. Tanta estimationis est, ut vix vinum medicatum seu absynthites vulgus parci, cujus partem non constituat.

PRÆPARATA.

1. ∇ . Ex integra planta.

2. *Extract.* i. e. succus inspissatus ex herbis ac floribus conquassatis atque cum aqua maceratis.

Dosis ad Drach. j.

3. *Sal. com.* Ex Cinere.

LXXXIV. *Cepa, Cepe.*

Κεράμυρον, Arab. Bassal. *Cepe, Trag. Fuchf. Matth. Cord. in D. Cast. Capitata, Matth. Cepa rotunda, Dod. Cepa sativa, Matth. Cepa alba & rubra, Lon. Tab. Cepa vulgaris, C. B. i. Germ. Zwiebel / Zwissel.*

Ceparum etiam variaz dentur species, differentes pro diverso colore florum & radicum, tum pro diversa radicum figura, rotunda, oblonga, sessili, &c. at tamen conveniunt facultatibus, adeoque promiscue usurpantur, acriores tamen sunt oblongæ.

Coluntur in hortis, soloq; gaudet optimo: Florent Junio & Julio.

OFFICIN. NAT.

Radix sola.

Vires. *Calf.* & sicce, ad gr. 4. aper. incidunt, abstergunt, parvum sunt crassarium, adeoque statulenta. Usus præcipui in tartaro pulmonum incidendo & expellendo (cum melle cocta & esitata) in urina & menstruis ciendis, in lumbricis fugandis (ex infusione.) Extrinsicis maturant & rumpunt apostemata (cocta & imposita) etiam maligna in peste (impleta Theriaca vel Muhridatico & cocta.) Urinam proritant (tosta in axungia & imposita. N. idem facit membrula cuilibet carnea particula intercedens, glandi scilicet imposita.) Pernioni conferunt (cum adipe cocta & imposita) menses & hamorrhoides proliciunt (subdita) ambustis medentur

(Cra-

(cruda cum sale subacta ac statim imposita.)

N. Sunt qui contagioso aëre in conclavibus suspendunt, inque contagium colligi, adeoque conclave purgatum iri autumant.

LXXXV. Cerasa.

Cerasorum varia producuntur genera, tam secundum colorem, quam secundum saporem differentia. Veruntamen in usum pharmaceuticum duo potissimum accersuntur, subacida rubra scil. (Amarena) dulcia nigra.

Cerasa apud omnes ferè authores nomen suum retinent & dicuntur cerusa. Germ. Kirschen.

OFFICIN. NAT.

Cerasa utriusque generis siccata. Nuclei & Gummi.

Vires. Acida refrigerant, siccant, astring. Cor ac Stomachum roborant. Hinc utilia in febrili siti ac astu mitigando, &c. Fernel. decoctum cerasorum in hypochondriaco affectu summè commendat. Dulcia temperata sunt ad humiditatem inclinantia, cephalica, unde & in morbis capitis Apoplexia, Epilepsia, Paralyti, &c. peculiariter proficua censentur.

Nuclei calculum comminuunt, adhibenturque contusi in frontalibus, unguentove refrigeranti commixti, ad dolores febriles capitis demulcendos faciunt.

Gummi celebratur vi lithonriptica.

1. *Condita.* Condiuntur acida cum saccharo. Vide supra.

2. *Succus sive Rob.* Ex acidulis fit, expressione scil. & inspillatione.

3. *Syrup.* Ex succo acidor. & saccharo $\frac{1}{2}$.

4. ∇ . *Stillat.* Ex dulcibus nigricantibus.

5. *Spir.* Ex dulcibus nigris fermentationis dicitur & Q.E. Vide de Spirit.

6. ∇ . *diuretica.* Ex nucleis utrorumque. Vid. l. 2.

7. *Tinctura ac Extractum.* Ex nigris fit cum Spir. vin. vel ∇ propria l. a. *Querc. Phar. Rest.*

8. <i>Diamarenatum</i>	{	<i>simplex.</i> R. pulp. ceras. vinos. (per cribrum) lb.
		iiij. sacch. lbij.
		<i>compos.</i> fit ex simplici ac aromatibus.

9. *Oleum.* Ex nucleis exprimi potest, sed minus usuale.

LXXXVI. Cerefolium.

Kaiserpolder. Chærefolium, Brunf. Dod. fativum, Trag. Cerefolium, Matth. Cast. vulgare, Ger. Lon. Lob. Cam. Tab. Gingidium, Fuchf. Chærophyllyum fativum, C. B. l. alias. Cerifolium, Germ. Kerbel.

{ fativum. Hoc officinale. & jam nominatum.

{ sylvestre. Hoc minus usuale.

Crescit in hortis, floret Majo.

OFFICIN. NAT.

Folia & Semen.

Fff ff

Vires.

Vires. *Calfac.* & *secc.* *disentit;* est par-
tium tenuium, diureticum; emmenago-
gon ac lithonripticon, sanguinem coagu-
latum resolvit, somnum suaviter indu-
cit. Extrinsicus usus insignis est in do-
lore colico, in urina retenta (imposit. in
cataplas.)

PRÆPARAT.

1. ∇ . *stillat.* Ex integra planta.
2. *Sal Com.* Ex cinere.

LXXXVII. Chamadrys.

*Trixago, Triflago, Quercula Cala-
mandrina, Gaimanderlein, Klein Bath-
engel.*

Species dantur varix, ex quibus offi-
cinales præ reliquis chamædrys minor
repens, C. B. 3. Chamæpitys, *Brunf.* cha-
mædrys, *Cord. hist. Tab.* chamædrys ve-
ra, *Trag. Cord. in D.* vera mas, *Fuchf.*
cham. vulgaris mas, *Lon.* chamædrys
major, *Lob. ic.* minor, *Ger.* chamædr.
minor repens, *Dod.* chamæd. major vel
2. *Clusf.*

Colitur in hortis, solo gaudens aspe-
ro floret Junio, ac Julio.

OFFICIN. NAT.

Folia ac Flores.

Vires. *Calf.* & *seccat.* ad gr. 2. Est *stle-
netica* ac *Epatica*, saporis amari, incid.
atten. aperit, potenter urinam ac sudorem
movet. Hinc confert in feyibus, Scorbu-
to, sanguine coagulato, Hydroke incipi-
ente, mensibus obstructis ac inprimis
in arthritide. Extrinsicus in ulceribus
serpentibus, in dolore hamorrhoidum, in
scabie ac pruritu, in catarrhis excitandis.

PRÆPAR.

1. ∇ . Ex integra planta, foliis scil. &
floribus.

2. *Conserva.* Ex floribus.

N. Est & chamadrys fruticescens, quam
Tencrium vocant, hac iisdem pollet viri-
bus. Et præter hanc est chamadrys vulga-
ris, juxta sepes nascens, qua vere substitui
potest.

LXXXVIII. Chamæpitys.

Ajuga, abiga, Arthetica, Arthritica,
*iva arthetica, Schlassträutlein, je län-
ger je lieber, pidigrin. Arab.*

Ex generibus variis chamæpytis of-
ficinalis præ reliquis est lutea vulgaris,
C. B. 3.

Quæ dicitur chamæpitys 3. *Trag.*
Fuchf. 2. *Lon.* chamæpitys 1. *Mauh.*
Dod. *Cord. hist. vera, Cord. in D.* cha-
mæpitys major, *Tab. mas, Ger.* Ajuga
sive chamæpitys mas *Dioscoridis, Lob.*
Ajuga, Cast. Ajuga luteo flore, *Clusf.*
hist.

Crescit in agris sabulosis, floret Julio
& Augusto, præcipue autem in hortis
colitur.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus, seu herba tota.

Vires. Nervosum genus roborat, *calf.*
2. *secc.* 3. incid. aper. diuretica est, & em-
menagoga, confert in arthriticis dolori-
bus.

PRÆPAR.

1. ∇ . Ex herba integra.

2. *Pilula de iva arthritica.*

LXXXIX. Chamomilla.

Χαμαίμελλον, ἀνθεμίσ. Leucanthemum
Dioscor. camomilla, chamomilla, Cha-
miden.

Est } vulgaris. Hac usitatissima.
Romana seu nobilis odorata.
Hac itidem usualis.
fœtida. Hac minus officinalis.
Inodorata. Itidem minus usualis.
vulgaris insignitur chamomilla
3. & vulgaris, Trag. Lon. chamæme-
lum (parthenii 3. species,) Brunfels.
Cast. Tab. Ger. chamæmelum Leucan-
themum, Fuchs. chamæm. sylv. Dod.
arvense, Cam. Anthemis, Cord. in D.
Mauh. Anthemis vulgatio, sive
chamæmilla, Lob. chamæmelum vul-
gare, Leucanthemum Dioscoridis,
C.B. 1.

Romana dicitur, Parthenium &
nobilis chamomilla, Trag. Lon. Leu-
canthemum odoratum, Dod. Anthe-
mis seu Leucanthemis odorata, Lob.
chamæm. odorat. Cam. Romanum,
Tab. Ger. chamæmel. nobile seu odo-
rati, C.B. 2.

Vulgaris nascitur passim, in arvis ali-
isque locis arenosis. Romana colitur
in viridariis. Fœtida invenitur itidem
passim.

OFFICIN. NAT.

Flores seu tota herba, tam vulgaris,
quàm Romanus.

Vires. Calf. & succ. 1. diger. laxat.
mollit, mitigat dolorem, menses & uri-
nam ciet. Eapropter usus insignis est
in dolore colico, & hinc pedisequa paret.

Extrinfecus usitatissimus ejus usus est in
paregoricis, emollientibus, maturantibus,
cataplasmatibus, clysteribus, &c.

PRÆPARATA.

1. ∇. Ex vulgari.
2. ∇. Ex Romana.
3. ∇. carminativa seu de chamomilla
composita. Vid. l. 2.
4. Ol. stillat. Ex vulgari.
- N. Destillant alij cum Terebinthina;
unde oleum caruleum.
5. Ol. stillat. Ex Roman.
6. Ol. infus. Ex vulgari seu cum flori-
bus ac oleo communi.
7. Sal com. ex cinere.
8. Syr. de succo chamomillæ.

XC. Chelidonium majus.

Χελιδόνιον μέγας, Chelidonia, Brunf.
Chelidonium majus, Trag. Mauh.
Fuchs. Cord. hist. Dod. Lob. Cast. Tab.
Ger. vulgare, C.B. 1. aliàs, Hirundinaria.
Germ. Schwalbentwurz / Schellwurz /
Goldtwurz.

Crescit passim juxta sepes, adhære-
scitque muris: Floret primo statim vere
& per multam æstatem.

OFFICIN. NAT.

Folia c. floribus, Radix.

Vires. Calfac. & succ. 3. valide ab-
sterg. atten. saporis est acris & amari,
bilem per alvum & urinam educit, vi-
sum acuit. Hinc conducit in ictero, ob-
structione Lienis & Epatis, Ocrearum.
Radix alexipharmaca statuitur. Ex-
trinfecus oculorum imbecillitati, ul-
cers.

FFFF 2

ceribus, ceterisq. affectibus medetur (Cujus rei gratia sunt, qui succum lacteum ex rupto caule manantem, oculis indunt.)

N. Sunt qui ad Icterus sanandum plantis pedum supponunt.

PRÆPARATA.

1. Succus inspissatus.
2. ▽. Ex herba cum floribus.
3. Sal. com. Ex cinere.

XCII. *Chelidonium minus*

Χελιδόνιον μικρόν, *Ficaria* & *scrophularia minor* vel. 2. *Brunf.* *Chelidonium minus*, *Trag.* *Matth.* *Fuch.* *Dod.* *Cord.* in *D.* *Lon.* *Lob.* *Cast.* *Tab.* *Ger.* *Chelidonia rotundifolia minor*, *C. B.* 2. *A. rabib.* memitem, *Feigwarthentwurz* / *klein Scheitkraut* / *Schorbuelstrauch*.

Crescit locis humidis & palustribus. Florer Martio.

OFFICIN. NAT.

Radix & *Folia*.

Vires: Refrig. & humect. spleneticum est. Usus præcipui in Ictero, Scorbuto, hæmorrhoidum fluore. Extrinsecus specifice mariscas seu sitos ani curat; dentiumque parvedani maximopere subvenit.

PRÆPARATA.

▽. *Stillat.* Ex herba tota.

XCIII. *Chermes*

Kermes, *coccum infectorium*, *Matth.* *coccus infectoria*, *Cord.* in *D.* *Cast.* *Tab.* *Granum* & *coccus baphica* *Dioscor.* *granum tinctorium*; *Lon.* alias *Scarlatum*: Fructus est famosis-
simi fruticis, qui in scribitur *Ilex* in

quo *coccus baphica*, *Bellon.* *Ilex coccigera*, *Clus.* *hist.* *Ger.* *minor coccigera*, *Dod.* *Ilex coccigera*, *Cam.* *Ilex aculeata cocci glandifera*, *C. B.* 4. *Germ.* *Schwaartachbeer* / *Kermesförner*.

Nascitur in Creta, teste *Bellon.* *L. r.* *obs. c.* 17. uti & multis Hispaniæ locis, in Narbonensi etiam Gallia & Provincia, &c.

Delect. Eligenda sunt grana rubicundo-nigra, integra-vermiculum in se continentia.

Vites. *Cardiasa* sunt grana calf. & sic adstring. vapores retro discutiunt, spiritus vitales resciumt, parvuriens subveniunt, vulneratis nervis medentur, morbillos erumpere faciunt.

PRÆPARATA.

1. *Confectus Alkermes*. Vide *Dispa*. Fit cum & sine moscho illa viris, hæc mulieribus convenientior est.

2. *Extractum seu Essentia*. Fit de fructibus contulis cum spir. vin. vel ▽ *Rosar.* quæ acidula reddita sit guttulis aliquot. Spir. Vitriol. aut Sulphuris. *Quercet.*

N. *Scarlatum pannus*; grana hisce (quibus tinctus est) admodum celebris est, adhibeturque non modo ad morbillos proliciendos. (Patientes in eum involvendos, (sed & ad cor roborandum (Epithemata eo suscepta cordis regioni imponendo.) ut & ad bubones venereos curandos (pannum iis imponendo.) Quin & filo sericeo hujus coloris, ad arcendum Erysipelas locum affectum circumligare vulgo usitatissimum est.

XCIII.

XCIII. Cheyri, Keyri, Leucojum.

Classes Leucojorum C. B. sunt 4. exhibetque

1. Incanum, (folio incano)	} singula sunt diversorum generum.
hortense,	
2. Incanum maritimum,	
3. Luteum folio hirsuto,	
4. Luteum folio viridi,	

Ex his placet officinis luteum vulgate; C. B. 5. inter Leucoja folio viridi, quod est Leucojum, *Brunf. Cord. in D. Leucojorum*, aureum *Matth. Leucojum Luteum, Fuchf. ico, Dod. Lob. Cast. Cam. Leuc. sativum luteum, Clus. Keyri vel Cheyri, Lon. Viola lutea, Trag. Fuchf. Ger. Viola petraea lutea, Tab. Germ. gelbe Biolen/ Mägel Biolen.*

Crescit nobis in hortis, raroque sponte provenit: Floret Aprili, Majo & ultra.

OFFICIN. NAT.

Flores, seu herba cum floribus, & raro Semen:

Vires. Cordiales sunt, Calf. & sicc. 2. attenuant, discut. partium sunt tenuium, extergent, cordiales ac nervini sunt, dolores mitigant, menses cient, secundinam proritant.

PRÆPAR.

1. Conserva. Ex floribus.
2. ▽ Ex floribus vel integra plant.
3. Ol. Ex infusis floribus in oleo veteri.

XCIV. China.

Chinæ radix, China redix, *Fragos. C. B. 1. Cina alias China, Matth. Chi-*

na, *Garz. Acof. Chinna seu Cinna, Casalp. Boeckenhurk.*

Est Orientalis. Ex regione Sinarum, China dicta.
Occidentalis. Ex Hispania nova & Peru.

Præfertur Orientalis: quæ exterius est colore rubente aut subnigro, interius candicante aut subrubente: & hæc, quod nigrior eò melior. Occidentalis colore est interius magis ruffo.

Vires. Calf. leniter siccant. 2. substringit, est diaphoretica, diuretica, discutiens, aperiens, Epatica. Hinc convenit in cachexia, hydropse, paralyfi, arthritide, cephalaa, ictero, lue venerea, tumoribus scirrhotis & adematosis.

PRÆPARAT.

Extract. cum Spir. vin. quod tamen rarius usus: adhibetur crebrius in decoctis, sufficitque Unc. j. vel Unc. ij. pro ℥ix. ▽.

N. *Vesalius de China librum conscripsit integrum.*

XCV. Cicer.

Egshard & Rücher/ Ziser Erbsen.

{	album.
	rubrum.
	nigrum.
{	Sylvestre.

Fffff;

Ex

Ex his arridet officinis rubrum fa-
tium, cui tamen & album substitui
potest.

Videatur Cicer, *Bruff. Maub.* (cui
& Domesticum, *Cord. in D. Cast. Tab.*
Ciceris altera species, *Trag.* cicer ni-
grum, *Fuchf.* seu arietinum, *Cord. hist.*
cicer arietinum, *Dod.* cicer sativum,
Ger. Arietinum, *Lob.*

Vires. Calf. & sicc. x. emoll. absterg.
discut. diuretica sunt. ac lenientia, proin-
conducibile est eorum decoctum nephriti-
cis. Extrinsecus adhibetur farina in cata-
plasmatis, &c.

XCVI. *Cichorium* &
Cichorea.

Krychior, Béig, folsequium, intybus,
Ambubeia, Cicorea, Cichoren / Weg-
wart / Sonnenwendel / Sonnen-
Frant.

4 Sativum

Sylvestre flore { cærul. vel albo.
huteo.

Ex his usitatum lativum, tum sylve-
stre cæruleum vel album.

Crescit juxta vias, floret Junio.

Sativum dicitur Cichorium dome-
sticum, *Matth. Cast.* Cichorium fati-
vum caeruleum, *Lob.* Cichorium la-
tioris folii, *Dod.* Cichor. latifolium
sativum, *Lon.* serisativa, *Lob.* Cicho-
rium sativum & album sat. *Tab. Ger.*
Cichorium sativ. *C. B. r.* Sylvestre di-
citur folsequium, *Brunf.* Cichorea,
Trag. Sylvestris, *Matth.* Seris sylvest.
Lob. Seris picris, *Lob. ico.* Cichorium

sylvestre, Dod. Cast. agreste, Lon. Inty-
bum agreste, Cord. Sylvestre, Fuch.
Cord. hist. Cichorium, Tab. Hieracium
latifolium, Ger. ico. Cichorium sylv.
sive officinar. C. B. 1. Seris ~~pluric~~ Dio-
scoridi.

Flores, Folia, (sylvestris potissimum)
Radix (sativa.)

Vires. *Epaticum* est nobilissimum frig.
 & sicc. 2. (aliis calidum videtur ob ama-
 rorem) aperit, diureticum est, attenuat,
 extergit. *Usus* precipue in *Epatis* obstru-
 ctione & febribus.

N. Collectum in sua exaltatione (die festo Nativitat. Mariae,) haemorrhagias sistere creditur.

PRÆPAR.

1. *Conſerva.* Ex floribus.
 2. *Condit.* Radix cum ſaccharo.
 3. *Syrup. ſimpl.* Ex ſucco & ſacchar.
- Vide Diſpenſ.
4. *Compoſ.* (Coridi) Vide Diſpenſ.
- Norib.
5. *de cichor. cum Rhab.* Florent.
- Vide Diſp.
6. ▽. Ex foliis & floribus.
 7. ▽. *ophthalmica.* 32. Flores cæruleos (collectos ☉ in principio ☾ collocato,) q.v. inde vitro oriſicii anguſti, obtura optimæ & maſſæ panis circumvolutum committe Clibano, ut pinſatur cum pane; hinc expreme ac deſtilla in MB.

Vires. Convenit omnibus affectibus oculor. albugini, nubecula, angui, suffu-
sioni, caligini, &c. Inungitur palpebra

CLASSIS I.

mane & vespere. Hartm. in Pract. Poppius in Herbar.

8. *Salcom.* Ex planta incinerata. Attenuat, discutit, febrifugum est.

XCVII. *Cicuta.*

Κόκτεον, *Wüterich / Schierling.*

Ex Generibus cicutarum infertur in Officinas, *cicuta major*, C. B. I. quæ *Cicuta*, *Trag. Matth. Fuchf. Dod. Lob. Lon. Cast. Tab. Ger. Cicuta major*, *Cord. hist. Cam. Vera Gestr. hist. Cicutaria vulgaris, Clus. hist.*

Nascitur passim in pratis, locis incultis & umbrosis: Floret Junio & Julio.

OFFICIN.

Folia & Radix, sed raro.

Vires. Quamvis summe frigida censeatur, atque inter venenata referatur à *Dioscoride*; Nihilominus tamen frequens ejus usus modernis est in tumore ac inflammatione lienis, succus. *Emplastro splenetico* incoctus extrinsecus adhibetur: hinc in inflammationibus aliis, quini- mo adhibetur quoque nonnunquam in collyriis.

Sunt qui radicem fodere monent: tempore & H & O.

PRÆPAR.

Emplastr. de Cicuta splenetico. Vide lib. 2.

XCVIII. *Cinamomum.*

Cortices sunt arboris cujusdam exoticæ, ejusdem nominis. German. *Zimmetrinde / Canel.*

N. *De Cassia & Cinamomo officinar.*

quod & *Canella* dicitur, controversa occurrunt opinionis. Sunt enim qui inter se confundunt & pro uno & eodem utrumque habent *Cortice*, solisque nominibus differre, non reipsa: alij ex sola loci varietate ea distinguunt, non ex diversa specie arboris: alij ex una eademque arbore utrumque desumi volunt, cujus corticem exteriorem & crassiorem appellant *cassiam ligneam* seu odoratam; interiorem & tenuiorem *Cinamomum*. Alij diversa speciei arborum corticis faciunt, inter quos tamen maxima similitudo intercedat, adeo ut *Cassia* arbor in *Cinamomi* arborem transplantari facile queat: Hac opinio *Galeni*. Recentiores prima ut plurimum subscribunt opinioni, *Cinamomum*que officinarum vulgo *canellam dictum*; legitimum antiquorum *cassiam* dicunt. Et in compositionibus *Græcorum Xylcassiam*, id est, *cassiam ligneam* seu odoratam postulantibus, *canellam nostram* esse adhibendam: Si quatenus distinguere libet; crassiorem *cassiam* appellare licet; tenuiorem *Cinamomum* differentia suborta à differente loco natali arborum.

Videantur supra hac re *Garzias* ab H. lib. 1. arom. hist. c. 15. *Joh. Manard.* lib. 8. *Epist. 1. Matthiol. in Dioscor. Caspar Bauhinus Theatr. Botan. lib. 11. f. 3. & sim.*

Frequentes sunt hæ arbores in *Zeylan*; *Cinamomum*q; præbent præstantissimum; ignobilius è contra *Cinam*; præbent arbores in *Provincia Malayar.* & *Jaba* seu *Java*.

N. Ro-

N. Rosum siue ex cinereo vinosum colorem contrahit Cinamomum, ex solis calore, cui cortex detractus exponitur: non probe idem paratus, candicans siue cinerei coloris fit, nimis vero ardoribus solis combustus niger.

Delectus. Probatur sub rubrum odoris fragrantissimi, saporis subastringentis, & acris.

Vires. Calf. & siccatur, aperit, discutit, menses & partum accelerat, omnia viscera spiritusque singulos recreat, concoctiones iuvat. Hinc usus ejus frequentissimus est in virium imbecillitate, lypothimia, capitis, ventriculi & uteri affectibus frigidioribus.

PRÆPARATA.

1. Confect. Cinamom. Fit l. c. ut ex aliis aromatibus. Vide l. 2. vel uti in destillatione olei.

3. Tinctura seu Extract. Spir. Vin. Tartarifato.

4. Elyxir. Cinam. Fit ex Tinctura cinamomi, additis & croci & santali citrini Tincturis.

5. Oleum. Elicitur una cum ∇ beneficio destillationis, l. 2. f. j. dat Drach. ij. vel Drach. iij.

Nota de menstruo: Alii adhibent solum vinum, alii vinum cum ∇ mistum: quibus quoque Tar. aut Sal. com. insuper admiscunt.

6. Sal. Ex fecibus incineratis elixivatur.

7. Balsamus. Ex ol. Cinam. ol. Nucist. depurato. Tingitur bolo Orientali vel pulvere Cinamomi.

8. Syrup. Vide Dispens. Norib.

9. Magisterium. Extrahitur cum Spir. vin. opt. ac præcipitatur cum ∇ fontan. vel cum ∇ Cinam. primum stillanti, retinetque colorem Cinamomi.

10. Spec. Diacina. Vide Dispens.

XCIX. Citrus.

Malus Citria, Medica, Assyria. Arbor est exotica per totum annum virens, fructumque tenellum cum maturefcente simul ferens.

Videatur Citrum, Brunf. Citria, Trag. Citrus, Tab. Cord. hist. Malus Medica, Matth. Cord. hist. Dod. Lob. Malus citra, Gesn. hort. Lon. Cast. Clus. hist. Cam. Citria & mala Medica, Bellon. Malus Medica, C. B. 1. Citronbaum.

Dicitur Medica & Assyria, quia apud Medos & Assyrios & imprimis apud Persas frequens est. Hinc in Italiam translata fuit, postea & in Hispania in usum devenit, ut nemora & campos occuparit hodie. Colitur & apud nos in hortis.

OFFICIN. NAT.

Fructus seu Poma Citria, (citrea) Cortices & Semen, raro Flores. Fructus variant magnitudine: quædam sunt majora instar melo-peponum: alia minora & vulgaria: alia Limonum magnitudine. Sic alia prælonga sunt, alia rotundiora: in officinis usitatoria sunt minora, utpote quæ carnosiora, tum quoque majora.

Vires. Citrium malum (cum cortice ac carne) alexipharmicum putatus ex-justibee

iuslibet veneni, resistit putredini, morbis-
que malignis, lumbricos fugat, diaphore-
ticum est. Cortex calf. 1. sicc. 2. (aliis
calesc. & sicc. 3.

Caro: seu pulpa refrigerat & humectat, &
hinc succus expressus.

Semen: calf. & sicc. 2. attenuat, di-
gerit, abstergit, lumbricos fugat.

PRÆPARATA.

1. Condit. 1. *Poma* maxima condiun-
tur nondum satis matura, cum cortice
ac carne incisa, nucleis exemptis: di-
cuntur nostratibus Citronat.

N. Eodem modo condiuntur & mi-
nora, integra vel in taleolas dissecta.

2. Cortices. Condiuntur post mitiga-
tionem amaroris, cum saccharo.

3. Flores cond.

2. Conserv. 1. ex floribus.

2. Ex medulla, remotis scil. cortici-
bus ac semine succoque expresso.

3. Confect. cortic.

N. Majores cortices conditi dicuntur.
Citrinat. confect.

4. ▽. Ex corticibus.

5. Oleum itidem cum ▽ ex cortici-
bus extillat.

N. Potest & exprimi oleum ex semine,
sed minus id usitatum.

7. Succus. Ex carne exprimitur &
reservatur pro usu, diciturque nonnul-
lis Vinum citri, præcipue si cum tantil-
lo sacchari sit fermentatus.

CI. Cochlearia.

Cochlearia *Rösselkraut* / { folio subrotundo, cochlearia Batavica, qua usnalis.
folio sinuato Britannica, Lob. hac nobis inusitata.

Ggg 88

Voca-

7. Syr. acetosiatæ citri. Ex succo &
saccharo.

Syr. citri simpl. Ex cortic. Vide Disp.
compos. Vide Disp.

8. Morsuli citri. } Vide suis
Citri laxativ. } locis.

9. Balsamus. Ex ol. stillat. & ol. Mu-
schato.

10. Electuarium de Citro solutivum.

C. Citrullus.

Citrullus, Anguria, Angurien/ Spe-
cies Cucumeris est, fructu rotundo,
quo reliquas cucumeris species quoad
magnitudinem exsuperat.

Dicitur Citrullus, Trag. Lon. Tab.
officinar. Lob. Ger. Anguria, Marth.
Dod. Cast. Cam. Cucumer vel cucumis
citrullus, Fuchs. Anguria citrullus di-
cta, C. B. r.

N. Variat corticis calore qui aliis vi-
ridis seu herbaceus, aliis candidus macu-
lis aspersus: Caro aliis rubens & dulcis, a-
liis candida: Semina colore nigro, rubro,
fulvo.

OFFICIN. NAT.

Officinis tantum Semen in usu est id-
que adhibetur vel cum, vel sine cor-
tice.

Vires. Est ex 4. sem. frig. maj. Refrigerat
itaque & hum. ad gr. 2. est Diureticum,
aperiens, acrimoniam obtundens. Inser-
vit præcipue Renibus ac vesica abstergen-
dis, bilis ac sanguinis aestui compescen-
do.

Vocatur Cochlearia, *Dod. Cam. Ep. Math. Tab.* Cochlearia Batava, *Lob.* Cochlearia fol. sub rotundo, *C.B. 1.*

Crescit apud nos in hortis loca amans palustria rigua & umbrosa: floret April. Majo. Videlicet anno secundo à satione.

OFFICIN. NAT.

Folia, quæ recentiora adhibere præstat, quam siccata, quippe Sal volatile, quo potissimum efficacia sunt arefciendo evanescit.

Virës. *Calf. & sic. 2. ad 3. aper. est sple-*netica, ac diaphoretica, fixos ac crudos humores spirituales ac volatiles reddens, putredini que resistens. Hinc utilis in hypochondriacis morbisque Tartareis primæ regionis, ac præcipue in Scorbuto, in cuius medicatione celeberrima audit, adhibeturque inius & extus in gargarismis, (ad putredinem gingivarum) balneis, ad arinum resolutionem.

PRÆPAR.

1. *Conserv.* Ex fol.
2. *Stillat.* Ex fol. recent.
3. *Syrup.* Ex succo & saccharo.
4. *Sal com. volatile.* Ex succo.
5. *Spiritus* è foliis fermentatis.
6. *Succus* expressus.

N. Recens maxima est efficacia ad arcendam oris ac gingivarum putredinem, etiam post morbillos. Inspissatus loco Extracti assumi poterit.

CII. Lignum Colubrinum.

Lignum serpentarium, *Clematis Indica*, *C.B. 2.* Ligni Colubri al-

terum, genus Garzia, *Trag. & Clus. Li-*gnum colubrinum, *Tab. Germ. Griech. holk.*

Advehitur ex Insula Zelan. Eligendum amarum, non cariosum, grave.

Virës. *Calidum est ad siccum* (ut amaror arguit) abstergit moribus serpentum, aliisque venenis medetur: bilem ac mucilaginem per alvum (nonnunquam etiam per vomitum educit) unde usus præcip. est in febribus intermittentibus, tertiana ac quartana: Lumbricos necat ac fugat. Extrinsecus maculas cutis abstergit.

PRÆPAR.

Extractum, cum ∇ Centaurei vel simili factum.

Dosis ad Scrup. j.

CIII. Contrayerva.

Contrayerva, radix yerva, radix contrayerva, radix bezoartica, alexipharmaca, radix contra venena, rad. venenis adversus, *Monar. Giffthour.*

Est radix Iridis vel Cyperi radicibus non absimilis, quæ annis ab hinc aliquot ex Provincia Peruana Charcas apportari cepit.

N. *Bauhinus* facit speciem Cyperi, vocatque Cyperum longum, odorum Peruannum.

Eligatur densa non cariösa, quæ aromaticum quiddam sapit, cum acrimonia conjunctum.

Virës. *Calida est 2. alexipharmaca: & sudorifera.* præstantissimumque remedium adversus omne venenum, cum juncun-

CLASSIS I.

31

justumque si generis (excepto Merc. subli.) vomitione id rejiciens, aut per sudores evacuans. Sed & amatoria pocula expulvere hausto, educi ferunt. Ventris etiam animalia pellit. Quin & in peste felix ejus usus compertus est, ut & morbillis nigris.

Dosis Drach. j.

CIV. Consolida.

1. Consolida seu conf. major. Vid. *symphytum*.
2. Consolida media. *Hec hujus loci.*
3. Consolida minor. *Vide bellis hortensis.*
4. Consolida Regalis. *Vide Calca trippa.*
5. Consolida aurea & sarracenica. *Vide Virga aurea, Guildengümsel.*

Est { flore caruleo. *Hac usualior.*
flore purpureo. *Hac rari usus.*

Dicitur Consolida media, *Brunf. Matth. Fuchs. Tab. Cast.* Consolida media prima, *Tab. prunella carulea, Trag. Bugula, Dod. Clus. hist. Ger. Bugula & prunella quibusdam, Lob. Symphytum medium, Lon. Consolida media pratensis carulea seu N. 1. C. B.*

Crescit in locis campestribus: floret Majo.

OFFICIN. NAT.

Herba.

Vires. Veraque vulneraria est, tam intrinsecus, quam extrinsecus adhibita: confert & ictero, Epatis obstructioni, urinae retentioni, herniis, &c. Brevibus:

ut et cum Prunella & figura serè conuenit; ita & vir. bus.

CV. Corallina.

Bgüor & ad dörion, Dioscor. Muscus marinus, Matth. Cord in D. Cast. Tab. Corallina, Lob. Lon. Muscus maritimus seu Corallina officinarum, C. B. German. Meermoos/Corallenmoos.

Inhaeret scopulis & piscium testis corallisque, eo sane modo, quo muscus arboribus innascitur, optimaque est, quæ à corallis detrahitur.

Eligatur colore, cum sicca est, subrubesciente, salso sapore, odore concharum marinarum simili.

Vires. *Refrig. & sic. astringit, incrassat, vi lumbricos necandi & expellendi celeberrima est, inius & extus adhibita.*

Dosis ad Drach. j.

PRÆPARATA.

Magisterium: fit cum lixivio forti. Vid. l. 2.

Dosis Scrup. j.

CVI. Coriandrum.

Kögior & kogiawon, Dioscor. Coriandrum, Germ. Coriander.

Est { 1. Majus. *Hoc usuale solum.*
C. B. { 2. Minus testiculatum } *inusta-*
3. Sylvestre. } *ia.*

Insignitur Coriandrum, *Brunf. Trag. Fuchs. Matth. Cord. hist. Lon. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger.*

Colitur nobis in hortis, solo gaudens pingui: floret Julio.

OFFICIN. NATIVA.

Semen granosum, quod primum hali.

Ggggg 2

halitum gravem halat, resiccatum autem suavem acquirit odorem.

Vires. Stomachicum imprimis est, calf. & sicc. ad gr. 3. astring. Hinc celeberrimum in laxitate stomachi, si post cibum assumatur, claudis enim ventriculum, exhalationesque suppressit, quo minus caput gravent, ructusque producant.

PRÆPAR.

1. *Preparatum*. Preparatur sem. Coriand. maceratione per noctem in ☩ dein exiccatur.

N. *Preparatio* hac fit ob castigationem qualitatis noxiæ (crudioris & excrementitiæ) quam tamen & arefcentia amittit.

2. *Confectio*. Ex semine præparato.

3. *Stillat.* Rari usus est.

4. *Oleum*. cum ☐ ascendit.

CVII. Cornus.

Cornus, Germ. *Cornerbaum*.

CVIII. Corylus & Avella.

Corylus Haselstaude.	{	Nostras	{	fativa	{	fructu albo minore. <i>Corylus vulgaris</i> .		
				sylvestr.		fructu majore	{	rotundo maximo.
						fructu est minore, albidior & rotundior, quam nativa.	{	oblongo rubente.
{	Peregrina	{	Humilis.	{	fructu purgatrice Monard.	{	Nostratibus non sunt n- suales.	
			fructu osculi trifidi, &c.		{		{	

Ex his officinis in usum veniunt nostrates coryli, quæ describuntur ab authoribus vel coryli vel avellanæ titulo, &c. Præfertur autem fructus oblongus rubens in compositionibus.

{ hortensis, sativa. *Hæc usua-*

{ Mas { *lis.*
{ sylvestris,
{ fœmina, *Lon. sylvest.*

Indigitatur Cornus, *Brunf. Trag. Matth. Lon. Dod. Lob. Cornus mas, Tab. Cornus sativa & mas. Cord. in D. Cornus vulgaris mas, Clus. hist. Cornus hortensis mas, C.B. 1.*

Florere incipit initio veris: colitur in hortis.

OFFICIN. NAT.

Fructus, rarissime *Folia*.

Vires. Viraque refrigerant, exiccant, astringunt, constipant. Hinc conveniunt præcipuè in diarrhæa & dysenteria. Exhibentur fructus exiccati & pulverisati ad Drach. j.

PRÆPAR.

1. *Condit. fructus*, cum saccharo, l a.

2. *Rob. de Cornis*. Vide Disp. August.

Ex succi pulpæ, p. ij. & sacch. p. i.

OFFICIN. NAT.

Lignum, *Fructus* & *Viscum*.

Vires. *Lignum* per se raro officinale est, nec asservatur, nisi pro parandis inde

inde spiritu ac oleo. Adhibetur autem corylus sylvestris.

N. 1. Serpens virgâ corylina percussus torpescit; unde conjectare licet, facultate antiserpentina corylum abundare.

N. 2. Faciunt ex ejusdem coryli sylvestris bifido surculo virgulam quâ metallâ scrutantur.

Fructus (avellanæ *απλονάγου*) exhibent usui medico, nucleum, putamen & membranulas.

Nuclei teste Gal. l. 7. simpl. med. plus habent essentiae terrestri ac frigidae, quam juglandes. Venenis resistunt venenosorumque animalium ictibus, (cû ruta & ficibus impositi) ex mulso hausti veteri tussi medentur, urinæ odorem mitigant.

Putamen crudum in pulverem contritum astringit, obstruit ac proinstitit diarrhæam, albaque scæminarum profusiva. Quercetanus specificum antipleuriticum inde facit, cum corall. rub. & mandibul. lucii.

Membranula nucleum ambientes ejusdem cum putamine sunt faculta-

tis, eidemque præferendæ. Eliguntur rubei coloris.

PRÆPARATA.

Ex ligno. 1. Spiritus fit per Retortam igne nudo ex sarmentis exiccatis.

2. Oleum fit itidem per Retortam vel per descensum.

Vires. Vim habet utrumq; calfacientem, incidentem, anodynâ, antiepilepticam ac præcipuè odonalgicam.

N. Sunt qui oleum hoc oleum ligni Heraclei. Rulando dictum autumant, nec sine causa quidem. Etenim non modo viribus iisdem celebre est, quas Rulandus oleo suo Heracleo adscribit, sed & nominis rationem habet. Corylus enim, quia primum ex Heraclea Ponti in Græciam translata fuit, heracleotica seu pontica dicta est, adeoque & nuxes heracleotica.

PRÆPAR.

Ex avellanis Oleum expressum.

Vires. Articulorum dolores inunctum juvat.

N. Ingrediuntur etiam nonnullas compositiones alexipharmacas, ubi præferenda sativa rubeſcentes, & præcipue oblonga, ut dictum supra.

CXIX. Costus.

Costus wurk.	{	verus	{	dulcis	} hic officinalis.
				amarus	
				Costus, Matth. & Lon. i.e. Panax costinum, pseudocostus.	
				Costus Hortensis minor, Gesn. i.e. Ageratum.	
{	falsus	{	Costus Hortor. Lob. i.e. Mentha.	}	

N. Officina in dulcem & amarum dividunt, quam divisionem non diversæ species, sed diversæ ætatis Clusinus non sine causa statuit. Nimirum recentiores

Ggggg 3 her.

herba dulciores, cum vetustate tandem amarescunt.

Costus verus officinis nostratibus usitatus, est cortex extrinsecus cinereus, intrinsecus candidans, C. B. 6. & 7.

Eligatur costus recens, densus odoratus, subamarus, non cariosus.

Costus amarus dicitur, Helenii Comagenii radix, Cord. in D. Costus comagerius, adulterinus officinar. Lob. costus officinar. amarus, Lon. Cast. Tab. costus amarus officinarum seu Helenium comagenium Dioscoridis, C. B. 6.

Costus dulcis dicitur, Costus dulcis officin. Lon. sed adulterinus, Tab. costi pharmacopolarum species major. Cam. in Marib. costus dulcis, Cast. costus dulcis officinar. centaury magno cognatus, C. B. 7.

Vires. Stomachicus, Epaticus. Virenus ac Nephriticus est calf. sicc. 3. atten. aper. disc. Hinc convenit in colica, obstructis mensibus & urina, hydropse, paralyse.

PRÆPARATA.

1. Oleum costinum Mesuæ. Vide Disp. (ex cost. p. ij. cass. lig. p. i. major. p. 8. cum vino ac oleo selamino.

N. Febrilem rigorem spina inunctum mitigat.

2. Pilula marcocostina. Vid. l. 2.

3. El. caryocostinum. V. D. N.

CX. Crocus.

Κρόκος, Planta est bulbosa, florem

primo autumnos ferens purpureum, cuius flammea stamina (instar antherarum) officinarum crocus est. German. Saffran.

Ex croci generibus plurimis officinal. est crocus sativus. C. B. 1. Huius differentiam officinæ faciunt à natali loco, unde Crocus Viennensis, i. e. qui ex Viennensi agro ad nos transportatur, ubi optimus hodie nascitur. Orientalis qui ex locis orientalibus ac præcipuè ex Sicilia transmittitur, in cuius monte (caryco nomine) omnium præstantissimus provenire censetur. Vulgoq; dicitur Crocus de Aquila. German. Zinnat / Saffran.

Videatur Crocus, Brunf. Trag. Fuchs. Dod. Cord. Lon. Tab. Crocum, Marib. Cast. hortense, Cam.

Eligatur crocus flexilis, tritu difficilis, albicantibus nonnunquam filamentis permixtus. Reprobatur è contra saturato nimis colore rubro, odore fugaci, utpote qui vel cnici floribus, vel carnis bubulæ salitæ villis adulteratus.

N. Adulteratio croci adeo impostoribus communis est, ut Emporiis nonnullis visum sit, certos deputasse inspectores, quorum iudicio ut bonus crocus venalis pronuntiatur: ita adulteratus Neptuno, Vulcanove, non citra venditoris ignominiam consecratur. Cuius rei exemplum hic Francofurti aliquot abhinc retro annis observare licuit.

Vires. Cordialis est ac pulmonicus (ut

(ut quoque anima pulmonum audiat) u-
terinus, & hinc ceteris visceribus familia-
ria, calf. 2. succ. 1. aper. dig. emolt. anody-
nus est, somnum conciliat, menses ac fe-
cundum pellit. Useus ejus frequens in syncope,
Apoplexia (gutta 1. ac 2. tinctura asper-
gitur lingua) in histericis affectibus, in i-
ctero, in peste aliisque venenosis morbis, in
asthmate (cum ol. amygd. dulc.).

Dosis ad Scrup. j.

Extrinsecus in collyriis, & sim. adhi-
betur.

NB. Ufus ejus immodicus (sci-
licet ad Drach. ij. vel iij.) lethalis cense-
tur.

PRÆPAR.

1. Species diacurcuma. Vid. Disp.

2. Tinctura seu essentia croci. R. Croci
Orient. q. v. extrahe cum Spir. vin. opt.
abstrahere lentiss. Δ ad consistentiam de-
bitam. Beguin.

N. 1. Alij extrahunt cum ∇ is cordia-
libus e.g. rosarum, iisq. guttula una ac al-
tera spir. vitrioli vel sulphuris roboratis:
alijs fit extractio cum ∇ vitis vel ferola-
tis.

N. 2. Spiritus vini abstractus croci
facilitate est impregnatus, idcirco cum
successu in usum Medicum venire pote-
rit.

N. 3. Alij collocant crocum cum syn-
done in alembicum, destillantque Spir.
vin. ex cucurbita tantisper, donec colorem
ex croco susceperit. Tinctum Spir. vin.
iterum destillant ad remanentiam Tin-
ctura in fundo. Tentzel.

3. Extractum.

4. Oleum croci Mesue, (compof.)

5. Ol. stillat. paratur ut olea reliqua
ex floribus, sed rarissimum est, ob ni-
mios scilicet sumptus, quos requirit.
Nimirum ex croci lbj. vix Drach. j. elici
poterit.

N. 1. Alij R. croc. or. lb. β. Terebinth.
Unc. iβ. Spir. vin. opt. q. s. destillant, sapi-
usque à fecibus cohobant. Alii R. croci
opt. lb. β. terunt grosse ac admiscunt Tar-
tari, Sal communis an. Unc. β. circiter,
cum albumine ovi F. pulmentum, cui su-
perfundunt ∇ m. fontan. calidam (vel
∇ m. mellis) digeruntque dies (3. 4.) Hinc
destillant per Alembicos ex cinere. Me-
dull. destill.

N. 1. Habet potestatem prosternendi
appetitum.

6. Trochisc. de croco. Vide Disp.

7. Elect. de ovo distum. GuildenEy.
Vid. Disp.

9. Empl. oxycroceum. Vid. Disp.

CXI. Cubebe.

Κουβέβαι, Cubebe, Quabebe, Cube-
ba vulgares. Germ. Cubeben.

Fructus sunt aromatici exigui, forma
& magnitudine piper rotundum refe-
rentes, nisi quod ferè paulum sint mi-
nores. Advehuntur ex Java, Ind. Or.
Insula, ubi decoquuntur antequam
vendantur, ne apud externos planten-
tur. Præstant majores, recentes, ponde-
rosæ.

Dicuntur Cubaba, Garz. Acoff.
Fragos. Cord. b. Cast. Tab. Math. (qui
eas nec Arabum cubebas, nec Gale-
ni carpesium demonstrat,) Cube-
ba vulga-

vulgares, C.B. officinarum, Lob. carpesium Græcorum, Lon.

N. Quid sint cubebe, ambigitur: alij ex genere piperis & nigro piperi congeneres esse, Theophrastoque piper rotundum dici volunt: alij viticis fructum (at facultates sunt diverse) existimant: Sylvaticus, Rusci fructum: alij carpesium Galeni statuunt. At Casalpini, Amomi legumi fructum pronunciat. Est autem fructus racemosus arboris cujusdam,

malo vulgari similis, foliis vero piperis, sed angustioribus.

Vires Calfac. 2. completè sicc 3. compl. atten. disc. viscera omnia roborant atque imprimis caput, adeoque plurimis inseruiunt compositionibus.

OFFICIN. NAT.

1. Confect. c. saccharo.
2. Ol. Cubebar. still.
- N. Rari usus est.
3. Spec. Diacub.

CXII. Cucumis.

Cucumis (olus) in genere notat omnes fructus horarios, adeoque sub eo comprehenduntur

Cucumis officinarum qui vel } Sativus, h. loci.
Pepones, } Sylvestris Agninus,
Melones, } Vide in Class.
Anguria, &c. } 4. Elaterium.

Dicitur cucumis sativus, Brunfels. Matth Fuchs. Lon. Cast. cucumis Trag. Tab. cucumis vulgaris, Dod. Ger. cucumer sativum, Cord. in D. cucumis sativus & esculentus, Lob. cucumis sativus vulgaris, C.B.I. German. Cucumern.

Ipsa cucumerum substantia refrigerat & humectat. Excrementum est succi, adeoque non nisi robustioribus ventriculis edenda, idq. non sine corrigentibus condimentis v.g. pipere, & sim.

PRÆPARATA:

Condit fructus: cum Sal.com.

CXIII. Cucurbita.

{ sativa Rûrbs, Hujus loci,
Koloquindis } sylvestris. Vide Colocynth.
class. 3.

Nomen cucurbitæ omnibus familiare est Botanographis.

N. Cucurbita sativa et si variant magnitudine, colore, figura; conveniunt tamen, natura & viribus.

OFFICIN. NAT.

Solum Semen & nonnunquam Folia.

Solum Semen, cui & ipsi Fructus addi possunt: hi enim etsi sint culinares; attamen cibum præbent medicamentosum.

Vires. Semen, (seu nuclei) ex numero est famosior. 4. sem. frig. maj. refriger. (præcipue si aridum sit, alias humect.) in sine grad. 1. absterg. aperit, urinam ducit, usque creberrimi est in emulsionibus antipleuriticis, antiphreniticis, & sim.

N. Se-

N. Semen recensetur in numero seminum 4 frig. maj. venitque in usum cum vel sine cortice.

Vires. Cucurbita convenit viribus cum cucumere tam in qualitatibus carnis quam in seminis facultatibus. Folia recentia puerperarum mammis adhibita, monente Matthiolo, lac imminuunt. ▽. stillat. Ex fructu immaturo.

Vires. Fert opem omnibus inflammationibus externis, oculorum, aurium, podagricis, &c. Intrinsecus quoque mirabiliter astum corporis mitigat.

N. Succus expressus idem facit.

CXIV. Cuminum.

Cuminum { sativum: quod hic
pratense: quod carum.
Κύμινον. Cuminum sativum, Brunf. Trag. Matth. Cord. hist. Lob. Cast. Cuminum, Lon. Cuminum officin. cumini sylv. i. genus Diosc. Cyminum, Cord. in D. Tab. sativum, Cam. Cuminum semine longiore, C. B. i. aliis cuminum domesticum, Romanum. Ger. Rüm-
mich / Rümme / Römisch Rümme / Pfeffer Rümme / Kramrümme / Gartenrümme.

OFFICIN. NAT.

Solum Semen.

Vires. Calfac. & sicc. 3. atten. diger. resolvit, flatibus discent. utile in Colica, Tympanit vertigine.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex sem. l. a.

2. Ol. stillat. Ex sem. l. a. cum ▽ elicitur.

3. Sec. Diacumin.

CXV. Cupressus arbor.

Κυπάρις { Mas.
Fœmina.

Arbor est proœra conifera, foliis pinum æmulans, iisque semper viridibus.

Provenit copiose in Insula Creta.

Insignitur Cyparissus, Cast. Cupressus, altera sive sylvest. Ger. Cupressus, Matth. Dod. Cord. in D. Lon. Lob. Cam. Tab. C. B. i. Germ. Cypressbaum.

OFFICIN. NAT.

Lignum, Fructus & raro Folia.

Vires. Lignum, refrigerat, siccatur, astringit.

Fructus & Folia calfaciunt parum, exiccant ad gr. 3. astringuntque valide, proin usus sunt precip. in hamoptysi, diarrhaea, dysenteria. Commendantur itidem in mixtione involuntaria, ut & in herniis curandis intus & extus adhibita.

N. Fructus sive conos, nuces vel pilulas Cypressi officina nominant: aliis Gabula dicuntur.

CXVI. Cupressus herba.

Chamæcyparissus, Trag. Fuchf. Cord. Lon. Santolina altera, Dod. Abrotanum fœmina, Brunf. Matth. Lob. Cast. Clus. hist. Tab. Ger. Cam. Cupressus herba, Cord. in D. Santonicum minus, Cord. hist. Polium. Theophrast. Dioscor. Absinthium marinum, Tab. Abrotanum fœmina foliis teretibus, C. B. i. Germ. Gartenypress.

Hhh hh

Coli-

Colitur in hortis nostratibus.

OFFICIN. NAT.

Herba seu folia, sed raro.

Vires. Convenit qualitatibus cum abrotano, ususq; praeipui est in obstruct. Epatis, Renum & Uterum, curat lile- rum, lumbricos fugat. Extrinsecus subvenit morbis uteri, &c.

CXVII. Curcuma.

Cyperus Indicus, Dioscor. & Curcuma officinar. Cord. hist. Clus. coroll. Lon. Lob. Tab. Curcuma longa & rotunda, Cord. hist. Cyperus altera, radice lutea, Cast. Terra merita, Ruell. Lob. Cyperi genus ex India, Matth. Fuchf. C. B. 1.

Est radix officinalis exotica, non tantum croceo colore apparens, sed & eodem colore alia tingens. Germ. Gilb. twurz / Geelsuchtwurz.

Duplex communiter est, aliquando longa, aliquando radice rotunda: Hac multo acrior priori existit, atque cum zinzibere saepe affertur.

Vires. Dicata est vesica biliaria, Stomacho & Epati, hinc & Lienis ac Uteri. Calf. & sic. 2. amara est: absterg. atten.

CXIX. Cyanos.

Baptifecula, Blaptifecula, flos frumenti, Kornblum / blau Kornblum.

Cyanos	{	Sylvestris	{	Montanus.
				Segetum: Hic officinal.
				Latifol.
		Repens		Angustifol.
	{	Hortensis.		

Dicitur Cyanus, Lon. flos, Dod. Cyanus major, Matth. Cast. Cam. Cyanus.

aper. dig. disc. menses movet. Usus in lile- ro, Hydropes, cachexia.

PRÆPAR.

Species Diacurcuma.

N. Rectius spec. diacrocui nominantur, quippe curcumam non admittunt.

CXVIII. Cuscuta.

Est { Major, colore scil. albo vel rubro:
Hac huius loci.
Minor. Vid. Epithem. in purgan-
tibus.

Dicitur Androsaces vulgo cuscuta, Trag. Matth. Lon. Cast. Clus. Ger. cassytha, Lob. Tab. cassutha Fuchf. Dod. ma- jor, C. B. 3. Germ. Filskraut.

Floret Junio, Julio, Augusto: adna- scitur passim herbis & fruticibus, potif- simum urtica, lino, lupulo.

OFFICIN. NAT.

Folia seu herba tota villosa cum flo- ribus, praeipue lino adnata.

Vires. Splenetica in primis est, hinc epa- tica, Calf. 1. sic. 2. abstergit, subastringit, aperit, melancholicum humorem corrigit, utilis in scabie, ictero nigro, obstructioni- bus epatis ac lienis.

PRÆPAR.

Δ stillat. Ex tota planta.

Cyanus sylv. *Fuchf.* Cyanus vulgaris, *Lob. Ger.* Cyanus cœruleus, *Tab. Baptifecula, Trag.* Lychnis agria & flos frumenti, *Brunf.* Cyanus segetum, *C. B. 2.*

Crescit passim inter segetes: Floret Majo.

OFFICIN.

Flores.

Vires. Frigef. & sicc. 2. astring. utilis in oculor inflammationibus, rubedine, lippitudine, doloribus, in hydropo (propinanti.)

PRÆPAR.

▽. *stillat. ex flor.*

CXX. Cyclamen.

Vocatur Cyclaminus, *Matthiol. Cord. in D. Lon. Tab.* Cyclaminus major, *Cast.* cyclam. rotundus, *Fuchf.* cyclaminus orbicularis rotundifolius, *Dod.* Cyclamen officinar. orbiculato folio, panis porcinus & Arthanita, *Lob.* Cyclaminus flore odorato, *Clus. hist.* Cyclaminus vulgaris & cyclam. prior, *Matth. & Lab.* Lugd. cyclam. æstivus vulgaris, *Cam.* Cyclamen orbiculato fol. *Ger.* Cyclaminus minor & Umbilicus terræ, *Trag.* Cyclamen orbiculato folio infernè purpurascens, *C. B. 1.* German. *Erdapffel / Cato brodt.*

OFFICIN. NAT.

Radix. colligenda autumno.

Vires. Calfac. & sicc. 3. potenter incidit, aper. absterg. Errhinum est. Usus præcip. in obstructis mensibus, in pellendo

ætui mortuo, in ictero, in calculo expellendo, strumis ac tuberculis discutiendis. Interne tanto opus habet, magisque externo usui prodest.

PRÆPARATA.

Succus. Hic cum raro nostratibus in promptu sit ejus locum subit decoctum.

Unguentum de Arthanita majus V. D. minus. V. D.

CXXI. Cynoglossum.

Κυνόγλωσσον, Cynoglossa, lingua canina, Hundesjung.

Diversorum est generum è quibus magis officinale, quod indigitatur cynoglossa major, *Brunf. Cord. in D. cynoglossum vulgare, Matth. Lob. Cast. Clus. hist.* cynoglossum, *Dod. Tab. Ger.* officinarum, *Lon.* cynoglossum majus vulgare, *C. B. 2.*

Crescit passim locis aridis pene muros: Floret Julio.

OFFICIN.

Flores, Folia ac Radix, sed raro.

Vires. Refrig. & sicc. 2. incrass. lenit, obstruit. Usus insistendo fluxu alvi, in gonorrhœa, ac catarrh. incrassandis. Verum quia in numero herbarum est, quæ narcosis virulenta suspecta sunt, rarissimè à practicis adhibetur.

PRÆPAR.

1. *Pilul. de Cynoglossa. Vide Disp.*

N. Somnum conciliant, narcotica sunt.

2. *Unguentum. Vide Disp.*

CXXII. Cynobatos.

Κυνόβατος, κυνόβατος, Rosa sylvest.

H h h h h 2

arven-

arvensis, canina, rubus caninus, wilde
Rosen/ Feld-Rosen/ Heckenrosen/ Hei-
derrosen/ Hainbeere.

Varia comprehendit genera. Est e-
nim rosa sylvestris, vulgaris, flore odo-
rato incarnato, flore majore & ruben-
te, &c. Verum in officinas non nisi rosa
sylvestris, flore odorato incarnato in-
fertur.

Insignitur Cynosbatus, Diosc. Lon.
cynosbatus procerior & cynorrhodos,
Cord. in D. sentis canis & cynosbatus,
Brunf. Rosæ sylvest. r. genus Trag. Ro-
sa sylv. Math. Dod. Tab. odora, Ger.
Rosa sylvest. vulgaris, Cam. epit. Rosa
canina odorata & sylvest. Lob. Rosa ca-
nina, Cam. Rosa sylvestris vulgaris flore
odorato, C.B.r.

N. Matthiæ Cynosbatus & cynor-
rhodon inter se differre statuit. Verum
non male faciunt qui pro uno & eodem
frutice habent.

Crescit in dumetis, floret Majo.

OFFICIN.

Flores, Fructus, Spongia, & interdum
Radix.

Vires. Flores conveniunt in qualita-
tibus cum rosis sativis, sed majorem vim
astringendi habent, proinde in profluvio
uteri rubro & albo summa sunt estima-
tionis.

Fructus, (Hagenbutten) vi Lithon-
triptica maximopere commendantur, in
qua tamen excellunt exempti arilli.

Spongia, (Bedeguar, Schlaßkunk/
Schlaßapffel/) iidem calculosos effi-

cacissimè juvare dicuntur & imprimis
qui inibi continentur lapilli ac vermiculi,
quorum hi quoque ad lumbricos fugan-
dos commendantur. Potest propina-
ri spongia pulverisata, vel aliter præpa-
rata.

Radix. Spicula ex corpore extrahit
(imposita.)

PRÆPAR.

1. Fructus Cynob. condit.

Condiuntur abrasa lanugine & ex-
emptis prius arillis.

2. Rob. Cynobati. Fit leg. c.

3. Spiritus s. ∇ spongiarum quæ fit:

Glomi mense Majo vel Junio colle-
cti inciduntur, remotisque vermiculis
aut aliis insectis inibi reperibilibus, di-
gerunturque cum ∇ & fermento ut
putrescant, dein elicitur ∇ seu spiritus
pervescam.

4. Spiritus alcalisatus. Ex capite mor-
tuo (in destillatione præcedenti resi-
duo) ulterius incinerato, elicitur Sal
com. idq; purificatum cum Spiritu con-
junge & aliquamdiu macera. Tandem
cum argilla misce & propelle per Re-
torram ∇ munda ut nempe totum Sal
com. simul transeat. Postea rectifica si
opus sit. Hartm. in præst.

Vires. Spiritus hujus guttula aliquot
(ad 20.) in liquore conveniente exhibita,
calculum insensibiliter expellunt.

CXXXII Cyperus.

Künerg. wilder Galgam.

Longus.

Rotundus.

Rotun-

Rotundus potissimi quidem usus est, tamen iudicio virorum etiam eruditorum parum vel nihil longum superat; suntque parvus diversi ejusdem radicis.

Crescit sponte in regionibus calidis, Italia, Syria, Alexandria, & simil. Nostratibus colitur quandoque in horto, gaudetque solo humido, sed minus efficax est peregrino.

Dicitur *Cyperus*, *Diosc. Alpin.* *Cyperus* rotundus *Orient. maj.* vel *Babylonicus*, *Rauwolf*, *Cyperus* major *Syriacus*, *Cam. in Matth.* *Cyperus* rotundus orientali major, *C.B.L.*

OFFICIN. NAT.

Sola *Radix* quæ eligenda gravis, densa, fractu contumax, plena, aspera, odoris cum quadam acrimonia jucundi.

Vires. *Utraque Stomachica est ac uterina calf. & sicc. 2. aper.* Usus precipuus in urina ac mensibus ciendis, cruditate ventriculi consumenda, hydropo inchoato præservando, colica ac vertigine discutienda, ulceribus vesica solidandis: mastica emendat oris fetorem. Cocta in oleo contusa & imposita renibus ac pectini urinam proritat.

Varias quidem ingreditur compositiones, sed alieno titulo insignatas.

CXXIV.

Μαλέα κωσάνια, *Cotonea* malus, *Quittenbaum*.

Mala <i>Cotonea</i>	{	hortensis	Mala minora, quæ præferuntur.
		ferens	Mala majora vulgo pyra seu struthia.
		sylvestris	Mala media, i.e. notha, quæ proveniunt ex cotoneis, quæ struthiis insita fuere vel contra.

Videatur malus *Cotonea*, *Brunf. Trag. Matth. Fuchf. Cast.* Malus *Cydonia Lon. Tab. Cam.* *Cotoneus*, *Cord. hist.* *Cotonea* & *Cydonea* mala, *Lob.* Mala rotunda minora, nonnullis *χρυσόμυλα* ab exteriori cutis colore, *Dod.* Mala *cotonea* minora, *C.B. 1*

OFFICIN. NAT.

Mala ipsa exiccata. Semen seu grana.

Vires. Mala *cotonea* stomachica sunt refriger. 1. sicc. 2. astringunt, nutriunt. Usus præc. in vomitu, alvi fluxu, singultu, laxitate stomachi.

N. Ante cibum sumpta alvum constipare creduntur, è contra à pastu, laxare.

Semen. Refriger. & hum. mucilaginosum lenit, acrimoniam obtundit. Usus precipuus ad lingue ariditatem leniendam (garisim.) ad dolorem hemorrhoidum sedandum (in clysteribus) ad ophthalmiam sanandam (mucilago cum Aq. rosarum facta & imposita) ad scissuras manuum solidandas ambusta quæ curanda, &c.

PRÆPAR.

1. *Condit.* Condiuntur *Cydonia* (si-
Hhhhh 3 vein

ve integra sive in frusta concisa) separato cortice semineque exempto: aromatizanturque cinamomo, caryophyllisque in fixis.

2. *Vinum*. Est succus liquidus, cui admixtum est tantillum sacchari.

3. *Rob. Cydonior.* Est succus inspissatus ad mellis consistentiam, dicitur aliàs syrupus Imperatoris.

4. *Diacydonium*. Ex succo acido & sacch. $\frac{1}{2}$ *Vid. Disp.*

6. *Marmelata*. Est citonior. dulcium decoctio (per manicam Hippocratis) filtrata, cum saccharo inspissata & in scatulas ut congelescant effusa.

7. *Miva Cydonior. simplex*. Syrupus & ex succ. dulcior. p. xij. vini p. v. & sacch. p. iij.

8. *Miva Cydonior. aromatizata*. Syrupus est ex succ. acidior. p. xij. vini p. v. mellis p. iij. & Cinam. V. *Disp.*

9. *Diacydonites, vel Diacydonium simplex*. Ex carne Cydonior. scil. atque sacch. ana V. D.

10. *Diacydonites, vel Diacydonium compositum*, diversæ descriptiones extat. V. *Disp. A. & N.*

11. *Diacydonites Laxativum*. *Vid. Disp. Aug.*

12. *Essentia seu spiritus*. Ex succo dulci fermentato: raro in usu est.

13. *Ol. per infusionem*. Ex cydoneis non exortictatis succo Cydon. & ϕ omphacino. V. D.

D.

CXXV. *Daucus*.

$\Delta\alpha\upsilon\kappa\omicron$, *Daucus*, *Daucum* & *Daucium*, *Mohrentkummel*.

N. *Dauci* no mine planta bina officinis veniunt. *Daucus* scil. *Creuscus*, de quo hic; & *Daucus vulgi seu officinarum*. *Vide Pastinaca sylvestris*.

Dicitur *Daucus* 1. *Math.* *Daucus Cretensis* verus, *Diosc. Lob. Ger. Dau. Creticus*, *Cast. Tab. Dauc. foliis fœniculi tenuissimus*, C. B. 1.

Nascitur sponte in Insula Creta unde nomen quoque habet, tum quoque in Italia: Semen solum nostratibus officinale est.

Vires. Uterinum in primis est & diureticum *Cals. & succ. 2. aperit, incidit, flatu discutit. Usus* *pracip. in mensibus obstructis, suffocatione & dolore matricis, in colica flatulenta, in singultu, dysuria, tussichronica.*

N. Ingreditur Compositionem *The-riaca*.

CXXVI. *Dictamnus Creticus*.

Dictamni officinales sunt. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Dictamnus Creticus, Cretischer Diptam: De quo hic.} \\ \text{Dictamnus vulgaris seu albus officinar. Vide Fraxinell.} \end{array} \right.$

Dicitur *Dictamnus*, *Brunf.* *Dictamnium*, *Math. Lob. Cast. Dictamnium Creticum*, *Math. verum*, *Dod. Di-*

ctamnus verus, *Cord. in D. Dictamnus Creticus*, *Trag. icon. Cam. Dictamnus Creticus*, C. B. 1.

Nasci-

Nascitur in Creta foliis crassioribus & villosioribus, in hortis Italiae majoribus, minusque incanis.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. *Uterina* in primis est herba alexipharmaca. *Calf.* & *sicc. atten.* absterg. aper. *Usus* prac. in obstructis mensibus, in partu accelerando (intrinsecus & extrinsecus) in Ichibus venenatis, inspiculis extrahendis.

CXXVII. *Dipsacum.*

Est { *Sativus* { Major. Hic usualior.
 { *Sylvestr.* { Minor. Et hic adhiberi potest.

Videatur *Διψακ*, *Fuch.* *Dod.* *Tab.* *Ger.* *Labrum* veneris, *Math.* *Cord.* in *D.* *Carduus* Veneris, *Carduus* fullo-
 num, *Lob.* *Trag.* *Dipl.* *sylv.* aut *Virga* pa-
 storis, *C.B.* 3. & 4. German. *Kartendi-*
 stel.

Crescit locis asperis arenosis; Floret
 Junio & Julio.

OFFICIN. NAT.

Radix sed rarissime: hinc *Vermiculi*
 in echinis reperti.

Vires. *Radix* teste *Matthiolo* *sicc.* ab-
 stergit. *Usus* pracip. in Rhagadibus ani
 solidandis (decoctum cum *Vino*) commen-
 datur in verrucis abigendis.

Vermiculi (vel *radix*) de collo suspen-
 si quarianam arcere creduntur: eosdem
 cum oleo rosac. vel simili contusos paro-
 nychiam sanare, auctor est *Matthio-*
lus.

CXXVIII. *Doronicum.*

Aconitum pardalianches *Theophra-*
sti, *Math.* *Tab.* *Doronicum* Austria-
 cum alterum, *Clus.* *Cam.* *Doronicum* 2.
 longifolium, *Tab.* minus, *Ger.* *Doroni-*
 cum radice repente; Eidem. *Doroni-*
 cum radice dulci, *C.B.* 1. Germ. *Gäm-*
sewurz / *Schwindelkraut*.

Crescit in Austria, Styria, Helvetia,
 &c.

OFFICIN. NATIVA.

Radix.

Vires. Accedit ad *calfac.* & *sicc.* gr. 3.
 discnt. alexipharmaca est. *Usus* pracipu-
 us in Vertigine, Uteri inflatione, palpi-
 tatione cordis; venenosis morbis ac mor-
 sibus (nimirum signaturam *Scorpionis*
 habet.

N. Sunt qui *aconitum* par *dalianches*
 esse volunt, adeoque noxium (ut *Mat-*
thiol.) Cui tamen moderni minimè sub-
 scribunt.

E.

CXXIX. *Ebenus.*

Lignum exoticum est in medici-
 na nullius usus, præter quàm quod
 Paracelsus oleum ac sal ejus maxime
 commendat. *Ol.* stillat. collaudat in
 doloribus arthriticis, Podagra, Para-
 lyti, morbis venereis & pustulis (ex-
 trinsecus scilicet loco affecto inun-
 ctum) Sal celebrat vi purgandi (for-
 te facultatem purgatricem stimulan-
 di) in podagricis, paralyticis, item
 virtute mundificandi vulnera. Vide
 Para-

Paraceif. de Xylo Hebena. German.
Ebenholz.

CXXX Ebulus.

ἄμυγδαλιν Dioscoridis, h. e. Sambucus humilis. Ebulus. Trag. Matt. Fuchf. Lob. Cast. Tab. Ebulus seu humilis sambucus, Dod. Ebuli & Sambucialterum genus, Lon. Sambucus humilis seu Ebulus, C. B. 5. Germ. Niederholzer/Altich.

OFFICIN. NAT.

Floris, Folia, Cortex interior, Semen & bacca.

Vires. Flores calfac. & sicc. discut. emol. resol. sudores movent ut sambuci flores.

Eadem vi pollent folia & in primis ad podagricos dolores sopiendos, tumoresque aquosos discutieudos, adeoque & hernia aquosa conveniunt.

Cortex interior maxime radice (præterquam quod aquosos & serosos humores totius corporis per alvum educit,) calfac. & sicc. discutit, emollit. Usus præcip. (ut florum) in inflammationibus. Erysipelate. & sim.

PRÆPAR.

1. ▽. stillat Ex floribus.

2. Spiritus. Ex floribus fermentatis.

3. Rob. Ebulin. seu pulpa baccar.

Vires. Aquas blande detrahie, sudoresque mover.

4. Tinctura seu Essentia granorum Ebuli. Fit & usurpatur eodem modo quo tinctura Sambuci.

Vires. Tinctura hæc specificum est

remedium contra hydropem, cachexiam uteri strangulatam, cujus paroxysmum sudore medianie fugat.

De Cortice & semine, vide in purgantibus.

CXXXI. Endivia.

Σίγει, Intybus sativa, Endivien.

Est { Major latifolia, qua intelligitur simpliciter sic dicta.
Minor angustifolia (dicitur scariola,) quæ priori substitui potest.

Prior dicitur Intubus sive Endivia, Trag. Intubus major, Matth. Intubum sativum latifolium, Fuchf. Lob. Intybus sativum, Cord. in D. Dod. Ger. Intybus sativa major, Cast. Seris (sive Endivia alba,) Lob. Endivia hortensis, Cam. Intybus major sativa sive cichorium domesticum, Tab. Scariola Arabum interpretibus Seris domestica latifolia Dioscor. Intybus sativa latifolia sive Endivia vulgaris, C. B. 1.

Colitur in hortis, solo gaudens optimo, Floret Julio & Augusto.

OFFICIN.

Folia, Semen, rarissime Radix.

Vires. Epatica & nobilissima, refriger. & sicc. 2. absterg. aperit diuretica est. Usus frequentissimi in febribus biliosis.

PRÆPAR.

1. ▽ stillat. Ex integra planta.

2. Succus. Ex foliis.

3. Syrup. de Endiv. simpl. ex succo & saccharo $\frac{1}{2}$.

4. De Endiv. compos. Vid. D.

5. Syr. Byzantius. V. D.

6. Dia-

6. *Diafer. Andernac. V. D.*
 7. *Sal. com. Ex planta incinerata.*

CXXXII. *Epatica Nobilis.*

Epatica alba, Trifolium nobile. Epatica, Brunf. aurea, Brunf. Tab. Trifolium magnum seu aureum, Trag. Trif. aureum, Dod. Lon. aureum magnum Cast. Trinitas, Matth. Cord. b. Cast. Hepaticum trifolium, Lob. Cam. Ger. Hepatica trifolia, Clus. hist. Trifolium Epaticum flore simplici, C. B. I. Germ. Herk oder Leberblumlein / gülden Leberkraut edel Leberkraut.

Florere incipit veris initio, colitur in hortis.

OFFICIN. NAT.

Folia ac Flores.

Vires. Calf. & succ. moderate (al. refr.) substring. sanguinem mundificat, Epatis ac Lienis obstructiones reseruat, urinas ciet, Renes & vesicam abstergit, Herniam curat.

PRÆPARATA.

Δ. *Ex planta integra.*

CXXXIII. *Epatica stellata.*

Hepatica stellaria, Tab. Matrisylva, Trag. Cord. in D. Lon. Asperula, Lob. Ger. Asperula odorata Dod. Cast. Clus. hist. Aperine sylv. quædam, Cord. Asperula seu Rubedo montana odora, C. B. I. Caprifolium aliis Germ. Stein Leberkraut / Herkfreud / Waldmeister.

Gaudet solo nemoroso; Floret April. Majo.

OFFICIN. NAT.

Herba. cum floribus.

Vires. Calfac. & succ. sen. temperata potius est, Epatis ac cordi familiaris. Usus præcip. in obstructo Epate ac meatu biliario & hinc in Ictero, in Epate calidior refrigerando. Exirinscus in temperie calida Epatis (cataplas.) in tumoribus calidis. Quin & pedibus alligata parturientium partum accelerare dicitur.

N. Plantula est nostratibus familiarissima, quippe vix quidam e Francofurtensibus erit, cujus potum Majo mense non suborneret, saporem conciliando grausimum.

CXXXIV. *Equisetum.*

Ἰππῆρις, Herba Equinalis, Cauda Equina, Rosschwanz / Pferdswanz / Schaffenhew.

Varii est generis. Est enim Equisetum palustre varium, est sylvaticum, est pratense, est denique arvense. Et hæc etsi viribus convenient, attamen usuale magis est pratense.

Dicitur Hippuris altera, *Trag. Equisetum alterum, Matth. Equisetum, Fuchs. ico Cord. in hist. Hippuris major prima, Lon. Hippuris fontalis & Equisetum 2. Diosc. Lob. Hippuris minor, Lob. Equisetum palustre majus, Tab. palustre, Ger. Equisetum pratense longissimis setis, C. B. 8.*

OFFICIN. NAT.

Caules cum foliis suis.

Vires. Vulnerarium est, frig. sec. 2.
 Iii ii in spiss.

inspissat, astring. Usus precip. in hamorrhagiis sistendis, in exulceratione & vulnere Renum & vesicae, interaneorum tenuium, &c.

PRÆPARATA.

▽. stillat.

CXXXV. *Eruca*.

Ευζωμων, Arab. Legir. *Raucen*.

Palustris. Crescit juxta rivulos.

Eruca Sylvestris, crescit in locis arenosis, floret Junio, Julio, &c.

Hortensis, Ευζωμων, Legir, *weisser Senf*.

Ex his inferitur in officinas potissimum hortensis latifolia, C. B. 1. quâ tamen acrior est sylvestris.

Dicitur *Eruca*, *Brunf. Math. Cord.* in D. *Cast.* *Eruca* sive *Rucula marina* major & *Sinapi* 8. *Trag.* *Eruca sylvestris*, *Fuchf. ico. Lon.* *Sinapis altilum* genus, *Fuchf. Erucula* major, *Cord. h.* *Eruca sativa*, *Math. Lob. Dod.* *Eruca* major, *Cam.* *Erucula latifolia alba sativa* *Dioscor. C. B. 1.*

OFFICIN. NAT.

Semen.

Vires. *Calsac. succ. intense.* (3.) Usus precipuus in Venere stimulanâ, apoplexiâ præservandâ. Extrinsic. (imposita radix) extrahit officula fissa, pituitam è cerebro prolicit (in apophlegmatism.)

CXXXVI. *Eryngium*.

Eringus, *Aster Atticus*, *Centum*

capita, *Inguinalis*, *Mannstretu/* *Stae dendistel/* *Brackendistel.*

Gaudet locis herbosis, arenosis, floret Julio.

Ex *Eryngiorum* generibus officinale est *Eryngium primum*, *Trag. Lon.* *Eryngium montanum* sive *campestre*, *Math. Cast.* *Eryngium*, *Fuchf. Cord. in D. Tab.* *Eryngium mediterraneum*, *Ger.* *Eryngium campestre*, *Dod. Cast.* *vulgare*, *Clus. hist.* *Eryngium campestre mediterraneum*, *Lob.* *Eryng. vulgare*, C. B. 2.

OFFICIN. NAT.

Radix colligenda Sole existente in Cancro.

Vires. *Epatica*, *nephruica* & *alexipharmaca* est, temperate calida, medicriter sicca, aper. discut. Usus præc. in obstructis mensibus, Urina, Epate, Vesica biliaria, Liene, &c. & hinc in istero, ut & (teste Galeno) in Colica.

PRÆPARATA.

Condiaradix.

CXXXVII. *Erysimon*.

Variorum est generum è quibus singularis est, *Egusimon*, 1. *Tab.* *Erysimon* *vulgare*, C. B. *Iris*, *Math. Cord. in D. Lon.* *Verbena fœmina* & *Sinapi* 7. *Trag.* *Begseniff/* *Hederich.*

Crescit juxta vias: Floret Julio, Augusto.

OFFICIN. NAT.

Semen ac Herba.

Vires. *Calsac. & succ. 3.* attenuat, aperit, expectorat. Usus præc. in mucilagine

gine contumaci pulmonum atque tussi mammarum.

chronica. Extrins. in Cancro non ex-
ulcerato, tumoribusque renitentibus

PRÆPARATA.

Syr. de Eryfino Lobelij. Vid. l. 2.

CXXXVIII. Eupatorium.

Eupatorium { Veterum seu Græcorum. Vide Agrimonia.
Mesuæ. Vide Ageratum.
Cannabinum: Describitur hoc loco.

Dicitur Eupatorium Cannabinum,
C. B. 1. Herba S. Künigundis, Trag. 1.
Tab. Eupator. aquaticum, Gesn. Salvia,
Brunf. Eupatorium vulgare, Math.
Dod. Cast. Eupatorium adulterinum,
Fuchf. Eupatorium Avicennæ credi-
tum, Lac. Lon. Cam. Cannabina aqua-
tica mas, Lob. Germ. Wasserdost/ Rū-
nigkraut/ Hirschgünkel/ Altkraut.

N. Plerique hanc herbam Eupatorium
Avicenna censent, Bauhinus, verò Agri-
moniam pro Eupatorio & Græcor. & A-
vicenna habendam esse monet.

Crescit locis uliginosis: Floret Julio
& Augusto.

OFFICIN. NAT.

Flores & Folia, sed raro.

Vires. Calfac. & sicc. saporis est amari-
usculi, atten. aper. subadstr. Epatica
est vulneraria. Usus præcip. in cachexia,
catarrhis & tussi, mensibus retentis. Ex-
trinsecus è nobilissimis est vulnerariis (ut
& intrinsecus) mensis ciet balneatione,
&c.

PRÆPARAT.

1. ▽. Ex foliis & floribus.
2. Trochisci de Eupar. A.

CXXXIX. Eupragia.

Ευφροσύνη, Euphragia, Eufrasia, Au-
gentrost.

Eligitur Euphrasia vulgaris seu offi-
cinarum, C. B. 1. Euphragia alba, Brunf.
Eupragia, Math. Cast. Euphrasia &
Eufrasia, Fuchf. Dod. Lob. Tab. Ger. Vul-
garis, Lon. Euphrasia Argentinenisium
vel 2. & 6. Trag. Ophthalmica sive O-
cularia.

Crescit locis apricis, sabulosis. Floret
Junio, Julio, Augusto.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. Ophthalmica est & Cephalica,
calf. & sicc. 2. adstring. disc. saporis suba-
cris: Usus præcip. in oculor. suffusionibus,
caligine, memoria debilitata.

PRÆPAR.

1. Conserva. Ex tota herba cum flo-
ribus.
2. ▽. Et integra herba Julio colle-
cta.
3. Vinum nonnullis usitatum est: fit
infusione summitatum pro potu ordi-
nario.

CXL I. Fabaria.

Τηλέφριον, Crassula, Crassula major, faba inversa, Knabenkraut / Wundkraut / Donnerkraut / Donnerbonen.

Usuale est Telephium vulgare, C.B. 1. quæ est Fabaria, Matth. Telephium, Matth. Lob. Tab. Cast. Cam. Telephium album, Fuchf. acetabulum alterum, Dord. in D. album, Fuchf. ico. Faba inversa, Lob. Telephium alterum sive crassula, Dod. vulgare sive secundum, Clus. hist. Crassula seu faba inversa, Ger. Coryledon, alterum Dioscoridis, Col. scrophularia media vel 3. Brunf.

Floret Julio ac Augusto. Crescit circa muros, locis que saxosis.

OFFICIN. NAT.

Folia tantum.

Vires. Matthiol. refrig. & hum. (Dodonaæ refrig. & sicc.) vulneraria est, astring. mundificat, præcipuique usus est in consolidanda intestinorum erosione per dysenteriam introducta, in curanda hernia, in maculis cutis detergendis, in am-
bustis medendis.

PRÆPAR.

▽. Ex fol. & floribus.

Farsara, vide Tussilago.

CXL II. Ficus.

Σύκη, Ficus, Brunfels. Trag. Matth. Dod. Cord. hist. Bellon. Lon. Lob. Cast. Tab. Ger. Ficus sativa, Fuchf. communis, C.B. 1. Germ. Feigenbaum.

OFFICIN. NAT.

Fructus, (σύκα.)

N. Primitia fructus dicuntur grossa ficus; sicca in furno aut sole exsiccata, carica; aliis passa.

Vires. Carica calf. 2. (recentes moderatius:) utraque humect. pulmonaria sunt, & bechica, arenulis Renum & vesica medentur, venenis resistunt: præcipui usus sunt in variolis & morbillis ad cutem pellendis, maturant, molliant, attrahunt, unde & bubonibus pestilentialibus (innuente Scriptura) conferunt. mulierculis nostratibus, appropinquante partu, ficum costar. esus ad partum facilitandum est familiarissimus. Quin & familiare est super ficus Spir. vin. accendere, brodiumque ad tussim sedandam propinare.

CXL III. Filipendula.

Φιλιπένδρα, Filipendula oenanthe, saxifraga rubra, rother Steimbrech.

N. Dicitur Oenanthe veterum, quia viribus aliquantum conveniunt.

Usualis est filipendula vulgaris, C. B. 7. Filipendula, Trag. Dod. Matth. Cord. hist. Lon. Cast. Tab. (cui & saxifraga rubra,) Ger. Oenanthe, Fuchf. Cord. in D. Lob.

Nascitur solo herboso. Floret Junio & Julio.

Folia & Radix.

OFFICIN. NATIVA.

Vires. Calf. & sicc. 3. attenuat, abstergit, subastring. discui. diuretica est: Usus præcip. est in tartarea mucilagine pulmonum, Renum, vesica ac articularum, in colica flatulenta, in albo mulierum

profusio. Extrinsecus in tumore hamorrhoidum.

Dosis Drach. j.

CXLIV. Filix.

Πλέγξ, Πλέγξ, Fabry / Fabrykraut / Waldfabry.

Mas non ramosa (plurium) utraque
pedicillorum. promi-
Fœmina ramosa, (unius) scilicet u-
pedicilli. sualis.

Mas dicitur Filix, Brunf. vulgaris, Trag. mas, Matth. Fuchf. Dod. Lon. Lob. Cast. Tab. Ger. fœmina, Gesn. Casalp. Filix non ramosa dentata, C. B. 3.

Fœmina inscribitur, Filix sylvest. Brunf. Filicis majoris genus, Trag. Fil. fœmina, Matth. Fuchf. Dod. Lob. Cast. Tab. Ger. Tylypteris, Filix, fœmina, Cord. in D. Filix mas major sive fœmina credita vulgo, Clus. Filix ramosa major pinnalis obtusis non dentatis, C. B. 1.

Nascitur locis opacis nemorum: vi-
ret tota æstate, nocte D. Johanni sacra
semen profert: novi qui dicto tempore
id collegerunt, verum qua utilitate,
ignoro.

OFFICIN.

Radix inprimis Filicis fœminæ.

Vires. Splenetica est, calf. & sic. ama-
ra est, subastr. aperit. Usus præcip. in ob-
structionibus viscerum & inprimis Lienis
& Uteri. Extrinsecus commendatur ad
ambusta (extracta mucilago.)

N. Gravidis insensu censetur.

CXLV. Fœniculum.

Μάραθρον, Fœniculum, Brunf. Trag.
Fuchf. Cord. in D. Tab. Vulgare, Ger. fœ-
niculum nostrum vulgare, quibusdam
Hippomarathrum putatum, C. B. 1.
Germ. Fenchel.

Crescit locis cultis, aridis; Floret Ju-
lio, Augusto.

OFFICIN. NATIVA.

Herba seu Summitates Radix (quæ
una ex radicibus 5. aperientibus famo-
sis.) Semen.

Vires. Folia calf. 2. sic. 1. aper. resolv.
discut. diuretica, carminativa & bechica
sunt ventriculum roborant, lac augent,
visum confortant, asperam arteriam le-
nunt.

Radix & semen calfac. 3. adeoque in-
super usus creberrimi in humorum & fla-
tuum discussione, & ad peripheriam ex-
pulsione.

N. Semen adhibetur sæpissime ad cor-
rigenda purgantia, ut & ad flatum discuti-
endos.

PRÆPARATA.

1. Confectum Semen.

2. ▽. Ex integra planta incisa.

3. ▽. Ex semine.

N. Ophthalmica est inter usitatissi-
mas.

4. ♂ stillat. Ex semine.

5. Sal com. Ex planta incinerata.

CXLVI. Fœnum græcum.

Fœnogræcum, Fenugrec / Voets-
born.

Est

Est { Sativum: Hoc usuale.
Sylvest. minus usitatum.

Dicitur fœnum Græcum, Trag.
Math. Lob. Lon. Dod. Cast. Cam. Fœ-
nogræcum, Fuchf. Cord. in D. fœnum
græcum sativum, C. B. I.

OFFICIN. NAT.

Semen solum ex sativo scilicet de-
sumptum.

Vires. Calfac. 2. sicc. 1. emollit, dige-
rit, maturat, discutit, paregoricum est,
ususque adeo famosi, ut cataplasma dicta-
rum intentionum Chirurgis vix usitatum
sit, quin fœnogræcum vel huius mucilagi-
nem contineat. Crebrique usus est in
clysteribus emollientibus, mucilaginosi
quippe sua substantia obtundit acrimoni-
am, intestinaque erosa oblinit. Insuper
concludit ejus mucilago ad oculorum sug-
illationes discutiendas (imposita) Vide
Hartm. præct.

PRÆPARATA.

Mucilago. Extrahitur beneficio co-
ctionis in ∇.

CXLVII. Fragaria.

Κόμμερον, Fragaria, Brunf. Trag. Matt.
Fuchf. Dod. Lon. Lob. Cast. Ger. Fraga-
ria vulgaris, C. B. I. Fragula, Cord. hist.
Fragula & Trifolium fragiferum, Tab.
Erdbeerkraut.

Crescit locis opacis: Floret Martio
& Aprili.

OFFICIN. NAT.

Folia seu herba & Fructus in præpa-
ratis.

Vires. Herba refriger. & sicc. mode-

ratè subastring. diuretica est, ususq̃ cre-
bri in ictero, ut & in gargarismis & bal-
neis, in cataplasmatibus, &c.

Fructus, (fraga) Refriger. & hu-
meft. Splenetica sunt ac nephritica, Ve-
nenis resistunt, quia autem facile pu-
trefcunt, non adeo commode comedun-
tur.

PRÆPAR.

1. ∇. Ex integra planta florida. Ab-
stergit lentigines & maculas.

2. ∇. Ex fructibus.

N. Sium & astum febrilem extinguit,
urinam ciet.

3. Syrup. Ex succo fragor.

4. Spirit. Ex succo fermentato, qui
tamen usus rarioris.

5. Tinctur. E baccis cum ∇ pro-
pria.

CXLVIII. Fraxinus.

Eschbaum/ Excelsior Hac officinalis.

Eschern/ Humilior. Minus usualis.

Dicitur Fraxinus, Brunfels. Trag.
Math. Dod. Lon. Lob. Tab. Cast. Fra-
xinus excelsior, C. B. I.

Floret Aprili & Majo: Semen fert
Autumno. Crescit in sylvis opacis.

OFFICIN. NAT.

Folia, Cortex, Lignum, Semen.

Vires. Folia siccant valide curant-
que ictus serpentum, sed usus sunt raro-
ris.

Cortex & Lignum, siccant itidem,
attenu: Splenis duritiem specificè emolli-
unt, diuretica sunt lithontripica, & aque
non è postremis.

N. Sunt qui lignum de Ioannis Ba-
ptista

ista casum, vulneribus ac contusionibus solo affricatu mederi credunt, cadunt autem id alii ante Solis ortum, alij ipso meridiano temporis puncto.

Seimen. (foliis adhaerens) calfac. & succ. valide, conducit Epaticis, Pleureticis, Calculosis.

N. Colligendum hoc est autumnali tempore.

PRÆPARATA.

1. *Extract.* Ex corticibus per ∇ appropriatam, liquore aliquo acido acuatam, ubi excellit ∇ ex tenellis fraxini foliis destillata. *Quercetan. in P. R.*

2. *Oleum ex ligno:* Fit destillando modo communi.

3. *Sal. com.* Ex cinere corticum.

N. Sal ex ligno incinerato, vulneribus intus & extus cum felici successu usurpatum vidi.

CXLIX. Fraxinella.

Dictamnus albus (propter radicem albam) sive *fraxinella*, C. B. γ . *Polemonium*, Tab. *Dictamnus putatus*, Brunf. *Dictamnus vulgaris*, Trag. Cam. Officin. Lon *Dictamnus albus*, nonnulli *pumila fraxinus*, Matthiol. Cast. *Tragium primum*, Dioscor. Lob. *Dictamnus nostra*, Cord. in D. *Fraxinella*, Cord. hist. Dod. Clus. Ger. Germ. *weisser gemeiner Diptam* / *Eschertwurz*.

Crescit in rupibus: Floret Junio.

OFFICIN. NAT.

Radix. verno tempore colligenda.

Vires. Est cordialis, alexipharmaca. *uterina, cephalica, amara, calfac. & sic-*

cat, aperit, vermes necat: Usus precipui in morbis malignis, in Epilepsia, aliisque affectibus capitis, in obstructione uteri, &c. Extrahere quoque dicitur spicula cuti infixata.

C L. Fumaria.

καρυϕ, *Fumaria officinarum* & *Diosc. C. B. i.* *Fumus terræ*, Brunf. Cam. *Fumaria*, Trag. Math. Fuch. Cord. in D. Dod. Lon. 2. *Flore albo*, Tab. Capnos, Lob. *Fumaria major*, Cast. *Fumaria purpurea & alba*, Ger. German. *Daubenkropff* / *Daubenkörbel* / *Erdo rauch* / *wiide Daufen*.

Crescit passim in hortis, vineis, &c. Floret Majo & Junio.

OFFICIN.

Herba cum floribus.

Vires. Splenetica est ac Epatica: attenuat, serenos, biliosos ac adustos humores sensim expurgat, viscera reserat, reserata roborat, sanguinem purificat. Hinc usus precipui, in scorbuto, aliisque morbis mesenterii & Lienis, in lictero, in scabie omnis generis & sim.

PRÆPARAT.

1. ∇ . Ex herba cum floribus.

2. *Oleum stillat.* quod rarum.

3. *Succus inspissatus.* Dosis ad ζj .

4. *Conserv.* lummit.

5. *Syr. simpl.* Ex succo.

Compos. Vide Disp.

6. *Pilul. de fumaria.* Purgant bilem, serenosque humores.

Dosis Drach. j. ad Drach. iß.

7. *Sal. com. fumaria.* ex herba incinerata.

C L I.

CL I. *Fumaria bulbosa.*

Fumar. bulb. { radice cava 1. *Hac usualior.*
 { major 2. *Hac surrogari priori potest.*
 { radice non cava { minor 3.

1. Dicitur, *Aristolochia rotunda*, *Brunf. Arist. rot. vulgaris, Trag. Fuchf.* (cui & *Pistolochia*.) *Cam. Fumaria altera, Matth. Cast. Capnos Chelidonia, Lon. Radix cava major, Dod. Clus. hist. Fum. cava herbariorum, Lob. German. Erdkraut/falsch Holtwurk.*

2. *Fum. bulb. radice non cava* dicitur *Aristolochia rotunda vulgaris radice solida, Trag.*

Crescunt in dumetis, locis frigidis & opacis, ut & in vineis. Florent Aprili.

OFFICIN. NAT.

Radix: raro *Herba* cum floribus.

Vires. Calf. 2. sicc. 3. absterg. subastring. aperit. *Epatica* est, *Uterina*, *Alexipharmaca*, *sudorifera*, *diuretica*, & *vulneraria*. *Usus* precip. in ciendis mensibus, lochiis: fœtum mortuum expellit, *lctero* medetur, sanguinem mundificat, adeoq; & scabiei succurrit. *Extrinsicus* commendatur quam maxime ad vulnera etiam inveterata & fistulosa, utpote qua mundificat & consolidat; ad scabiem, ad dolores podagricos (à frigidis humoribus) ad sanguinem coagulatum in contusionibus, ad putredinem oris.

G.

CL II. *Galanga.*

Galgan/ { Major radice crassiore, ru-
 { bra minus odorata, &c.
 C. B. { Minor, radice tenuiori, no-
 { dosa intus & extra rube-
 { scente, sapore acri instar
 { piperis odore suavi.

N. *Hac priori præsertur.*

Dicitur *Galanga minor, Matth. Cord. hist. Fuchf. Lob. Lon. Tab. Acof. Ger. Galanga minor officinar. C. B. 2. Galanga Indica, Amat.*

Major vocatur, *Galanga minor, Matth. Cord. hist. Lon. Fuchf. Lob. Calsalp. Tab. Gal. crassa, Amat. Iridis genus, Clus. in Acof.*

N. *Galanga (γαλγαν)* quibusdam *Acori*, nonnullis *Iridis* species videtur; minor à recentioribus Græcis *Cyperus Babylonica* nominatur. *Arab. Galingia.*

OFFICIN. NAT.

Radix, quæ eligenda saturato rubra, ponderosa, bene odorata, saporis acris.

Vires. Stomachica est, *Cephalica* ac *Uterina*: *calf. & sicc. 3.* saporis acris, incidit, aperit. *Usus* in cruditate at inflatione ventriculi, vertigine, uteri obstructione, aliisque totius corporis affectibus à frigiditate ac flatulentia oriundis. *Extrinsicus* commendatur ad roborandum caput (in Errhinis.)

Kkk kk PRÆ-

PRÆPARATA.

Spec. Diagalang. Vid. Disp.

CLIII. Galega.

Galega, ruta capraria, *Matth. Cast. Cam.* Ruta capraria, *Tab. Galega, Lob. Dod. Lon. Ger.* vulgaris. *Clus.* Galega vulgaris, C. B. 1. *Germ.* Gänstrauf/ Fleeckenkraut.

N. *Quidam* Onobrychin, alii Glau- cum, nonnulli Polemonium, alii Polyga- lam veterum esse iudicant: verum his omnibus Dioscoridis descriptiones contra- dicunt.

Colitur apud nos in hortis: Floret æstate.

OFFICIN. NAT.

Herba collecta Junio & Julio.

Vires. Celeberrimum est Alexiphar- macum ac sudoriferum, venenum, in pri- misque pestilentielle insigniter discutiens. Usus ejus precipuus est in petechiis ex- pellendis, aliisque morbis pestilentiali- bus, ipsaque peste curanda. In morbillis In Epilepsia infantum (exhibetur succi coch- lear, 1.), in ictibus serpentum, in Lum- bricis, (quos etiam extrinsecus applicata fugat.)

N. Herba hac secus ac alie citra sa- pore est, & insuper qualitatibus primis temperata.

PRÆPARATA.

1. Δ. Ex integra planta Julio colle- cta.

2. Conserv. summit seu flor.

CLIV. Gallium.

Γάλλιον, Γάλλιον, Γαλάτιον, Γαλέγον, *Germ.*

Megerkraut/Waldstroh/unser-Frau- en Weistroh/Wegstroh/Lebkraut.

N. Nomen habet, quod coaguli vice γάλα, i. e. lac coagulet.

{	Luteum flor. luteo	{	vulgare.
			palustre.
{	Album flore alb	{	palustre minus.

Ex his præfertur primum, C. B. seu Gallium luteum, quod Dioscoridis Gallium putatur.

Dicitur Gallium *Fuchf. Dod. Lon.* Gallium luteum primum, *Tab. Gallii* primum genus, *Trag.* Gallium. *Matth. Cast.* Luteum, *Cord. in D. Lob. Cam. Ger.* Gallium luteum, C. B. 1.

Crescit passim locis aridis & areno- sis, juxta vias, &c. Floret Majo, & hinc tota æstate.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. Calf. & sicc. moderatè. Usus ejus potissimum externus est in hamor- rhagia narium sedanda (pulvis infla- tus) in scabie simplici & maligna, adeo- que in cancro mammarum, &c.

N. Rari usus est apud præcticos, so- lumque asservatur pro compositionibus, quas ingreditur: ut unguentum Martia- tum, &c.

CLV. Genista.

Genista, Genst/ Genster / Pprim- menkraut.

Usualis est è Genistis non spinosis, C. B. 1. Genista angulosa & scoparia, spartium, *Lob. Genista. Brunf. Trag. Fuchf.*

Fuchf. Dod. Cord. in D. Cam. Tab. Ger.
Genista angulosa, Cord. hist. Genista
minor seu non aculeata, Lon. Genista
scopatia vulgi, Lob.

Solo gaudet arenoso & aprico. Floret integra ætate.

OFFICIN. NAT.

Flores & Semen.

N. Flos communiter luteus, rarius albus est.

Vires. Splenetica & nephritica censetur, hinc & epatica calf. & sicc. 2. aper. atrop. absterg. calculum pellit, aquosos humores educit, tam per vomitum, quam per alvum & urinas. Hinc usus ejus insignis in obstructione Epatis & Lienis, Mesenterii, adeoque in Hydrope, catarthis, arthriticis affectibus.

N. Semen extrinsecus applicatum scrophulas consumere dicitur.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex floribus & foliis.
2. Conserv. Ex floribus.
3. Sal com. Ex incinerata herba.
4. Conditæ flores.

Condiuntur autem flores (seu potius gemmæ) collecti mense Aprili, antequam aperti fuerint, cum aceto & sale, adhibenturque loco capparum, unde & nostratibus cappares. Germ. dicuntur, Teutsch Capern.

N. Circa vomitum assumi poterunt.

CLVI. Gentiana.

Gentiana (à Gentio inventore sic dicta.) Gentian.

Gentiana { Alpina { major.
 { minor. Gentianella.
 { pratensis.
 { palustris.

Usualis est ex his alpina major lutea, C. B. i. de qua notandum, quod reperitur quoque floribus flavis, imò & albis, punctis carentibus.

Dicitur Gentiana, *Brunf. Matth. Fuchf. Dod. Cord. in D. Lon. Cast. Gentiana major, Matth. Lob flore luteo, Cam. Gentiana veterum, Clus hist. Gentianæ i. species, Trag.*

OFFICIN. NAT.

Radix collecta mense Augusto ac Septembri.

Vires. Calf. & sicc. 2. Alexipharmaca est, aperit attenuat. Usus præcipui in peste, aliisq; venenatis affectibus, in obstructione Epatis, Lienis, &c. Et hinc in hydrope, tum in suffocatione Uteri, in imbecillitate ventriculi, lumbricis, in febribus, in morfu canis rabidi. &c. Extrinsecus adhibetur creberrimè in vulneribus ac fonticulis mundificandis, renovandis, &c. in morfu canis rabidi arcendo (cum Theriaca imposita.)

PRÆPAR.

1. Succus inspissatus.

N. Creberrimus usus est in febribus intermittentibus, in quibus ante paroxysmum à ʒss. ad ʒj. vel ʒiij. exhibetur, felici cum successu.

2. Extractum cum S. V. factum.

CLVII. Geranium.

Geranii multa recensentur genera,
 Kkkkk 2

ra, officinis nostris maxima ex parte in-
usitata. Usitatus tamen præ cæteris
est, quod Geranium Robertianum di-
citur, alias Gratia Dei, *Ruprechtskraut* /
Gichtkraut / *Gottes Gnad* / *Rothe*
lauffkraut / (quia Erysipelati mederi
dicitur.

Dicitur Geranium, 3. *Brunf. Matth.*
Fuchf. Lon. Geranium, Robertianum,
Lob. Dod. Cam. Tab. Gratia Dei vel ge-
ranium quibusdam, *Trag.* Herba Ru-
perti & Geranium 2. *Diosc.* Geranium
Robertianum primum, C. B. 5. videli-
cet inter species Geranii folio cicutæ vel
myrrhidis.

Gaudet locis opacis ac desertis. Flo-
ret potissimum Aprili & Majo.

OFFICIN. NATIVA.

Folia.

Vires. Temperatum est in cal. & frig.
moderatè siccatur, substring. exterg. san-
guinem in corpore coagulatum resolvit.
vulneribus convenit, sanguinem scil. co-
hibendo, vulneraque mundificando. U-
sus externus (omnium generum Gera-
nij.) vulgaris est in cataplasmatibus, plantis
pedum cum sale & aceto applicandis, ad
febrilem æstum compescendum. Adhi-
betur itidem ad mammarum fissuras, la-
etisque discussionem (Robertianum im-
positum.

PRÆPAR.

▽. stillat. Ex integra herba in fine
April. collecta.

CLVIII. Glyzirrhiza.

Liquiritia, *Brunf.* dulcis radix, *Trag.*

Glyzirrhiza, *Fuchf. Cord. in D. Cam.*
Glyzirrhiza altera, *Matth.* vulgaris,
Dod. Cam. Epit. Glyzirrhiza siliquosa,
C. B. 2. Germ. *Süßholz.*

Crescit locis sylvestribus & sabulosis.
Floret Julio.

OFFICIN. NAT.

Radix ex Episcopatu Bambergensi,
ubi in copia crescit, ad nos transmissa,
quæ sole exiccata biennium integra ma-
net.

Vires. Calidit. & frigid. temperata est
(seu moderatè calefacit) in reliquis ad
humiditatem inclinat, pulmonica ac ne-
phritica est, acrimoniam mitigans, expe-
ctorationem promovens, asperitatem leni-
ens, alvum infantum leniter molliens. U-
sus præcipui in tussi, raucedine, vesica. e-
rosione, urine acrimonia.

PRÆPARATA.

1. Succus inspissatus.
2. Syr. Compositus. Vide Disp.

CLIX. Gramen.

Gramen absolutè sic dictum. Offi-
cinis graminis speciem denotat, quam
Dioscorides ἀργεῖον κατ' ἐξοχὴν, vocat,
estque Gramen caninum, seu arvense, C.
B. 1. Gramen. *Dod. Cord. in D. Cast.*
Gramen canarium medicatum, *Lob.*
Gramen caninum, *Tab. Ger. German.*
Reh oder Queckengraß.

Passim spontè provenit, felicius au-
tem in terra arida & arenosa.

OFFICIN. NAT.

Potissimum Radices (collectæ men-
se Majo vel Septemb.) raro Caulis cum
foliis, rarius Semen.

Vires.

Vires. Radix cujuscunque graminis refriger. & sic. aper. substring. substantia est tenuis ac penetrativa.

Herba seu folia intra siccitatem & humiditatem moderata sunt, frigida gr. 1. Usus precip. in obstructionibus Epatis, Lienis, Vreterum, in expuitione sanguinis (ubi succus ex integra planta valet) in lumbricis necandis. Extrinsecus in dolore capitis leniendo (seligunt gramin septem nndorum) in oculorum inflammationibus ac defluxionibus. (Has sedare dicitur dramen trium nodorum, decrefcente Luna evulsum ac collo circumligatum,) in auribus purulentis, in odontalgia, in tumoribus podagricis disentiendis.

PRÆPARATA.

▽. stillat. Ex radice Majo mense collecta.

N. Diarrhaam sedat infantum si abdomen eâ lavetur.

Est & graminis species, Gramen mannæ dictum, inter gramina dactilodea C. B. 8. Cujus semen incibum venit nomine Mannæ in German. ex Silesiæ ac Poloniæ confinibus transportatum, semine milii solis non absimile. De hoc vulgi opinio, quod ex aëre decidat, unde & Mannæ nomen impositum est.

CLX. Granata.

Malus (Domestica, qua pomifera est. puni- Sylvestris, quæ flores solum ca. fert.

Videatur Malus punica, Trag.

Matth. Dod. Cord. hist. Lon. Cam. Mala punica, Cord. in D. Bellon. Malum punicum, Lob. Cast. Malus granata, Tab. Malus punica, C. B. Germ. Granaten.

Utraque arbor, quamvis exotica sit, nostratibus tamen in hortis colitur.

OFFICIN. NAT.

1. Poma, eaque vel dulcia vel acida, vel acidodulcia, i. e. vinosi saporis 2. Flores collecti ex Grana sylvestri (Balaustia dicuntur) tum quoq; interdum ex domestica (appellantur Cyini.) 3. Cortex pomorum (malicorium, psidium) 4. Nuclei.

Vires. Poma: in genere censentur boni succi, ventriculo convenientia, sed pauci nutrimenti. Dulcia adhibentur in tussi chronica.

N. Quia ventriculo inflationes causantur, in febribus minus commodè adhibentur.

Acida, frigida sunt ac astringentia, stomachica. Usus precipui in febribus biliosis, in Gonorrhæa, in picagruvidar. compefcenda, orisque putredine corrigenda & sim.

Vinosa, (acidodulcia, Granata muza) media sunt natura inter dulcia ac acida, ad frigiditatem tamen aliquatenus accedunt. Cardiaca sunt ac Cephalica. Usus precipui in Syncope ac vertigine, &c.

Flores, tam Balaustia, quam Cyini ejusdem sunt natura, terrestres scil. valde astringentis, inspissantis, refrigerantis, siccantis, unde & balaustior. creberrimus

Kkkkk 3

rimus usus esse solet in omnis generis fluxionibus. E.g. Diarrhea, Dysenteria, uteri fluore, & sim. in sanguine vulnorum cohibendo, in gingivarum laxitate emendanda, in Hernia curanda, &c.

Cortex, (malicorium, psidion) ejusdem cum floribus censetur natura, præcipuiq; usus est in sedando fluxu hamorrhoidum, narium, uteri, &c.

Nuclei refrigerant iidem, astringuntque, inprimis qui ex pomis acidis collecti.

PRÆPAR.

1. Succus liquidus. Ex pomis expressus, fermentatus & depuratus, qui nomine vini granatorum venit.

N. 1. Præstat vinum ex pomis acidodulcibus.

N. 2. Ante præparationem hujus vini, extremam cutem granis detrahenda solent.

N. 3. Ad conservationem, nonnihil seminis Coriandri pulverisati in Vino eodem suspendunt.

2. Syrupus. Ex succo granator. dulc. ac sacchar. $\frac{2}{3}$. Vid. Disp.

3. Ex succo granat. acidor. & sacchar. $\frac{2}{3}$. Vid. Disp.

Grana Paradysi.

Paradyßförner/ vide Cardamom.

CLXI. Guajacum.

Lignum Indicum, Lign. Sanctum. Guaacan, Guajacan, Palus factus, Frankensholz, hällig Holz, Arbore est

exotica, procera, quæ ex India Occidentali ad nos transportatur.

Est que magna matrice. Guajaci 1. genus, Monard. & Mathioli. Guajaci 2. propemodum sine matrice, quod priori præstantius. Guajaci 2. Genus, Monard. & Mathiolo.

N. 1. Sunt qui prius Guajacum appellant, posterius lignum sanctum: Verum quia apud Authores Synonyma sunt, præstat matrice, uti dictum ea distinguere.

N. 2. Posterius dividitur à nonnullis in plura genera, quæ tamen non res esse sentia, sed solo colore diffierre vult Mathioli, idque pro diversitate maturiatis, quò enim maturius, eò ipsi nigrius est, & quanto minus adoleverit, tanto magis ipsi albicat.

OFFICIN. NAT.

Lignum Cortex, & Gummi, (sed raro.)

Eligendum est lignum recens ponderosum, succulentum (quod Carboni impositum fumigat.) Posterius præstat, quod colores rufum, spadiceum, flavum, lividumque simul mixtos habet.

Vires. Lignum calf. & sic. sudorem ac urinam largiter promovet, adeoq; sanguinem mundificat, putredini resistit. Utus præcipui in Arthritide, Hydrope, Catarrhis, aliisque morbis à phlegmate tartareo vel mucilagine aut flatibus oriundis: peculiariter ac specificè curat luen Gallicam.

Cortex.

Cortex. Minus calidus est quam Lignum.

Gummi (Refina) Gummi hoc mecum communicavit Vir rerum novarum curiosus Adrianus Sonnemann, Materialista hujus Civitatis, Affinisque mihi dilectus, idque cum felici successu aliquoties in curanda L. G. fuisse adhibitum affirmavit. Sapore est acri, colore ac figurâ Laccam ferè representante, pellucidum, friabile.

PRÆPARAT.

1. **Decoctum.** R. Guajac. incisi lbj. Aq. fontan. lbxij. post infusionem 24. horarum coq. ad lb. vij. plus minusve; coletur pro sudorifero, reliquum coquatur cum ∇ tantundem pro potu ordinario.

N. Possunt & addi Liquiritia, passula, sem. anisi, &c.

2. **Extractum viscosum & gummosum.** Videl. 2.

3. **Rectificatum.** Fit destillatione. Videl. 2.

Vires. Exhiberi commodè poterit intrinsecus in lue Venerea, aliisque morbis diaphoresi opus habentibus.

Dosis gr. iij. v.

N. Sunt qui oleum hoc pro oleo heraelino Rulandi habent, ejusque vires admodum deprædicant in Epilepsia, expellendo foetu vivo ac mortuo, in dolore dentium mitigando. Vide Brendel, in Chymia.

4. **Spiritus.** Est liquor acidulus, una cum oleo in destillatione colle-

ctus ac rectificatus. Vid. l. 2. de spiritibus.

N. Spiritus hic acidus præter medicinales virtutes descriptas, vim habet perlas, corallia, &c. solvendi. Intus exhiberi poterit à ʒʒ ad ʒj.

5. **Sal com.** Ex cinere elixivatur, sed paucum.

H.

CLXII. Hedera terrestris.

Ἰαμαίνιος G., hedera humilis vulgaris, corona terræ, Gundelreb/Grundreb/Grundmann/Erdepheyl/nostribus Donnerreb.

Est { vulgaris. Hæc usualis.
montana. Inusitata.

Nuncupatur Hedera terrestris, Brunf. Maith. Dod. Tab. Ger. Elatine Brunf. 4. Chamæcissos, Trag. Fuchf. Cam. Chamæclema, Cord. hist. Corona terræ, Lob. Hedera terrestris vulgaris, C. B. 1.

Crescit passim circa sepes: flores Aprilis potissimum.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. Saporis est amari & acris calf. & sicco. vulneraria est, aperit, abstergit. Usus creberrimi in tartaro, tam pulmonum, quam renum, aliarumq. partium, incidendo, resolvendo, adeoq. confert obstructionibus inde natis & lètero: conducit erosionibus & ulceribus viscerum abstergendis, consolidandis, &c. Extrinsecus adhibetur creberrimè ad calculum renum resolvendum (in balneis)

neis) ad dolores colicos resolvendos (in clysteribus.)

PRÆPARATA.

1. ∇ stillat. Ex herba Majo collecta.

2. Conserva. Ex floribus summ.

N. Conservam compositam habent August.

3. Syrup. simpl. Ex succ.

4. Compos. Vide Disp.

5. Succus. Succum propinatum plurimos, à morte liberasse refert Holterius.

CLXIII. Hedera arborea.

Κισσός, κισσός, Hedera, Brunf. Trag. Cord. in D. Dod. Hedera arborea, Matt. Nigra, Fuchf. Lon. Hedera corymbosa communis, Lob. Tab. Ger. Hedera major, Cast. Hedera arborea, C.B.1. Germ. Eppheio/ Eppich.

Est { Arborea. Hac usualis & jam nominata.
Major sterilis.
Minor.

Adhæret muris, arboribus, aliisque rebus in altum exurgentibus. Viret per totum annum: Floret autumnò, baccas fert hyeme.

OFFICIN. NAT.

Folia, Bacca, Lachryma seu Gummi.

Vires. Herba calf. & sic. (Galeno est mixta natura, calfac. scil. & frigida) subastringit. Internus ejus usus, quia capiti nervosoque generi adversatur, rarus est. Externus crebrior in acheribus exiccandis & sanandis, in fonticulis ab

inflammatione tutandis (imponitur quotidie folium) in Ozani curandis, in aurium purulentarum dolore sedando (miscetur succus cum ol. e.g. liliaceo.

Bacca. Purgant per superiora & inferiora, unde & contra febres à vulgo exhiberi solent.

Gummi seu lachryma ex trunco hederae majoris vulnerato & interdum sponte exit, colore ex flavo rubescens, odore grave, sapore ac. e. Psyllothrūm à majoribus habetur infigne ac causticum, lentesq; interimere dicitur.

N. Nostratibus in usu non est, quippe gummi hederae officinarum nec figura nec viribus descriptio gummi convenit. Purpureo nigricans est (adeoque Mumia non absimile) fragile nec saporis acris, sed velut adusti, lignosis segmentis ac sordibus plerumq; scatens.

PRÆPARATA.

Ol. stillat. Ex baccis cum ∇ fermentatis per Vesicam.

N. Alij lignum, baccas ac gummi simul per Retortam destillando, oleum parant.

CLXIV. Helenium.

N. Dicitur Helenium, quod è lachryma Helena natum dicatur.

Ελινιον, Elenion. Trag. Helenium, Brunf. Matthiol. Dod. Cord. in D. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. Enula, Lon. Enula Campana, Brunf. Cam. Helenium vulgare. Alantwurk.

N. Crescit plerumque locis humidis: Floret Julio.

OFFI-

CLASSIS I.

OFFICIN. NAT.

Radix, quæ collecta, antequam in stolones abierit, in taleolas secatur, inq; umbra exiccatur.

Vires. Nonnullis calfac. & sicc. 2. (*Fernelia calf. 3. sicc. 1.*) abstergit, discutit, aperit, pulmonica est, stomachica, alexipharmaca, sudorifera, &c. *Usus* principalis, in tartaro pulmonum renumque attenuando ac educendo, & hinc in tussi, asthmate, in cruditiatibus ventriculi emendandis, ureteribus referandis, in peste, contagiosisq; morbis arcendis, in scabie, &c.

PRÆPAR.

1. *Radix condita*.
2. ▽. *Ex radice destill.*
3. *Conserva Radicis*.
4. *Extract. Ex Rad.*
5. *Vinum Enulatum*. Ex Radice & musto.

CLXV. Herniaria.

Dicitur *Herniaria*, *Dod. Cam. Tab. Ger.* *Herniaria multigrana serpillifolia*, *Lob. Herba Turca*, *Lob. Polygoni genus*, *Herniaria appellata*, *Clus. hist.* *Millegrana*, *Cord. hist.* *Herba cancri minor*, *Cord. Polygonum minus*, *Cast. Matth. Empetrum*, *Trag. Lon. Polygonum minus seu millegrana major*, *C.B. 11.* (videl. inter *Polygoni* minores species.) *Germ. Harn-Kraut/ Zausent-Rörner*.

Crescit locis aridis ac tenosis, nonnunquam tamen & circa ripas: floret Junio, Julio.

OFFICIN. NAT.

Herba seu planta integra.

Vires. *Refrig. & sicc.* *Usus* principalis est in *Hernia curanda*, *urina cienda*, *renum ac vesica calculo atterendo*, *ventriculi ac aliarum partium mucilagine incidenda*, *educenda*, *bile ac aqua expellenda*, adeoque in *letero curando*.

PRÆPARATA.

▽. *Stillat.* Ex herba.

CLXVI. Hispidula.

Æluropus, *pes Cati*, *pilosella*, *montana hispida*, *C. B. 5. Ragen-Tuss.* Est species *pilosella*, (aliis *Gnaphalii*) parva admodum, totaque ferè tomentosa, maximè verò floriculi, quos profert rubentes, interdum albidos. *Videatur Renodans*.

Nascitur in collibus ac locis siccis & apricis: floret Majo, Junio.

OFFICIN. NAT.

Tota Herba cum floribus.

Vires. *Eisdem vires obtinet quas reliqua pilosella genera*, vide *auriculam muris*: peculiari tamen proprietate *pulmonum exulcerationi conferre statuitur*, & *sanguinis expulsiōni*.

PRÆPAR.

1. ▽. *Ex integra planta cum floribus*.
2. *Syrupus simpl.* Vide *Venodæum*.
3. *Compositus de pede Cati.*

Videl. 2.

N. Nostratibus Syrupus hic compositus vulgarissimus est.

LII II

CLXVII.

CLXVII Hordeum.

Gerſte ſhyemale. Hoc præſtantius.
eſt æſtivum.

Videatur Hordeum, Brunſ. Matth.
Lob. Dod. Lon. Caſt. Ger. hordeum ma-
jus, Trag. Hordeum polychiſtichū, Fuchſ.
Tab. Hordeum ſecundum hyemale,
Cord. in D. Hordeum polychiſtichum hy-
bernum, C. B. 1.

OFFICIN. NAT.

Semen & Farina.

Vires. Refrig. & ſicc. 1. abſterg. aperit,
dig. emol. eſt diureticum nutritivum.

N. Crudum ventriculo aliquatenus
inimicum eſt, quippe ſtatalentum: tamen
coctione corrigitur.

PRÆPARATA.

1. ▽. Hordei graminis. Fit menſe
Majo, colligiturque mane gramen rore
adhuc madidum.

N. Inſignis eſt efficacia in aſtu doman-
do, extrinſecus in Cephalalgia mitigan-
da, oculorum deſtillationibus calidis emen-
dandis, &c.

2. Decoctum hordei, ſeu ▽ decoctionis
hordei, Gerſten-Waſſer.

N. Ad decoctum hordei ſumitur hor-
deum non excorticatum, ſi intentio ſit ab-
ſtergere, exiccare: Excorticatum ſin ani-
mus ſit digerere, ſitimque extinguere, &c.
Formula decoctionum uſitatiffima, mulie-
ribusque notiffima ſunt.

CLXVIII. Horminum.

Sclarea ſhortenſe odoriferum.
Eſt ar-
leyen/ ſylveſtre.

Ex his officinale, quod Gallitri-
cum, Cam. Ger. Gallitrichum ſativum,
Trag. Sclarea, Maub. Caſt. Cam. Tab.
Sclarea. Lob. Horminum ſylv. 1. Cluſ.
biſt. Orminum ſativum, Fuchſ. Cord. in
D. Orvala Dod. Caſt. Horminum ſcla-
rea dictum, C. B. 3.

Floret Junio, Julio, ſolo gaudet opi-
mo.

OFFICIN. NATIVA.

Folia cum floribus, ſed raro.

Vires. Calſ. & ſicc. abſtergit, attenuat:
Uſus rari, niſi quod in vino cum floribus
ſambuci & vitis ſuſpendi ſoleat.

CLXIX. Hyoſciamus.

Jusquiamus, Faba ſuilla. Herba ca-
nicularis, Dens caballinus, Wiſſen-
kraut/ Wiſſen/ Doll- Kraut/ Schlaſſ-
kraut/ Säu- Bon/ Rinds- Wurk/
Ziegeuner kraut.

ſ vulgaris vel niger, C. B. 1.

Eſt { albus { major, C. B. 2.
 { minor.

Ex his eligere monet Fernellius flori-
bus albis, ſemineque albo, reliquis ne-
glectis.

Inſignitur Hyoſcyamus albus, Matth.
Dod. Lob. Lon. Caſt. Cam. Ger. Tab. Hy-
oſc. candidus, Trag. Apollinaris 3. Cord.
in D. Hyoſcyamus albus major vel 3.
Dioſcoridis, C. B. 2.

Creſcit incultus: floret Junio & Ju-
lio.

OFFICIN. NAT.

Radix, Semen, Folia.

Vires. Refrig. 3. ſicc. 1. emollit mirè
ſomnum inducit, ſtupeſcit, acrimoniam
miti-

mitigat, rationem perturbat. Unde internum ejus usus rarissimus est. exhibetur tamen ad hamoptysin curandum. Externus aliquatenus crebrior, scilicet in tumoribus calidis, in podagra, in odontalgia (suscipitur fumus seminis per insundibulum).

N. 1. Trallianus amuletum antipodagricum ex radice facit: colligit eandem ☾ existente in ♊ ☿ ☿ ante ☉ occisum, radicem non attingendo, sed osse cuiuscunque animantis mortui effodiendo, peculiarique insuper adjurationis verba superaddit, quae cum superstitiosa videntur, adscribere super sedeo. Videatur Trahian. l. 11. in fine.

N. 2. Antidota Hyoscyami sunt: lac caprinum, ☿ muisa, semen cucurbitae sem. Urtica, Sinapi, Raphanus, Capa, allium cum vino assumpta.

PRÆPARATA.

1. ☿. Ex fol. floribus ac semine immaturato destill.

2. ☿ expressum. Ex semine albo recente, sicco, calida ☿ a asperso, in solatito tritoque.

N. Alii macerant Hyoscyamum cum semine suo immaturo in Omphacino: hinc exprimunt ☿ coquunt.

3. Extractum seu succus Hyoscyami. Ex radice mense Septembri vel Martio cum germinibus tenellis exprimitur succus, depuratur ac digeritur, ut rubicundo colore tingatur.

N. Ingreditur landanum opiatum. Quercet.

CLXX. Hypericum.

☿ reginò, Hypericum, Brunf. Matth. Fuchf. Lon. Dod. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. Herba perforata & Hypericum, Trag. Ascyron, Cord. in D. Androsimum minus, Genesf. Hyperic. vulgare, C.B. 1. aliis fuga Dæmonum, Johanne Fraut.

Crescit passim in dumetis, aliisq; locis incultis: Floret Julio.

Folia ac Flores.

Vires. Calf. ☿ sicc. est partium tenuium, diureticum ac vulnerarium. Usus præcipui in vulneribus mundificandis, consolidandis (intus & exius) in sanguine coagulato resolvendo, in calculo renum auferendo, in Lumbricis fugandis (scil. si tempore exaltationis collecta fuerint, aliàs hac facultate destituitur) Extrinsec. in contusionibus (præcipue nervorum) in tremore, in partu allevando (sic suffusus.)

N. Paracelsus refert inter herbas veneficia ac spectra arcentes; colligereque jubet sibi influentia ☿, Stann. ac ☿ ris (nullo modo sub ☾) tempore auroræ, atque varium ejus usum docet, loco amuleti adhibet, pileo includit, noctu pulvinari supponit, sapius naribus admoveet, sternit per domum, de parietibus suspendit, &c.

PRÆPARATA.

1. ☿ stillat. Ex fol. ac flor. in fine Junii collectis.

2. Oleum. Ex infusione florum in oleo communi.

LIII 2

N.

N. *Alij summitates cum flor. ad maturitatem seminis ferè accedentes macerant cum vino exprimunt, atque cum Therebinthina & oleo coquunt.* Vide Disp. August.

3. *Sal. com.* Ex planta, integra incinerata.

4. *Tinctura.* Hanc habet Tentzel. in Exeg. Sala de Essentiis. V. l. 2.

N. *Dof. gr. vj. ad ʒʒ.*

CLXXI. *Hyssopus.*

ῥάσωνος. *Hyssopum, Hsop/Hsphen.*

Est { *Hortensis, Hac officinarum.*
Sylvestris.

Vocatur *Hyssopus*, *Brunf. Trag. Cord. in D. Lon. Tab. Cam.* *Hyssopus hortensis, Fuchf. Hyss. vulgaris, Dod. Clus. lativa, Cord. hist.* *Hyssopus Arabum, Lob. Ger. Hyssopus officinar. cærulea sive spicata, C. B. 1.*

Crescit in hortis: floret Jul. & Aug.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus collecta Aug.

Vires. Calf. & sicc. 3. partium tenuium est autem. aperit, absterg. *Usus* *præcipuus in effectibus pulmonum tartareis, tussi, asthmate.* *Extrinsecus adhibetur crebrò ad sugillationes oculorum, ad uterum mundificandum, auriumque tinnitus tollendos (per tritorium suffitus susceptus) adoris absterfionem (in gargari-smis)*

N. *Sunt qui Absynthio in corroborazione ventriculi præferunt.*

PRÆPAR.

1. *∇. stillat.* Ex herba & floribus in MB.

2. *Ol. stillat.*

3. *Conserv.* Ex floribus.

4. *Spec. Diabyssopt.* Nic. Vid. D.

5. *Syrup. simplex.* Ex succo.

6. *Compos.* Vid. Disp.

1.

CLXXII. *Jacea.*

Herba Trinitatis, Brunf. Fuchf. Lon. fativa, Trag. jacea sive flos Trinitatis. Matth. jacea major sive viola tricolor, Cast. Dod. Clus. Ger. Viola flammea, Coloria, Lob. Viola Trinitatis 1. Tab. Viola tricolor hortensis, C. B. 5. inter violas Martias, Germ. Freysam Kraut/Dreysaltigkeit-Blum/Siebenfarben-Blum/Unnütze Sorge/je länger je lieber.

Floret Aprili, Majo ac totà ferè æstate: crescit locis arenosis.

Colitur in hortis, crescit & in agris. Illa licet præferatur: atramen non licet non recipere & sylvestrem.

OFFICIN. NATIVA.

Herba integra cum floribus.

Vires. Calf. & sicc. ad gr. 3. usque 3. (aliis remissius) subamara ac acris est: hinc abstergit, penetrat, incidit, discutit, vulneraria est ac sudorifica. Usus præcip. in astu (maximè infantum) domando, in scabie ac pruritu, in mucilagine viscosa pulmonum, in uteri obstructione. Extrinsecus itidem in pruritu, in abstergendis vulneribus, in mucilagine pulmonum incidenda, in uteri obstructione. (balm.)

Præ-

PRÆPARAT.

▽. Ex integra herba.

CLXXIII. *Jasminum*.

Язювор, Jofmenum, Jefeminum, Gel-
feminum, Arab. Zambach, Jefemin, Ja-
fme. Weiföl. Neben.

Ufuale est, *Jasminum* vulgatius flore
albo, C. B. 1. quod est *Jasminum*, Dod.
(cui & *Apiaria*.) Cord in D. album, Tab.
Ger. Gelfeminum vel *Jasminum*, Matt.
Cast Cam. Alpin.

Gaudet locis calidis ac apricis. No-
stratibus colitur in hortis: floret ferè in-
tegram æstatem.

OFFICIN. NAT.

Soli flores, sed rarò. Nimirum no-
stratibus non nisi *Oleum* in usu est, quod fit
ex reiteratâ infusione vel coctione flo-
rum in oleo veteri. (N. Aliis in oleo a-
mygd. dulc.)

Vires. Easdem ferè vires obtinet,
quas *chamamelinum*. Dig. calf. emoll.
aper. Usus præcipuus internus ad ute-
rum calefaciendum & laxandum, ejus
scirrhum sanandum, ad partum facili-
tandum, ad tussim anhelitusq; difficulta-
tem, ad plenitudo, dolores stomachi, intesti-
norum, uteri, (oleum *Jasmino* amygd.)
Externus in catarrhis frigidis, in mem-
bris ac articulis resolutis, in dolore pleuri-
tico, colico ac uterino (in clismate vel un-
guentis.)

N. Sunt inter mulieres, quæ oleo *Ja-
smino amygdalino* capillos pectunt, ut eo
feliciter crescant. Verùm caveant ab eo
biliosa, ut potè quæ facile capitis dolorem
illo sibi conciliare possunt.

CLXXIV. *Imperatoria*.

Ostrucium, Lon. Ostrucium, Astruti-
um, Astrentium, Astrantia, Brunf. Dod.
Clus. hist. Magistrantia, Cam. Struthium,
Cord. hist. Laserpitium Germanicum,
Fuchf. Smyrnion hortense, Trag. Impe-
ratoria, Matth. Lob. Cast. Tab. Ger. Im-
peratoria major, C. B. 1. Weistertwurk/
Magistrant/Oftrik.

Floret Augusto, colitur in hortis.

OFFICIN. NAT.

Solaradix.

Vires. Saporis est acerrimi: calf. &
sicc. 3. alexipharmaca ac sudorifera est.
atten. aperit. Usus præcip. in venenatis
morbis ac iclibus, in pulmonum tartaro
resolvendo, expectorando, in fœtore anhe-
litus corrigendo, in capitis affectibus pble-
gmaticis, paralyfi, Apoplexia &c. in cru-
diatæ ventriculi, & colico dolore, in febris
quartana. Extrinsec. in Odontalgia (gar-
garisf.) in catarrhis exiccandis (suffitu) in
tumoribus ac arthritide frigida. In scabie
capitis exiccanda (lotione) in serpigine in-
veterata sananda (cum adipe suillo illi-
ta) in globulis sagittisve corpori extrahen-
dis (imposita.)

PRÆPAR.

▽. stillat. Ex herba florescente col-
lectâ Julio.

CLXXV. *Iris Nostras*.

Iris. Benel. Wurk/Dimmelschwer-
tel/blatw Gilgen.

Iris in offi-
cinis usi-
tata est. { Hæc hujus lo-
ci.
Peregrina Illyrica scil. &
Florentina. vid. infra.

E variis Iridis nostratis speciebus infertur solum in officinas Iris vulgaris Germanica seu sylvestris, (latifolia.) C. B. 1. Quæ inscribitur, Iris, Brunf. Sylvestris, Matth. Cord. h. Cast. Tab. sylvest. 1. Lob. sylv. major, Matth. Epit. Iris Germanica, Fuchf. cœrulea, Dod. gladiolus cœruleus major, Trag. Iris latifolia major vulgaris, Clus. hist.

Floret tempore verno, Aprili scilicet & Majo.

OFFICIN. NAT.

Radix, colligenda verè antequam germinare ceperit.

Vires. Calf. sicc. 3. valde hydragoga est, ac errhina. Usus præcip. in hydropicor. aqua educenda. Extrinsecus in impetiginibus, aliisque corporis maculis detergendis.

N. Ventriculo reliquisque visceribus insensa est, proin corrigitur stomachicis.

PRÆPARATA.

1. Succus. Exprimatur ex radice, depuratur (digestione) adhibeturque recens pro hydragogo.

Dosis ʒj. ad ʒiij.

N. Infusatur nonnunquam, reservaturque pro Errhinis.

2. Fecula Fit ex succo l. a.

N. Non aquè purgat ac ipsa met radix.

3. Oleum infusum. Vide Disp.

CLXXVI. Iris illyrica.

ac Florentina.

Prævalet Illyrica, sequitur Florentina; utriusque itidem sola radix in usu est. Germ. Violwurk.

Vires. Calf. & sicc. 2. incidit, attenuat, expectorat, diger. absterg. emolli. Usus præcip. in mucilagine seu tartaro pulmonum, tussi, asthma, obstructione mensium, torminibus ventris infantum. Extrinsecus abstergit cutis maculas & lentiginis (cum Elleboro & melle mixta) oris fetorem emendat: celeberrimus usus modernis est in pulveribus, qui capillis insperguntur. Vulgus vocat pulveres de Cypro.

PRÆPAR.

1. Extractum.

2. Spec. Diareos simpl. V. D.

3. Salomon. V. D.

CLXXVII. Juglans.

E Juglandum generibus usualior est, quæ dicitur nux regia, Brunf. Cord. in D. Nux juglans, Trag. Matth. Lon. Dod. Lob. Cast. Tab. Cam. Juglans, Fuchf. Nux juglans seu regia vulgaris, C. B. 1. Nußbaum / Welsche Nuß.

Juli & folia erumpunt Martio: nuces maturescunt autumno.

OFFICIN. NAT.

Nuces, Putamina nucum externa, ea quæ viridia, Cortex internus ipsius arboris, Cortex interior nucleum ambiens, Iuli ante oculos apperentes & decidentis.

Vires. Nuces recentes calf. 1. sicc. 2. sicca sunt facultatis calidioris ac siccioris. Comesta difficilis sunt digestionis, pauci nutrimenti; ventriculo insensa, bilem augent, cephalalgiam excitant, pulmonum affectus ac præcipuè tussim exasperant.

asperant. Dicuntur tamen à peste præferre.

Putamina externa viridia, vi vomitum leviter movendi prædita sunt.

Cortex interior, de arbore decerptus, dum adhuc succolentus est, siccatuſq; ciet vomitum sat validè.

Dosis à ʒʒ. ad ʒj.

Cortex nucleum ambiens juvat colicos (potus.)

Juli itidem vomitum excitant, sed lenius. Usus præcipuus in colico nephriticoque dolore; sistunt & diarrhaam, exhibiti.

PRÆPARATA.

1. *Nuces conditæ.* R. Nuces virides circa Festum Joannis collectas, perfora aliquoties, ut penetrabilia putamina sunt, ac macera (♂ 7. vel 10. in ∇ frigida, ∇ quotidie semel acriter permutando, ut aliquo modo dulcescant. Hinc coq. l. Δ ut mollescere incipiant. Postea sicca & confige Cinam. Garyophil. &c. atque cum saccharo vel melle coque ad consistentiam. Videl. 2. Confortant stomachum, juvantque digestionem, unde & bellariorum loco apponi solent. Specificè eas cieri menses, testis est Matthiolus.

2. ∇ *Vomitiva ex nucibus.* Videl. 2. cap. 38.

N. Alij destillant ∇m ex nucibus immaturis contusis, alij ex solis putaminibus viridibus.

3. *Succus* mense Februario è radicibus perforatis destillans.

Vires. Podagricos dolores ad miraculum lenire dicitur, illius.

4. *Rob. nucum:* Diacaryon. Fit ex corticum viridium succo & mellis $\frac{1}{2}$.

Vires. Destillationi tenuium catarthorum confert. Vide Disp.

5. *Oleum.* Fit expressione ex nucleis maturis.

Vires. Flatu potenter dissipat, adeoq; in colico dolore multum fert auxilij.

Dosis ʒij iij ad jv. &c.

Extrinsecus tumores discutit, contractos nervos emollit, scabiem antiquam sanat.

6. *Electuarium.* Vid. l. 2.

N. *Varia* Electuarij nucum inveniuntur descriptiones, qua tamen Basin minime à nucibus participant, unde nec hujus loci sunt.

CLXXVIII Jujubæ.

Zizyphæ, Jujubæ majores oblongæ, C. B. Jujubæ, Trag. Cord. hist. Lon. Tab. Jujubæ Arabum, Lob. Zizypha, Maub. Cast. Zizyphus, Dod. Clus. hist. Zizyphus rubra, Cam. Brust. Beerlein. Fructus sunt arboris Zizyphi, magnitudine Olivas, sapore passulas majores æmulantes, unicum referentes lapideum nucleum.

Asportantur ex Italia.

Vires. Moderatè calf. & humect. Uſus præcip. in pulmonum asperitate, inſſi, pleuritide, urina acri, fervescencia sanguinis, erosione renum ac vesica.

PRÆPARATA.

Syr. de Jujubis. Vid. Disp.

CLXXIX.

CLXXIX. *Juniperus.*

Agreudic, Agreut & Juniperus, Brun-
felf. Matth. Dod. Lon. Lob. nostras Cam.
vulgaris, Trag. Clus. hist. Minor. Euchs.
Cord. in D. Sylvest. Cast. Juniperus &
Juniperus baccifera, Tab. Juniperus
vulgaris fructuosa, C.B. 1. Germ. Beck-
holder / Wachholder / Wachholder-
Baum / Kramet-Baum.

OFFICIN. NAT.

Lignum, Bacca, Gummi, Fungus.

Vires. Lignum calidum ac siccum est
3. suave olet (præcipue si Martio mense
cadatur,) unde & rasura ejus non sine
causa in cucuphis adhibetur, quippe ce-
phalicum est, nervosumq; genus insigniter
roborat.

Baccæ, Calf. 3. sicc. 2. discut. incid.
atten. Usus præcipui, in cienda urina,
sudore, obstructis mensibus, obstructo lie-
ne, in affectibus capitis, nervorum, pe-
ctoris (tussi) in morbis à flatu (ut colica.)
in mucilagine renum & vesicæ, &c.
Suffusus usitatissimus est tempore pestis,
tum è baccis, tum è ramusculis suscitatus.
Colliguntur bacca Sole in virgine existen-
te.

Gummi, (Arab. Sandaraca vernix)
fructuener Firnis / calf. & sicc. 1. (alijs 2.)
condens. discut. Usus præcipui in nervo-
*rum affectibus, resolutione, frigidi-
 tate, contractura, &c. convenit & in capitis*
*affectibus reliquis, à frigidi-
 tate subortis.*

N. 1. Vernix liquidus, facilius est li-
quor, ex gummi hoc, i. e. Sandaracha in
oleo lini soluta. Valet ad ambusta, lenit
dolores præcipue hæmorrhoidum.

N. 1. Sandarcha Gracorum est Auri-
pigmentum,

Fungus. Majo mense instar musci ad-
nascitur. Inservit aqua ophthalmica.

PRÆPARATA.

1. ∇. Ex baccis sine præmissa fer-
mentatione raro destillatur.

2. Spiritus. Fit ex baccis cum ∇.
(& p. 4. 5.) fermentatis & per vesicam
destillatis. Vide l. 2.

N. Alij loco ∇ a sumunt cerevisiam,
spiritusque copiam sibi persuadent majo-
rem: verum enimvero major illius pars
cerevisie debetur.

3. Oleum ex baccis. In destillatione
∇ a spiritus simul extillat.

4. Oleum ex ligno. Fit per descen-
sum vel retortam. Applicatur extrin-
secus in morbis, ut supra diximus, ner-
vinis.

N. Melius elicitur per vesicam, extil-
latque clarum.

5. Sal. Ex cineribus baccarum elici-
tur, tum quoque ex ligno combusto.

6. Rob. Juniperinum. Mel Juniperi-
num, Theriaca Germanorum. Fit co-
ctione cum ∇, hinc expressione ac in-
spissatione.

N. Quercetanus macerat ac coquit
cum vino. Ph. Rest. c. 23.

7. Extract. gummosum. Ex ligno &
cortice fit l. a. Quercetan. Ph. Rest.
cap. 23.

8. Extract. è baccis siccis. Fit.
cum ∇ vel cum ∇, i. e. Spiritu Junipe-
ri.

Dosis ℥j. ℥ij.

Vires.

CLASSIS I.

Vires. *Utrumque Extractum excellens est sudorificum & Bezoarticum adversus Epilepsias, pestes & affectus alios contagiosos atq. venenatos.*

9, *Elyxir Juniperinum.* Bz. Baccar. Juniper. maturat. ac electar. q. v. contundantur crasse, digeranturque affusa aliqua ∇ diuretica. Hinc exprime, abstrahendoque inspissa ad consistentiam mellis. Hujus mellis Juniperi cochl. 10. 11. 12. &c. misce optimè cum ∇ a vitæ Juniperina, digereque aliquamdiu, lenissimo calore (Olis, & sim.) sic confecisti Elyxir Juniperinum admirandarum virium, in calculo, quod

insuper stomachicum insigne est, aliasque facultates eximias obtinet, de quibus in baccis.

Dosis cochl. j.

N. Vir Generosus ac Nobilissimus Dn. Chun. Quirinus Schûke ab Holzhause / Illustriss. Aula Darmstadina olim Mareschallus, vir in omni scibiti solertissimus, jam morte immatura non sine plurimorum querela, ereptus, creberrimo Elyxris hujus usu annos plurimos à calculi injuriis, quibus alias obnoxius maxime fuit, liber vixit, eoque nomine id mecum communicavit.

L.

CLXXX. Lactuca.

Lactuca, { vulgaris }
 { Hortensis } capitata } Usuales sunt promiscuè.
Lattich / { crispa }
 est { Sylvestris. }

N. Nomen Lactuca Botanicis omnibus usuale est.

Solo gaudet pingui & stercorato. Floret æstivo tempore.

OFFICIN. NATIVA.

Folia ac Semen.

Vires. Refrig. ad gradum usque 3. siccat mitius, conciliat somnum, bilis fervescentiam ac æstum compescit, lac auget, alvum leniter movet, ventriculo convenit, multi ac laudabilis nutrimenti est, unde & in acetariis usurpari crebrius solet. Extrinsecus sedat dolorem capitis, medetur ambussu, somnum conciliat (in lotionibus pedum, &c.

Semen. Est ex seminibus frigidis famosis illis, quæ minora dicuntur. Valeat ad Gonorrhæam virulentam ad urine ardorem ut & ad reliqua quibus folia convenire diximus.

PRÆPARATA.

1. ∇ . Ex Foliiis.
2. Succus inspissatus.
3. Caules conducti. Fiunt è stolonibus nostratis lactuc. dum caulescunt.

CLXXXI. Lagopus.

E generibus Lagopi usitatus est, quod inscribitur $\lambda\alpha\gamma\acute{o}\pi\epsilon\varsigma$, Dioscorid. Plin. $\lambda\alpha\gamma\acute{o}\pi\alpha\gamma\omicron\varsigma$ Hippocr. Lagopus seu Mmm mm pes

pes leporinus, *Math. Fuchf. Dod. Lob.*
(cui & lagopyron.) *Lag. major, Cast. mi-*
nor, Cam. Lagopodium, Tab. Ger. Le-
por. pes, Cord. in D. aliis trifolium lepo-
rinum, Germ. Hasen-Klee / Hasenpö-
lin / Hasen-Klee.

Crescit inter segetes. Viget Julio
potissimum.

OFFICIN. NATIVA.

Herba cum Spicis.

Vires. Sicc. & adstring. usus precip.
in profluvio alvi, uteri (fluore albo) in
dysenteria, hamoptoisi, stranguria, ulce-
ratione vesicae, &c. Extrinsic. in hamor-
rhagia hemorrhoidum, vulnere, in tu-
moribus inguinum & herniis, &c. Quin
& ad cutim Solis ardore induratum leni-
endam adhibetur (lotione.)

CLXXXII. Lapathum.

Acetosum. Vide Acetosam.
Hortense. Vide Spinachiam.
Est vel Sylvestre { Augustifol. De quo hic.
 { Latifol. Vid. Rhabarb. Monachorum.
Aquaticum.

Dicitur Rumex acutus, *Cord. in D.*
Oxylapathum, Fuchf. Matt. Cast. Germ.
Oxylapathum, Dioscor. Lapathum a-
cutum, Trag. Lob. Dod. Lapathum sati-
vum, Cam. Lapathum seu Rumex, Lon.
Cast. Lapathum folio acuto plano, C.
B. 1. Germ. Mengel-Wurk / Grind-
Wurk / Streiff-Wurk / Buben-
Kraut / wilder Mangolt / wilder Am-
pfer / Lenden-Kraut.

Provenit in locis incultis: floret Ma-
jo ac Julio.

Radix ac Semen sed raro.

Vires. *Lapathum temperata cense-*
tur natura in aëlivis, aliàs ad siccitatem
inclinat. Semen alvum obstruit: Folia
subducunt: Radix usus crebri & preci-
pui est in scabie extergenda ac siccanda,
idque extrinsecus, potissimum in lotioni-
bns.

PRÆPARATA.

▽. stillat. Exradice.

Vires. Commendatur maximopere ad
cutis maculas & pustulas albos, junthos,
vitilignes & lichenas.

CLXXXIII. Larix seu Larex.

Adg. Larix, Brunf. Matt. Dod. Fuchf.
Lon. Lob. Cast. Clus. hist. Tab. Ger. Cam.
German. Lerchen-Baum / Lerchen-
Dannen.

Gaudet montanis, unde & in Helve-
tia ac territorio Tridentino vulgaris est,
viget ac floret Vere.

OFFICIN. NAT.

Resina & Fungus trunco adnatus A-
garicum dictus. Vide infra.

Resina sinit ex arbore ad medullam
usque perforata, venditurque titulo Te-
rebinthina vulgaris. De hac vide infra
Terebinthina.

CLXXXIX.

CLXXXIV. *Laurus*.

Δάφνη, Lorbeer-Baum.

Est { *Latifolia. Hac usua-*
lis.
Hortensis. Augustifolia vulgaris.
Sylvestris. Hac priori substitui po-
test.

Dicitur (latifolia) *Laurus* latiore folio, *Matth. Cast. L. Latifolia, Cord. in D. L. Latifolia mas, Tab. Laurus latifolia, πλατυτέρα, Dioscor. C. B. 1. Angustifolia dicitur Laurus, Brunfels. Trag. Lob. Laurus tenuifol. Matthiol. Cord. in D. Cast. Cam. Lauri altera species, Dod. Laurus mas, Tab. & Ger. vulgaris, C. B. 2.*

Crescit sat copiosè in Italia; apud nos non nisi in hortis colitur.

OFFICIN. NAT.

Folia & Bacca.

Vires. *Calf. & sicc. 3.* (bacca paulò calidiores sunt) emolliunt, resolvunt. *U-*
sus precip. (baccarum) in mensibus & u-
rinis sciendis, in affectibus nervorum, pa-
ralyse, in colica, in dolore post partum in
cruditatibus ventriculi. Extrinsecus con-
ferunt folia ad ictus vesparum, molliunt
tumores, promovent menses (in suffitu ac
balneo) leniunt dolores, odontalgiamque
mitigant (gargar.)

PRÆPARATA.

1. *Electuar. de baccis lauri. V. D.*
2. *Emplastr. de baccis. V. D.*
3. *Oleum laurinum. Vel ex baccis recentibus exprimitur, vel coquendo elicitur, August.*

4. *Oleum stillat. ꝑ. Bacc. lb. ij. con-*
tus superfunde ꝑa tepida lb. iij. vel
iv. Postquam aliquamdiu steterint,
destilla per XX vel vesicam. Sic prod-
bit oleum ac ꝑ per tritorium separan-
da.

Vires. *Oleum hoc stillat. discutit in-*
signiter flatus ac ventositates, præcipuè in
spasmo gravidarum, ut & in colica; si-
derata membra illien restituit, auribus
indurum dolores compescit, auditumque
confortat, delet impetigines, lenigines &
quascunque faciei maculas. Deniq; icho-
rosos capitis ulceribus medetur. phthiriasin
& tineas curat.

Dosis gr. ij. iij. jv. Videatur Tentzel. in Exeg.

5. *Spiritus. Fit ex baccis cum ꝑ fer-*
mentatis.

6. *Essentia. Fit ex baccis quæ in spi-*
ritu infusa, vires suas eidem communi-
cant.

CLXXXV. *Lens palustris*.

Lenticula lacustris, aquatica, Lenti-
 ticula aquatica, *Brunf. Palustris, Matth.*
Cord. in D. Lob. Ger. Dod. Lenticula pa-
lustris vulgaris, C. B. 2. Germ. Wasser-
Linsen.

OFFICIN. NAT.

Folia aquis supernatantia.

Vires. *Refrig. humect. 2. Usus præci-*
pui ad extinguendas inflammationes a-
stusq; sanguinis. Extrinsecus ad scabiem
etiam malignam.

CLXXXVI. *Lentiscus*.

Exiv & Dioscor. Lentiscus, Matth.
M m m m 2. Dod.

Dod. Lon. Clus. Lob. Cas. Cast. Germ. Mastix-Baum. Arboreit baccifera, in Italia, Gallia Narbonensi & præcipue in Insula Chio copiose nascens.

N. Bellon. lib. 2. observ. cap. 8. Solas Lentiscos in Chio Insula Mastichen proferre asserit, cui experientia reclamatur: Nimirum ex donatione Affinis mei dilecti D. Ioh. Glaferi, Pharmacopai huius Reipub. solertissimi, frustulum obtineo mastiche ditissimum, quod sibi ex Helvetiis alpibus transmissum fuisse asserit.

Exhibet officinis Gummi resinam Mastichen dictam, quam vide infra. Ex ligno fiunt vulgariter dentiscalpia, quæ reliquis laudem præripiunt.

N. Hippocrates adhibet & baccas, quas *xidac* appellat.

N. 2. Exprimitur & oleum ex baccis, Clus. in hist. Verum nobis vulgare non est.

CLXXXVII. Levisticum.

Ligusticum vulgare, C. B. 7. (inter Libanotides,) Laserpitium Europæum Germanicum, Levisticum, Brunf. Lob. vulgare, Matth. Dod. Ligusticum, Brunf. Cord. in D. Lon. Tab. fativum, Trag. Cord. hist. vulgare. Cam Lybisticeum vulgare, Fuchf. Icon. Laserpitium, Ger. Smyrnium, Fuchf. alias Hippofelinum, Germ. Lieb. Stöckel.

N. Est & Ligusticum verum. Vid. Sefeli offic. Est in idem Laserpitium aliud Dioscoridis, ex quo Laser. Gummi moderis incognitum.

Floret in primis Julio mense, gaudet solo umbroso.

OFFICIN. NAT.

Folia, Radix, Semen.

Vires. Calf. & succ. 3. incid. aper. alexipharmacum est ac diureticum, vulnerariumque ventriculum roborat, asthmatisque mensis & lochia ciet, fetum mortuum ejicit, (semen) tartarum lentum resolvit, doloresque inde natos sedat, Epatis, Lienisque obstructions refert, adeoque præcipue liero convenit. Extrinsecus usus ejus celeberrimus est in balneis, cataplasmatibus (ntero & ureteribus dicatis) in emplastris vulnerariis & simil.

N. 1. Vulgus per caulem cavum potum haurire suevit, quo tussim sedatum iri sibi persuadet.

N. 2. Radicem effossam, dum in V intrat amuleti loco appendunt in atrophia. Fel. Wurk.

PRÆPAR.

1. ∇ stillat. Ex integra herba cum rad. ac flor. mense Julio collectis.

2. Oleum stillat. Cum ∇ ascendit.

3. Sal. Ex cinere.

CLXXXVIII. Lichen.

Lichen petraeus, Lichen saxatilis, Muscus saxatilis, Hepatica, Brunf. Lob. Lon. Tab. hepatica saxatilis, fontana, C. B. 1. Jecoraria seu hepatica fontana, Trag. Lichen. Matth. Fuchf. Dod. Cord. in D. Cast. Lichen i. petraea, Ger. German. Leber-Kraut / Steinleber-Kraut / Stein-Flechten / Moos-Kraut / Brunnen-Kraut.

N. Huic surrogatur muscus arboreus crustaceus. Vide Pulmonaria arborea. Floret

Floret Majo & Junio, floresque fert instar stellarum. Crescit locis udis & umbrosis in puteis, juxta fontes, & similibus.

Vires. Refrig. & sicc. absterg. Epaticain signis est. Usus precip. in Epatis obstructione & vesicis (quorum signaturam in foliis gerit.) Hinc in Hæctica, in Eletero, in scabie & Lichenibus, in gonorrhæa in febre. Extrinsecus sistit sanguinem in vulneribus.

PRÆPAR.

▽. stillat. Fit in fine Maji ac principio Junii.

CLXXXIX. Ligustrum.

κύνος, Ligustrum, Brunf. Matth. Fuchf. Cord. in D. Lob. Cast. Tab. Ger. Ligustrum Germanicum, C. B. i. vulgare, Trag. majus, Lon. Phyllirea, Dod. Arab. Kenne. Germ. Hartriegel/Beinholz/Reintweiden/Mundholz.

Vulgare, quod officinarum & hujus loci.

Est { Myrtifolium }
Foliis laciniatis. } officinis inusitata.
Ægyptiacum latifolium.
Angustifolium.

Crescit passim in sepibus. Floret Majo, Junio.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores.

Vires. Refrig. & sicc. adstring. incid. (Folia efficacius, flores imbecillius) proin-

ducunt ad inflammationes, putredines, exulcerationes oris & faucium, ad procidentiam & tumorem uvæ, laxitatem gingivarum (in collution.) Quin & intrinsecus ad scorbuti curam folia maxime facere compertum est. Adhiberi quoque possunt in profusis sistendis, &c.

PRÆPARATA.

1. ▽ stillat. E floribus.

N. Hæc commendatur præter dictas qualitates ad oculorum inflammationem & rubedinem.

2. Oleum infusum, sed raro.

CXC. Lilium.

Κελύων, Lilium, Germ. Lilien/Gilgen. Liliorum genera diversa sunt, album scil. aureum & cruentum: Officinis tamen usitatus est album, quod insignitur lilium, Brunf. Matth. Cast. Lilium album, Trag. Fuchf. Lon. Tab. Lil. candidum, Cord. in D. Lob. Dod. Lilium album vulgare, Cam. Lilium album flore erecto & vulgare, C. B. i.

Gaudet solo pingui stercore ac umbroso. Floret Junio.

OFFICIN. NAT.

Flores, Radix, Stamina.

Vires. Flores moderate calf. & humect. partium sunt diversarum, & anodynæ, digerunt, maturant.

Radix, absterg. & sicc. i. digerit itidem, emollit, maturat. Usus internus rarus est, externus crebrior, iisque tumoribus maturandis & leniendis, in clavis pedum, &c. sanandis, in pudendis partu-

M m m m 3

rien-

rientium molliendis, in ambustis emendandis, &c.

Stamina exhibentur ad facilitandum partum cum ∇ verberna vel simili.

PRÆPAR.

1. *Conserv.* Flor. alb.
2. ∇ . Ex florum foliis recentibus, iisque tum solis, tum concilis cum radice.

Vires. Usus est crebri in affectibus pulmonum, asthmate, tussi, & simil. Exirins. in facie dealbanda (cum camphora & oleo Tartari.)

3. \odot *Lilium simplex.* Ex florum foliis in ol. olivar. veteri infusis. Vide Disp.

4. \odot *Lilior. compos.* Ex iisdem floribus ac aromatibus. Vid. Disp.

CXCI. *Lilium convallium.*

Lilium convallium album, C. B. 2. Ephemerum non lethale, Fuchf. Gacilia *Lilium convallis* vel sylv. Brunf. *Lilium convallium*, Trag. Matt. Dod. Cast. Tab. Ger. Clus. hist. *Lilium convallium* vel vernum Theophrasti, Lob. Germ. *Mäyenblümlein*.

N. Est & *Lilium convallium* flore rubente, sed minus usitatum.

Gaudet solo humido, nemoroso. Floret initio Maji.

OFFICIN. NAT.

Soli Flores raro Radix.

Vires. Calf. & sic. cephalici sunt. Usus præcipui in morbis capitis frigidis ut Apoplexia, Paralyfi, Vertigine, Epilepsia. Hinc & in Lypothymia. Insigne itidem errhinum exhibent pulverisati.

PRÆPAR.

1. ∇ *simplex.* Ex floribus.
2. *Spiritus Vini liliatus.* Ex floribus cum Vino vel Malvatico destillatis.
3. *Spiritus Lilior.* Ex floribus fermentatis destill.
4. *Conserva.* Ex floribus.
5. *Oleum.* Ex infusione florum recentium in oleo veteri.
6. *Pulvis sternutatorius,* Ex floribus pulverisatis.

N. Sunt qui succum instar olei præparant. Floribus implent vasculum, occluduntq; hinc per mensem in formicarum acervo sepeliunt, ut in succum liquecant. Anodynum hoc censetur in signo antipodagricum, curativumq; serpiginis.

CXCII. *Limonia mala.*

Λιμόνια μάλια, Germ. *Limonien* / *Poma* sunt mali limoniæ, C. B. 1. Videatur malus Limonia, Matth. Dod. Lon. Cast. Tab. Limones, Cord. in D. Bellon. Lob. Clus. hist. Limon. arbor ex citri genere, Cord. hist. Malus Limonia acida, C. B. 1.

Vires. Citri mali virtutes amulantur, nisi quod ut magis acidiuscula sunt, ita & magis refrigerantia ac siccantia. Usus præcip. in febribus aliisque morbis calidis, in calculo, & sim.

PRÆPARATA.

1. *Succus expressus.*
 2. *Syr. de succ. express. & sacchari* $\frac{1}{2}$. Vid. Disp.
 3. ∇ . Ex floribus quæ raro extat.
- N. Sunt qui cortices cum succo clauso vase macerant & postea destillant.

CXCIII.

CXCIII. *Linaria*.

Linariae genera plurima occurrunt, ex his solummodo inservit officinis, *Linaria vulgaris* lutea flore majore, C.B.I. Olyris, *Matth. Cord. in D. Lob. Cast. major* Tabinaria, (& *pseudolinum*), *Brunsf. Ger.i. Dod. Lon. Linaria vulgaris, Trag. Cam. Germ. Leinkraut/wilder Flachs/Hanfskraut.*

Crescit locis incultis & cultis juxta sepes. Floret Junio, Julio ac Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. *Calif. & sic. est diuretica, amarum saporis. Usus prac. in Ictero & obstructo Epate. In urina difficultate, in hydropse. Extrinsecus imponitur abdomini in stranguria; ano, in hemorrhoidum dolore.*

PRÆPARATA.

▽. *stillat. Ex integra planta in fine Maji collecta.*

Lingua Cervina, vide *Scolopendria*.

CXCIV. *Linum*.

Linum sativum, Hoc usual. Flachs/ Sylvestre. Minus usuale.

Dicitur *Linum*, *Brunsf. Matth. Fuchf. Tab. Cord. in D. Lon. Cast. Linum sativum, Trag. Dod. Linum vulgare cœruleum, Lob. Linum sativum, C.B.I.*

OFFICIN. NAT.

Semen.

Vires. *Calif. I. in reliquis temperatum est, digerit, emollit, maturat. Usus*

pracip. in tussi, pleurisi, phibisi. Extrinsecus maturat tumores, lenit dolores, scitum expellit:

PRÆPARATA.

1. *Mucilago.* Fit coctione vel infusione feminis in ▽.

2. *Farina.*

3. *Oleum expressum.*

Easdem vires retinet, quas semen. Prodest etiam ad pterigia oculorum, (instillatum) inprimis cum successu exhibetur pleuriticis atque dolore colico vexatis, in quibus & intrinsecus prodest, ut, & in Liene duro.

Dosis ad ʒij.

N. *Stupa & tela inserviunt non raro aliorum medicamentorum susceptioni & applicationi. V. g. Tela recens anodynus nephriticis suscipiendis familiaris est.*

N. 2. *Hoc oleum dictum è chartis combustis, videlicet charta accenditur, imponiturque lamina stannea ut comburatur. Sic adhærescit stanno liquor crassus colligendus.*

Vires. *Anodynum est ac consolidativum. Hinc utile in odontalgia, lichenibus, &c.*

CXCIV. *Lotus*.

Lotus hortensis, Tab. hortorum odora, Lob. sylvestris, Matth. Cast. sativa, Cord. in D. & hist. Cam. Trifolium Dioscoridis, Trag. Trifol. odoratum, Fuchf. Lon. Trifol. odor. alterum seu Lotus sativa, Dod. German. Siebengezeit / (quod septies in die odorem.

dorem mutare dicatur, zahner Stein-
flee/ Gartenflee.

Seritur in pratis, Floret Junio, Julio,
Augusto, ejusdem anni quo sata est.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus & Semen, sed ra-
rò.

Vires. Calf. temperatè sicc. digerit, ab-
sterg. alexipharmaca, anodyna, diuretica
ac vulneraria est. Usus precip in pleuresti,
dysuria, Epilepsia uterina, Hydrope inci-
piente, &c.

Extrinsec. in vulneribus ab inflam-
mendis & consolidandis eorum ve-
neno corrigendo (fotu) hamorrhoidibus
leniendis (balneo vel fotu) in oculorum
nubeculis (succus instillatus.)

PRÆPARATA.

1. ▽ stillat. Ex herba cum flori-
bus.

2. Ol. infus. Fit ex fol. & floribus in
ol. comm. maceratis.

Vires. Ad vulnera glutinanda. Her-
niasque puerorum sanandas, tumoresque
molliendos & maturandos plurimum
commendatur.

N. Herbam aridam interponunt ve-
stimentis ne à tineis rodantur.

CXCVI. Lupulus.

Βούλον, Lupulus salictarius, Hopffen.
{ Domesticus. Hic præfertur.
{ Sylvestris.

Dicitur Lupulus, Brunf. Matthiol.
Dod. Clus. hist. Tab. Lupulus sativus,
Trag. Lon. Cast. (mas) Cam. in Matth.
Lupus salictarius, Fuchf. Lob. Lupulus
mas, C. B. I.

Floret Augusto: Solo gaudet pin-
gui.

OFFICIN. NAT.

Flores & Juli Martio mense prorum-
pentes.

Vires. Flores calf. & sicc. 2. amari sa-
poris anodynique sunt, discutiunt. Usus præ-
cip. in obstructione Lienis ac Epatis & in-
de in lètero in hypochondriacis affectibus;
&c. ciet menses & urinam. Extrinsecus
sedat dolores, auxiliatur confusionibus, lu-
xationibus, tumoribus.

Juli (turiones, asparagi) mundificant
sanguinem, adeoque à scabie præservant
(in acetariis assumpti.)

N. Nimius ejus usus gravat caput.

PRÆPAR.

1. ▽ è flor.

2. Syrupus de lupulo. Ex succo turio-
num ante enata folia expresso, lb. iiij.
succ. fumar. lb. ij. cum saccharo.

M.

Macis & macer, vide Moschata.

CXCVII. Majorana.

Αμάραντος, Σάμψυχον, Majoran/
Maferan/ Masoran/ Meyeran.

{ peregrina. Vide Marum.

Majorana { sativa { latifolia vulgaris.
 { { tenuifolia minor.
 { sylvestris.

Ex his usualis est sativa utraque, è
quibus tamen latifolia præfertur, C.
B. f. quam nostrates rubram vocant
ed,

ed quod caulis non nihil ad rubedinem inclinet.

Vocatur Majorana, *Brunfels. Dod. Amaranthus, Matth. Fuchs. Sampfuchus* sive Amaranthus, Latinis Majorana, *Cord. in D. hist.* Amaranthus vulgarior, *Lob. ico. major, Cast. Sampfuchus, Lob. Majorana* vulgò, Maron, *Diosc.* Majorana sive amaranthus major, *Tab. Ger.* Amaranthus sylvestris annua, *Cam.* Majorana vulgaris, C B 5.

Gaudet solo umbroso, stercoreato humido. Floret Julio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia, Semen.

Vires. *Calf. & sicc. initio 3. est partium tenuium, digerit, attenuat. Usus* precip. in affectibus capitis ac nervorum, hinc & uteri & ventriculi: ciet menses (in pessario) Confortat cerebrum ejusque status discentit: errhina est & apophlegmatifans.

PRÆPARATA.

I. ▽. Ex foliis recentibus in MB.

N. Præstat gemmas cum vino destillare.

2. *Conserva.* Ex foliis seu summit.

3. *Confect. Sem.*

4. *Ol. stillat.* Ex foliis.

5. *Balsamus.* Fit ex oleo destill.

CXCVIII. Malabathrum.

Μαλάχατρον, Malabathrum, Matth. (cui & Folium,) *Lob. Tab.* Folium Indiseplasiariorum, *Trag. Cassia folium, Cord. in D.* Tamalapatra, *Garz. Clus.* Cadegi Indi, id est, folium Indum, Arabibus, C. B. 1. German. *Indianisch Blat.*

Dioscorides folia hæc in aquosis crescere locis aquisque innatare scribit, utilis palustris. Garcias ab horto autem esse folia arboris ait, inventiriq; copiose in India ac maxime in Cambaja, procul ab aquis. Utrum ergo folium modernum cum veterum idem sit, est de quo ambigitur.

Eligenda sunt recentia, viridiuscula (non nigra.)

Vires. *lisdem facultatibus pollent, quibus spicanardi, sed fortioribus: urinam potenter movent.*

CXCIX. Malva.

Malva { Sylvestris { folio rotundo } *hujus loci.*
 { folio sinuato }
 { Hortensis seu arborea, loci sequentis.

Appellatur Malva, *Brunfels. Matth. Cast.* Malva vulgarissima, *Trag.* Malva sylvest. pumila, *Fuchs. Dod.* Malva sylv. repens pumila, *Lob. Ger.* Malva sylv. supina, *Cord. hist.* Malva minor, *Lon.* sylv. minor, *Tab.* vulgaris minor, *Cam.*

Malva sylvest. folio rotundo, C. B. 1. Græc. *μαλάχη*, Germ. *Pappeln/ Râß Pappeln/ Haß Pappeln.*

Crescit passim inculta, gaudet solo pingui ac humido: floret Majo ac sequentibus.

Nnn nn

- OFFI-

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores, Semen, Radix.

Vires. Herba (folia & flores) moderate Calf. (aliis refriger.) humect. emollit, lenit dolores, laxat alvum, urina acrimoniam mitigat. Usus precip. in affectibus pulmonum, Vesicae, intestinor. Uteri, e. g. phibisi, tussi, rancedine, calculo, erosione vesicae ac intestinor. in duritie uteri, febris, &c. Extrinsecus intinea capitis (cum urina in lixivium cocta) in tumoribus maturandis, doloribusque sedandis (cataplasm.) in alvo lenienda, dolore nephritico mitigando (clyster.)

N. Semen & radix iisdem pollent viribus, sed usus rarior sunt. Praeferuntur nihilominus in medicamentis internis.

Radix cocta surfures capitis cadere facit (lotione.)

PRÆPARATA.

1. ▽ stillat. Ex fol. & flor. Majo collectis.

2. Conserv. flor. Verum rari usus est.

CC. Malva arborea.

Malva rosea folio subrotundo, Malva hortulana, Brunfels. hortensis, Trag. Fuchs. Dod. Lon. Ger. Malv. major, Matthiol. Malv. arborea, Tab. Malva Romana, Gesn. Malv. major unicaulis, Matth. Cast. Malv. rosea fruticosa, Lob. Germ. Herbst. Rosen / Winter. Rosen / Erd. Rosen / Garten. Pappel. Batw. Rosen.

Ex flore simplici vel pleno, eoq; coloris albi, purpurei, incarnati.

Crescit in hortis: Floret in fine aestatis, initioque autumnii.

OFFICIN. NAT.

Flores soli.

Vires. Calfac. & hum. minus tamen quam vulgaris malva, substring. Usus precip. in consillarum morbis, oris putredine (gargar.) in fluxu menstruo. in reliquis, malva vulgari similis est.

CCII. Mandragora.

Mandragora, Arab. Jabor, Hebr. Dudaïm. German. Alraun / herba est baccifera, radicem habens, quæ hominis partes inferiores aliquatenus repræsentat.

Estque mas vel fœmina, illa usualior. Insigniturque Mandragora mas, Trag. Fuchs. Matth. Cord. in D. Lob. Cam. Mandragora albus seu masculus, Cord. hist. Mandrag. mas vel alba, Cam. Mandragora fructu rotundo, C. B. I.

OFFICIN. NAT.

Cortex radices, qui ad nos aliundè potissimum ex Italia asportatur.

Vires. Refriger. 3. sicc. 1 emollit, mirè, Narcoticus est ac soporiferus, rari usus intrinsecus. Extrinsecus usus ejus est in oculorum rubore ac dolore, in Erysipelate, in tumoribus duri, struma, &c.

PRÆPARATA.

Ol. Fit ex decoct. cortic. aliorumque narcoticor. succis, atq; oleo. Vide Disp.

CCII.

CLASSIS I.

99

CCII. Marrubium.

Marrubium { Nigrum Ballote. Hoc mi-
nus usuale.
Album. Hoc officinale
est.

Dicitur Marrubium album vulgare.
C. B. I. Marrubium *Math. Cord. in D.*
Fuchf. Dod. Cast. vulgare, Clus. hist. Lob.
Tab. Ger. Marrubium fœmina, Brunf.
Candidum, *Trag. Germ. weisser An-*
dorn.

Crescit incultum juxta vias. Floret
Julio.

OFFICIN. NATIVA.

Folia tola.

Vires. *Calif. 2. sicc. 3. aper. absterg. at-*
ten. saporis amari. Usus præcip. in ob-
struct. pulmonum, Epatis, Lienis, Uteri,
adeoque in phthisi, in expustione sangui-
nolenta, in partu difficili, lochiisq; remo-
ratis. Extrinsicus usus ejus variior est.

N. Vesica ac renibus censetur noxium,
correctum tamen Glycyrrhiza ac passulis
nihil nocere dicitur.

PRÆPARATA.

1. ∇ stillat. Ex integra planta, Junio
ac Julio collecta.

2. Syrup. de præssio. Fit ex herbis pe-
ctoralibus, radic. aperient. emoll. &c.
Vide Disp.

3. Spec. Diapraffi. Vid. Disp.

CCIII. Marum.

Planta est exotica, Majoranæ, in fa-
cultatibus ac figura similis, adeo ut pro
unâ eademque herba à nonnullis ha-
beantur. Quamobrem cum maro hîsce

in regionibus destituamur, Majoranam
vel Dictamnnum Creticum substituere
solemus.

PRÆPAR.

Pilula Marocostina Mindereri. Vide
lib. 2.

CCIV. Matricaria.

Arthemisia tenuifolia, Trag. Fuchf.
& nostras, *Lob. Parthenium, Matthiol.*
Dod. Cord. in D. Cast. Amaracus, Galen.
Matricaria parthenii. species, Brunf.
Matricaria, Trag. Lon. Cam. Ger. Ma-
tricarica vulgaris. C. B. I. German. Meo-
fram/Meethran/Meter/Meter-Kraut/
Mutter-Kraut/Feber-Kraut.

Crescit in hortis, floret Junio, Ju-
lio.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus.

Vires. *Calif. 3. sicc. 2. attenuat, incid.*
Usus præcip. in affectibus. uteri frigidis ac
flatulentis, in obstruct. mensium, in impo-
tentia Veneris, in hydropo (purgat per u-
rinam nonnunquam & per alvum,) &c.
in febribus putridis; in calculo renum, in
vertigine. Extrinsic. in suffocat. matri-
cis (decoct. cum 4 naribus applicatum)
in mensibus ciendis (pessar.) in duritie
mammæ. (catapl.) in æstu febrili miti-
gando (fricando dorsum) in arthritico do-
lore sedando, &c.

PRÆPAR.

1. ∇ stillat. Fit ex integra herba
mens. Majo & Junio.

Sal. com. Ex cinere.

3. Syr. de Matricaria. V. D.

4. Ol. stillat. raro extat.

Nnnnn 2

CCV,

CCV. *Matrisylva.*

Matrisylva vocabulum, diversis plantis attribuitur, 1. *Epatica stellata*, 2. *Caprifolio* ac 3. *Hormino*. Vide suis locis.

CCVI. *Melilotus.*

Melilotus vera, major vulgaris, *Trag.* *Lotus Urbana*, *Matth. Sylvestris*, *Fuchf.* *ico Tab.* officinarum Germaniæ, C. B. 1. *Melilotum* majus, *Brunsf.* *Melilotus*: *Lon.* saxifraga lutea, *Fuchf.* *Loti* five trifolii species, *Cord. in D.* *Melilotus* Germanica, *Lob. Cam. Ger.* *Trifolium odoratum*, 1. & 2. *Dod.* *Honig-Klee/Stein-Klee/edler Stein-Klee.*

Gaudet locis saxosis. Floret integra ætate.

OFFICIN. NATIVA.

Flores seu integra Herba Semen.

Vires. *Calf.* 1. *emoll. diss.* dolores mitigat. *Usus* creberrimi præcipuè extrinsecus, in tumoribus, doloribus, oculis rubicundis, in clysteribus, & sim.

N. Quoties simpliciter *Meliloti* fit mentio, semen recipiendum.

1. ∇ . Ex herba cum flore still.

2. *Emplastrum de Meliloto.* V. D.

CCVII. *Melissa.*

$\mu\epsilon\lambda\iota\sigma\sigma\phi\upsilon\lambda\lambda\omicron\nu$, *Melissophyllum*, *Matth. Cast. Tab.* *Melissophyllum* vulgare vel adulterinum, *Fuchf.* *Apiastrum*, *Matth. Cord. in D.* *Lob.* *Citrago*, *Gesn.* *Melissa*, *Brunf.* *Dod.* *Ger.* *Melissa domestica* vel 1. *Trag.* nostras, *Cam.* *hortensis*, *Lon.* & 1. C. B. Germanicè

Melissen/Iden-Blat/ Biensaug/ Mutter-Kraut.

N. Est & *Melissa peregrina*, quæ à loco natali unde asportatur, *Turcica*, *Italica*, &c. dicitur, coliturque isdem nonnunquam apud nos in viridariis, sed minus ea est usualis.

Floret Julio: crescit in hortis.

OFFICIN. NAT.

Vires. *Calf.* 2. *sicc.* 1. *Usus* magni est in affectibus cephalicis, cardiacis, uterinis, hinc & in stomachicis, adeoq; in *Melancholia*, in somnis turbulentis, *Paralyti.* *Apoplexia*, *Epilepsia*, *vertigine*, *Lypothymia*, *cruditate ventriculi*, *remoratis mensibus ac lochiis puerperarum*, *suffocationeque uteri*, emendat insuper factorem *anhelitus*. *Extrinsècus* in uterinis *balneis*, *cataplas.* in ictibus *venenatis apum*, *vesparum.*

N. Recensentur inter herbas cordiales.

PRÆPARATA.

1. ∇ still. Ex herba integra in MB.

2. *Ol* Ex herba sicca, raro extat.

3. *Extract.* Ex foliis.

4. *Conserua.* Ex floribus.

5. *Syrupus simpl.* Ex succ. & sacch. 2.

6. *Compos.* *Fernel.* *Vid. Disp.* *Noriberg.*

CCVIII. *Melo.*

$\mu\epsilon\lambda\omicron$, *Melo*, *Brunf. Tab. Trag. Ger.* *Melo* five *melopepo* vulgi. *Cucumis*, *Gal.* *Dod.* *Melo* vulgi seu *cucumis antiquorum*, *Melopepo Dioscoridis*, *Lob.* *Melopepo*, *Lon.* *Pepo*, *Matth.*

Matth. ico. Fuchf. Cast. Pepo, grandis
Melo, *Cord. hist.* Melo vulgaris, *C. B. 1.*
Germ. *Melonen/ Pfeben.*

N. *Matthiolus* majores vocat *Pepo-*
nes, minores, *melopepones*.

Gaudent solo aprico & versus me-
ridiem sito, pingui, æstateq; serenâ. Col-
ligendi sunt ante ortum solis.

OFFICIN. NAT.

Semen excorticatum & non excorti-
catum.

Vires. Ipse fructus sex pulpa refrigerat,
& hum. nutrimenti est mali, putrescibi-
lis, febribus ac torminibus generandis ap-
ti.

N. Minus nocet coctus, potusque vini
& pipere correctus.

Semen, est è 4. seminibus frigidis ma-
joribus, aperit ac abstergit, Epaticum est
& nephriticum, ea propter confert tussi,
phthisi & febribus medetur stranguria,
ardorem urinae, sitimque sedat, &c. Vide
& reliqua semina frigida majora, cum
quibus in omnibus convenit.

PRÆPARATA.

Melones conditi. Inciduntur melo-
nes nondum maturi, secundum longi-
tudinem, maceranturque in ☩o dies
aliquot (10.) hinc effuso ☩ recens af-
funditur, maceranturque denuo. Tan-
dem exempta ac siccata in melle vel
saccharo syrupisato sensim coquantur
admixtis aromatibus pro libitu.

CCIX. *Mentha.*

Miv. In, in d'los m. G. *Münk/ Balsam.*

Est { *Acuta*
fativa { *Crispa* } *hujus loci.*
 { *Sarracenia. Vide loco sequenti.*
Sylvestris. *Mentha caballina*, mentaltrum; minus officinalis est.
Aquatica. *Vide sisymbrium.*
Cattaria. *Vide Nepeta.*

Et si mentha utraq; tam acuta, quam
crispa earundem virium adeoque offi-
cinalis utraq; sit, præfertur tamen
à nonnullis *Crispa* ceu nobilissima,
sive verticillatam velis sive spicatam
& potissimum cujus caulis ad ru-
bedinem inclinat, rubra inde vulgo
dicta.

Videatur *Mentha fativa* seu cri-
spa, *Trag. Cord. in D. Mentha fativa al-*
tera, Matth. Fuchf. Dod. Crispa, Lon.

Cam. sive Balsamita. Mentha rotundi-
folia altera flore spicato, sive cruciata
Mentha, Lob. Mentha fativa minor,
Cast. Mentha rotundifolia crispa spica-
ta, C. B. 7. Germ. Krausemünk.

Mentha angustifolia spicata, C. B. 7.
Mentha, Brunf. 1. Matthiol. Cast. fativa
vel hortensis 3. Dod. Fuchf. acumina-
ta, Lon. acuta, Tab. Roman. Lob. cru-
ciata, Ger. odorata angustifolia, Cam.
Germ. Spigmünk.

Nnnnn. 3

N.

N. Hac foliis est cum latioribus, tum angustissimis & longissimis.

Colitur in hortis: gaudet locis apricis, non pinguibus quidem, sed humidis. Floret Julio.

OFFICIN.

Herba cum floribus.

Vires. Calfac. & sic. in princ. 3. par. rium est tennium, subastring. Usus præcip. in ventriculi imbecillitate, cruditate, singulis, vomitu, flat. at dore, Epatis obstructione, intestinor. dolore, capitis vertigine, lactis coagulationem impedit. Extrinsecus corrigit ventriculi imbecillitatem doloresque colicos sopit (cataplas.) duritiem mammarum lactisq. coagulationem, capitis achores sanat, &c.

N. Mentha aquatica eadem cum sativa vires habet, adeoque in defectu substitui poterit.

PRÆPAR.

1. ∇ stillat. Ex herba.

N. Mulierculis usitatissima est, ad tormina ventris in infantibus compescenda.

2. Syrup. de mentha minor. Ex succis menthæ granatorumque ana. Vide dispens.

3. Syrup. de mentha major. V. C.

4. Conserv. Ex foliis.

5. Oleum stillat.

6. Oleum infus. ex mentha crispa.

7. Balsamus. Rarus est.

8. Sal. comm. Ex cinere.

CCX. Mentha Saracenica.

Balsamita, Brunf. Mentha Sarrace-

nica, Cord. in D. Lon. Cam. Mentha corymbifera major, Cord. hist. Costus hortorum, Lob. M. Græca, Matthiol. Cast. Alisma, Trag. M. hortensis Corymbifera, C. B. 1. (& 2.) aliis mentha Romana, Mentha S. Mariæ, German, Fräwen Münk / Marien Münk / Pfankuchen Kraut.

Colitur in hortis & cæmeteriis. Floret Junio, Julio.

Officinalis quidem est, sed rarissimè, non è re tamen esset, asservare Folia grati odoris & saporis, ut & Radices.

Vires. Calf. sic. aper. atten. discut. absterg. auxiliatur uterini affectibus, menses ciet, jecur corroborat, peculiarisq. vi opii aliorumve venenorum malignitatem recundere statuitur.

Dosis ad \mathfrak{z} ij. præcipuè radix.

Extrinsecus adhibetur in balneis ad ciendos menses, &c.

CCXI. Mercurialis.

Ανδρωεις, German. Bingel Kraut / nostratibus, Winter grün.

Mas testiculata,	{	usurpantur promi, scut.
C. B. 1.		
Fœmina spicata		
C. B. 1.		

Mas insignitur Mercurialis, Trag. Brunf. M. mas, Matthiol. Fuchf. Dod. Lob. Cast. Tab. Ger. Cam. Mercurialis mascula, Cord. Phyllon. arthenogonon Theophr. Cord. in D. Mercurialis testiculata five mas. Diosc. C. B. 1.

Fœmina dicitur: Mercurialis vulgaris

garis, & 1. *Trag. M. Fœmina, Matth. Fuchf. Dod. Lob. Cast. Tab. Ger. M. spicata seu fœmina, C. B. 2.*

Nascitur in campestribus cultis, vinerisque. Floret per integram æstatem.

N. Est & mercurialis sylvestris seu montana, sed minus usualis.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Mercurialis calf. & sicc. 1. absterg. alvum movet (bilem ac ∇ as purgat.) Extrinsecus vulva adhibita menses & secundinas trahit, tumores emollit, creberrimi usus in clysteribus.

N. Sunt & nostratibus mulierculis, quæ Mercurialem infantulis cum pappâ exhibent, ut alvum solutam retineant, torminâq; præcaveant.

PRÆPAR.

1. ∇ stillat. Ex herba florecente.
2. Syrup. de succo Mercurialis, & saccharo $\frac{1}{2}$. Vide Disp.
3. Mel. Mercuriale. Ex succ & mell. $\frac{1}{2}$. Vide Disp.

N. Adhibentur potissimum in clysteribus.

CCXII. Mespilus.

Μέσπιλον, Mespilus, *Brunfels. Trag. Lon. Lob. Dod. mespilus altera, Matth. mespili altera species spontè proveniens, Cord. in D. mespilus vulgaris, Clus. hist. Cam. Epis. mespilus vulgaris Germanica folio laurino non serrato, C. B. 1. five mespilus sylvest. Germ. Mespel-Baum / Mespel-Baum.*

Crescit in hortis. Floret Junio. Fructus fert Octobri.

OFFICIN. NAT.

Fructus (μέσπιλον, Officula, Folia.

Vires, Fructus. (mespila) Refrig. sicc. Saporis sunt asperi, astringunt, constipant valide, ventriculo noxia sunt, præcipue dum duriuscula adhuc extiterint, emollia enim astringunt levius, nocentq; minus, ac facile putrescunt. Usus esse possunt in diarrhæa, dysenteria. Extrinsecus in vomitu, fluxuq; alvi sistendo (cataplas) impositi.

Oslicula. (lapilli acini) commendantur summopere ad calculum aterendum & expellendum.

Folia, similem vim cum fructibus obtinent. adeoque & iisdem indurationibus inserviunt. Et præcipue in gargarismis, balneis uterinis.

PRÆPAR.

Condit fructus: cum melle.

CCXIII. Meum.

Μήνον, Officin. Meum indeclinabiliter. Meum, *Matthiol. Tam. Cam Ger. Cast. Dod. Daucus, Cast. Tordylium, Cord. in D. Meum vulgare tenuifolium, Clus. hist. Daucus Creticus, Trag. Fuchf. Sefeli Creticum, Fuchf. Meum foliis anethi, C. B. 1. Beer. Wurk / Bâro Wurk / wilder Dill / Bâren-Dill / Bâren-Fenchel / Mutter-Wurk / Herk-Wurk.*

Crescit copiosè in sylva hercinia, aliisque locis montanis, ut & in montibus campestribus & apricis, apud

nos non nisi in hortis cultum invenitur.
Floret Junio ac Julio.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Calf. 3. sicc. 2. atten. aper. flatus discutit. *Usus* precip. in inflatione ac ructu ventriculi, in mensibus ac urina cindis, in uteri suffocat. In torminibus ventris, in catarrhis tartaroque Pulmonum expectorando. Extrinsecus in balneis, cataplasmatibus, &c.

PRÆPAR.

Multas ingreditur compositiones, ut & ipsam Theriacam.

CCXIV. Milium.

κίχρη, Milium, Brunfels. Trag. Matth. Fuchs. Dod. Cord. in D. Lon. Lob. Cast. Tab. Milium aureum & album, Cam. Milium semine luteo vel albo, C.B. Hirs/Hirschen.

Gaudet solo arenoso humido. Floret Augusto.

OFFICIN. NAT.

Semen ac Farina seminis.

Vires. Refrig. & sicc. 3 alvum constipat, est difficilis digestionis, plurimum tamen ac laudabilis nutrimenti. Decoctum sudorem ac urinam potenter movet. Extrinsecus exiccat catarrhos, dolores capitis & ventris sedat (costum cum Sal. com. calid. vertici vel ventri impositum) consumit lac, pellit calculum renum (in baln.) Diarrhaam infantum sistit (cataplas. cum decocto sumach.

PRÆPARATA.

1. ∇ stillat. Ex herba florescente.

Insigne præservativum censetur in calculo.

2. Decoctum D. Ambrosii. ℞. Milii ℥ij. coq. in ∇ ℥ijj. ad crepaturam, coletur.

Vires. Magnarum virium censetur in febribus, imprimis tertiana, si in declinatione paroxysmi exhibetur ad sudorem eliciendum.

N. Alijs vinum adhibuisse placet.

CCXV. Milium solis.

Λιδοσπέρμον, Lithospermum. Brunf. Fuchs. Cord. in D. Lon. Lithospermum minus, Matth. Dod. Lob. Cast. Ger. Vulgare minus, Cam. Lithospermum legitimum, Clus. saxifraga tertia, Brunf. Milium solis sativum, Trag. Fuchs. Lithosperm. arvense, Tab. majus erectum, C.B. 3. minus, Matth. Germ. Meerhirsche/Steinsamen.

Crescit in hortis, inter fruges in cultum. Floret Majo.

OFFICIN. NAT.

Semen, raro Folia.

Vires. Calf. & sicc. 2. calculum insigniter comminuit ac expellit, Renes abstergit, urinas ciet, partum pellit.

Dosis sem. ʒj ad ʒij.

N. Sunt qui pro certo experimento jactitant, in febris quotidiana ante invasionem semen exhibere, idque vicibus iteratis.

PRÆPARATA.

∇ stillat. è folijs.

CCXVI. Millefolium.

Στρατιώτης, ὀχλιδέφυλλον, Stratiotes mille-

CLASSIS I.

101

millefolia, *Fuchf. Cast.* millefolium ter-
restre majus, *Tab. Cord.* millefolium al-
bum, *Brunf.* millefol. vulgare, *Trag.* A-
chillea, *Lon. Dod.* millefolium, *Cam.*
millefol. stratiotes, *Cord. in D.* millefol.
album, *C.B. 2.* Germ. Garbe/ Zausent-
Blat/ Garben Kraut/ Schaaf Gar-
be/ Schaaf Stipp.

Crescit passim locis aridis juxta vias
in camiteriis, &c. floret Junio.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus.

Vires Exiccat, astringit cum tempera-
to calore ac amarore: hinc medetur vul-
neribus, tumoribus ac inflammationibus
sine repulsione. Usu itaque interno con-
venit, in hemorrhagiis ac fluxionibus o-
mnis generis, narium, uteri, alvi, vulne-
rum, sicut in sanguinolento, vomitu, uri-
na reienta, calculo, mictione sanguinolen-
ta, gonorrhoea, hamorrhoidibus, fluore u-
terino, mariscis, cruore, vulneribus, Ex-
trinsecus adhibetur feliciter cephalalgia,
pterygio oculorum, hamorrhagia narium,
vulnere odontalgia (massicando vel
emplastrando) mensibus (superfluori al-
bo, diarrhoea, vulneribus consolidandis, tu-
moribus hamorrhoid. Hernia, et libus ve-
nenatis, contra fluxur, tumori penis.

N. 1. Sunt, qui herbam cum floribus
in peste preservanda & curanda, prose-
creto peculiari vendunt.

N. 2. Herba recens narium indita ha-
morrhagiam causatur.

PRÆPARATA.

▽. Ex herba cum floribus.

N. Medetur putredini gingivarum
quam optime.

CCXVII. Momordica.

Balsamina, *Matth. Fuchf.* Balsamita
cucumerina punicea, *Lob. Tab. mas,*
Cam. Ger. Pomum mirabile, *Trag.* Po-
mum Hierosolymitanum, Balsamina
rotundifolia repens seu mas, *C.B. 1.* Ger-
man. Balsam-äpfel.

Colitur apud nos in hortis.

OFFICIN. NAT.

Folia & Fructus (Poma dicti.)

Vires. Refrig. parumque siccatur, vul-
neraria est, dolores ac praesertim hamor-
rhoidum mitigat. Extrinsecus sauciatis
consert nervus, hernia, ambustis, &c.

PRÆPARATA.

Oleum. Fit ex infusione & decoctio-
ne fructus (exempto semine) in oleo a-
mygd. dulcium.

CCXVIII. Morus.

Mogia, Maul- beer Baum	{	alba, album ferens
		fructum,
		nigra, celsa, nigrum fe- rens fructum. Hae
		praefertur.

Dicitur Morus, *Trag. Matth. Fuchf.*
Dod. Lon. Tab. Ger. vulgaris. *Cam.* Mo-
rus nigra, *Cord. in D. Cast.* Morus celsa
officinis, *Lob.* Morus fructu nigro, *C.*
B. 1.

Maturescit fructus Augusto.

OFFICIN. NAT.

Cortex (praecipue radice,) Folia &
Fructus exiccatus sed raro.

Vires. Cortex Radicis calf. & sicc.

000 00

ama-

amari saporis est, absterg. adstring. Epar
ac Lienem aperit, alvum laxat, tinea la-
tas enecat.

Fructus nigri immaturi (mora im-
matura) refriger. & sicc. 3. valde astring.
Usus praecep. in omnibus fluxibus. E. gr.
diarrhaea, dysenteria, fluxu menstruo,
expuitione sanguinis. Extrinsecus in san-
cium acoris inflammationibus, ulceribus-
que.

Mora matura, refriger. & sicc. parum
(aliis humect.) solvunt alvum, (initio
pastus) sitim sedant, appetitum exci-
tant.

N. Nutrimenti sunt pauci & putresci-
bilis.

Folia vel sola vel cum cortice cocta o-
dontalgiam sedant (gargar.)

PRÆPARAT.

1. ▽ stillat. Ex moris immaturis.
N. Rarò prostat.
2. Rob Diamoron simpl. Ex succ. &
mell. $\frac{1}{2}$. Vide Disp.
3. Diamoron. Compos. Fit ut simpl.
addendo myrrh. croc. omphac. Vide
Dispens.
4. Diamoron Nicolai. Ex succo moror.
Celsi lb. ss. mororum rubi lb. j. mell.
lbj. sapæ ziiij. V.D.
- N. Hoc usitatissimum est.
5. Diamoron Cordi. Ex succo moror.
Rubi, Rubi l dxi, Celsi, fragor. & melle.
V.D.

N. Mororum succi ex immaturis mo-
ris exprimendi sunt.

CCXIX. Moschata, Macis.

Nux moschata & muscata, Lon. Lob.

Fragos. Cord. Tab. Acost. Nux Aromati-
ca, moschocaryon, moschocarydion,
Nux myrista seu unguentaria, Matth.
Cast. N. myristica, Clus. exot. Nucista,
Nux moschata fructu rotundo, C.B.I.
Germ. Muscat. Nuß.

N. Clusius duplices statuit minores
(feminas) & majores seu oblongas (ma-
res.)

Crescit in Insula Banda Indiæ Occi-
dentalis.

Duplici cortice vestita est: altero ex-
teriori & crassissimo, per maturitatem
dehiscente, ut in juglandibus; altero
tenuiore, nucleum proximè instar reti-
culi ambiente, &oque primum coloris
rubescens, postmodum flavescentis,
& hæc officinarum Macis est. German.
Muscatblüth.

N. 1. Macer veterum est ligni cujus-
dam cortex lignosus, crassus, rubescens, ex
Barbaria afferri solitus, gustu valde ama-
rus & astringens, adeoque differt à maci,
quanquam interdum modernis confun-
dantur.

N. 2. Est & genus materis Insul. Ori-
ental. quod forsàn idem cum veterum.
Vid. Christ. Acost. c. 12.

OFFICIN. NAT.

Nux ac Macis.

Eligenda Nux recens, gravis pinguis
& quæ acu puncta, succum oleosum re-
mittit.

Macis probatur odore suavi, sapore
subacri, colore flavo.

Vires. Nux calf. & sicc. subastr. est
stomachica, cephalica, uterina, discutit
flatu

statu, coctionem iuvat, halitum foetidum oris emendat, fœtum recreat, lipothymia ac palpitatiōni cordis succurrit, Lienem minuit, alvi fluores compescit, vomitum sistit.

Maci eadem vires adscribuntur, quia tamen partium tenuiorum existit, ideo & operando efficacior & magis penetrans habetur.

PRÆPAR.

1. *Condit. Nucist.* Condiuntur nucistæ virides, integræ ut juglandes, conditæque, ad nos transportantur.

2. *Condiuntur sine involucris.*

N. Possunt & apud nos condiri: vide-
delicet. *R.* Nucistas quoad fieri potest recentissimas, macera in lixivio forti, dies (9. & 10.) ut mollescant: dein abra-
de extremam cuticulam lavaque donec lixivio penitus exuta sint: hinc sicca ac cum saccharo syrupisato condito.

2. *Confectio Macis.*

N. Confiuntur ut Nucista, sed raris-
simè.

3. *▽ Nucista Parari potest ut Cinnamon.* Vide lib. 2.

4. *Oleum Nucistæ still.* extillat unâ cum *▽.* prodest in cardialgia & sim.

Dosis gr. iij. iv.

5. *Ol. Nucistæ expressum.* Exprimi-
tur ex nucibus recentibus contulis & in
sartagine fervefactis l. communi.

Vires. Prodest in torminibus ventris
ac nephriticis (in liquore calido exhibi-
tum. (Extrinsecus conciliat blandè som-
num) temporibus illis tormina infan-
tum sedat (umbilico innectum.)

N. Ex oleo expresso paratur corpus
balsamorum.

6. *Sal. com. Nucistæ.* Ex remanentia
incinerata elixiviat.

7. *Ol. Macis stillat.* Eodem paratur
modo.

Dosis gr. iij. iv.

8. *Ol. Macis expressum.* Exprimi-
tur itidem ut dixi.

9. *Extract. R.* Ol. Nucist. express.
q. v. extrahe secundum artem digeren-
do cum *▽* rectificatissimo: decanta fil-
tra & abstrahere ad consistentiam olei.

Vires. Præter utilitates alias, Balsamo
nucistæ conficiendo inseruit.

N. Album corpus post extractionem
residuum aliquoties *▽* calida abluatur,
serveturq; pro corpore Balsamum, quod
præstat tamen, si extractio cum *▽* varia-
risato peracta fuerit.

10. *Balsamus Macis.* Fit ex oleo ex-
presso additis guttulis aliquot destillati
olei.

11. *Balsamus Nucistæ.* Fit similiter.

CCXX. Muscu.

Bgüor, Arab. Usnea, Moos.

Muscu { Arboreus. De quo hic.
Terrestris. De hoc sequenti lo-
co.
Saxatilis. Vide Lichen.
Marinus. Vide corallina.

Muscu qui arboribus accrescit.
figuræ ratione potissimum triplicis
est sortis, i. capillaceus, id est, habens
formam capillorum, adnasciturque
Ooooo 2 caudi-

caudici, C. B. 1. seu usitatus officinarum.) 2. Fœniculeus, i.e. fœniculi folia æmulans, (C. B. 3. seu muscus arboreus cum orbiculis, Tab. Muscus ramosus, floridus & non floridus. Adnascitur ramis. 3. Crustaceus, habens formam crustarum, (C. B. 7. seu muscus pulmonarius, Tab. pulmonaria.) Vide pulmonariam arboream.

Ex his hujus loci sunt priores, quorum usualior primus, adeoque usnea officinar. dictus. Hic tùm tenuior est, tùm crassior: aliàs brevior aut prolixior: omnes candescentes, pauci rutilantes, quandoque nigri. Primæ nobilitatis sunt muscus lariceus, piceus, pineus & abietinus. Hinc populeus, sed candidus (nigricans enim improbat) (utilissimus omnium est quernus.

Videatur Muscus arboreus, Trag. Matth. Dod. Cast. Muscus, Cord. in D. Musc. arborum, Lob. Tab. Musc. quernus, Lob. Ger. Muscus arboreus: Usnea officinar. C. B. 1. inter species musci arborei.

Colligendus est in initio veris.

Vires. Muscus omnis adstring. Usus præcip. in Ictero, vomitu, diarrhæa, dysenteria, abortu præcavendo. Extrinsecus in laxitate gingivar. in sanguinis fluxu compescendo.

N. 1. Quia signaturam capillor. habet, ideo & capillis muscum dicatum esse volunt.

N. 2. Hujus loci est muscus Cranio adnatus, quem peculiari vi commen-

dant in vulnerum hamorrhagia & consolidatione, adeoque unguentum magneticum ingreditur. Præstantissimum itidem medicamentum exhibet in dysenteria & simil. Surrogari autem eidem potest muscus aliis ossibus adnascens.

CCXXI. Muscus terrestris.

Musci terrestris variaz itidem dantur species, è quibus in officinas solum venit quæ repens vocatur, C. B. 10. seu muscus terrestris clavatus, muscus terrestr. Trag. Matth. Dod. Cast. Lycopodium, pes lupi, Tab. Pes Leoninus, Lob. Ger. Cui tamen affinis est muscus terrestris ramosus, C. B. 2. muscus terrestris, Tab. Germ. Bärapp/ S. Johannis Gürtel/ Gürtel-Kraut/ Reunheil/ Zeusefels/ Klaw/ Löwen-Fuß.

Crescit in sylvis desertis ac myricetis Floret Junio.

OFFICIN. NAT.

Muscus, flos citrinus & Farina.

Vires. Refrig. & sic. Usus præcip. in calculo atterendo ac expellendo (laudatur summopere flos ejus citrinus) in fluxu alvi, Extrinsecus in laxitate dentium, in consolidatione & siccatione vulnerum (farina excussa, inpersa).

CCXXII. Myrtillus.

Myrtillus, Matth. Lon. Cast. Myrtill. vulgaris baccis nigris, Clus. hist. vitis idæa, Tab. vitis idæa nigra, Cam. Myrtillus Germanica, vaccinia nigra C. B. 1. seu vitis idæa foliis oblongis

crena

crenatis fructu nigricante. Germ. Hei-
del. Beer.

OFFICIN.

Bacca. Vaccinia seu Myrtilli Ger-
manici.

Vires. Refrig. 2. sicc. & subastring.
sedant sitim. Usus rari sunt, adhiberi
tamen possunt in febris, vomitu ac di-
arrhea. Alij exiccant inque dysenteria
utluer propinant.

CCXXIII. Myrtus.

Myrtus myrtus, Myrtus & murtus.
Germ. Myrten-Baum.

E variis myrtorum generibus usua-
lior est Myrtus, Tab. M. Minor, Lob.
& Tarentina, Clus. hist. M. Tarentina,
Matthiol. Cast. Cam. M. minor vulga-
ris, C. B. 9.

Hinc substitui poterit. Myrtus foliis
minimis & mucronatis, C. B. 8. M. prior,
Dod. angustifolia 9. Lob. M. domestica
fructu albo, Clus. hist.

Crescit in regionibus calidis Italia
ac Gallia Narbonensi juxta ripas ma-
ris.

OFFICIN. NAT.

Folia, Bacca (Myrtilli officinarum
myrta.

Vires. Utraque refrigerant tempe-
ratè sicc. valide, astringuntque. Usus in-
ternus rarior est, nihilominus tamen ad-
hibentur in fluxu alvi ac expuitione san-
guinis. Extrinsecus usus utriusque cre-
brior.

Folia emendant foetorem sub axillis
& inguinibus pulvis aspersus: sudorem

corporis immodicum sistunt (frictione:)
membris ac catarrofis opulentur, alvi
fluxui succurrunt, defensivum exhibent
in herpetibus, putredinem oris sanant, ha-
emorrhagiam narium sistunt, polypo me-
dentur (cum melle ac vino.)

Baccæ mitigant oculorum inflamma-
tiones, juvant luxatos articulos ac ossa fra-
cta, subveniunt procidentia uteri ac ani,
capitis tinea, fursuracea que excremen-
ta abigunt.

PRÆPARAT.

1. Syr. myrtillor. seu myrtinus. V. D.
2. Ol. myrtillor. Ex fol. myrti & ol.
communi infusis.
3. Ol. myrtinum. Ex fol. myrti & ol.
communi.

N.

CCXXIV. Napus.

Beviæ, { sativa usualis.
sylvestris.

Vid. Napus, Brunfels. Manb. Dod.
Cord. in D. Cast. Cam. Lon. Rapum sati-
vum alterum, & Napus veterum, Trag.
Napus Bunias sativus, Fuchs. Bunias seu
napus, Lob. Napus sativa, C. B. 1. Ger-
man. Steck-Rüben.

N. Recensentur Napi in genere rapo-
rum, quod caule, floribus, semineque Ra-
pa amulentur, quanquam sæto & radice
Raphanos magis referant. Est autem ge-
nus plantar. sativar. notissimum, quod co-
lunt non modo ob radicem usum esculen-
tum, sed & ob seminis oleum expressum,
quod tæm fercula impinguant, tæm lampa-
des instaurant.

O o o o 3

Floret

Floret à Vere in æstatem.

OFFICIN. NAT.

Semen.

Vires. *Calf. succ. absterg. aper. digerit, atten. & incidit, venenis potenter resistit (unde & Theriacam Androm. ingreditur) morbillos ac variolas peculiari facultate à centro ad circumferentiam corporis pellit, ideoque in febribus malignis & petechialibus crebri usus est, (in emulsionibus) Conser. & in lètero, urina remorata, &c.*

Dosis ʒj.

PRÆPARATA.

Oleum expressum ad omnia utile ad quæ semen. Usitatum est plebeis, ad compescenda tormina ventris infantibus exhibere.

CCXXV. *Nasturtium Aquaticum.*

Kardapum, Nasturtium aquaticum (& 2.) Trag. Lon. Dod. Cressi, Laver odoratum, Cord. Syimbrium cardamine. Fuchf. Syimbrium aquaticum primum, Tab. Syimbrium alterum, Cord. in D. Sion Cratevæ, syimbr. 2. Diosc. Sion Cratevæ Eruca folium, Lob. Sium majus, Ger. Syimbrium aquaticum, Matthiol. Cast. Nasturtium aquaticum supinum, C. B. 1. German. Brunnen-Kress.

Crescit in rivulis vel paludibus: floret Julio & Augusto. Viret perpetuo, adeoque hyemali tempore acetaria exhibet non vituperanda.

OFFICIN.

Folia seu herba cum floribus.

Vires. *Calfac. & succ. 2. (exiccatum 3. atten. aper. Usus pracip. in calculo ac sabulo, obstructione Lienis ac Epatis mensumque; specificè in scorbuto commendatur.*

N. *Præstat recens adhibuisse quam exiccatum, ob Sal. com. volatile paulatim evanescens.*

PRÆPAR.

1. *Succus inspissatus.*

N. *Cum aceto naribus illitus, arcet immoderatas vigilias: Polypum extirpat, succus naribus inditus.*

2. *Stillat. Ex planta integra collecta Augusto.*

3. *Spiritus. Ex herba contusa addito tantillo fermento, fermentata.*

CCXXVI. *Nasturtium hortense.*

Kardapum, Latifolium.

est { *Crispum vulgatum. Usitatus.*

Nasturtium, Brunf. Matth. Cast. Tab. Nasturtium hortense, Trag. Fuchf. Lob. Dod. Ger. Nasturtium hortense vulgatum, C. B. 2. Garten-Kress.

Colitur in hortis.

Seritur vere: floret ætate.

OFFICIN. NAT.

Folia ac Semen.

Vires. *Semen & herba sicca calf. & succ. 4. (Herba viridis mitior est) utrumque attenuat, aperit, abstergit. Usus prac. est in tumido liene, mensibus obstructis fatig., mortuo expellendo, tartaream mucila-*

mucilaginem Pulmonum incidit; Scorbuto confert. Vulgò iidem ad expellendos morbillos inservit semen. Extrinsecus usruenit in apophlegmatif. errhinis, phænigmis: furfures ac scabiem fœdam capitis aliarumque partium sanat (triturum aut frixum, cumque porci axungia illitum.)

N. Nasturtium pratense (quem florem cuculi appellant, alibi iberim, Lepidiumve minus,) ut & Nasturtium montanum, seu alpinum nec non & nasturtium hybernium (eruca lutea vel barbarea dicta) officinis incognita sunt.

CCXXVII. Nepeta.

Mentha felina, Tab. Ger. Cattaria, Dod. Lob. Mentha non odorifera, Nepeta vulgaris, Trag. Nepeta fruticosa, Cord. in D. herba gattaria, Matth. Cast. Calaminthæ i. genus, Fuchf. Nepeta Germanica, Cam. Calamintha montana, Lon. Mentha cattaria vulgaris & major, C. B. i. Germ. Raken-Kraut / Raken-Rept.

Crescit ut plurimum in hortis, tum quoque juxta vias: floret Junio, Julio, Augusto.

OFFICIN.

Herba.

Vires. Calf. & sicc. 3. partium est tenuium, attenuat, aper. Usus præcip. in morbis uterinis (scil. obstruct.) sterilitate, fœtu pellendo, tum quoque in tartaro pulmonum incidendo, &c. Extrinsecus in balneis pro utero.

N. Ob gravem odorem rarò intrinsecus exhibetur.

CCXXVIII. Lignum Nephriticum.

Est ligni genus crassum & enode, aquam infusione cæruleam reddens. Germ. dici potest Größ. Holz.

Videatur lignum nephriticum seu lignum ad renum affectiones & urinæ incommoda, Monard. Lignum ex novo mundo pyro simile, Fragos. Lignum peregrinum aquam cæruleam reddens, C. B. 4. Inter genera Fraxini.

Afferitur ex nova Hispania.

Vires. Calf. & sicc. gr. i. Usus ejus receptus est ad renum vitia, urinæq. difficultates & incommoda. Hinc in Epate & Lienis obstructionibus.

PRÆPAR.

Infusio, quæ in ∇ Fontan. facta nonnullis potus est sat experitus, tum ratione saporis, quem ferè nullum exhibet, tum quoque coloris cærulei, adeoque amicabile. Potest illà dilui vinum.

N. Adulteratur alio ligno simili, quod ∇m croceo colore inficit. Monard.

CCXXIX Nicotiana.

Tabacum, Tobacum, Tabacca, Tubac, Petum. Herba sanctæ Crucis, sana sancta, torna bonna. Indianisch Wein, Welle / Indianisch Wund-Kraut / heilig Wund-Kraut / Toback.

N. Ante annos aliquot ex America primum adferri cæpit, unde postmodum in nostris hortis colitur, & copiose ab Hannoveriensibus, qui officinas nostrates suo Tabaco

Tabaco sufficienter instruunt: Huic tamen iudicium præferendum censemus ex *Indicæ Occid. Insula virginica florida* cen patria genuina ad nos allatum.

Est { *latifolia seu fœmina*, C.
Major { B. 2.
 angustifolia mas, C. B. 2.
Minor, C. B. 3.
Minima, C. B. 4.

1. Videatur. *Nicotiana*, Lon. Major, *Tab. Tabacum* (ab ejus nominis, *Insula*,) *Monard. Fragos. Tabac. latifol. Cam. Petum. Clus. ad Monard. Hyoscyamus Peruvianus, Dod. Cam. Epit. Sana sancta Indorum, Lob. Ger.*

2. *Tabacum* seu herba sancta minor, *Lob. Tab. angustifol. Cam. Petum angustifol. Clus. ad Monard. Hyoscyamus Peruvianus alter, Dod.*

3. *Petum* 4. *Clus. ad Monard. Hyoscyam. niger* vel 3. *Matth. Cast. Hyoscyamus luteus, Dod. Lon. Cam. Ger. Hyosc. Peruvianus, Tab.*

4. *Tabacum minimum*, *Cam. Tabac. seu sana sancta minima, Lob. Petum* 3. *Clus. ad Monard.*

N. *Nicotiana* dicitur à *Nicotio*, *Regis Gallia Legato*, qui herbam eam *Ulissipona Zeelandia* accepit è *florida allatam*, postmodumque *Gallis* innotescere fecit.

Gaudet solo pingui ac lato, area plana, opaca, aqua mirè delectatur, frigoris impatientissima est. Seritur felicissimè tempore verno, in principio April. ☾ crescente, colligitur herba ☉ in ♀ 15. gr. 18. 19. 20. ☾ de-

crescente. Semen ☿rio & ☿ est dicatum.

OFFICIN. NAT.

Folia seu herba & *Semen*.

*Vires. Herba recens calf. & sicc. 2. siccata 2. (alius calf 1. sicc. 2. alius refriger. abstergit, incid. 1. resolvit, aliquantulum astringit, resistit putredini. Sternutatoria est, apophlegmatizans, anodyna, vulneraria, vomitoria, &c. Usus præcipue externi ad catarrhos cerebri exiccandos, somnum inducendum, lassitudinem ex labore discutiendam, uteri strangulatum compescendum: à peste præservat (in suffitu) sedat dentium dolores, discutit tumorem uvula (in gargar.) medetur lichenibus, phthiriasi, porriginis, achoribus ac favo, mundificat ac consolidat vulnera ac ulcera inveterata, sanat ambusta quoquo modo adhibita (balneatione scil. vel sola impositione soliorum recentium nostratis *Nicotiana*, &c. Nec tamen prorsus usum quoque subterfugit internum, dum pro vomitorio exhibetur (sai violento) qua ratione curat febres, similesq. morbos, sed cautione hic opus est.*

N. 1. Non adeo proficius *Tabaci* usus est juvenibus ac biliosis.

N. 2. Novi qui mictionem nocturnam vespertino *Tabaci* suffitu præcavebat.

PRÆPARATA.

1. ▽. Ex foliis.

2. *Syrupus de Nicotiana.*

Vires. Et aquam & syrupum cum successu

7. *Balsamum*. Vide lib. 2.

Peculiarem Tabacologiam conscripfit Joannes Neander, Medicus olim Bremanus, & inde Alstedius in sua Encycloped. Satis itidem prolixus in descriptione Tabaci est Nicol. Monard. in simpl. medic. hist. c. 14.

{ maggiore { simplici
 { pleno.
 { minore { simplici
 { pleno.
 { simplici
 { pleno.

I. Semen

1. *Semen preparatum*. Maceratur in
 † atque exiccatur.
2. ∇ *stillat*. Ex semine.
3. ∞ *stillat*. Ex semine.

CCXXXI. *Nummularia*.

Centummorbia, Hirundinaria, Serpentina, Egel-Kraut / Schlangen-Kraut / Klein Matter-Kraut / Pfennig-Kraut.

Est { Major lutea. *Hæc usualis*.
 C. B. 1. { Minor purpurea flore. *Hæc incognita*.

Dicitur Serpentina 3. & centummorbia, *Brunfels*. Nummularia, *Trag. Matth. Fuchf. Dod. Lob. Lon. Cast. Cam. Tab. Ger.* Hirundinaria minor, *Tab. Nummularia major lutea, C. B. 1.*

Crescit in campestribus ac locis herbosis, humidisque, Floret Majo.

OFFICIN. NAT.

Herba seu folia.

Vires. *Refrig. sicc. subastring. vulneraria est. Usus præcip. in pulmonum exulceratione, venis ruptis, tussi sicca infantum: in fluxu cujuscunque generis, diarrhæa, dysenteria, hæmoptoyi, commendatur in Scorbuto, herniæque omnis generis.*

PRÆPAR.

1. ∇ *stillat*. Ex herba collecta cum floribus mense Majo.

CCXXXII. *Nymphæa*.

Nymphaea, Nenuphar. Arab. Nenufar. See Blum / Hark / Wurf / Waf / ser / Lilgen.

Est { Alba floribus albis. { major.
 { Lutea, floribus luteis. { minor.
 { minima.

Ex his præfertur quidem alba eaque major, quæ intelligenda quoties Nymphæa simpliciter mentio fit. Veruntamen nec negligenda est lutea.

Alba dicitur Nenuphar album, *Brunfels*. Nymphæa alba, *Brunfels. Matth. Dod. Lob. Lon. Tab. Ger. Clus. hist.* Nymphæa candida, *Trag. Fuchf.* Nymphæa maj. alba, *Cast. C. B. 1.*

Lutea usitatior est quæ inscribitur Nenuphar luteum, *Brunfels*. Nymphæa lutea, *Trag. Mauthiol. Fuchf. Dod. Lon. Lob. Cast. Tab. Ger. major, Clus. hist.* Nymphæa lutea major, *C. B. 1.*

Crescit in lacubus. Floret Majo & Junio:

OFFICIN. NAT.

Radix, Folia, Semen, flores.

Vires. Radix & semen refriger. & sicc. gr. 3. astring. Flores & folia refriger. & humect. Singula sunt usus præcip. ad fluxum alvi, ad pollutionem nocturnam, seminis acrimoniam, sanguinis astum & tenuitatem. Extrinsecus crebro adhibentur folia & flores ad febriles astus & vigilas sopiendas (in lotionibus pedum, in impositione foliorum scil. lumbis, temporibus, plantis pedum.)

PRÆPARATA.

1. ∇ *stillat*. Ex floribus albis.
2. ∇ *stillat*. Ex floribus luteis.

3. *Syrn-*

3. *Syrupus Nymphaeae simpl.* Ex infusione florum.

4. *Syrupus de Nymphaea compos. sive de Nenuphare.* Vide Disp.

5. *Conserve.* Ex floribus albis.

6. *Ol.* Ex infusione florum.

7. *Unguentum de Nymphaea.* Vid. l. 2.

O.

CCXXXIII. *Olea.*

Elæia, Olea, Oli { *Sativa.*
ven. Baum/ Del. { *Sylvestris, olea-*
Baum/ { *ster.*

Prior insignitur *olea, Brunf. Trag. Cord. hist. Lon. Dod. Lob. Cam. Bellon. Olea sativa, Matt. Cord. in D. Cast. Tab. Ger. Olea sativa, C.B. 1.*

Posterior, *Olea sylv. Matt. Tab. Ger. Olea sylv. seu Oleaster, Lob. Cast. Oleaster, Lon. Clus. hist. C.B. 2*

Crescit utraque in regionibus calidis, Italia, Hispania, &c. Gaudet locis siccis argillosis. Floret Julio. Fructus decerpuntur mense Novembri & Decembri.

OFFICIN. NAT.

Folia, Fructus (sed conditi.)

Vires. Folia refriger. & exiccant. astring. Usus externus & precip. in fluxu alvi, mensium, in herpetibus, & sim. *Fructus immaturi siccant & astring. in primis sylvestres.*

N. Exhibet itidem (tùm *olea, tum oleaster*) lachrymam resinofam, resine Elemi non absimilem, sed hac in usu non est.

PRÆPARATA.

1. *Condit. Oliva.* Condiuntur muria antequam planè maturuerint, in Hispania & Gallia Narbonensi; interdum etiam maturæ & nigræ.

Vires. Comesta initio pastus excitant appetitum, movent alvum, humentem ventriculum exiccant ac confortant.

N. Rancida subvertunt ventriculum.

2. *Oleum,* (simpliciter ita dictum.) Exprimitur ex olivis maturis, diciturq; *oleum* (simpliciter,) *oleum commune olivarum, Baum. Del.*

Vires. Calfac. & humectat moderatè. (N. Vetus calidius est recenti) emollit, digerit, vulnerarium est, alvum laxat cum cerevisia calida assumptum 3j.) ariditatem pectoris corrigit tormina ventris mitigat, urinarios meatus laxat, erosos abstergit & consolidat. Extrinsicus creberrimi usus est in clysteribus, tumoribus calidis, &c.

N. 1. Cum ∇ tepida assumptum movet vomitum.

N. 2. In patria mea Westphalia usitatissimum est vulneratis quotidie exhibere *oleum olivarum cum cerevisia calida, quò adeò largè utuntur, ut quoque sudor oleum redoleat.*

4. *Oleum omphacinum.* Exprimitur ex olivis immaturis.

Vires. Refrigerat, siccant, astringit, adeoque multis compositionibus inservit.

5. *Oleum Philosophorum.* Fit destillando *oleum olivarum*, cum lateribus ignitis mixtum ex retorta. Ang.

Vires. Discutit, maturat, emollit. Prodest tumoribus frigidis, duris, &c.

Ppppp 2

CCXXXIV.

CCXXXIX. Ononis.

Anarvis, Dioscorid. Onarvis, Theophr.

Hawbechel.

Est	{	Spinosa	{	purpur. (flor.)	Hacu- sualior.
				lutea. (flor.)	
	{	non spinosa	{	purpur.	major. minor.
				lutea	
				luteo variegata	

Videatur Restia bovis, *Trag. Lon.* Anon-
onis seu Ononis, *Math. Tab.* Anonis,
Fuchs. Dod. Cast. Ononis, *Cord. in D.*
Lob. Anonis, *Ger.* Anonis spinosa flore
purpureo, *C. B. 1.*

Crescit in Campestribus, dumetis,
arvis, juxta vias. Floret Junio & Ju-
lio.

OFFICIN. NAT.

Radix ac potissimum hujus. *Cor-
rex.*

Vires. *Calf. & sicc. in princ. 3. absterg.*
atten. discut. Usus *pracip. in diuresi, li-
thiasi, ictero, obstructione epatis, in car-
noso ramice absumendo, Hemorrhoidi-
bus cecis, mariscisve discutiendis (infu-
sum aliquandiu bibitum.)* Extrinsecus
*in putredine oris ac dolore dentium (gar-
garisf.)*

N. Antequam spinas protrudit con-
dicat cum sale pro cibario.

PRÆPAR.

▽. *stillat.* Ex integra planta cum
radicibus novellis eruta.

CCXXXV. Origanum.

Origanum, *Brunf.* Orig. vulgare,
Trag. Math. Lon. Origanum sylvest.

Dod. Cord. in D. Fuchs. Tab. Cam. Agri-
origanum seu Onitis major, *Lob.* Ori-
ganum Anglicum, *Ger.* Origanum sylv.
Cunila Bubula Plinii, C. B. 1. German.
Doffen/ Wolgemuth.

Crescit in locis Campestribus opa-
cis. Floret Junio ac Julio.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus seu Summitatis.

Vires. *Calf. & sicc. 3. aper. absterg. a-
string.* Usus *pracip. in obstructione Pul-
monum, Epatis ac uteri & hinc in tussi,
asthmate, ictero, angustiac, ichorosa ex-
crementa per sudorem expellit (ante bal-
neum assumptum.)* Extrinsecus usu ve-
nit crebriori, eoque in balneis uterinis,
cephalicis, totius corporis (contra sca-
biem.)

PRÆPARATA.

1. ▽ *stillat.* Ex integra planta cum
floribus.
2. Oleum *stillat.* raro prostat.
3. Sal. *cons.* ex cinere, Raro itidem
paratus.

P.

CCXXXVI. Palma.

Philuz. Palma, *Trag. Math. Dod. Al-
pin. Cord. in D. Lob. Cast. Cam.* Palma
major, *Tab.* Dactyliscum palma elate,
Math. Palma elate, *Cord. in D. Dod.*
Caryota, Caritides, fructus palmar
dactyli, *Cast.* Palmarum fructus sive
dactyli, *Lob. Dod.* Palma major, *C.*
B. 1. Dattel. Baum oder Dactel-
Baum.

Crescit in Judæa, Syria, Ægypto,
Africa, & simil. locis calidis.

N. Pal-

N. Palmas feminas non sine aspersione pulveris vel florum e palmis maribus parere asserit Alpinus.

OFFICIN.

Fructus (officinis.) dactyli, palmylae, Datteln.

Eligendi magni flavi, parum rugosi, molles, pleni, carnosae carne subdura ad nucleum candicante, ad corticem rubefcente, & qui concussi minus sonant, sapore vinoso. Detiores sunt graciles, flaccidi, duri & excarnes.

Vires. Dactylorum maturorum pulpa calf. subastring. (immaturi astringunt fortiter.) asperitatem faucium leniunt, foetum in utero roborant, fluxus ventris sistunt, vitis renum ac vesicae succurrunt. Extrinsecus conveniunt in cataplasmaria astringentibus, & simil.

N. Concocti sunt difficiles, capiti dolorem inferunt, (inprimis exiccati) crassum ac melancholicum humorem generant.

PRÆPAR.

Species seu Ele-
ctuarium Diapha-
nicon. Fernelii. }
2. Diaphaniscum } Horum basis est
in solido. i. e. tabel- } Turbith. ac dia-
le El. diaphanicon. } grid. Vid. D. &
purgant. } Turbith. infra de

CCXXXVII, Papaver
sativum.

Μήκων, Papaver (simpliciter.) Arab.
Thaxthax, Mrag, Samen/ Del. Ma-
gen/ Del. Samen/ Mōn.

Album, quod tutius intra corpus adhibetur.

Nigrum, quod non aequè tutum est.

Videatur prius Papaver, Brunf. Lon. papaver sativum, Matth. Tab. papaver album, Trag. Dod. papaver album sativum, Lob. Cast. Ger. papaver sativum semine candido, Fuchs. papaver hortense semine albo, C. B. 1.

Nigrum usitatius inscribitur Papaver nigrum, Brunf. Cast. Pap. sativum 2. vulgò nigrum, Cord. in D. pap. sativ. semine atro, Fuchs. papaver hortense nigro semine, sylvest. Dioscoridi, nigrum Plinio, C. B. 2.

Colitur in hortis. Floret mediâ æstate.

OFFICIN. NAT.

Flores, Semen albi & nigri. Capita cum & sine semine.

Vires. Refrig. & hum. 3. (aliq. 4.) Vires precip. in somno conciliando, in affectibus pectoris ac pulmonum & inprimis in tussi, raucedine, phthisi. Hinc & in fluxu alvi. Extrinsecus in dolore leniendo, somno introducendo (capite pedibusve adhibitum).

PRÆPAR.

1. Succus inspissatus. Ex foliis.

N. De Opio ac Meconio, quæ succi sunt papaverum exoticor. Vide sis infra.

2. Extractum. Ex floribus siccis cum
▽ papav.

N. Quercetanus in Pharm. Rest. c. 25. parat hoc modo. R. Capit. papav. q. v. (cum flores expandere incipit, praestat- que papaver quod flores fert rubicun-

PPPPP 3 dos.)

dos) contunde ac digere in MBcum Hydromelite vinoso, vel vino Canaria dies (1.15.) ut liquor intensissimè rubescat. Exprime fortiter, ut omnis genus gummosa & resinosa eliciatur. Abstrahel. Δ (VB) ad remanentiam gummosa & resinosa substantia, quam adhuc calentem si voles effunde in frigidam & subito coagulabitur. Et hoc, ait, est verum probatumque opium ac nullo modo sophisticum (intellige Germanicum) quod loco opij exotici adhiberi potest, de quo classe sequenti.

3. *Aqua.* Ex floribus vel capitibus florentibus.

4. *Syrup. simpl.* Ex decoct. capit. papav. utr. c. sem. añ. & penidio. Vide Dispens.

5. *Compos.* Fit cum aliis pectoralibus, Vide Disp.

6. *Electuar. 1.* *Diacodium simpl.* Ex Decoct. capit. papav. albi & melle, (vel saccharo, vel sapa cum Glyzyrrhiza.

7. 2. *Diacodium Montani,* seu *Syrupus de Siliquis.* Ex decoct. capit. papav. alb. siliquis. Rad. Althe. & Glyzyrrhiza, cum saccharo cando & penidio.

8. 3. *Diacodium Aetuarij.* Hoc ex astringentibus.

9. 4. *Diacodium insolido i.* c. Rotulæ e emulsione & saccharo. Vide Disp.

10. *Lobach.* Vid. Disp.

11. *Oleum.* Ex semine exprimitur.

CCXXXVIII. Papaver

Erraticum.

Μίνων πόας, Ποας; Papaver fluidum, Papaver rubrū, Klapper-Rose / Korn-Rose / Feldmag; Samen / Grind-Magen.

Est majus Hoc officinarum est. minus Inusitatum.

Dicitur Papaver erraticum, *Math. Cord. in D. Lon. Dod. Cast. Tab.* Papaver erraticum primum, *Euchf.* Papaver Rhæas, *Lob. Ger.* Papaver Rhæas sive flore caducò puniceo, *Lob. ico.* Papaver erraticum majus, C.B. 10. inter spec. Papaveris.

Crescit in arvis juxta vias ac inter segetes. Floret Majo, Junio.

OFFICIN. NAT.

Flores.

Vires. Refrigerat validè, somnum conciliat, dolorem sedat. Usus prap. in febribus, pleuresi, (cui specificè prodest,) angina, aliisque morbis (in primis pectoris) refrigeratione opus habentibus. In inordinato mensium fluore (infus. flor. in V.) Extrinsecus sunt, qui herba Hepati imposita, hemorrhagiam narium sistere conantur, quam vim & radici adscribunt.

N. Galenus semen multò frigidius esse ait; quàm sem. papaveris sativi, unde & internum usus usum interdicat.

PRÆPARATA.

1. ∇. *Stillat.* Ex floribus.

2. *Syrup.* Ex infusione florum triplici.

3. Con-

3. *Conserv.* Ex floribus.

4. *Extractum.* Cum propriâ aquâ
acuatâ. Spir. Sulphuris. *Quercet. Ph.*
Rest. cap. 26.

5. *Acetum*. Ex floribus.

CCXXXIX. *Parietaria.*

Ελζιν, Parietaria, Urceolaris, vitra-
ria, herba muralis, Tag und Nacht/S.
Peters Kraut/Glaß Kraut.

Major vulgaris. *Hæc officinar.*

Minor. Tragi.

Dicitur Parietaria, *Brunf. Cord. hist.*
Dod. Tab. Ger. Parietaria vulgaris &
 major, *Trag.* Helxine, *Manb. Euchf.*
Lon. Cast. Cam. Helxine altera, *Cord. in*
D. Perdicium, *Lob.* Pariet. officinarum
 & Dioscoridis, *C.B.* 1.

Crescit juxta sepes, muros ac parietes. Floret Julio.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Refrig. & humect. parum, e-
mollit, maturat, exterg. subastring. Usus
ejus internus licet rarus sit, tamen prodest
in pectoris mucilagine & hinc in tussi,
in renibus extergendis & hinc in stran-
guria & calculo. Extrinsecus crebrior
ejus est usus, isque in tumoribus, ery-
sipelate, ambustis, vulneribus & ut plu-

rimum adhibetur in clysteribus & cata-
plasm.

PRÆPAR.

▽. *stillat.* Ex integra herba mense
Julio collecta.

CCXL. *Herba Paris.*

Herba Paris, *Matth. Dod. Cast. Ger.*
 Parisherba, *Lon. Cam.* Aconitum par-
 dalianches monococcon, *Cord. in D.*
 Solanum tetraphyllum, *Lob.* Solanum
 quadrifolium bacciferum seu 10. *C. B.*
 Aconitum salutarium, *Tab.* Uva ver-
 sa, Uva vulpina, *Cin. Beer / Wolffs.*
Beer.

Crescit in sylvis opacis. Floret Aprili
& Majo.

OFFICIN. NAT.

Bacca, rarò *Folia*.

Vires. Bacca ac folia refrigerant & sic.
 Usus baccarum internus est alexipharmacus in peste, venenatis morbis, venenisque assumptis. (E. gr. Arsenico.) Extrinsecus foliorum usus est in bubonibus pestilentialibus, aliisque calidis tumoribus in paronychia, in inveteratis ulceribus.

PRÆPARATA.

Pulvis Saxonicus. Vid. D.A.

CCXL1. *Pastinaca domestica.*

Pastinaca est tūm { Latifolia [Elaphoboscum] } Sylvestris } minus
 { Tenuifol. } Sativa seu domestica. } usuales.
 { Sylvestris. } Hujus loci.
 { Sylvestris. } Hac loci sequentis.

Est que

Estque Pastinaca lutea. Carota lutea, gelbe Mohren/gelbe Pastenach/gelbe Rüben.
 sativa. } alba. Carota alba, weisse Pastenach/weisse Rüben.
 } rubra. Carota (simpliciter,) rotthe Rüben.

Videatur Pastinaca sativa, 1. & 2.
Euchf. 1. (& Elaphoboscum.) *Tabern.*
Lon. Sativa Diosc. *Lob. Cord. in D.* tenuifolia (& latifol. sativa,) *Dod. Ger.*
Pastin. 3. *Daucus staphilynus altius &*
hortensis vulgò Carota, Cam. hort.
Carota ex albo flavescens, (& pastin-
naca domest. Cast. nostralutea, Cam.
Staphylinus 1. & 2, Trag. *Staphyl.* sa-
 rivus & *Daucus domesticus, Galeno.*
Sifer alterum, Matth. Tab. *Pastin. te-*
nuiifolia sativa radice lutea vel alba, C.
B. 5.

De rubra vid. *Pastinaca sativ, 2.*
Euchf. sat. rubens, Dod. Tab. atro ru-
 bens, *Lob. Carota, Matth.* radice ru-
 bra, *Cast. vulgaris, Lob. Staphylinus 3.*
Trag.

OFFICIN. NAT.

Semen rarò Herba (Radices culina-
riæ sunt.)

Vires. Semen & herba calf. 3. succ. 3.
Usus pracip. in vulneribus singultu plen-
rifi, torminibus ventris calculo ac mensi-
busspellendis. Specificum habetur ad uteri
suffocationem.

Dosis seminis ʒj.

N. Rarò planta hac in officinas infer-
tur.

CCXLII. Pastinaca
sylvestris.

Pastinaca tenuifolia sylv. Diosco-
ridis, vel Daucus officinarum, C. B. 1.

Daucus agrestis, Galen. Dauc. vulgaris,
Clus. hist. *Pastinaca erratica Plinio,*
Euchf. Cord. in D. Tab. *Staphylinus syl-*
vest. Trag. *Pastinaca sylv. Matth. Lon.*
Cast. sylv. tenuifolia, Dod. Ger. sylv. ge-
nuina Dioscor. Lob. Pastinaca 4. Cam.
Germ. Vogels-Nest.

Crescit passim locis Campestribus
ficcis & arenosis. Floret Julio & Au-
gusto.

Semen, rarò Radix & Herba.

Vires. Eisdem pradiata est virtutibus
quibus Daucus Creticus, cuius quoque lo-
co, in compositionibus adhiberi commodè
poteat. Semen calescit & succ. 3. radix
paulò imbecillius, herba adhuc minus, at-
ten aperit. Usus pracipui in tussi, pleurisi
stranguria, reserat Epar, Lienem, Ure-
tes, ciet menses & molas sedat matricis suf-
focationes, stimulat Venerem. Extrinse-
cus convenit radix pessariis, exiccat her-
ba catharros in lotionibus capitis (partu-
rientium partum promovet (in suffi-
tu.)

PRÆPAR.

1. *Confect. sem.*
2. *ʒ Stillat. Ex tota herba cum flori-*
bus ac radicibus Julio collecta.
3. *Ol. Stillat. Ex semine.*

CCXLIII. Perfoliata.

Perfoliata vulgarissima seu arven-
sis, C. B. 1. Perfoliata, Brunf. Matthiol.
Euchf. Dod. Cord. in D. Lon. Tab. major,
Trag.

Trag. perfoliatum vulgare flor. luteo, folio umbilicato, *Lob. perfoliata* vulgaris, *Ger. German. Durchs Wachs / Bruch Wurk.*

Crescit in locis sabulosis. Floret Junio.

OFFICIN. NAT.

Folia & Semen.

Vires. Calf. & sicc. (amari saporis) vulneraria est. Usus praeceptus in vulneribus recentibus, Enterocelis (inprimis umbilici) tumidis artubus, strumis, sive intrinsecus sive extrinsecus adhibere volupe fit.

OFFICIN. NAT.

▽ *Stillat.* Ex integra herba florente.

CCXLIV. *Malus Persica.*

Perficus, Brunf. Persica, Fuchs. Cam. persica malus, Lob. Tab. Ger. malus persica, Dod. persica arbor & ejus 1. genus, Trag. persica molli carne & vulgaris, viridis & alba, C. B. 1. persicus alba & popularis, Lon. persica viridis & alba, Matthiol. Cast. Germanicè Pfersich Baum.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores, Nuclei, Fructus, sed raro, quippe hi facile putrescunt.

Vires. Fructus (mala persica, Arab. Sanch.) refriger. & humect. 2. nutrimenti sunt pauci, facileque putrescunt. Verum initio pastus laxant alvum. Exiccata constipant, laudanturque in fluxu alvi, &c.

Flores, Folia ac Nuclei, calfac. &

sicc. absterg. Usus praeceptus (florum) in lumbricis infantum, in alvi laxatione, mesenterij obstructione, seipurgatione, & sim. (Nucleorum) in diureticis ac lithontripicis, in obstructione Epatis, ardore stomachi. Extrinsecus adhibentur crebro in emulsionibus dolori capitis dicatis, &c.

PRÆPARATA.

1. *Condit. fructi.* 5. subtrahitur sc. exterior cuticula, hinc condiuntur, l.a.

N. Aptiora ad condituram censentur mala minora quam praeocia.

2. ▽. *Ex floribus.*

N. Alvum infantum lubricam reddit, lumbricosque educit.

3. ▽ *diuretica.* Videl. 2. c. 38. ▽ diuretica ex nucleis.

4. *Syrup. de floribus persica.* Fit ex iteratis infusionibus, ut syr. ex infusione violarum.

Vires. Bilem ac serosos humores educit, mesenterium reserat, vermes enecat.

Dosis ad ʒij.

5. *Conserva florum Persica.*

6. *Oleum.* Fit expressione.

Vires. Sedat aurium, hemorrhoidumque dolores ac tumores, colicos juvat (assumptum.)

CCXLV. *Persicaria.*

Perficaria est { 1. mitis maculosa & non maculosa.
2. urens hydropiper. Hoc officinale.
3. angustifolia.
4. minor, pulicaria pumila.

Q99 99

Dici-

Dicitur *Hydropiper*, *Fuchf.* *Dod. Matt. Cord. in D. Cam. Cast.*
Ger. persicaria 1. *Trag. Tab. Mas. Lon.*
mafcula, Brunf. Perf. urens, Lob. aliis pu-
licaria. Germ. *Flöh. Kraut / Waffer-*
Pfeffer / Mucfen-Kraut.

Crescit locis udis ac palustribus. Flo-
 ret Julio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Hydropiperis Folia.

Vires. Calfic. & sicc. Usus *præcipui*
extrinsecus in vulneribus, tumoribus in-
duratis, ulceribus inveteratis (in cata-
plasm.

N. 1. *Persicaria mitis* habetur frigi-
 da, sed officinis inusitata est, ut species re-
 liqua.

N. 2. *Paracelsus* in *Hydropiperis* de-
 scriptione admodum prolixus est.

N. 3. *Sunt* qui hanc herbam, ad transplan-
 tationem morborum, præsertim incanta-
 tione introductorum utuntur.

CCXLVI. Petasites.

Petastis, Pestilens Wurk / Ne-
gen-Krafft.

Major, mas flore luteo. *Hæc usualis*
est.

Minor, fœmina, flore albo.

Dicitur *Petasites*, *Trag. Fuchf. Dod.*
Cord. Lob. Lon. Tab. Ger. mas, Cam. ma-
ior. Matthiol. Cast. major & vulgaris,
C. B. 1.

Crescit in locis humidis. Floret ini-
 tio veris.

OFFICIN. NAT.

Radix, quæ gummosa est.

Vires. Calf. & sicc. 2. part. est tenuium,
amari saporis: atten. aper. sudorifica est
ac alexipharmaca in peste, in lipothymia
uterina, morbis pectoris, à mucilagine
tartarea oriundis. E. g. tussi, asthmate.
Extrinfecus commendatur ad bubones &
ulcera maligna.

N. *Substitu* potest *costo*, quippe *vir-*
ibus eidem equipollere compertum est.

PRÆPAR.

1. *∇. Ex radicibus vel ex tota h.*
2. *Oleum stillat. sed rarum est.*
3. *Extractum.*

CCXLVII. Petroselinum.

Apium hortense, seu *petroselinum*
vulgare, C. B. 1. Petrosel. Trag. Brunf.
Cord. vulgare seu nativ. Lob. hortense,
Matth. Lob. Dod. Cast. Ger. sativum,
Tab. Apium selinum Diosc. Petroseli-
num, persilium, orefelinum, Fuchf. A-
rab. Karphi, Peterlin / Peterfilg / Gar-
ten-Eppich.

N. *Petroselinum verum seu verum*
est petrosel. Macedonicum (quod sequi-
tur.)

Gaudet solo humide, colitur in hor-
 tis. Floret Junio, Julio & Aug.

OFFICIN. NAT.

Radix, (colligitur vere.) *Semen*, (col-
 ligitur Augusto.) & *Folia.*

Vires. Calf. & sicc. in princ. 2. atten.
aper. exterg. diuretica sunt, Epatica,
&c. Usus præcip. in obstructione Pulmo-
num Epaticæ, Lienis, Renum ac Vesicæ, &
hinc in tussi, lètero, Cachexia, calculo,
fabulo, mensibus obstructis, asthmate,
&c.

Etc. Extrinsecus resolvunt humores calidos (inprimis oculorum suggillationes) impediunt capillorum casum (cum Abrotan.) imminuunt lac (mammis imposita) adeoque mulierculis nostratibus usui sunt in ablactatione infantum.

N. Forest. l. 16. 6. commendat adtussim puerorum &c. Succ. Petr. 3ß. Lact. muliebr. 3j. Cumin. ʒj. M. dat epide.

PRÆPAR.

▽ Stillat. Ex integra planta cum radice, coll. initio veris.

CCXLVIII. Petroselinum
Montanum.

Ορεισελίνον, Dod. Lob. Clus. in f. 1. Tab. Apium montanum, Cast. folio ampliore, C. B. 6. Elaphoselinum, polychreston. Cord. Berg. Peterlein / Berg. Eppich / Hirsch. Peterlein / wilde Peterfilien.

Crescit in locis montanis, sabulosis, ut & in hortis.

OFFICIN. NATIVA.

Radix atque Semen.

Vires. Calf. & sic. 3. est alexipharmacum, sudoriferum, diureticum, discutiens. Usus præcip. in calculo Renum & vesicae, in peste (sudorem eliciendo) in morbis & flatibus, in stranguria.

CCXLIX. Petroselinum
Macedonicum.

Πετροσελίνον, Macedonicum, Matth. Lob. Cast. Dod. Tab. aliàs Apium saxatile, Peterlein / Stein. Eppich / Stein. Peterlein.

Colitur apud nos in hortis. Gaudet solo sabuloso ac saxoso.

OFFICIN. NAT.

Semen raro Radix.

Vires. Calf. sic. (3.) absterg. atten. aper. alexipharmacum est, unde & Theriaca compositionem ingreditur. Usus præcip. in urina ac mensibus sciendis; in reliquis cum viribus petroselinorum speciebus adscriptis convenit. Adhibetur & morbis veneficio introductis.

CCL. Peucedanum.

Πευκεδάριον, Peucedanum, Trag. Fuchs. Cod. Cord. in D. Lob. Lon. Ger. Tab. 1. Cam. Matth. Cast. Peucedanum, C. B. 1. & 2. aliis fœniculum porcinum: German. Haar. Strang. Sätv. Fenchel / Schwedel. Burk. Himmel. Gall.

Crescit in montibus opacis. Colitur & in hortis: Floret Julio.

N. 1. C. B. duplex facit Peucedanum alterum Italicum, alterum Germanicum: Verum enim verò promiscuè in usum accersiri poterunt.

N. 2. Radicem Peucedani officinis usuaalem, non esse legitimam. Vid. ap. Matthiol. & Castor.

OFFICIN. NATIVA.

Radix colligenda, Vere Autumnove.

N. Radix impregnata est succo resinoso, qui tamen in usum medicum nondum venit, licet aliàs magnificat.

Vires. Calf. & sic. 3. aper. atten. expectorat, mucilaginem tarraream bilem- quæda. cit. Usus præcip. in affectibus pe-

Q9999 2

floris,

*Etloris, tussis, inflationibus (so die Lungen
den Hals steigt.) sim. in obstruct. E
patis, Lienis, Renum, ciet urinam, calcul-
lum atterit & expellit. Extrinsicus in
Hemicrania, aliisque generibus cepha-
lalgia à catarrhis ortum ducentibus, in
tumoribus renitentibus, ulceribus inve-
teratis mundificandis, promouet capillo-
rum proventum, &c.*

PRÆPAR.

1. Sal. { quæ raro pro-
2. Oleum stillar. { stant officinalia.

CCLI. *Pimpinella*,
Bipenella.

Τραγοτέλιον, Bibinella, Bimpinella,
Bibernell / Bibinell / Stein-Peter-
lein / Vocks Peterlein.

Bibi-
nella } laxifraga { major } promiscuè
 } minor } usuales.
 } sanguiforba, Italica. Vide suo
 loco.

Major est *Pimpinella saxifraga* major candida, *C. B. t. Pimpinella, Cora. Eon, Trag. Fuchf. Lob. Cast. Pimpinella saxifraga, Matth. Cam. Pimpinella saxifraga major, Ded. Tragofelinum majus, Tab.*

N. 5. Hujusradici adnascitur quibusdam in locis granum rubrum, quo utuntur Tinctores ad colorem Carmesinum, unde sunt qui pro cocco habent.

Minor, est pimpin. minor. C. B. 4.
minor, Fuchf. pimp. saxifrag. minor,
Cam. Tragofelinum petrzum, Tab. sa-
xifrag. patva. Dod.

N. 2. Hac praestantissima est, petroseli-
ni Macedonici loco compositiones ingre-
di potest, si id deficiat.

Gaudent solo pingui, sed inculto :
Florent Julio, Augusto.

OFFICIN.

Radix, Folia, Semen.

Vires. Calf & ficc. (major. in princ.
3. minor. compl. g. 3.) atten. aper. ac sterg.
sudorifica est, luhonriptica vulneraria.
&c. saporis acris. Usus præcip. in præca-
vendis ac curandis venenis ac contagiosis
morbis, in referendis obstructionibus he-
patis, Renum, Pulmonum, mensum. In
arena, calculo ac stranguria, in colicis do-
loribus, tussi, asthmate, peripneumonia:
in cruditate ac imbecillitate ventriculi:
in lue venerea: Antidotus nem est ar-
genti vivi. Extrinsecus valet: in ma-
culis faciei abstergendis: In odontalgia:
auget lac, maturat bubones, caneros-
que immores, mundificat ac consolidat
vulnera, tam recentia, quàm invetera-
ta.

PRÆPARATA.

1. *Consis.* Exradice.
 2. *Conf. Et.* Exradice vel ex semine.
 3. *Conserua.* Ex semine.
 4. *✓ Stillar.* Exradice ac integra herba florente Junio mense collecta.
 5. *Oleum stillar.* Extota planta cum radice.
- N. Sunt qui in vino rubello semen macerant rursum, exsiccant, atque sic oleum exprimere conantur.
6. *Sal.* Excinere.

CCLII.

CCLII. *Pinaſter ſeu pinus ſylveſtris.*

Pinus { *Sativa. Vide loco ſequenti.*
 { Sylveſt. { montana { 1. Fructifera
 { { 2 3 Steriles
 { { maritima major & minor, &c. { promiſcue uſuales.

Videatur Pinus ſylv. *Brunſelf. Trag.*
Lob. Maith. Caſt. Dod. Tab. &c.

OFFICIN. NAT.

Cortex, Folia, Nuceſ, Refina.

Vireſ. Cortex & folia reſrig. & ſicc. adſtringunt. Uſus prap. (externi) in dyſenteria, ſtuore menſium (ſuffiſcendo.)

PRÆPARATA.

1. ∇ ſtill. Ex conis viridibus.

Vireſ. Rugas faciei delet & mammas admodum in virginibus extuberanteſ cohibet (impoſita cum linteoliſ.)

2. *Oleum.* Fit ex ligno per deſcenſum igne leni, ut oleum ex abiete.

N. Forſan hoc oleum eſt officiniſ Templinum dictum.

Vireſ. Impetigineſ ſanat inunctum: Verrucas conſumit vulneratiſ verrucis inditum.

CCLIII. *Pinuſ & Pineæ.*

Pinuſ, Pinuſ, Brunſ. Trag. Dod. Cord. in D. Lon. Caſt. Pinuſ domeſtica, Maith. Tab. Pinuſ ſativa, Ger. Pinuſ vulgatiſſima, Lob. Pinuſ Italica, Cam. Pinuſ ſativa, C. B. 1. Arab. Sonabar. Fichren. Baum / Herk. Baum / Rinn. Holz / Foren. Holz.

OFFICIN. NAT.

Nuceſ Pineæ, Cortex & Folia.

Vireſ. Nuceſ Pineæ (ſtrobili, Coniſoccati & conaria veteribuſ) caliditate

temperate ſunt & humide, maturant, leniunt, agglutinant, reſolvunt, impinguant, adeoque nucleorum Uſuſ prap. eſt in phthiſi, (quia nutriende bene) tuſſi, ſtranguria ac acrimonia urina mitiganda: ſegnem excitant Venerem, ulcera Renum mundificant, &c.

Corticeſ & folia viribuſ conveniunt cum cort. & fol. pini ſylveſt.

PRÆPAR.

1. *Oleum.* Exprimitur ex nucleis.

2. *Conſect.* nucleorum.

CCLIV. *Piper.*

Pinuſ, Arab. Fulſel, Filſel, Pfeffer.

{ Album: hoc omnium
 { { prap. ſiſſimum.
 { Rotundum { Nigrum: ſuccedit albo.
 { { Orientale minus,
 { Longum Ma- { Tab. Hoc uſuale.
 { cropiper. { Occidentale majus,
 { Tab.

Album, dicitur piper album, Maith. Lob. Fragof. Cluſ. Caſt. Tab. Piper rotundum album, Cord. hiſt. Piper rotundum album, C. B. 2.

Creſcit rotundum in Malvar ac ſinitimis Inſuliſ Jayæ, Sunda, &c. fructuſque eſt plantæ cujuſdam, quæ arboribuſ inſtar convolvuli circumducitur.

Q9999 3

Eli-

Eligendum recens, ponderosum plenum, acre non cariosum.

N. 1. *Calf. & succ. 3. incid. atten. aper. resol.* Usus *pracip. in frigidi- tate ac cruditate ventriculi, colicis doloribus (præstat album) in visus imbecillitate (quia flatus discutit. Extrinsicus in apoplegmatismis, gargarismis, sternu- toriis, sedat odontalgiam, columellam in- midam imminuit, nervorum affectus fri- gidos juvat.*

N. 1. *Vis piperis volatilis valde est.* Vuentur ergo præparationes in quibus vo- latile evanescit, e.g. *Extractorum præpa- rationes.*

N. 2. *Vulgus piper longum in paro- xysmis febrium exhibere solet, id quod non nisi in principio locum habere potest.*

PRÆPARATA.

1. *Spec. diatrion. pipereon. V. D.*
2. *Tragea seu species fortes. V. l. 2.*
3. *Oleum piperinum stillat. Fit ex ni- gro, ad modum, quo ex reliquis aroma- tibus.*

N. *Piper parcissime oleum dat. (scil. ℥j. det ℥j. circiter (ideoque ▽ destillata aliquoties super remanentiam seu caput mortuum refundenda erit.*

Vires. Admodum penetrabile est, fla- tus discutit; paroxysmum tertiana præca- vet, si hor. 2. ante paroxysmum exhibea- tur, purgato tamen corpore. Extrinsicus admiscetur inunctionibus dorsi in fe- bribus.

Dosis gr. ij. iij. iv. &c.

4. *Ol. de piperibus. V. D.*

CCLV. Pistacia.

Πισαρία, Pistacia, Matth. Cord. Lon. Dod. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. Tere- binthus Indica Theophrasti, Lob. C. B. 1. Arbore est Indicæ Terebintho simi- lis.

Nascitur in Persia, Arabia, Syria, India. Quin & Italiæ indigena facta est.

OFFICIN. NAT.

Fructus (Pistacia, phisticia, Bisania, Fistici, Pimper-Müßlein.) Sunt nuclei duplici vestiti putamine, primò exte- riore coriaceo, hinc lapideo, quod nu- cleum proxime continet, membranula tubella circumdatum.

Eligendi nuclei recentes, ponderosi, extrinsecus albidii, intrinsecus virides, non racidi, in apice aliquantulum pa- tentes.

Vires. Calf. 2. hum. 1. atten. aper. U- sus pracip. in mucilagine pulmon. obstr. Epanis, roborant stomachum, arcent nau- seam ac vomitum, exiccant appetitum, bonum suppediat nutrimentum.

PRÆPAR.

Oleum exprimitur ex nucleis.

CCLVI. Plantago.

Ἀγρόζωσων, Wegerich.

Species plantag. usualiores sunt tres.

1. *Dicitur plantago latifol. sinuata, C. B. 2. rubra, Trag. Brunf. major & 1. Lon. major, Matth. Fuchf. Dod. Cast. Tab. Cam. latifolia, Cord. latifol. levis, Lob.*

2. *Plantago latifolia incana, C. B. 3. Plant.*

Plant. major, *Matth. Lon. Cam.* latifolia minor Dioscoridis, *Tab.* major incana, *Lob.* Plantago media, *Fuchf. Dod.*

3. Plantago angustifolia major, *C.B. 1* plant. minor, *Fuchf. Dod. Lon.* media, *Cast.* plantago lanceolata, *Trag. Tab.* plantago longa, *Matth.* plantago quinque nervia, *Lob.*

Crescunt locis herbosis, florent Maio & Junio.

OFFICIN. NAT.

Semen, Folia, Radix.

Vires. Refrigerant & sicc. 2. absterg. in crass. epatica sunt ac vulneraria. Usus precip. in fluxionibus cujusunque generis. E.g. alvi, expuitione sanguinolenta, gonorrhœa, mixtione involuntaria in mensium profluvio, in febribus, & sim. Extrinsecus in mundificandis consolidandisque vulneribus ac ulceribus inveteratis.

PRÆPARATA.

1. Succus inspissatus. Extractus ex foliis.

1. ∇ . stillat. Ex herb. integr.

3. Sympus de succo.

CCLVII. Pœonia.

Παονία, Arab. Feonia, Pœonien / Benia, Rosen / Pfingst-Rosen / Gicht-Rosen / Königs-Blum.

Mas. C.B. 1. Hæc præpollet.

Fœmina { flor. simpl. C.B. 2. &c.
 { flore pleno, C.B. 12. &c.

Mas dicitur: Pœonia nobilior vel 2. *Trag.* pœonia mas. *Matth. Cord. in D. Lob. Dod. Tab. Ger.* Pœonia folia

nigricante splendido, *C.B. 1.* Fœmina nuncupatur pœonia, *Trag. Lon.* pœonia fœmina, *Brunf. Fuchf. Cord. in D. Lob. Cam.* pœonia fœmina altera, *Dod.* pœonia vulgaris fœmina *Clus. hist.* pœonia communis vel fœmina, *C.B. 2.*

N. Discernuntur invicem Mas & Fœmina foliis & radice. Mas est foliis nigricantibus splendidis, juglandis folia amulantibus, radice digitali crassa, alba, seu mas non una radice nixus est, sed plures habet, Fœmina variat colore foliorum. Est folio utrinque virente & glabro, caule hirsuto, flore vel simplici, vel pleno, foliis helleborum amulatur, radicibus seu balanis longiores circiter octo aut sex adherent. Mas plures habet, &c.

Coluntur in hortis. Florent Maio.

OFFICIN. NAT.

Radix, Semen seu grana: Flores.

Radix effodienda est Vere, & decrescente (3. & ante novilunium.) Alii effodiunt & existente in & dieque ac hora solaribus, & decrescente. Flores colligendi sunt Maio. Semen Augusto.

N. Pœonia flore multiplici, raro semen producit.

Vires. Calf. & sicc. 2. saporis est subdulcis ac subacris, seu amari, subastringit. Usus precip. in affectibus Cephalicis, Epilepsia, incubo, &c. Uterinis, mensibus obstructis, lochiis purgandis, doloreque post partum mitigando, Epatis obstructione. Extrinsecus sustentuntur

*antur grana ac radix de collo pro arcen-
da Epilepsia.*

PRÆPAR.

1. ▽. Ex floribus, additâque si placet radice.

2. Syr. Ex infusione florum.

3. Extract. Ex floribus exiccatis.

4. Conserv. Ex floribus.

5. Sal. com. Ex incinerata integra planta.

6. Fecula. Ex radice. l. a.

7. Oleum stillat. Ex granis elicitur cum ▽ fermentat. l. comm.

CCLVIII. Polygonum.

Πολύγονον, { Majus, varii generis est, è
quibus usuale latifolium,
C. B. I.

Minus variorum itidem
generum, quæ cuncta minus
usualia sunt.

Dicitur centumnodia, Lob. Brunf.
Polyg. mas, Matth. Fuchf. Dod. Cord.
Cast. Trag. vulgare, Cam. majus, Lon.
Tab. German. Weg-Gras / Wegdrit /
Denn-Gras / Blut-Kraut.

Crescit locis incultis, aridis ac juxta
vias. Floret integrâ ferè æstate.

OFFICIN. NAT.

Herba.

Vires. Refrig. 2. (al. in princ. 3.) sicc.
astring. vulneraria est. Usus præcip. in
sistendis fluxibus quibuscunque, diar-
rhæa, dysenter. Fluxu uter. vomit. Ha-
morrhagia narium. Extrinsec. prodest
vulneribus, ulceribus, inflammationibus
oculorum, mamma tumoribus, febris ter-
tiana (carpi) imposita.

PRÆPARATA.

▽. Stillat. Ex herba collecta in prin-
cipio Augusti.

CCLIX. Polygonatum.

Est { Latifolium, varii generis, è qui-
bus usuale vulgare, C. B. I.
Angustifolium, varii generis, quæ
minus usualia.

Dicitur Sigillum Salomonis, latifo-
lium, Trag. polygonatum. Matth. Cast.
vulgare, Cam. latifolium, Fuchf. Dod.
Tab. majus, Lon. German. Weiß-
Wurk.

Crescit in sylvis & collibus. Floret
Majo.

OFFICIN. NAT.

Radix, rarò Folia, rarò Bacca.

Vires. Temperamenti est mixti, sub-
astr. exterg. saporis est subamari ac suba-
cris. Usus internus est in fluore albo mu-
lier. Bacca pituitam mucilaginosam per
vomitum ac secessum educunt. (Dof. n. 14.
15) Idem dicitur & de radice (3.) ac
de foliis. Extrinsecus faciei maculas ab-
stergit, currim dealbat, resolvit sugillatio-
nes ac tumores renitentes, lotionem fugat
lenticulos capitis, scabiemque infantum
exiccat, cicatrices, maculasque morbillor.
emendat, &c.

PRÆPAR.

▽. Ex radice cum foliis ac flori-
bus.

CCLX. Pomus.

Μηλέξ, Malus, Apffel-Baum.

Poma

129

Poma sunt { Domestica { acida.
 { { dulcia.
 { Sylvestria. { subacida.

Vires. Acida sunt nature frigidioris ac astringentis. Verum cum butyro cocta cibum febricitantibus præbent commodum.

Dulcia sunt natura calidioris ac laxantis.

Subacida seu vinosa, nature sunt mixta, conveniuntq; ventriculo & cordi.

Sylvestria. *Astringunt.*

*Extrinfecus (dulcia sub cinere cocta)
sedant dolorem acutorum, pleuritidis
(cum myrrha imposita.)*

PRÆPARATA.

1. *Succus fermentatus, seu vinum pomorum pomaceum.*

N. *Vulgatissimum est in Normannia Gallia Provincia, adeò ut non modo potus loco habeant, sed & ex eodem ∇ m vita destillent, & aceta conficiant, qua vel cum spiritu ac acetis ex vino, certare videntur.*

2. *Syrupus de pomis simpl.* Ex succis
pomor. dulcium ac vinosum.

Vires. Succurrit affectibus cordis syn-
cope, palpitat. ac aliis ab atra bile ortis.
Ventriculo gratus est, sedat sitim, febris
auxiliatur.

3. Syrup. de Pomis Regis Saborum. V.
D. & infra de Sena.

4. *Extract.* seu succus inspissatus pomorum dulcium fragrant.

5. *Extract.* è radice arboris fructus

acidosferentis, fit l. a. cum ∇ expomis
propriis destillata.

Vires. Summum est medicamentum
contra vim ventris profluvia, dysenteri-
am, lenteriam, diarrhaam, fluxum epa-
ticum. Quercet. P.R.c. 28.

CCLXI. *Populus.*

Est } alba latifolia, weiß Pappel-Baum
Aspen.
nigra, schwarz Pappel-Baum.
Hac usualis.

Alba dicitur, Pop. alba, *Matth. Dod.*
Cord. in D. Lob. Cast. Tab. Ger. Populi
 albae, aliae species, *Trag. C.B.I.*

Nigra dicitur: Populus alba, *Trag.*
Lon. Populus nigra, *Matth. Dod. Cord.*
in D. Lob. Cast. Tab. Ger. C. B. 3.

OFFICIN.

Cortex. Pop. albæ, sed rarò. Oculi,
Pop. nigrae.

Vires. Utraq; natura est mixta, (sed humido sicca) ceterum ad frigiditatem inclinans abstergitque. Cortex pop. alba precipuè adhibetur in dolore ischiatico intus & extra, in stranguria, in ambustis. Oculi seu gemma (σπέγματα,) pop. nigr. adhiberi solent à sexu muliebri ad capillos adornandos & promovendos, prosunt itidem ad dolores sedandos.

N. 1. Est & gummipop. nigra, quod
calfac. 2. sed minus id usuale est.

N. 2. Succus in foraminibus populi
collectus, verrucas ac impetigines curare
creditur.

PRÆPAR.

1. *Oleum populinum.* Ex oculis pop.
Rrr rr- nigr.

nigr. (primo Vere collectis) & oleo veteri. Vide Disp.

N. Alij addunt quoque vinum & coquunt adhuc consumptionem.

2. Unguentum populeon. V.D.

Vires. Refrigerat, somnum conciliat.

CC LXII. Porrum.

Πόροςιον, { capitatum, Alesch.
Dome- Lauch.
sticum } sectile, Schnitt.
Lauch/ } Lauch.
Usuale sylvestre.

Dicitur Porrum, Bransf. Cord. in D.
Dod. Cast. Tab. Porrum commune,
Matth. vulgare, Lob. porrum capitatum,
Fuchf. porrum capitatum vulgare,
Cam. porrum commune capitatum,
C. B. 1.

N. Capitatum & sectile non differunt genere, sed solum culturâ. Sectile enim dicitur, quod detondetur ad culinares usus: capitatum, quod sine detensione linquitur & autumno transplantatur, ut capitatum fiat.

Gaudet solo pingui. Seritur Martio & Aprili.

OFFICIN. NAT.

Radix, Herba, Semen.

Vires. Porrum: calfacit insigniter ficitque, attenu. aper. incidit, resolvit. Usus precip. in serpentum morsibus &ussionibus, mucilagine pulmonum. Extrinsecus in auxilium tinnitu ac suppurationibus, in ventis hamorrhoidum tumidis ac dolentibus, &c. Semen urinam ciet.

N. Frequens ejus usus, somnos turbulentos inducit, visuique officit.

CCL XIII. Portulaca.

Πορτολακία, Arab. Backaleancha. Porcellana, Buihel/ Borkel/ Gensel.

Laufoliatata. Haec praefertur.

Angustifolia sylvestris.

Interbitur Portulaca, Lon. Cord. hortensis, Trag. Fuchf. Dod. domestica, Matth. Lob. Cast. Tab. Ger. major, Cam. Portulaca latifolia seu sativa, C. B. 1.

Floret Junio: Crescit locis arenosis & sabulosis.

OFFICIN. NAT.

Folia, Semen.

Vires. Refrig. 3. sicc. 2. astring. paucitrimimenti est, lumbricos fugat & expellit. Usus precip. in mitigando fervore bilis, & hinc in febribus putridis malignis, ardore urinae, ut & in scorbuto, apprimet: succurrit febricitantium astui (folia recentia applicata secori, Renibus, &c.

N. In tabe prodesse, succulentia & crassities foliorum arguunt.

PREPAR.

1. Succus inspissatus.

2. Stillat. Ex herba.

3. Syrupus simpl. Ex succo.

4. Compos. Vide Disp.

N. Solet & condiri ad modum quo Cappares condiantur.

5. Conseru. Ex foliis.

CCL XIV. Primula veris.

Φλομίο, Herba Paralysis, Cast. Brunf. vulgaris, Trag. primula veris, Matth.

Tab.

Tab. major, fl. luteis odoratis, Dod. Primula pratensis, Lob. verbasculum odoratum, Fuchf. Achriticum, Gesn. simplex luteo flore, Cam. verbasculum pratense odoratum, C.B. 1. German. Schlüssel-Blumen/Himmel-Schlüssel/S. Peters Schlüssel/weiß Betonien.

Crescit in campestribus ac sylvis. Floret Aprili.

OFFICIN. NAT.

Flores ac Folia.

Vires. Calfac. leniter, siccac fortius, saporis est subacris ac subamari substring. Anodyna est. Usus pracip. in affect. capitis Apoplexia, Paralyti. In articulorum doloribus. Extrinsecus in Arthritide ac tumoribus, qui illius venenatorum animalium subsequuntur.

N. Acetum radicibus imprægnatum ac loco errhini in naves attractum, odontalgiam mirabiliter sedat.

PRÆPARATA.

1. ▽. Ex integra herba (caule, foliis ac floribus.)

2. *Conserv.* Ex floribus.

CCLXV. *Prunella.*

Brunella, Dod. Brunf. Lob. Brunella vulgaris & 6. Trag. consolida minor, Matthiol. minima, Cam. Prunella, Fuchf. Cam. Tab. Ger. symphytum petraeum, Lob. ico. Cord. in D. German. Brunellen/ Gottheit/ S. Anthouii Kraut.

Nomen ducit ab Anguina, quam Brunellam alii vocant.

Crescit in campestribus ac locis her-

bosis. Floret Junio, & hinc ferè integrâ ætate.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores.

Vires. Calf. & sicc. (Subamara est) abstergit, consolidat, vulneraria est. Usus pracip. in vulneribus imprimis Pulmonum, in sanguine coagulato. Extrinsecus in vulneribus & creberrimè in gingiva, aliisque affectibus oris ac faucium (gargaris.)

N. Author est Crollius, radicem aridam denti dolenti affricatam, ut sanguinem susceperit, magneticâ vi dolorem sopire, si salici indatur perforata, foramenque mox tubulo ex salice obturetur.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex integrâ planta Augusto collecta.

2. *Conserv.* Ex floribus.

CCLXVI. *Prunus*

Prunus { Domestica sativa, hujus loci. Sylvestris, Vide Acacia.

OFFICIN. NAT.

Коккунда, Pruna, Pflaumen/(fructus pruni.

Varii sunt generis colore, sapore, figurâ & magnitudine differentiâ, sunt enim dulcia, subacida, acida. Sunt purpureo-nigra, rubra, lutea, (cerea, Spilling/alba: sunt oblonga, rotunda: sunt denique majora, minora, &c. In officinis autem usitata sunt pruna Damascena (*Stretschien /*) cujus vicem subeunt pruna Ungarica, tum quoque nostratia dul-

ciora in clibano exiccata. Præterea sunt & Pruneola, (Pruna de Brignioles, è loco natali in Galliis,) qua enucleata & exiccata afferuntur, C. B. 15. pruna ex flavo iufefcentia, mixti saporis, gratissima. Germ. Pflaumen/Prunellen.

Palma datur Damascenis, quæ ex Syria Venetias sicca afferuntur, nucleoque sunt longo & plano potius quam rotundo. Secundo loco sunt, quæ ex Pannonia (unde Ungarica dicta sunt, aliis etiam Damascena, Cord. in D. & Transylvania adferuntur, at Dod. Moravica magis ad alvum leniendam probantur. His 3. subjungi poterunt & nostratia, sed viribus ea minora sunt.

N. Est & gummi prunor. ad calculum atterendum utile, sed rari usus.

Vires. Pruna natura refriger. & humect. Recentia cruda, emolliunt alvum quidem, verum facile putrescent & proin minus commodè (in primis post cibum) esitantur, maxime si immoderata usus sit. Pruna Damascena usui aptiora sunt, laxant, acrimoniam humorum obtundunt, linguam (macerata in frigida ac ore retenta) humectant, sitim mitigant.

Pruneola (seu Prunella dicta) refrigerant magis quam reliqua, humectantque sed citra alvi commotionem, adeoq; esu aptiora censentur, gratumq; refrigerium in febribus exhibent.

PRÆPAR.

1. *Conditio pruna* (ceræa) cum mell. p. ij & vini p. j.

2. *Pulpa prunor.* Ex magnis acidis & vinosis fit, coctis scil. perque setaceum trajectis & cum saccharo $\frac{1}{3}$ circiter infussatis.

3. *Electuarium Diaprunis simpl.* Eodem modo paratur, ex pulpa & sacchar. $\frac{1}{2}$.

4. *Diaprunum compositum* lenitivum Diadamascenon. *Vine Dispensat.*

5. *Diaprunum non laxativum.* V. D. Norib.

CCLXVII. Piarmica.

Piarmica, *Matth. 1. Fuchsf. Lon. Cast. Lob. folio* Taraxaconis, *Lob. Pratenfis, Cam. Ger. Draco* sylvestris sepiarmica, *Dod. Tanacetum album seu acutum, Trag. (& millefolium 3.) Tab. Pyrethrum, Brunself. ico.* aliis Pseudopyrethrum, *Dracunculus pratenfis serrato folio, C. B. 2.*

Crescit in pratis, ut & arvis etiam incultis, aliisque locis saxosis. Floret Maio, Junio ac Julio.

OFFICIN. NAT.

Radix & Folia.

Vires. *Calfac. & sic sternutatoria sunt* (ob acrimoniam,) sed rarioris usus.

CCLXVIII. *Pulegium*.

Ελάχον ἐλάχων.
Pulegium { Latifolium } *foemina. Hoc usitatus.*
 { mas. *Hoc subjungitur.*
 { Angustifolium Cervinum, cui subjungitur Creticum & Massilioticum, quæ minus usualia.

Insignitur *pulegium*, *Brunfels. Trag.*
Matth. Fuchs. Cord. Dod. Lon. Cast. Cam.
Pulegium Regium, Lob. Pulegium latifolium, C. B. 1. German. Polen/ Stöb Kraut/ (quia fumus ejus pulices fugare creditur.

Crescit locis cultis & incultis, humidis ac campestribus. Floret Julio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia, quæ eligenda cauhbus ad rubedinem inclinantibus.

Vires. *Calf. & sicca. 3. saporis subacris & subamari* partium tenuium, attenu. incid. aper. resolv. *Usus* præcip. in mensibus sciendus, fluore albo, sæpe ejiciendo, confert Epaticis ac pulmoniacis: nauseam ac tormina ventris discutit, calculum ac urinam pellit. Ictero ac Hydropi medetur. *Extrinsecus*, prodest capiti, somnum arcer, vertiginem discutit, doloribus arthriticis convenit, dentes abstergit, pruritus cutis curat, &c.

CCLXIX. *Pulmonaria*.

Lungen-Kraut/ Latifolia.

Pulmonaria { Angustifolia } *vulgaris, Schmal-Blätterich Lungen-Kraut.*
 { Plinii, *Schmal-Blätterich Hirsch-Mangolt.*

Crescunt in dumetis opacis ac umbrosis. Florent Aprili.

Eligitur præ cæteris latifolia. Hæc insignitur *lymphytum maculosum* seu

PRÆPARATA.

1. *Conserv. è summit.*
2. *∇ stillat. Ex herba.*
3. *∇ bis destillata. Ex herba.*
4. *Ol. stillatiuum.*

Pulmonaria arborea.

Musculus pulmonarius, Lob. C. B. 7. pulmonaria, Trag. Matth. Fuchs. Dod. Lon. Tab. prima, Cast. Germ. Lungen-Kraut.

Adnascitur arboribus præsertim, v. g. *Quercui* & aliis: tum & petris, sed hic candidior est. Vide *Lichen Petreus*.

Vires. *Refrig. & sicca. moderatè* (aliis calefacit.) *Usus* præcip. in affectibus pulmonum scil. erosione, tussi, asthma, in profluvio alvi ac uteri. *Extrinsecus* in vulnerum sanguine compefcendo. Vide & *lichenem* cum quo, ut figura, ita & viribus ferè convenit.

Pulmonaria latifolia, C. B. 1. Pulmonaria altera, Matth. Cast. maculosa, Lob. Cam. Tab.

N. *Folius variat, quæ aliquando albis punctis*

Rrrrr 3

punctis notantur, aliquando carent: floribus est communiter caruleo rubentibus, rarius albis. Sunt qui in marem & feminam distinguunt.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Refr. & sicc. consolidant, conglutinant (al. calf.) Usus precipuus in affectibus pulmonum, phthisi, exspuitione sanguinis. Extrinsecus in vulneribus.

CCLXX. Pyrethrum.

Πύρεθρον, Pyrethrum flore bellidis, C.B. 1. pyrethrum, Brunf. Trag. Fuchf. Dod. 2. Matth. Cam. Tab. majus, Lon. verum, Cast. officin. Lob. German. Bertram/ Zahn-Wurk/ Speicheltwurk/ Geiser-Wurk.

Crescit in Italia, aliisque locis calidis ac orientalibus, ut & in Helvetia, apud nos non nisi in hortis colitur.

N. Pyrethrum Germanicum seu pseudopyrethrum. V. Ptarmica.

OFFICIN. NAT.

Radix sola.

Vires. Calf. & sicc. ultra 3. atten. incid. sudorem validè movet. Usus precip. sed rari in viscoso plegmate corporis, ac precipue pulmonum, quod attenuat atque per exspuitionem ac urinam expellit, ad Venerem stimulat, quartanam curat. Extrinsecus in Odontalgia frigida, in Batracho apophlegmatizans insigne est: juvat & in Hemicrania: Paralyin ac stupida membra sanat, rigores febris precavet (inunctum dorso ac plantis pedum).

CCLXXI. Pyrola.

Pyrola rotundifolia major, C.B. 1. Pyrola, Matth. Brunf. Dod. Lob. Cast. Tab. Limonium, Fuchf. sylvestre, Trag. Limonium & Pyrola, Lon. Germ. Winter-Grün/ Wald-Mangolt.

Crescit in sylvis humidis. Floret Junio.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Refrig. & sicc. astring. consolidant, vulneraria sunt. Usus interno & externo celeberrima.

CCLXXII. Pyrus.

Ἄπριος, ἄπριος, Birn-Baum.

1. Pyra	{	Domestica	{	2. Acida.
		Sylvestria.		Acerba.

Vires. Refrig. astring. & sicc. sunt. Cocta verò melioris nota censentur, & ut schola Salernitana habet.

Cruda gravant stomachum, relevant pyra cocta gravatum.

Differre tamen viribus, prout sapor differunt, non difficile est colligere, dulcia laxant, acida & acerba astringunt, &c.

N. Aresacta cocta & comestica commendantur in fluxu alvi.

PRÆPAR.

Ex pyris vulgaribus fit, 1. Pyraceum vinum, German. Birn-Wein/ quod rusticis nostratibus loco vini infervit, paraturque ad modum quo vinum.

2. Ex eodem pyraceo fit acetum rusticis nostratibus vulgatissimum.

3. Con-

3. Condita pyra muscatellina cum decocto proprio.

Q.

CCLXXIII. *Quercus.*

Agg. Quercus, C. B. 4. Quercus, Maub. Fuch. Dod. Trag. Lon. Tab. vulgaris, Lob. Cord. Germ. Eich. Baum.

OFFICIN. NAT.

Folia, Glandes, eorumq; Capula Cortex, Viscum, Fungus.

Vires. Folia, Glandes, Cortex, Capula glandum refrigerant, sicc. astring. Usus in fluxu alvi, uteri, seminis. Extrinsecus in Odontalgia, profluvio uterino, &c.

Viscum, (quod præ reliquis visci generibus probatur) calfac. moderatè, sed paulatim emollit, discut. Usus præcip. ac specifice in Epilepsia. Extrinsecus maturat tubercula, parotides, ceterosque abscessus (cum resina ac cera mixtum.)

Fungus quercinus, hæmorrhagiam narium ac sanguinem vulnerum, non minus ac betulinus cohibere dicitur.

PRÆPARATA.

1. ∇ stillar. Ex foliis quercuum novellar. Majo collectis.

2. Gluten, i. e. Extractum viscosum è visco (Bogetheim/) quod ingreditur nonnulla Emplastra.

CCLXXIV. *Quinquefolium.*

Πεντάφυλλον, Quinquefolium majus

repens flore luteo, C. B. 1. pentaphylon minus, Brunf. vulgare, Trag. Dioscor. Tab. luteum majus, Dod. 1. & 2. Lon. repens, Cam. Quinquefolium, Maub. Lob. Germ. Fünffingerkraut/ Fünff. Blat.

Crescit passim locis arenosis, campestribus. Floret Majo & Junio.

OFFICIN. NAT.

Herba colligenda cum floribus Radix colligenda Vere.

Vires. Temperatum est caliditate & frigiditate, sicc. 3. astring. vulneraria est. Usus præcip. in affectibus à catarrhis oriundis, paralyti, phibisi, arthritide, in uteri humiditate corrigenda, in sanguinis expuitione ac tussi, in ictero, in obstructione Epatis & Lienis, obtundit acrimoniam bilis adusta, sistit fluxus alvi, hæmorrhoidum, hæmorrhagiam narium. Prodest in calculo ac erosione Renum, in Hernia, in febribus. Extrinsecus prodest in oculis inflammatis (succus instillatus) in oris putredine, laxitate dentium, abstergit ulcera etiam maligna.

N. 1. In febribus tertianis exhibent foliatriana, in quartana quaterna. &c.

N. 2. Sunt qui radicem pugno detentam ad hæmorrhagiam narium sedandam commendant.

PRÆPARATA.

∇ stillar. Fit ex herba collecta Majo.

CCLXXV.

R.

CCLXXV. *Raphanus.*

major orbicularis vel Raph. rotundus domesticus.

Hujus loci.

Raphanus } niger. *Idem hic cum priori.*
 } minor oblongus. *Est esculentus & minus officinalis.*
 } rusticanus seu marinus. *Vide in sequenti.*
 } aquaticus. *Non est in usu.*
 } sylvestris. *V. Armoracia.*

Paçavic, çapavòs, Arab. Fugell. Raphanus magnus, Lob. Raphans sativus, Fuchf. Cast. Raphanus rotundus, Lon. Tab. orbiculatus, Tab. & Ger. Radicula sativa, Dod. Raphanus major orbicularis vel rotundus, C.B. I. Nettiich.

Crescit in hortis, gaudet solo humido.

OFFICIN. NAT.

Semen, Radix, sed raro, quia culinaris potissimum est.

Vires. Calf. 3. succ. 2. aper. absterg. atten. Usus præcip. in calculo atterendo ac expellendo, urina ac mensibus ciendis, in obstructionibus Epatis ac Lienis, attenuat mucilaginem viscosam in ventriculo, confertque ad distributionem chyli, chymique. Extrinsecus apponitur plantis pedum in febris, sicuti & cervici in capitis dolore februm malignarum comite.

N. De usu interno notandum quod nauseam & ructus ciere soleat.

PRÆPAR.

▽. *Stillat, Exradicibus.*

CCLXXVI. *Raphanus marinus seu rusticanus.*

Raphanus Rusticanus, C.B. 5. sylvestris, Dioscor. Fuchf. Armoracia aut Raphan. major. Brunfels. Raphan. major, Trag. marinus, Tab. vulgaris & rusticanus, Mathiol. Radicula magna, Dod. rustican. Lob. Cam. Germ. Meer-Nettiich.

Gaudet solo humido.

OFFICIN. NATIVA.

Radix, effodienda Martio.

Vires. Calf. & succ. ad gr. incidit, atten. easdemque cum priori qualitates habet, sed fortiores: tartaream mucilaginem incidit, ciēt vomitum, (si succus vel infusio in aceto cum melle tepide assumatur & aqua superbibatur) specificè scorbuticis prodest. Calculum pellit, menses ciēt. Extrinsecus prodest in febris tertiana & quartana) succus cum ol. piperino dorso inunctus, pulsibusve cum Sal. com. impositus, vel umbilico applicatus, donec sentiat.

PRÆPAR.

▽ *Stillat. è radicibus.*

CCLXXVII.

CCLXXVII. Rapum &

Rapa.

Розылан, Ruben/Arab. Seliom, Selgem, Selgrem. Rapum Dioscor.

Est { longum, fœmina.
rotundum, mas.

{ sylvestre, quod minus usitatum.

N. Nomen Rapi omnibus usuale est.

Vires. Calf. 2. succ. 1. Seminis usus precip. in antidotis, Venerem ciet, morbillos expellit, Dosis ʒß. Radix magis culinaria est, sed ventriculo flatulenta. Succus & decoctum, leniunt acrimoniam bilis ac asperitatem bronchiorum, asperaq; arteria, &c. Extrinsecus imponitur Pernioni (cocta) adhibeturque in gargaris. Vide & Napum.

CCLXXVIII. Rhodia

Radix.

Родия, Роза, Radix Rosea, Trag. Matthiol. Dod. Cord. Cam. Fuchf. Lon. & Tab. Germ. Dioscor. Burk.

Crescit sponte in alpinis, sologaudet umbroso.

OFFICIN. NAT.

Radix sola.

Vires. Natura censetur temperata (Fuchf. calf. & succ. 2.) cephalica est. Usus precip. in dolore capitis (cum ʒ ros. confusa.

CCLXXIX. Rhodium Lignum.

Aspalathus, Dioscor. Holk.

Aspalathorum 4. quidem modernis innotuerunt genera, Cortice cinereo,

ligno purpureo seu Dioscoridis. 2. Aspalatho colore buxi. 3. Aspalatho albicans torulo citreo. 4. Aspalatho rubens. Verum officinis nostratibus non nisi secundum & tertium suppetunt. Prius est Aspalathi 1. genus, Lob. Posterius dicitur Rhodium Lignum, quibusdam Agallochum, oleaq; Æthiopica, Cord. in D. Agallochum forte, i. e. xyloaloe solida, quibusdam lignum Rhodium, Rhodifium & aspalathum, aliis oleastrum lignum, Cord. hist. Aspalathus roseus seu 3. Lob.

Vires. Dioscoridi & Galeno calfac. & succ. & astringit, unde commendabile ad ulcera oris, ad nomas genitalium & sordida ulcera, ad alvi fluxus. Verum enim verò an hac nostrati convenient, cuius licet experiri. Vix enim modernis practicis in usu est: nisi quod interdum ac renum calculos decoctis incoquantur.

PRÆPARATA.

Oleum still. quod communiter pro oleo rosarum habent.

CCLXXX. Rhaponticum

vulgare.

Rhaponticum seu Centaurium majus { folio in lacinas plures
diviso, C. B. 1. folio
non dissecto, C. B. 2.
Alpinum luteum, C. B. 3.

Ex his usualius est primum, quod insignitur Rhapontica, quæ hodie centauria major, Trag. Cord. Centaurium

Sssss

rium

rium majus, *Lon. Lob. magnum, Matth. Dod. Cast. Cent. majus* seu Rhaponticum pharmaceuticum, *Cord. in D. Cam. Tab. Germ. groß tausend guldenkraut/ Rhapontic.*

Crescit in alpiis & vallibus pingui-
bus; apricis. *pul. æ, Sabaudia.*

OFFICIN. NATIVA.

Radix.

Vires. Natura est temperata sicc. astring. vulneraria est, saporis subdulcis ac subacris. Usus in fluxibus alvi, Dysenteria: ciet menses, profluviumque è contrario sistit: prodest in hernia, sanguine coagulato, expuitione sanguinis in febris stomachicis: Epar aperit ac roborat, summo perè laudatur, à nonnullis in obstructione venarum mesaraicarum, & in morbis hinc ortis.

CCLXXXI. Rhaponticum
verum.

Rheum, Rha. Dioscoridis, C. B. 3. Ponticum Rha antiquorum, Lob. Rhapontic. verum officin. German. Rhapontic.

OFFICIN. NAT.

Radix, quæ ad nos ex Asia advehitur.

Eligenda quæ non cariola, rube-
scens, in ore lentorem referens.

Vires. Calfac. & sicc. 2. seu mixtura temperata est, terrestris & ignea, saporis subacris. Stomachica, sp. enica ac hepatica. Usus præcipui in doloribus arthriticis, febris, venenatorum animalium ictibus, &c.

PRÆPAR.

Extract fl.c.

Vires. Summum est cardiacum Quercet. Phar. Rest.

CCLXXXII. Rhus.

Rhus folio ulmi, C. B. 1. Rhus, Matth. Tab. Rhus coriaria, Dod. Rhus obtusior, Lob. Cam. Sumach. Arabum, Lon. Cast. Rhu, Rhoë. Rhus culinarium, Germanicè Terber-Baum/ Schlingo-Baum.

Gaudet solo petroso. Floret Julio.
Fructus fert autumno.

OFFICIN. NAT.

Semen, Folia.

Vires. Refrig. 3. sicc. 2. astring. Usus præcip. in fluxu alvi, uteri seu mensium: hamorrhoides compescit, bilem obtundit. Extrinsecus resistit putrefactioni ac Gangrenæ in paronychio.

N. Gummi dentibus inditum odontalgiam sedat.

PRÆPARATA.

Succus Sumach. i. e. Pulpa sine ossibus feminibus.

N. Aly &c. Decoct. Rhois ex ramisculis & Tamarind. conquassatis macerant ac coquunt ad consistentiam. Tabern. in Herbario.

CCLXXXIII. Ribes.

Grossularia multiplici acino seu non spinosa, hortensis rubra seu ribes officinar. *C. B. 1. Ribes hortense. Trag. vulgaris domestica, Matth. Cast. Ribes, Euchs. Lon. Tab. Uva Ursi, Ribesium*

sum fructu rubro, Dod. Ribes Ar-
bum, Lob. German. Johannis Beer-
lein.

Rubra. Hujus Bacca officinales.

Nigra. Usualis non est.

Alba. Et hujus bacca in officinas in-
feruntur, gratioresque sunt gustu ipsis
rubris.

Coluntur in hortis, maturescunt cir-
citer festum S. Joannis.

Vires. Refrig. & sicc. 2. partium te-
nuum: subastring. ventriculo conveni-
unt. Usus precip. in profluviis alvi, dy-
sent. choleram sedant in febribus biliosis
presunt, putredini resistunt, si immodice restrin-
gunt.

N. Alba ut minus acida, ita minus
frigida censenda sunt.

PRÆPAR.

1. Condita bacca, cum decocto pro-
prio & sacch.

2. Rob. de Ribib. simpl. Est succus in-
spissatus ad mellis consistentiam.

3. Rob. de Ribib. compos. Est syrupus
è succo & saccharo $\frac{1}{2}$.

4. Vinum. i. e.

CCLXXXIV. Rosa.

Domestica, ρόδον, Rosen / hujus loci.
Sylvestris, κυνóρροδον, κυνóρροδον
Vide Cynosbatos.

Rosatum varia sunt genera, colo-
ribus ac foliorum multiplicitate diffe-
rentia. Sic est Rosa (millesia) rubra,
rubrapallidior, saturatus rubens, pur-
purea (hæc colorem carnis referens
Zebethina dicitur.) Versicolor alba,
moscata seu Damascena, spinis carens,

subviridis, &c. in officinis autem tria
precipue genera usualia sunt. Rosæ
scil. rubræ (quæ præstantissimæ) pal-
lidæ quæ rubris succedunt & albæ quæ
infimæ sortis. Omnibus tamen laudem
præripiunt Rosæ moscatae f. Damasce-
næ.

Florent Majō & Junio. Coluntur
ubivis in hortis.

OFFICIN. NAT.

Flores (rubri & pallidi asservantur
exiccati,) Anthera, i. e. capillamenta.

Vires. Rosæ ut variant generibus: ita
& qualitatibus. Sunt enim qui non sine
causa rosas partim calidas & acres, par-
tim frigidas volunt, caloremque residere
in superficie à frigore scil. eo expulsam, qui
in marescentibus evanescat, in genere ta-
men omnes refrig. 1. ac astring. spiritus
vitales animalesque recreant, ac robo-
rant. pallidæ seu incarnatæ laxant.
Rubræ ac albæ astringunt (alba levius,
rubra fortius.) Usus precip. in fluxioni-
bus, febribus, siti, appetitu prostrato, &c.
Extrinfecus in vomitu, cephalalgia vigi-
liis, dolore aurium, gingivar. sedandis,
recti intestini (cum vino cocta & imposi-
ta:) in ulceribus & inflammationibus o-
ris, faucium, oculorum.

Flosculi lutei capillamentis in me-
dio florum adhærescentes, (Anthera
offic.) exiccati immiscentur dentifriciis
ad gingivarum astringentem fluxionum-
que exiccationem.

PRÆPAR.

1. Acetum, è flor. rubris.

Sssss 2

2. ▽

2. ∇ stillat. è florib. pallidis (præferunt ad oculor. morbos.

3. è floribus rubris.

4. albis.

5. Balsamus. Ex ol. stillat. & cera depurata.

6. Conserva, 1. ros. rub. recens.

7. 2. antiqua.

8. 3. Ros. Rub. Θ -ta.

N. Præstat ex tempore Θ -tam hanc conservam conficere, affusione scil. guttularum aliquot, quippe qua ad tempus aservatur, & amittit colorem & saporem mutat.

9. 4. Conserv. ros. pallid.

10. Elect. 1. Rosatum Mesua. V. D.

11. 2. de succ. Ros. solidum { Aug.

12. 3. liquidum { Aug.

13. Morselli, i.e. saccharum rosar. Ex succo & saccharo.

N. Morselli de spec. è succo rosar. sunt idem quod Elect. solidus.

14. Rotula Manus Christi, officinis dictæ, simplices & perlatae.

15. Ol. stillat. ascend. cum spiritu.

16. Ol. infusum 1. vulgare.

17. 2. omphacin.

18. 3. Compos. Aug.

19. Pilula Rosata, i.e. de aloe rosata.

20. Spec. Elect. de succ. rosar. Aug.

21. Aromatic. ros. Aug.

22. Diarrhod. Abb. Aug.

23. Rosar. novell. Aug.

24. Spiritus, è rosis rubris fermentatis.

25. Syrupi, 1. rosatus simplex, seu laxativus simplex. Ex infus. 3. ros. rub.

26. 2. rosar. solutivis Muscbarum, (è Damascen.) Aug.

27. 3. Laxativ. compos. seu elleboratus. Aug.

28. 4. sine elleboro. Aug.

29. 5. de rosis siccis.

30. 6. rosatus regius seu fulep Rosatum.

31. Mel rosatum Mesua.

32. simplex.

33. Citratum.

34. Laxativum: ferè idem est cum syr. simplici.

35. Tinctura. Fit ex ros. rub. sicc. \mathfrak{z} j. infusis in ∇ rosar. (vel fontanæ) reperf. \mathfrak{lb} jv. additis spir. Θ -vel Sulphuris \mathfrak{z} ij. factâ digestionem F. Expressio & si opus sit filtrato.

36. Trochisc. Diarrhod. Aug.

37. Unguentum rosarum.

CCLXXXV. Ros Solis.

Rorella, Salvara, Sonnen Thau, Sonthau.

Est { folio rotundo.
{ folio oblongo.

Ex his usualis quidem, veruntamen non nisi rarissimè major, qui inscribitur Ros-solis, Dod. Lon. Cast. Rosida sive Ros solis major, Lob. Rorella minor, i. Tab.

Crescit locis, campestribus & palustribus, inter muscum albicantem & rubentem. Floret Majo.

OFFICIN. NAT.

Herba colligenda quando \odot in Ω (medio Ω is) Υ crescente, die sereno

ac calido: asservaturque sine lotionē.
Item succus foliis instar sudoris adhære-
scens.

Vires. Dodonæus facit calid. & sicc.
4. unde internum ejus usum vetat: ve-
rum enim vero, sunt qui è contra magni
faciant, maximopereque commendent ad
Phibisin a (quia calidissimo etiam tem-
pore sudat) ad pestem, ad vulnera (in po-
tu, &c. ad Epilepsiam arcendam & pra-
cavendam. Extrinsecus promovere di-
citur partum in puerperio (abdomini im-
posita) odontalgiam sedare (in ore de-
tenta) affectum mitigare maniacum collo
appensa) curare quartanam (pulsibus 6.
horis applicata ac dein hor. 6. aque im-
posita: vicissim pulsibus applicata, idque
multoties (10. 12ies.)

a Forest. lib. 16. 58.

N. Novi qui infusionem Roselle in
aqua vita factam, pro cordiali usitato
habet.

Succus dicitur humiditas, quæ instar
sudoris diebus quoque calidissimis, imò
in majori copia, quàm aliæ herbæ ad-
hæret, atque concutiendo in patellam
suppositam colligitur.

Vires. Confortat cor, Epar ac ventri-
culum: capitis dolorem ac usque calida se-
dat, pestem praevenit ac curat. Extrinse-
cus adhibetur in affectibus oculorum do-
lore, scil. inflammatione, &c.

PRÆPARATA.

▽ Stillat. ex tota herba.

CCLXXXVI. Rosmarinus.

Ῥοσµαρινός, Ῥοσµαρινός, Rosmarinus,

Brunf. Trag. Fragos. Lon. Rosmarinum
coronarium, Matth. Lob. Rosmarinus
coronarius, Cam. Rosmar. coronaria,
Dod. Hortensis angustiore folio, C.B. 1.
Libanotis coronaria, Cord. in D. Germ.
Rosmarin.

Crescit in locis apricis. Floret Majo,
Junio.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores (specialiter Anthos of-
fic.) Semen.

Vires. Calf. & sicc. 2. lenta incidunt,
saporis sunt mixti acris, amari: suba-
string. cephalica sunt è principis, ut &
uterina. Usus præcip. in affectibus capi-
tis ac nervorum, Apoplexia, Epilepsia,
Paralyti, Vertigine, Caro, &c. Visum
acutunt, fatorem anhelitus emendant.
Epatis, Lienis ac Vteri obstructions re-
solvunt, Ictero ac fluori albo mulierum
medentur, corque confortant. Extrinse-
cus profunt in catharris (suffitu) & exin-
de natis affectibus. In utero corroboran-
do, &c.

N. Flores asservari possunt per bien-
nium.

PRÆPARATA.

1. ▽. E planta integra.
2. Ol. stillat. Una cum ▽ exstill.
3. Balsamus. Fit ex oleo l.c.
4. Conserva. Ex floribus Anthos.
5. Species Dianthos.

CCLXXXVII. Rubia.

Egō Ῥόβος, Rubia tinctor. sativa,
C.B. 1. Rubia, Cord. in D. Dod. Lob. Clus.
Rub. sativa, Brunf. Matth. Fuchs. Lon.
Sssss 3 Cast.

CCXC. *Ruscus*.

Ὠρυγγίν, *Ruscus*, *Matth. Trag.*
Cord. in D. Lob. Cast. Cam. Tab. Ru-
scum, Dod. Myrtacantha, Lob. (icon.)
 alius *Brosus* & *Bulscum*. Germanicè
Mäus-Dorn.

Crescit copiosè in Italia, ut & qui-
 busdam locis Germaniæ. Locis gau-
 det asperis. Primo Veretumones pro-
 mit, autumno semen.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. *Calf. & sic. temperatè, saporis*
est austeri & subamari, incid. atten. ape-
rit. Usus præcip. in obstructione Epatis u-
rina, (stranguria.) Mensum, &c.

N. Recensetur inter 5. Radices aperi-
 entes.

CCXCI. *Ruta*.

Ῥούρον, *Ruta hortensis, Rauten-*
Wein Raut.

Ruta est C. B.	{	Hortensis	{ 1. latifolia	} huius loci.	
			{ 2. tenuifolia		
			{ 3. major		
		Sylvestris	{ 4. minor		} inusi- tata.
			{ 5. flore ma- gno albo.		

Ornat officinas hortensis utraque, è
 quibus vulgarior quidem est latifolia,
 eaque major, ceterique coloris: præ-
 stantior verò tenuifolia minor & nigri-
 cantior

Latifolia inscribitur *Ruta, Brunfels.*
Matth. Cast. Domest. ca, Trag. Horten-
sis, Fuchs. Lob. Cam. sativa, Cord. in D.

graveolens hortensis, Dod. latifolia,
Tab. Ruta hortensis latifolia, C. B. 1.

N. Hac diligenti cultura arborescere
 solet, cuius exemplum nobis præbuit hu-
 jus civitatis civis & Primarius Phil. Leuto-
 wein.

Angustifolia insignitur *Ruta hor-*
tensis altera, C. B. 2. Ruta hort. minor,
Trag. Ruta sativa tenuifolia, Cord. in D.
Ruta tenuifol. Tab.

Gaudet solo arido ac calido. Floret
 Junio.

OFFICIN. NAT.

Herba ac Summuates cum semini-
bus.

Vires. *Calf. & sic. 3. incid. atten-*
diger. discnt. ex alexipharmaca; cepha-
lica ac nervina. Usus præcip. in variis
morbis, peste aliisque affectibus malignis
præservandis ac curandis, veneno arcen-
do, visu acuendo, lascivia reprimen-
da, pleuritide curanda, imbecillitate ven-
triculi corrigenda, colica discutienda,
morsu canis rabidi debellando, &c. Ex-
trinsecus in ictibus serpentum, carbuncu-
lis, in febrium paroxysmis arcendis (in-
uncl. dors) Cephalalgia ex crapula, he-
micrania, in febribus malignis (pro Epi-
themate pulsuum cum Sal. com. & ✕) in
dolore capitis, febrium ardentium & ma-
lignarum (similiter pedum plantis adhi-
bita.)

N. Nimis usus internus officii gra-
 vidis.

PRÆPARATA.

1. ▽. *Stillar* Ex planta cum cauliculis
 Majo collectis.

2. *Oleum.*

2. *Oleum stillat.*
3. *Oleum infusum.* Ex infusa herba in oleo communi.
4. *Sal.* Ex herba incinerata.
5. *Acetum.* Ex infusione.
6. *Balsamus.* Ex ol. stillat.

CCXCII. *Ruta muraria.*

Ruta muraria, C.B. Dod. Ger Capillus ♀ is, Brunf. Trag. Adiantum candid. Cord. in D. & hist. Ad album, Lon. Cam. Tab. Adian. nigrum, Casalp. Gesn. Saxifraga seu Empetron, Fuchsf. Paronychia, Matth. Cast. Salvia vitæ, Lob. German. Maur. Nauten/Stein. Nauten/Venus-Haar.

Nascitur in parietibus ac muris juxta aquas, locis videlicet irriguus & non apricis. Vivax est toto anno, æstate tamen amplius viret, flore & semine caret.

OFFICIN. NAT.

Folia seu herba cum caule.

Vires. Calid. & frigid. temperata est, siccatur, digeritur, discutitur, tartaream & viscosam mucilaginem in Pulmonibus, &c. incidit. Usus præcip. in tussi, asthmate, pleuresi, ictero, obstruct. splenis. Valet ad Renum & vesicæ dolores, urinam clementer ciet, calculosque expellit. Peculiariter præstare eam perhibet Matth. ad Enterocleas puerorum (& 40. pulvis exhibitus, & sim.)

Extrinsecus capillos crescere facit, ulceraq. manantia capitis abstergit, strumas & abscessus digerit.

N. I. Ubi *Adiantum verum & Tri-*

chomanes desunt, aut vetusta sunt, hæc uti licet. Hac sumenda quoque ubi Medici recentiores Adiantum præscribunt à capillo ♀ diversum, C.B.

N. 2. *Matthiolus hanc Paronychiam Dioscoridis esse disputat contra Dodonæum, qui id negat.*

S.

CCXCIII. *Sabina.*

Bgdus, Savina, Seven-Baum / Sieben-Baum.

Sabina { Tamarisci. Hac usualis. folio { Cupressi. I. & 2.

Dicitur Sabina, Brunf. Tra. Fuchsf. Dod. Lob. vulgaris, Cam. Sabin. Myrtifolio, Cord. in D. Savina, Lon. Savina mas, Tab. Sabina folio Tamarisci Dioscorid. C.B. I.

Colitur in hortis: viret perpetuo.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Calf. & sicc. 3. partium tenuium, incid. atten. discut. Usus præcip. in mensibus fortiter ciendis, foetu ejiciendo, urina pellendi, asthmate medendo. Extrinsecus in affectibus uterinis, ulceribus serpentibus arcendis, scabiè præcipuè capitis infantum exiccanda ac curanda (cum cremore lactis,) in maculis faciei abstergendis.

PRÆPAR.

▽. *Ex foliis,*

CCXCIV. *Salix.*

Itæa. Weiden/Weiden-Baum.

Salix multorum est generum, quæ sine

sine discrimine in usum medicum accersiri poterunt.

Crescunt in locis udis: florent Majo & Aprili.

OFFICIN. NAT.

Folia, Juli, Cortex & Viscum.

Vires. Folia refriger. & sicc. subastring. citra morsum. Usus pracip. in libidine arcenda. (Decoctum potum.) Extrinsicus in lotionibus pedum pro vigiliis ac astu febricitantium arcendo, in hemorrhagia vulnerum, narium, & sim. ad

stringenda. In aëre refrigerando (strata in pavimento.

Juli sistunt hemorrhagiam quamcunque (impositi.)

Cortex similem facultatem habet. Insuper verrucas & clavos pedum corticum cinere (cum imposito) extrahi tradit Dioscor.

Viscum commendatur præ aliis ad partum facilitandum.

PRÆPAR.

▽ Stillat. E foliis.

CCXCV. Salvia.

Ἑλεῖσσανον, Arab. Ἀλiffacos, Salben.

Est { Major, Breit: Salben.
Minor acuta, nobilis, Epik: Salben / Creutz: { sunt usuales, sed minor
Salben / Edel: Salben. { præstantior est.
Sylvestris. Hæc officinis ignota, aliàs convenit viribus cum Hormino.

Major inscribitur, Salvia latifolia, Trag. Lon. Clus. Cam. Salvia major, Matthiol. Fuchf. Dod. Cast. Tab. Salvia, Cord. in D. major scabrior. Dioscorid. Lob. C. B. 1.

Hæc variat in foliis & floribus: foliis est viridibus, iisque crispis & non crispis, purpurascens, versicoloribus: sic vel totis vel partim albidis, floribus communiter cæruleis, rarius candidis.

Minor vocatur. Salvia minor aurita & non aurita, C. B. 2. Salvia nobilis, Brunfels. Angustifolia & minor, Trag. Salv. minor, Matth. Fuchf. Cord. in D. Lob. Tab. pinnata Fena, Salvia acuta, Lon. angustif. Clus. Salv. tenuifolia auriculat. Cam.

Variat foliis auritis vel pinnatis & non auritis: foliis aliquando Lavendulæ concoloribus, sed latioribus & gravioris odoris: rarius luteolis: flore cæruleo, rarius albo.

Gaudet solo fecundato argilla, &c. Floret Julio ac Augusto. Transplantatur Martio, cum rutâ intermixtâ, quâ serpentes & bufones salviæ viciniam amantes arceantur.

OFFICIN.

Folia, Flores.

Vires. Calf. & sicc. subastring. absterg. Usus pracip. & diureticus: menses ob crassitiem remoratos ciet, nimios emendat. Prodest in paralyti, vertigine, tremore, catharris. Extrinsecus aphthas oris abstergit (in gargaris.) &c.

Ttt tt

Præ-

PRÆPAR.

1. ∇ . Ex herba cum floribus.
2. Oleum stillat.
3. Sal. Ex herba incinerata.
4. Conseru. Ex floribus.

CCXXXVI. Sambucus.

Astr. Sambucus, *Holder-Baum*/
Hollunder.

{ *Vulgaris, Hujus loci.*
Humilis. Vide Ebulus.

Insignitur, Sambucus fructu in um-
 bello nigro, *C. B.* 1. Sambucus, *Brunf.*
Matthiol. Fuchf. Dod. Lon. Lob. Tab.
Sambucus vulgaris, Trag. domestica,
Cast. Sambucus campestris seu vulga-
ris, Cam.

Gaudet locis opacis, sepibus, pome-
 riis & asperis vallibus. Floret Majo,
 Junio, Julio. Baccæ maturescunt Au-
 gustō.

OFFICIN.

Flores, Bacca, Liber, Spongia, Turio-
nis.

Vires. Sambucus integra calfacit &
secat, resolvit, hydropicos iuvat.

Flores discutunt insuper, emolliunt,
resolvunt, sudoriferi ac anodynifunt. U-
sus. princip. intrinsecus in Erysipellate pre-
parando & abigendo, quartana curan-
da. Extrinsecus in colico dolore, in Ery-
sipellate, combusti, &c. (impositi).

Baccæ sudoriferae idem sunt ac alexi-
pharmaceæ.

Liber (cortex interior) educit serosos
humores. Extrinsecus easdem vires ha-
bet, quas flores.

N. Eligendi cortices radices.

Turioncs & Gemmæ adhibentur in
acetariis, alvumque movent & nonnun-
quam etiam vomitum; præcipuè si sursum
decerpantur: idem facit & pulvis.

Spongia (Auricula Iudæ) oculorum
affectionibus medetur (macerata in ∇ ap-
propriata imposita.)

N. 1. Sunt qui insusum spongia bibunt
ad hydropis curam.

N. 2. Sambucum, visci instar, in sa-
lice nascentem pro peculiari commendant
ante epilepticum.

PRÆPAR.

I. E FLORIBUS.

1. ∇ stillat. Ex flor. l. a.
2. Spiritus. Fit rectificatione ∇ stillat. vel ex floribus in dolio querno fer-
 mentatis.
3. Vinum. *R.* flor. in umbra exiccat.
libj. circiter, infundantur multi mensu-
ris 8.

4. Oleum insusum. In ol. cydon.

5. Oleum stillat. Cum ∇ extillat, sedi-
 raro prostat.

N. Potest idem elici hoc modo. R.
Flor. q. v. macera cum vino Malvatico
vel Hispanico vitro bene ocluso calore so-
læ per tempus. (septim. 6.) hinc exprime
fortiter, ac moderate calfacito: sic super-
nabit oleum. Blochwitz.

II. E BACCIS.

1. Rob. Sambuci. Est pulpa baccar.
 mureatum.

Usum est frequentissimus ad sudorem
ciendum. Prodest & peculiariter in af-
fectionibus uterinis, assumptum. Extrin-
secus.

*Secus imponitur ad refrigerandum: quin
Et plantis pedum in febris inungitur.*

2. *Tinctura ac Extractum.* Fiunt ex
Rob. Sambuci (Quercetanus ꝑ. bac-
cas umbra exiccatus) beneficio V (qui
acidulus redditus sit cum liquore acido
aut Q. i aut Sulph.

N. Dicitur Tinctura antequam V
fuerit separatus. Extractum si idem V
abstractus sit.

Vires. Suffocationi uterina succur-
rit. Dosis tinctura, cochlear β. Extra-
cti ℥i.

3. *Spiritus.* Fit è succo ex baccis ma-
turiis expresso, vel ex baccis ipsis saltem
contusis & fermentatis, l. a.

N. Sunt qui è baccis exiccatis crasseq;
contusis farina bordeac. $\frac{1}{2}$. addunt, affu-
saque ∇ fervente digerunt.

4. *Oleum.* Ex arillis baccar. post suc-
ci transcolationem in filtro relictis; vi-
delicet hæ benè elotæ & in aëre exicca-
tæ, vino albo irrigantur ac fortiter ex-
primuntur.

Vires. Est vomitivum egregium.

Dosis ℥j. vel ℥jβ. in cerevisia tepida,
Esc.

N. Non est officinale.

His 5. addi potest Tragea granorum
Alix. Quercetani: ꝑ. succum bac-
car. maturar. expressar. q. v. adde fari-
nam secalinam, fac pastam & exinde
panes exiguos, in furno ad duritiem
bis cocti coquendos. Hos pulverisa,
pulverem cum eodem succo iterum
impasta, atq; ut prius in furno coque, id-

que tertio repetatur. Tandem pulveri-
sa ac serva.

Vires. Specificum est arcanum ad-
versus dysenteriam.

Dosis ℥j. cum Nucista ℥j.

N. Anatomicam Sambuci conscripsit
Martinus Blochvoizzius, M. D. in qua
Et præparationes Et usus sambuci in plu-
rimis affectibus curandis exhibet.

CCXCVII. Sanguisorba.

Pimpinella sanguisorba. Sorbaria,
Welsch Biberell.

Major.

Minor. { Hirsuta. Hac sola officinis
cognita.
Lævis.

Dicitur Pimpinella sanguisorba mi-
nor hirsuta, C. B. 7. Pimpinella, Lob.
Italica, Trag. Lon. minor Pimpinella,
sanguisorb. Dod. minor, Matth. Cast.
Cam. sanguisorba minor, Fuchs. Cord.
hist. Tab.

Colitur nobis in hortis. Floret Majo
& Junio.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus. Radix.

Vires. Refrig. moderatè, sicc. astring.
Vulneraria ac pulmonica est, saporis gra-
vi. Usus præcip. in catharr. affectibus pul-
monum, phthisi, ex erosionè, in morbis
malignis, in profluviiis alvi, hemorrhoi-
dum: præcavet abortum. Extrinsecus
in hemorrhagia quacunque utiliter adhi-
betur.

PRÆPARATA.

1. ∇. *Stillar.* Ex integrâ plantâ cum ra-
dice ac floribus collecto Junio.

Ttttt 2

2. Sy

2. *Syrupus*. Ex succo & saccharo.

3. *Conserva* ex floribus.

CCXCVIII. *Sannicula*.

Sannicula officinar. C. B. *Sannicula*,
Trag. Brunf. Cam. Tab. Dod. Lon. Dia-
penfia, Brunf. Matth. Cast. San. mas,
Fuchf. Sahic. & diapienia, Lob. Ger.
Germ. Sannicel/Sanicel.

Crescit in montibus ac vallibus:
solo gaudet pingui ac opaco: colligi-

tur Junio mense cum floribus.

OFFICIN. NAT.

Folia raro Radix.

Vires. Calf. & sicc. astring. saporis est
amari, vulnerariaqua una ex precipuis,
utilis in consolidandis ulceribus, fistulis,
rupturis, erosionibusque, tam interne
quam externe adhibita.

PRÆPAR.

▽. Ex herba florente.

CCXCIX. *Lignum Santalum.*

Σανταλον, { *Album. Matth. Lon. Cord. hist. Cast. Garz. Tab.*

Sandel, { *Rubrum. Matth. Lon. Cast. Garz. Tab.*

{ *Citrinum. Cord. hist. Lon. Flavum, Tab. Pallidum, Matth. Garz.*

Ligna sunt exotica ex Indiis ad nos
transportata.

Præstantissimum est, citrinum, succe-
dit album, infimas tenet rubrum, planè
inodorum. Eligendum autem citrinum
suaviter fragrans, magnam habens me-
dullam, grave, nodosum. Hujus in defe-
ctu recipi potest album.

Vires. Refr. 3. (al. 2.) sicc. 2. aperiunt,
Epatica sunt, ac cardiac. Usus præcip. in
lipothymia, palpitatione cordis, obstructio-
ne Epatis, &c. Extrinsicus in catarrhis,
Cephalalgia, Vomitu, Epatis intemperie
calida (in Epithemat &c.

N. Santalum rubrum magis refrige-
rat ac astringit, quam reliqua.

PRÆPAR.

1. *Extractum Gummosum*. Fit ut alio-
rum lignorum extracta cum V.

N. Quercetanus parat cum ▽ aliqua
Epatica. E.g. Agrimonia.

2. *Spec. Diatrion Santal.* V. Disp.

3. *Unguentum santalinum*, V. D.

4. *Cerotum seu Emplastrum santali-*
num. Vide Disp.

5. *Trochisci de Santalis.* V. Disp.

CCC. *Santonicum.*

Absynthiacum santonicum, Wundkraut est C. B.	{	Judaicum.
		Alexandrinum. <i>Hu-</i> <i>jus semen officinale</i>
		solum.
		Ægyptiacum. Gallicum.

Insignitur Semen sanctum seu Se-
mentina, Matth. & Semen Zedoaria,
Lob. Cast. Absynthium Seriphium,
Alexandrinum. Semen Cina, Cord.
Sementina, Dod. Tab. (cui & santon-
icum.) Santonicum & semen sanctum,
Lon. Germ. Zitwensamen/Wurmsa-
mel.

OFFICIN. NAT.

Semen quod affertur ex Alexandria
Ægypti.

N. *Sunt*

N. Sunt qui & ex absinthio (santon.)
Egyptio, semen Zina colligi volunt. Hoc
videatur apud Matth. Dod. Lob. Tab.

Vires. Calfac. & succ. saporis ama-
ri est. Usus in lumbricis cujuscunque
generis, enecandis, fugandis & expellen-
dis.

PRÆPARATA.

1. Semen santonicum præparatum, i.e.
in \times & ϕ (4.5.) maceratum atque ex-
iccatum.

2. Confectio seminis Cina, überzogen
Würmsamen.

CCCCI. Saporis.

Erge. Dion. Diosc. Fusch. Lon. Saponaria,
Trag. Dod. Lob. Tab. Cam. Ger. viola
agrestis, Trag. Saponaria major lavis,
C.B. 1. Germ. Seiffenfraut/Speichels-
wurk.

Crescit passim juxta rivulos & vias:
Floret Majo.

OFFICIN. NAT.

Folia, sed raro & Radix.

Vires. Calf. & succ. strenuè attenuat,
aperit, sudorifera est. Usus in asthmate,
utero, mensibus ciendis, lue Venerea. Ex-
trinsecus ptarmica est, tumores ac praci-
pue panos discutit.

CCCCII. Sarsaparilla.

Sarsaparilla, Smilax aspera Peruviana,
C.B. 4. Tab. Ger. Zarzaparilla, Matth.
Mon. Garz. Zarzaparilla Peruviana,
Dod. Zarza seu sarsaparilla, Cast. sarsa-
parilla, Lon. Trag. Lob.

Nomen accepit à similitudine

quam cum simulace aspera (Hisp. Zar-
zaparilla) habet.

Triplex est ea. (Nicol. Monardo
monente) adfertur scil. 1. Ex Hispa-
nia nova, quæ candidior ad pallorem
tendens & gracilior. 2. Ex Provincia
Honduras, quæ cinerea nigrior & cras-
sior, priorique melior est. 3. Ex Pro-
vincia Quitto, locis Urbi Guajaquil
vicinis (unde Zarzaparill. Guajacillana
dicitur,) quæ ex cinereo nigricans, ma-
jor & crassior adhuc est cæteris.

OFFICIN. NATIVA.

Radix lignosa, prælonga, fibrosa, u-
niformis.

Eligenda quæ coloris aliquantulum
nigri, recens, (non cariola,) gravis, fle-
xilis, nec frangibilis.

Vires. Calfac. moderate succ. partium
tenuium sudoriferaque. Usus præcip. in
lue venerea, quam specificè cura, in Ca-
tharris atque inde natis affectibus. E. g.
Arthritide, &c.

CCCCIII. Sassafras.

Arbor est prægrandis, nascens in Flo-
rida, folio ficulneo, cortice ex fulvo ni-
gricante, aliquantulum acri sapore, sed
aromatico, odore fœniculum redolen-
te.

Dicitur pavame seu sassafras, Mon.
Frag.

OFFICIN. NAT.

Lignum & Cortex, qui præfertur li-
gno, maxime si ex radice sit, quippe ra-
dix reliquis partibus prævalet, adeoque
& ejus cortex.

Tttt 3

Vires.

Vires. Cortex calf. & sicc. ad gr. 3.
Lignum calf. & sicc. 2. atten. aperit. dis-
sent. sudores movet. Usus præcip in omni
morbor. genere, præsertim obstructionibus
tollendis, partibus internis roborandis, in
sterilitate emendanda, & venerea lue cu-
randa.

N. Instar Panacea in catharris habetur.

PRÆPARATA.

1. Extract. Fit. l. a. Vid. l. 2.
2. Ol. stillat. Vid. l. 2.

CCCCIV. Satureia.

Θύμρα, Θύμρα, Saturey/ Gen-
gen-Kraut.

- | | |
|-----------------------|---|
| Satureja
est C. B. | 1. Hortensis seu culina sati-
va. Hac usualis. |
| | 2. Montana. |
| | 3. Spicata. |
| | 4. Cretica. |
| | 5. Thymifolio. |

Insignitur Hyssopus agrestis, Brunf.
Satureja, Trag. Lon. Dod. Lob. Tab Cam.
Sat. altera, Matth. sativa, Fuchf. Cord.
sylvestris, 2. Cast.

Colitur in hortis. Floret integrâ ferè
æstate.

OFFICIN. NAT.

Herba cum Floribus.

Vires. Saporis ac odoris est acris ac
calidi, unde & calida ac sicca censetur gr.
3. atten. aperit. disc. Usus in affectibus
ventriculi: cruditate, anorexia, &c. Pe-
ctoris; asthmate, uteri, mensibus obstru-
ctis, visum acuit. Extrinsecus discutit tu-
mores, doloresque aurium sedat.

N. Pulices necare dicitur strata in eu-
bili.

PRÆPARAT.

1. ▽. Ex herba florente.
2. Oleum stillat. cum ▽.

CCCCV. Satyrium seu
Orchis.

Satyrium seu Orchis, German. Rna-
ben-Kraut/ Stendel-Wurk.

N. Dioscor. distinguit inter Orchides
& Satyria, orchidesque vocat, quæ radi-
cem bulbosam habent eamque geminam:
Satyrium, quod unicam. Plinius verò
utraq; confundit.

Genera Orchidum seu Satyriorum
passim quam plurima nascuntur, quæ
et si promiscuè in usum accersiqueant:
attamen eligunt officinæ præ reliquis
cynosorchim.

Crescunt in Campeltribus, Sylvis ac
Vineis: Floret Aprili & Majo.

OFFICIN. NAT.

Radix cujus bulga distentior eligen-
da, rejecta flaccidiore. Colligitur incu-
nte Vere vel exeunte Autumno.

Vires. Calf. & hum. saporis dulcis.
Usus præcip. (ex signatura lasciva) ad vi-
rilem fortitudinem restaurandam. Sic
& uterum confortare creditur & ad con-
ceptionem disponere.

PRÆPARATA.

1. Condita Radix. R. Orbiculum di-
stentiolem, purga bene ac coque: hinc
exicca ac confice saccharo.
2. Electuar. Diasatyrium. V. D.
3. Extractum seu sanguis: Fit extra-
dice

hic conquassata & cum pane atque vino (V) digesta. Videl. 1. & Quercet. in ph. R. c. 26. Ab Heer. observ. 8 qui ita parat: R. Rad. Satyr. aquæ in pce, duobus quibus constant orbiculis divulsis, quæ fundum petierint (abjectis quæ supernatant,) contunde ac adde sensim micas panis alb. ac propter lentoris dilutionem V è malvatico, ut irrotetur. Dein digere in MB vase clauso septim. (6.) Tum exprime, expressum iterum per mensem digere. Innabit liquor rubicundus, hunc inclinando collige abjectis fecibus. Hinc patatur Extractum compositum. Vid. l. 2.

CCCVI. Saxifraga.

Saxifraga, Lon. alba, Trag. Dod. Fuchf. (icon.) Cam. Tab. Saxifraga, Brunfels. major, Fuchf. Saxifraga alba chelidonides, Lob. Saxifr. alba tuberosa radice, Clus. hist. German. Steinhrech.

Crescit in locis asperis ac sabulosis: Floret Majo.

N. Sunt & alia saxifagarum genera, verum officinis vel alio nomine veniunt, vel insitata sunt. Sic est saxifraga lutea, 1. Melilorus rubra, 2. Filipendula saxifraga, Pimpinella. Vide suo loco.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus, Radix quam Semen vocant.

Vires. Calf. & sic. evidentissime (3.) diuretica est, aperit. Usus præcip.

in sabulo ac calculo Renum ac Vesicæ atterendo, & expellendo, tum & in mucilagine eorundem attenuanda: in mensibus obstructis. Extrinsicus in balneis diureticis.

PRÆPARATA.

V. Ex planta integra, Majo collecta.

CCCVII. Saxifraga.

Pratenfis & arvensis, variorum specierum, ex quibus usitata est, C. B. 1.

Scabiosa } Montana. Variarum specierum.
C. B. est }

Capitulo globoso. Variarum specierum.

Stellata Variar. spec.

Dicitur scabiosa pratenfis hirsuta, C. B. Scabiosa, Lon. vulgaris, Fuchf. major, Cast. arvensis, Tab. (cui & major flore cæruleo purpureo.) Scabiosæ i. genus, Trag. Scab. segetum, Ger. German. Scabiosen / Apostem Kraut // Grind Kraut.

Crescit in arvis. Floret Junio.

OFFICIN.

Radix (colligenda Vere.) Folia, Flores.

Vires. Calf. & sic. usque ad 2. absterg. arren. discut. sudorifera, alexipharmaca ac pulmonica est. Usus præcip. in apostematibus: (unde & nomen habet) pleuresi, angina, tussi, asthmate, peste, fistulis seu manantibus ulceribus (mammarum, crurum, &c.) Extrinsicus in scabie, pruritu, impetigine ac prapupæ

in achoribus ac tinea capitis (Erbsgrind)
in furfuribus ac lendibus capitis, in sug-
gillatis, maculis faciei dolore hamorrhoi-
dum (in suffitu vaporoso.)

N. Radix scabiosa majoris flore purpu-
reo, specificè curare dicitur L. veneream
adeo, ut falsa parilla vel parum, nihil ce-
dere censeatur.

PRÆPARATA.

1. ▽ Stillat. Ex integra planta cum
radice ac floribus.
2. Sympus. Ex succo & saccharo.
3. Conserv. Ex floribus.
4. Sal. Ex planta incinerata.

CCCXIII. Schananthum.

Σχολις, Σχολιανδον, Lon. Juncus o-
doratus, Matth. Lob. Clus. Cast. Squi-
nanthum officin. fœnum Camalorum.
Stramen Camel. Camels-Hew / Ca-
mel-Stroh.

Affertur ex Arabia.

OFFICIN. NAT.

Culmi seu furculi (stramen) Flores,
Radix.

Vires. Calfac. substring. tenuium est
partium, discutit. Usus prap. in obstru-
ctis mensibus, Epate, Liene, in ventriculi
inflatione, vomitu ab singultu: in urina
difficultate, Renum, Vesica ac uteri dolo-
re. Extrinsecus corrigit fœtorem oris,
roborat caput (lotione) discutit uvulatu-
morem, roborat ventriculum.

CCCIV. Scolopendrium
verum.

Ἀσπληνιον, ἀσπληνιον, Arab. Scolofen-

drium, Ceterach Officinis, Scolopen-
drium, Cord. vera, Trag. Lon. Asple-
num & nion, Matth. Lob. Cast. Cam.
Dod. Cord. in D. Germ. Milz-Kraut.
Scolopendria vera. Hic describitur.

Vulgaris. Locosequenti.

Crescit in rupium fissuris, locisque
asperis sine floribus.

OFFICIN. NAT.

Folia collecta Septembri.

Vires. Calfac. & sicc. saporis acerbis,
absterg. spleneticum est. Usus prap. in
duritie Lienis, Ictero, febris quartana: u-
rinam movet, calculum comminuit, men-
ses ciet, semen imminuere creditur (illum
nocte effossum.)

N. Dioscorides folia in ✕ ferve facta
ac per dies 40. pota, Lienem absorbere
scribit.

PRÆPAR.

Syrupus de Scolopendria. Ex meris
splenicis fit. V. D.

CCCX. Scolopendria vul-
garis.

Φυλλίτις, Lingua cervina officin. C.
B. Scolopendrium, Brunfels. Scolop.
vulgare, Matth. Dod. Cord. Lob. Hæ-
monitis, Fuchs. phyllitis seu lingua cer-
vina, Tab. Germ. Hirsch-Zung.

N. Scolopendria vulgaris vel lingua
cervina dici potest, ad differentiam Cete-
rach.

Crescit in sylvis, locisque umbrosis
ac opacis, in puteis. Viret per totum
ferè annum.

OFFICIN. NAT.

Folia.

CLASSIS I.

153

Folia.

Vires. Refrig. ac sic. substring. at-
zen. Splenica itidem ac Epatica sunt. U-
sus pracip. in Liene tumido, fluxu alvi,
expuitione sanguinis. Extrinsecus mun-
dificant vulnera ac ulcera.

PRÆPAR.

▽. Ex foliis.

CCCCXI. Scordium.

Σκόρδιον, Scordium, C. B. 1. Trag.
Matth. Dod. Lon. Lob. Cast. Cam. Tab.
minus, Ger. German. Wasser-Bathe-
nig/ Rachen-Knob-Lauch.
Majus, quod usitatum.
Minus.

Crescunt in locis humidis. Florent
Junio ac Julio.

OFFICIN.

Folia.

Vires. Calfac. & sic. 2. absterg. at-
ten. uncid. putredini resistit, alexipharma-

cum ac sudoriferum est. Usus pracip. in
peste, pestilentialibusq; morbis, febribus
malignis (tam preservando, quam cu-
rando) in obstruct. Epatis ac Lienis, in
Pulmonibus purulentis ac macilagine re-
fertis. Extrinsecus mundificat vulnera
ac ulcera: lenit dolores podagricos.

N. Sunt qui in mensum profusio cum
successu exhiberi velint.

PRÆPARATA.

1. ▽ stillat.
2. Succus inspissatus.
3. Syr. de scordio simpl. Ex succo &
saccharo.
4. Compos. Hier. Mer-
curialis. Vide Disp.
5. Conserv. ex fol.
6. Elect. Diafscordium, Fracastorii. Vi-
de Disp.
- Dosis à ʒj. ad ʒij.
7. Sal. Ex cinere.

CCCCXII. Scorzonera.

Scorzonera { 1. Hispanica. Hac usualis.
 2. Germanica, Tab. Boemica, Matth. Lob.
 3. Foliis nervosis, Germanica angustifol.
 4. Humilis nervosa, Pannonica, Tab.
 Angustifolia.

Dicitur Scorzonera, Dod. Lon. Lob.
Cam. Hispanica, Matth. Cast. Tab. (cui
& Germanica 1.) Scorz. latifolia si-
nuata, C. B. 1. alia Viperaria, Schlan-
gen-Merd.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Calfac. hum. 1. alexipharmaca

est. Usus pracip. in morbis serpentum,
peste, melancholia, epilepsia, vertigine,
&c. Quin commendatur maxime pere
ad uteri suffocationem.

PRÆPAR.

1. ▽ è radice.
2. Extractum.
3. Conditio radix.

Uuu uu

CCCCXIII.

CCCXIII. *Scrophularia*.

Scrophularia, *Matth. Dod. Cast. major, Brunfels. Lon. Lob. Cam. Tab. Ger. nodosa foetida, C. B. 1. Ocymastrum, Trag. Galeopsis, Fuchs. Aliis Ficaria, Ferrara, mille morbia, Castrangula, Braun. Burk / groß Feigentwarthen Kraut / Knoden Kraut / Satw. Burk.*

Crescit in locis umbrosis, juxta sepas ac in cæmeteriis. Floret Junio ac Julio.

N. Est & femina dicta qua non nisi in locis palustribus nascitur, sed priori bonitate cedit.

OFFICIN.

Radix nodosa.

Vires. Calf. & succ. digerit, incidit, saporis amari. Usus præcip. in strumis seu scrophulis, sicut & mariscis ani (unde & nomen accepit) in cancriosis ac similibus serpentinis ulceribus, malignaq; scabie. Extrinsicus in tumoribus renitentibus, malignisque molliendis. E. g. scrophulis, & simil.

PRÆPAR.

▽ *Stillat.* Exherba cum radice.

CCCXIV. *Scylla*.

Squilla, Brunf. Scilla, Trag. Matth. Fuchs. Cord. hist. Lon. Cam. major Pancratium, Dod. Tab. rubentibus tuniceis, Lob. Arab. Haspel. Germ. Meerzwibel.

Crescit copiosè in Apulia, Sicilia, Portugallia.

OFFICIN.

Radix bulbosa, quæ eligatur recens

succi pleni, collecta Julio.

Vires. Calfac. succ. 2. saporis acris & amari, atten. incid. absterg. discut. putredini resistit, diuretica est. Usus præcip. in obstruct. Epatis, Lienis, meatibus biliarij, mensum urina: in mucilagine Pulmonum, tussi, &c. Extrinsicus in achoribus capitis (infus. in ol.) in per-nione.

N. Veneficia ac incantationes arcere dicitur.

PRÆPARAT.

1. *Preparata radix.* Involvitur massa panis atque cum eadem in clibano coquitur: hinc eximitur atque exiccatur. Vide Disp.

N. Preparatio hac instituitur ad obtundendam acrimoniam.

2. *Syr. Oxymel. scylliticum simpl.* Ex. ✕ scyllitico & melle.

3. *Oxymel. compositum.* Vide Disp.

4. *Loch. de scylla.* Loch. ad asthma. Ex succo ac melle.

5. *Acetum scylliticum.* Ex infusione radicis in aëre exiccatae (& 40.

6. *Fecula.* R. Scyllæ cor incide minutim, vel conquassa, digereque aliquod temporis spacium in MB. Hinc transeola & inspissa. Quercet. Ph. R. cap. 24.

7. *Extractum.* Vide Quercet. Ph. R. c. 24. ubi & Saccharum seu conservam Scyllæ parare docet.

CCCXV. *Sebesten*.

Sebesten, Trag. Prunus Sebesten, Matth. Sebestena, Myxa, Myxaria, Tab. Alpina.

Offi-

OFFICIN. NAT.

Μύξα, μυξα, myxæ, myxaria, Sebesten Brust-Beerlein. Sunt fructus arboris pruno similis, assimilati parvis prunis, referentes nucleum cortice triquetro lapideo inclusum.

Asportatur ex Syria ac Ægypto.

Vires. Sebesten inter caliditatem ac frigiditatem temperata sunt, humectant, emolliunt acrimoniam humorum obtundunt. *Usus* præcip. in catharris acris, urina acri, febribus biliosis, alvi obstructione: summam ut figura ita & viribus pruna Damascena emulantur.

PRÆPARATA.

Electuar. de Sebesten. V.D.

Vires Purgat leniter, obtunditque acrimoniam humorum.

Dosis à ʒβ. ad ʒij.

CCCXVI. Secale.

Farrago, Rogga, Siligo, Briza, German. Roggen/Korn. (nostratibus.)

Est { Hybernium vel majus, C.B. 2.
Vernum vel minus, C.B. 3.

1. Dicitur. Rogga sive secale, Dod. Siligo, Brunf. Lon. Veterum & Secale, Trag. Secale, (Secle,) Matth. Fuchf. Lob. Tab. Ger. Secale & Farrago Plinii, Cast. Olyra, Cord. in D. Tiphæ cerealis Portæ, C.B.

2. Appellatur. Rogga seu secale æstivum, Dod. Siligo æstiva, Trag.

N. Veterum siliginem a secali nostro esse differentem, vide sis apud Tabern. l. 1. s. 7. c. 1.

Floret Junio.

OFFICIN. NAT.

1. Farina. 2. Furfures.

Vires. Secale calefacit moderate minus tamen quam triticum, magis vero præ hordeo. *Usus* ejus potissimus culinaris est, adhibetur tamen non raro farina extrinsecus ad tumores & dolores discutiendos, adeoque imponitur Erysipelati, podagricis doloribus, & sim.

Furfures abstergunt, emolliunt, discutiunt, (calidi impositi in sacculo.)

PRÆPAR.

1. Panis. Adhibetur in doloribus capitis & aliarum partium (impositus) in ventriculi imbecillitate, in cordis palpitatione, in fœtû roborando (tostus & vino aliove liquore convenienti imbutus, vel in micæ redactus, & cum aliis impositus,) in tumoribus maturandis (masticatus cum butyro & impositus) in dentificiis crusta tosta & trita.

2. ▽ still. è pane. Fit è micis panis vi MB.

N. Commendatur in Diarrhæa & Dysenteria.

3. ▽. Siliginis officinarum. Fit è gramine MB.

4. Emplast. de Crusta panis V.D.

CCCXVII. Sedum.

	{ majus arboreescens;
	{ minus
	{ minus Hamatoides, &c. Officinis incognitum.
	{ Minimum, Vide vermicularis.

Uuuu 2

Inf-

Insignitur sempervivum majus, *Brunf. Matthiol. Ger. Lob.* Sedum majus, *Fuchf. Cord. in D. Tab.* Sempervivum, 1. *Lon.* Semperv. majus 2. seu Jo-vis barba, *Dod. Aizon.* majus, *Cam.* Sedum majus vulgare, *Clus. Germanicè Haus. Wurtz/Donner. Bart. Maur. Pfeffer.*

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Refrig. 3. astring. incrassat. U-
sus prap. intrinsecus in febribus biliosis,
sedat scil. suum, compescit ardorem. Ex-
trinsecus in Angina, &c.

N. Vulgare est plebinostrati, expres-
sus succum cum sacchara in febribus
morbisque calidis propinare.

PRÆPARATA.

1. ∇ . Ex foliis stillat.

2. Succus ex foliis expressus.

N. Adhiberi solet recens in febribus
malignis & biliosis.

CCCXVIII. Senecio.

Senecium, ἡνύκων, herba pappa,
Germ. Creutz. Wurtz/Grind. Kraut.

C. B. Est	{	1. Senecio minor	}	indifferenter usuales.
		vulgaris,		
		2. Senecio minor montana		

1. Appellatur Senecio, *Matth. Fuchf. Cord. in D. Lon. Lob. minor, Cast. vul-*
garis, & 1. Trag. Tab. Erigerum minus,
Dod. Verbena scemina, Brunfels.

2. Senecio 1. *Tab. Erigerum, Ger.*
majus, Dod.

Nascitur passim in hortis, in agris

secus vias, &c. majus sylvestris gaudet &
arenosis. Vere florere incipit, flotes-
que per totam æstatem producit, aliàs
hyberno quoque tempore viret.

OFFICIN.

Folia cum floribus & caule.

Vires. Mixtas vires habet, refriger. ac
simul modicè discut. consolidat. Usus præ-
cip. in cholera, lètero, in temperie calida
Epatis, lumbricis, vomitu & expulsi-
one sanguinis. Ischiatico dolore, fluore mu-
liebri. Extrinsecus in mammis inflam-
matis, scabie (capitis) struma, dolore ven-
triculi, urinæ remorata, arthritide, vul-
neribus.

∇ still. Fit è sol. flor. ac caule, tóta
æstate.

CCCXIX. Serpillum.

Ἐγρίλλος, Diosc. Serpillum, Brunf.
Trag. Fuchf. Lon. Lob. vulgare, Dod.
Ger. Serpillum sylvest. Matthiol. Cord.
in D. sylvestre alterum, Cast. Serpillum
minus fl. albo & fl. purpur. Tab. Serp.
vulgare repens, Clus. hist. Serp. vulgare
minus, C. B. 6. Germ. Quendel/Rün-
lein/Hüner. Röl/wild Polen.

N. Sunt species plures sed hac officinis
usitator.

Crescit locis sabulosis, apricis. Flo-
res Majo mense protrudit, integrâque
æstate fovet.

OFFICIN.

Herba cum floribus.

Vires. Calfac. & sicc. princ. 3. saporis
acris, atten. aperit. Cephalica est, ute-
rina ac stomachica. Usus præcip. in men-
sibus

sibus ac urinacienda (balneo) in expul-
sione sanguinis, spasmo, &c. Extrinsecus
arceat vigilias, cephalalgias, vertiginem.
Ciet menses (balneo.)

PRÆPARATA.

▽. *Stillat.* Ex plantâ cum floribus
Junio collecta

CCCXX. *Sesamum.*

Σησαμύον, Veterum, C. B. Sesamum,
Alpin. Matth. Lob. Dod. Cast. Tab. ve-
rum, Cord. in D. Cam. German. *Lein-*
Dotter / Flachs-Dotter.

N. Est & Sesamum, *Myagrum di-*
etum, ac officinis inusitatum.

OFFICIN. NAT.

Semen quod affertur ex Alexandria
Creta & Sicilia.

Vires. Calfac. modicè humect. emot-
lit, paregoricum, viscosum pingue adeo-
que & Emplasticum est: nervorum du-
ritiem illius discutit, colicis doloribus me-
detur.

PRÆPAR.

Ol. Expressum: Hoc eligatur can-
didum, syncerum: adulteratur enim
oleo nucum & Papaveris, qui dolus
tamen odore & sapore facile dignosci-
tur.

N. Olim solum ex Alexandria Æ-
gypti Venetiasque inde ad nos compor-
tabatur. Hodie & apud nos ex sesamo pa-
ratur.

Vires. Moderatè calf. itidem emol-
lit, maturat, pulmonicum est. Usus pra-
cip. in tussi ac asperitate Pulmonum (lin-
tium) in pleuritide: impingnat, semen

genitale auget. Extrinsecus in duritie
nervorum, aurium doloribus, in ulceri-
bus serpentinis ac malignis.

N. Quia nauseam excitare solet, ra-
rò internum usum subit.

CCCXXI. *Seseli officinarum.*

Αιγυπτιακόν, Diosc. Λιβυτικόν, Gal. Ligu-
sticum quod seseli officinar. C. B. i. Si-
ler montanum, Trag. Dod. Lob. Clus.
hist. Ligusticum, Matth. Cast. verum,
Tab. Seseli Massilioticum, Cord. in D.
Seseli Italicum, Cast.

Crescit copiosè in Liguria Italiz.

OFFICIN.

Semen.

Vires. Calf. sic. menses & urinas ciet,
flatu discutit.

CCCXXII. *Seseli Massi-
lioticum.*

Σέλιν, σεσέλις, Hippocr. σέλι, σίλι, Si-
selios indeclinabiliter, German. *Sesel /*
Sesel-Kraut / Marfilischer Sesel /
Roß-Kümmel / Zirmet / Silermon-
tan.

Est {ferulæ folio } promiscuè usua-
{fœniculi folio } lia.

1. Dicitur Seseli Massiliense, Matth.
Lon. Cast. Tab. nuperorum, Lob. Seseli
Mass. ferulæ aut Dauci Cretici facie,
Lob. Siler montanum, Ger. C. B. 8.

2. Seseli Massil. fœniculi folio, quod
Dioscor. censetur, C. B. 9. Lob. Ses.
Mashl. Dod. Diosc. Clus. hist. nonnul-
lorum, Cam. Fœniculum petrarum,
Tab.

Crescit spontè in Gallia ac Italia,
Uuuuu 3 apud

apud nos non nisi in hortis colitur; solo
gaudet fabuloso.

OFFICIN. NAT.

Radix atque *Semen*, quod verum in
modernis officinis prostat, secus ac an-
tea, ubi semen branca ursina, monente
Tabernamontano, ejus loco venum
iuit.

Vires. Calfac. & sicc. ad gr. usque 3.
incid. aperu. discut. Usus precip. in mor-
bus capitis, Epilepsia (cui tota sua substan-
tia resistit,) in imbecillitate visus, spasma,
&c. in Pulmonum ac pectoris affectibus,
tussi, catarrhu; in Epatis obstructione,
Hydrope, ventriculi cruditate ac inflatio-
ne, in calculo Renum ac Vesica: in men-
sibus obstructis. Specifica antidotus est
cicutae. Extrinsecus in spasma contractis,
in lacte mammarum coagulato, in uteri
impuritate, ac obstructione.

CCCCXXIII. Sefeli Cre-
ticum.

Τογύλιον, Dioscor. Sefeli Creticum
minus, C. B. 4. Cam. Sefeli Creticum,
Lob. Dod. Cast. Tab. Ger. Pimpinella
Romana, vulgo Arab. Arturtilon, Cre-
tischer/ Sefeli, Candischer Sefel.

Crescit sponte in Provincia Galliae,
apud nos non nisi in hortis.

OFFICIN. NAT.

Semen.

Vires. Calfac. & sicc. 2. est nephriti-
cum, uterinum, pulmonicum. Usus precip.
in stranguria, & urinæ remota: dolores
discut. menses ciet, catharrorum expecto-
rationem promouet.

CCCCXXIV. Sideritis.

Σιδερίτις, Sideris 1. Fuchf. Cord. in D.
vulgaris, Cam. in Maub. 2. Clus. hist. 4.
Lon. Sid. Heraclea, Cord. hist. Tab. Si-
deritis seu ferrum matrix, Lob. Sid. vul-
garis hirsuta erecta, C. B. 4. Arab. Te-
trahit. Siderichis. Germanicè Gliedo
Kraut.

N. Matthioli Marrubiastrum pro
Sideriide Dioscoridis habet, cui contra-
riatur Tabern.

Crescit locis apricis montanis fabu-
lofis: floret Majo.

OFFICIN. NAT.

Herba sedrard.

Vires. Absterg. astring. vulneraria est
intus & extra adhiberi apta. Usus precip.
in herniis.

N. Adhibetur videm in morbis incan-
tatione introductis.

CCCCXXV. Siliqua.

Κεράτια, Siliqua edulis, C. B. 1. Sili-
qua, Maub. Cord. in D. Lon. Cast. Cam.
Ceratonia, Dod. Cerata vel Siliqua, Lob.
Tab. Ger. Clus. hist. Sil. dulcis Carub &
Carnub vocata, Alpin. German. Jo-
hanns. Brod.

Crescunt in Regno Neapolitano,
tùm in Insula Creta & Syria.

OFFICIN. NAT.

Fructus (scil. siliqua, cujus succus
melligenus in usum solum venit.

Vires. Siccat & astringit. Usus pra-
cip. in ardore stomachi, tussi, &c. alias
concocta est difficilis.

CCCCXXVI.

CLASSIS I.

CCCXXVI. Sinapi.

Σινάπι, ῥάπι, Arab. Cardel, Senff.

Hortense {
rapifolio: Huius se-
men purpureum
& usuale potissi-
mum.
Sinapi {
apli folio: Huius se-
men rubescens &
minus usuale.
Sylvestre, &c.

Dicitur Sinapi, *Cast. Matth. Sinapi hor-
tense, Cord. in D. Lon. sativum pri-
us, Dod. Sin. sat. Erucæ aut rapi folio,
Lob. Tab. seu album, Cam. C. B. I.*

OFFICIN.

Semen.

Vires. *Calsac. & sic. 4. incidit. atten-
trah. rubificat. Usus pracip. in appeti-
tu. excitando chylificatione promovenda:
in affectibus hypochondriacis ac quartana:
ex mucilagine tartarea, item in quoti-
diana (ante paroxysmum. Dos. ʒj. exhi-
bita) in calculo: caput purgat. Extrinse-
cus in sinapismis, in arcendo cara,) nari-
bus inditum vel in sinapismo adhibitum)
tumores maturos aperit, sternutationem
movet.*

PRÆPARATA.

Oleum. Ex semine expressum.

Vires. *Nervorum affectibus frigidis
consert.*

CCCXLVII. Sisarum.

Σισάριον, Sisar, Siser, *Brunf. Matth.
Cord. in D. Lon. Cam. sativum. Fuchf.
sisarum, Trag. (& Rapunculus horten-
sis,) Dod. Lob. Tab. Ger. Sisarum Ger-*

*manorum, C. B. I. Germ. Gierlein //
Görllin/ Klingel- Rübelein/ Zuckerto.
Colitur in hortis: solo gaudet pin-
gui.*

OFFICIN.

Radix.

Vires. *Cals. 2. saporis subamaris sub-
astring. ventriculo convenit, appetitum
excitat, diuretica ac lithontripica est, be-
ne nutrit, facile concoquitur, specifica an-
tidotus censeitur & vivi.*

N: *Est usus potius culinaris, quam of-
ficinalis.*

CCCXXVIII. Solanum.

Σολύ, Solatrum, Nacht- Schat-
ten/ Sāw- Kraut.

Solani varia occurrunt genera: quo-
rum alia baccifera sunt, alia pomifera.
Verum officinis quod usitatus. Solanii
titulo, est solanum officinarum, *C. B. I.
Solatrum, Brunf. vulgare, Trag. Sola-
num, Lon. hortense, Matth. Fuchf. Dod.
Lob. Cam. Ger. sativum, Tab. Solanum
nigrum, Cord. in D.*

*Crescit: juxta sepes ac vias: floret æ-
state: integrâ.*

OFFICIN. NAT.

Herba, bacca.

Vires. *Refrig. 2. reliquis temperate:
sunt, adstring. appellunt. Usus pracip. ex-
terne in Erysipel. in dolore capitis, in aestu
febrili mitigando (capiti ac pedibus ap-
plicata) in paroditibus.*

PRÆPAR.

▽ *Stillat. Ex herba cum floribus.*

N: *Sundr*

N. Sunt qui ante Biennium exhibere
vetant.

CCCXXVIII. Sorbus.

O, ðn, Sorbus, Sperber-Baum.

Sorbus { lativa. Hac officinalis.
C.B. { sylvestris.

Insignitur sorbus, Brunsf. Trag. Dod.
Cord. in D. Lon. Tab. Ger. Sorb. Dome-
stica, Matth. Lob. Cast. Sorbum ova-
rium, Fuchs. Sorbus legitima, Clus. hist.
est. Antea, Cam.

Crescit in hortis: maturos fert fru-
ctus autumnus.

OFFICIN.

Fructus, (Sorbum, Speyerling /
Suov.)

Vires. Refrig. & sic. astring. Usus
præcip. in fluxionibus alvi, uteri, &c. Ex-
trinsecus adstringit vulnera (fructus pul-
verisatus.)

N. Sorba colliguntur potissimum, im-
matura, exiccanturque tum in aëre, tum
in Clibano: siccata pulverisantur pro usu
Medico, pauci enim sunt nutrimenti.

PRÆPARATA.

Condit. Flores cum melle.

CCCXXIX. Spica.

{ Spica mas.
{ Spica fœmina. Lavandula.

Non discrepant nisi magnitudine,
quæ tam flor. quàm foliorum in spica
majore est, in Lavandula minor: odor
itidem spicæ gravior est, Lavandulæ
gratior, ideoque promiscuè usurpari
possunt.

Mas insignitur Lavandula latifo-

lia, C. B. 1. Spicanardus Germanica;
Trag. Nardus Italica, Matthiol. Lob.
Germanica, Lon. Lavandula, Dod. ma-
jor, Cord. Pseudonardus, Matth. Cast.
mas, Fuchs. at in icon: fœmina, Lavandu-
la latioribus foliis 1. Cam. 2. longiore fo-
lio, Clus. Lavendel.

Fœmina dicitur Lavandula angusti-
folia, C. B. 2. Lavandula, Trag. Matth.
vulgaris, Cord. in D. minor, Cord. hist.
Pseudonardus fœmina, Matth. Fuchs.
(at in icon, mas) Lavandula, Lob. Spica
nardi, Cam. brevior folio & spica, Clus.
Spicanard.

Colitur utraque in hortis, nobisque
vulgatior est spica fœmina: Floret Ju-
nio ac Julio.

OFFICIN. NATIVA.

Flores utriusque.

Vires. Calfac. & sic. 3. (prævalet ta-
men spica) saporis subacris ac subamari,
partium tenuium, cephalica est ac ner-
vina. Usus præcip. in catharris, paraly-
si, spasmis, vertigine, lethargo, tremore artu-
um. In urina, mensibus ac foetu pellendo
(unde & parturientibus exhiberi solet)
in torminibus ventris flatulentis. Extrin-
secus in luxuriis, capitis ac artuum affecti-
bus, in Masticatoriis (pro catharro exic-
cando ac revellendo ad palatum ne ad
pulmones defluat.

N Odore suo fugat pediculos.

PRÆPARAT.

1. Conserv. Flor. Lavandulæ.
2. Confect. Flores.
3. ∇ stillat. Ex floribus irrigatis sc. vel
vino vel aquâ.

4. Ol.

Ol. spica stillat. eum ▽. ascendit.

N. Asportatur ad nos sat copiose ex Provincia Gallia regione, ubi copiose crescit, utriusque motus ac dolores compescit umbilico illi.

CCCXXX. Spica Celtica.

Nardum Celticum, *Matthiol. Cord. hist. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger.* Nardum Celticum in Dioscorid. C. B. 4. Nardus alpina seu celtica, *Clas. alius*, Romana Galatica, Saliunca, German. Celtischer Marden.

Crescit in Liguria, in Carinthia, Styria, in alpinis Tyrolis. &c.

OFFICIN. NAT.

Radicula, cum adnatis, colligenda Julio & Augusto.

Eligenda recens, jucundi odoris, radiculis numerosis, cohaerens, non fragilis, & plena.

Vires. *Calfac. & sicc. virinumque earundem* est cum spica Indica; sed imbecilliorum majore tamen cum utilitate adhibetur in urina cienda, ventriculo corroborando, flatibus discutiendis. Extrinsicus additur malagmaticis, unguentisque calfacientibus.

CCCXXXI. Spica Indica.

Nardus Cord. in D. Lob. Nardus Indica, *Matth. Cord. hist. Lon. Cast. Ger.* Nardus seu Spica Indica, spica nardiofficin, C. B. 1. Arab. stumel, Indianisch Spicanarden.

Radix est officinalis ex India Ale-

xandriam, atque inde Venetias & in Germaniam transportata. Dicitur autem spica, quod spicae similitudinem habeat.

N. Est & Nardus spuria Narbonensis, ut & Nardus montana, valeriana non ab simili; verum officinis nostratibus peregrina.

Eligenda recens, levis, longam comam habens, spicam vero brevem, colore flavo, aliquantulum redolens Cyperum, sapore amaro ac linguam attrahente, quae diu in sua odoris gratia permanet.

N. Madefacta dolose vendi solet, quae fraus deprehenditur, quod spica sit candida, squalida, nulloque pulvere obsita, filis vel lana instar crinita.

Vires. *Calfac. 1. sicc. 2. atten. astring. nephritica & stomachica est.* Usus praecip. in urina ac mensibus ciendis, in ventriculi rosione, inflatione, in Ictero, &c. Extrinsecus in lixivis cephalicis, balneis uterinis, &c.

PRÆPAR.

1. Oleum Nardinum simplex. Fit ex coctione in ol. communi, vino aqua.

2. Oleum Nardinum compos. Fit ut simplex additis nonnullis aromatibus.

CCCXXXII. Spinachia.

Spinachia, (Spinacia,) *Brunf. Fuch. Dod. Tab. Lon. Cast. Matthiol. Lob. Ger. mas, Cam. vulgaris. Trag. Lappathum hortenfe seu Spinachia semine* Xxx xx Spino-

Spinoso, C. B. 2. German. Binetsch/
Spinat.

Colitur in hortis: floret ut plurimum
Julio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia seu Herba. Potissimum culina-
ris est.

Vires. Refrig. & hum. i. utilis cibus in
omnibus morbis, laxat alvum, lenit aspe-
ritatem pulmonum. Extrinsecus refrige-
rat ventriculū ac Epar (imposita)

N. Continuus usus melancholicum ge-
nerat sanguinem.

CCCCXXXIII. Staphisagria.

Staphisagria, Trag. Matthiol. Fuch.
Dod. Lob. Cast. Cam. Herba pedicularis,
Cord. in D. Arab. Alberas, Käuß Kraut/
Speichel Kraut/ Bißmünz/ Mäuß
und Ratten Pfeffer.

Crescit in Apulia, Calabria, Dalma-
tia, Istria.

N. Crescit & apud nos species quadam,
verum minus illa usitata est.

OFFICIN. NAT.

Semen triquetrum & asperum.

Vires. Internus usus purgatorius est:
sed rarus. Extrinsecus ejus usus est apo-
phlegmatisans in masticatoriis, gargaris.
odontalgicis (cum ✕) ac abstergentibus,
in ulceribus ac papulis, &c. Adhibetur &
in phthiriasi.

CCCCXXXIV. Stachas.

Στάχας, Stachas, Trag. Matth. Lob.
Lon. Cast. (Stichas) Fuch. Dod. Stich.
Arabica, Cord. in hist. Cam. St. brevio-
ribus ligulis, Clus. hist. St. purpurea,

C. B. 1. Arab. astochodas, Römischer /
Welscher / frembder Rummel oder-
Thymian/ Stachas Kraut.

Crescit copiose in Insulis Galliae, quae
Stachades dicuntur, optima tamen
censetur Arabica (unde ad composicio-
nes recipere monent Arabicam.) Huic
succedit Cretica.

OFFICIN. NAT.

Flores seu potius spica compressa, in-
ter florum ac seminum proventum col-
lecta.

Eligendae spicae recentes odoratae,
& subamarae, si haberi possunt Arabi-
cae.

Vires. Calfac. 2. & sicc. 2. absterg. at-
ten. aperit. Usus praecip. in affectibus capi-
tis & nervorum, scil. in vertigine, Apo-
plexia, Paralyti, Lethargo: In morbis pe-
doris iidem praestat quod Hyssopus: insu-
per urinam & menses ciet, venenis resistit,
affectibus hypochondriacis succurrit. Ex-
trinsecus in lotionibus capitis, suffitu,
&c.

PRÆPARATA.

1. Syr. de Stachade simplex. V. D.
2. Syr. de Stachad. compos. V. D.
3. Syr. de Stachad. Fernelij. V. D.

CCCCXXXV. Stachas.

Citrina.

Ελίχρυσον, Elichrysum seu Stachas:
citrina angustifolia, C. B. 4. Stach. ci-
trina, Matth. Gesn. Dod. Cast. Tab. A-
maranthus luteus, Fuch. Lon. Coma
aurea, Lob. aliis Tineraria (quod tineas
abigat,) Germ. Rhein Blumen/ Mote-
ten Kraut.

Crescit:

CLASSIS I.

163

Crescit locis aridis & sabulosis, & convallibus frequens juxta Rhenum, floret Junio.

OFFICIN. NAT.

Flores.

Vires. Calfac. & sicc. incid. aperiunt, diaphoretici ac vulnerarij sunt. Usus præ. in obstructione urina, Epatis, Lienis, mensum: coagulatum sanguinem resolvunt, catharos exiccant, menses nimis fluentes siccando sistunt, lumbricos fugant: commendantur & imprimis ad exiccandas defluxiones acres Pulmonum, &c. Extrinsecus faciunt ad emolliendam uteri duritiem, (in balneo) lentes abigunt (in lixivio capitis) defluxiones siccant & discutiant (suffitu,) &c.

N. Sunt qui amuleti loco de collo suspendunt, lumbricosque v. utriseo fugari volunt. Dn. D. Arnold. Weichard. in thesauro pharmaceutico.

CCCCXXXVI. Succisa.

Succisa, Matth. Fuchf. Dod. Cast. glabra, C. B. Jacæa nigra Brunfels. Morfus Diaboli, Trag. Lob. Lon. Tab. Germ. Albbiß/Zeussels Albbiß.

Crescit passim in Campetribus, pratis ac juxta arva: floret Julio, Augusto, Septemb.

OFFICIN. NAT.

Radix. Flores. nonnunquam & Folia.

Vires. Calf. & sicc. z. amara, alexipharmaca ac vulneraria est, ut Scabiosa, cum qua & reliquis facultatibus convenit. Imprimis celebratur in Epilepsia,

Peste, uteri dolore, sanguine coagulato, abscessibus occultis, lue venerea, ejusq. ulceribus, in vulneribus recentibus, &c. Extrinsecus in angina, tumoribus tonsillar. diuturnioribus, qui ad suppurationem ægrè perveniunt (gargaris, in sugillationibus, bubonibus, &c.

PRÆPARATA.

▽. stillat. Ex integra planta (cum rad. & flor.) collecta in fine Julii.

CCLXXXVII. Symphytum.

Officin. Hujus loci.

Majus tuberosa radice.

Minus tuberosa radice.

Symphytum. Minus borraginis specie.

Maculosum, v. de Pulmonaria.

Petræum, minus usuale.

Minus usuale.

Insignitur consolidamajor, Brunf. Trag. Cam. Ger. symphytum. Lon. majus, Matthiol. Cord. hist. Cam. Cast. Tab. magnum, Fuchf. Dod. alterum, Cord. in D. Symphytū Alum & Alus, Lob. Consolidamulgo, Solidago, Germ. Wasse Wurk/Schwarz, Wurk/Schmeere Wurk/Beintwell.

Crescit in pratis, & hortis, gaudet loco humido: Floret Mayo ac Junio, floresque fert purpureos vel albos: illud marem vocant, hoc fœminam, quæ hoc tractu vulgarior crescit.

Xxxxx z

OFFI-

OFFICIN. NAT.

Radix, Folia, Flores.

Vires. Caliditate temperatum est, sicc. 2. vulnerarium est è precipuis celeberrimum, mucilaginosum, incrassans, acrimoniamque humorum obundans, imò & incidens, adeoque partium mixtarum. Usus precip. in fluxionibus quibuscunque in primis alvi in Erosione Pulmonum ac phthisi, in herniis, ruptis venis, fractis ossibus, &c. Extrinsecus vulnerum sanguinem sistit, fracturas ossium ac vulnera consolidat.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex herba cum radice.
2. Conserv. Ex floribus.
3. Condita Radix. V. Renodæum.
4. Syrup. de Symphyto. V. Disp.
5. Extract. Symphyti. ꝑ. mucilaginem radice coctæ inspissatam. Extrahe cum V ac abstrahere.
6. Extractum sanguinem. Sanguis. ꝑ. Rad. recent. symph. maj. & min. conquassa in formam pultis. Hinc adde panis $\frac{1}{4}$. (scil. fecalini vel triticei. M. ac irriga cum vino generoso, inde Phiolæ vitreæ occlusæ cera Hispanica, digere aliquamdiu in fimo vel V. Hinc exprime, digere, fecesque subsidentes separa, reliquum inspissa. Vide Quercet. Ph R. c. 26.

Vires. Præstat ad hernias & ulcera omnia.

Dosis ꝑj. ad dies pluresculos.

7. Oleum stillat. Ex radice sicca per Retortam elicitur.

N. Oleum hoc ut per paucam elici,

curandis intus & extra adhibitur.

T.

CCCXXXIII. Tamariscus.

- Tamariscus } 1. Germanica. Hæc usua-
C.B. est } li.
 } 2. Gallica.
 } 3. Egyptia.

Dicitur Tamariscus, Brunfels. Lon. fœmina, Cord. hist. Myrica, Trag. Clus. sylvestris seu Tamarix, Matth. Cast. Dod. Tab. Tamarix sylvest. fœmina, Fuchs. Tam. humilis, Cord. in D. Myr. sylv. altera, Clus. hist. Myr. altera in Germania, Cam. Tam. fruticosa folio crassiore, C.B. al. Murica, Arab. Tarfa, Tamariscen. Holk.

Frutex est arborescens similis Sabinæ, in tantam excrescens magnitudinem, ut doliola inde fiant mentur. 1. capientia, quæ vulgaria sunt nostratibus.

Nascitur juxta Rhenum & Danubium, tum quoque secus paludes, sole gaudet saxoso.

OFFICIN. NAT.

Lignum, Radix, Cortex, (qui maxime usualis est, in primis radici detrahus.)

Vires. Cortex calfac. & sicc. 2. (lignum ad frigiditat. inclinat) atten. aper. absterg. subastring. diureticus est ac splenicus. Usus precip. in obstructione ac tumore Lienis (quem absolvere scribit Diosc.) in morbis ab araribus ac sero oriundis.

undis, ut scabie, pruritu, in ltero nigro, profluvio albo mulierum, &c. Extrinsecus inprimis in tinea capitis, & obstr. mensium (infectu.)

PRÆPARATA.

1. *Extract.* è corticibus fit l.a. cum ∇ vel ∇ . v.g. flor. genistæ, scolopendriæ, & sim. Querc. Ph.R.

2. *Sal.* Ex incinerato ligno, l.a.

CCCXXXIX. *Tanacetum.*

Tanacetum C.B.	{	Odora	1. vulgare luteum.
			<i>Hoc usuale.</i>
			2. foliis crispis.
			3. minus, album.
{	Inodorum	4. alpinum.	
		minore.	
	Flore	major.	

Dicitur Tanacetum, Matricariæ 2. species & parthenium, *Brunf.* Tanacetum vulgare, *Trag.* Tanacetum, *Matth.* *Lon.* *Dod.* Artemisia tenuifolia, *Fuch.* Ambrosia quibusdam, *Cord. in D.* Tanacetum millefolii foliis, *Lon.* Athanasia seu Tanacetum, *Cast.* Artemisia *Dioscor.* *Tab.* Græcè *Aglexistia* *lemisofulla* G., Athanasia, Tanasia, Germ. *Steinfarn/Wurm Kraut.*

Nascitur locis arenosis incultis: floret Junio & Julio.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus, Semen.

Vires. *Calfac.* & sic. incid. discut. vulnerarium, uterinum & nephriticum est. *Usus* præcip. in lumbricis, torminibus ventris, calculo impuritat. que Renum ac Vesicæ, mensibus obstruclis, statim

bus, hydropo, &c. Extrinsecus in eadem affectibus adhiberi potest, lavando, cataplassando, &c.

PRÆPAR.

1. ∇ stillat. Ex tota planta florente.

2. Oleum stillat. quod rarò prostat.

CCCXL. *Taraxacum.*

Dens Leonis, *Brunf.* *Matth.* *Dod.* *Lob.* (& corona, caput Monarchi,) *Tab.* *Ger.* Hieracium majus, *Trag.* parvum, *Cord. in D.* Hedipnos major, *Fuch.* Taraxacon minus, *Lon.* Dens Leonis latiori folio, C. B. i. Germ. *Pfaffen-Blat/Münchs-Kopff.*

Habetur & major & media quæ vulgarior est folio acutiore, aliquando obtuso.

Crescit in herbosis locis: Floret Aptili, Majo.

OFFICIN. NAT.

Radix, Folia.

Vires. *Refrig.* & sic. 1. saporis amari, absterg. aperit, Epaticum est, cum Endivia conveniens, quâ tamen potentius operatur. *Usus* præcip. in febr. putrid. inveteratis, &c. Extrinsecus maculas abigit oculorum (lac ex disrupto caule, ter quotidie oculis inditum,) vulnera ac ulcera abstergit, &c.

N. Radix amuletice curare dicitur affectus oculorum, peculiari tamen modo, ut volunt collecta. Nimirum, sunt qui infrorsum per fossam subius factam evellunt. Sunt qui quoquo modo fossam in novem secant frustra, novemque diebus de collo suspendunt. Alij integram radicem

XXXXX }

dicent

dicem adhibent. Idem Amuletum & tertianam fugare dicitur.

PRÆPARATA.

▽. stillat. Ex plantâ cum radice, foliis ac floribus collecta initio Maji.

CCCXLI. *Thlaspi*

Batvren. Senff. Genera varia sunt, eaque promiscue usualia. Præferuntur tamen arvensia.

Nomen *Thlaspi* Botanicis ferè omnibus vulgare est.

Nascitur in locis incultis, laxosis, apricis, parietibus ac tectis. Floret Majo, maturescit Junio.

OFFICIN. NAT.

Semen & Herba.

Vires. *Calfac. & sicc. 4. abstergit.* Usus præcip. in internis abscessibus rumpendis, mensibus ciendis, Ischiaticis affectibus curandis. Extrinsecus abstergit ulcera quacunq; manantia, insuperq; ptarmicum est, sed minus vulgare.

N. Gravidis quia foetum necat, insensum censetur.

CCCXLII. *Teucrium.*

Teucrium; *Fuchf. Cord. in D. Lon. Lob. Cast. Teucrium 1, Tab. & C. B. 2. Matt. chamædrys 2. seu affurgens, Dod. Teucrium vulgare fruticans seu 1. Cins. hist. Teucr. latifolium, Ger. Germ. groß Batthengel.*

Crescit locis herbosis asperis, aridis apricis: Floret Aprili, Majo.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus, vel & herba antequam flores eruperint collecta.

Vires. *Calfac. & sicc. 2. Epatica est, saporis amari, viribus omnino conveniunt cum chamadri.*

CCCXLIII. *Thymus.*

1. Vulgaris, folio tenuiore.

Hæc usualis.

Thymus 2. Vulgaris folio latiore.

C. B. 3. Capitatus.

4. Inodorus.

Dicitur *Thymus*, *Brunf. Trag. Matt. Fuchf. Cord. hist. Lon. Thymus durior, Cam nostras, Cord. in D. Scrpillum hortense, Dod. aliàs Thymum, Arab. Hæcce. Germ. Römischer, Belscher Quendel/Thymian.*

Crescit nostratibus in hortis: floret Julio.

OFFICIN. NAT.

Herba seu Folia & Semen.

Vires. *Calfac. & sicc. 3. saporis subacris, attenu. incidit, discutit.* Usus præcip. in affectibus *Tariareis. 1. Pulmonum, ut asthmate, tussi, 2. Artuum, ut podagra, omnia viscera reserat, appetitum excitat. Extrinsecus in humoribus frigidis, sugillationibus, inflationibus ventris, doloribus arthriticis.*

PRÆPAR.

1. ▽ Ex herba cum floribus.

2. Spiritus.

3. Oleum stillat.

CCCXLIV. *Thymiana.*

Thymiana (officinis corruptè *Thymiana* vel *Thuris cortex*, vel *Thus Judæorum*, quod *Judæi* in suffumigiis

giis frequenter eo utantur) corticosum. quid est ex India allatum, Videatur Sty-
rax rubra, Bellon. Nascaphtum, Cord.
hist. Storax rubra officinarum, C.
B. 3.

Vires: Constructionibus vulvae ex sus-
fitu prodest. Odoris jucundi gratia &
suffimentis immiscetur. Vide thuris cor-
tex. Class. 2.

N. Sunt & qui Ammoniacum ele-
um, hymiama appellant.

CCCXLV. Tilia.

Tilia, Lin.
den-Baum. { Mas & sterilis. Hac nobis:
 { inusitata.
 { Fœmina, flores ac semen
 { profereus.

Dicitur Tilia fœmina, Brunf. Matth.
Fuchf. Lob. Tab. 1. Tilia, Lon. Dod. sativa,
Frag. Phyllirea, Cast. Tilia fœmina fol.
majori, C. B. 5.

N. Est & folio minori Tilia sylvestris,
Trago, quæ priori per omnia similis, nisi
quod sit minor & nigrior.

OFFICIN. NAT.

Flores, Folia, Cortex, Semen, Lignum.

Vires. Flores calf. & sic. partium te-
nuium, discut. cephalici sunt. Usus pracip.
in Epilepsia, Apoplexia, Vertigine.

Folia ac Cortex siccant, repellunt, u-
rinam ac menses cient. Extrinsecus am-
bustis subveniunt (mucilago scil. extracta:
ac inuncta.

Semen fluxionibus quibuscunque me-
detur, etiam hæmorrhagia narium, (nari-
ribus scil. induum.

Lignum in titiones & aspersione re-

ductum, sanguinem coagulatum fortiter
resolvit.

Extrinsecus adhibentur folia in aph-
this ac tumoribus pedum discutiendis:
corticis mucilago in ambustis ac vulneri-
bus magni est solaminis.

N. Humor defluens e medulla dissecta:
tilia capillorum defluvio succurrit.

PRÆPARATA.

1. ∇ Stillat. Ex floribus.

2. Conserv. Ex floribus.

CCCXLVI. Tormentilla.

Tormentilla { 1. Sylvestris. Hac usua-
 { lis.
 { major.
C. B. { 2. Alpina { folio feri-
 { ceo.

Appellatur Tormentilla, Brunf. f.
Matth. Dod. Cord. Lon. Lob. Cast. Tab.
(cui consolida rubra, Ger. Heptaphyl-
lum, Fuchf. Germ. Tormentill / Heiß.
Wurk / Blat. Wurk / roth Gungel /
roth Heil. Wurk / Rubr. Wurk.

N. Sunt qui $\chi\gamma\sigma\upsilon\beta\gamma\sigma\upsilon\upsilon\upsilon$, Dioscor. esse
velint.

Crescit passim in herbosis ac areno-
sis locis: florere incipit Majo.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires: Siccat. 3. sine insigni calidi-
tate, astringit, vulneraria, diaphoretica:
ac alexipharmaca est. Usus pracip. in
peste, morbisque cæteris malignis, in pri-
mis si cum fluxu alvi conjuncti sint, in
catharris exiccandis, in lue venerea,
in veneno hausto, in vulneribus. Sum-
matim:

matim non est vegetabile, quod in fluxionibus quibuscunque (alvi, uteri, &) usitatus sit, quam hac tormentillaradix. Extrinsecus iisdem adhibetur variis in affectibus, in vomitu, vulneribus, & sim.

PRÆPARATA.

1. ∇ . *stillat.* Ex herba tota cum floribus collectis Majo.

CCCXLVII. *Trichomanes.*

$\tau\rho\iota\chi\omicron\mu\alpha\nu\epsilon\varsigma$, seu *Polytrichum* officinarum, C. B. *Trichom.* *Trag. Matthiol. Fuchs. Dod. Cord. hist. Lob. Cast. Cam. Trichom. mas. Tab. Ger. Adiantum rubrum, Lon. Polytrichum vulgò Cassalp. aliàs capillaris Filicula. German. Widertodt.*

N. C. B. Ex Tabern. diversa genera refert, verum promiscuè singula in usum accersi possunt.

Provenit locis humidis juxta aquas in vetustis parietibus ac muris. Virescit perpetuò, sterileque est.

OFFICIN. NAT.

Flores seu herba integra.

Vires. *Adiantum* (capillo ♂ ut & *Ruta muraria*) facultatibus omnibus respondet, ideoque eo recurrendum. Peculiariter tamen monet Tabern. quod ∇ *stillat.* in primis proficua sit, in quibus je-cur putrescere incipit.

CCCXLVIII. *Trifolium.*

Trifolii quam plurima passim occurrunt genera, nimirum plantæ quæcunque foliis ternis germinantes hoc sibi

met nominis jure nativo vendicant. Ex omnibus tamen non nisi species paucas officinis inservire comperimus: hæ sunt.

Trifol. { *Acetosum. Vide Acetosella.*
 Anteum. Vide Epatica nobilis.
 Odoratum. Vide Lotus & melilotus.

CCCXLIX. *Triticum.*

Triticum nobis usitatus est duplex hybernium & æstivum.

1. Dicitur hybernium aristis carens, C. B. 1. *Matth.* Triticum, *Brunf. Cord. b. Dod. Tab. Trit. 1. genus. Trag. Fuchs. Lon. Siligo spica mutica, Lob. Trit. spica mutica, Ger. Topòs, Robus, Arab. Henta, Henca, Hantha, Germ. Weisk/ Winter-Weiske.*

2. Appellatur triticum æstivum, trimestre Setanium, *Gal. German. Sommer-Weiske.*

Est & triticum terrestre, *Cord. aliàs Zea amilea, vel Zoopyrum amyleum, C. B. 3. Trit. 2. Trag. Trit. amyleum, Tab.*

OFFICIN. NAT.

Semen ejusque Farina & Furfures.

Vires. Moderatè calfac. emollit, maturat, discutit, internus ejus usus cibarius est, multum enim ac bonum nutrimentum suppeditat, incrassat & obstruit. Extrinsecus adhibetur (farina in tumoribus molliendis, leniendis, &c. in oculorum inflammationibus ac fluxionibus (cataplasmatibus forma imposita) in

Erysi-

Erysipelate, podagricis que doloribus leniendis (sicca farina imposita.)

Furfures abstergunt squamulas capitis, leniunt dolores, (in cataplas. vel sacculus.)

Triticum triunestire inservit amylo conficiendo.

PRÆPARATA.

1. ∇ stillat. Ex pane in MB.

Vires. Sistit fluxus alvi in infantibus, &c.

2. Oleum tritic. Parari potest destillando per descensum, ex tritico contuso, sed inusitatum est.

N. Alij extendunt triticum contusum super laminam ignitam, vel torrent in sartagine ac exprimunt.

CCCL. Tussilago.

Tussilago	{	Vulgaris. Hec usualis.
		Alpina {
		rotundifolia glabra.
		rotundifolia canescens.
		folio oblongo.

Dicitur $\theta\eta\chi\iota\omicron\nu$, Diosc. Cord. hist. Ungula Caballina, Brunfels. Trag. Tussilago, (Bechium,) Matth. Fuchs. Cord in D. Lon. Dod. Lob. Cast. vulgaris, Cam. alijs Farfara, Farfarella, German. Huffs. Lattich / Brand Lattich / Rosshub.

Nascitur in amoenis ac riguis locis, crepidinesque fluminum amat: Floret Martio.

N. Dicitur & Filius ante patrem, quia Februario & Martio folius nondum egressus, repente floret, floresque fugacissi-

mos ultra biduum ferè cum caule non perstantes profert.

OFFICIN. NAT.

Folia, Radix.

Vites. Radices & Folia virentia temperatis proxima sunt, (al. refr.) siccata verò modicè acris & calida evadunt. Planta est thoracica. Usus prap. internè in tussi (unde & nomen habet) orthopnea, vomituq, pectoris, quibus singulis & summus ejus ore hiantè attractus mederi creditur. Extrinsecus prosunt ulceribus calidis & inflammationibus (folia recensia imposita.)

PRÆPAR.

1. Syr. de farfara, è succo foliorum.

2. Conserv. è flor.

3. ∇ . stillat. è foliis.

4. Succus. 9. diebus bibitus quartanam tollere dicitur.

V.

CCCLI. Valeriana.

Valerianæ	{ Hortensis,	
usuales	{ Sylvestris	Major.
sunt	{	Minor.

Hortensis insignitur. Phu magnum, Fuchs. Matth. Lot. majus, Matth. Cord. hist. verum, Cord in D. Ponticum, Tab. Valeriana vera, nardus agrestis, Trag. Valer. major, Lob. Cam. Valer. hortensis, Dod. Ger. C. B. 1. (cui & Phu folio olusatris Dioscoridis) Carpesium, Cast. Terdina Paracelso, groß Baldrian / groß Garten Baldrian.

Sylvestris major, C. B. 4. dicitur
Yyy yy Phu.

Phu similitudine Elaphobosci Dioscoridi. Valeriana, *Brunf. vulgaris, Trag. Cord. in D. Sylvestris, Lob. Dod. Cam. Clus. hist. major, Tab. Phu parvum, Matth. Cast. Phu Diosc. Brunf. vulgare, Fuchs. Tab. Phu Germanicum, Fuchs. großwild Baldrian.*

Minor appellatur Valeriana palustris (sylvestris) minor, *C.B. Valeriana exigua vel 4. Trag. Valer. minor, sylvestr. Lob. minima, Dod. sylvestr. seu palustris minor, Cam. Phu minus, Lon. Tab. minimum, Matthiol. Cast. Cam. (Epit.) Klein Baldrian.*

Phu verum colitur nobis in hortis, in Ponto & Creta sponte provenit, nasciturque in pratis, aliisque locis humidis: minus, in Campestribus udis: florent Majo, Junio ac Julio.

Optima censetur hortensis, cui succedit minor, ac demum major.

OFFICIN. NAT.

Radix præcipue stū & Herba Phu veri. Vires. Calfac. & sicc. atten. aperiunt alexipharmaca, sudorifera ac diuretica sunt. Usus præcip. in imbecillitate visus, peste, asthmate, pleuritide, obstruct. Epatis, Lienis, Ureterum, Hernia, Ictero, & simil. Extrinsecus confortant visum, maculas oculorum abstergunt, cephalalgiam sedant, menses cient, sudorem promouent (in balneis) exiccant catarrhos (suffitu) bubonum ac anthracum malignitatem corrigunt, globulos sagittasve infixas extrahunt, ulcera inveterata mundificant.

N. Sunt qui radicem pro amuleto febris quotidiana habent, eamq. de collo suspendunt.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex integra planta (radice, caule ac foliis) in fine Maji.

2. Extract. Itidem ex integra planta vel radice sola paratur.

CCCLII. Verbascum.

ϕλόμω, Candelaria, Candela regis, Lanaria, Wull-Kraut / Kerken-Kraut / Brenn-Kraut / Himmel-Brand / Unholden-Kerken / Königs-Kerken.

Verbascum C. B.	{	Album	{	latifolium luteum, C. B. 1.
				mas
		fœmina	{	flore luteo magno, 3.
				flore albo, 4.
Nigrum	{	fol. papav. corniculati.		
		flore ex luteo purpurascens.		
Salvi folium, Hoc singulare & rarum speciebus, 4.				

Ex his usualiora sunt. Verbasce. mas latifolium luteum, cujus Vicarium est,

Verbasce. fœmina flore luteo. Prius insignitur Verbascum, *Matth. Cord.*

Cord. in D. Verbasum mas, *Lob. Cast. Tab.* Verbasum candidum mas, *Lon.* Verbasum latius, *Dod.* Tapfus barbarus, *Ger.*

Posterius, Verbasum seu candela regia, *Trag.* Verbas. nigrum, *Fuchf. Lon.* Verbasum maximum album foemina flore subpallido, *Lob.* Verbas. luteum, *Tab.* Verbas. lignite minus, *Ger.*

Crescunt locis arenosis: Florent Junio.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores, Radix, sed raro.

Vires. Calf. moderatè ac sic. emoll. discut. dolores lenit. *Usus* prap. in morbis pectoris, tussi, expuitione sanguinolenta, torminibus ventris.

N. Radix hamorrhoidum fluxum & dolorem sistere dicitur (dieb. 9. vel 10. continuis assumpta.)

Extrinsecus sunt flores ac folia prap. astimationis, in sopiendis doloribus quibuscunque & in primis in affectibus ac tumoribus ani (hamorrhoidibus:) in capillis lutes colore tingendis.

PRÆPAR.

1. ∇ Stillat. Ex floribus.

2. Oleum. Ex infusione iterata flor. in ol. oliv.

N. Matthioli oleum parat ex floribus solis, quibus vitrum repletum, beneq; obturatum exponit soli, qua ratione flores aliquatenus liquefcunt.

CCCLIII. Verben.

Peristereum, Verbenaca, Verben. Arab. Beneran, Albea, &c. Eisen

Kraut/Eisenreich/Eisenbart/DaubenKraut.

Verbena { 1. Communis. *Hac usualis.*
2. Tenuifolia Verbenaca supina, *Tab.*
3. Fœmina. *V. Erysimon.*

Dicitur Verbenaca, *Lon.* recta. *Trag.* mascula, *Brunfels.* communis & sacra recta, *Lob.* Verbenaca, *Matth. Cast.* supina (& fœmina,) *Fuchf. Cord. in D.* recta, *Dod. Tab.* fœmina, *Cam.* vulgaris, *Clus. hist. al.* Columbaris. Verbenaca communis cœruleo flore, *C. B. i.*

Crescit passim juxta muros & vias: Floret Julio ac Augusto.

OFFICIN. NAT.

Herba seu folia.

Vires. Calfac. & sic. saporis amari, astring. Cephalica ac vulneraria est. *Usus* prap. in dolore, aliisque affectibus capitis (à frigidis humoribus) in affectibus oculorum pectoris, in tussi inveterata in obstruct. Epatis ac Lienis, Ictero, torminibus ventris, dysenteria, in primis attērit ac expellit calculum, libidinem coeracet, febrim tertianam fugat, arthritidem mitigat, vulnera sanat, partum faciliat. Extrinsecus in cephalalgia, odontalgia, alopecia, melancholia in oculorum lippitudine, imbecillitate, rubore, in Angina, in raucedine (collo circumplasmata) in tumore glandularum, in faucibus (gargaris.) in dolore Lienis (cum axung. porci.) ac podagrigo mitigando, in vulneribus astringendis ac putridis abstergendis, in procidentia ani, in mariscis, &c.

Yyyyyy 2

N. I.

N. 1. Sunt qui febrim tertianam ac quartanam peculiari modo eâ curant. Nimirum in tertiana recipiunt geniculum tertium (à terra) idque sursum decerptum propinant: in quartana quartum.

N. 2. Amuleticè strumam verbenâ curari, sunt qui statuant. Modum Marcellus Empyricus edocet. Radicem transversim in partes duas iubet dividere, inferiorem suspendere de collo, superiore in fumo. Sic arecente parte superiore & strumam arefcere ait. N. Quod si utraque pars postmodum in fluentem congiaciatur, malum recrudescere idem asserit.

N. 3. In dolore capitis sedando quantum valeat si de collo suspendatur, videre licet apud Forest. lib. 9, observ. 52.

PRÆPAR.

1. ▽ Stillat. Ex herba cum floribus æstate collectis.

2. Est & unguentum de verbena, aliàs unguentum Jovis dictum. Vide Augst.

CCCLIV. Vermicularis.

Sedum minimum, Tab. 3. Fuchs. Sedum minus 3. & Vermicularis, Trag. Lob. 3. Matth. Cast. Sempervivum minimum, Illecebra. Sempervivum, 3. Dod. Lon. αἰγόου, 3. Dioscor. αἰγ. acre. Cord. hist. Portucula 3 Brunf. Vermicularis sive Illecebra, Ger. Germ. Mator Pfefser / Klein Hauss Wurtz.

Crescit in muris, locisque arenosis. Floret maximè æstate integra.

OFFICIN. NAT.

Folia cum Floribus.

Vires, Calfac. & sicc. valide, saporis acerr. bilem per vomitum insigniter educit. Unde usus præcip. in febribus. Extrinsecus in laxitate dentium (quorum signaturam refert) ac puredine gingivarum scorbutica (gargarism.) rubificat, vesicatoria est, strumas discutit.

N. Sunt qui pro amuleto febrili 9. & 10 de collo suspendunt.

CCCLV. Veronica.

Ehren-Preis / Grund-Weil.

Veronica	Mas	1. Erecta.
		2. Supina & vulgarissima. Hac usuali.
		latifolia.
		angustifolia.
C. B.	Spicata	minor.
		Fœmina seu pratensis serpyllifolia.

Insignitur Teucrium, Trag. Veronica, Tab. Veronica mas, Fuchs. Lon. Veronica mas serpens, Dod. Veronica vera & major, Lob. (cui & major, septentrionalium,) Cam. Ger. Veronica vulgaris supina, Clus. hist.

Crescit in dumetis. Floret Junio, floribusque est subæruleis, rarius candidis.

Eligenda quæ circa quercuum radices nascitur.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores.

Vires. Calfac. & sicc. saporis amari & astringentis, incidit, vulneraria insignis

gnis ac sudorifera est. Usus precip. in erosione ac obstructione Pulmonum, Lienis, hinc & imprimis in colica, Phthisi, scabie, pruritu, peste, vulneribus, &c. Extrinsecus famosissima est in vulneribus abstergendis, astringendis, in duritie Lienis, in colica (clysmat.)

1. Conserve. ex summit.
2. ▽. stillat. Ex herba cum incipit florere.
3. Syr. Ex succo & saccharo.
4. Sal. Ex cinere.

CCCLVI. *Victoralis.*

{ Maslonga. Hac usualis.
 { Fœmina; Est species gladioli, C.B. 3.
 Appellatur Allium montanum, latifolium maculatum, C.B. 9. (inter allia.) Allium Alpinum, Tab. (cui & Victoralis mas.) Allium anguinum, Math. Cam. Porta, Serpentinum, Cast. Ophiocoridon, Lob. Victoralis longa, Clus. (cui & major.) Germ. Sieg. Wurt.
 Crescit in alpibus: Floret cum aliis speciebus allii.

OFFICIN. NAT.

Radix crinita.

Vires. Calf. & succ. perinde ac allium agreste, cuius & in facultatibus aliis per omnia similis existit.

N. Plebi nostrati, Judæisque amuletum est familiarissimum, quo à spectris aëreque infecto se tutos fore persuasi sunt.

CCCLVII. *Vinca.*

Κλημάτις, δαρνοειδής, Singrün/Ingrün.

Clematis Daphnoides, { 1. Minor. Hac usualis.
 { 2. Major.
 C. B. { 3. Flore pleno.

Nominatur Vinca pervinca, Brunf. Lob. Tab. pervinca, Trag. clematis, Mat. Cord. in D. Clem. Daphnoides, Dod. Fuchf. Lob. Cam. Tab. Clus. h.

Solo gaudet fœcundo: Floret Aprilis, Majo, viret semper. Flores cœrulei sunt, quandoq; candidi, rarius rubentes vel sub purpurascens.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Refrig. succ. & astringit. (Doneo calfacit i. succ. amplius.) Vulneraria insignis est. Usus precip. in fluxionibus alvi, dysenteria, hemorrhoidibus, expulsiōne sanguinis, vulneribus, seroso liquore manantibus. Extrinsecus in profluvio mensium, narium, in laxitate & dolore dentium: lac extinctum revocat.

N. Adhibetur quoq; ad profigandos morbos incantatione introductos (in lotionibus,) &c.

PRÆPAR.

▽ stillat. Ex radice foliis ac floribus principio Veris collectis.

CCCLVIII. *Vincetoxicum.*

Ἀσκληπίας, Dioscor. Hirundinaria, Schwalben Wurt.

{ 1. albo flore & Gerard.
 { Hac usualis.
 Asclepias { 2. nigro flore } minus usualis.
 C. B. { 3. Cretica }
 { 4. Virginea }

Yyyyy 3 Insigni-

Insignitur Hirundinaria, *Brunfels.*
Trag. Lon. Vincetoxicum, Matth. Dod.
Cast. Asclepias, Fuchf. Cord. hist. Lob.
Tab. Cam.

Crescit in sylvis, locisque petrosis
 atque arenosis: Floret Julio ac Augu-
 sto.

OFFICIN. NAT.

Radix, raro Semen.

Vires. Calscit atque sicca moderate,
 attem. alexipharmaca ac sudorifera est in-
 signis. *Usus* praecep. in peste, aliisque ve-
 nenosis affectibus, in obstructionibus men-
 sum, in palpitatione cordis, ac lipothy-
 mia, in Hydroke. Semen commendatur
 ad calculum. Extrinsicus usus tam flo-
 rum, quam radicum ac semenis est in ul-
 ceribus sordidis ac malignis purificandis,
 ad ictus insector. venenator. in ulceribus
 mammarum, &c.

Dosis rad. ʒj.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex integra planta.
2. Extract. cum. S. V.

CCCLIX. *Viola pur-
purea.*

Ex variis violarum classibus, quæ a-
 pud Botánicos occurrunt, tres, officini-
 nis potissimum considerandæ veniunt.
 Viola purpurea Martia, de qua hîc. Vio-
 la lutea, de quâ in Cheiri, ac Viola tri-
 color, de qua in Jacea.

E Violis purpureis Martiis inferun-
 tur in officinas odoratæ, neglectis ino-
 doris.

Insignitur Viola, *Lon.* Viola fativa,

Brunfels. Viola Martia odorata nigra
 seu purpurea, *Trag.* Viola purpurea,
Fuchf. Matth. Cast. Viola nigra, *Dod.*
Cord. in D. Ger. Clusf. hist. Viola Martia
 purpurea, *Tab.* Viola præcox, *Lob.*
 Viola Martia purpurea flore simplici o-
 doro, C. B. i. aliis violaria, German.
 Viole/Kraut/ Veil-Kraut/ braune
 Viole/ Merk-Viole.

Eligatur odora.

Solo gaudet umbroso ac aspero,
 juxta vias, sepes & muros, &c. Flo-
 ret circiter finem Martii ac initium A-
 prilis.

OFFICIN. NAT.

Flores & Folia, Semen.

Vires. Violaria (præcipue flos) re-
 frig. i. hum. 2. flores exiccati refrigerant
 imbecillius siccantque, emollit, laxat, cor-
 dialis est ac pectoralis, expectorationem
 promovet. *Usus* præcipui ac creberrimi
 in bile, præcipue atra mitiganda in ser-
 ve febrim compescendo, doloreque capi-
 tis inde nato, in tussi, asperitate gutturis,
 catharris acribus, pleuritide, &c.

N. i. Flores alvum leniter subducunt.
 Extrinsicus adhibetur herba crebro in lo-
 tionibus, cataplasmatibus, clysteribus, & si-
 mil.

Semenis usus rarus est, iisq. in obstru-
 ctione rennum, ubi emulsioni potissimum
 inservit, de qua nota, quod plerumq. vo-
 mitum ac secessum moveat.

Dosis ʒss. ad ʒj.

N. Flores locum sibi vendicant inter
 flores illos cordiales famosos.

Præ-

PRÆPAR.

1. *Syrupus violar. solutivus.* Ex multip. infusione florum recentium in ∇ .

Vires. Ex viribus supra enumeratis, maxime lenit alvum.

Dosis \mathfrak{z} ij. ad \mathfrak{z} iiij.

2. *Syrupus ex succo violar.* (Syrupus violar. simpliciter dictus.)

3. *Syrupus violarum compositus Me- sue.* Ex decoct. flor. \mathfrak{z} j. sem. Cidon. Malvæ, jujub. j. sebest. añ. N. xx. in ∇ cucurb. lb. vj.

4. *Syrupus violatus regius.* i.e. Julep. violar. ex ∇ flor. & sacchar.

5. *Conserv.* Ex floribus selectis à parte herbacea (alabastris)

6. *Acetum.* Ex infusione florum.

7. *Oleum.* Ex floribus infusus in oleo omphacino.

8. Δ *Stillat.* Ex floribus.

9. E tota herba.

10. *Tinctura.* R. flores, macera in propria ∇ , leviter exprime & cola.

N. Addi hic potest spir. Qui in Tinctura Rosar. ait Glucradt: verum veretur, ne color inde mutetur, quod tamen viribus nihil derogat.

N. 2. *Elegantier quoque violarum Tinctura conficitur, si flores phlegmate* Qui. N. pluries, 8. vel 9. super ∇ cohobato) irrorantur, digeruntur ac exprimuntur.

11. *Extractum.* Ex succo lentissimo igne inspissato.

R. Flor. violar. lb. β . inde cucurbitæ etiam sine conquassatione, affusaque ∇ æ lbj. pone in MB. tepidum,

ut coloretur: exprime ac procede ut moris: nimirum expressum succum novis floribus affunde, macera, exprime, inspissa.

Dosis \mathfrak{z} j. Sala.

N. 1. *Gemmas integras non rejectis alabastris (foliis exterioribus) adhibere licet.* 2. *Es color ultra semestre spatium non durat, nihil tamen inde viribus decedit.* 3. *Si ex floribus exiccatis idem conficere volueris, ad eundem illum modum id prestare poteris, præterquam quod major aqua copia requiratur.*

12. *Trochisci.* Vide Disp.

CCC LX. Vitis.

Ἀμπέλ & ὄνοφός & Vitis Vinifera. Arab. Harin. Wein. Stock / Wein. Heb.

Loca amat Aprica: Floret Junio.

OFFICIN. NAT.

Folia, quibus adjungi poterit. *Succus* (lacryma) ex amputatis palmitibus extillans, sic & *Vinum*, *Omphacium*, *Tartarus*, *Uva*, *Acini* uvarum, *Uva passa*, *Vinacea*, quippe hæc omnia absque operatione officinali suppetunt.

Vires. Folia (pampini) capreolique refrigerant, astringunt valide. *Ufus* præcip in dysenteria, vomitu, pica, expulsi-
one sanguinis aliisque hamorrhagiis sistendis, (succus expressus assumitur,) *Extrinsècus* refrigerant ac leniunt capitis dolores ac æstus, conciliant somnum in lotionibus pedum, ut & ipsi capiti adhibita.

Succus ex amputatis palmitibus extillans. (*Aqua Vitis*, *Lachryma Vitis*.)
Intrin-

Intrinfecus vim habere creditur atterendi & expellendi calculum: oculorum caligini medetur ac rubedini, (oculis instillata) in petigines sanat si locus affectus nullo antea fricatus, eo lavetur.

N. De Vino Omphacio, aceto ac tartaro vide suis locis infra.

Uvæ immaturæ. (Agrestæ.) Refrigerant & siccant astringunt. Proin poterit esse usus earum in febribus ardentibus, excitant scil. appetitum, fluxum ventris sedant, at sanguinem indigestum procreant. Vide etiam Omphacium.

Uvæ maturæ calfac. & hum. i. recen-
ter deglutitæ generant inflationes & cruditates ventriculi, diarrheam, & simil. magis tamen id faciunt adolescentes, minus rufescentes. Exiccata uva ventriculo commodiores sunt, appetitumque excitant, alvum laxant.

Uvæ passæ, sunt uvæ maturæ vi caloris exiccatae, sive calore Solis exiccatio illa perfecta sit, unde passulæ dulciores resultant: sive calore clibani, unde dulco acidæ. Prostant uvarum passularum potissimum genera tria. Passulæ scil. maximæ, seu Damascenæ Zibebæ dictæ, 2. Passulæ majores Germanicæ Rosinlein / è quibus sunt, quas uvæ Masinioticas vocant. Germanicè blatw Rosinen. 3. Passulæ minores seu Corinthiæ, kleine Rosinlein / Corinthen.

Vires. Omnes calida sunt seu temperata, leniunt alvum laxant, acrimoniam hebetant, ventriculo pulmonibus ac Epatici grata sunt, tussim mitigant. Zibeba

distilla exemptis acinis, (gigartis) in fontan. vel stillat. convenienti infusa, potum agrotis exhibent sat gratum sitque convenientem. Acini vim habent astringentioriam, convenientque in vomitu, alvique fluxu, sive intrinfecus, sive extrinfecus adhibeantur (torrentur scil. ac teruntur).

Vinacea, i. e. siliqua cum acinis in expressione musti residua, magnarum virium perhibentur in arthriticis doloribus sadandis. Si membrum affectum vinaceis per se calefcentibus imponitur.

PRÆPAR.

1. Cinis sarmentor.

Vires. Adhibetur ad cauteria, & furfures capitis extergendos.

2. Loch passularum. Vid. l. 2.

3. Mel passularum. Vid. l. 2.

4. Condu. passula laxativa, V. D.

CCCLXI. Virga aurea.

1. V. A. major seu Doria.

2. V. A. latifolia ferrata. Hujus loci.

Virga aurea C. B. est { 3. V. A. angustifolia ferrata. Hac & Sarracenica dicitur.

4. V. A. angustifolia minus ferrata. Hac Serrata surrogari apta est.

Secunda dicitur Virga aurea, Cam. Epit. Ger. V. A. ferratis foliis, Tab. V. A. altera serrato folio, Lob. V. A. marginie crenato, Dod. V. A. minor laciniatis foliis. Cam. Germ. grüden Wundkraut / ein ander Heidnisch Wundkraut. Quar.

Quarta dicitur V. A. *Matth. Dod. Lon. Cast. Villanovani, Lob. V. A. foliis non serratis, Cam. Epit. V. A. major, angustifolia, Cam. Symphytum petraeum, 3. Tab.*

Crescit angustifolia ut plurimum in sylvis: latifolia in collibus, agrorumque marginibus & vineis. Floret Julio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia & Flores.

Vires. Utraque calf. & sicc. 2. astringit, vulneraria est celeberrima, intrinsecus & extrinsecus adhibita, nec non & lithontriptica diureticaque non est postremis. Conferit itidem diarrhoea & dysenteria, sanguinis expuitione medetur, mucilaginem renum & ureterum efficaciter abstergit, putredinem gingivarum, dentiumque vacillationem curat.

PRÆPAR.

▽ stillat. Ex herba cum flor. Julio & Augusto collecta.

CCCLXII. *Virga aurea alias consolida Sarracenica.*

Solidago Sarracenica, *Trag. Fuchf. Dod. Lon. Lob. Consolida aurea, Tab. Herba Doria, Ger. icon. Virga aurea angustifolia serrata, C. B. 3. Heidnisch Wund-Kraut.*

Crescit in locis montanis, sed magis udis & depressis.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Astringit, amara est siccatq, evidentissimè, vulneraria est insignis usu

interno & externo adhiberi apta, medetur & fistulis, ulcera maligna mundificat ac sanat.

CCCLXIII. *Ulmaria.*

Barba Caprina, 1. *Lon. Barba Capræ, Lob. Barbula Caprina 1. Trag. Medefusium, Cord. hist. Regina prati, Dod. Ger. Ulmaria, Clus. Tab. Barba capræ floribus compactis, C. B. 2. Germanicè Geiß-Wart.*

Crescit locis udis juxta flumina, & sim. Floret Junio, Julio.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus & nonnunquam radix.

Vires. Refrig. siccat, astringit, sudorifera & alexipharmaca est, proin convenit in fluxibus omnis generis, in diarrhoea, dysenteria fluxu menstruo nec non in expuitione sanguinis, resistit pesti. Extrinsecus sunt, qui radicem recentem contusam vulneribus imponunt, tum ad sistendum sanguinem, tum ad consolidanda vulnera.

PRÆPARATA.

1. ▽ stillat. Ex foliis cum floribus.

2. *Extract.* Quod admodum Quercetano probatur in peste. *Ph. Rest. cap. 26.*

CCCLXIV. *Urtica.*

Ανὰ δόψι Urtica C. B.	{	Maxima	{	Hausua-	
		Urens		Minor	les.
				Romana	
	Fatua est Cannabis sylvestris.				
		Mortua, vide infra.			

Zzz zz

Maxi-

Maxima dicitur *Urtica major*, *Brunfels. Fuchf. Lon. Tab. Urtica vulgaris Urens*, 1. *Trag. Urtic.* 2. *Matth. Cast. Urtica*, *Cord. in D. Urt. urens*, *Ger. Urt. urens altera*, *Dod. Urt. sylvestris asperior*, *Lob. Urt. communis seu major & fœmina*, *Lob. Urtica urens maxima*, *C. B. 1. Germ. grosse heisse Brennessel.*

Minor insignitur *Urtica minor*, *Brunf. Fuchf. Cord. hist. Lon. Tab. Ger. Urtic.* 3. *Trag. Matth. Cast. Urtica urens minima*, *Dod. Urtica minor acrior*, *Lob. Urtica urens minor*, *C. B. 3. heiter Messel.*

Romana dicitur: *Urtica legitima*, *Elus. hist. Urt. Rom. Trag. Fuchf. Matthiol. Romana vel mascula*, *Lob. Cam. Tab. Ger. Urt. 1. Matth. Cast. Urtica urens*, *Dod. Germ. Römische Welsche Messel.*

1. & 2. Crescunt passim locis arenosis juxta sepes ac muros, &c. Prior potissimum sylvas amat. 3. Colitur in hortis. Omnes vigent æstate.

OFFICIN. NAT.

Urticæ maximæ Radix, *Semen*, (*Julio & Augusto colligendum*,) *Folia*, *minor. Herba*, *Romanæ*, *Semen.*

Vires. Urtica omnis calf. moderatè & sicc. 2. partium tenuius est, aperit, incidit, absterg. emollit, diuretica est, & lithontripuica, peculiariterque cicuta adversatur, ut & Hyoscymo. Radix (urtica maxima) commendatur maximo perè ad Icterus. Herba usus in gangrana (decocta & propinata.) Eadem in olera

sumpta solvit alvum, abstergit Renes, calculos expellit, expectorationem, morbillorumque eruptionem promovet, Semen (Romana) Usus crebri est in Pulmonum affectibus, asthmate,ussi contumaci, plenitudine, peripneumonia. Extrinsecus reprimat urtica uvam inflammata (in gargaris.) sedat hæmorrhagiam narium) urtica minor scil. confusa vel & succus ejus expressus naribus inditus,) gangranam mundificat.

N. 1. Noverunt & Chirurghi urentis urtica fricatu sanguinem allicere, adeoque atrophiam subvenire.

N. 2. Prurigini ab urtica introducta medetur oleum olivarum.

CCCLXV. *Urtica mortua seu Galiopsis.*

Varia genera & urticæ mortuæ passim observantur, colore, odore, figurâ, & simil. differentiâ. Datur fœtida & non fœtida: maculata & non maculata: flore purpureo, albo, luteo. Primas autem præ cæteris dant fœtidæ ac præcipuè maculatæ, quam geminam suspicantur *Galiopsis Dioscoridis*, ex lacteo scil. ductu, qui folia media in longum intersecat. Hinc surrogari tamen non nequit & fœtida non maculata.

Maculata insignitur *Lamium alba lineata* notatum, *C. B. 5. Urtica lactea*, *Matthiol. Galiopsis Dioscoridis, Cam. Milzadella vulgo seu Lienaria* (quod lieni conveniat.)

Non maculata est, quæ inscribitur *Lami-*

Laminum purpureum foetidum folio subrotundo, seu Galeopsis Dioscoridis, C. B. 1. Urtica labeo mas, *Brunf.* Laminium, *Trag.* (vel urtica 8.9.10) *Fuch.* Galeopsis, *Cord. hist. Lon.* 2. Tab. purpurea, *Cast.* Urtica iners altera, *Dod.* non mordax, *Lob.*

Crescunt juxta sepes, parietes, vias, in rudibus, &c. magna ex parte totaestate florent.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. *Calfac.* & siccatur. præcipue commendatur Galliopsis fl. purpureo ad dysenteriam (decoctum propinatum) flores albi ad suorem album specificè celebrantur. Extrinsecus medetur urtica pano, &c.

PRÆPAR.

Conserv. Ex floribus albis.

Z.

CCCLXVI. Zedoaria.

Zedoaria { 1. longa } Ha promiscue
2. rotunda } usuales.
Zittwer / { 3. tuberosa }
C. B. { 4. nigricans } inusitata.
4. Geiduar. }

1. Insignitur Zedoaria, *Lon. Matth.* *Lob.* Zed. radice longa, *Clus. in Coroll.* Zedoaria & veterum Arnabi. 2. species radice longa, *Cord. hist. C. B.* Zadura, Zaduar, Zudar., &c. *Fuch. in comp. med.*

2. Dicitur Zerumbet Serapionis, *Lob.* Zurumbethum, *Cord. hist.* Zerumbeth & Zedoaria rotunda, *Fuch. comp.*

N. 1. Datas has Zedoarias non differre inter se, nisi sola forma, adeoque ejusdem radicis partes esse, videre licet apud *Lobellium* in advers. & observ.

N. 2. *Tabernamontanus* & *Matthiolus* Zedoariam *Avicenna* nihil aliud esse, quam *Antoram* modernorum, probare nituntur, *Dodonæus* Zedoariam officinarum pro *Zerumbeth.* *Avicenna* & *Serapionis*, habet.

Advehitur è Sinarum regione & ab extremis Indiae finibus.

OFFICIN. NAT.

Radix sola.

Eligitur odorata, albida, amara, ponderosa, non cariosa.

Vires. *Calfac.* & sicc. 2. incid. flatus discutit, amarissimi est saporis ac alexipharmaca. Usus præcip. in doloribus colicis atque ventriculi: animalium venenatorum moribus opitulatur, lienteriam sistit, vomitiones reprimat, menses ciet, suffocatione uteri efficaciter succurrit, alvitineas quascunq; enecat, antidotis permiscetur.

PRÆPAR.

1. Condit. Zedoaria. Conditur ut Zinziber.

2. Confect. Zedoaria. Fit l. comm.

3. Extract. Fit cum V.

N. Substitui poterit decoctum inspissatum.

4. Oleum stillat. cum ∇ ascendit.

5. ∇ stillat.

6. Balsamus. Ex oleo & corpore olei nucistæ.

Zzzzz 2

Zinzi-

CCCLXVII. Zinziber.
Zingiber.

Zizyibeg, Zizyibegis, Zizyibegis, Zingiber,
Lob. Monard. Zingiber & ejus filiqua,
Matth. Zinziber, Lon. Gingiber, Garz.
ab H. Arab. Zingibel seu Lengibel, Ger-
man. Imber / Ingber.

N. Reperiuntur apud Aromatarios
radices alba & rubentes: ha rubrica, illa
sape creta infecta, quo à terebinibus qui-
bus candidiores & molliores magis obno-
xia, praeserventur.

Advenitur copiosum ex Calecut In-
dia Emporio, atque ex Trogloditica
Arabica.

Vires. Calfac. potenter, sed non primo
statim occurſu, adeoque partium est cras-
siorum, earumque non terrestrium, sed
aquearum, & consequenter humectan-
tium: aperit, incidit, attenuat. Con-

fert ventriculo, thoraci, aliisque visce-
ribus, appetitum prostratum excitat,
putredini ac malignitati humorum resi-
sit.

PRÆPAR.

1. Zingiber in India seu China condi-
tum. Convehitur ad nos ex India con-
ditum scil. recenter saccharo, vel quo-
dam mellis genere, quod quibusdam è
siliquis exprimunt.

2. Conditum nostrate. Fit lege com-
mun. Vid. l. 2.

3. Confectio Zingiberis. Macera radi-
ces aliquamdiu in ∇ , vel lixivio, postea
scinde in tenues & oblongas particulas,
exiccaque: hinc confice l. c.

4. Zingiber laxativum. V. August.

5. Spec. Diazingiber. V. Disp.

6. \odot Stillat. Fit lege commun. Vid.
l. 2.

CLASSIS II.

DE ALTERANTIBUS SECUNDARIIS, QUÆ SUNT SUCCI,
OLEA, LACHRYMÆ, RESINÆ, GUMMI RESINÆ;

GUMMATA.

CCCLXVIII. Acetum.

Acetum est liquor aciditate terre-
striori ac fixiori (Olicam vocant) im-
pregnata.

Delectus: Acetorum maxima di-
versitas est, variantque naturâ, viri-
bus ac præstantiâ, pro varietate rerum
ex quibus ea confecta sunt. Sunt enim
aceta ex vino, cerevisia, ex succis fru-
ctuum (pomaceis, pyraceis) ex melle,
&c.

Utitoria autem sunt vinacea, quæ
recipienda quoties aceti simpliciter fit
mentio.

Hæc itidem variantia occurrunt.
(Etenim ut vinum differt præstantiâ,
ita & acera exinde confecta.) Eligantur
igitur quæ ex meliori ac generosiore vi-
no, utpote omnium vegetabilium prin-
cipe & maximè omnium vitriolato,
confecta sunt.

N. Ad menstrua metallis solvendis
desti-

destinanda, eligenda sunt imprimis aceta hydromeluturn vinosorum, utpotè quæ cū manna cœlesti (melle) naturam animalem præter vegetabilem ex floribus induerunt, atq; ita alia menstrua solvendi potentia superant. Et hæc sunt aceta illa Philosophus usitata, unde & Philosophica dici solent, de quibus amplius in menstruorum descriptione, l. 2. c. 57. Vide etiam Quercet. in Tetrad.

N. De reliquis Acetis cerevisiarum succ. pomaceorum aut pyraceorum immaturorum, viliorumve vinorum, notetur, quod rerum metallicarum solutionibus minus sufficiant.

Vires. Substantia acetum est mixta; frigide ac calide (superat tamen frigiditas caliditatem) in reliquis siccatur, partium est tenuium atten. penetr. astring. putredini resistit, sudorem ciet.

N. Acetum accedit proximè ad naturam Θ i, primasque tenet præ cæteris correctivis, quorum opera gummi calfacientia succive venenati corriguntur. Per se quoque singulare est remedium adversus ictus serpentum etiam venenatissimorum, quales sunt aspidæ. Quercet. in Pharm. rest. c. 24.

PRÆPARATA.

I. ACETA DESTILLATA.

1. Acetum destillatum commune.

R. \ddagger fortissimum, destilletur ex cucurbita vitrea in B. M. vel cineribus leniss. calore: primò ascendit phlegma insipidum (fermè quarta pars liquoris,) quod phlegma ubi extillaverit, (acido odore & sapore id deprehenderis) muta

recipiens, colligeque acet. destill. (spir. \ddagger .) seorsim, continuando, destillationem, donec spiritus omnis ascenderit.

N. 1. Si ad extracta ususque medicos acet. destill. destinetur, tanto opus est, ne nimium urgendo impetum concilietur: sin vero ad metallicos labores, urgendum erit donec rubri spiritus attollantur, nihilque amplius spirituum exeat: id felicius fiet in arena.

N. 2. Alij rectificant aliquoties cohobando, tandemque partem aliquam phlegmatis lento MB calore abstrahunt. Senn. instit.

Vires. Phlegmatis usus esse potest in Extractionibus quibusdam. E.g. viridis aris pro conficiendo Θ o Φ i & aliarum Tincturarum.

2. Acetum ex fecibus.

R. Feces \ddagger (die Mutter von Weine Essig/) destilla per vesicam cū refrigeratorio ac prodibit acet. destill. igneum.

Vires. Solvit metalla, &c. Kesler. 4. c. 65.

3. Acetum Radicatum, seu alkalifaturn.

R. Fecum ex acet. destill. destillatione relictarum lb. 1. vel 4. calcina ad siccitatem, dein affunde acet. destill. idq; iterum abstrahere in arena, roties cohobando, donec omnis sal. com. cum acet. destill. ascenderit. Sennert. Instit.

Aliter. R. Sal. com. \ddagger i volatilæ (vide infra) p. 1. acet. destill. p. 4. confunde & destilla per arenam in retorta, dando in fine ignem satis fortem. Destillatum de-

stillā iterum suprà Sal. com. fixum cohobis toties repetitis, donec omne cum acet. destill. ascenderit. *Beg. l. 2. c. 5.*

R. ✕ i mens. 1. affunde supra tart. calcin. lb. β. Sal. com. ℥iv. destilla, cohobaque aliquoties, tandemque supra recentem tart. calcin. & Sal. com. funde, destillationemque reitera. *Vide Kesler.*

4. cap. 78.

4. *Acetum mellitum.*

R. Mell. lb. 4. ✕ ad emin. 4. digitor. destilla ex arena. Exit aqua acerba, quam rectifica.

Vires. *Solvit Corallia, Margaritas, & reliquos lapides pretiosos.*

5. *Acetum Terebinthinatum.*

Fit ex aceto & Terebinthina per ☉ simul destillatis, hinc oleo & spiritu ac ☿ separatim. *Hartman.*

6. *Spiritus aceti S. Closs.*

Destillentur lb. vi. in MB paulò ultra tepidum incalescente, donec sexta tantum pars restet lbj. vix excedens, quæ unā cum cucurbitā & XX in cineres transporteretur, & destilletur ad siccitatem usque cum cohobio ter & quater super facies repetito. Quod si adhuc fortiolem exoptes, tunc ex crystallis fecum ✕ cum boli s. g. globulos concinna, qui per ☉ acti Δ nudo in Recip. quod prædictum ✕ spiritum contineat, rectificaque igneum atque corrosivum ☿ um dabunt, metallorum solutionibus aptissimum.

N. Sal. com. evanescit ab Extractis & Tincturis quibuslibet per putrefactionem ☿ & abstractionem fortem in cine-

ribus. Sic enim Sal fit volatile ☿ illius qualibet vice ascendit.

II. CRYSTALLI EX ACETO.

R. ✕ ad mellis consistentiam inspissatum, repone ad cristallificandum s. artem. Crystallos purifica solvendo (e. g. in phlegmate ✕ abstracto,) & cristallificando. *Libavius.*

CCCLXIX. Gummi Ammoniacum.

Ἀμμωνιάκον, ἀμμωνιάκον, ἢ ἀμμονιακόν, Dioscoridi Hammoniacum, Ammoniacum, Thymiamma, Gutta ammoniaca, Cord. hisp. Ferulæ lachryma, Galeno. Ammoniaci lachryma, Matthiol. vulgò Armoniacum. Arab. Althatur, Raxach. Aassach, &c. Ger. Gummi Ammoniac.

Gummi est stillans ex ferula quadam, quam ad differentiam aliarum Ammoniaciferarum vocant, alii Metopion. Dicitur autem Hammoniacum ab Hammonis oraculo, juxta cujus delubrum colligitur.

Eligendum est syncerum, instar Thuris in grumos condensatum, odore Castoreum utcumque æmulans, sapore amarum, digitis tractatum mollescens, bene coloratum. (exterius flavum, interius candidum.) Et hoc ῥεῖον, (thrauston Plinio, i. e. fragmentum) appellatur: sicut id quod terræ, calculorumve particeps est. φύμα, (Phyma Plinio, i. e. mixtura) dicitur.

Vires Calfac. 2. sic. 1. emollit, attenuat, resolvit, digerit, maturat, astrahit valē.

valide, ut quoque spinas carni infixas eliciat, alvum moveat, splenicum est. Usus præcipuus est in doloribus arthriticis, in resolvenda mucilagine tartarea viscosa crassa ac contumaci Pulmonum, Mesenterii, & hinc in obstructionibus contumacibus Lienis, Epatis Uteri in calculo. Extrinsecus in scirrhis, panis, topis que juncturarum, in scrophulis, alijsq; tumoribus durioribus resolvendis, &c.

Dosis à ℥j. ad ʒj.

PRÆPAR.

1. *G. Ammon. depuratum* & *Gummi*, q. v. solve, cola ac exprime, hinc inspissa.

N. Solvitur in quocunq; liquore aqueo & Vino, succo, &c. Usitatus tamen per & depuratur.

2. *Ol. stillat.* Fit per XX, vesicam vel Retortam. Vide supra.

Vires. Omnibus confert affectibus, quibus *Gummi Ammoniacum*.

3. *Oleum caruleum S. Cloff.*

Feliciter eliciuntur hujusmodi olea per 3 tribus fulcris è luto sicco statuminatam in capella fabulo & cineribus vacuâ, cooperitâ tamen, dando Δ lentum rectificentur.

N. Simili modo eliciuntur olea ex Galbano & Sagapeno.

4. *Pilula de Ammoniaco.* Vid. l. 2.

N. Ibidem describuntur *Pilula tartarea diversa*, quarum non minima portio *Ammoniacum* existit.

5. *Extract. Resinosâ seu Resina.* V. l. 2.

N. Convenit viribus cum ipsa *G. Ammoniac.*

6. *Extractum viscosum.* Vid. l. 2.

Vires. Lenit asperitatem aspera arteria, incrassat acres ac tenues catharrhos, unde & utiliter linclibus commiscetur.

CCXLXX. *Gummi seu Resina Animæ.*

1. fulvescens & pellucidum.
2. nigricans & taurino glutini vel colophoniz simile.
3. pallidum & retorridum.

1. *Animæ* est *Resina* pellucida ex albo citrinescens, in nova Hispaniola seu America ex arboribus quibusdam proceris incisis extillans, Thuri similima, quo tamen majora grana refert. Et hæc nobis usualis est.

N. Veteribus incognita statuitur. Amatus tamen pro Cancamo veterum habet, cui consentit Garzias.

Eligenda est albida seu flavescens, granulata oleosa, si frangatur Citrina, fragrantissima ac gratissimi saporis, carboni imposita faciliè liquefcens.

2. *Myrrhæ* quodammodo assimilatur.

Hanc esse *Minæam* Galeni vel *Ammineam* Dioscoridis & *Serapionis* idem vult Amatus, adeoque *Animum Lusitanis* dici. Vide *Myrrhæ*.

3. Est ea species, quam ex India Orientali afferunt, granis minoribus granulata. Hæc ut colore ac pelluciditate priori cedit: ita & viribus minor est.

Vires.

Vires. *Calf.* 2. *hum.* 1. *atten. resolv.* astring. discutit, cephalica est. *Usus* prae-
cipuum est externus in capitis at nervorum
affectibus frigidis dolorificis, catarrhosis.
flatulentis, in affectibus articularum, pa-
ralysi, contractura, laxationibus, con-
sionibus, &c.

N. Solvitur ut alia Resina in oleo, tum
quoque in ∇ rectificatissimo.

PRÆPAR.

Ol. still. Fit ut & aliis Resinis, per
Retortam ex arena. *Vid.* l. 2.

N. Colligi possunt sigillatim oleum te-
nuius ac crassius. Sala in Hydrolog.

CCCLXXI. Gummi Ara-
bicum.

Gummi simpliciter, Gummi The-
baicum, Gum. Babylon. Gum. Sara-
cen. Gum. Acanthin. ex arbuscula qua-
dam manat, quam Dioscorides Acaci-
am vocat. Estq; Gummi naturæ pro-
fus aqueæ.

Eligendum vitri modo pellucidum,
syncerum, in vermiculorum speciem
contractum, candidum vel ad flavedi-
nem inclinans. Reprobantur sordi-
dum, resinofum, adulteratum. Adul-
teratur enim admixtione gummi cera-
for. prunor. & simil. velex Resinarum
quarundam, id quod cognoscitur solu-
tione in ∇ , qua syncerum liquidissime
ac limpidissime solvitur, adulteratum
non item.

Vires. *Calf.* & *hum.* 1. inspissat poros
cutis obstruit, acrimoniam medicamen-
torum obviandit, asperitati aspera arte-

ria ac tussi confert, ocularibus medica-
mentis & arteriacis commodissime adhi-
betur. Et contra Dysent.

PRÆPAR.

1. Pulvis.

N. Ut benè pulveretur, calsiant mor-
tarium ac pila.

2. *Depuratum.* Solvitur in ∇ cola-
tur ac inspissatur.

CCCLXXII. Asa fetida.

Ὠπός, μύδιος, Συγιάδος, (olim *μυ-
γιάδος*.) Laser medicum, foetidum. Arab.
Altit, vulgò Asa foetida. Germ. *Zeus-
fels.* *Drect.* Succus est sive Lachryma
Laseris sive Sylphii in Media, Lybia ac
Syria crescentis, (non Laserpitii Dio-
scoridis, cujus succus modernis inco-
gnitus est.) Et ex illius radice ac cauli-
bus incisus colligitur.

Eligenda est sincera alii odorem fe-
rè æmulans, viscida: reprobanda adul-
terata. Adulteratur enim permixtione
farinæ, fursuris, sagapeni.

Vires. *Calf.* 3. *incidu.* &c. *Usus* inter-
nus praeipuus, in suffocatione uteri, peri-
pneumonia ac vulneribus, alias raro ad-
hibetur. Extrinsecus in tumido Liene,
uteri suffocatione, paneritio (cum alio ovi
alb. suscepto.)

Dosis à \mathfrak{ss} . ad \mathfrak{zj} .

N. 1. Solvitur super prunis coquendo
in ∇ , aceto aut vino.

N. 2. Si quis Epilepsia obnoxius sen-
serit suffitum ex Asa foetida accornu ca-
prino, paroxysmo actutum corripitur.

PRÆPAR.

1. Pila-

1. *Pilula de Asa foetida.* R. Asa foetida. q. v. humecta vel solve cum Acet. destil. ac redige in massam.

2. *Pilula foetida.* Vide Disp.

B.

CCCLXXII. Balsamum
verum.

Balsamum Syriacum, Ægyptiacum, Balsamelæum, Opobalsamum, Bals. de Mecha; est liquor Balsamæus, flavus instar Terebinthinæ, odoris fragrantissimi, saporis subamari & acris, sudans ex balsamitum fruticibus, quoad corticem vulneratis, tum ex ramusculis amputatis.

N. 1. *Siguttula aqua tepida immitatur, per totam superficiem sese extendit, ac rursum aqua refrigerata sese contrahit, lacti instillatum id ipsum coagulat, in vestem laneam effusum non linquit maculam, secus ac alia.*

N. 2. *Tanta astimationis est, ut Princeps Arabia felicitis, cui etiam Mecha paret, singulis annis inter alia munera tres quatuorve ejus libras Turcarum Imperatori honorarii loco transmittat. Cayrii idem Prefecto unam. Quin & Ducibus peregrinis idem ceu maximum honorarium presentat.*

Vires. Inter olea quævis & balsama omnium est laudatissimum, præstantissimum ac toto orbe maximè celebratum, utpote quod vires habeat abigendis morbis tam internis, quam externis, nulli medicamento secundas. Confert febricitantibus asthmaticis, jecoris obstru-

ctiones solvit, menses movet, stomachi dolores sedat, phthisicos fovet, appetitum excitat. Vide prolixius Balsamum de Tolu, & Clusium in Mōnard. ut & Petrum Bellonium in observationibus suis. Alpinum de plantis Ægypti, ut & in Dialogo de Balsamo peculiariter conscripto.

CCCLXXIV. Balsamum de Tolu
seu Tolutanum.

Balsamum de Tolu est liquor Balsamæus, coloris rubei ad aureum tendentis, mediæ inter liquidum & densum consistentiæ, valdè glutinosus, & ubicunque reponatur firmiter inhærens, saporis dulcis & grati, non nauseabundi (secus ac reliqua balsama) odoris excellentissimi Limoniorumque fragrantiam vel Jasmini quodammodo referentis, præsertim si paucillum in vola manus fuerit fricatum.

Advehitur ex Continentis quadam Provincia, inter Carthaginem & nomen Dei sita, Tolu ab Indis appellata: ubi colligitur ex arboribus Pino pumila-similibus, iisque tum domesticis, tum sylvestribus, quæ vulnerato cortice præstantissimum hunc liquorem fundunt.

Vires. Antecellere videtur facultatibus ei, quod è nova Hispania adducitur (Peruviani nomine), efficaxque est ad omnia, ad quæ Balsamum illud Ægyptiacum. Calfac. & sicc. autem. resolvit) vulnerarium est, pectus expurgat, &c. Usus præcip. in asthma, phthisi, in ven-

Aaa aaa

tricu-

triculi cruditate & dolore. Extrinsicis doloribus à causa frigida, quibuscunque & in primis capitis, arthriticis & nephriticis: in defluxionibus ad oculos cohibendis, in paralyfi, in ventriculi imbecillitate, dolore, inflatione (inunctum cum oleo nardino) in Hydrope (illitum cum Unguento aperitivo,) in Lienis imbecillitate, in tumoribus quibuscunque, ac oedematibus, in contractura: parotides in super seu Scrophulas cacas curat. In primis autem celebratur in vulneribus consolidandis, defendendis, praesertim si ossa quoque sint fracta. (quippe fragmenta expellit) in vulneribus articularum, sectionibus nervorum, puncturis, contusionibus, &c.

Limpidum subalbidum: Ex cortice arboris fauciato stillans: opobalsamum vocant, nostratibus officinis dicitur Balsam, Indicum verum. **Der weisse Indianische Balsam.**
 Crassius. Ex segmentis trunci ramisque cum ∇ coctis supernatans: dicunt Xylobalsamum: nostratibus appellatur Balsamum Indicum seu Balsamum Indicum vulgare, nigrum.

Prius praestat limpidius, posterius eligatur purpureum, suaveolens (ut vel optimo Styraci calamitæ nihil cedat) cujus guttula, carboni instillata suavem suffuturum præbeat. Rejiciatur nigrum, crassum, odoris gravis.

Vires. Calf. & sicc. 2. discut. emol. subastring. Usus præcip. in asthmate, phibisi, nephritico dolore, mensibus obstructis, ventriculi debilitate ac dolore, Epate obstructo, utero squalido atque inde ad concipiendum inepto, suffocatione ex utero, &c. Extrinsicis lenis dolores ex humoribus frigidis ortos, discutit hu-

Dosis gr. 3. 4. &c. Nicol. Montan.

N. Balsamum hoc illud esse arbitror, quod nostratibus Balsamum de Honduras dicitur.

CCCLXXV. Balsamum Indicum.

Balsamum Indicum novum, Matth. Balsami genus novum, Fragos. Balf. Peruvianum, **Indianisch Balsam.** Est liquor fragrans arboris cujusdam Indicæ Balsami dictæ (Indis xylo) coloris ex albo ac nigro rubentis, odoris suavissimi, saporis acriusculi & aliquantulum amari. Affertur ex America seu nova Hispania Indiæ Occidentalis. **Monard.**

mores aqueos, roborat caput ac nervos, partes contractionesque sanat, ventriculi flatus discutit, cruditates tollit, lienem durum emollit, nephriticum dolorem mitigat, urinam remoratae promovet, arthriticis doloribus summè confert: in Chirurgia proficuum est vulneribus recentibus (tunc consolidando, tunc noxia discutendo:) inveteratisque, nec non & nervorum prodest contusionibus: febricitantibus confert, spinam ante paroxysmum inungendo atque cum Vino guttulas aliquot exhibendo, idque iteratis vicibus.

Dosis

Dosis gr. 4. 5. 6.

N. Tanta censetur efficacia, ut sint qui Opobalsamo seu Balsamo Syriaco substituere non verentur. Nicol. Monard.

PRÆPAR.

Spiritus ac ol. still. Fit per arenam ex retortal. Δ . Sic extillat post roridam ∇ oleum clarum instar sacchari candi coagulabile (*Spiritus.*) 2. Post flavescere incipit igne fortiori, (*oleum.*) 3. In retorta manet materia instar Celophonæ.

CCCLXXVI. Bdellium.

Bdellium, Belehon, Malathram, Maldacon seu Madelcon, Lachryma est arboris cujusdam spinosæ nascentis in Arabia, India Media. Videatur *Matth Cord. hist. Casalp. Frag.*

Probatur gustu amarum, translucentum cum frangitur, pingue cum fricetur, odoratum, subamarum, facile mollescens, syncerum (*Parthicum* nomen.) Reprobatur, sordidum, nigrum in offas convolutum, quod Adrobalon nuncupatur.

N. Sunt qui G. Anime legitimum Bdellium esse putent.

Vires. Calf. & sic. (N. Aliis calfac. 3. sic. 2. aliis calf. 2. hum. 1.) digerit, discutit, sudorem movet. Usus præcip. intern. in tussi ac Pulmonum apostemate, calculo atterendo, urina cienda, mensibus immodicè fluentibus, ut & in fluore uterino sistendo, foetu expellendo. Extrinsecus discutit hernias, mollit durities ac

nervorum nodos, adeoque creberrimi usus est in Emplastris sticticis.

N. Contusum solvitur affuso vino, aqua calida aut aceto.

PRÆPARATA.

Pilula de Bdellio. Ex Bdellio & Mirobalanis.

N. Sistunt fluxum hamorrhoidum ac mensium.

CCCLXXVII. Benzoin.

Benivi, Garz. Benivinum, Belzoinum, Benzoinum, *Matthiol.* vulgo Asa dulcis, *Cord. hist. wolriechend Balsam.* Resina est citrinescens vel flava, ceu variis & frustulis diversorum colorum in massam redacta, bene odorata, facilis liquatu ac fractu. Stillat ex arboribus certis, magnitudinis proceræ, quoad corticem sauciatis.

Amygdaloides, quod maculas candidas refert instat amygdalar. delibratar. colligitur in Sion & Samaria.

N. Hanc Myrrham Trogloditicam Dioscoridis, Amatus censet.

Nigrum odorem suavissimum spirans. Exudat ex novellis arboribus. Dicitur benivi de Bonias, q. de floribus.

Nigrius parum fragrans, quod vilis.

N. Commisceri solent, ut unâ commodius vendantur.

Optimum censetur pellucidum, globulis candidis refertum, Thuris æmulam, suavissimè spirans, nec heterogeneis inquinatum.

A a a a a 2

Vires.

Vires. Calfac. & sicc. 2. incid. atten. pulmonicum est. Usus præcip. intrinsecus in affectibus pulmonum, catarrhosis, tussi, asthmate. Extrinsecus in cerebro per sternutationem expurgando, in odontalgia, (masticando) in tuberculis ac rubore faciei abstergendo: ob suavem insuper halutem creberrimè suffumigiis commiscetur.

N. 1. Si suffius ex solo Benzoinè paratur, tussis excitatur.

N. 2. Solvitur in oleaginoso ac spiritu vini rectificatissimo, ut & in ovi albumine, aëri humido ad liquefcendum exposita.

PRÆPAR.

1. *Magisterium.* R. Benzoin. solve in V rectificatissimo. (NB. nisi V fuerit omnis phlegmatis expertus, nihileffeceris) solutioni affunde V & præcipitabitur lactescens Benzoin: lava V rosar. ac exicca.

N. 1. Unius hore spacio solutio hac absolvi potest, calore MB saltem adhibito.

N. 2. Poteris iidem V abstrahere sine affusione V

N. 3. *Magisterium* hoc non est nisi depuratum Benzoin.

N. 4. Solutio, quam Tincturam nonnulli vocant, manu abstergit, candidas. quæ reddit.

2. *Flores.* R. Benzoin trit. q. v. inde olle vitreatæ desuper ponendo pyramidem ex charta duplici formatam, admoveque paulatim ignem lenem carbonum vel cinerum: sic sublima-

buntur flores, chartæque adhærescent, quos sæpius exime, ne rursus decendant.

Dosis à gr. iij. ad ʒss.

N. Sunt qui flores in V rectificatiss. solvunt, solutionemq. pro Tinctura venditant.

Florum Benzoin perfectior modus.

R. Benzoin pulv. ʒj.

Spir. vin. opt. ʒix.

Glaper O in arena.

V seorsim primò exprime.

Butyri partem primam & albidior rem solve in V fervente & citissimè per chartam cola, & mox sub ipsis manibus flores coagulari videbis, cum nigriori butyri parte eodem modo procedes, sed flores non adeo elegantes habebis. Aquam residuam aquæ frigidæ in suo vase impone, & sensim descendet lac album, ejusdem cum floribus virtutis.

Post butyrum superius pelle ulterius & habebis oleum Benzoin cum cineribus vel calce viva rectificandum.

Ex communicatione Cl. Dn. D. Ioh. Cassari Fausii, Archiatr. Palatin. Amici mei colendi.

3. *Liquor.* Fit in albumine ovi cocti ut supra. Abstergit maculas, stigmatæque è lue venerea contracta.

4. *Oleum.* R. Benzoin pulv. ʒj. spir. Vini ʒiij. (vel iij.) digere O (4. 5. 6.) dein adde sabulum purum vel scoriarum O ʒiij. destilla per Retortam ex arena vel cinere igne gradati-

vo:

vo: hinc separa oleum à Spiritu. *Panth. hygiast. Deodat.*

N. *Spir. Vini leniter abstracto, ascendit materia gummea, candida, solida, quam vocant Mannam Benzoin. Hac albificat cuprum.*

Alii.

℞. Benzoi pulv. ℥ij. affundunt + ros. in olla benè clausa, committuntque igni ut fluant (odore id cognoscas.) Hinc affundunt novum + fluereque sinunt continuò agitando; tandem inspissari paulatim permittunt, immiscendo pro libitu flores Rorismar. Lavend. Ros. Spic. Ind. ut & sant, citr. in fine superfundunt V rectif. ac destillant ex arena vel cinere. *Med. destill.*

Alius modus optimus.

℞. Benzoin pulv. q. v. misce cum fabulo ac imple Retortam ad medietatem: destilla gradatim ex arena & nancisceris liquorem ac oleum crassum instar butyri. ℞. Hujus (à liquore separati) p. j. ∇ pulv. p. xij. destilla in cinere per XX, & extillabit oleum clarum & flavum ad fundum subinde secedens. Postquam pars media ∇ extillarit, extinguatur Δ, effundaturque materia in cucurbita relicta. in leberem æneum, calfiatque optimè super Δ, affuso subinde ∇ calidæ quadruplo: hinc filtretur per pannum, reponaturque filtratura ad crystallisandum. Crystallinos collectos exicca lento Δ calore.

N. 1. *Oleum illud rectificari poterit*

semel ac iterum ex XX cum V Tar. sato & evadit odore, saporeque gravior.

N. 2. ℥ij. Benz. prabet ol. (℥i℥.) crystall. seu florum. (℥j.)

Modum hunc cum aliis non paucis acceptum refero viro solertissimo Johan. Casp. Sparre, Pharmacopæo hujus Reip. Seniori, Affini meo colendo.

N. *Sunt qui Benivinum solvunt in ol. nucl. cerasor. expr. solutionique admiscunt ambram, muscum & Zibellum & exprimunt ad perfumandas, ut ajunt, chirotecas.*

Oleum Sam. Closs.

Ego. (Sam. Closs.) Oleum Benzoin. paro ad modum Deodat. in Pantheo materia gummea, quæ post destillationem V ascendit est flos sive crystalli Benzoini, qui collum N opplent, ac proinde bacillo removendi veniunt, ne N frangatur, post flores exit materia butyracea, inde acetum & phlegma Benzoini, sequitur oleum hyacinthinum boni odoris, sed paucum, tandem balsamum spissum igne adaucto. Ex floribus sive crystallis & materia gummosa cum V tincturam citrinam elices, remanente gummate albo infundo cucurb.

Vires, Crystalli sudores movent summâ cum utilitate in lue Q ea, si decocto Guajacino permisceantur. Oleum vulnerarium est, balsamum vice Peruviani falsè divenditur.

5. *Trochisci de Benzoini. Vide Disp.*

Aaaaaa 3

C.

C.

CCCLXXVIII. Camphora.

κόρυδα, Camphora sive Caphura, *Math. Cast. Arab.* Capur & Casur Lachryma est resinosa proceræ cujusdam ac peregrinæ arboris, (non bituminis genus.) *Germ. Kampfer.*

Differentia tria 1. Caphura de Borneo, (Insulæ Oriental.) Borneina dicta, quæ raro adfertur, & omnium nobilissima est. 2. Ex China seu Cnicheu quæ communiter in Europam adfertur, in panes orbiculares coacta, *Garz. Acoft. Linscot. Fragos.* (dicitur China Chinichis, &c.) Sic alia rudis est ignem non experta: alia elaborata, quæ solis aut ignis calore cocta atque purgata, album colorem contrahit, *Math.*

Seligenda est alba pellucida instar Crytalli, syncera (non maculata) odora, digitis friabilis, quæ accensa vix extingibilis.

Distinguitur à supposita, quod hæc calido pani triticeo (uti ex clibano extrahitur) diffecto imposita torreatur, vera autem liquecat.

N. In tritura, mortarium ac pistillum oleo aliquo, e.g. amygdal. &c. est inungendum.

Vires. Resistit putredini ac venenis, unde frequens ejus usus in peste malignis-que morbis febribus, &c. Veneris quoque stimulum arcere conceptumque impedire creditum est; verum si experientia ac observatio Scaligeriana fidem me-

retur, citra veritatem, (nisi usu continuatio id experiri quis velit) suffocationi uterina subvenit (sc. ∇ meliss. in aqua Camphora extincta fuerit propinata.) Usus externus crebrior est, usque potissimum in Epithematibus sc. Frontalibus refrigerantibus & paregoricis, quibus ut commisceatur, solvi solet in ∇ vel consericum nucleis. semine aliquo oleaginoso, e.g. pineis, sem. citrill. & sim.

De qualitatibus primis diversitas hant levis est. Majores ad gradum usque 3. frigidam statuunt. Recentiores è contra calidam: utrisque sue sunt rationes. His inseruit 1. inflammabilitas, utpote quæ æreis non aqueis, ac terrestribus propria est. 2. Odor aromaticus ac sapor acer. 3. Facilis evanescencia, qua vel sponte ærem ceu chaos suum repetit. Illis: vis venerem ac libidinem compescendi, inflammationesque extinguendi. Verum triumphare videntur recentiores. Etenim quantum ad prius, posito quod venerem arceat, non tamen propterea necessario frigiditatem concludi posse argumento sunt Ruta: Vutex. & sim. Nec firmior ratio posterior, utpote ab operatione qua per accidens fit, desumpta. Quippe inflammatio aut mitigatio eo in casu non à qualitate frigida introducit, sed à subtili penetrativa, exhalationibus calidis exitum referante, atque per sudorem, insensilemque transpirationem discutiente.

PRÆPARAT.

I. Oleum Camphoræ. ℞. Camphor. ℥iv. Terræ argillacæ vel boli armen. M. ij.

M.ij. (alij. Camph. part. i. Argill. p. 3.) Misce diligenter, & ex Massa mixta forma globulos, quos in sole vel umbra exiccatos, destilla in arena ex Cucurbita vel Retorta vitrea (in excipulum, quod contineat, si libet, aliquid aquæ pluviæ destillatæ.) Sic prodit primum quiddam album, mox aqua perspicua, tandem igne fortiori oleum fragrantissimum. Ol. hoc cum Vbis rectificatum, aureum colorem acquirit.

N. 1. Eodem modo destillari potest cum terra communi.

N. 2. Album illud sublimatum liquescet in Alembico & defluet in Excipulum.

N. 3. Non opus est formare globulos, sufficit enim materias solum miscuisse.

Vires. Vires ex superioribus collige. Optimum in super medium est in gangrenis, ac odontalgia. Hoc oleum affusum super Talcum subtiliss. pulveris. (melius calcinatum) biduana in MB maceratione albescit, virginibus ad nitorem faciei egregie inseruit. Senn. in Instit. Hartm. in pract. Tentz. Sala.

2. Ol. Camph. Paulo aliter.

R. Camph. p. 1. Boli p. 2. Pulverisata misce & destilla ex Retorta vitrea loricata, 1. Δ arenæ; & prodibit Camphora instar butyri. Hujus R. part. i. Tart. optime calcinati part. 2. V ad eminent. digit. 3. Dest. per MB. donec Camphora incipiat ascendere, quo dato signo, subtrahe Δ m, & effunde V qui extillavit, in vitrum

angusti orificii, affundeque ∇ fontanæ quantiratem, sic lactescet V oleum que Camphoræ supernabit, quod separa. Materiæ in Cucurbita relictæ affunde denuo V & destilla, separaque ut antea, idque toties reiterando, donec nihil Camphoræ ulterius ascendere conspiciatur, sic habes oleum Camphoræ, quantitate quidem paucum ($\frac{1}{8}$) viribus verò efficacissimum.

N. V Rectificari poterit ad usus alios.

Ex communicatione Johann. Casp. Spar. Pharmac. hujus Reip. primarii.

Aliter.

Solve Camphoram in sp. Θ i Antepileptico Hartmanni, (vel & in V,) & Camphora elevabitur in forma \odot i ad superficiem. Hoc seorsim collige, atque cum terra sigillata & paucio \star forma globulos. Destilla per \oslash m & prodibit \sim seu \odot valde fugax. Hartman. in pract.

Aliter.

R. Camphor. el. ζ ij. Sal. com. ζ ij. Sal. Taft. ζ ij. terantur subtiliss. cum lacte in formam pultis. Hanc macera in Arena & 3. dein affunde vini Malvat. ζ ij. destilla per \times humilem recipienti firmiter annexum, idq; l. Δ , prodibit aquosa & oleosa substantia, quam utramque rectificare poteris.

2. Oleum Camph. Succineum.

Solvatur Camph. in spiritu Θ i aut Nitrum in oleum supernatans, quod cochleari vitreo separetur, & cum Olei succini rectif. pari pondere aliquoties per

per \oslash setur, donec uniantur optime, postea super colchotar \oslash li sapius rectificetur, dum omnino purum evadat, & Camphora corporaliter non amplius appareat. *Est Diaphoreticum eximium in maligna febre.* Dos. gutt. 6. vel 8. in liq. appropri. *Ex communicatione Greg. Horst. p. m. habuit S. Closs.*

2. Liqueor.

R. Camphoræ q. v. inde utinali, ac impone desuper aliud utinale inversum, juncturis bene clausis sublima ex cihere, toties utinalia illa invertendo, donec Camphora in \oslash abeat. *Kesler. 4. c. 66*

N. Sunt qui in ∇ camphoram dissolutam pro oleo vendunt, cujus equidem usum internum nemini suadeo. Exirinfecus autem adhiberi solet in dolore dentium. Hoc \oslash tandem rursus in camphoram coalescet. *Med. destill.*

Nonnulli, in peste hoc depradicant.

R. Camph. ℓ l ζ iss. Sal. absynt. ζ iiiss. Ol. amygd. ζ ij. M. diligenter & macera per diem unum ac alterum, vase el. Hinc destilla per \oslash m, interum Salabsynth. ζ iss. admisce, \oslash rursus affunde per \oslash 3. digere atque hinc denuo per \oslash m destilla.

Dosis gutt. iij. v. vj.

Alii.

R. Camph. p. i. Spir. Terebinth. p. ij. & atque bis cohibendo.

3. *Essentia Camphoræ alexiteria.*

R. Camphoræ q. s. solve, cum \oslash amygd. dulc. scil. digerendo, colaturam cum ∇ aliquamdiu circulatam destilla denuo, ut abstrahatur ∇ , residuo adde tincturam croci ad aureum colorem usque inducendum.

Vires. Mirabilis est ad precavendam & curandam pestem, item in suffocatione Matricis & Febribus.

Dosis gutt. i. ac altera, *Tentzel.*

N. 1. *Spiritus ille abstractus haud minori cum successu in usum accersiri poterit.*

N. 2. *Quercetanus elicit ex camphora essentiam cum ∇ vitæ tartarisata.* *Phar. rest c. 26.*

4. *Trochisci de Camph. A.*

CCCLXXIX. Cancamum.

Κάγκανον, Dioscoridi est Arabicæ arboris lachryma, Myrrhæ quodam modo similis, virosi gustus: ad suffimenta usurpant.

Quod vires eidem splenetica, emmenagoga & ophthalmica habetur.

N. De hoc Dioscoridis Cancamo diverse hoc tempore Opiniones. *Laccam dicunt alij, alij Resinam Anime faciunt, alij Benevinum, nonnulli prorsus incognitum putant.* Videatur Matth. Garz. Clusius in Garz. Amatus in D. & sim.

CCCLXXX. Caranna.

Caragna, Carana est Resina duriuscula, tenax, sine multa agglutinatione, Tacamahacæ similis, nisi quod sit paulo odoratior, splendidior, liquidior

dior & densior. Affertur ex Carthagine Indiæ Occidentalis seu novæ Hispaniæ Provincia, ubi ex vulnerata arbore elicitor, atq; illinc foliis latis ac nervosis instar arundinaceorum foliorum involuta ad nos pervenit.

Vires. Calsac. & sicca. 3. viribusque pollet usdem Tacamahaca, quæ tamen operando citior & efficacior est, præcipuè in tumoribus, omnisq; generis doloribus, maximè juncturarum, tumores inveteratos dissolvit, defluxiones frigidas aut mixtas sistit, nervorum ac cerebri dolores sedat, vulnera recentia præsertim nervorum & juncturarum sola sonat, defluxiones in oculos & alias partes reprimat, (pone aures vel temporibus imposta.) *Monard.*

Solvitur in Oleo.

Præparatur inde Emplast. antipodagricum in signe.

℞. Carannæ ʒj. ciræ flav. ʒss. cum Ol. verbasc. F. Emplast.

CCCLXXXI. Colophonia.

Colophonia Officinarum; C. B. Pix græca, *Matb.* Cord. est substantia naturæ oleaginosæ, flavescens, arida ac friabilis, residua ex resinis abietina, strobilinaque coctione dum purgabantur, inspissatis ac frigore induratis.

Eligenda est pellucida, odorata, quæ Thuris fumum accensa æmuletur.

N. 1. Dicitur Colophonia, quod ex Colophone olim advehebatur.

N. 2. Friabilem illam flavamque

substantiam in Resinarum singularum destillatione residuam, alij Resinam frietam appellant; alij eidem colophonia nomen imponunt.

Vires. Si quidem Colophonia portio est Resinarum, Resinarum quoque vires retinet, sed minus penetrabiles, calfacit itaque & siccat, molli, glutinat, ususq; ejus, quia pinguibus solvitur, commodissimus est in Emplastris.

CCCLXXXII. Resina Copal.

Pancopal. Copal. Resina est duriuscula, admodum candida, vel ex albo flavescens, pellucida, bene odorata, in massam redacta. Asportatur ex India Occidentali, sive nova Hispania, ubi ex vulnerata arbore guttatim stillat. *Monard.* Clus. in *Monard.* *Fragos.* Calsac.

Vires. Calsac. 2. hum. 1. emollit, resolvit. Usus præcipuè in affectibus cephalicis.

PRÆPAR.

Oleum tenuius & crassius. Eodem modo elici potest utrumque, quo ex Resina atime.

N. Cæpit ab annis aliquot ex eadem India Occidentali, liquor quidem adferri olei de Copalyra appellatione, quodan ex Resina jam descripta sit, in dubio relinquit Clusius in *Monard.* commendari id ait ad vulnera recentia curanda: nostratibus ignotum est.

CCCLXXXIII. Elemi.

Gummi Elemi, Elemii, Helenii; Bbb bbb Resi-

Resina est, sive lachryma pellucida albicans, cum flavis particulis intermixta, in massam redacta, suavem, accensa halans suffitum. Asportantur ex Æthiopia, ubi stillat ex arbore, quam oleum nonnulli volunt (quod negat Matth.) alii cedrum.

N. Dioscoridi flavum est ac scammonio utrunque simile, mordaxque nostrata non item, quare an verum habeamus, dubium. Damnatur Ammoniaco vel Gummi Arabico simile, colore nigricans.

Vires. Calf. temperatè, emollit, digerit, resolvit, maturat, dolorem sedat, capitis ac nervorum affectibus eorundemque vulneribus, ac imprimis calvaria vulnerata specificè confert, contusionibus articulorum prodest, menses ac urinam citat.

Solvitur in oleagiosis, ut reliquare sine.

PRÆPAR.

1. Oleum stillat. Elemi. Fit ex retortâ per arenam vel vesicam ut ol. Anime. vide supra.

Vires. Specificum præ aliis (ut & ipsa Resina) censetur in affectibus nephriticis, paralyti, contractura.

F.

CCCLXXXIV. Fuligo.

Fuligo est pars rerum, combustibilium levior, à partibus crassioribus sub specie fumi elevata, inque substantiam crassam nigricantem, vi frigoris compacta, Germ. Rost.

Delectus, Fuligo eligatur splendens,

instar succini nigri, quæque fumarum parietibus proximè adhæreat (quod fornaci propior, eò melior) imò nec absere foret, delectum quoque instituere, ratione materiæ combustæ, quæ quantum Medicæ intentioni convenientior, tantò quoque fuligo præstantior censenda est.

Vires. Acris est, extergit, rarique usus per se, nec adhiberi eam memini, nisi quod intelligam, in suffocatione matricis à mulierculis plebeis cum successu esse propinatam. Quin & cum aliis mixta carpi imponitur ad arcendam febrem.

PRÆPAR.

1. Spiritus. 2. Oleum, & 3. Sal.

1. Fulig. el. q. v. imple ad collum usque retortam vitream lutatam & destilla ignis aperti gradibus, successivè adhibitis, in Receptacul. capaciss. ut prodeant cum phlegmate spiritus albicantes, ac oleum flavum, ultimòq; rubrum. Spiritum cum oleo aliquam diu digere, postea affunde medietatem V & destilla sæpius: prodit cum V, Spir. fuliginis & simul ol. rectificatiss. Caput mortuum incinera & extrahe sal more solito cum *

Vires. Spiritus ac oleum confortativa sunt insignia, mirabiliter agnoscant exhibita refocillant.

Dosis Spiritus gr. vj. ad ʒss.

Olei gr. 1. 3. in vino vel alio vehiculo convenienti.

Vires Salis. Præstantissimum curativum

virum est in cancro exulcerato, si in cella solutum cancris ulceribus semel ac iterum inungatur, venenositas instar vaporis visibiliter extrahitur. Tandem oleum (crassius) leni aspergine sapius illitum, crustam instar cuticula superinducit, quae sponte, spatio 5. vel 6. dierum decidens, ulcus consolidatum esse indicat. Hartm. in Pract.

G.

CCCLXXXV. Galbanum.

Γαλβανόν, χαλβανόν, Galbanum (Matthiol. Cord. hist. Caf.) est gummi (seu succus) ferulae Syriacae, quam Metopium vocant, quo nomine aliis gummi idem venit, intensè flavum vel albidum inflammabile; odore Opopanacem referens, colore Tacamahacae.

Optimum censetur cartilaginofum (alii granulatum volunt, sed ratissimè, ob mollescentem naturam in granis invenitur,) flavum, syncerum; pingue non lignosum, quod in se retineat non nihil ex suis seminibus, & ipsis ferulae sarmentatis, gravis & ingrati odoris, nec minus humidum, nec minus aridum, cum accenditur flammam nutriendens.

Vires. Calfac. sicc. 2. com. emollit, resoluit, extrahit.

Usus praecipue intrinsecus in mensibus ac partu pellendis, intussi inveterata ac Asthmale: Adversatur toxicis.

Extrinsecus prodest in partu ac men-

sibus, suffocatione uteri, vertigine, in furunculis ac lentiginibus: quin & glandi impositum Emplastri vice Urinam provocare dicitur.

PRÆPAR.

3. Galbanum depuratum: solve in liquore, exprime ac inspissa.

N. 1. Solvitur ut alia gummata ferulae, in quolibet liquore aqueo, & o. succo, vino.

N. 2. Galenus suspendit in linteis super Batq puram extillare facit.

N. 3. Dioscorides dimittit in ∇ m ferventem, impuritatesque supernatantes ejicit.

2. Oleum stillat. Fit. 2. per ∇ m ex Arena, addito sabulo, vel silicibus contusis.

N. Sunt qui Galbanum cum ∇ o in formam mellis miscent atque destillant. At exit primo liquor, dein \odot , adeoque opus protrahitur citra necessitatem.

Vires. Maximarum est virium in passione hysterica, intrinsecus, exhibitum vel extrinsecus umbilico illitum. Maturat bubones & anthraces.

Oleum aliud Sam. Cloff.

Solutio Galb. in ∇ non est de nihilo, praesertim ubi spiritus Galb. expetitur, omnium optimè fit oleum caeruleum ex catino ferreo ad latus inclinato; cum ∇ super tripodem terreum imponitur, deinde pertuso operculo obturatur, ita servantur gradus Δ , exitque primo spiritus, mox oleum, & balsamus ex pyreuma redolens.

Bbbbbb 2

3. Gal-

3. Galbanetum, i. e. Balsamum Galbanelum, seu spiritus Terebinth. Galbanetus.

Rx. Galban. trit. lb. β. Spirit. Terebinth. lb. i. Digere & aliquot, dein destilla ex cucurbita humili, vel ☉.

Vires. Summarum virium censetur in contractura ex colica, extrinsecus illitum.

N. Est & aliud Galbanum Theophrasti dictum.

Rx. Galb. lb. β. Gummi. Hedera ℥iij. trita seorsim, misce ac destilla per ☉ in Arena, Qato adde Terebinth. lb. i. Ol. laur. ac spic. ana. ℥j. destilla denuo.

Vires. Cephalicum est ac nutriticum in signe contracturas ac morbos similes curans. Med. destil. part. i.

4. Ceratum de Galbano, s. Ceratum Mauricale, Vid. August.

Gummi Hedera.

Vide Hedera, Class. i.

H.

CCCLXXXVI. Hypocistis.

Hypocistis, germen seu plantula est, è radice cisti fruticosi dum florescit, seu viscum ex quercu, profliciens: Dicitur & Limodorum, aliis Robethron. Ex hac itaque plantula, cum floribus succulenta sit, exprimitur succus, qui in sole exiccatus Glycyrrhizæ succo non absimilis evadit; atque ad nos, sed raro asportatur. Diciturque Hypocisthis vel succus Hypocistidis. Videatur Math. Dod. Cord.

in D. Lon. Cast. Clus. hist. Lob. Tab. Ger.

Vires. Refrig. (3.) siccat, potentissime astringit, condensat. Usus præcip. in quibuscunque fluxionibus sistendis, Diarrh. Lienter. Dysent. profusio meri, vomitu, &c. Uti & in excretionem sanguinis ex lapsu casuque orta. Extrinsecus roborat viscera humidiora, ventriculum, epas, &c.

N. Quia rara est, ejus loco succus Aca-cie recipi potest, quippe qua analogas vires habet, quamvis imbecilliores.

PRÆPARATA.

Hypoc. depurata.

Rx. Solve in ☉, aut succo appropriato, cola & inspissa.

L.

CCCLXXXVII. Lacca.

De Lacca diversæ Opiniones. 1. Fit Lacca cujusdam mentio apud Arabes, quam Cancamum Dioscoridis esse volunt, quod in odorum planè & nobis incognitum est. 2. Lacca est vulgaris seu officinar, quam Garzias ab horto fieri scribit ex succo arboris cujusdam proceræ familiaris in Pegu, Bengala seu Balagvate & Martaba, Malavar Provinciis scil. Indiæ Orient. Nimirum à formicis alatis succum quendam exugiant, eumque in Laccam, (non secus ac mel ab apibus) redigi, ramisque arborum induci, unde postmodum cum ramis ad nos transportetur. Alii sponte exudare volunt, atque circa ramos conrescere. Est autem resina sicca, Myrrhæ rubræ similis,

milis, masticata salivam rubro colore tingens, accensa vel tusa, suave olens. Dicitur Lacca Sumetri, à loco natali scil. Insula Sumetra, sicut ea quæ in glebis sine furculis affertur, Lacca comberti vocatur.

N. Est & genus lacca factitia terrestris, pictoribus familiare, quibus ad conficiendos inde colores inservit. Laccam vocant globulatam seu rotulatam, quippe globorum plerumq; venit formulis, colore minij, &c. Duplex id generis est, alterumq; vulgarem Laccam insectoriam appellant: alterum Florentinam, quæ cærior & coloris saturatius rubri.

Vires. Calfac. (aliis temperate, aliis 2. atten. aperit, sanguinem purificat, sudorem ciat, diuretica est. Usus præcip. in obstruct. Lienis, Vesicæ, felle, Epatis ac pulmonû, & hinc in hydropo, Ictero, Asthmate, apostemate pulmonum: in expellendis variolis, morbillis atq; pestilent. contagio in ciendis mensibus, &c.

PRÆPARATA.

1. Lacca lota seu præparata. Tota lacca lavetur in Decocto Aristoloch. & Scœnanti, quoad clarescat: hinc collige quod relederit.

2. Trochisci de Lacca. V. Di.

CCCLXXXVIII. Labdanum.

Labdanum, Laudanum est liquor ex Cisti (Ledon appellati) foliis exudans, seu est: massa non absimilis masticæ pilularum, (in pilulas vel sola manuformabilis:) friabilis, colore opa-

ca cinerea, inflammabilis, accensaque gratum saporem halens, insuffitibus usitatissima.

Cistus illa familiaris est in Cypro, Lybia, Arabia. Videatur *Λιδον*, Ledum, *Math. epist. Cast. Tab.* Lada & Ladon, *Cord. in D. & hist.* Ladanum, *Lon.* Cistus Ledon latifolium, *Lob.* Ledum latiore folio Italicum, *Cam.* Cistus Ledum Matthioli, *Ger.* Cistus ladanifera, *C. B. 1.*

De origine Ladani scribit Dioscorides, quod hirci, frondes Cisti depascantes, succum illum barbis suis colligant, unde postea pectine decerpatur.

Laudatur odoratum, subviride, leve, facile mollescens, pingue, resinosum, arenularum, aliarumque sordium expers, quale in Cypro gignitur, quod plerumque ceu ex gyris coagmentatum, asportatur. Arabicum vilius habetur, afferturque in massa uniformi.

Vires. Calf. sic. emollit, digerit, maturat, attenuat, aperit, orificia venarum referat, inspissat. Usus præcip. in capite humido ac catarrhoso, in dysenteria, &c. Extrinsecus ejus usus est in Emplastris amollientibus, anodynis, iussim sedantibus, in Alopecia (inunge vel coque in vino & lava) in odontalgia, in cardialgia, doloreque ventriculi, (cum modico Bdelli faciunt pilulas dandas, Num 1. & 2. horat antepastum. Crato.) in suffocatione nteri (introrsum adhibitum:) cicatrices curat.

Bbbbbb 3,

PRÆ-

PRÆPAR.

1. *Ol. stillat.* Vide *Medull. destillat.*
lib. 1.

2. *Pilula de Ladano.* V. l. 2.

N. 1. *Sala purificare docet in* ∇ *id solvendo atq; colaturam inspissando. Verum me hercle minus commode. Et si enim coctione non nihil in aqua solvatur, id tamen non nisi portiuncula minima est, relinquitur pars major intacta, quæ non minus quam ulla commoda est.*

N. 2. *Et si inflammabile ladanum sit, non tamen pinguibus solvi potest.*

CCCLXXXIX. *Liquidambra.*

Liquidambar, Liquidambra, (q. liquida ambra, ob odoris suavitatem,) Refina est oleaginosa suavissimi ac fortissimi odoris, effluens ex arbore quadam procera ac venusta, Ococol sive Ocolote Indis dicta. Estque partim siccior, partim liquidior. Liquidior pars vel seorsum collecta, vel expressione, à sicciore separata, sigillatim venditur, dicta eodem nomine Liquidambar, seu oleum liquidambar, oleumve de Ambra. Videatur Monard. Casalp. Lugdunens. in hist. Mexic.

N. 1. *Effluxio hac incisione corticis promoveatur.*

N. 2. *Arbor Ococol familiaris est in India Occidentali, seu nova Hispania, unde paucos ante annos in Europam transferri cepit.*

Vires. Calf. 2. (oleum 3.) hum. 1. re.

solvit, obstructions expedit, emollit, maturat. Usus præcip. in uero obstructo ac indurato, tumoribus duris, &c. insuffiti- bus, & sim.

N. *Adhibetur mechanicè in persumandis (ut ajunt) coriis ac chirothecis.*

PRÆPAR.

1. *Oleum, (ut dictum) vel seorsim collectum, vel expressione à sicciore parte Resinæ separatum.*

2. *Coctione ex ramis elicatum. Coquant enim Indi ramulos in ∇ , supernatantem q; pinguedinem nomine olei colligunt. Et hoc esse oleum illud officinarum nostratum, color arguit, rubro-purpureus, quippe nativa albican- tiora esse solent.*

N. *Resina nostratibus in usu non est.*

CCCXC. *Lycium.*

Altiore, Lycium Dioscoridi est succus extractus (coctione scil. & inspissatione) ex ramis ac caudice arboris ejusdem nominis. Hanc describit titulo Lycii, Matth. Tab. Ger. Lyc. alpini, Lugd. Pyxiacanthæ, Dod. Lon. Verum cum modernis incognitum sit, factum est, ut diversæ inde subortæ sint opiniones, Lob. substituit suum ex Lycio Narbonensi extractum, Garz. suum Cate dictum; habet & suum proprium Ravvolius in Itinerario. Officina suum Lycium communiter ex Periclymeni baccis gravissimo errore conficiunt: alii ex Ligustri fructu: alii ex prunis sylvestribus. Præstaret tamen, monente id etiam

etiam C. B. in Matthiol. succedaneum
ex Oxyacantha aut Rhamno, aut Rho-
is succo compilare.

M.

CCCXCI. Mastiche.

Mastiche est Gummi Resina ex al-
bo citrina, pellucida, granulata, bene
odorata, ex Lentisco arbore exudans.

N. De Lentisco. Vide Class. I.

Delectus.

Optima censetur quæ in Insula Chio
provenit, odorata, candida, instar ceræ
albæ, splendens, adulta, retortida, fria-
bilis, sincera, stridens. Reprobatur
nigra bitumina similis, viridis, livida,
impura. Adulteratur Thure & Resi-
na pini, sed odore fraus statim depre-
henditur.

N. Quanto vetustior, tanto intensius
citrina agit.

Vires. Calf. & sicc. 2. subastr. emollit:
ventriculum roborat. Usus præcip. in vo-
mitu, nausea ac fluxu alvi compefcendo.
Obtundit ac corrigit purgantium acri-
moniam, reprimat exhalationes ventricu-
li, quæ caput aliàs ferire solent, (granaa-
liquot post pastum deglutita,) roborat ca-
put, nervosumque genus, expuitioni san-
guinis ac tussi medetur, emendat oris ha-
litum, pituitam è cerebro elicit (masti-
cando.) Extrinsecus Usus ejus creberri-
mus est in dentifriciis, emplastris ac cata-
plasmatis stomachicis.

N. Coquitur 3ß. in ∇ 1ß. iij. vel iiij.
daturque pro potu ordinario in Diar-
rhæa.

PRÆPAR.

1. Oleum stillat. s. flavum. 2. Oleum
rubrum seu Balsamus.

R. Mastich. q. v. salis parum, ($\frac{1}{3}$.)
silic. contus. ana, destilla per Σ m, pri-
mo extullat liquor albus cum ϕ o flavo,
tandem Δ e fortiori, ϕ o rubrum, recti-
fica per Σ m parvam: flavum ϕ o ser-
va seorsim, rubrum deinde & Balsa-
mum nigricantem itidem seorsim.

Aliiter.

R. Mastich. 1ß. ij. Boli pulv. M. ij. ∇
q. s. impasta, digere ϕ (14.) dein de-
stillat per Σ m Δ e nudo. & prodibit
 ϕ o leve supernatans, tum quoque gra-
ve & ad fundum secedens, utrumque
rectifica cum bolo ac sale.

N. 1. Habes egregium modum Olei
albi flavi & rubri prima parte Glauber. p.
36.

N. 2. Et aliud sub titulo Quinta Es-
sentia cum spiritu Thereb. Myroth. Fa-
bri. Per se autem factum Oleum prabet in-
copia, quod si super Σ m rectificaveris, a-
credinis alicujus erit particeps, addidit ve-
rò ∇ font: per B. habebitur Oleum fla-
vum S. Cloff.

2. Oleum per deliq.

Fit in albumine ovi cocti, aëri hu-
mido exposito.

3. Oleum Mastichinum.

Fit coctione mastich. in Ol. Rosar.
omphac. Vide Diss.

4. Spiritus Mastichis.

Est liquor albus, (qui in ϕ atione
olei prodit,) rectificatus.

5. W

5. *V. Mastichatus.*

R. Mastich. el. lb. i. V. rectif. lb. ss. digere ☞ (14.) postea affunde ▽ a-
nat. & destilla in MB, i. prodi- de-
in ▽, quæ nullius usus, in MB re-
ctifica & serva.

N. Quod remansit Vari potest per
Om, ut profundat ☞.

Vires. Maxime prodest in ventriculi
imbecillitate ac cruditate, in colico dolo-
re, &c.

6. *Aqua Mastichina F. F.*

R. Mastich. lb. ss. Caryophyl. ʒss.
Macis ʒj. vini albi generosi lbij. destil-
la per XX.

7. *Pilula Mastichina. Vide Disp.*CCCXCII. *Myrrha.*

Συγγρα, Dioscor. Bola Indis, Myr-
rha, Matth. Cord. in D. Gariz. Frag.
Ces. Lob. Est resina gummea (concre-
tus gummi resinofusus succus, cujusdam
arboris exotice, quæ cortice vulnera-
to, Myrrham profundit, partim in
substratas tegetes destillantem, par-
tim citrà caudicem concretescentem.
Plurima affertur ex Arabia, tum etiam
ex Regione Alexim quæ Æthiopia
est.

Delectus.

Laudatur friabilis, levis, undiqua-
que concolor, minutis glebis, amara,
acris, odorata, & quæ confracta, ve-
nas unguinum modo candidas & leves
ostendit. Omnibus autem antefertur,
quæ à loco unde convehitur, Tro-
glodytica nuncupatur, colore palle-

scens, seu subviridis, splendens ac mor-
dax. Inutilis est ponderosa & coloris
piceo s. nigra- hæc (myrrha animinea.
Amati.

N. Stactem nihil aliud esse quam myr-
rham liquidam, testatur Dioscorides. E-
jus autem colligendi diversos deprehendi-
mus modos. 1. Sponte ex arbore non vul-
neraria exudat. 2. Exprimitur ex myr-
rha, ut oleum Liquidambar ex Resinae-
judem nominis.

Vires. Myrrha calf. & sicc. 2. (al. 3.)
aperit, subastr. athen. maturat, discutit,
putredini resistit. Usus præcep. in uteri
obstructione, fetu expellendo, in pulmo-
num & intestinorum mucilagine, ac in-
de nata raucedine, tussi & angina, plen-
tude, colica, lumbricis: compescit diar-
rheam ac dysenteriam, febrium rigorem,
præcipue quartanæ arcet. Extrinsecus
prodest in igne sacro, gangrena, tumori-
bus, vulneribus inveteratis ac recentibus,
in primis capitis, unde in Emplastris sti-
licis, ut vocant, usus ejus creberrimus
esse solet. Masticata ac subinde deglu-
tata halius fetorem emendat, coryzam-
que curat, &c.

Dosis à ʒss. ad ʒij. vel ʒj.

PRÆPAR.

1. *Myrrha Depurata.*

Depuratur more solito: Myrrhæ
subtiliss. tritæ affunde expressum suc-
cum, decoctum, vel infusum (inten-
tioni tuæ appropriatum,) vel vinum
ad eminen. digit. 2. digere in MB, ut
mollescat, dein calide exprime & in-
spissa lente. Vide Querc. Ph. Rest. c. 15.
2. Myr-

2. Myrrha Extracta.

Extrahitur cum V rectificatiss. f. a. abstrahitur V, inspissaturq; extractum ulterius in vitro, vel vitreato vase ad consistentiam olei.

3. Oleum Myrrha.

Destilla per Σ m ex Arena.

N. 1. Sunt qui myrrham cum serratura abietina macerant, ac postmodum per Vesicam oleum eliciunt. Verum id aliqua ex parte abietinum est.

N. 2. Alij liquori myrrha V affundunt, digerunt. ac per XX Qant. Med. destill.

N. 3. Alij digerunt myrrham pulverisat. cum \dagger atq; hinc Qant.

N. 4. Neque per se, neq; cum silicibus, arenâ, bolo aut farinâ laterum. Ol. profundit, sed solum Σ um gravem & acidum aq. fortentem. Fiat igitur utroque modo, ut dixi de Mastiche S. Cloff.

4. Liqueor Myrrha.

Impone Myrrham pulveris. albumini ovi cocti adhuc calido, ac repone in cellam ad liquefendum, vel mixtam cum eodem albumine repone supra tabulam vitream ut liquefcat, destillet in vitrum suppositum.

Vires. Abstergit maculas cutis, stigmataque ex lue venerea.

5. Trochisci de Myrrha.

O.

CCCXCII. Omphacium.

Agresta, Agrest. Gall. du Verjus. Est succus ex uvis immaturis expressus colatus, inque dolis repositus, & vase clauso asservatus.

N. 1. Praestat uvae adhibere dies aliquot (45.) soli expositas.

N. 2. Tempore Dioscoridis inspissabatur calore Solis ad consistentiam Rob.

N. 3. Oleum acidulum ex olivis immaturis expressum, ob saporis affinitatem itidem Oleum Omphacium appellari solet, de quo vide supra Olea, class. 1.

Vires. Inservit tam Esculentis, quam Medicamentis. Refrig. 2. succ. 1. substantia est crassioris, saporis acido acerbis. V. sus precipui ad hypochondria ardentia, Stomachi ardorem, (orificio impositum) imo calidis morbis omnibus felicius iuvamento est, quam acetum quod prater refrigerandi vim & caliditate acris pollet, secus ac omphacium.

PRÆPAR.

Syrupus de Agresta, vide Disp.

CCCXIV. Opium.

Sunt, qui Opium Meconii nomine confundunt, & duo uno eodemq; habent, sed male.

Opium enim lachryma est, quæ stilavit ex capitibus papaveris, dum maturiscebant, leviter incisis.

Meconium è contra succus est ex iisdem expressus. Videatur Matth. Cord. Garz. Frag. Bellon. Cord. in hist.

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Opium
triplex
est, | { | 1. Album, affertur ex calico, forte est Thebaicum. |
| | | 2. Nigrum & durum, ex Aden. |
| | | 3. Flavescens magis & mollius, ex Cambaja & Decan. |

Ccc ccc

Col-

Colligitur Plinio & Avicennæ ex pap. nigro, aut Turcæ ex albo) docente Bellonio, lib. 3. obs. c. 15.) leviter inciso eliciunt, quotidianoque usu ad ʒss. vel ʒi. nomine Maslac, assument, ad conciliandam scil. animositatem. Verum quia hoc opio caremus (flavescens enim id esse, leoninorum pilorum modo, ait Bellonius) de opio agemus nobis usitato, quod vel adulteratum, vel meconium, potius, quam opium.

Præstantissimum habetur nobis usitatum opium Cabaianum, quod ponderosum, densum, inflammabile & ardens (non atra tamen flamma) odore soporiferum (instar papaveris,) ac graveolens, sapore amarum & acre, colore ad aloen accedens, cum frangitur, splendore quodam nitens, facile solutum.

N. 1. Dignoscitur ab adulterato, quod hoc si diluatur, liquorem croceo colore tingat, ob Glaucium admixtum.

N. 2. Opium seu Meconium nostrate, secundum Quercetanium, ex papav. nostrati Extractum. Vide supra in papav.

Vires, Opii. Vim possidet spiritus commotos, inquietos, seditiososq. compescendi, facultatique animali peculiari quadam proprietate torporem inducendi. Unde somnus, sensibilitatis imminutio, &c. media sanè maximi solaminis, in vigiliis, doloribusque intensis. Verum enimvero, nec & suis incommodis opium caret, nimirum, præterquam quod excretionem urinae & fecum supprimat,

malignitatem quoque exercere aptum est. Hac videlicet livorem artuum, frigidumq. sudores, respirationem parvam, ac difficilem, mentis alienationem, & inducit. Scribonius.

N. De caliditate & frigiditate maxime controversitur. Plurimi tamen cum recentioribus calidum id probant, inducunt amarorem, inflammabilitatem, acedinem, vi exulcerandi, &c. Alij cum majoribus frigidum id demonstrant, virtuti scil. insistentes narcotica, quam obtinent. Disputatio, me hercle, citra necessitatem. Etenim statuatur calidum, reputetur frigidum, quid inde: nec enim in copia adhibetur tanta, ut metuenda inde inferre possit incommoda. Veruntamen calidum potius dicendum esse quam frigidum, potiores evincunt rationes: nec obstat vis narcotica, utpote quæ non à frigiditate, sed occulta qualitate procedit. Similem enim videretur observare licet in nonnullis correptis peste, febribusve malignis & ardentibus. In quibus sanè quicumque narcosin ad frigiditatem referre voluerit, signum frigiditatem attribueret.

PRÆPAR.

I. Extractum Opii Quercetani.

R. Opii tenacis (non emarctidi,) ꝑ q. v. scinde in bracteolas tenues & exiguas ac in patina vitreata moderato calore (arenæ) exicca (cavendo fumum), donec in pulverem digitis comminui possit & fœtorem amittat. Sic Sulphur fœtidum discussum, in quo omnis vis narcotica.

R. Opi-

℞. Opium hoc Sulphure suo narcotico exutum, extrahe s.a. Tincturam cum acet. destill. fortissimo, (vel succo Limoniorum) abstrahedein menstruum in MB ad mellaginem seu extracti formam. Hartm. in Croll.

N. Feces quæ post Tincturam extractam remanent, inservire possunt anodynis externis inde concinnandis, v. g. in Podagra, &c.

2. Aliud Quercetani Extractum Opii & Hyosciami, quod placet appellare.

Extractum Opii succati.

℞. Succu seu Extracti Hyosciami ℥x. (vide Hyoscyam.) opii præpar. i. e. ad ignem exiccati, ut dictum ℥x. vel vj. Digerantur lento calore cinerum. Sic attrahit opium tantum succi, quantum sufficit, quod residuum erit ab attractione, leorsim separabitur per inclinationem & exhalationem. Ex eo autem quod coagulatum est extrahe Tincturam cum succo Limoniorum s.a. donec animadverteris succum non amplius colorari. Tinctos liquores decantatos digere denuo, ut crassiores feces subsideant, quas fecerine.

N. Laudanum opiatum majus Quercetani ingreditur.

3. Extractum Opii Angeli

de Sala.

℞. Opii in frustula concisi lb. ℔. humectetur aceto ros. ℥ij. vel iij. atque exponatur igni & farragine ferrea, continuò agitando ut liquecat,

vaporque opii Sulphureus ac noxius una cum ✕ in auram abeat, opiumque refrigeratum friari ac pulverisari queat.

N. Ignis cautè administrandus, ne empyreuma contrahat.

Hinc ℞. opium illud pulverisatum ✕ ros. lbiii. stent in calore arenæ (saltem aliquot horis) ut solvatur, dein cola per colum linteum cum expressione accoagula. Hinc solve denuo in Q. E. Sambuci rectificatissima: clarifica cum albo ovi, ac inspissa ad consistentiam pilulis aptam.

N. Sal ✕ ros. operationem opii (cum quo jungitur) non modo mitiorem reddit, sed & vim ejus diaphoreticam confortat, ut vel sudor haud sine levamine subsequatur.

4. Extractum Opii Crollianum.

℞. Opii (purgati prius in liquore hyssopi, vel aqua Qata,) q. v. extrahe s.a. cum V decanta & abstrahede.

N. Crolliana hac extractio non sine ratione reprehensionem incurrit, quia 1. Tartari illud, in quo vis narcotica latitat, humana natura inimica, per V tenuius, subtilius, adeoq; ferocius redditum, Laudani compositionem deteriore facit 2. Spiritus vini suam naturam nihil præter Tartari extrahit, sale intacto, quod potissimum tamen requirimus. Præstat itaque cum aceto extrahere, quam cum V. Hartman. in Croll. Brendel.

5. Laudanum opiatum.

Laudanum opiatum, nihil aliud
Cccccc 2 est

est quam Extractum Opii admixtione alexipharmacorum, cordialumve, & sim. correctum. Dicitur autem Laudanum, quasi laudatum medicamentum, ob insignes operationes, quas vel in gravissimis morbis præstat, quales sunt 1. dolores sedare. 2. somnum inducere. 3. omnes fluxiones sistere. 4. ardorem mitigare. 5. Naturam confortare. Inquietos spiritus Phrenitide, Arthritide, Epilepsia, & sim. compescere. Variæ porro laudani huius descriptiones circumferuntur, quarum tamen præcipuæ sunt sequentes.

6. *Laudanum Opiatum.*

R. Extr. Opii (Quercet. vel Salæ) liquidi adhuc instar mellis ℥j. Magister. vel sal. corallor. perlar. ana ℥ss. Extract. croci (cum V facti) ℥ij. M. omnia diligenter & serva. In fine addi possunt aliquot guttulæ ol. caryophyllorum.

N. Alij spir. ☉ admiscant.

Hoc Laudanum est pene inculpabile & securè sine omni alicujus peregrinæ affectionis metu potest administrari.

Dosis à gr. ij. ad iij. *Hart. in Croll.*

7. *Laudanum Opiatum Querc.*

R. Extr. seu Essent. Opii, ℥ij.

Extr. Croc. (cum aq. Limon. fact.) ℥j.

Hic confusus adde.

Pulv. Hyacinthor.

Corallor. ana ℥ss.

Terræ sigill. ver. ℥j.

Bezoard. ver. (f. Extracti Bezoardici. V. l. 2. c. 57.

Unicornu.

Ambr. grz. ana ℥ij.

M. exactè, continuò agitando ad Δ lentum, donec ex materia frige facta pilulæ formari possunt.

Vires. Insignes ac suspiciendas percipies huius anodyni affectus, quod te spe nunquam frustrabit. Nam confert citra molestiam & cerebri ullam perturbationem, adversus omnis generis dolores, à quacunque causa subortos contra omnes hæmorrhagias, in quacunque corporis parte fuerint, contra omnes defluxiones & fluores ventris, dysentericos, hepaticos, lientericos, & sim. ad inducendam gratam tranquillitatem in febribus ardentibus, in quibus ipsi rationis sensus laditur, & in phrenesin ager plerumque dolabitur.

Dosis pilulæ una ac altera magnitudine grani piperis. *Querc. in Pharm. Rest. c. 25.*

8. *Aliud, laudanum Opiatum Quercetani, quod libet appellare.*

Laudanum Opiatum majus Querc.

R. Extract. Bezoard. Querc. (non dum inspissat.) Dosis l. 2. c. 57.

Extr. Croci ex croc. ℥iij. cum ☐ Lat ex succo limon. vel pomor. redolent. acuata cum ☐ u ☉,

vel ☉ Sulphur.

Extr. Myrrhæ ac mumiz, (ut sequitur.)

Extr. Opii succati (quale & quantum supra paratum,) sc. ℥vj.

Misce

Misce & lento Δ e redigantur ad
consistentiam mellis.

Dein adde.

Succin. Citrin. præparat. (i.e. super
quo ∇ opt. aliquoties (4.) defla-
grarit.) \mathfrak{z} ij.

Sal. Perlarum.

Corallorum. ana \mathfrak{z} ij.

Terræ sigill. opt. \mathfrak{z} ss.

Pulv. Bezoard. ver.

Off. de C. C.

Unicorn. ver. ana \mathfrak{z} j.

Ambr. gryf. \mathfrak{z} ss.

Misc. opt. in fine addendo.

\mathfrak{z} o Anis.

Fœnic. ana gr. xij. vel xv.

ferva pro usu.

Dosis, est magnitudo piperis, vel gr.
 \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} ij.

*Extractum Myrrha ac Mu-
mie sit.*

\mathfrak{z} . Utriusque ana \mathfrak{z} ss. dissolve in hy-
dromelite vinoso ac Δ m, trajiceq;
calidè per chartam, quia viscosa est
solutio.

9. *Aliud Laudanum Opiatum, A-
nodynium specificum Paracelsi.*

\mathfrak{z} . Opii Thebaic. \mathfrak{z} j.

Succ. aurant. acid.

Cydon. ana \mathfrak{z} vj. (alii addunt & ∇
spermat. Ranar. tantundem.

Cinamom.

Caryophyll.

Croci or. ana \mathfrak{z} ss.

F. digestio leni calore Solis vel fornæ-

cis per \boxtimes m, dein exprimantur & impo-
nantur iterum:

Moschi \mathfrak{z} ss.

Ambræ \mathfrak{z} iiij.

Magist. Corall.

Perlar. ana \mathfrak{z} ss.

Misce digereque iterum per \boxtimes m.

postea adde

Quint. Essent. auri. \mathfrak{z} ss.

Miscè exactè.

N. *Hartmannus omissa Q. F. auri
remanentiam incinerare, atque Salin-
de extractum priori mixtura admiscere
jubeat.*

*Vires. Anodynium specificum est Pa-
racelsi ad auferendum quoscunq; dolores
internos & externos, Hartman, in Croll.
Sala in Opiolog.*

10. *Aliud.*

Nepenthes Aureum Angeli Sala.

\mathfrak{z} . Extr. Opii (Salæ) \mathfrak{z} ss.

Croci (ut in laudan. opiat.

major.) \mathfrak{z} ij.

Lap. Bezoar, seu Tinctur. auri. \mathfrak{z} ij.

Resin. ligni aloës.

Ambr. gryf. opt. ana \mathfrak{z} j.

Misce & incorporentur simul in va-
se vitreo, eoque bene clauso ferventur.
Sala in Opiologia.

11. *Laudanum Opiatum Crollij.*

\mathfrak{z} . Opii Thebaic. \mathfrak{z} iiij. purgetur in ∇
hyssop. dein extrahatur cum ∇ .

\mathfrak{z} . Succ. Hyoscyam. debito tempo-
collecti, & in \odot inspissat. \mathfrak{z} ss.

F. Extractio cum ∇ .

\mathfrak{z} . Spec. Diambra.

Ccccc 3

Dia-

Diamosch. ana ℥ij. β.

F. Extract.

Hiscē extractis per ☐ses 2. digestis
admisce.

Mumiæ transmar. ℥β.

Sal. Perlar.

Corall. ana ℥ij.

Liquor. succin. per alcohol. vini ex-
tract.

Off. de Corde Cervi.

Lap. Bezoard.

Unicor. animal. vel minor. ana ℥j.

Moschi.

Ambra, ana ℥j.

Et in defectu genuini auri potabilis,
nullis corrosivis inquinati, addantur in
fine.

☉ Anisi.

Garui.

Arantior.

Citrrior.

Nucist.

Caryophyll.

Cinamom.

Succin. ana gr. xij.

F. Massa pilularis.

N. 1. Radices & Cortices Hyoscyami
juniores recentes, (abjecto interno trun-
co lignoso,) colligantur ☉ & ☾ existen-
tibus vel in ☐, vel in ☐ ante pleniluni-
um. Alij colligunt, si fieri possint, in ipsa
hora, quando ☾ in dictis signis renova-
tur. Expressus succus depuratus inspissa-
tur ad consist. mellis, dein extrahitur cum
☐ in spissaturque l. Δ.

N. 2. Succus Hyoscyami & Opium
(antequam reliquis misceantur,) prius

reijciant sua Sulphura, & venena noxia;
(qua spuma instar superficiem petunt.)

N. 3. Pro mulieribus propter suffo-
cationem matricis omittantur Moschus
& Ambra, vel corrigiuntur adjectione gra-
norum aliquot Castorei.

N. 4. Ex remanentia incinerata Sal
extractum mixtura misceatur.

N. 5. Extractions illa digerantur per
menses 2. dein abstrahatur ☐, addantur-
que pulveres.

N. 6. Oleis, quia difficulter extracto
miscentur, prius invicem mixtis, aliquot
gutta ☐ affundi solent, & diligenter com-
misceri, ita facile compositioni miscen-
tur.

N. 7. Compositio lenissimo calore per
mensem fermentari poterit.

Dosis à gr. ij ad iij.

12. Laudanum Opiatum Clar.

Sennert.

℞. Opii purific. ℥j. F. Extr. cum ☐

℞. Spec. Diamb. ℥j. F. Extr. itidem
cum ☐.

Hinc affundatur Extracto Opii, (ad
styr. consistent. inspissato,) Tincturæ
Diamb. pars dimidia & succ. extr. rec.
purific. ℥vj. stent in digestionē ☐ 20.
sæpius agitentur, ubi ☐ maxima pars
exhalaverit.

Adde.

Extr. Castor.

Solut. Corall.

Perlar. ana ℥β.

Essent. Croci ℥j.

Affund. Tincturæ Diamb. reli-
quum, lentoque ☐, ☐ exhalet.

Sub

Sub finem adde.

℞ Citri.

Cinamom.

Caryophyll. ana gr. iij.

F. Massa instar Extracti.

Dimidia pars adde.

Moschi.

Ambra ana gr. vj.

Reliquum reservetur pro fœminis.

15. *Laudanum simplex Plater.*

Laudanum simplex habetur in ob-
serv. Plateri p. 455. ex 3℥ bdell. in succo
plantag. emolliti & 9j. opii in V soluti
F. massula, cujus dosi gr. vj.

14. *Aliud.*

℞ opii super laminâ ferreâ exiccat

3ij.

Syrac. calamit.

Labdan. anc 3℥.

Ol. garyoph. gutt. iij.

Malaxentur in mortario calido & for-
mentur pilulæ magnitudinis pisi pon-
dere gr. 4. aut 5. detur unica.

15. *Laudanum liquidum.*

Firex opii desiccatur, super laminâ fer-
reâ 3℥.

℞ opt. rectific. 3vj.

℞ opt. 3℥.

Croci Angelic.

Specierum diambr.

Diaromat. ros. ana

℥iij.

Ambr. gris. 3℥.

Infundantur simul matraccio clau-
so, digerantur calore lento per 20. &
continuos, coletur per chartam &
colatura servetur. Est iis accommo-

datum, qui pilulas sumere nequeunt.

Dosis à gr. 4. ad 8. &c.

16. *Laudanum solidum S.*

Closs.

Totum Laudanorum artificium
consistit in correctione opii, quæ fit per
diutinam digestionem in Acet. destill.
(sp. 8. dierum) quæ ter cum novo Acet.
destill. repetenda venit, abstrahatur
postea Acet. destill. à tincto liquore ad
consistent. Extracti.

℞ extracti Opiatici 3ij.

Croci (in p. 8. aq. ros. &
spir. vin. parte unâ fa-
cti) 3℥.

Castor. eodem modo pa-
rati 3j.

Extr. spec. Diambr.

Diamarg. frig. &

Diamosc. dulc. in Acet. destill.
mixtim parat. 3iij.

Magisterii corallini 9lati 3vj. M.
ut artis est. Serveretur in vitro ad dimi-
dias solum pleno qua post paucas horas
fermentari incipit, quod dum fit, agite-
tur sæpè spatulâ ligneâ.

Dos. g. iij.

N. *Essentia* & cetera omnia quæ vul-
gariter Laudanis adduntur, pretium po-
tius, quam virtutes augent.

17. *Laudanum pectorale valdè ex-
cellens Ang. Sala attributum.*

℞ Extracti Opii liquidii in part. iij.

V. & parter. aq. ros. per digestionem

3. & in B. parati 3j.

Croci.

Florum Sulphure Benzoinat.

Aloes

Aloës lucid.

Myrrh. el. ana ℥ij. pulverifentur. & M. calidè, addendo spiritus Sal com. ℥j. (ad promovendam fermentationem.

Hoc Laudanum purissimè exhibetur phthisicis à Gararho. Asthmaticis tussicentibus, cum extracto succi glycyrrh. In Epilepsia aërea cum sanguinis effusione, hæmorrhagiâ, capitis dolore. In dentium dolore dissolvitur in & applicatur denti. Dose eadem cum superiori.

N. Plures insuper Laudanorum descriptiones passim reperiuntur, ut in Alchymia Libavij, l. 2. c. 1. in Opiolog. Cl. Dn. D. Winckleri, Freytagij, & sim. quo curiosum Lectorem remittimus.

12. Pilula Narcotica Plateri. Vid. l. 2. c. 74.

CCCXCV. Opopanax.

Όποπάναξ, Dioscorid. Opopanax. Gummeus est succus ex panacis heraclei lauciata radice effluens ac concre- scens.

Dicitur Opopanax & Opopanacum, Cord. hist. Cæs. Planta autem insignitur, πανακες, ηρακλειον Dioscor. Panaces Heracleum, Matth. Cæs. Panax Heracleum, Lob. Dod. Ger. Pan. Herculeum, Cæs. primum, Tab. Panax Sphondylii folio, C. B. 2.

Vires. Calf. 3. sicc. 2. emollit, digerit, flatu discutiit, purgat pituitam, crassam & lentam, à partibus remotis, cerebro, nervis, sensorijs, juncturis, Thorace, (de quo Class. 4.) uvula delapsa opitulatur (suffitu in os immisso.)

N. Signa bonitatis, color extus flavus intus albus, aut subflavus, sapor valde amarus, odor gravis, consistentia pinguis, facile in aqua solubilis, levis, tenera, friabilis galeani instar lactescens, dum resolvitur ad lacteum liquorem proprium accedens. Improbatur Opopanax niger ac mollis.

PRÆPARATA.

Opopanax, styrax calam. bdell. labdan. parum admodum olei profundunt.

P.

CCCXCVI. Pissasphaltos.

Πισσασφαλτος, } Nativum Erdwachs.
Πισσασφαλτον, } Factitium.

Nativum describitur à Dioscoride, quod nascatur in Apollonia Epirotar. Item quod ex Cerauniis montibus devolvatur, & impetu fluminis rap- tum rursus æstu in littus expuatur, ibique concreseat. Hac ratione nihil aliud esse videtur quam ασφαλτος, de qual. 3.

Factitium, est compositum quid seu mixtura ex pice ac bitumine (unde & nomen accepit,) videturq; id esse, quod nostates ασφαλτον vocitant seu bitumen Judaicum.

N. Sunt qui Pissasphaltum mumiam Arabum dicunt, de quo lib. 5. in homine.

Vires. Calf. 3. & sicc. 2. dolores capitis aliisque ejus morbis à frigidityte obortis medetur.

CCCXCVII. Pix.

Πισσα, Pix, Pech. Est pars Resinosa

ex accensis tædis, i. e. arboribus resinosis per senectutem nimia pinguedine quæ strangulatis, colliquata.

Modus fiendi rusticis committitur, quæ in nonnullis locis, ubi arbores resinosæ abundant, inde victum lucrantur: fitque ad modum quo destillatio per descensum fieri solet. Rogus scilicet ædarum resinosarum contegitur undique termitibus terræ, ne qua exhalatio fieri queat: hinc subdunt ignem per foramen relictum, quo fit ut resinosa pars colliquata in canales affabrè subditos effluat, initio liquidior, hinc crassior, ultimo crassissima. Affertur autem copiose ex Finlandia, ubi rogos ejusmodi plures non citra oblectationem vice unâ & eadem conspexi, abietem enim ac Pinum copiosè illa alit.

Dicitur Pix liquida, Pisselæon, Dioscor.

N. Arbores resinose sunt imprimis Pinus, Abies, Larix, Terebinthus, Cedrus.

Pix illa ubi denuò coctione purgatur, seu si mavis dephlegmatur, crasse scit magis ac magis, diciturque Pix sicca, Palimpissa, Pix navalis (quod navibus picandis adhibeatur, non quod à navibus maritimis derasa sit, quippe hæc appellatur Zopissa.)

Vires. Ut resinam sapit, ita & resinarum Vires obtinet, idque eo magis, quo liquidior pix fuerit, sicca enim exiccat fortius: facultatis itaque pix liquida est calfacientis, discutientis, mollientis, digerentis, anodyne, &c.

Ol. stillat. Fit l. c. per Ret. per se, vel addito sabulo.

Vires. Maxime prodest ad vulnera capitis, & ad puncturas ex causâ frigida egregiè facit.

N. Multum olei fundit.

R.

CCCXCVIII. Resina Terebinthi
J. Terebinthina Cypria.

Terebinthina in officinis Resina est liquidiuscula, referens balsamum sive oleum crassiusculum, colore ex albo flavescens, sapore acris, lenta, cutique tenaciter adhærens. Estque duplicis generis. Resina scilicet Terebinthi & Resina Laricis. Resina Terebinthi *intimè requiruntur*. Resina Terebinthina (Avicennæ gluten Albotin) est ea quam Officinæ Terebinthinam Cypriam Venetam, Paracelsus Lorchet appellat. Terebinthina Resina. Math. Ter. vera. C. B. I.

Optima censetur clara, pellucida alba, vitrei coloris in cæruleum vergentis, acris & odorata. Præfertur item quæ ex Chio Insula affertur, post hanc Lybica, tum Pontica; tandem Cypria, Syriaca, Judaica, Arabica, Terebinthus arbor est mediocris magnitudinis, in plurimis regionibus sponte familiaris, v. g. in Hispania, Syria, Sicilia, &c.

N. Terebinthinam veram officinis esse ignotam autumat Clusius, officinalem.

Ddd ddd

lemq.

lemque esse resnam abiegnam è novellis abietibus collectam. Vide sis class. 1. in abiete.

Vires. Facultates Terebinthina ex lib. 2. sub titulo de Resinis huc referre licet. Excellit enim Terebinthina præ reliquis Resinis, unde & facultatibus præpollet. Conferit intrinsecus præcipue in tussi aliisque pulmonum affectibus (cum melle,) in urina ac alvo cienda: convenit Epatici, Lienis, Renibus, Vesicae, expectorationi purulenta ac phthisi incipienti succurrit, calculum pellit, arthriticos affectus juvat, iterum à saburra liberat. Extrinsecus usitatior est terebinthina laricea, quæ hujus vicaria in defectu esse potest, viribus iisdem pollens, sed imbecillioribus.

N. 1. Lavari solet in aqua appropriata, & hinc exhiberi.

N. 2. Exhiberi potest 1. per se, placentalis quas oblatas vocant, involuta. 2. In aqueo liquore, adjecto tantillo Vitelliovi, sic laqueum scilicet exhibet liquorem. 3. In spissata aliquantulum & in pilulas redacta. Verum ob evanescentiam spiritus præstant modi priores, vel si placet, formantur modo sequenti.

Pilula de Terebinthina cum Rhab.

Pilula Podagrica.

Rx. Terebinth. Cypr. ʒj. coq. in ∇ chamæpyt. dum albescat. hinc adde Rhab. opt. pulv. ʒvj.

Iv. arthritic.

Succin. alb. ana ʒij.

Glycyrrhiz. ʒj.

M. & F. Massa.

Vires. Faciunt ad removendam materiam calculi & podagra.

Dosis ʒß. ad ʒj. & c. Cl. Greg. Horst. part. 1. lib. observ.

N. Crato easdem habet, sed paulo secus, cons. 143.

CCCCXCIX. Resina Laricis, s. Terebinthina vulgaris.

Resina Laricis est, quam Terebinthinam vulgarem, seu Terebinthinam simpliciter ita dictam, vocant. Hæc quantò Terebinthinæ priori similior, tantò quoque præstantior æstimatur, adeoque optima, quæ purissima, odoratissima, aliquantum translucida, & quæ in intincto digito contumaciter & æqualiter diffluit.

Vires. Calfac. emollit abstergit. Usus præcipuus, intrinsecus in pulmonibus expurgandis, in Gonorrhæa sistenda (cum ∇ plantag. ac succino,) urinam ac alvum ciat. Extrinsecus Chirurgis usitatissima est, fereque in Emplastris omnibus adhibetur, movet enim pus, maturat, scabiei cutis medetur.

N. Sunt qui Terebinthinam, in cerevisia infundunt atque simul defervere sinunt, pro potu ordinario in præsertione calculi, viscerumque obstructionibus.

PRÆPAR.

Ex Terebinthina sola vulgari fieri solent.

solent, ad quem modum tamen & reliqua tractari poterunt.

Suntque 1. Spiritus Terebinthina.

2. Oleum Terebinthina.

3. Balsamus Terebinthina.

Horum preparationes.
Videl. 2. de oleis.

N. Oleum ac Balsamus raro seorsim crebro conjunctim extant.

4. Colophonia.

Vires. Spiritus calfacit, siccatur, attenuat, urinam ciet, tartaream mucilaginem resolvit. Hinc confert in tussi, aliisque Pulmonum affectibus tartareis, in Lienis & uteri obstructione, in calculo Renum & Vesicae, in stranguria, gonorrhoea virulenta, ulceribus pene ex lue venerea.

Dosis à gr. iij. ad vj. & ultra.

N. Urina odorem Violaceum conciliat.

Balsamus calfacit, attenuat, mundificat, consolidat. Hinc adhibetur feliciter membris frigore rigidis, tumoribus scirrhis, vulneribus inveteratis ac putridis, gangrana, fissuris pedum à frigore oriundis (pernionibus) quas efficaciter curare creditur.

N. Conrad Runrath commendat summè spiritum Terebinth. mellitum, cujus guttulas 4. 5. 6. in liquore convenienti quotidie exhibet ad calculum Renum & Vesicae atterendum. Parat ex mellis puri part. 2. & Terebinth. p. 1. mixtis exactè, & per Ret. vel XX destillatis,

5. Oleum caeruleum Terebinth.

Fit S. S. S. in Vesica cupreâ ex scobe radicum pinguium abietinarum cum flore chamom. affusâ aq. q. s. fermententur per dies aliquot, donec Tereb. abieti inhaerens tincturam Quis ad se attraxerit, quam in olei ejus prolestatione secum in XX rapit, sibi per omnia miscet. Est vulnerarium incomparabile, si Thurnheusero creditur.

6. Tinctura Therebinth.

Evaporet ol. flavum illius leniter in scutella, dum restet Colophonia rubentissima, è qua tincturâ cum V trahitur, eoque remoto balsamus relinquitur quo renes inunguntur in doloribus Nephrit.

7. Sal volatile Thereb. purgans.

Describ. in Myroht. Fabri.

8. Pilula de Therebinthina cum Rhabarb.

℞. Therebinth. cypr. ℥j.

Coq. in aq. chamæpytis dum albefcat.

Hinc adde Rhabarb. opt. pulv. ℥vj.

Ivæ arthetice.

Succin. alb. ana ℥ij.

Extr. Glycyrrhiz. ℥j.

M. F. Massa.

N. Crato aliquot hujusmodi descriptiones exhibet, atque Rhabarbarum in minori quantitate immiscet.

Vires. Commendantur in praeservatione arthritidis, calculi, &c. Assumuntur singulis trimestribus, &c.

Dddddd 2

Dof.

Dosis ad ʒj.

Greg. Horst. lib. 1. observ.

S.

CCCC. Saccharum.

Σάκχαρ, σάκχαρον, μέλι κολάμινον ἀλε
Indin, Sacchar, Saccharum, Zuccha-
rum, Zacchar, Zaccharum, Succha-
rum, mel Harundinaceum, mel Can-
na. Arabib. Zazar, Sudur, Sutter, Ger-
man. Zucker. Vid. Maubiol.

Succus est plantæ cujusdam arundi-
naceæ, non solum in India, sed in mul-
tis Asiæ & Africæ locis, quin imo & in
Europæ quibusdam Regionibus ver-
naculæ.

Exhibet autem Saccharum, par-
tim incisione Trunci, unde Saccha-
rum instar Lachrymæ extillat, quod
rarum est, partim elixatione potissi-
mum medullæ ac radicis, donec f. sac-
charum in fundo instar salis concre-
verit.

Planta illa saccharifera inscribitur
Arundo saccharifera, C. B. 2. scil. inter
arundines Indicas. Arundo sacchara-
ta, Dalech. in D. Arundo saccharina
Indica, Lob. Ar. & Calamus Saccha-
rinus, Lob.

N. Sunt qui saccharum Veteribus
incognitum fuisse statuunt, sed falsò.
Mentionem enim sacchari faciunt
sed nomine mellis in cannis concreti,
mellis arundinacei, Galen. 8. Meth.
& 7. simpl. Dioscor. l. c. c. 75. Hinc
Paulus Ægineta, l. 7. c. 3. Salem In-
dicum vocare videtur, quod interdum si-

perveniente Solis calore induretur &
concretum Salis effigiem referat. His 3.
ad stipulatur Plinius l. 14. c. 18. Sic &
Avicenna Fen. 1. Can. 4. tetr. 2. c. 23.
Salem scil. appellat, qui ex India adve-
ctus, colore sal, dulcedine mel represen-
tet.

Denominationes sacchari sumuntur
tam à locis, unde plerunque asporta-
tur, tum ab elaboratione, qua depura-
tur, Officinis que communicatur.

A loco natali dicitur 1. Saccharum
Madariense, vel Mederense, à Mede-
ra Insula. 2. Saccharum Canariense,
Canarium: à Canariis Insulis. 3. S.
Thomasinum seu Thomæum, ab In-
sula S. Thomæ. 4. Saccharum Mal-
tanum, Melisum, sive Melitheum, Ci-
bale, à Maltha, seu Melitha Insula. Sic
dicitur & 5. Valentinum à loco refi-
nationis, qua Valentia Hispaniæ cele-
bris est.

N. Madera, Canaria S. Thomæ Insu-
la, sunt Insula in Atlantico mari sitæ,
Africaque vicina.

Ratione elaborationis, saccharum,
vel est non finum, vel refinatum, seu
finum, vel Candifatum, vulgo saccha-
rum Candi seu Candum. Non finum
quod solâ coctione in ∇ depuratum
est, adfertur ad nos partim in Pyra-
midales metas fustum, partim in for-
mam pulveris ac grumorum crassio-
rum redactum. Non finum in pulve-
re Materialistis Cassonada vel Casto-
nada vocari solet, forsan à Cistis qui-
bus inclusum ad nos advehitur, Cista
enim

enim Germanis inferioribus Rastapellatur. Aliis saccharum miscellaneum, quod ex diversis saccharis commisceatur. Estque hoc saccharum tum minus excoctum, tum quoque minus purgatum, unde & minus candidum, quippe quo magis depuratur, eo magis albescit. Hinc diversi coloris exhibetur, album, gryseum, pallido-citrinum, citrinum purpureo-nigricans, &c.

Non finum in metis, est pulveratum illud saccharum, ulteriori coctione in ∇ excoctum, despumatione (citra refinationem) clarificatum, in formulas pyramidales usitatas effusum, quâ ratione à sordibus feculentis per foraminula formularum illarum destillantibus sequestratur.

Refinatum seu finum est, quod lixivio (ex calce viva cum ∇ facta) solutum, excoctum, despumatum, & postmodum inspissatum, inque formulas effusum est, inferiori parte perforatas, ut feculentus glutinosus succus defluat.

Saccharum candisatum, vulgo saccharum candi s. candum, saccharum candium, saccharum crystallinum, saccharum lucidum, Germ. **Zucker Candis.** Est saccharum depuratum, candisando in crystallinam formam s. a. reductum, ad modum quo falia crystallari diximus. Atque album vel rubrum: album fit ex Canariensi; rubrum ex Tomasio.

Delectus 1. Ex loco natali optimum

habetur Mederiente, hinc Canariense, tertium locum sibi Melisium vendicat, ultimum Tomasium. 2. Ex colore, purius æstimatur album, hinc gryseum & denique rubrum.

N. *De Saccharo refinato, utrum non refinato præstet, dubium movetur. Negativam habet Tabernmontanus, Herbar. l. 1. c. 41. Affirmativam tuetur Angelus Sala in sua Saccharologia, l. 1. c. 4. Verum malle ex Scopo rem decidere, quo refinatum, quia aliquantulum acrius est, præstat in attenuatione, incisione, absterfione; non refinatum in lenitione, lavigatione, adeoque in pulmonum vitiis, &c.*

PRÆPARATA.

1. *Saccharum Penidium.* Hoc fit \mathcal{R} . saccharum q. v. dissolve & clarifica per alb. ovi. Hinc cola ac inspissa lente, donec bullæ magnæ apparuerint. Hinc retrahe ad Δ , ut bullæ resideant, effundeque in tabulam oleo amygd. illitam atque ubi non nihil induruerit, de unco suspende, manibus celeribus (amylol conspersis) distrahe in formam debitam ac repone.

2. *Saccharum rosatum.* Fit ex sacchar. in succ. ros. soluto.

3. *Saccharum Violatum.* Fit eodem modo cum succo violar.

4. *Aqua seu spiritus acidulus.* \mathcal{R} . Sacchari (lbij.) destilla ex cucurbita vitrea sat alta & ampla (quippe facile in altum attollitur,) Δ arenæ per gradus (NB. vel Retortam adhibere poteris,) fit extillat aqua acidula,

D d d d d 3

cum

cum oleo supernatante: Rectifica **V**bi placet, oleumque à spiritu separata.

Vires. Spiritum hunc in dissolutione lapidum, aliorumque crustaceorum adhibere licet, & est instar spiritus Guajaci.

5. Oleum. Ex prioribus patet.

6. Sal. Ex relicto capite mortuo, ulterius incinerato elixiviat.

7. Liquor seu Syrupus. **R.** Sacchar. cand. q.v. affunde **V** ad eminen. digit. 1. accendatur, efflagretque ad consistentiam syrupi.

Vires. Prodest in tussi, aliisque affectibus pulmonum, incisione ac levigatione opus habentibus.

N. Liquor hic apud vulgum usitatissimus est, magna que astimationis.

8. Lignor alius. Inde Saccharum candidum albumini ovi cocti ad duritiem, repone ad liquefendum.

Vires. Exhibetur ad tussim & asperitatem gutturis infantum. Extrinsecus confert oculorum rubedini.

9. Essentia & crystalli Sacchari.

Essentiam & crystallos Sacchari paravi, ut reperies publicarum centur. 3. artic. 20. Keslerii. Addidi autem pastæ & sacch. & Acet. destill. factæ cochleare unum ac alterum ol. Tartari, materiam relinquo in digestionem cinerum per 24. horas, postea pro **℥j.** sacch. affundo **V** non rectif. mens. **℞.** digeratur denuò, habebis Tincturam corroborantem.

Dof. cochl. ij. Sam. Cloff.

CCCCI. Sagapenum.

Σαγαπέννον, Diosc. Sagapenum Saponium, Offic. Serapinum, Matth. Cord. hist. Cas. Sirap. n. s. aff. Est lachryma seu Gummi arboris cujusdam ferulaceæ, ejusdem cum succo nominis, ex qua lauciata educitur.

Nascitur in media Regione, unde Alexandriam, ac hinc Venetias atque in alia Europæa loca transportatur.

Optimum censetur syncerum translucentum, foris colore fulvo vel ruffo intus albedo, gustu acre, odore gravi, porumque æmulans.

Vires. Calf. 3. sicc. 2. attenuat, aperit, substantia est tenuis: tanta extrahendi vi pollere dicitur, ut quoque spicula ex carne eliciat: purgat lentos & crassos, imò & serosos humores ex ventriculo, intestinis, utero, renibus, cerebro nervis, juncturis, pectore. Hinc prodest in hydrope, tussi inveterata, asthma, cephalalgia, spasma, epilepsia, paralyti, tremore artuum, in obstructione & tumore splenis, febribus intermittit, dolore colico, menses ciet, (sed factum enecat) urinam movet, Extrinsecus convenit in pleurisi, aliisque tumoribus ac doloribus, mitigatione ac resolutione opus habentibus. Fumus excitat Epilepticos, hordeola Ciliorum sanat.

Dosis à ʒss. ad ʒj.

N. 1. Ventriculo ac Epati quia non adeo familiare est, corrigitur tertia parte Mastiches, Cinamom, Zinzber, &c.

PRÆ-

PRÆPAR.

1. *Sagapenum depuratum*. Fit ut depuratum ammoniacum.

2. *Pilula de Sagapeno*. Vide Dispens. August. & Cordi.

3. *de Sagapeno Camilli*. Vide sis apud Quercet. & supra l. 2.

4. *fœtida*. Vide Disp. Aug. & c.

5. *Oleum stillar.* Fieri poterit ut ol. Gum. Ammoniac. per XX in Arena.

CCCCII. Sanguis Draconis.

Αἷμα Ὠρακόνιον, Dioscor. Sanguis Draconis est Lachryma arboris cujusdam, instar sanguinis exiccati, concreta. Solvitur quidem in ∇ , quam lacteam quasi reddit, sed sine mixtione, quippe refrigerata ∇ subsidet iterum, parietibusque vasis adhærescit. Videatur Cord. hist. Matth. Clus. Acoſta, C.B. 7. (inter Gummi) *Drachenblut*.

Advehitur ex novi Orbis Insula, cui nomen Portus sanctus, ubi partim sponte, partim vulnere caudici illato, profluit, arboris illius fructus cerasis similes sunt, detractâq; pelle dracunculum exactissimè repræsentant, unde & nomen lachrymæ succo huic impositum est.

N. Sunt qui Dioscoridis cinnabarim esse velint.

Vires. Refrigerat (aliis caliditate & frigidityate temperatus est,) exiccât strenuè, astringit, repellit. Usus ejus est præcipuus internsecus in exiccandis cataractis, (impositus capiti) in hamorrhagia

sistenda, vulneribus glutinandis, dentibus laxis stabilendis.

N. Umbilico impositus quoque dysenteria prodesse dicitur.

PRÆPAR.

Nulla inde prostant, depurari tamen potest, si in aqua decoquatur, à fecibus decanetur, & denuo inspissetur.

CCCCIII. Sarcocolla.

Σαρκοκόλλα, est lachryma gummea in granulis, mannæ seu pollini Thuris similis, colore subruffa, (vel flava) sapore amara, dulcedinemque (Glyzyrrhizæ æmulam,) post se relinquentem. Profluit ex arbore quadam exotica, spinosa ac nodosa, ejusdem cum lachryma nominis, quæ tùm sponte, tùm sauciata lachrymam illam profundit. Videatur Matth. Cord. in D. & hist. Cas.

Eligenda recens, coloris ad pallorem vergentis (vetusta enim rubescit,) saporis amari, substantiæ porosæ, viscosæ, glutinosæ, & quasi spumosæ, facilisque in ∇ solutionis, &c.

Vires. Calfac. & sicc. 1. astringit, consolidat, glutinat, coquit, maturat. Usus præcipui in vulneribus extergendis consolidandis, cicatrice obducendis, unde & nomen adepta est, &c. Mirificè prodest, & in oculorum fluxionibus, albugine, nubeculis, (maceratur in lacte asinino vel humano & (s.) postea cum ∇ Rosar. mixta, ciliis imponitur, addito si libet tantillo sacchari,) in hamorrhagia narium, (anacollematis immiscetur.

N. Sunt

N. Sunt qui propinant purgandi gratia, crassosque & viscosos humores ex partibus diffusis, e.g. ab articulis, pulmonibus illa retrahi scriptitant.

Dosis ʒj. corrigenda est, ut sagapenū.

PRÆPAR.

Pilula de Sarcocolla compos. Vide Dispens. August.

CCCCIV. Succolata.

Succolata est massa in placentas sat crassas formata, rubra saturatè, friabilis, sine odore, non absimilis sanguini Draconis, præterquam sit, coloris lucidioris.

Dicitur chucalate, Chocolate, *Lin. scotus part. 9 l. 4. c. 22. Ind. Occid. Cacaoate, Benzoin. part. 5. l. 2. c. 16. & 17. Ind. Occ. Clus. exot. l. 2. c. 28.*

Fructus ex quibus Chocolate conficitur, dicitur Cacao, *Clus. Tab.* Amygdalis similis fructus Guatimalensis s. Avellana Mexiocana, *C. B. 6. Jacao, Bertio, Mercatoria in Hispaniola.*

Fructus hic arboreus filiquis inclusus, amygdalarum speciem refert colore fuscus. Adfertur copiosus ex Guatimala, adhibeturq; loco monetæ, pauperibusque eleemosyna datur. Parant ex hoc tum potum Indis vulgarem, tum massam hanc chocolaten dictam & potius hoc nomine venit) quæ sit ex dictis granis contusis, & cum aromatibus mixtis.

N. Primus honor debetur ei quæ in America paratur, posterior, quæ in Hispania ex granis adveclis conficitur, vestustate paulatim vilescit.

Vires. Conferre dicitur ventriculo frigido, pectori adeoque tussi, purulentoq; inprimis sreatui, vertigini. Quin & commendatur summè ad roborandum vita Balsamum, Veneremque proritandam.

Ufus est, ut manè cum saccharo in vino vel cerevisia calida diluta absorbeatur.

Dosis ʒij. ad ʒß. & ultra.

N. Fructus huius participem me fecit, *Joh. Petrus Materialista huius Reip. celeberrimus.*

CCCCVI. Styrax seu Storax calamita.

Στύραξ, Styrax, duplicis generis in Officinis prostat, siccus & liquidus.

Siccus Officinis Storax calamita, (à Cannarum calamis sic dicta, in quibus olim ex Pamphilia apportabatur,) est arboris cujusdam gummeus, resinosusque succus concretus, aridus, odoris suavissimi, videatur *Matth. Cord. hist.*

Crescit arbor illa Storaciflua, in Syria, Silicia, Pamphilia.

Præfertur Styrax pinguis, lentus, fragmentis albicantibus rufescens, vel flavus odore perseveranti, qui dum mollietur, melleum liquorem reddit. Improbatur furfurosus, niger, cano situ obductis, inodorus.

Vires. Calfacit, exiccat, emollit, concoquit, Cephalicus inprimis est & nervinus: medetur tussi, catharris, rancidini, gravedini, vulva præclusa, duritie vel la-

vè laboranti, extra & intra datus conuenit: immiscetur cardiacis & latificantibus, alvum leniter mollit, si cum Terebinthina in forma catapotij assumatur.

Extrinsecus suffitu capiti adhibetur.

PRÆPAR.

1. Oleum stillat. Fit si Styrax cum ▽ Rosarum digeratur, postmodum in Fre ex XX getur, primum Δe leni, dein, quando ☉ stillare incipit, fortiori.

Vires. Iudem confert, quibus Styrax sed maiori efficacia: gutta auribus instillata sibilum discutit.

2. Oleum coctum. Vide August.

N. Occurrunt descriptiones medicamentorum in quibus & Storax calamita & rubea distinctum prescribuntur; nisi sunt Diacastoreum Nicolai, Trochisci A-lipta moscata. In his igitur quid per Styracem calamitam à rubea distinctam intellectum velit Nicolaus, diverse sunt opinioniones: Sunt qui Thymiana per Styracem rubeam innui volunt, ut Fuchf. in composit. Medic. & Bauhinus in Pinac. Alij Styracem optimam, quæ in grana confluit, ut Augustani & Cordus. Alij Styracem vetustate rubefactam. Verum enim verò cum in prescriptionibus optima quæq; eligenda sint, adeoq; & Styrax in grana recipiendus, ubi calamita styracis fit mentio, per rubram aliud quid intelligere utiq; oportet.

CCCCVI. Styrax liquidus.

Est Liqueor pinguis, instar Balsami crassus, graveolens.

N. De Styrace liquido, magna inter Authores dissensio. Aliis videlicet nihil aliud est, quam statle, i. e. myrrha colamen. [a] Alij factitium quid ex Styrace calamita in oleo ac vino soluta admistaq; resina laricea, excocta, [b] qua decoctio ubi refrigerit, Styrax liquidus ad fundum secedere dicitur, ad superficiem mittens oleosam substantiam liquidiores, (alijs expressu idem moluntur.) Serapioni Styrax liquidus, est oleum ex nucleis arboris storacis lue expressum, ac cortex, fructus, ex quo oleum expressum est, Styrax sicca eadem dicitur. Avicenna Styrax humidus fit per decoctionem corticis, estque colore nigro. Fex remanens eadem Styrax sicca dicitur, lib. 6. cap. 32. Dioscorides oleum styracinum appellat, quod ait componi in Syria ex Styrace. De hoc refert quod calfaciat vehementer & emolliat, verum caput dolore afficiat gravetque, & saporem adferat. Quæ facultates in Styrace liquidoprehenduntur.

a] Matth. in Diosc. lib. 1. c. 26. Bauhin. Pinac. lib. 12. sect. 6.

b] Fuchf. de comp. med. l. 1. c. 11.

T.

CCCCVII. Tacamahaca.

Resina est, ex iis, qui ex nova Hispania non ita pridem adferri cœperunt. Colligitur ex vulnerata arbore instar populi procera, admodum odorata, cujus fructus ruber est, Pœoniæ semen æmulans. Resina autem colore accedit ad Galbanum, unguibus Ecce ecc

est

est albis, ut ammoniacum, odorem ac saporem gravem refert, cutiq; tenaciter adhærescit. *Vid. Frag. Monard. & Indiæ Occid. part. 9. l. 4. c. 9.*

Vires. Calfac. in princip. 3. sicc. 2. valida astrictiōis particeps, digerit, resolvit, maturat, tumores emollit, dolores ac flatūs discutit: uterina imprimis est, nervina ac cephalica. Usus præcipue externus est. Prunis injecta naribusque admota, mulieres uteri suffocatione laborantes illico liberat. Umbilico Emplastri modo imposita uterum suo loco retinet (usu familiarissimo.) Ventriculus roborat, defluxiones quascunque è capite defluentes reprimat, (lenteo excepta, & post aurem alteram saltem vel utramque applicata, sufflueve attracta.) Temporibus adhibita (cerati modo) defluxiones in oculos aut alias faciei partes revellit, dolorem dentium sedat, (dentibus etiam corruptis indita:) abdomini Emplastri inserta imposita uteri fluxum cohibet: magna est efficacia in doloribus articulorum (coxendicis) juncturarum ac nervorum vulneribus imposita eadem curat, nimirum statim suppurare facit, & spasmus prohibet. Monardes.

N. 1. Adeo celebris est apud Indos, ut ad qualemcunque dolorem adhibeatur, nec aliud remedium norint, modo non adsint inflammationes admodum calida.

N. 2. Inveteratos cruris dolores Tacamahaca Emplastri loco imposita curatos vidi.

PRÆPARATA.

Empl. Stomachicum, Vide l. 2.

CCCCVIII. De Tartaro.

Tartarus in Medicina pathologica est res naturæ lapidescentis, i. e. in lapides coagulati apta, vel jam demum coagulata: potissimum tamen viscosam ac lentam mucilaginem denotat, quæ nondum in duritiem lapidis conversa est. Hinc deducitur quoque ad officinam, denotatque sal terrestre ex vegetabilibus certis, vel per se, vel artificio separatum.

N. De Tartari origine non possum quin animi sensa communicem: Rerum principia primitus indigesta sunt, ac veluti, in choatica sua dispositione simplicia: hinc subinde cum maturitate in partes secernuntur crassiores & subtiliores. Crassiores ad elementalem vergunt statim, scil. aqueo terrenum: Subtiliores & potiores & exaltantur subinde sen (ut dicitur,) spiritualisantur, i. e. in statum spiritus evehuntur. Ha ergo ubi ad statum deducta fuerint summum, quem natura intendit, exhibent spiritualement partem, sin minus eadem sint digesta, vel cum tempore retrogressa ad statum crudiores exhibent Tartarum, constantem scil. ex partibus potioribus aqua, terra & salis, adeoque Tartarus pollet viribus insignibus, spiritus vires amulantes.

PRÆPARATA.

Præparationes Tart. sunt 1. Depuratio, 2. Destillatio, 3. Salfificatio.

I. DE-

I. DEPURATIO.

Depuratio vel fit à sordibus externis, vel parte magis arenosa ac minus solubili: illa lotionem peragitur, hæc solutione ac coagulationibus.

Lotio seu ablutio: unde *Tart. lotus*.

℞. *Tart.* tritum ac cribratum, q. v. affunde ∇ fontanam, calidam (vel lixivium forte, e. g. ex cineribus clavellat.) agitaque optimè, hinc sine residere ac refrigerescere, postea decanta aquam una cum impuritatibus, idque repete aliquoties, donec *Tart.* sit instar arenæ.

N. Si lixivium adhibueris, edulcorare *Tart.* oportet.

Solutio & coagulatio, unde

1. *Sulphur. depuratus, Acidum Tart. Cremor & Crystalli Tart.*

℞. *Tartari* optimè loti, q. v. affunde ∇ æ ferventis bonam quantitatem, agita spatulâ ligneâ, & solverur particula *Tartari*, cola per manicam *Hippocrati*. dum adhuc calet aliàs coagulaturs rursus, quod solutum erat: restanti *Tartaro* affunde aliam ∇ m ferventem, agita & cola, idque reitera tantisper, donec nil nisi arena irrefolubilis restet. ∇ s has *Tartaro* imprægnatas repone ut refrigerant, & videbis *Tartar.* purum, partim supernatare instar cuticulæ, partim instar crystallorum vel ad fundum residere, vel parietibus ac bacillis immixtis adherere (utrumq; cuticulam scil. & crystallos collige, exicca atque serva.

N. 1. Si nimia ∇ æ quantitas coagu-

lationem impiedierit, evaporare aliquantulum sine.

N. 2. Sunt qui cuticulam supernatantem seorsim colligunt (nomine cremoris *Tart.*) & crystallos itidem seorsim (titulo crystallorum *Tart.*) verum cum utrumq; ejusdem sit natura & efficacia, distinctionem hanc parvi momenti autumo.

N. 3. *Felicus* adhærescens crystalli vasis ligneo.

N. 4. Si depuratum hoc *Tart.* haud satis candidum sit, solve iterum in ∇ fervente, filtra & repone ut ante, ad coagulandum.

Vires. Usus hujus *Tartar. depurati* est crassos tartareosque humores præcipuè autem in primâ ventris regione stabant incidere ac attenuare: commodè itaque adhibetur in obstructione Epatis, Lienis, Mesenterii, Renum, in affectu Hypochondriaco, &c. Hinc quoque sibi primas vindicat inter Digesta universalia, cujus rei gratia & catartæcis premitti plerumque solet. Quinimo ad laxandam alvum commodissimum medicamentum est, si saltem grano uno ac altero *Diagridii* vel *Gummi de Gamandra* acuatur.

Dosis à ʒss. ad ʒj. vel ʒij.

2. *Crystalli Tart. chalybeati Acidum Tart. chalybeatum Salæ.*

℞. *Acidi Tart.* ʒiiij. *Magister. chalyb.* i. e. crystall. σ per spir. Θ . (Vide in σ) ʒij.

*Crystall*os σ solve in ∇ fumar. solutionem incorpora cum acido *Tartari* in mortario lapideo. Exicca iterum

Eccccc 2

rum ac pulverisa: aromatisetur aliquot guttis ol. Cinamomi.

Vires. Utilissimum medicamentum est in morbis chronicis, ut sunt obstrutio Lienis, quartana, icterus uterque, cachexia virginum, hypochondriaca passio.

Dosis à ℥j. ad ℥ij.

3. *Cremor Tartari chalybeatus compendiosior S. Closs.*

Ubi ∇ imprægnata Tartari pulverisat. ℥j. solvitur in ℔xv. aq. fluvial. per ebullitionem fuerit resoluta, & ad decidentiam unius quartæ evaporata, injice in vas ℥iiij. limat. & tis moxque ab ∆ remove ad cola calidè. Habebis cremorem prætiosum & summè deopilativum.

N. Injiciatur limatura dum ∇ fervet nec diu relinquatur, ne cremor reddatur vomitorius.

II. DESTILLATIO unde

1. Spiritus ac oleum.

℞. Tartari albi crudiloti (vel quod melius depurati,) q. v. destilla ex Retort. vitrea in arena (vel igne nudo) ∇ e gradatim adhibito: primò extillat phlegma, dein spiritus in forma nebulae & tertio oleum pingue. Separa oleum à spiritu, vel beneficio chartæ ac filtrationis, vel tritorii gossypiive auxilio.

N. Sunt qui spiritum Tartari ternâ vice supra colchoiar rectificent.

Rectificatio spiritus Tartari. Destilla ex MB tertiâ vel quartâ vice semper vasæ distillationi inservientia optimè lixivio forti eluendo.

Rectificatio ol. Tartari. Affunde quantitatem magnam ∇ (vel Acet. destill. ac destilla per MB separa oleum ab ∇ ut moris, idque rectifica ∇ m scil. fragrantem aliquam addendo ac denuo destillando.

N. Ex residuo capite mortuo extrahi potest sal. Vide suo loco.

Vires. Spiritus vim habet, incidendi, attenuandi, resolvendi, discutiendi. Hinc referat obstructions viscerum, purgatque per sudorem ac urinam, ideoque nilius adhibetur in Hydrope, Tympanitide, Arthritide, Paralyti, Scorbuto, lue venerea, impetiginibus, scabie, contractura artuum (ex materia flatulenta & humoralis fluida, non Tartarea coagulata & fixa.)

Dosis à ℥j. ad ℥ij.

Oleum intrinsecus adhibitum prodesse creditur adversus dolorem colicum, suffocationem uterinam, &c.

Dosis gr. iij. iiij.

Extrinssecus. admisceri potest unguentis contra scabiem communem vel luis venereæ, &c. Vide Crollium, Sennert. in Institut. Salam. in Tartarologia.

N. Spiritum Tartari ex musto parat Forsterus p. 1000. de morb. Tartar. collectis scil. crysallis evaporatione lentâ, in quibus spiritum Tartari primateriale remanere credit.

2. Spiritus Tartari compositus.

℞. Tartar. purum, destilla ut moris, prodeatque phlegma spiritus ac oleum. Ex capite mortuo extrahere Sal com. quod

quod solutionibus ac coagulationibus purificatum conjunge cum phlegmate spiritu ac oleo: Hinc digere in MB vase clauso, donec Sal com. totus solutus sit, cum hoc liquore impasta argillam siccam, formaque globulos & destilla ex Retorta, igne nudo (ut destillatur spiritus Sal nitri,) prodibit cum spiritu & oleo, Sal totus spiritualiter in posterum à spiritu Tartari inseparabilis: Oleum foetens separa à spiritu, ut moris.

Vires. Penetrantior & efficacior est priori.

3. Spiritus Tartari *Q*latus seu spiritus Tartari aperitivus compositus.

℞. Spir. Tartari (simplicis) ℥vj. V ℥iij. Misce & affunde colchotari: digere in MB (℥ 8.) ac destilla per Retort. adhibitis ignis gradibus omnibus. Totum deinceps quod prodit funde super caput mortuum nigrum Tartari, ex quo nimirum spiritus ille simplex est prolectus. Digere 8 24. Tincturam decanta, residuum calcina ad albedinem, atque ex eodem extrahe Sal cum Tinctura illa decantata, in calido S. (hor. 24.) relinquendo: Vm hanc per filterum purifica.

Vires. Exhibetur magno cum successu ad contumaces obstructions viscerum, ad fædos colores, febres diurnas. Hydropem.

Dosis à ℥j. ad ℥ij. in aquis appropriatis.

Spiritus Tartari Philosophicus ad aurum potabile, S. Closs.

Reverberetur Sal Tartari super testâ probatoriâ (in einer flachen Scherben/) absque fusione tamen, per horas 24. ita cæruleum evadet sal, affunde Acet. destill. quousque tumultuet amplius, & Acet. destill. 3. digitos super materiam emineat, digere tingeretur Acet. destill. saturato rubore filtra & coagula. Hoc quater cum novo Acet. destill. repete. Permixtis his 4. salibus V rectif. suffunde & tincturam extrahe toties, dum colorari desinat, sal. restant. solve iterum in Acet. destill. iterumque cum V attrahe tincturam. Jam omnes V tinctos, & in unum collectos, & per MB in cucurb. cui XX infundibulo instructus imponatur, extillatum V re affunde per infund. sal. tincto & cohobato toties (14. vicibus ad minus) donec videas guttas rubentes decidere, tum cessa, & liquorem ex Arena per O leniter & a, ita transibit spiritus salis Tartari, nebulosis cum guttis rubris, superstitute infundo O pulv. rubro. Illo utere ad extractionem O is.

Vires. In obstructione mesenterii, & arthritide, dantur gutt. 4. 6. in vino, in retentione mensium, si dosi ter aut quater iteretur, certo fluent menses.

III. SALIFICATIO unde

1. Sal. Tartari.

Sal Tartari elixiatur ex Tartaro ad albedinem calcinato, (i.e. combusto,) non secus ac ex aliis cineribus. Sal extrahi solet.

N. 1. Ex capite mortuo in destillatione spiritus residuo, iidem Sal elixiari potest.

Eeeee 3

potest, si ulterius comburatur. Promptè enim ignem concipit, atque etiam extra ignem comburi potest.

N. 2. Communiter calcinatur Tart. in fornace figulina.

2. Ol. Tart. p. d.

Pone Tart. calcinatum in cella ad liquefcendum, vel dissolve Tart. calcinatum in ∇ communi, filtra & coagula.

Vires. Optimum est remedium in serpiginebus, ulceribus, zinea, scabie, &c.

N. Est porro hujus olei elegans usus in Extractis vegetabilium purgantium consciendis. Ejus enim gutta aliquot cum menstruo mixta, tum extractionem faciunt tum catharsin ipsam promouent.

3. Magisterium Tart. seu Sal. vit. Tart. alcoholisatus.

Impræгна Sal com. Tart. Sale volatili Vini, v. g. \mathcal{R} . Salis Tart. purissimi, q. v. affunde ∇ ad eminent. digit. i. digere ac destilla lenissimo calore, iterumque ∇ affunde, idque repete toties, donec Sal Tart. totam spirituosam Vini substantiam, seu omne Sal volatile Vini imbibit, quod ubi factum, sublima, habebisque sal vini sublimatione ab omni phlegmate & aquositate separatum. Sennert. in Institut.

4. Magisterium Tartari purgans.

\mathcal{R} . Sal com. Tart. q. v. impræгна aceto optimo, donec Tart. nihil amplius

aciditatis retinere velit (vide correctionem flor. \mathcal{G} ij. Crollianam l. 3.) dein affunde ∇ , cumque abstrahe aliquoties cohobando: tandem repone Tart. ad liquefcendum & habebis oleum rubrum.

Vires. Purgat per inferiora, utile in omnibus morbis deploratis.

Dosis à gr. v. ad \mathcal{D} ß.

N. Sal illud Tart. Acet. destill. sufficienter imprægnatum si in ∇ destill. (e. g. Borraginis) solutum atque s. a. crystallisatum sit, conveniens medicamentum evadit in morbis Tartareis.

5. Tinctura seu Sulph. Tartari.

\mathcal{R} . Sal Tart. optimè purificatum, calcina igne violentiss. ad cæritatem: dein affunde ∇ , extrahe rubedinem s. a. decanta, abstrahe ad consistentiam olei. Sic habes Tincturam Tart. quam si placet exaltare, digere aliquamdiu cum ∇ recenti ad emin. dig. i. affuso.

N. 1. Sunt qui ex Tart. cum Sal. com. an. calcinato Tincturam hanc extrahunt, sed prævalet modus prior.

N. 2. Maxima pars Tart. decedit.

Vires Urinam largiter ciet, confertq. in Melancholia hypochondriaca, Scorbuto, Hydrope, aliisq. Mesenterii ac Lienis morbis & obstructionibus.

Dosis gutt. aliquot 4. 3. 6. 7. 8.

6. Tart. ϕ -latus.

\mathcal{R} . Ol. purissimi per deliq. \mathcal{Z} ijij. affunde guttatim Spir. ϕ . \mathcal{Z} ij. vel q. s. donec strepitus cesserit, idque in vitro capaci: sic fiet coagulum: sedarâ ebull-

ebullitione evaporare sine humiditate lento calore ad siccitatem.

Vires. Digestivum est præstantissimum. Tart. in corpore humano efficacissimè resolvens. Hinc utilissimè exhibetur in obstructionibus viscerum, venarum, mesaraicarum, in omnibus febribus, præcipuè in quartana, in obstructionibus mensium.

Dosis à ℥ss. ad ℥j. in convenienti liquore, convenientissimè autem propter saporis emendationem offertur in Hydromelite.

N. Eodem modo fieri quoque poterunt salia vegetabilium ☉lata. Sic sal (e.g. absinthii) depuratum solve in ☿ absinthii, instilla spiritum ☉li, procedeq, ut cum Tart. ☉lato.

Tartarus ☉lat. alius.

℞. Magisterium Tart. purgans ad siccitatem evaporatum, affunde guttatim ☿um ☉li, donec strepitus omnino cesserit, abstrahè phlegma in Arena coagulum superstes reverbera per triduum, ita tamen ut sal non fundatur sed in continuo isto calore velut fixetur. Vocatur à Parac. lib. 7; Archidox. specificum purgativum.

Vires. Purgat benignè per inferiora, & sudores movet in peste, scorbuto, hydropse.

Dos. ℥ss. in syr. de ros. de rhamno, &c. Ex communicatione S. Cloff.

7. Tart. ☉latus crystallisatus.

℞. Crem. Tart. ℥iij. spir. ☉ ℥ij. dègerendo solvantur. Hinc affunde ☿ calid. ut penitus solutio fiat, ab-

strahè aliquantulum, & repone ad crystallifandum.

8. Sal Tart. volatilifatum.

℞. Sal com. Tart. purificat. q. v. affunde ☿ rectificatiss. Quæ ex Area per XX cohobando aliquoties (3.) & adhærescet Sal com. Tart. leteribus XXbici.

N. Si per MB Qaveris, non sublimabitur, sed exhibebit Menstruum cor aliis solvendis idoneum.

Vires. Insigne est lithonripticum.

Dosis gr. v. vj.

9. Liquor Tartari spleneticus.

℞. Tart. ℥ij. Sal com. ℥ss. (al. ℥ij.) Misc. exactè, imponeq; mortario, sartagini vel lamini ferreæ ignitæ ut calcinentur: Hinc pulverifa ac affunde aquæ ferventis ℥iij; digere in loco calido ☿ ☿ (6.) quotidie agitando, postea colentur, ut omnis faldedo insit aquæ. Huic aquæ imprægnatæ tandem adde Tart. el. ℥ij; digerantur ☿ ☿ (8.) filtrenturque pro usu.

Vires. Insigne est deoppilativum Lienis, aliarumque tartarearum obstructionum, mesenterium maxime infestantium: adeoque utile in hypochondriaca, scorbuticaque affectione ac mensium obstructione.

Dosis cochl. f. ad ℥i cum aliis appropriatis vehiculis.

Terebinthina.

Vide Resina.

CCCCIX. Thus.

Albar ☉, Dioscoridis, Λιβανὸν, Olibanum; Atab. Lovan. Cönder. German. Weirauch. Resina est duriusculâ, pel-

la, pellucida, profluens ex arbore Arabica Loyan. Arab. dicta. Vide Thus, Matth. Cord. hist. Cef. Loyan. & Conder, Garz. C.B.7. (inter gummata.)

Genera Thuris traduntur duo, masculinum scil. quod propriè Olibanum dicitur, seu Melax, (Arab. Melafon.) & fœmininum.

Masculum ex albo flavescit, suapte natura rotundum est, guttarum formam referens, candidum intus & pingue.

Fœmininum, resinofum magis est, ac molle, cito ardens, flavum.

Præfertur masculum, ut quod ex arboribus montanis colligitur.

Vires. Calfac. 2. sicc. 1. substringit. Usus præcipui intrinsecus ad varios capitis & pectoris affectus, ut ad alvi, uterique profluvia, ad iussim, (deglutitur vesperi frustatim,) vomitum, sanguinis excreationem, diarrhaam, dysenteriam mitigandam. Extrinsecus inservit suffitibus pro capite roborando, catarrhos discutit, cava ulcera carne replet, & ad cicatricem perducit, cruenta vulnera cephalica inprimis glutinat, perniones (cum suis adipe aut anserino) sanat, ulcera cacoëthea, tum sedis, tum reliquarum partium demulcet, (tritum cum lacte in linimentum:) oculorum rubedini ac lippitudini medetur, scilic. ▽ Rosarum multiplici extinctione Thuris imprægnata, lactique muliebri postmodum commixta, pro collyrio liquido verrucas incipientes & impetigines abigit, (tum pice & aceto impositum.)

Cortex Thuris in Officinis corticosum illud vocatur, quod Thymiam supra appellavimus. Cortex hic præfertur crassus, pinguis, odoratus recens, lævis minime scaber. Vide supra.

Manna Thuris sunt micæ, fragmenta, (pollen ac farina) Thuris, quæ ex collusione, dum in saccis vehitur, colliguntur.

PRÆPARATA.

1. Liqueor. Fit in albumine ovi cocti, summèque prodest ad maculas abstergendas, cavitatesque cicatricum explandandas.

2. El. Dialibanum. V. Disp.

CCCCX. Tragacantha.

Tragacanthum, Tragacantha, corruptè Tragaganthum, vel Dragaganthum, Tragant. Est gummi fruticis ejusdem nominis pellucidum, album, subdulce, leve ac syncerum, in granis plerumque fragmentisvè contortis.

N. ▽ calida solvitur, mucilaginemq; exhibet aliis Medicamentorum formulis, e.g. trochiscis formandis convenientem.

Dicitur Spina kirci, Arab. Chitinæ. Germ. Bocksdorn.

Exudat hoc gummi radice incisa, vel ut alii volunt sponte sua.

Præstat pellucens, gracilis, levis, syncera & subdulcis.

Vires. Refrig. 2. (aliis temperata est) hum. 1. (aliis siccatur) lenit, cutis spiracula

cula obstruit, acrimoniam mitigat, incras-
sat. Usus præcip. ad iussim inveteratam,
ad fauces exasperatas, retusas voces, cat-
rasque destillationes, (cum melle inde sit
linctus, subditur vè lingua, ut liquefeat,)
contrarenium dolorem & vesicae rosiones,
(in passio vel brodio,) in dysenteria. Ex-
trinsecus ad dysenteriam (in clysteribus,)
ad rubedinem & acres destillationes ocu-
lorum (soluta in ∇ rosar. vellacte,) ad
palpebrarum scabritiem.

Dosis ʒj.

N. Tragacantha quo vetustior, eò ca-
lidior.

PRÆPARATA.

Spec. Diatragacanth. calide } V. Disp.
Diatragacanth. frigide }

CCCCXI. Tubera Cervina.

Fungus Cervinus, Cervi boletus
Math. Cam. Lon. Tab. Cord. in D. C.
B. 2. German. Hirschbrunst / Hirsch-
schwamm.

Crescit in sylvis, ut vulgo creditur ex
libidine cervorum, quippe nonnun-
quam formâ genitalis cervini reperitur.
Verum testibus Lonicero & Cordo, nec
iis denegatur locis, ad quæ nec cervi,
nec Damæ unquam pervenerint. Inhi-
ant autem iis Cervi ob odorem fortem,
quo delectantur.

Vires. Rari usus est, nec adhibetur,
nisi quod nonnulli ad libidinis stimulum,
lactisque incrementum id commendunt,
cui Lonicerus contradicit, qui contra
nature frigida & humida statuit, adeoq;

ad stimulum inepta. Extrinsecus com-
mendatur ad uterinas ascensiones compe-
scendas, & parius difficultatem.

N. His subungi poterit & Fungus Chi-
rurgorum, videlicet Fungus orbicularis,
ovatus, pulverulentus. Crepitus Lupi,
Germ. Bubenfist / Weiberfist / Wolfs-
fist / Pofist. Videatur Lon. Tab. Cast.
Dod. Math. Cam.

Hujus vires sunt adstringere, siccare,
adeoque pulvis ejus ad interrigines, &
abrafâ non inutiliter adhibetur. Chi-
rurgi frustum imponunt sectæ venæ ad
sistendum sanguinem vulnusque soli-
dandum.

CCCCXII. De Vino.

Anatomia Vini.

Vinum est succus vitis, fermentatio-
ne exaltatus.

Dicitur Paracelsus, Sanguis Terræ
Querc. omnium vegetabilium Princeps,
& maxime vitriolatum.

Eligatur generosum, beneque ma-
turum.

PRÆPARATA VINI SUNT
varia, pro diversis scil. partibus va-
riantia.

Nimirum.

Vini partes sunt.

Essentia subtilissima, incorruptibilis,
vulgo ∇ vitæ, ∇ ardens, W, Sulphur.
Cœleste, Sulphur Bezoardicum vege-
tabile, menstruum cœleste, ∇ cœlica,
Lullii cœlum, clavis philosophorum,
corpus æthereum ex Δ & ∇ con-
stans, Balsamus volatilis liquoris ca-
fff fff tholi-

tholici 2. Magna copia ∇ insipida corruptibilis. 3. Hanc sequitur \sim quidam fumidus, qui nihil aliud est, quam Sal com. vino volatile crassius, in forma fumi ascendens. 4. Huic mox subjungitur \odot quoddam vere pingue & unctosum combustile, sed paucum. 5. Ex \odot extrahitur Sal commune quoddam corrosivum. 6. Post extractionem Sal com. relinquitur Terra limosa inutilis, *Sala in Anatomia § ij.*

Hinc 1. ∇ f. vite Q. E.

Vini.

R. Vinum generosum, \odot etur per vesicam, donec pars optima \odot arit, (quod gustu facile cognoscitur destillatum rectificetur aliquoties per B. M. abstrahaturq; saltem pars dimidia, tertia aut quarta, ut nihil humiditatis, relinquat combustibilis.

N. 1. Rectificatio feliciter peragitur 1. Si in rectificatione orificium, cucurbita charta subtili triplici vel quadruplici, vel panno spissiori tegatur, quippe hac ratione penetrat solum pars spirituosior, aquosior in cucurbitam, relabente. 2. Si rectificatio ex cucurbita colli longi, vel per phiolam serpentinamve perficiatur.

N. 2. Nonnulli obstruunt cucurbita, vel phiola orificium spongia oleo imbuta, qua ratione solus \sim transit. ∇ in spongiaremanente. Senn. Instit. Libav. in Alchym. Verum nemini suasero hunc modum, inscitur enim ab oleo ascendente ipse ∇ .

N. 3. Eodem modo paratur ∇ & ex

fecibus vini, ut & ex siliquis uvarum ex quibus vinum fuit expressum, Kesl. 1. cap. 70.

2. Aliter ∇ subtiliss.

R. Vini generos. q. v. digere (14.) \odot in fimo, vel alio lenissimo calore, postea per phiolam destilla, destillaturque aliquoties per eandem phiolam rectifica, donec ad summam subtilitatem pervenerit.

R. Hujus \sim lbij. misce cum recentis vini lbvj. destilla iterum per \odot m, ac prolice saltem lbij. affunde iterum recentis vini lbvj. ac destilla denovo, ut dictum, idque repetere septies vel pluries ad lbij. colligendas.

N. Hic \sim adeo subtilis ac fugax est, ut guttatim \odot ando ne Terram quidem attingere possit, quin in auram evanescat. Tentzel, Glückrath, in Beguin. l. 3. c. 2.

Vires. ∇ calidus est & siccus, penetrantissimus, incorruptibilis, resistit putredini, refocillat apoplecticos, comate oppressos, &c. Extrinsecus resolvit tumores, frigidos ac scorbuticos, arcei coagulationem sanguinis in contusionibus, crurumque resolvit ac discutit.

N. Sunt qui ∇ circulatum, ac toties destillatum, ut in oleaginosam abeat consistentiam. Circulatum Paracelsi autumant, sed male. Alii ∇ cum proprio sale, intervenientibus tamen digestionibus aliquoties destillant, ut sal tandem cum ∇ per Alembicum transferatur, vocantque Circulatum Majus Lipav. tract.

tract. de Igne Naturæ. Verum fallunt
& falluntur.

3. *Spiritus Vini alcalisatus.*

R. Vini generosi Hispanici vel Hungarici, q.v. elice spiritum ac phlegma: separa eadem ab invicem: ex fecibus calcinatis cum phlegmate extrahe Sal com. idque per crystallisationem purifica, in spiritu solve Sal com. & habes V alcalisatum.

4. *Spiritus Vini acutus Tart. seu spir. Vini Tartarisatus.*

R. V it ij. Tart. alb. crudi puriss. grossè contusi 3j. destilla in balneo pleno scobe ligni serrati, madefacta lenissimo ∇ ut ad quartum ferè pulsus guttula cadat: quando phlegma stillare inciperit, cessa, vel si phlegma quoque prodierit rectifica.

N. 1. Si subtiliter adhuc expetatur, de-
nuo ad hujus itij. addatur Tartari 3j. de-
stilleturq; ut ante. Sennert. in Instit.
Tentzel. in Exeg.

N. 2. Ad cognoscendum, utrum spiritus
prodeant nec ne, observentur strie, quippe
quo spissioribus striis XXbicus refertus fue-
rit, eo uberior semper spirituum sit evapo-
ratio & e contra.

N. 3. Oleum, quo lentà hac destillatio-
ne peractà, guttis quibusdam innatare
videbitur (quamvis vina in hoc valde in-
ter se discrepent) vera vini essentia esti-
matur: Tentzel.

3. *Aliis V Tartarisatus sive V
Tartar. alcalisatus.*

Hic spiritus si super eundem Tar-
tarum per Retortam cum cohobis

rectificatur & in fine (phlegmate inter-
medio abjecto) fortiori igne urgetur,
spiritus vini Tartarisatus acquiritur,
Sennert. Instit.

6. *Spiritus Vini Tartarisatus seu ∇
philosophica.*

R. Tartarum in præcedenti spiri-
tus Tartarisati præparatione post co-
hobiarelictum (vel & Tartarum re-
centem) calcina ad viriditatem (cæ-
rulitatem,) dein affunde spiritum
illum Vini Tartarisatum, destilla &
tandem propelle igne fortiori. Ten-
tzel.

Vel: Sal. com. Tartari ad cærulita-
tem calcinato extrahe essentiam dige-
rendo cum V, (V habeat aliquid phle-
gmatis, cujus beneficio sal arripit) de-
stillà gradatim, ad ignem fortissimum
subindè progrediendo.

Vires. Spiritus hic longe præstantissi-
mus est ad Tincturas & Extracta purgan-
tium in genere elicienda ad conservandas
metallorum & vegetabilium, animaliumq; facultates.

In reparatione arcanum est ad plurimos
affectus, imprimis tartareos, & ubi sal
fixum ex deficiente coctionis *πνεύμα-
τος* abundat, ut in Scorbuto. Tar-
tareo Hypochondrio, Asthmate, Ca-
chexia Epatis aut reliquorum visce-
rum obstructionibus, conciliat insu-
per somnum cum essentia croci propi-
natus.

N. 1. Spiritus vini hoc modo rite præ-
paratus, est Ros Jovis amphibii vegeta-
bilis ad parandum illud Biolychnium

Burg-

Burggravii. Ejusdem beneficio fit & perpetuum mobile & ægis criterium. Hartman. in pract. Tentzel. in Exeg. Qui plura de V facultatibus voluerit, consulat Lemnium, Evonymum, Gesnerum. Libavium, Med. destill.

N. 2. Hic V tartarizatus in spagyrica sochlea Hermet. Cl. circulatus, è mero spiritu evadit Balsamus, è fragrantia fragrantior, è crystallino carbuncularis, haud secus ac cor sanguinem Epatis, continente pulsum circulo, in auream vitæ Balsamicam, vividamque spirituum vitalium naturam exaltat.

Vires & Dosis. Hujus essentia gutta 3. vel 4. calidum nativum in Eclampsia evocant. Cum Croci essentia somnum conciliant, restorationemque membrorum conantur.

7. Spiritus Vini microcosmicus, i. e. cum sale urinae volatili acuat.

R. Spiritus Vini subtiliss. ac Sal communis urinæ ad summam puritatem ducti (vide in urina) ana mixti ponantur in locum frigidissimum. Hinc digerantur per lentum calorem V in Phiola. H. Cl. spatio 20. vel 30. & P & convertentur in liquorem, qui si lubet per MB semel ac iterum rectificetur. *Reguin. l. 3. c. 2. Hartm. in pract. & in Croll. Senn. in Instit.*

Vires. Menstruum est ☉ potabilis preparationi inserviens: poterit quoque intrinsecus adhiberi, ad referandas obstructions viscerum, ut & extrinsecus ad dolorem tempestendum.

8. Spiritus Vini Dilutus.

R. Spiritus vini opt. & spir. Bi rectificati ana ℥iij. M. & destilla per XX in cinere, primo lento igne, dein fortiori, ut simul alembicum transeant: reitera destillationem vice tertiâ, postmodum circula per mensem simul, habebisque spiritum odore & sapore sat gratum.

9. Quinta Essentia Vini.

R. Vini generos. alb. vel rub. q. v. Gla ex MB rectificando donec V evadat quasi igneus (fit rectificationibus sæpius iteratis scil. 12. &c.) Spiritus hic indatur vitro, quod bono luto vel mastiche & album. ovi optime claudatur. Hinc circuletur V per mensem. Postmodum aperi sensim & si mirum oleat saporem, affecutus es vini. V. Essentiam; sin minus, claude denuo vitrum & repone in V donec dictum signum senseris, saporem sc. sive odorem in videris.

N. Acquiritur scopus beneficio salis proprii. *Popp. in Hodoget.*

Vires. Balsamus est efficacissimus, nostroque balsamo naturali roborando convenientissimus. Insuper antidotus est certissima adversus pestem intra 6. horas sanandam, si in primo illius insultu gutta xij. exhibeantur ad movendos sudores. Epilepticum paroxysmum annihilat eadem dosi factum mortuum expellit, in partu difficili illico, & admiraculum usque operatur siccochleare integrum illius exhibeatur.

10. Aliud

16. *Aliud opus vegetabile ex commu-
nicatione S. Closs.*

Cohoba Acer. destill. super sal. Sulphuri proprium tantisper, donec tam acidum egrediatur, ac fuerat affusum, cumque sufficienter sibi suis acidis fuerit imprægnatum ℥. Illius 3vj. 7es super sal Tart. proprium rectificati 3j. Digere per mensem Δ lampadis, usque dum corpus suam receperit animam, imbibatur rursus eadē quantitate olei ætherei & desiccetur per quindenam, his imbibitionibus ad sufficientiam factis, detur Δ 2is, elevari-
bitur Sal candidissimum, relictis terreis aliquot impuritatibus. Sublimatum reconde in aliā phialā H. C. & Δ eodem lampadis decoque ad albedinem usque perfectam. Quo viso imbibatur fixissima hæc materia uæthereo suo sive animâ, idque roties intercedente digestionē fixativâ iteretur, donec in igneum ruborem elevari fuerit, summam corporis nostri medicinam.

11. *Magisterium Vini. Lapis vini
vegetabilis.*

℞. Vini generosi Hispanic. vel Ungaric. q. v. putrescat 40. & P in fimo equino. Hinc destilla in MB, & prodibit spiritus, ac tandem oleum: hæc separa ab invicem, spiritumque dephlegma. Oleum denuo in fimo equino & P 40. putrescat ac destilletur. Ex remanentibus fecibus beneficio phlegmatis extrahatur sal volatilius

sine calcinatione. Utrumque conjunctim, s. a. purifica. Postea impræгна sal spiritu suo ac digere: hinc adde & oleum, digereque donec coloris tandem rubei pulverem nanciscaris.

Vires. Grana (vel gutta aliquot, si minus liquidius) integram mensuram aqua, vinosis qualitatibus persundunt.

12. *Mensurum Basilii Valentini, Aqua
temperata, Temperatum Ex-
tractivum.*

℞. Spiritus vini subtiliss. q. v. cumque cum spir. Sal com. digere ac terna destillatione per alembicum, uni. Sic dulcescit, acrimoniamque amittit. Vide spir. Sal. com. dulcem.

Vires. Solvit ☉ non radicaliter, sed tinturam ejus extrahendo. Vide de ☉ Basil. in repetit. magni lapidis veterum. Senn. Instit.

N. 1. Alij ℞. V optimum, cumque cohobant multoties (12.) supra Sal com. ut essentiam Sal communis secum evehat. Huic V essentiâ Sal com. imprægnato affundunt tantundem spir. Sal com. rectif. digeruntque.

N. 2. Tenzelius ℞. V rectific. q. s. superfundit Sali Tartari philosophico ad emin. 3. digit. digeritque in Phiola longiss. colli aliquamdiu l. calore: postmodum destillat.

13. *Sal. Tart. philosophorum.*

℞. Sal ex cineribus Sarmentor. Extractum. reverberetur Δ aperto (hor. circiter 3.) donec albescat. Dein solve in Δ & separa feces filtrando & coagulando. Sic habes Sal Tartari philo-

philosophorum, Tenzel. in Exeg. de ☉
potabili.

14. Cinis Clavellatus.

℞. ☉ ex destillatione secum residuum, combure & elixivia.

CLASSIS III.

DE PURGANTIBUS PRIMARIIS.

CCCCIII. Agaricum.

Agaricus s. Agaricum fungus est albicans trunco laticis adnatus. Vid. Brunf. Matth. Dod. Cord. in D. Lob. Cast. Tab. Ger. Cam. Lon. Porta. Bellon. German. Perchenschwaum.

Estq; Diosc. Mas, hic reprobatur.

℞ Plin. ♀ Fœmina, hac præfertur.

Mas rotundus est. & undique sibi similis (Plinio) crispior amariorque. Fœmina rectas intus habet pectinum modo venas, & q. divisuras (Plinio.) Fœmina solutiore est, initio dulcis, mox in amaritudinem transit.

Eligatur itaque Agaricus albus, levis, valde rarus, velociter friabilis, saporis primum dulcis, mox amarus & stypticus. Reprobatur lignosus, longus, durus ac gravis.

N. 1. Pars exterior præstat interiori.

N. 2. Multos in annos durabilis est, sine virium jactura.

N. 3. Adnascitur eidem Fungus Abietis, Pice sylv. Teda & Larici, sed solum Larignus intra corpus sumitur.

Vires. Pituitam educit tennem aquosam, serosam; & viscosam totius corporis & imprimis excrementa mesenterii, tum urinam ciet ac

N. 1. Quia ventriculo nauseabundus est, corrigitur stomachicis, e.g. Zinzib. Garyophyll. Spica Celiaca, &c.

N. 2. Quia tardè operari solet, additur stimulus ex sale gemma, crystallis Tartari & similib.

Dosis à ʒj. ad ʒj. In infusione à ʒij. ad ʒv.

PRÆPAR.

1. Extractum Agarici.

℞. Agarici, q. v. Extrahe cum V, &c. Augst.

N. Sala adhibet Agaric. Trochiscatum, extrahitque cum V.

Alii aquam adhibuisse malunt, ac præ aliis aquam Anisi vel Cinamomi in qua Agaricum macerant (hor. 24.) exprimunt ac inspissant. Verum enim vero quia Agaricus nonnihil resinosi quoq; in se continet, præstat V adhibere.

Dosis à ʒj. ad ʒß. vel ʒij.

2. Agaricus Trochiscatus.

℞. Agaric. limat. cum vino in quo maceratum Zinzib. additoque tantillo Tragacanth. vel Gummi Arab. F. Trochisci.

3. Trochisci de Agarico.

℞. Agaric. lim. ʒij ʒß. Zinzib. ʒij. cum Oxymell. q. l. F. Trochisc. V. D.

4. Pi-

4. *Pilula de Agarico*. Vid. Disp.

Dosis à ʒʒ. ad ʒijʒ.

5. *Pilula Hieracum Agarico*.

Vid. Disp.

Dosis à ʒj, ad ʒij,

CCCCXIII. *Asarum*.

Ἀσάρον, Diosc. *Asarum*, Brunf. *Trag.*

Matth. Fuchf. Dod. Cord. in D. & hist.

Lon. Cast. Tab. Ger. Cam. C. B. 1. Asa-

rum baccaris seu baccatus, Lob. aliis,
vulgo, *Hafelwurk*.

Solo gaudet montano opaco, Vici-
niaque corylorum. Viret perperud,
nova folia tamen una cum stoculis ve-
re promit.

OFFICIN. NAT.

Radix colligitur vere, & folia.

Vires. *Crasampituiam*, bilemque
utramque per vomitum ac nonnunquam
per secessum violenter expurgat. *Cals. &*
sicc. 3. diureticum est, ac emmenagogum
insigne, Epar, Lienem, vesicamque fellis
aperit. Hinc utile in arthritide, hydropo,
febris praeipue tertiana & quartana,
in ictero, &c.

Dosis Rad. à ʒʒ. ad ʒj, in substantia,
à ʒj. ad ʒijj, in fusio.

Folia exhibentur. N. 6. 7. 8. 9. in fusio
cocta & expressa.

PRÆPAR.

1. *Extractum alcalisatum* quod ve-
nit nomine coaguli *Asari*. 2. Rad. ad
folia *Asari*, extrahe cum V ac filtra.
Hinc adde sal ex incineratis fecibus
elixiviatum, & ad ignem fusionis cal-
cinatum, solutione ac inspissatione.

purificatum, abstraheq; Vini spiritum
ad consistentiam mellis. *Vide Sennert.*
in Instit. Hartm. in pract.

Dosis ʒj. ad ʒij.

2. *Diasarum Fernelij*. Vid. lib. 2.
cap. 51.

Dosis à ʒj. ad ʒijʒ.

B.

CCCCXIV. *Bryonia*.

Ἀμπέλ. λευκή, Dioscor. *Bryonia*.

Trag. Lon. Tab. Cam. alba, Dod. Ger.

Vitis alba, Matthiol. Fuchf. Cord. in D.

Lob. Cast. C. B. 1. Germ. Zaunrübe/

Schmeertwurk/ Stickturk/ Scheiße-
turk/ Satolturk.

Est baccis rubris & nigris, utraque u-
sualis, praefertur tamen prior.

Crescit dumetis: Floret Majo.

OFFICIN. NAT.

Radix collecta verno tempore.

Vires. Purgat validè serosos & pitui-
tosos humores. Splenetica, Uterina &
Iecoraria est, utpote quorum obstructions
aperit. *Calsac. & sicc. 2.* *Hydropicorum*
aqua per vomitum ac secessum educit,
menses ciet foetum ejicit, suffocatione: ute-
ri arcet, asthmata sanat, podagricis con-
venit (intus & exter.).

Dosis in substantia à ʒj. in Infuso ad
ʒijʒ. vel ultra.

Extrinsecus confert Hydropi, ab-
domini emplastrata cum sterc. capril-
lo. quin & quartanam curare dicitur ar-
teriis temporum & brachiorum affi-
xa.

PRÆ-

PRÆPARATA.

1. *Fecula Bryonia.* Videl. 2.
Vires. *Uterina est, menses ciens, sed non*
citra nauseam.
Dosis ad ℥j.
2. *Nectar succosum S. Closs.*
Fit ex ℥j. succi bryon. per expressio-
nem facti, & ℥j. ol. \odot vel Sulph. M.
Dosis ℥j. in vino albo.
- N. *Purgat aliquando per vomitum,*
alvum & urinam.

3. *Unguentum Agrippa.* V.D.CCCCXV. *Carthamus.*

Kvix \odot , *Dioscor.* *Kvinox*, *Plinis*, *Arab.*
Karten. *Cnicus*, *Mauh.* *Dod.* *Lob.* *Cast.*
vulgatis. *Clus. hist.* *fativus*, *Cord. in D.* &
hist. *Lob.* *Cnicus urbana & fativa*, *Theo-*
phr. & *Plinii.* *Carthamus*, *Brunf. Trag.*
Fuchf. *Lon.* *flore Croceo*, *Cam.* *Cnicus*
fativus seu Carthamum officinar. *C.B.I.*
aliis, *Crocus sylvestris*, *Cnecus*, *Germ.*
wild Safran.

N. *Floribus est orocis, rarius albidis,*
illorum admistione adulterant Crocum.

Colitur in hortis Italiae, Galliae. Flo-
ret Julio & Augusto.

OFFICIN. NATIVA.

Semen.

Vires. *Semen pituitam viscosam ac a-*
guas vomitu ac dejectione purgat: confert
maximè pectori: Calf. & sic. i. Stomacho
adversatur, ideoque corrigitur stomachi-
cis anis. galang. Zinzib. &c.

Dosis in substantia à ℥j. an. ℥ij. ℞. (sed
raro ita exhibetur ob viscositatem) in
infuso à ℥iij. ad vj. vel ultra.

PRÆPARATA.

1. *Extract. Diacartham. f. Cnicophar-*
macum. Vide A.D.
Dosis à ʒ℞. ad iiij.
2. *Syrupus de Carthamo.* V.D.
Dosis ab ʒj. ad ʒij.
3. *Electuar. Diacartham.* Dof. ʒj.
4. *Species Diacartham.* Dof. ʒj.

CCCCXVI. *Cassia.*

Cassia, (*Casia*) *fistula*, *Arab. & Al-*
pin. *Cassia nigra Aethiopiae Dod. Cord. in*
D. Cast. Fragos. Tab. Ger. Cass. laxativa
Lon. Cass. solutiva, Bell. Monard. Garz.
Siliqua aut Cassia purgatrix Arabum,
Lob. Cass. Aegyptia. purgans, Cam. aliis
Canna fistula, Siliqua Indica. Cass. so-
lutiva seu Aegyptia, siliqua, Mauh. Cass.
F. Alexandrina, C.B.I.

N. *Advehit cepit & ex Brasilia, Cas-*
siapurgatrix, cuius ʒj. plus purgat quam
ʒij. Cassiae illius Aegyptiacae.

Cassia Arbor procera est, instar ju-
glandis ferens siliquas, seu cannas lon-
gas, rotundas, exterius lignosas, intus se-
minibus ac medulla praegnantibus.

OFFICIN. NAT.

Siliqua seu Cannae medullam inclu-
dentibus. Haec eligendae ponderosae, re-
centes, plenae, quaeque minimè com-
motis intus seminibus resonent,
splendentes, foris etiam ac in pulpa
pingues.

Vires medullae. *Alvum lenit clemen-*
ter atque sine torminibus feces educit,
calidi-

caliditate & frigiditate temperatâ (Fernel. cal. 1.) cetera humidior, unde nec humido ventriculo nec hypochondriaci ac flatulentis nisi stomachicis & carminativis. (E. g. Cinam. Mastich. sem. anis. correctâ convenit. Potio ejus grata est pleuriticis.

PREPAR.

1. Cassia flos & pulpa Cassia, Cassia extracta. Fit traiectione medullæ exemptæ per cribrum.

N. Vapor aqua cribro subditur, ut medulla in cribro agitata cò facilius transeat: debet autem fieri extractio actutum quando usus postulaveris, ac scit quippe pulpa cum tempore.

Dosis. Infantibus ad ʒiſs. adultis ad ʒiſs. in clysteribus ad ʒij.

2. Cassia extracta seu Cassia extracta communis sive pro clysterio. Fit pulpam cum decocto herbar. mollientium & melle ad consistentiam Electuarii coquendo. Vide Disp.

3. Elect. Diacassia cum Manna. Electuarium est & paratum ex pulp. Cassiæ, p. vj. Tamarind. j. Mannæ ij. Sacchar. Cand. j. Penid. j. Sacchar. Violar. iij. quæ suscipiuntur decocto prunor. & syrupo violar. V. D.

4. Cassia extracta sine foliis sene. Electuarium est ex pulp. Cassiæ ʒij. Tamar. ʒj. sacchar. ʒij. susceptis de cocto express. polypod. sem. cartha. herbar. pectoral. Vid. Disp.

5. Cassia Extracta cum foliis sene. Fit

ex prioris Electuarii p. xij. pulv. sen. p. j. Vide Disp.

6. Extractum Cassia. Vide Quercet. in Diet. & Ph. Rest.

Dosis ad ʒiſs.

7. Aqua Cassia. Fit ex pulpâ additis limon. parvis & ser. lact. q. f. Extrahitur aq. per B. M. dantur ʒvj. in nephrit. & inflammatione Renum.

8. Syrupus de Cass. Describitur à Rend.

CCCCXXVII. Cataputia minor.

Labugis, Dioscor. Lathyrus, Brunfeld. Matth. Fuchs. Dod. Cord. in D. Lob. Lon. Cam. Cast. Gerh. Tab. Lathyrus seu Catapucia minor, 2. Trag. Cataputia minor, Lob. Tab. Lathyrus minor, C. B. 1. Granum regium minus, Mes. German. Springkórner.

Ratione ætatis, latiora vel angustiora folia habet, hinc apud Tab. Lathyrus duplex, latifolia scil. & angustifolia, quæ promiscuè usuales.

N. Recensetur inter genera Tithymalorum, utpote tota candido & lacteo succourgens.

Colitur in hortis: Floret Julio, fert semina Augusto.

OFFICIN. NAT.

Semen (s. grana) rarissimè Folia.

Vires. Purgat cum violentia per vomitum ac secessum, humores inprimis serofos & biliosos, hinc phlegmaticos, calf. & sicc. 3. Dosis à bacis vj. ad xij.

Gggggg Folia

Folia Num. 4. vel 5. sed est varius. Ex-
trinsecus vesicatorum exhibet & psilo-
thrum, præcipue succus ejus lacteus.

CCCXVIII. Colocynthis.

Colocyn-
this, C. B. est

{	rotunda	{ major.
		{ min. hæc usualis
	oblonga.	
	pytiformis.	
	pomiformis.	

Dicitur Κολοκυνθίς, Dioscor. Colo-
cynthis fructu rotundo minor, C. B. z.
Fæmina, Tab. Coloc. fungosa & le-
vis, Cord. h. aliis cucurbita sylvestris,
fructu rotundo minor, vulgo Colo-
quinthis Sicyonia. Arab. Chandel,
Handel & Handhal. Videatur & Co-
locynthis, Math. Cord. in D. Lon. Lob.
Dost. Cast. Cam. Ger. Vera, Trag. prima
f. mas, Tab. Germ. Coloquinth.

OFFICIN. NAT.

Fructus seu poma, ac præcipue medulla
ejus arida affertur autem ex Ægypto.

Vires. Pituitam crassam ac glutino-
sam ex profundioribus & remotioribus
partibus expurgat, ut ex cerebro, nervis,
juncturis, pulmonibus, unde cum com-
modo exhibetur Vertiginosis, Hemicrani-
cis, Epilepticis, Apoplecticis, Scabie, Lue-
que Venerea afflictis. Calida est & sicca. 3.
verum ob vehementiam ac amarorem, &
quia ventriculo ac intestinis noxia est, ra-
rissime in substantia, & non nisi robustis,
imo decenter correctâ exhibetur. Corri-
gentia illa sunt cuminum, tragacantha,
mastiche, bdelium, & sim. cardiaca, he-
patica, stomachica.

Dosis in substantia à gr. vii. ad ℥j.
in clysteribus (in petia) ad ℥ss.

PRÆPAR.

1. Trochisci albandal. Vid. Disp.
2. Infusum Trochisc. alband. vi-
ta aureus Rulandi (nonnullis.)
- ℞. Trochisc. Alband. ℥ss. V Mal-
vat. ℥x. vel ℥xij. Digere aliquamdiu
filtra & serva ad usum.

Vires. Purgat per alvum absque peri-
culo omnes humores viscosos, bilem u-
tramque ac serum, si tertio quoque die
propinetur.

Dosis à ℥ij. ad ℥j. vel ℥i℥. vel si pla-
cuerit inspissare ad consistentiam ex-
tracti, detur à ℥ss. ad ℥j.

3. Extract. Colocynth.

℞. Colocynth. pulpæ (rejectis se-
minibus) pulverisatæ, extrahe dige-
rendo, vase clauso cum V, aliquot se-
ptimanis (3) quo temporis spatio to-
tam acrimoniam amittit, filtra & si
dulcius desideras, iterum digere, &
dulcescer, Medicamentum evadens o-
ptimum, ad pituitam & alios humores
crassos à remotioribus partibus attra-
hendos, idque sine noxa. Corrigitur
oleo Mastich. Nucist. Cinam. Weckerus
ex Querc.

N. Sala ℞. pulpæ coloc. sine se-
mine q. pl. eamque subinde irrorando
▽ plantag. incidit, dein extrahit cum
▽ plantag. part. ij. Vp. j. filtrat, de-
fecat & inspissat ad consistentiam mel-
lis.

Menstruum ex ▽ plantag. & V
commiscet, ne quid ex parte resinosa
ac

ac viscosa, quibus Colocynthidem constare ait, intactum maneat.

Dosis à gr. iij. ad x. cum corrigentibus.

N. Praestat Extractum hoc cum aliis purgantibus miscere, ut illis stimulo sit, quam solum exhibere.

CCCCXIX. *Ebulus.*

De Ebulo actum est supra class. i. Hoc loco ergo solum Ebuli partes purgationi intervinientes, perstringimus. Hæ sunt Cortex & Acini s. seminula baccarum.

Vires. Ebuli cortices & seminula vim habent educendi ∇m , conferunt igitur in Hydrope, Arthritide, cæterisque morbis à sero natis.

N. Eliguntur cortices medii ac potissimum radicis.

Semen Ebuli solutorium acquiritur hoc modo.

R. Baccar. Ebuli quantitatem magnam, exprime succum, (quem in Extractum redigere poteris ad normam datam l. 2.) acinulosque restantes à siliquis separa, aliquoties lavando, semperque quod supernatat rejiciendo, donec solos acinuloseosque puros nactus fueris. Hos sicca ac serva pro usu.

Diaretici sunt.

N. i. Dosis à $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. vel fiat emulso in dosi majori. *Sala.*

N. 2. Ex hoc semine exprimitur \odot quod ventri inunctum alvum laxare dicitur.

Aqua still. Sambuci aut Ebuli ra-

dicum, cujusque ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. sumpta per 30. dies, confert Hydropi.

Arcanum Chamaædes S. Cloß.

Semina contusa pone in cucurb. affunde aq. limpidam, agita materiam in calore remisso, donec in pulvem tenuem evadat, digere per 3. & deinde cola torculari fortiter. Oleum mixtum erit cum aq. Digere & quod supernabit serva, in fundo habebis ejusdem sem. unguentum.

Vires. Oleum hoc intus sumptum purgat egregie pituitam si ejus $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. cum far. amyli incorporetur, vel in jussulo exhibeatur. Extus podagra materiam influentem abigit; ingressam discutit, durecentem emollit, in omnibus doloribus salutare est.

CCCCXX. *Elleborus niger.*

Utimur non omnibus Ellebori nigri speciebus, sed (monente Matthiolo) Helleboro nigro, flore roseo, C. B. 4. cui tamen alii substituunt Helleborum nigrum hortensem flore viridi. Alii ejus loco cum successu utuntur Elleboro nigro tenuifolio, Bupthalmi flore, teste Bauhino in Matth. Germ. schwarze Nießwurk.

Prior insignitur Elleborum nigrum, Matth (cui & Helleb. purpureo flore,) Cast. Cam. Helleborus niger, Lob. 2. Dod. verus, Ger. Veratrum nigrum, Dod. Legitimum, Clus. hist. Styriacum, Tab. C. B. 4.

Posterior nominatur Helleborus niger, Brunf. alter Matth. 3. Dod. no-
Gggggg 2 stras,

stras, *Cord. hist.* Helleb. niger aduke-
rinus domesticus, *Trag.* hortensis
Fuchf. Helleborastrum, *Lob. Ger.* Ve-
r atrum nigrum, *Cord. in D. Clus. pan.*
& *hist. Tab. C. B. 2.*

Tertius dicitur Elleborus niger ve-
rus, *Trag. Lon.* PseudoElleborum *Mat-
thiol.* Buphthalmum, *Dod. Clus. Cam.*
Helleborine tenuifolia, *Cord. h.* Elle-
borastrum nigrum, *Cam.* Helleb. ni-
ger ferulaceus *Theoph. Lob.* Elleb. al-
terum, *Cast.* Hellebor. Hippocratis,
Tab. C. B. 9.

Prior crescit copiosè in Austria.
Floret Januar.

OFFICIN. NAT.

Radix ac præcipuè Cortex.

N. Colligendi tempus referunt C in
aspectu felici cum L aut Q existente sub
ortu \odot , C crescente, ac peragante si-
gnum Capricorni, Leonis aut Sagittarii.
Heurnius.

Vires. Purgat potenter humores me-
lancholicos, utile per consequens medica-
mentum est, omnibus affectibus inde O-
riginem trahentibus, quales Mania, in-
fania, Hypochondriaca passio, Elephantia-
sis, Herpes, Cancer, Quartana, Vertigo,
Epilepsia, Apoplexia, Scabies. Sed cautè
& non nisi robustis ob violentiam quam
exercere capius nactus est, exhibere con-
ducit. In decocto ramen minus periculi.
Corrigitur mastiche, cinam. anisofenicul.
& sim.

Dosis à ʒj . ad ʒij . in infusione dant
à ʒj . ad ʒʒ .

PRÆPARATA.

1. Preparatio Ellebori officinarum.

Maceretur (rejectâ medullâ li-
gneâ) per ʒ 3. in Vino cidonior. (alii
in Malvatico (postea exiccetur. *Aug.*

Quercetano sufficit 24. hor. in ✠
ros. macerasse. *Ph. Rest. c. 26.*

N. Alii radicem ita preparatam ul-
terius pomo cidonio insigunt, idque pasta
panis obvolunt in clibano coquunt,
postmodum radicem exemptam exic-
cant.

2. Preparatio Recentiorum.

ʒj . Rad. Elleb. nigr. pulveris. q. v.
irrita phlegmate ⊕ -i, & ad lenem ca-
lorem continuò ligneâ spatulâ agita,
iterumque irrita & agita, donec fec-
tor omnis exhalarit, radicesque gratum
odorem & colorem nigricantem ac-
quisiverint.

Dosis ʒʒ . ad ʒj . cum corrigentibus.
*Hartmann. in Croll. Sennert. Inst. Ten-
zel.*

N. 1. Alii irrigant aliquoties (3.) suc-
co rosarum, & in umbra exiccari si-
nunt, dantque ad gr. 10. vel 12. imò ad
 ʒj .

N. Non minoris virtutis sunt alie cor-
rectiones, quæ per inacerationem radicum
seu fibrarum helleb. teretum & minutu-
larum ex Oriente allatarum sunt in lacte
caprino, sero lactis, melocrato, & Oxy-
mel. vel triduum, vel etiam modo sequen-
ti.

3. Extractum Ellebori nigri.

ʒj . Cortic. rad. & fibrar. q. v. co-
que in Vino albo generoso leni calo-
re hor. 3. in fine Δ m augendo ut bul-
liant

liant. Dein exprime, & coagula ad consistentiam Extracti.

Dosis à gr. x. ad xv. vel xx. cum ol. mastich. & sim.

N. Alii loco vini solâ aqua pluviâ utuntur, ut August. Alii aqua anisi, de qua oleum separatum, ut, Heurnius in Meth. pract. vide & Wecker. vel aq. major. aut Meliss. cum ol. Tart. per d. Hartm. in pract. alii V ut Beg. lib. 2. cap. 9.

4. Extractum Ellebori nigri Quercetani.

R. Rad. & fibrar. cum ✕ rosar. præparat.) q. v. extrahe digerendo, cum succ. Limonior. part. 1. & succ. pomor. redolent. part. ij. (succ. prius sint benè depurati & clarificati,) exprime. Fecibus affunde novum succ. Rosar. pallidar. clarificatum, ac denuo digerendo extrahe colando & exprimendo. Utramque Tincturam conjunctam digere in MB. & defeca. Defecatam Tincturam l. Δ coagula ad formam extracti.

Dosis ad ℥j. cum stimulo aliquo vim ellebori vomitoriam obtundente, e.g. Extract. diagrid. & sim. *Querc. in Pharm. rest. c. 26.*

5. Aliud Quercet.

R. Extr. elleb. nigr. (cum ∇ Anisi factum) affunde V digerendo, extrahe, filtra, coagula. *Wecker ex Quercet.*

N. Si viridem habueris Elleborum, extractum quoq. parare poteris cum ∇ ejus Qata, ad modum in Esula extracto delineatum.

6. Extractum Ellebori nigri

Sala.

R. Cort. ellebori nigri, ℥ss. Δ borrag. ℥iij. V ℥ij. digerendo extrahe, vale f. cl. decanta, ex fecib. combustis extrahe Sal, idque Tincturæ admisce, digere per ℥ 1. ac coagula.

Dosis. ad ℥ss. ad ℥j.

7. Extractum helleb. nigri S.

Cloff.

Desicca fibras helleb. nigri flore purpureo in patellâ ferreâ, admoto subtus Δ lento, quasi animus esset aliquid frigere, agita frequenter, ut vapor malignus, qui convulsionis causa est, inde exhalet, hoc facto terè radículas, & cum phlegmate *Ace. destill.* tincturam extrahe, filtra & coagula.

Balsamus Elleboratus.

Herbas & rad. elleb. nigri mundenur, conquassentur & ponantur in Vinum moschatellinum rubr. mensur. 4. vase vitreo benè claulo per menses duos, postea exime & succum exprime, expressum filtra, filtratum pone super herbas & radices recentes ann. m. j. ros. rubr. m. v. garyoph. ℥vj. Ponantur ad digestionem per aliquot ℥, adde V octavam partem, deinde exprimatur, expressum servetur. Tandem remanentiam combure in cinerem, & f. a. salem præpara, liquorem abstrahere in B.

℥. Salis præparati ℥ss.

Croci. ℥j.

Ambar. gril. ℥ij.

Mosch. ℥j.

Gggggg 3 Aloes

Aloes epat. ʒß.

Spec. Diamb.

Diagrid. ana ʒj.

Ol. garyoph. ʒß.

Solvatur extractum, deinde admisceantur hæc species, iterumque ad formam inspissentur, datur à ʒj. ad ʒß. & ultra. Ex communicatione Greg. Horstii habuit S. Cloß.

Syrupus Helleboratus Vlmensis.

℞. Myrobalan. omn. ʒiiss. contundantur crassiori modo & fricentur manibus cum ol. amygd. Deinde infundantur per diem & noctem in aq. fumar. lb. xij. Postea coque ad cōsumpt. tertiæ partis.

Adde cort. rad. helleb. nigr. præpar.

Glycyrrhiz. mund.

Polypod. q. à ʒj.

Sem. citr. ʒß.

Caryophyll. ʒjß.

Sum. fumar.

Fl. Cichor. mß.

Borrag.

Bugloss. ana p. i.

Bulliant omnia ad remanentiam lb. v.

Postea adde. Fol. sen. el. ʒiiss.

Epythym. cort. ʒij.

Iterum bulliant, donec maneant lb. iij.

Addito sacch. ʒxxxij. coque ad consist.

Greg. Horst. in observ. lib. i.

N. Syrup. Helleb. Quercetan. Vide lib. 2.

Syrupus Elleboratus: In hoc continetur.

9. Oxy mell.

Elleboratum:

In quo

Cort. Elleb. 3.

Rhabarb. 8.

Fol. Senæ 16.

Polypod. 16.

Helleb. alb. 3.

Helleb. nig. 3.

Esulæ. 2.

Agaric. 2.

Turbit. 8.

partes. partes.

Pulvis purgans.

Fit ex foliis helleborastri mense Septembri vel Octobri collectis, Cā decreſcente, quæ in umbrâ per se exiccandâ, vel in pane siliginoso.

Dosis à ʒß. ad ʒj. in vino albo.

CCCCXXI. Elleborus albus.

Elleborus albus flore subviridi, C. B. r. Ellebor. alb. Brunf. Trag. Fuchf. Cord. hist. Lon. Cam. Clus. hist. Helleborum album, Matth. Lob. Cast. Veratrum album, Cord. in D. mas & foemina, Tab. Germ. weiß Nieswurk.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Ob violentiam purgationis, quam per superiora & inferiora exercet usum purgandi internum soli fere Elleboro nigro linquit. Ingreditur tamen ceu basis vomitorium Conradinum. Extrinsecus sternutationes movet, scabies, impetigines & serpiginis mundificat & sanat, Lethargicos excitat, (naribus indita) menses proritat (subdita)

PRÆPAR.

1. Vomitus Conradini.

℞. Rad. Bryon.

Cycla-

Cyclamin. à ʒij
Helleb. alb. ʒj.

Radices has probè mundatas, loras & exiccatas pulverisa, affundeque V ad eminent. dig. 2. stent. in MB. dein Qla per XX, feces exime & comminue, spiritum abstractum reaffunde, stentque aliquandiu vase clauso. Postea filtra & habebis verum vomitorium.

Ufus. Penna extremas plumas intinge & immitte in haustum vini malvatici, eumque bibe & evomes. Vid. Hartman. in Croll.

2. Vinum vomitorium.

Fit vinum ex elleb. albo, si radicum illius crasse contusi. ʒß. maceretur in ʒij. Vini Hispani, exponaturque Soli.

Vires. Est singulare Heurnii Experimentum pro movendo vomitu cochleare unum, ad alvum vero ciendam detur cochl. ʒ. cum aliis laxantibus. adde vomit. Amat. Lusit.

CCCCXXII. Epythymum.

Ἐπίθυμον, Dioscor. Epithymum, Matth. Lob. Cast. Tab. Cassutha minor. Dod. C. B. 1. Germ. Tymseid.

OFFICIN.

Integra Planta.

Vires. Purgat blandè melancholicos & serosos humores, calf. & sic. 3. Usus præcip. in scabie, ulceribus, affectibus melancholicis, in hypochondriorum & lienis passionibus & obstructionibus.

PRÆPAR.

Syrupus de Epythymo. Vid. Disp.

CCCCXXIII. Esula.

Esula herba est Linariæ conformis nisi quod hæc lacteo succo careat, quod illa gravida est, juxta versum:

*Esula lactescit, sine lacte Linaria
crescit.*

Diversa ejus sunt genera iisdem qualitatibus prædita. Ex his eligere movent pineam, i. e. quæ foliis pinum æmulatur.

Dicitur Esula vulgaris major. ʒ. Trag. Esula minor Officinar. Lob. Esula minor, Dod. Tithymalus cupressinus, 2. Tab. Tithymalus foliis pini, forte Dioscoridis Pityusa, C. B. 1. Germ. Wolffsmilch.

N. Eligenda non nimis recens.

OFFICIN.

Cortex præcipuè radicis, hinc & folia, quibus addi potest & succus, sed rarissimi usus est.

Vires. Pivuitam & serum validissimè, præcipuè per inferiora purgat, unde & Rusticorum Rhabarbarum Esula audit. Est autem acris ignea & erodens, adeo ut impudentium mendicorum fraudi inserviat, qui ejus succo cutem sibi met exulcerant scabritiei specie.

Corrigitur ejus feritas Bdellio, Tragacantho, mucilagine Psyllii. Quinimo mitescit præparatione, i. e. triduanâ in ✚ acerrimo ros. infusione ac exiccatione. Vide August.

N. Quervetanus contentus est infusione.

sione 24. hor. in Pharm. Restit. Alii singulis diebus novum acetum affundunt. Nonnulli perficiunt eandem macerationem in decocto myrobalanor. cum modico cinnomi vel spica.

PRÆPAR.

1. *Extractum Esulæ minoris Salæ.*

℞. Cortic. radice (in principio veris quando prodire incipit collecta.) q. v. coque cum Vino albo generoso in diplomate: Exprime ac inspissa: Inspissatum liquorem solve iterum in ∇ plantaginis, maceraque in MB 3. vel 4. decanta, filtra vel si opus, clarifica cum albumine ovi, & coagula.

Dosis à gr. xij. ad xx. vel plura.

2. *Aliud Extractum Esulæ, quod Rulandinum existimatur.*

℞. Rad. Esul. min. ut in officinis veneunt, q. v. coque lento Δ cum ∇ simpl. temper despumando, dum spumat ∇ m inde cola & serva, aliamque superfunde & coque collectam ∇ , leniter coagula ad spissitudinem mellis, postea affunde ∇ ad eminent. digit. j. & vase clauso in loco calido, aliquamdiu asserva. Tandem abstrahe leniter ∇ . Et relinquatur Extractum.

Vires. Feliciter ∇ inter cutem pellit, &c.

Dosis à ʒj. ad ʒj. Hartman. in Croll. Senn. in Inst. Tentzel.

Weckerus describit & Extract. Esulæ ac foliis siccis cum ∇ factum, idq; per vomitum ac alvum expurgans.

3. *Extractum Esulæ Quercetani.*

Exprime succum ex radice & foliis, fecibus remanentibus, affunde serum lactis (vel ∇ m lactis Qatam) digere & aliquot, dein exprime. Expressiones utrasque cunfusas digere in MB ut defecentur, nec quicquam amplius crassamenti deponant. Liquorem defecatum lento MB calore coagula ad consistentiam Extracti.

Dosis ad ʒß. in forma pilular. vel in liquore dissoluta.

4. *Aliter ejusdem Quercetani.*

R. Esulæ viridis contus. q. v. destilla in ∇ B (non tamen conburatur) fecibus affunde destillatam illam ∇ m, digere, ut extrahatur Tinctura. Tincturam decantatam separa ab aqua sua in MB: abstractam aquam reafunde fecibus prioribus, ex quibus parasti extractum, idque toties reparasti extractum, idque toties repetendo, donec non amplius tingatur: Ultimo exprime; expressionem prioribus Extractis adde.

N. 1. Si ex fecibus utriusque preparationis (precedentis atque hujus) combustis. Sal cum sua propria aqua extraxeris, idque extracto proprio addideris ejus purgandi vim & efficaciam validiorem reddes.

N. 2. Ad hunc modum Extracta preparabis ex Thymelæa, Mezereo & reliquis omnibus Tichymatis speciebus, & ex ipso quoque Elleboronigro. si in loco cohabitaveris, ubi recens colligi potest.

5. *Pilula de Esulæ Ferneti.* V. l. 2.

Frans.

CCCCXXIV. *Frangula.*

Alnus nigra, baccifera; C. B. 1. *frangula*, *Math.* Dod. *Alnus nigra*, *Lob.*
Cam. *Alnus baccifera*, *Tab.* *Arbor fec-*
tida, *Lon.* *Trag.* *Avornus Crescentio.*
 Germ. *Faulbaum / Zapfsholz.*

OFFICIN. NAT.

Cortex interior, potissimum *radicis.*

Vires. Purgat homines noxios omnes, maximè *serum*, tam per vomitum, quam per secessum, idque sat violentè. Ea propter corrigi solet *Cinam.* *Zinziber.* *sem. anis. fenic.* & *sim.* *Extrinsicus*, coquitur cum *butyro*, ad scabiem & similes morbos.

Dosis ad ʒij.

N. *Rusticus familiare* exhibet purgans in *hydrope* & *sim. morbis.*

CCCCXXV. *Gratiola.*

Gratiola, *Matthiol.* Dod. *Lob. Cast.*
Cam. Tab. Ger. *Limmesium* s. *centaurioides*, C. B. *alis* *Gratia Dei*, Germ. *wild Aurin.*

N. *Veteribus ignota videtur*, quamvis aliqui *papaver spumeum* *Dioscor.* alij *Eupatorium Mesue*, alij *Been album* esse velint. *Centaurida* alij faciunt nec male, cum *centaurij minoris species* esse videatur, & inter *spurias Centaurij*

minoris appellationes quoque Helleborine extet, quæ ob vires cum *Gratiola* eadem esse videtur.

Crescit in *campestribus & pratis.*

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Efficax remedium est in *humoribus aquosis*, *lentis*, *biliosisque* specificè *evacuandis*, quos vel ex remotissimis partibus trahit, atque tum per secessum, tum per vomitum expurgat. Hinc magnus ejus usus esse poterit in *Hydrope*, *lithero flavo*, &c. Et quia *amaritudine insuper dotata est insigni*, fugat *lumbricos earumq; saburram* expurgat.

Corrigitur *Cinamom. sem. anis. Glyzirrh. &c.*

Dosis foliorum *pulverisatorum ʒ.* vel *infuso ad ʒij.*

N. *Math. exhibet folior. Num. x.*

PRÆPAR.

Extractum seu succus inspissatus
Gratiola.

℞. *Fol. Gratiolæ*, (*Majore vel Autum. collect.*) exprime *succ. clarifica* & *inspissa.*

Dosis à ʒj. ad ʒʒ.

CCCCXXVI. *Hermodactylus.*

Hermodactylus est vel	{	<i>Iris tuberosa.</i>	{	<i>Hermodactylus verus</i> , <i>Math. & Tab.</i>
		<i>Colchicum</i>		<i>perniciosum. Inusitatum.</i>
		<i>Satyrium</i>		<i>non venenatum. Hoc usuale & hujus loci.</i>
		<i>Cyclamen</i>		<i>Hac officinis ignota.</i>

Dicitur *Colchicum radice siccata albâ*, C. B. 2. *Colchicum album*, *Cord. hisp.*

Hhh hhh

Hermo-

Hermodactylus legitimus, Dod. *Hermodactyli* non venenati Offic. *Lob.* *Hermodact.* Offic. *Cam. Lon.* *Hermodact.* albus, *Serapioni.* *Hermodact.* Orientalis, *Cesalpino.*

N. *Matthiolus* & *Tabernamontan.* *Hermodactylum* in Officinis usitatum esse volunt, radicem Iridis illius tuberosa, à quibus dissentiunt *Dod.* *Lob.* & alii.

OFFICIN. NAT.

Radix, quæ ad nos ex Syria afferitur.

Repetitur *Hermodactyli Radix* alba, rufa & nigra, sed eligenda quæ foris & intus verè alba, gravis, compacta, quæ leni contusione in pulverem farinæ triticæ similem facile redigitur, sapore suavi ac dulci.

Vires. Pituitam crassam, lentam, aliosque humores viscidos peculiariter à juncturis efficaciter trahit, ob id articulorum affectibus, *chiragra*, *podagra*, &c. conducit.

Dosis à $\mathfrak{z}\text{ss}$. ad $\mathfrak{z}\text{ss}$. in infusione à $\mathfrak{z}\text{ij}$. ad $\mathfrak{z}\text{ss}$.

PRÆPARATA.

Pilula de Hermodactylo. Vide apud *Augustanos.*

Dosis à $\mathfrak{z}\text{j}$. ad $\mathfrak{z}\text{iiij}$.

I.

CCCCXXVII. *Jalapa.*

Jalapa radix est, exterius nigricans, interius rufescens, radici *Mechoacæ* similis.

N. Incognita fuit majoribus, & non nisi paucos ante annos ex India ad nos transportari cepit. V. *Hortii Problem.*

Dicitur *Gialappa*, *Chelopa*, *Celopa*, *Jalapium*, vel *Gelapo*, (à Massiliensibus,) aliis *Mechoacanna nigra*, quod *Mechoacannæ* assimiletur, C. B. *Bryonia*, *Mechoacanna nigricans*, Num. 7.

Vires. Expurgat valide humores noxios omnes, imprimis autem serofos, idque citra molestiam.

Dosis à $\mathfrak{z}\text{ss}$. ad $\mathfrak{z}\text{ss}$. in infusione à $\mathfrak{z}\text{ss}$. ad $\mathfrak{z}\text{ij}$.

PRÆPARATA.

1. *Extractum Jalapæ.*

Extrahe cum V, f.a. decanta & abstrahere ad consistentiam.

Dosis à $\mathfrak{z}\text{ss}$. ad $\mathfrak{z}\text{j}$.

N. 1. *Extractum hoc* quia resinosum est, in aqueo liquore dissolvi nequit.

2. *Magisterium.*

Extrahe cum V optimo, hinc affunde aquam & præcipitatur.

Dosis ad gran. xvij. Huc refer Tinct.

N. 2. *Purgatrix potissimum* in resina *Jalapa* consistit. Ideoque si *Jalappam* adhibere volueris, vel in substantiâ, vel in Extracto aut magisterio utere, vino enim si infundatur, vires suas pro voto non communicat.

CCCCXXVIII. *Mechoacanna.*

Mechoacan, *Mon.* *Dod.* *Lon.* *Frag.* 1. & 2. *Tab.* Ger. *Mechoaca peruviana*, *Lob.* Ger. *Rhabarbarum Indicum*, *Gass.* *Bryonia*, *Mechoacanna alba*, C. B. & aliis *Rhabarbarum album*, *weiß Rhabarbar*.

OEEI-

CLASSIS III.

243

OFFICIN. NAT.

Radix ex provincia novæ Hispaniæ Mechoacan nomine ad nos allata.

Duplex habetur ratione loci: Prima ex Mechoaca Insula affertur, altera vero ex continente circa Nicaragua nata, quæ priore longe præstantior est. Eligatur recens intus albicans, extus cortice cinereo vestita, minus cariola.

Vires. Pituitosos, aquosos, serososque humores, ex toto corpore, ac in primis ex capite ac nervoso genere, pectoreque blande ac sine molestia educit. Utilissimum itaque Remedium est in Catarrhis, ac inde ortis affectibus, in Hydrope, in omnibus arthritidis speciebus, Lue Venerea, &c. Quia tamen calida & sicca est, in calidis constitutionibus ejus usus ne sit continuus.

Dosis infantibus ℥j. præter propter, Adultis à ℥j. ad ℥ij. in infusione ad ℥ss.

N. Conducit maximè infantibus in cruditate ventriculi ac pectoris viscosa mucilagine expurganda.

PRÆPAR.

1. Extractum Mechoacanna.

Extractum ut alia extracta parari potest cum V, vel secundum Quercetian. (in Pharm. rest. c. 26.) cum V aliqua Epatica, e. g. Endiviæ, succo Limoniorum vel Citriorum acidula reddita. Atri parant cum R. Hartm. in præf. verum minus rectè, quippe vis purgatrix hac ratione obtunditur.

Dosis ad ℥j.

N. Nihil lucri in hoc Extracto præ pulvere habet, præterquam quod dissolvi liquoribus possit.

2. Extractum Mechoacanna compositum.

℞. Rad. Mechoac. el. non cariola ℥ij.

Turpeth. gummos. & alb. ℥j.

Zinziberis albi ℥ij.

Polypod. querni ℥ss.

Incisis grosso modo, extrahe digerendo cum V opt. & V Beton. (quæ ab Aloe est abstracta, si adsit) ana ℥ss. exprime fortissimè, fecibus relictis aliam affunde V m Betonica, macera iterum ac exprime, expressis liquoribus adde

Mannæ puriss. ℥ij.

Scammon. mund. ℥i.

Agitando misceantur, adde

℞-i, g. v.

℞ Cinam. gr. iij.

Redige ad consistentiam extracti.

Vires. Panchymagogen est, omnes humores noxios simul educens, præcipuè autem serosos.

Dosis ℥j. plus minus. Hart. in Croll.

CCCCXXIX. Mezereum, Laureola s. Daphnoides.

Frutex est Mezereum Officinarum, cujus baccæ Officin. Cocci gnidii, s. grana cnidia vocantur.

Dicitur Chamelæa s. Mezereon, Trag. Germanicum, Lob. Chamelæa Germanica, Dod. Daphnoides, Fuchf. Hhhhhh 2 Cam.

Cam. (Epit.) flore purpureo, *Tab. Laureola major, Cast. Thimelæa, Cord. in D. Daphnis alterum, Lon. Laureola folio deciduo, flore purpureo* Officin. Laureola fœmina, *C. B. 2. Germ. Kellershalß.*

N. *Sunt qui Chamædaphnen Dioscoridis faciunt. At alii Dioscoridi ignotam fuisse volunt.*

OFFICIN. NAT.

Cortex, folia & Grana.

Vires. Mezerei vis est ignea, acerrima, exulcerans, mordens, febres accendens, cordis principumque partium vires exolvens, validissimè bilem, biliosasque, serositates purgans. Corrigitur macerando hor. 24. in aceto (ut elleborus ac Esula) succo mali punici aut Cydonii, portulaca, mucilagine sem psylli.

N. *Alii corrigunt infundendo in Vino, & iterum exiccando. Alii triduanam macerationem in \ddagger requirunt, singulis diebus novum \ddagger affundendo & tandem ∇ bene eluendo.*

Dosis, Fol. ac Cortic. Mezerei optimè præparatorum & correctorum (sine correctione exulare debent,) est gr. viij. ad xv. Grana à gr. vj. ad xv.

N. 1. *Rejiciantur fibra, dum teritur.*

N. 2. *Ob malignitatem rarissimè in usum venit.*

PRÆPARATA.

Pilula de Mezereo. Vide sis apud Augustan.

N. *Est & Mezereum Chamelæa Tricoccus, C. B. 1. Chamelæa foliis magnis & tenuibus, Mesuao. Cham.*

latif. vel alba, Serapioni. Chamelæa, Matthioli. Dod. Cord. D. Bellon. Lon. Clus. Tricoccus, Lob. Cast. Mezereum Arabum, Lob. Tricoccus, Tab. Chamelæa vera, Cam. Germ. Seidelbast. Verum officinis nostratibus non adeo vulgare, quamvis sint qui pro Mezereo officinarum habeant.

CCCCXXX. Myrobalani.

Myrobalani fructus sunt ex numero prunorum exoricorum, veteribus Græcis incogniti, ab Arabibus primum inventi.

Suntque Myrobalani

{	Chebuli	} omnes sunt n- suales.
	Citrini	
	Bellyrici	
	Indi	

 Emblici

Myr. *Cebuli* dicuntur Quebolia & Quebuli, *Arab. Miobal. Cepula, Mes. Clus. Chepulæ, Aëtuario, Matth. Gaz. Lob. Chebuli, Cord. h. Lon. Cast. Chebulæ, Tab. Ger. Myrobal. maximi oblongi, angulosi, C. B. 1.*

Citrini dicuntur Azafar, *Arab. Myrob. lutei, Aëtuar. flavæ, Garz. Lob. flavæ, Matth. & lutea, Clus. in Cord. Myrob. citrea mas citrini, Cord. hist. Lon. Lob. Cast. Ger. flavæ citrinæ luteæ, Tab. Myrobal. citrin. Bellon. Myrob. teretes citrini, C. B. 2.*

Bellyrici: Belleregi, Bellilegi, Bellegu, *Arab. Myrob. bellirica, Matth. Cord. hist. Clus. in Cord. Garz. Lob. Tab. Ger. bellirici, Lon. Cast. Myrob. rotundæ belliricæ, C. B. 3.*

Indi:

Ind: Afuar. Arab. Myrob. nigra, *Afuar. Mes. nigri, Lob. M. Inda & Damafonia & nigra, Clus. in Croll. Indica, Lob. Tab. Ger. f. nigra, Garz. Indi, Cord. hist. Cast. Myrob. nigra octangulares, C. B. 4.*

Emblci: Embelgi, Emblegi, Ambelgi, Arab. Myrob. de Seni, Serapioni, Senitica, Avicenna, Myr. Empelica, *Matth. Empelica f. Emblica, Clus. in Cor. Emblici, Cord. hist. Lob. Lon. Cast. Emblica, Lob. Tab. Ger. C. B. 5.*

Eligendi sunt carnosiores, crassiores: ponderosiores.

Vires. Myrobalani citrini seu flavi bili flava educenda apti nati sunt. Indi f. nigra, bili atra, chebuli, pinnati ac postea bili, Emblici ac Bellyrici, iidem pinnati.

Dosis à ʒvj. ad ʒiſs.

OFFICIN. NAT.

1. *Pilula de 5. generibus Myrobal.*

2. *Extractum Myrobalan.*

3. Genus Myrob. quodcumque volueris exemptis nucleis, tere partem carnosam subtiliss. Macera dies aliquot cum ∇ dein exprime & inspissa. *Sala.*

N. Alij adhibent succum pomorum redolentium, indeq; conficiunt *Extractum Myrobalanorum pomatum.*

CCCCXXXI. Polypodium.

Polypodium { vulgare. H. usuale.
minus. Dod. 2. *Matth.*
1. Tab. Esc.

Dicitur πολυπόδιον, Diosc. Polypo-

dium, *Bransf. Trag. Matth. Fuchs. Cord. hist. Lon. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. majus, Dod. C. B. 1. Germ. Engelsfuß.*

Reperitur in Fago, Corylo, in antiquis & cædis saltibus, in rudibus saxosis, præfertur tamen omnibus, quod in Quercu nascitur.

OFFICIN.

Radix.

Vires. Educt bilem adustam & pinitam lentam. Hinc utilissimum in obstructionibus Mesenterii, Epatis ac Lienis, & inde natis passionibus hypochondrior. scorbuticis. Rarò autem solum datur, sed aliis purgantibus fere admiscetur, & quia segniter purgat, plerunque in decoctis vel infusionibus, rarò in aliis formulis adhibetur.

CCCCXXXII. Psyllium.

Dioscorid. f. Indicum crenatis foliis.	{	Majus	supinum, 2. <i>Matth.</i>
			<i>Cast. Tab. Esc.</i>
			erectum, hoc usuale solum.
			Minus.

Dicitur Psyllium, *Trag. Matthiol. Fuchs. Cord. in D. & hist. Dod. Lob. Cast. Ger. 1. Tab. Germ. Psyllienkraut.*

Crescit sponte in Italia, locisq; nonnullis Germaniæ, solo gaudens aspero, nobis non nisi in hortis colitur. Floret Julio & Augusto.

OFFICIN.

Semen collectum Octobri.

Vires. Evacuat bilem flavam mucilagine

Hhhhhh 3

lagineque suâ acrimoniam humorum obtundere aptum est. Hinc convenit maxime in Dysenteria & Corrosione intestinorum.

Dosis à ℥iij. ad ℥vj. scil. ex his ▽ convenienti extrahitur mucilago propinanda, sed raro.

N. Semen psyllij hoc peculiare praecate-
ris purgantibus habet, quod qualitate re-
frigerandi sit praevalens, secus ac Mesue
statuit. Verum enim vero nec tamen ex-
tra reprehensionem positum est, quam in-
currit ratione virulentiae suae.

PRÆPARATA.

Electuarium de Psyllio.

Dosis ℥j.

R.

CCCCXXXIII. Rhabar- barum.

Paxâignov, Dioscor. Arab. Raved, &
Rhabarbarum, Romanis Raponticum
Rhabarbarum, Officin. C. B. 1. Rha-
barbarum, Garz. Acof. Fragos. Lob. 3.
Tab. 2. Ger. Rhabar. Americanum,
Monard. Rhabarbarū. Indicum, Cord.
Rheum f. Rha. Dod.

In China provenit, unde in Turci-
am, hinc Venetias deferretur & quidem
vel navibus, quod citius corrumpi-
tur, vel itinere terrestri, quod durabi-
lius.

Duplex venale prostat: alterum di-
citur Rhabarbarum de Lavantes,
quod flavius & melius: alterum Mu-
scoviticum, quod obscure flavum & vi-
lius est.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Purgat benignè bilem flavam,
pituitamq; viscosam ac tartaream in ven-
triculo, primaeque regione stabulantem.
Epatis specificè confert, adeo ut cor Epatis
dicatur, curat lilem, & quia vim quoq;
astringentem obtinet in omnibus morbis
dissolutis, Dysenteria, Diarrhaea pra alijs
commendatur.

Corrigitur $\frac{1}{3}$. Cinam. Schœnanthos,
Santal. Citrin.

N. 1. Partem tum purgantem, tum a-
stringentem obtinere creditur, quarum
prior facilius eximitur, posterior difficil-
ius. Hinc pro diversa intentione, diversi-
mode quoq; tractatur. Nonnulli levi to-
stione vim purgantem minui & astring-
entem augeri sibi imaginantur, quod alijs
improbant, nec immerito, etenim cum vis
purgans fixior sit, quam ut levi tostione
in auram evanescat, tostia illa vix satisfac-
ciet. Praestat itaque si astringentem vim
auctam velimus, rejectâ primâ decollio-
ne, denuo id coquere, ac fortissimâ expres-
sione exprimere.

N. 2. Radix Rhabarbari Monachorum
(alijs Lapathi domestici, hortensis, sati-
vi,) eandem purgandi facultatem, cum
vero Rhabarbaro habere creditur, modo
in duplo usurpetur. Hinc sunt qui pro
Rhapontico illud habent, sed malè, Rha-
ponticum quippe verum & à Rhabarbaro
Monachorum & à vero Rhabarbaro di-
versum, nonnunquam ad nos transporta-
tur. Weckerus.

Dosis

Dosis Rhabarbari veri à ʒ. ad ʒiʒ.
in infuso ad ʒʒ.

N. 3. Rhabarbarum ex omnibus ca-
tarticis est usitatissimum, sine ullo peri-
culi metu omni aetate, atq; ideo etiam pue-
ris & pregnantibus conveniens.

PRÆPARATA.

1. Rhabarbarum conditum.
Cujus dosis paulò major est crudo.
2. Syrupus de Cichorio cum Rhabarb.
(in qua solum Rhabarbarum) V. D.
3. Syrupus de Rhabarb. solutivus, in
quo part. æqu. Rhab. & fol. Senæ.

4. Syrupus Diasereos
in quo partes
Rhabarb. ʒ.
Cartham. 4.
Agaric. trochisc.
2.
Fol. Sen. i.

5. Trochisci de Rhabarb. V. D.
6. Pilula de Rhabarb. Vid. Disp.
7. Extractum Rhabarbari.

Rhabarb. el. q. v. extrahef. a.
digerendo cum ∇ dest. Epatica (En-
div. Cichor. Agrimon.) affusis aliquot
guttulis ol. Tart. per d. decanta ac ex-
prime, coagulaque ad formam Extra-
cti.

Alii addunt quoque corrigentia,
eaque simul extrahunt. Sic Quercet.
Rhabarb. lbʒ. addit Cinamo. ʒʒ.
Santali. ʒj. Extrahitque cum ∇ En-
div. succo Limonior. vel Citriorum
acidula reddita. Pharm. Rest. c. 26. Fit
quoque Extractum per ∇ Vide Wecke-
num.

Dosis ʒj. ad ʒʒ. ʒj. Acui tamen

potest Diagryd. præparat. Gummi gutt.
Elater. &c.

N. Melius est extractum simpliciter
sine corrigentibus conficere, cui si opus sit
pro intentione Medici oleum aliquod con-
veniens. E. g. Macis, anisi, & sim. admi-
sceri potest.

CCCCXXXIV. Ricinus.

Ricinus { Vulgaris. Hujus loci.
Americanus. De hoc infra.

Dicitur *κινι*, Diosc. Plin. Ricinus,
Trag. Matthiol. Fuchf. Dod. Cord. Lon.
Lob. Cast. Tab. vulgaris, Cam. C.B.I. Ga-
taputia major, Fragos. Granum regium
majus, Mesnao, alius, Palma Christi. A-
rab. Alkaroa & Kerva. Germ. *Bun-
derbaum*.

Colitur in hortis, tùm ob raritatem,
tùm ob talpas, quæ ejus præsentiam fu-
gere dicuntur.

OFFICIN. NAT.

Semen seu Nuclei cortice suo triqua-
tro echinato exuti.

Vires. Potenter bilem & pituitam aro-
matizant pellit, calfi. & sicc.

Dosis. Nuclei N. xij. plus minus.

N. Rarissimi iidem usus est.

PRÆPAR.

Oleum ex semine expressum, quod di-
citur oleum de Kerva. V. D.

N. Oleum hoc dicunt oleum ficus in-
fernalis.

CCCCXXXV. Ricinus

Americus.

Est & genus Ricini, quod ante an-
nos aliquot. ex America adferri ce-
pit.

pit, vulgari paulo majus, cujus operimentum seu siliqua, quæ semina continet, tuberculis asperis non est obsita, ut in vulgari, sed levis & cinerei coloris: ipsum granum sive semen vulgari simile est, nigrum tamen & non maculosum, nucleumque continet solidum.

Nominatur Ricinus Americus, Lob. Tab. Clus. in Monard. Ricinus Americanus, C. B. 1. aliis curcas. Vulgo Grana tiglia. Ubi tamen notandum Granadillam Monardo grana esse ab his diversa & granati seminibus similia.

Vires. Valenter supernè ac infernè purgat.

Dosis. Nucleus unus excorticatus, vel solum dimidium nuclei.

S.

CCCCXXXVI. Senna.

Senna { Alexandrina f. foliis acutis. Hac
 præstantissima.
C. B. { Italica f. foliis obtusis. Hac priori
 substituuntur.

Priori inscribitur Senna Alexandrina, Trag. Cam. Orientalis, Bellon. Lob. Tab. Ger. aliis Egyptiaca, Syriaca.

Altera dicitur Senna, Hermolac. Sena, Matth. Fuch. Dod. Cord. b. Lon. Lob. Cast. Italica, Trag. Tab. Ger. Cam. altera media dicta, Bellon. aliis nostras.

N. Veteribus Græcis indicta videtur, primum à Serapione descripta.

OFFICIN. NAT.

Folia, tùm quoque folliculi, sed raro. N. Folia præscribuntur ut plurimum f. st. i. e. sine stipitibus, à quibus eligendo seligendoq. separantur.

Vires. Senna inter purgantia usitatissima est, adustos ac serosos humores & hinc flavam bilem pituitamque ex Capite, Epate, Liene, continuatoq. usu juncturis sine noxa sat benignè educens. Excitat tamen nonnunquam tormina, id quod ex abundantia pituita vitrea seu mucilaginis acris evenire nonnulli volunt. Verum rectius sentire videntur, qui id crudiori ac magis terrestri sena particula, forti expressione prolecta, adscribunt. Quia autem calida ac sicca (1.) corrigitur flor. viol. Borrag. Prun. & quo minus ventriculo obesse possit, additur Cinam. Galang. Zinzib. &c.

Exhiberi potest omni ætati & vel ipsi prægnantibus.

Dosis in subst. à ʒss. ad ʒiſs. in infus. à ʒiſs. ad ʒß. vel ad plures vices ʒi. ij.

N. Adhibetur & extrinsecus ad melancholiam capitis arcendam (in lotionibus capitis).

PRÆPAR.

1. Pulvis senæ Montag. V. D.

2. Syrupus folior. senæ. V. D.

3. Syrupus de pomis Reg. Sab. V. D.

N. Potest Syrupus senæ parari cum fructu, ut est in Pharm. Poterit p. 122. Acui potest ap. extrahens aliquot gutt. Mus, Oli aut Tartari.

4. Ele-

4. *Electuar. Diabelzemer. f. Senna-*
tum Renod.

5. *Pallula laxativa. Vid. Disp.*

6. *Extractum.*

℞. Fol. Senæ Alexand. ʒj. affunde ∇
simpl. ferventem (acuatam sibi libet ali-
quot guttis ol. Tart. per d.) ʒviij. Ex-
trahe, exprimeque leniter, clarifica sin-
spissa ad consistentiam justam.

N. 1. *Alij extrahunt macerando cum*
∇ stillat. pomor. redol. Beguin. Quer-
cet. *Alij cum ∇ Lupuli. Scolopend. Bor-*
rag. Fumar. addita portione alia Caryo-
phill. Zinzib. sem. fœnic. August.

Dosis à ʒiʒ. ad ʒj. & ultra.

N. *Extractionem & usdem foliis se-*
cundo ne repetas: gravia nimirum tor-
mina excitare solet.

7. *Tinctura Sen. aut Rhabarb. ex*
communicatione S. Closs.

℞. Fol. Orient. vel Rhabarb. ʒʒ. Sal.
nit. tantundem, reduc. in pulv. qui ac-
census cum carbone ignito detonet in
✕ lo, cinerem solve in Acet. destill. aut
V, solum filtra & evapora, solvatur
denud in aq. ros. filtreturque addendo
ʒij rhei aut fol. Sen. in pulv. redact. di-
gere per 4. aut 5. horas.

Dos. *huius tinctura sint cochl. ij. in ju-*
sculo. *Ita reliqua purgantia in Tinctura*
adducuntur.

CCCCXXXVII. *Soldanella.*

Κράμβη θαλασσία, Diosc. Soldanella,
Tod. Lon. Lob. Iab. Marina Ger. Bras-
sica marina, Matth. Cord. Lon. Cast.
Cam. Soldan. maritima minor, C. B. 2.
Germ. Meerwinden.

Crescit in locis maritimis Italiae, Gal-
liae, inferioris Germaniae Floret aesta-
te.

OFFICIN. NAT.

Herbasen Folia ad nos ex Gallia al-
lata.

Vires, *Calif. & sicc. 3. Aquam valide*
educit adeoq; confert in hydrope, scorbu-
to, &c. Corrigitur cum stomachicis Zin-
zib. Mac. Cinam. sem. anis. &c.

Dosis in substant. à ʒʒ. ad ʒj.

PRÆPARATA.

Succus inspissatus.

CCCCXXXVIII. *Spina in-*
fectoria.

Rhamnus Catarcticus, C. B. 6. Rha-
nus solutivus, Dod. Ger. Rhamni alia
species, Trag. spina infectoria, Matth.
Bellon. Lob. Cast. Clus. hist. Tab. Cervi
spina, Cord. hist. spina alba, Lon. Germ.
Wegdorn/Creukbeer.

Crescit juxta sepes in sylvis, aliis-
que locis incultis, amans scrobes & ri-
vulos, familiaresque est tractui circa
Rhenum. Floret Majo, fructus fert
Autumno.

OFFICIN. NAT.

Bacca collectæ in fine Septembris,
aut initio Octobris.

Vires. *Purgant bilem, pituitam ac ma-*
xime serosos humores unde usus præcip. in
Cachexia, Hydrope, Arthritide.

Dosis baccar à N. xv. ad xx. vel aridæ
baccæ teruntur, daturque pulvis à ʒj.
ad ʒiʒ. in decoctione coquuntur bac-
cæ Num. 40. vel 60.

lii iii

PRÆ-

PRÆPARATA.

1. Succus ex bacis expressus.
2. Syrupus de spina insectoria s. Syrupus domesticus. Syr. de Spina Cervina. Fit ex succo ac melle additis corrigentibus.

Dosis ʒj. ʒiſ. V. D.

N. Ex bacis immaturis fit luteus color, ex maturis; Viridis (Cassia gr.)

3. Extractum Rhamni & Tithymalorum omnium S. Cloſſ.

Contundantur Rhamni baccæ, vel Tithymali cum toto, & inter pistandum irrorentur aceto rosar. succum exprime, clarifica, tortivæ hujus materiæ retrimentum calcina, addito pari pondere Sal. nit. & extrahe salem cum Acer, destill. quem succo remisce ad Extracti consistentiam redige, quod longè purius erit, si denuo solvatur in aq. ros. addaturque ʒſ. ol. Sulphur. campanarii, filtretur & evaporetur ut prius.

Dosis gr. viij. in juscuto.

N. Sic quoq; Cucumer agrestis & Rad. Helleb. in extracta redigi possunt, affuso vino alb. loco aceti, in quo rad. per horam unam aut alteram decoquantur.

CCCCXXXIX. Staphisagria.

Staphis agria descripta est supra. Hujus loci semen est, quod purgat per vomitum, sed rarissimi usus est.

Dosis gr. 12. vel 15.

T.

CCCCXL. Turpethum.

- | | | |
|------------------|---|--|
| Turpethū
C.B. | { | 1. Arabum s. Turbit. officinarum. |
| | | 2. Indicum Turbit. Garz. Acoſt. Trag. Dod. |
| | | 3. Garganicum s. pseudo Turpetum, Matth. |

1. Dicitur Turbith Mesuæi, Matth. Turbitum s. turbit Arabum, Cord. b. 1. Alexandrinum, Lob. Ger. Cast. Thapsiæ radix, Fuchs. Turpetum, Tab.

N. Hoc esse quod in officinis nſitatum est, authores sunt, Cluſ. in Garz. Matt. & alii quam plurimi.

2. Dicitur Turpetum repens foliis Altheæ, C.B.

N. Hoc esse verum officinarum Turbith defendit Garzias, & hoc Dodonæus, &c.

3. Nihil aliud est, (teste Matthiolo,) quam radix vel Thapsiæ, vel pityusiæ, ex Gargano Apuliæ monte allatæ, vel (teste Cluſio in Garziam,) Scammonæ Radix, loco veri Turbith venundata.

OFFICIN. NAT.

Cortex seu Radix à medulla lignosa sequestrata.

Vires. Calf. 3. crassos viscososq; humores, sive pituitam fortiter & à remotioribus partibus, juncturisque elicit: unde & diuturnis morbis maximè conducit. In primis proficuum ejus usus est in Arthritide, ventriculo pituita abūdante, Asthma re, Læe venerea, Hydropse, Elephantasi, scabie, &c.

Quia

Quia venterculo nauscam & vomitum procreare per se solet, corrigitur Zinzibere, Mastiche, Pipere, Cinam. Fœnicul.

Dosis à ℥ij. ad ℥iij. in infusione à ℥j. ad ℥iij.

N. Infantibus ac gravidis dare caveto.

PRÆPAR.

1. Species Diaturbith. C. Rhab. V. D.

2. Pulvis Stockstaldi, dictus. V. D.

3. Pilula de Turbith. Stomachica Me-
sua. V. D.

4. Acetum de Turbith. Varii generis.
Vires. Commendatur in Peste, sitque
ex Turbith. ruta, myrrha, aloë, aliisque
putredinem arcentibus in ✕ infusis.

4. Extractum.

N. Quia Turbethum resinosum est,
seu ut ajunt gummosum, convenit cum V
Extractum ejus conficere.

Dosis hujus Extract. à gr. vj. ad x. &
plura.

CCCCXLI. Tamarindi.

Tamarindus Serapioni. Tamarindi
Math. Bellon. Garz. Acoft. Fragos. Lob.
Alpin. Tamarindi, dactyli Indi, Me-
sua Thamarindus, i. e. Acacia Indica,
Cord. hist. Thamarindi, Cam. Epit.
Palmæ sylvest. fructus oxyphænica,
Lon. Cast. Siliqua Arabica, quæ Tama-
rindus, C. B. 3.

OFFICIN. NAT.

Dactyli acidi (sic dicti ab Arabico
Tamar quod dactylus est: dicuntur &
δξύφοινα palmulæ acidæ, non quod
fructus palmæ arboris sint. Arbore
nim Tamarindifera instar Fraxini pro-
cera est.)

Eligendi recentes, nigro-rufescentes
teneri, multis villis intertexti, pingues,
acidissimi, vinosi.

Vires. Refriger. & sicc. 2. humorum
acrimoniam & fervorem reprimunt, bi-
lem ac adustos humores blandè ducunt,
sui succurrunt,

Dosis à ℥ij. ad ℥iij. in Decocto. Alii
à ℥ss. ad ℥j.

N. Parum nutrimenti subministrant.

PRÆPAR.

Pulpa Tamarindor. V. D.

Dosis ab ℥j. ad ℥ij.

Sunt qui paulo aliter hanc pulpam
depuratam conficiunt. Extractum Ef-
sentiamvè Tamarindorum vocant. R.
Tamarind. q. v. coque in f. q. aquæ. Ex-
prime, clarifica cum albumine ovi ac
inspissa.

Dosis à ℥ss. ad ℥j. & ultra.

N. Fit & Tart. ex Tamarindis l. a. sed
minimè purgat. Sala.

Electuarium Diaphanicum. V. D.

El. de Tamar. Horstij.

CLASSIS IV.

DE PURGANTIBUS SECUNDARIIS.

A.

CCCCXLII. Aloë.

Aloë est succus sapore amarissi-

mus, qui ex Arabia & Ægypto ad
nos pellibus involutus, deportatur.

Genera ejus moderno tempore offi-

lissimi 2 cinis

cinis in usu sunt 4. quæ tamen non nisi puritate & impuritate discrepant. Nam *Aloës crassamentum* s. pars impurior arenosa, fortibus conspurcata & idcirco nigricans, dicitur *Aloë caballina*: pars paulo prior, colorem hepatis referens, *Hepatica*: adhuc purior, succotrina vocatur, quasi succo citrina; quod pulvis ejus citrini coloris sit, vel succotrina ab Insula Socotra, ubi copiosè crescit: pars purissima, si adeò depurata ut transparens sit, lucida dicitur, quod scil. radiis solaribus objecta pellucida instar vitri appareat.

Optima lucida est atque sine ulteriori præparatione in usum medicum accersi apta. Lucidæ succedit Succotrina & Hepatica.

N. *Caballina*, *Caballis* seu *Equis* exhiberi debet, non hominibus.

Censetur Aloë bona, quæ pura, eximie amara, sub flava, difficilis solutu ac fractu. Hinc, quantò Aloë purior, amarior, flavior, tantò quoque melior est. Nigra enim & fractu contumax, reprobanda, ceu adulterata.

Aloë, C.B. 1. vulgaris. *Hujus loci.*

est 2. folio in oblongum aculeum abeunte.

1. Dicitur Aloë, *Trag. Matth. Fuchs. Dod Cord. Lon. Lob. Cast. Garz. Clus. h. communis, Cam.* Ex hac exprimitur succus, qui inspissatus Aloën hujus loci exhibet.

2. Est sempervivum illud folio mucronato, quod de tabulatis cæna-

colorum suspensum diutinè virefcit, præsertim si luto radix circum-ligetur & subinde irrigetur. Dicitur Aloë Americana.

Vires. Vim præter purgantem obtinet & exsiccantem (gr. 3.) calfacientemq; (gr. 2.) proritat hemorrhoides & menses, roborat ventriculum, enecat & expellit lumbricos, arceat putredinem, astringit, consolidat, extergit, adeoque vulneraria est insignis.

PRÆPARATA.

1. Aloë depurata, sive lota.

℞. Aloës q. v. pulveris. solve in ∇, quod arenosum subsidet, abjice: pinguißimum e contra & quod leve est, recipere.

N. 1. Sunt qui ∇ Endiv. vel Cichor. Acetosavè adhibet. Alij ut augeatur vis purgatrix, decoctum purgans loco ∇ substituant.

N. 2. Aloë constat parte resinosa & aquea: illa purgationi inutilis est, hac idonea. Eapropter, si aloen purgantem expetis, neglecta resinosa, aqueam collige, in ∇ solubilem, eamque à fecibus sequestratam.

2. Balsamus sive Extractum Aloë.

℞. Aloës succotrin. q. v. extrahe rubedinem, s. a. cum V rectif. decanta, filtra, coagulaque ad consistentiam aloë debitam, *Pharmacop. Aug.*

Vires. Ex superioribus collige.

Dosis à ℥j. ad ʒß.

N. Aliam quoq; extractionem scil.

cura

cum Acet. destill. & ▽ rosar. Vide filibet in Pharmacop. Augustan. sub Extracto Holagogo Andernaci.

3. *Aloe violata.*

R. Aloës puriss. grossè contusæ lbj. i. infusionis violarum, (ex triplici infusione, vide Syrup. violar.) lbij. clarifica, digere, ut solvatur aloë, cola ac coagula leni calore ad consistentiam pilularem.

Dosis à ʒß. ad ʒß. Sala de Essentiis.

4. *Aloe violata Tartarea.*

R. Aloës violatæ lbj. j. Crystal. Tart. lb. ss. misce.

N. Sala vocat Aloedarium Tartaro violatum.

Dosis à ʒß. ad ʒj.

5. *Aloe Rosata.*

Fiteodem modo (quo Violata) cum succo Rosar. & ex eadem cum vino F. pilulæ. Vide Pharm. August.

6. *Aloe rosata Hieronymi ab Aqua pendente.*

R. Aloës puræ pulveris. q. v. impasta cum succ. Rosar. Damasc. seu provincialium: exicca leni calore ætivi solis; iterumque impasta; idque toties, donec Aloe sedecim succi partes imberit, reservetur dein in massæ pilulari pro usu.

Dosis ad ʒiß.

7. *Eadem aliter.*

R. Aloës puriss. lbj. j. succ. Rosar. Damasc. lbß. coagulentur ad ignem, idque repetatur bis veltër, sic habetur Aloe rosata optima.

N. Corrigitur quoque cum spir. G. Vide Scammonium.

8. *Oleum Aloës purgans.*

R. Aloëpat. lbj.

Myrrh. ʒij.

Thuris ʒß.

Destilla lento ▽ incineribus ex cucurbita humili.

Vires. Umbilico illitum purgat & expellit lumbricos.

E.

CCCCXLIII. *Elaterium.*

Ελατήριον, Elaterium succus est amarus, Ex fructu cucumeris asinini expressus inspissatus.

N. Omnium succor. hic maxime durabilis est, adeo ut ultra centum annos efficax manere credatur.

Cucumis asininus describitur Cucumis agrestis, Brunf. Cord. in D. Cucumis sylvestris, Trag. Matth. Fuchs. Dod. Lon. Cast. Cucumer Elaterii sylvestr. Lob. Cucum. asininus, Tab. Ger. Elaterium quod leve & candidum & igne instar pinguedinis accenditur, Bellon.

Eligatur Elaterium vetustum, summe amarum.

N. Elaterium à bimatu ad decennium colore candido, utile Dioscoridi: Agineta, quod anno antiquius non est, & quod virefcit: Theophrasto optimū, quod vetustissimum.

Vires. Purgans est violentum humoris serosi: movet menses, foetumque inter-

interimit, underrarus ejus usus, præcipue cum nec malignitate careat.

PRÆPAR.

1. *Elaterium depuratum.*

2. *Elat. correctum.*

N. Depurari potest, si in ∇ solvatur ac siltretur, quod facili fieri potest negotio, siquidem ut plurimum liquidum extet.

Corrigitur cum spir. Θ i & oleis ut de Scammoneo dictum.

3. Fit etiam *Extractum* ex depurato succo per Ψ , ut & Fœcula ex succo cucumerum maturorum per subfidentiam, cujus vires vide in observat. *Henn. ab Heer.*

Dosis gr. j. ac ij.

CCCCXLIV. *Euphorbium.*

Ευφορβιον , Euphorbium succus est concretus accerrimus, ex sauciata Lybica Ferula ejusdem nominis extractus.

N. 1. *Modum extrahendi docet Dioscorid.* Videatur Matth. Dodon. Lob. Lon. Tab. Ger.

N. 2. *Dodoneus Euphorbium, (unde succus ille extrahitur,) plantam esse perhibet. Dioscorides arborem: contradietione haud difficili conciliatâ. Sunt enim planta quæ temporis progressu, vel diligenti cultura arborescunt, cujus rei exemplum, & in hac civitate præbuit arborescens Ruta frutex.*

Genera Euphorbii sunt duo:

1. *Sarcocollæ modo pellucidum flavum, pisi magnitudine in guttas 2-*

quales densatum, modicè cavernosum
2. In utriculis, quibus excipitur, in massam densatur candicantem, aut vitri colore.

Dosis à gr. v. ad x.

N. *Adulteratur admixtis Sarcocolla aut Gummi atq; liquore Tühymalli.*

Eligendum est purum, translucens, candidum aut flavum & acre, quod levilinguæ contactu os accensum diu detinet. Annotinum, nimirum per æratem perfectionem suscipere creditur, acrimonia cum tempore mitiore reddita. Recens improbandum, ceu virium violentia suspectum.

Vires. *Insignem quidem vim obtinet serum ac aquas ex toto corpore purgandi. Verum enim vero non sine violentia ac molestia, quam præter substantia proprietatem malignam, & vi inflammandi (calidum e. est gr. 4.) exerit.*

PRÆPARATA.

Correctum Euphorbium.

Correctio Euphorbii consistit partim in partium acrium volatilium abolitione, partim in residuarum malignarum ac calidarum mitigatione, quod fit.

1. & Euphorb. purificati ab omnibus fecibus q. v. redige in exigua frustula ac inde pomo Citrio vel Limonio excavato, massaque panis obvoluto, coque in clibano: Euphorbium dein sic præparatum, (quod albißimum) vase vitreo serva. *Quercet. Pharm. Rest.*

N. *Augustana Pharmacopœa initio Euphor-*

Euphorbium cum Ol. Amygdal. dulc. q. s. instar collry terere ac massam dein pomò imponere jubet.

2. *Correctio Euphorbii.*

Solve Euphorbium in ☿ rosato, cola & inspissa abluque ∇ Rosarum.

3. *Correctio prastantior.*

℞. Euphorbii (prastat quod primâ correctione correctum,) q. v. affunde succum Limon, vel Granat. acid. depuratum, ad eminent. digit. 3. vel 4. solve digerendo in MB, filtra calidè ac coagula. *Querc. Ph. R.*

4. *Correctio prastantissima.*

Solve Euphorbium cum phlegmate Oli, totali & integro suo spiritu imprægnato, vel cum aquis citonior, pomorumvè curti pendulorum, oleo, Sulphuris per C. vel spiritu Oli acuat, decanta vel filtra & coagula. *Querc. dist. loc.*

5. *Extractum Euphorbii.*

℞. Euphorb. opt. depurat. (ut supra cum ☿ rosar.) extrahe cum V, decanta, coagula & denuo circula cum novâ alcoole (8. & 10.) dein separato menstruo coagula Δ lento addendo aliquod correctorium pro libitu: fiat mixtura.

Vires. Paralyf, Arthritidi, Spasmo, Hydropique conducit, pituitam nervis impactam expurgando ducit.

6. *Ol. Euphorb. stillat.*

7. *Ol. Euphorb. commune.*

℞. Euphorb. 3℔. Ol. Cheirin. 3v. vinigeneros. 3v. coq. ad consumptionem vini.

Præparata illa communiora, quæ Euphorbium ceu basis ingreditur sunt *Hiera Logadij.*

Pilula de Euphorbio, &c. Vid. l. 3.

Sternutator. Colon.

G.

CCCCXLV. *Ghitta,*

lemon.

Gutta Gamandra, Gummi gotta, Gutta gemau, Cattagauma vel gemu, Gummi Peruanum s. de Peru, de Jemu, de Gemandra; aliis succus Cambici vel Crambici.

Est succus concretus aut inspissatus (potius quam Gummi,) Cujus autem plantæ succus fit, nondum certò constat. Sunt enim qui ad Esulam, ad caputiam majorem, ad flores Ricini Indi originem ejus referant, coloremque aliunde. (E.g. ex Curcuma) conciliatum volunt, alii Euphorbii succum censent: aliis ex Scammonio & Tithymallo compositus est: nonnulli compositum ex Chelidoniæ majoris succo, Scammonea & Croco suspicantur: alii ex succo corticis mediani Frangulæ. Nos præcipuè de Usu solliciti, eligere suademus, putum, flavique coloris.

Adfertur ex Sinarum regione, primumque adferri cepit ante annos 40. Videatur *Clus. lib. 4. exor. cap. 8. succ. 11.*

N. Videtur esse Gummi contra podagram Monardi.

Vires. Expurgat per superiora & inferiora, præcipuè humores serosos & aquo-

aquosos, tunc quoque omnem saburram vitiosorum humorum ex toto corpore educit. Hinc usus ejus creber est in hydropse, Febri, scabie, pruritu & sim.

Dosis à gr. v. ad xiiij.

PRÆPARATA.

Etsi crudum quidem, non citra commodum adhiberi queat, attamen cum nauseabundam possideat qualitatem, operæ precium duxerunt, hanc obtundere. Unde

1. *Ghitta Jemu correctum per spir.*

⊖ aut Tart. Mindereri.

℞. Ghitta Jemu q. v. dissolve cum spir. ⊖ : abstrahatur dein spir. ⊖ residuumque exiccetur, lentè, ne scil. nigrescat, sed colorem suum retineat.

N. 1. *Edulcora si volueris ∇ aliquoties ablue.*

N. 2. *Procedit feliciter correctio ad modum quem habes de Scammonio: vel Gummi Gutta terna vice cum spir. ⊖ aut + imbibe, tere & exicca.*

Dosis à gr. xv. ad xx.

2. *Extractum s. Magisterium.*

℞. Gitta Jemu pulv. ℥ij. ∇ opt. ℥viiij. fiat solutio, digerendo in MB. 8 aliquot (2. 3. 4.) desanta & filtra calidè, præcipita affundendo ∇ ros. (vel aliam aliquam,) abstrahere ∇ & coagula lente.

N. 1. *Melius succedat processus.*

℞. Ghitta Gem. ℥ij. ∇ opt. ℥v. 8 Tartari ℥j. digere, & solvetur in MB brevitempore.

N. 2. *Sunt qui ℞. ∇ Santali tincturâ imprægnatum.*

3. *Magisterium G. G. S. Clossai, sive Gammandra correctâ.*

Imbibatur pulvis Chittæ Jemon. ol. Tart. deliquioso, ita ut lique scat instar pastæ, malaxetur diutissimè in mortario, terendo pistillo vitreo, donec colorem mutet, affunde ∇ Tartarifatam, macera per 15. horas in tali calore, qui colliquando solvendoque gummati non sit satis, decanta, malaxa ut prius, addito novo ol. Tartari, idque tertiâ vice reitera, tandem albescentem hanc materiam lava pluries aq. ros. & ex illa desiccata Tabellas aut trochiscos fingere.

Vires *Leniter & absq. vomitus* provocatione operationes suas in plerisq. absolunt.

Integrum doctumque Tractatum de Gitta Jemon conscripsit Clariss. Dn. D. Joan Petrus Lottichius, Marpurgi Med. Professor publ. amicus meus singularis, ad quem Lectorem remitto.

M.

CCCCXLVI. Manna.

Δροσόμελι & ἀργέλι, Galen. Mel ex aëre, cui cœlestis natura, Plinio. Men Siracost & Terniabin, Arab. Thereniabin & Trungibin, Terengibil, Serapioni & Avicenna. Manna purgatoria, Math. Drosomeli, Cord. hist.

Est

Est ros sive liquor suavis, qui ex aëre sublucanis temporibus decidens arborum ramis & frondibus, hinc herbis, lapidibus & solo interdum invenitur inhaerere, brevi tempore coalescens, grumofus instar gummi apparet.

Manna { Liquida Terebinthin, strictè itaque { Bellon lib. 2. obs c. 65.
cum { Du- { Mastichina } Ha Off-
est. { rior { Granata } cinales.

Pro diversitate regionum est Manna Orientalis, s. Syriaca, Persica, Calabrica, Goritiana, Tridentina, Briansonensis.

N. Meminit & Garzias Manna Granata instar seminis Coriandri, qua nobis penitus incognita, nisi intellectum velit graminis semen, Manna nomine veniens, de quo supra Class. I.

Ex his etsi Syriaca laudem omnibus præripiat: attamen nostratibus in Officinis primas damus Calabrienfi & præcipue granatæ, i. e. quæ granulis minoribus constat, vulgus Mannam foliorum vocat, quod scil. de arboribus colligatur. Hac inferior est mastichina, i. e. quæ granis majoribus & mastichis guttis prope æqualibus est. Dicunt mannam corporis, quod de ramis colligatur vel impetu ventorum in terram delabatur.

Eligenda candida, recens, anno non vetustior: ruffa enim & fusca inveterata est. Adulteratur saccharo penidio, herbarum foliis circumvoluto. Sic quoque quæ Sennæ folia granis suis

amplectitur factitia est, C. B. Fit quoque Manna factitia ex amylo Manna, Scammonea semine aliquo & radice lacticia, Christ. Acoft. cap. 8.

Vires. Temperata est ad caliditatem reclinans, guttur, asperam arteriam, thoracemque leniens, alvum blandè movens, bilem serososque humores educens

Dosis infantibus à ℥ij. ad ℥ss. adultis ab ℥ss. ad ℥iij. & ℥iij.

N. Quia facile bile scit, in febribus, nisi frigida admista fuerint, non adeo conveniens censetur.

PRÆPAR.

1. Electuar. Diacassia cum Manna. Vide Disp.

2. Electuar. Lentivum de Manna. Vide Disp.

3. Manna Tartarisata s. Tabula de Manna.

Fiunt ex manna soluta & purgata, quæ more communi in tabulas effunditur, additur ad Mannæ ℥j. Cremor. Tartari ℥j.

4. Manna liquida.

℞. Mann. Calab. ℥iij.

Crem. Tartari ℥ij.

Aq. stillat. pro libitu ℥v.

Tartarum prima aquis optimè solvatur, hoc facto, lento igne manna, quæ omnia calidè per linteum trajicienda, & cum albumine ovi clarific. in modum syrup. Cui ad conciliandum gratum odorem aqua cinam. vel simile quid affundi potest.

Ex communicatione D. D. Joh. Kiefer.

Kkk kkk

℥. Spi-

5. Spiritus Manna.

℞. Mannæ l. q. v. destilla Δ lento
ex Cucurbita, & habebis spiritum infu-
pidum.

Vires. Sudorificum insigne est in fe-
bribus tum pestilentialibus, tum commu-
nibus, sudorem propellens admodum fœ-
tidum.

Dosis ad cochlear. j.

Solvit itidem Sulphur, unde Tin-
ctura Sulphuris flava Cl. Dn. D. Helvic.
Dietericus, Medicus Electoris Brandeb.
Princip. Dan. & Holsat. amicus meus
integerrimus.

6. Spiritus Manna alius.

Dissolvatur Manna rore Majali, &
tamdiu cohobetur donec sublimetur
in caput XXI instar nivis. Hic ℞ in
spiritu fluidam naturam redactus fit
solutivum Solis mineralis, seposita om-
ni vi corrosiva. *Beckerus in Hermete
redivivo.*

7. Syr. de Manna laxativus.

Dn. D. Echoldi.

℞. Polypod. q. 3vj.
Rad. Ireos Flor. 3℔.
Passul. min. ping. & incif. 3iij.
Fl. Violar.
Borrag.
Bugloss. anap j.
Sen. s. st. 3℔.
Cinam. 3℔.
Aq. muls. lbij.

Coque omnia s. a. ad consumpt. lib.
1. Coletur & exprimatur. Incolatu-
ra dissolve.

Mann. calabr. 3iij.

Sacchar. penid.

Cand. alb. an. 3j.

Coq. ad consist. syrupi, addendo in
fine aq. Cinamo. parum.

Dosis 3j. ad 3ij. & ultra.

CCCCXLVII. Opopanax.

Opopanax quid sit & quodnam
optimum, vide supra, hoc loco illius
purgandi facultatem describemus, quâ
educit phlegma crassum & viscosum,
non solum e mesenterio s. regione pri-
ma, sed & idem allicit à partibus remo-
tis & juncturis, adeoq; mundificat ce-
rebrum, nervos, pectus; tussi antiquæ
confert: potum cum aceto hora una
ante accessionem febrilem, arcet rigo-
rem, maximè si idem opopanax cum
succo apii ac oleo anethino spinæ illina-
tur.

Dosis à 3℔. ad 3j.

Corrigitur spica & mastiche.

PRÆPAR.

1. Opopanax depuratus, Fit solvendo
(in \star) colando & inspissando.

2. Extractum. Fit ut Euphorbii.

Dosis à 3℔. ad 3j.

3. Pilula de Opopanaco com. V. D.

Dosis 3j.

4. Oleum stillat. (ex XX per cinerem.)

Sagapenum. Vide Class. 2.

CCCCXLVIII. Scammonium.

Scammonium, Scammoneum;
Scammonia, Scammonea. Est succus
ex radice Scammonæ, plantæ lacteo
succo

succo plenā, extractus & inspissatus. Extrahitur autem vel radicem adhuc crescentem incidendo (vid. Diosc.) vel eadem (dubio procul cum foliis & caule,) prælo submittendo.

Scammonia { Syriaca, hac hujus loci.
planta est { Monspelaca, Valentina

Dicitur *Σκαμμόνια*, Diosc. Theophr. Scammonia, Matth. Lon. Cast. Sammonia, Cord. in D. Antiochena, Cam. Scammonium, Cord. hist. Dod. Syriacum, Lob. Syricca, C. B. 1.

Optimum est quod ex Antiochia affertur, dein Armenium, Europæum omnino parvum est. Probatum quod nitidum, splendidum, (instar gummi) rarum, citò liquefcens, friabile, colore cum frangitur, fulvo, non valde ponderosum, tactu linguæ lactescens, nec vehementer eam calefaciens, (nimirum hoc Tithymalli admisti argumentum est.) Quod ab his notis recedit, tantò pejus existit, quantò longius recesseris. Improbantur glebæ ingentes, nigrae, graves, nimirum aut adulteratae hæ sunt, aut succus ex tota planta expressus.

Dosis à gr. v. ad x. vel xij.

Vires. Expurgat valde humores biliosos, acres, serfos, adeoque creberrimè usus est, non modo per se, sed & cum aliis permistum.

N. Cum magna sit acrimonia intenseque caliditatis & siccitatis, insensa malignitatis, mordacis flatulentia, excessiva attractionis, adeoque apertum na-

rum quod intestina erodat, viscera, cor, &c. conturbet, ventriculū flatibus mordacibus laceffat, vi suā calfactoriā ac exiccatoriā (quas 3. gr. obtinet) inflamet, & consequenter febres producat, vi attractoriā hypercatharses introducat, correctione opus habet, hanc alijs aliter instituum. Hinc.

PRÆPARATA.

1. Scammonium correctum per Cydonium, i. e. Diagridium.

2. Scammonium tritum, coque in malo Cydonio excavato pasta circumdato, exemptum dein diagrydium serva pro usu.

N. 1. Hæc elaboratio est Gall. 1. c. 1. de aliment. facult. ubi interna malicotonij acetabula semini destinata excavat, eaq; Scammonio replet ac coquit.

N. 2. Antiquum imbecillum est, ideoq; flatulentum, bimum est optimum.

N. 3. Dicitur Diagridium, Diagrydium, Diagerydium.

2. Scammonium defecatum per succum Citonior.

Solve Scammonium (vel diagrydium) in succo calido Citonior. Rosarumve pallidarum aut Damascenarum s. a. decanta à fecibus ac coagula.

N. 1. Quercetanus veram Scammonij præparationem fieri cum succo Limoniorum ait, cum quo procedit ut dictum Vide Pharmacop. c. 15. Alij cum succo Citri.

N. 2. Crollius imbibit Diagridium puriss succo clarificato Ros. pallidar. vel
Kkkkkk 2 Sylve.

Sylvestrium,) forte *Damascenar. sen. Pro-*
vincialium) addit spir. *⊖* guttam unam
 vel alteram, atque exiccat calore solis vel
 retrofornacem, idque reperit multoties
 (20. vel 30.)

Dosis à gr. vj. ad xij.

N. 3. *Brendelius* dissolvit *Scammoni-*
um in ∇ destillata aëtu frigida. Sic sub-
 sidet picea quadam substantia, à qua de-
 cantat liquorem supernatantem; idq. re-
 petit, novam scil. ∇ affundendo, quoties
 ∇ albicantem colorem contraxerit. Coa-
 gulat dein decantatas ∇ s. leni calore ad
 siccitatem.

Dosis ad gr. xij. &c. *Brendel, in*
Chym.

3. *Extractum* per spiritum Vini, *Ma-*
gisterium s. *Resina Scammonii*,
Pulvis Syrius.

2. *Scammonii* purissimi grossè tri-
 ti ℥ij . V opt. ℥xij . (vel ad eminent. dig.
 4.) Digerantur in MB hora una ac al-
 tera, sæpius agitando, ut solvatur: dein
 filtra calidè per chartam, filtraturæ af-
 funde ∇ frigidam Rosar. (vel aliam a-
 liquam ∇ m) & lactescet liquor. Ab-
 stracto V reponere reliquum & residet
Resina quam (à supernatante lacteo li-
 quore decantationis beneficio sepa-
 ratam,) ter quaterve ∇ rosacea la-
 va.

N. 1. Si *Scammonium* purum fuerit
 vix parstertia decedit. *Sala de vege-*
tab. Kesh. 1. c. 90. Tentzel in Exeg.

Dosis à ℥ss . ad gr. xv.

Fit quoque *Extractum Scammonii*
 per *Acetum destill.*

Dosis gr. 8. vel 12. *Hartm. in Croll.*

4. *Extractum Diagridi aromatisa-*
um F. F.

2. *Cinam.*

Zinzib.

Caryophill.

Macis.

Nucist.

Cardamom.

Cal. Arom.

Anis.

Cortic. Arant. ana ℥ss .

F. Extractum cum V ℥ss .

2. 2. *Diagrid. ℥ijj.* Extrahe itidem
 cum V s. a.

Utrumque *Extractum* conjunctim
 digere. V abstrahere ad consistentiam
Extracti.

Dosis gr. xv. ad ℥j .

5. *Extractum Scammonii Glycy-*
rhizatum.

Verum *Scammonii* correctivum est
 succus liquiritiæ. Infundatur radic.
glycyrrh. bona quantitatis in aq. per 24.
 horas, eaque infusio nova semper gly-
cyrrh. additione ter repetatur, coctio-
 ne levi præmissâ. In hoc decocto *Scam-*
mon. pulverisatum resolvetur filtretur,
 exhalet aqua sub finem lenissimo Δ (ne
 aduratur) usq; dum *Extractum* in fun-
 do resideat. Est *S. Clossai.*

6. *Elyxir Scammonii Crollianum* s.
Pilula Scammonii.

Ex *Scammonio* crebris imbibitio-
 nibus succi Rosar. (ut supra) impræ-
 gnato, extrahe *Tincturam* s. a. dige-
 rendo.

rendo cum Ψ opt. (in quo sem. anif. fœnic. cinam. spica nardi macerata,) decanta & abstrahere Ψ ad consistentiam duriusculam, vel quod melius præcipita cum ∇ Rosar. & lava.

\mathcal{R} . Hujus Extract. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Succi Citonior. depurati $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

Ros. Rub. depurat. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

M. & coagula ad consistentiam pilul.

Dosis à gr. 10. ad 20.

7. *Alia correctio Hartmanni: Scammonium & latum.*

\mathcal{R} . Scammon. minutiss. triti q. v. imbibe cum pauxillo spir. Θ i vel ol. Sulphuris p. c. adfundendo guttas aliquot Ol. anif. vel fœnic. contere diligenter ut fiat massa instar picis viscida, quam serva.

Vires. Purgat leniter sine omni molestia.

Dosis à gr. xv. ad xxv. *Hartmann. in Croll.*

N. 1. *Eodem modo mitigatur & vehementia omnium succor. purgantium, Aloes, Elaterii, Gummi de Peru. Hartmann. in Croll.*

N. 2. *Quercetanus in Pharmac. Restit. c. 15. Chymici, inquit, qui elegantes illas & singulares Θ i proprietates occulte in eo delitescentes eruere norunt, haud verebuntur Scammoneam, Myrrham & ipsa etiam Gummi preparare & dissolvere cum phlegmate Θ i, toto suo spiritu impregnato. In hoc solo enim spiritu latet vera illorum simplicium preparatio, qua cum exuperante calefa-*

ciendi qualitate insignita sunt, & hac viâ exquisitè & perfectè corriguntur.

N. 3. *us, Θ i & Tartaris comburant Scammon. & in picem vertunt, ac proinde multum virtutis catartica deperdunt. Satiùs igitur erit Scammon. resolvere in Tincturâ ros. cum Ψ Θ i paratâ ut moris est, resolutumque ad Extracti ad consistentiam reducere.*

8. *Scammonium Sulphuratum.*

\mathcal{R} . Scamm. minutiss. triti, q. v. (E. gr. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. vel $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.) Extendatur supra chartam bibulam, detineaturque supra carbonibus vivis Sulphure super injecto fumantibus, donec Scammonium, (quod continuò movendum) liquefcere incipiat vel albescat. Scammonium hac ratione optimè correctum exhiberi potest à gr. vi. ad vij.

9. *Scammonium rosatum.*

\mathcal{R} . Scammon. vel Diagrid. q. v. Extrahere cum spiritu Citonior. s. a. decanta, filtra & inspissa ad consistentiam mellis. Dein adde ad Scammon. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. succi Ros. Rub. recenter express $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. coagulentur simul ad siccitatem.

N. Si spiritum Citoniorum, in infusione Santali tinctum, loco Menstrui extractioni huic adhibueris, non modò Scammonium colore elegantius, sed & Epatici minis noxium acquies. Et hoc modo paratum Scammonium rosatum extat in officina Salzvedeliana, jucunda suâ rubedine visum oblectans.

Dosis à gr. vj. ad xv.

10. *Infusum Scammonii seu spiritus purgans.*

Kkkkkk 3

\mathcal{R} . Scam-

R. Scammon. el. p. iij. Succ. Cydon. p. ij. mixta pone in locum calidum quotidie movendo, donec induretur. Tunc affunde V Malvatici, q. s. stentq; aliquamdiu in digestionem. Et fit spiritus purgans seu solutivus.

Vires. *Purgat sine ulla fastidia ac molestia.*

Dosis, variat pro Scammonii ingredientis quantitate.

N. *Hac infusio ad annum circiter servata, rejicit ad superficiem guttulus olei rubei, instar picis liquidæ, in quo ferocia seu malignitas scammonij residere judicatur.* Tentzel in Exeg.

II. Diacydonium Lucidum Scammoniatum seu laxativum.

R. Gelat. Diacydon. lucidi, lbj. Extract. Diagrid. ʒvj. coque lento igne, (NB.) optimè miscendo, ad justam consistentiam.

Vel

R. Scammon. ʒij. extrahe Tincturam cum V postea fiat s. a. Cydoniatum ex succi Cydonior. lbj. sacchar lbj. Tincturam paulatim succo affunde, misce exacte ac affunde in scatulas.

Dosis à ʒj. ad ʒij. & ʒiij.

N. *Nisi mixtio exacte fiat, fieri potest, ut diagrydium in uno loco parcius, in alio copiosius concreascit, inde purgatio justo lenior hinc copiosior, adeoque hypercatharsis nonnunquam subsequitur.*

12. Gelatina Cydoniorum Laxativa cum Turbith.

R. Scammon. ʒij. Turbith. ʒiv.

Extrahe cum V, postea

R. Decoct. Cydon. lbvj.

Sacchar. ʒxviii.

Coq. s. a. & F. Celatina, cui sub finem affunde Tincturam Diagridis & Turbith. spatulaque agitentur, donec V evanescat. Tandem reponere pro usu.

N. Communiora preparata, quæ diagridum ceu basis ingreditur, ipsemet Tyro observare poterit.

Præcipua ex his sunt.

Confectio Anisi Laxativi,

Elect. Benedict. Laxativ.

Decitro solutivum.

Diacydonites Laxativ.

El. Episcopis. Elefscoph.

Confect. Hamech.

Indum majus.

Diaprunis solutivum.

Rosatum.

De succo Rosarum.

Zinziber Laxativum.

Pilula Aggregativa majores.

Aurea.

De Fumaria.

De Hermondaclilis.

Extractum Catholicum, &c.

Et hæc sunt quæ de Vegetabilibus scribenda fuerunt.

caliva

, cuius
Diagnosi
tur, do
in repore

ata, quia
ur, ipse me


et.

et.

a



7



vicia, qu
malia ap
re hinc ex
spoliatione
zofiamen
peris, pro
emptis,
violentiā
expetitiu
stantia, e
que facit
vribus e c
licet disp
que pereg
te natura
tur, curric
principia



PHARMACOPOEIA
MEDICO-CHYMICÆ,
LIBER V.
DE

ZOOLOGIA.



Oologia est pars Pharmacopœiæ, quæ Medicamenta ex Animalibus delumpta recenset.

N. Animalia p̄ta, tam viva, quam interempta, (licet hac animalia appellare.) De utriusq; commone hic expedit, eligenda esse, quæ extra dispositionem morbosam & hinc detrimensam constituta sunt. Itaq; si ex vivis expetis, provideas, sana ea sint: sin ex interemptis, interempta illa adhibeas morte violentâ extrinsecus accedente. Etenim expetitur medicinalis cuiusq; rei substantia, eaq; ad medicationem apta, adeoque facultatibus morborum destituta, salubribus è contra tincturis delibuta. Hæc imprimis pars rei spiritalis est, in naturalis scilicet dispositione constituta, facultatibusque peregrinis orba. Nimirum hæc, ut morte naturali paulatim senescens consumitur, curriculumq; suò destinato perfuncta, in principia sua resolvitur: ita eadem ipsa,

si flammâ vitalis violenter extinguatur, superstes aliquamdiu manet, nec a corpore separetur, donec huius dissolutione & ipsa dissolvatur. Et quidem talis ferè illa superstes suppetit, qualis erat, dum flamma illa exstinguebatur, i. e. salubribus, insalubribusve tincturis imbuta. Hinc itaque non raro mira cadaverum facultates elucent, veluti præ reliquis est vis illa formatrix, non modo è cineribus vegetabilium suscitabilis, (teste Sennerto, ex Quercetano & Polono, ut & ex Libavio, teste Cl. Horstio epistola ea de re ad me missâ, teste itidem Vigenatio Gallo, in tractatu Gallico, de Igne & Sale, pag. 262.) sed & in animalium quorundam cineribus demonstrabilis. Huius rei historiam, cum Parisiis degerem, cen verissimam mihi retulit Doctor Medicinæ Parisiensis, nomine Certain, vir vel ætatis ratione fide dignus, videlicet sibi in maceratione cineris cancrorum, tam perfectiorum,

rum, quam imperfectorum, in liquore natantium. Simili ratione in ∇ stillat. spermatis ranarum, sibi ranarum imagines quondam fuisse representatas, restis est Vir Excellentissimus Joan. Daniel Horstius, in Academia Marpurgensi, Medicinæ Professor publicus, Amicus meus integerrimus. Non minus & in perfectiorum animalium ossibus idem accidere, præter alios refert Robertus Flud, de Fluctibus, Medicus Anglus, Scrutator naturæ sagacissimus. Et quæso quid cause subesset, quod solum animalia mactata culinis expetantur, posthabitis quæ secus obierunt, nisi sit, quod illa balsamica, seu spiritali prædita sunt substantia, ad nutritionem requisita, hæc vel eadem destituta sint, vel inquinatam & insalubrem possident? In Medicis difficultatibus non postrema est, quæ etiam doctissimos macerat, unde scilicet facultates occultiores Medicamentorum fluant. Nimirum alii Formam mixti eas acceptas referunt, alii Formam separatam relictam vestigio: ne dicam de peculiari qualitatibus primarum mixtionum, quam alii ponunt. Verum annessatius sit, difficultates has & similes hoc ipso, quod posui, fundamento dirimere, quam Entia citra necessitatem multiplicare, cuiuslibet pro arbitrio do judicandum, nec enim quemquam cogor, sed solum Philosophicam libertate nixus modum suggero de difficultatibus emergendi, & quidem ex-

juamodi, quem (ne novitatis accuses) tota Stoicorum schola olim docuit. Vide sis Quercetan. libr. de Veritate Hermetice. medicin. cap. 10. Nec est quod hinc metuas simplicitati formarum hac ratione derogari. Simples quidem sunt forma, id fateor, sed & materiales, non ut communiter fingitur simpliciter spirituales. Caveas autem ne huc spiritum divinum hominis retrahas: hic enim, ut sublimioris est originis, ita & altioris indaginis.

Quia Epistole Horstiane mentionem feci, ejus verba subungere placet, quæ sunt: Quod attinet suscitabilem vim formatricem, certè sæpeque D. Georgius Moltherus Med. Wetzlar. retulit, non semel se urticam vidisse in ∇ congelata. Mihi est sal Absynthii, cujus ope, vera loquor, totum Absinthium tibi ponam ob oculos. Hæc Horstius; quibus & hoc subicere volui, quod certâ quadam operatione Sal. com. Absynthii volatile elevatum Alembici lateribus adhærendo plantam suam dilucidè representet.

Classes Zoologiæ sunt quatuor.

1. Animalia terrestria exhibet, eaque perfectiora.
2. Aves recenset.
3. Pisces describit.
4. Insecta subjungit.

CLAS

CLASSIS I.

De Animalibus Terrestribus perfectioribus.

I. Agnus.

Ἀγνός, ἀγρός, ein Lamb / Schaaf.

OFFICIN. NAT.

1. Pulmones, (cum recentes, tùm siccati.) 2. Fel. 3. Lana. 4. Ossa incinerata. 5. Coagulum.

Vires.

1. Pulmo attritus à calceamentis contractos, ab inflammationibus tuetur (*impositus*), vide *Ovis*.

2. Fel, ad morbum comitalem exhibetur.

3. Lana (*cum corio*) anginae, aliisque colli tumoribus leniendis ac molliendis confert, *imposita*.

4. Ossa incinerata, consolidationem vulnerum, etiam eorum, quae difficilius sunt consolidationis, consolidant.

5. Coagulum valet ad venena, ad Lac coagulatum, ad morsus venenatos (*cum potum*).

II. Alces.

Ἄλκην, Alces, magna bestia, *Casari*, *Albert. Magn.* (cui & Equicervus) *Ola magno*. *Mizald. Lev. Lemnio.* & *lind.*

Animal est gregarium bisulcum, ad cervi figuram accedens, quo tamen majus est, naturâ timidum, comitali morbo obnoxium.

OFFICIN. NAT.

1. Ungula ac 2. Nerv.

Vires.

1. Ungula specificâ virtute celebratur adversus Epilepsiam, tum præcavendo, tum curando, idque usu tam interno, quam externo.

Internè propinantur scobs, & præparata subjuncta.

Externè includitur particula anulo, gestaturque digito, qui minimo proximus est, ut palmam respiciat. Inditur itidem pugno, applicatur pulsi, immittitur in aurem, (sinistram,) suspenditur de collo, ut cutim attingat.

Dosis ℥ss. & ultra ℥j.

N. 1. Dignoscitur odore, quem gratum suffitus exhibet.

N. 2. Referunt, non quodlibet hujus speciei animal malo Epileptico corpori, nec omnia eadem proprietate prædita esse, sed pro aetate, sexu, tempore, & ipsius etiam ungularatione, plurimum variare. Fœmina ungulam hac facultate nequaquam pollere, sed maris solum; nec pulli, sed adulti, idque eo tempore, quo in Venerem ferri incipit, (inter Festum assumptionis Mariae & nativitatibus ejusdem.) Plus etiam unguibus posterioribus, quam anterioribus tribuunt, & horum quidam pedi (quod vulgatius) dextro, alii sinistro. Sunt qui velint has ungulas ab animali adhuc vivente, dicto tempore præscindendas esse. Andr. Bacc. l. de Alce.

Lil lil 2

2. Ner-

2. *Nervi*, circumligantur membris spasmo obnoxiiis.

PRÆPAR. Ex Ungulis.

1. *Ungula præparata*, lege communis.

2. *Magisterium* fir. l.c. aceto, (alii maturo spir. vitrioli.) ac oleo Tartari.

N. *Magisterium* hoc cineris colorem ferere fert.

3. Sunt qui aquam ex medulla cerebri destillatam, pro arcano Epileptico habent. Vide in homine.

4. Exhibere itidem poterit *Oleum Liquorem*, ac *Sal volatile*, l.com.

N. Cum in Finlandia digerens presertus institutioni Generosissimi Gustavi Horn/ Everhardi Filii, qui jam Generalem Majorem in Suecico Exercitu agit celeberrimum, transossam Alcen, Generosissima illius Marri Vidua à servis præsentatam vidi 17 palmos altam.

III. Aper.

1. Mas, *arg.*, Verres sylvaticus, *Wildschwein/ Eber.*

Aper/ Fœmina sus fera, scropha sylv. *wilde Sau.*

Porcellus sylvestris, *Frischling.*

Vescitur glandib. nucib. faginis, castaneis, radicib. filicis, angel. & simil. Coitinitio Hyemis, parit Vere

OFFICIN. NAT.

1. *Adeps*, 2. *Dens*, 3. *Genitalia*, 4. *Fel*, 5. *Stercus*, 6. *Urina*.

Vires.

1. *Aper*, ut verum domestico cognat-

us est, ita & vires communes obtinet, sed fortiores. Hinc recipitur adeps ad unguentum armarium, commendatur peculiariter ad laterum dolores leniendos, materiamque molliendam: rejections sanguinis sistit, (in $\frac{1}{2}$ o vel vino potum,) ad rupta & convulsa, (ex $\frac{1}{2}$ o bibitur,) luxatis (cum $\frac{1}{2}$ o rosar.) medetur. *Diosc.*

2. *Dens* specificè in pleuritide exhibetur: cynanchen. (cum Ol. Lini inunctus vel $\frac{1}{2}$ exhibitus) curat.

Dosis Zj.

3. *Genitalia* ac *Testiculi* ad Veneris impotentiam ac proliferationem faciunt.

4. *Fel* strumas discutit.

5. *Stercus* aridum (potum) rejections sanguinis sistere creditur, id quod etiam præstat extrinsecus ad motum.

6. *Urina* comminuit specificè vesicæ calculos, eosque expellit.

PRÆPARATA.

1. *Dens præparat.* leg.com.

2. Fieri etiam potest *Magisterium* ex dente, solvendo cum Acet. destill. & præcipitando cum Sp. $\frac{1}{2}$ i vel ol. Tartari.

N. *Dens* apri mucilaginosus valdè est, ideoque congelascit nonnunquam in fundo præparatum. Hanc congelascentiam ut præcaveant, solent igni aliquantulum exponere & urere.

3. Sunt & qui ∇ m ex sanguine cum plantis refrigerantibus & humectantibus, destillatam in Atrophia magnificiunt. *Harum in præf.*

IV. Asi-

IV. *Asinus.*Mas *Esel.*♀ *Fœmina Eselin.*Pullus *Füllin.*

Animal est pigrum, melancholicum, vivax (ad annos 30.) mense 12. pariens.

OFFICINALIA NATIVA.

1. *Ungula.* 2. *Sanguis.* 3. *Lac.* 4. *Urina.*5. *Stercus.* 6. *Adeps.* 7. *Pili.*

Vires.

1. *Ungula* in morbo comitiali ungulæ alcis vicaria censetur: (datur per mensem diebus continuis ad 36.) nonnullis & *Calvaria.*

Extrinfecus commendatur cinis ad discutiendas strumas & sanandos per-niones (cum oleo immixtus) ad rimas cutis consolidandas; apostemata discutienda, pterygium oculorum tollendum, (cum lacte mulieris instillatus,) ad fœtum mortuum eliminandum, (insuffus,) ad Epilepticas & Hystericas excitandas (nidore.

2. *Sanguis* sudorem ciet; pone aures f. ex aure extractus, linteo susceptus & interveniente linteï illius infusione assumptus, melancholici humoris ferociam dicitur mitigare, morbosque incantatione introductos arcere: sunt & qui eundem ad febrem quotidianam exhibent. Pulli asini sanguis icterum curat.

3. *Lac* nutrit, abstergit fortiter; hinc utile in Phthisi, in morbis ventriculi, renum abscessu, vesicæ lithiasi, arthriticis doloribus, laxat nimis. al-

vum, abstergit vias urinarias, ciet menses.

Extrinfecus adhibitum, stabilis gingivas, compescit dolores podagricos, (cum stercore cataplasmatum) faciel-que gratum conciliat pallorem (illium.)

Exhibetur ab 3iv. ad x.

4. *Urina* medetur peculiariter morbis renum, (Dioscorides) tum & scabiei, (canum urinâ eâ imbutum imponitur. Verrucis & callis, membrorum atrophie & paralyfi, podagricisque dolorib. &c.

V. gr.

5. *Urinam* pulli asinorum, ungulam asina incineratam, subige addendo axungiam asin. cum tantillo spica ludica addorem.

Fac Unguentum.

3. *Adeps* Cicatrices concolores reddit.

6. *Stercus*, sanguinem sistit, (potum velustum, vel emplastrum instar impositum, naribusve admotum.

7. *Pellis*, loco culcitæ imposita, infantum terrorem arcere dicitur.

V. *Bos.*Mas *Taurus* & *Ochse.*Bos, Bos { Fœmina *Hesse.* Vacca *Rube.*

{ Vitulus, vide infra.

Animal est vulgo notissimum vitam ad annos viginti producere aptum natum. Coit ferè medio Vere vel Autumno.

Llllll 3

OFFI-

OFFICINALIA NATIVA.

1. Cornu. 2. Fel. 3. Iecur. 4. Splen. 5. Sanguis. 6. Medulla. 7. Serum. 8. Axungia. 9. Ungula. 10. Urina. 11. Stercus. 12. Lapilli. 13. Lac. & inde 14. Butyrum. ac 15. Casus. 16. Priapus. 17. Ossa.

Vires.

1. Cornu rariusus est: vidi tamen scobem exhiberi contra Epilepsiam, adhibetur quoque in suffitu, ad aërem contagiosum corrigendum.

2. Fel, bubulum seu taurinum præstat ferè omnium quadrupedum feliibus: specificè aurium medetur furo, ulceri, ac dolori, (mixtum cum lacte muliebri aut caprino, & cum cottone impositum,) alvum movet, (in Chysteribus.

3. Iecur, rari usus est, ejusque loco vituli epar, pro hepate scil. corroborando, in decoctis adhiberi ferè solet.

4. Splen, inservit potissimum decoctioni ac extractioni pro arcenda splenis duritie, mensiumque suppressione. Sunt & qui extrinsecus spleni illi nunt.

5. Sanguis, intrinsecus singularem opem fert dysentericis mensium & internis hæmorrhagiis. Extrinsecus discutit & emollit tumores, maculas faciei extergit, (illitus.

6. Medulla, post cer vinam & vitulinam proximum bonitatis locum habet: præter vires generales, (cum vino illita,) trementia membra reficit, nervis induratis confert.

7. Serum seu Adeps, præter vires generales, usurpatur specialiter ad mor-dicationem intestinorum, & tenesmū, ut & ad ulcera & rimas labiorum, podagricis & Scirrhis affectib. medetur.

N. Præfertur qui à Renib. colligitur.

8. Axungia ex ungulis, (latens Schmalz) usitata vulgo est in molliendis tumorib. leniendis dolorib. luxationeque articulo.

9. Ungula, in cinerem combusta copiam lactis præbent, (assumpta,) adhiberi item solent ad arcendum aërem malignum, (in suffumigio.

N. Ungularum suffitu fugantur mures.

10. Urina, aurium dolores lenit, & cum Myrrha instilletur.

11. Stercus Vaccinum, refrigerat, siccaturque moderatè, discutit, dolores insigniter mitigat. Hinc feliciter adhibetur adustionib. inflammationibus, arthritidi, apum ac vesparum morib. suffitu reprimi uterum pro lapsu. Hydropicis in forma Cataplasmatismis imponitur.

N. Plebei febri ardente, vel colico dolore correptis in potu suspendunt, aut succum expressum felici cum successu propinant.

12. Lapillus, ex ventriculo (Martio Mense,) vel & Lapillus è fellis vesica (Majo) extractus medetur Ictericæ, specificè comminuit ac consumit calculum, sicum vino propinetur: idem præstat, si vino, quod potui datur, quotidie imponatur, donec penitus consumptus sit. Quere.

La.

Lapillus fellis in pulverem redactus
errhinum exhibet egregium.

13. *Lac Vaccinum*, crassum est; nutrit benè inflat, Renum & Vesicæ dolori convenit, diarrhæa, dysenteria, tenesmo, erosioniq; intestinorum succurrit (potum).

N. 1. *Nocet Lac Spleneticis, Epaticis, Comitialibus, Vertiginosis, Febricitantibus, & Capite dolentibus, quod de lacte in genere notandum.*

N. 2. *Lac coagulatum cum camomilla nascitur. aq. & bac. Iunip. in lacte coctis, ad dolores scorbuticos mitigandos maxime prodest (catapl.*

14. *Butyrum*, calfac moderatè emollit, digerit, lenit, resolvit, laxat, oculorum hebetudini prodest, (indistum,) &c.

15. *Cafens recens mollis podagricorum dolores lenit, Epatis astum mitigat, Exomphalo infantum succurrit (impositus).*

16. *Priapus Tauri (rubri) dysentericis prodest (tritum & exhibitum).*

N. *Mulieribus fastidium Coitus parere creditur.*

N. 2. *Vasa spermatica cum didymo combusta, sanguinis hamorrhagiam sistunt.*

N. *Hoc ludeorum medicamen incircumciss. Forest. in Chirurg.*

17. *Ossa*, ad corroboranda viscera, & ad arcendam Epilepsiam à nonnullis adhibentur.

PRÆPAR.

1. *Aqua omnium florum dicta, destillatur*

MB. - *velex Cinere, Verno seu Majali tempore, ex stercore recenti vaccæ herbas despascentis, prodit & hinc oleum.*

Vires.

Refrigerat, discutit, adhibetur internè in dolore colico, nephritico, urina suppressa, febribus, &c.

Externe imponitur locis dolentibus, ut supra. Commendatur & ad Ulcera cancrofa-

2. *Aqua sanguinis fit (Majali tempore) MB.*

Vires.

Summè mitigat podagram.

3. *Decoctum Splenis Bovis, v. lib. 2.*

4. *Extractum Splenis, ut & Epatis vide lib. 2.*

N. Crolius.

Re. *Splenem bovis junioris castrati, scindit in laminas tennes, macerat per aliquot & d. in V cum myrrha essentificato, dein exiccat in aère, postea cum V f. a. Essentiam extrahit, abstrahit, majoris efficacie ergo addit aliquot guttulas Olei Angelica stillat.*

Vires.

Lienis obstructions expedit, menses provocat.

Dosis ℥j. in V appropriata.

N. *In thbano commodè exiccaripotest.*

5. *Oleum ex butyro, vide lib. 2.*

6. *Tinctura fellis Tauri.*

Re. *Fella Taurorum sensim in O exiccata, extrahe cum V.*

Vires.

Cosmeticum est insigne ad miraculum

culum usque albedinem gratissimam concilians. Illinitur scil. linquiturque illita per triduum, quadriviumve, ita tamen, ne aëri liberè sese exponant, post eluatur aliquoties ∇ flor. fabarum, nenuphar. polygonati & simil. *Hartm. in Croll.*

VI. Bubulus.

Βεβαλδς. Animal est bovi figurâ & naturâ simile, majus tamen & crudelius, colore nigrum. *Büffel.*

OFFICIN. NAT.

1. Cornua & Ungula. 2. Serum. 3. Stercus, &c.

Vires.

1. Cornua & Ungula medentur spasmō, (annulus exinde factus gestatur digitis manus vel pedis.)

2. Servi, Stercoris, &c.

Vires.

Ex descriptione bovis addiscere licet.

PRÆPARATA.

Extractum Epatis bubuli fit eodem modo, quo *Extractum Splénis* bovis.

N. *Præstantius* habetur, si Sal proprium ex capite mortuo extractum admixtum fuerit.

Vires.

Ufus ejusdem est, cujus extractum splénis bovis, sed promptioris efficacitæ.

Dosis quoque eadem est. *Hartm. in Croll. Gluckr. in Beg.*

VII. Bufo.

Μύοξ. Bufo } palustris, qui minus vulgatus,
Krotte/Zaafche est } terrestris, qui vulgator.

N. *Maxima* fovetur antipatheia inter Bufones & araneas, adeo ut si bufo subter araneam ponatur, cum impetu illum interemptum hac descendat.

OFFICIN. NAT.

2. Ipsi bufones, & 2. Lapis bufonites.

Bufones siccantur in aëre, transfolli per caput, collumve; siccati asservantur pro usu.

Vires.

Et si animal sit deterrimum, venenosum ac abominabile; attamen non effugit usum Medicum, eumque tum internum, tum externum.

Internè pulvere ejus hydropicorum aquas per urinam educi, desperatur quidam expertus est hydropicus, qui præter spem attentatæ necis sanitatem illo acquisivit. *Petrus in Nosolog. p. i. diss. de Hydropo. Wierus in observ. de Hydropo, ut & de prestig. demon. l. 3.*

Dosis ʒß.

[N. *Malle* ego minorem.]

Extrinsecus imponitur bufo, parte quæ venter est anthracib. (in acetoparum maceratus,) ad eliciendum sc. venenum, (quod adeo feliciter præstat, ut attracto veneno intumescat,) ingreditur itidem amuleta aëri contagioso arcent-

arcendo dicata, hæmorrhagiam nasi-
um certo experimento sistit (si vel po-
ne aures per se applicetur, vel pugno in-
cludatur, ut caleseat, vel axillis sublige-
tur vel & collo appendatur. Idem & ci-
nis s. pulvis præstare perhibetur loco
affecto inspersus. Renibus impositus a-
quam inter cutem per urinam pellere
dicitur, Umbilico alligatus, fluxus hy-
stERICOS retrahit & inhibet. Plantis pe-
dum appositus capitis cordisque mor-
bis phrenetidi febribusque succurrere
statuit.

Lapis Bufonites, Chelonites, Ba-
trachites, Borax, Krottenstein/ Gem-
ma est bullæ instar, altera parte cava,
altera convexa, coloris ex fusco pal-
lens al quantum fusci, interdum ni-
gri, albi, (qui melior.) Viridis, Versi-
coloris.

N. Reperiuntur in agris, affirmant
tamen alii, eos in annosiorum, ac qui diu
in arundinetis, inter rubos sentesq; deli-
ruerint, bufonum capitibus generari, cui
ut fidem adhibeam, disuadet quorun-
dam magnitudo.

Vires.

Commendatur ad pestem, & vene-
na seu remedium præstantissimum
(exhibens.) Imò sunt qui asserant, il-
lum gestantes à venenis tutos esse,
blandoque attritu inflationes à vene-
natis bestiis discutere, ac virus omne
elicere. Cast. Bauhin. de Lapide Bezo.
cap. 3.

N. Prasente poculo venenato fertur
hic lapis colorem mutare ac sudare.

PRÆPAR.

ex bufone.

1. Amuleta variarum descriptio-
num,

Cinis Bufonis (Bufo combustus)
incontinentiam Urinæ ex lacerato vesica
collo ortam sanat. De collo suspensus, Ob-
serv. Henr. ab Her. 18.

2. Pulvis fit sola tritura, qua bufo-
nes optimè exiccati in pulverem redi-
guntur.

N. Mallem equidem bufones incine-
ratos.

3. Sal elici potest ex calcinatis bu-
fonib. pulverique illi in hydrope substi-
tui.

Dosis ad gr. iij. &c.

4. Oleum.

℞. Bufon. viv. N. iij. vel iv. per ho-
ram in Ol. Olivar. lb. ij. Coque, cola-
tumque serva.

Vires.

Maximè commendant in maculis
faciei, morphæa, aliisque affectibus
seu ulceribus inveteratis abstergendis,
(signatura sua maculata bufonum ad macu-
las prodesse judicatur,) singulis die-
bus illinitur semel. Harum. Parac. t.
1. p. 1091. b.

N. Preferrem equidem ranas macu-
latas.

5. Ol. bufonum compositum.

℞. Ol. pedis vervec. q. v. bulliat
cum Sulphur. pulverisato, usque dum
rubicundum ol. evadat. Hoc factose-
paretur Sulphur. ab ol. in quod adhuc
calens immergantur & suffocentur bu-
fones

M m m m m m m

fones, post expressionem destillentur.

Vires. Præstantissimum est in digerendis tumoribus & hydrope.

Ex communitat. Dn. D. Joh. Kiefferi.

VIII. Canis

(Mas, Hund.
Fœmina, Hündin.
Catulus, junger Hund.
OFFICIN. NAT.

1. Canis integer. 2. Caput. 3. Axungia.
4. Fel. 5. Sanguis. 6. Stercus. 7. Urina. 8.
Dens. 9. Pellis. 10. Pilus.

Vires. 1. Integer, scil. vivus catulus, ventri impositus, dolores colicos mitigat. Paretica membra confortat (balneatio in decocto catulorum & axungia e decocto hoc collecta.)

2. Caput s. calvaria incinerata desiccatur, curat vitia sedis, rhagades & testiculorum tumores.

Intrin. Icterus sanat.

3. Axungia canina reliquis calidior est, adhibeturque internè in vulnerib. & exulcerationib. abstergendis, consolidandis, adeoque & in Phthisi, & crure ex casu dissolvendo.

Externè in Podagricis, auriumque dolorib. leniendis, lendibus capitis arcendis, auditu difficili reparando, scabie & pruritu corrigendo.

4. Fel catuli nigri, Epilepsiam mirè curat, recens cum ☩ potum, vel in pulvere exhibitum.

Extrin. abstergit maculas faciei,

(cum stercore Vitulino inunctum.) oculorum albugini medetur, (cum melle illitum.

5. Sanguis contra Veneficarum venenum commendatur, bibique cum successu dicitur contra morsum rabiosæ Bestiæ ac Toxicum.

6. Stercus (album Gracum Officinis) siccat, abstergit, discutit, aperit, apostemata rumpit, exulcerationes abstergit; hinc utile est in Dysenteria dolore colico & simil.

Extrinsecus medetur angina, (guttur in sufflatum.) ulcerib. malignis (inspersum;) tumores duros emollit (emplastr.) aquas trahit hydropicas, (ventri illitum;) verrucas abigit, (cinis per se vel cum Ol. rosar. impositus.

N. Commendatur præ reliquis, quod Iulio fuit collectum ex cane ossibus nutrito, candidum, purum, minimè sætens.

7. Urina, verrucas abigit, ulcera capitis manantia, futfuresque abstergit.

8. Dentium cinis, (cum melle vel butyro illitus mandibulis,) infantium dentitionem faciliat: (gargarismis inditus,) odontalgiam sedat.

9. Pellis parata manuum lenit pruritum, nervosque emollit contractos (chirotheca scil. induta.

10. Pilus morfib. canis medetur (impositus.

PRÆPAR.

Balsamus e Catulis compositus.

Fit

Fit ex integris catulis in vino albo suffocatis, coctisque cum herbis nervinis, oleis & resin. in bals. quod membra contracta sanat, ischiadicos & arthriticos dolores compescit.

IX. Caper, Capra.

Est { Caper masculus *♂* & hircus ein Ziegenbock.
Capra foemina, *♀*, Capella ein Geiß.

Animal est alacre, velox, superbum, auditu acuto praeditum, vorax, &c. obnoxium febrib. pesti & simil.

OFFICIN. NAT.

1. Cornu. 2. Sanguis. 3. 4. Medulla. 5. Serum. 6. Lac. 7. Lapilli. 8. Stercus. 9. Urina. 10. Vesica. 11. Omentum. 12. Pellis. 13. Fel.

Vires, 1. Cornu ut & pilis utimur ut suffumugiis, pestis tempore, ut & ad Venteruosos & Epilepticos excitandos

2. Sanguis hircinus habetur alexipharmacus, obstruit, dysentericis convenit, sanguinem concretum resolvit, (siccatus & exhibitus,) calculum attenuat.

Extrinsecus tumores maturat.

N. Hircum mediocris aetatis (quadrimum) domi per mensem alunt, nihil aliud dando, praeter plantas lithonripticas, hinc Aetatis principio cum Sol in ♄ ingressus est, mactant, sanguinemque arteriosum, abjectis partibus ichoreosis, concretum in furno siccant. Vide Disp. Aug. & Norimb.

PRÆPAR.

Ex sanguine hircino non minus, ac ex aliis sanguinis generibus fieri possunt: Spiritus, Oleum, (quod summe in calculo commendatur,) & Sal. Attamen præ aliis famosus est, Balsamus antipodagricus ex sanguine, qui ut modo fiendi, ita & virib. convenit cum balsamo è sanguine cervino. Vide suo loco.

N. Sunt qui exinde Tincturam conficiunt, ad calculum, sanguinemq; coagulatum celeberrimam.

3. Lien; Lienem Caprae deligant per diem, super lienem infirmi, die sequenti ad furnum, vel solem suspendunt, quantum ibi exiccabitur, tantum quoque lienem patientis diminui ajunt. Theaur. pauperum Petr. Hispan.

4. Medulla hircina acrior est ac facior reliquis, ideoque & efficacior.

5. Serum hircinum validissime discutit, podagricis auxiliatur, stranguariam tollit, (umbilico immisum) hæmorrhoidum dolores lenit (suppositorium.

6. Lac Caprinum nutrit, abstergit, febri hecticâ laborantibus & Phthisicis, consumptisque ac emaciatissimis optime convenit.

Serum ejus præstat reliqua feris, aperit, abstergit, incidit, laxat, hinc frequentiori usu ad infusiones purgandæ Melancholiæ recipitur.

7. Lapilli in ventriculis & felle reperiuntur commendantur, vi diaphoretica & resolutive.

Mmmmm 2 8. Stercus.

8. *Stercus* calfacit, siccatur, abstergit, digerit, aperit, acrisque est facultatis.

Hinc *Usum* præcipui in duris tumoribus Lienis & aliarum partium, in parotidib. ac bubonib. in ulceribus desperatis consolidandis (cum vino veteri expressum & appositum) hydrope, (*imponitur ventri*) in coxendicum dolore,ustum tenuioris est substantiæ, congruitque ad omnia vitia, quæ extergi volunt, ut ad alopecias, lichenes, &c.

Intrinsicus convenit Spleneticis, exhibetur itidem in Ictero, inenstruis re-tentis & morbis similibus.

9. *Urina* (*hirci*) commendatur præ reliquis omnib. urinis ad calculi attritionem, urinæque expulsionem, (*calide ut ex hircio egeritur epota*).

Hinc convenit & in Hydrope, &c. (*destillata*).

10. *Vesica Urinaria* exiccata ac pulverisata urinæ incontinentiam peculiariter curare dicitur.

Dosis ʒj. exhibita.

11. *Omentum* mitigat feroces & ebullientes spiritus, (*calide impositum*) hinc prodest in dolorib. colicis, in Manica, &c. Præterea urinam obstructam pellit; *ventri impositura*.

12. *Pellis* sedat diarrhæam, (*decoctum ejus bibitum*) sistit Hæmorrhagias, & præcipuè narium, (*Cinis pilorum in-spersus*).

N. *Hædus* est pullus caprinus seu te-nellus caper, infra menses sex constitutus,

capropter ut natura cum capris conve-nit, ita & viribus, quas tamen ratione juvenutis teneriores & imbecilliores ob-tinet.

13. *Fel* febriem quotidianam curat. (cum pane an. & ovi albumine addi-to oleo laurino in cataplasma reda-ctum, ac Ventri impositum. Petr. Hispan.

X. *Capra alpina*, f.
Rupi-Capra.

Dama } Mas.
Gembs } Fœmina.

Caprarum genus sylvestre est, ma-gnitudine ac figura domesticis confor-me; amans alpes, gaudens herbis alpi-nis & fabulo nascentibus, & præcipuè doronici radice nigra.

OFFICIN. NAT.

1. *Sanguis*. 2. *Sevum*. 3. *Fecur*. 4. *Fel*. 5. *Stercus*. 6. *Lapis*.

1. *Sanguis* recens vertiginis est me-dela (*bibitus*).

2. *Sevum* Phthisi exulcerationique pulmonum succurrit, (*cum lacte assum-ptum*).

3. *Fecur* alvi fluxum sistit, (*pulvis as-sumptus*).

4. *Fel* oculorum nubecula, nyctalop-iaque auxilio est.

5. *Stercus* calculum atterit & expel-lit.

6. *Lapis* in capsula supra ventri-culum nonnullarum rupicaprarum reperiri solet, (*ut Bezoar repetitur*), magnitudine variante, & maxima ad juglan-

juglandis magnitudinem ascendente, colore nigro, odore dum frangitur gratissimo.

Hujus Vires experientia docuit insignes ad febres malignas, venena, pestem, & sim. Unde alii Bezoar Germanicum vocant.

Dosis gr. xv. ad xx. ad præcavendum gr. iv. vel v. *Casp. Bauh. de Lap. Bez. c. 13.*

*XV. Capri Cerva Orientalis, æqua
Lapis Bezoar. Orientalis.*

Est Animal Perficæ ac Indiæ Orientalis, partim Cervo simile, partim Capræ: hinc fit, ut aliis Capra audiat, aliis hircus, aliis Capricerva: V. g. dicitur Capra Indica, *Amato*; Capro Montana, *Monardo*, Capra sylvestris, *Lacuna*; Pazon, *Perfis*.

OFFICIN. NAT.

Lapis Bezoar Orientalis, qui est lapis in dicto animali repertus (ac potissimum in proventriculo, hinc & in ventriculo aliisque cavitatibus internis.) figurâ scil. variante, ovali, rotunda, fessili & inæqua, (meditullio paleam, pilos vel simile continente) superficie levi & splendente: substantia è laminis instar cæparum sese invicem incumbentibus compacta: Variante item colore (plerumque atro virente, hinc dilutius virente, pallescente, cineritio, fulvescente, mielleo, &c. odore nullo: variante magnitudine & pondere (plerisque scil. infra juglandis ma-

gnitudinem constitutis nonnunquam & paulo majoribus.

N. Dantur & adulterati seu falsi, confecti sc. ex lapidum fragmentis & pice artificiose coagmentatis: Item ex creta, cineribus testarum, sanguine sicco & lapidibus Bezoar minoribus pulverisatis & cum liquore incorporatis: Item ex & ignis artificio compactis, tinctis, &c. Quis sane non modo citra utilitatem, sed & cum detrimento in usum acersuntur.

Nota ergo bonitatis ab Authoribus passim notata sunt.

1. Forma à forma renum aut ovi columbini externius levigati diversa utpote quæ signum lapidis adulterati.

2. Structura laminis multis instar cæparum sese invicem incumbentibus, iisque singulis glabris, levibus, splendore coruscantibus: quod tamen alii reproban.

3. Cavitas (meditullium) experti rei heterogeneæ præter pulverem, quidam malunt inclusam paleam, festucam, granum & sim.

4. Pondus aliis levius, nonnullis gravius.

5. Commistio cum calce, i. e. si lapis humectatus, & calci vel muro affricatus, calcem colore viridi tingat. si lapis calce viva (cui admista aqua) innectus, paulo post flavescat: si lapis charta creta oblita affricatus viridem inducat lineam, si pulvis cum calce viva mixtus colorem expallido virentem referat, (quod tamen non de omnibus verum esse potest.)

M m m m m 3

6. Fria-

6. Friabilitas & dissolutio in ∇ . quæ tamen itidem & falsi lap. propria esse non nequit.

7. Liquatio, i. e. si acus candens intrudi possit.

8. Disparitas fragmentorum cum gypso aut terra cocta (in duritie scil.

9. Experimentum.

Verum enimvero summa in dijudicatione lapis cautio adhibenda est, neque absque notarum syndrome de bonitate, quid certi statuere expedit. Prestantissimus tamen inter ceteros habetur Persicus.

Vires. Corroborat sudores ciet, alexipharmacus est, ideoque utilis in vertigine, Epilepsia, Lipothymia, Palpitatione cordis, Ictero, Colica, Dysenteria, Vermicatione, Calculo, Mensib. obstructis, partu difficili, Melancholia. Precipue autem in peste febribusque malignis, venenis assumptis, Quin & extrinsecus adhiberi poterit in scrophulis apertis, cancro ulcerato & sim'l.

Dosis à gr. iij. ad xij.

XII. Capri Cervæ Occidentalis.

Est Animal Pervanum, Capricervo Orientali simile, cornib. tamen orbum depascens herbas salutiferas.

Dicitur Vicunitas, s. Taraguas Jos. A Costa.

OFFICIN.

Lapis Bezoar Occidentalis, qui est lapis locis iisdem animalis, ut de prior dictum, circa rem heterogeneam

in cavitate media contentam, tunica-
tim concretus, Orientalibus ut plurimum major, superficie scabra, colore cineraceo, albo, nigro, obscure virente, (qui optimus.

N. Prestantiores habentur (uti & Orientales) ex animalibus montanis exemptis.

Vires. Iisdem viribus celebris est cum Orientali, cujus tamen bonitati non parum cedit. Hinc utilis compertus est in affectibus cordis, venenis, febrib. pestil. quartana, (cujus symptomata mitigat) Melancholia, morbis diuturnis. Lumbicis, Epilepsia & simil. Nec minus & extrinsecus convenit in vulnerib. venenatis (inspersus.) Monard.

Dosis major quam Orientalis, sc. à gr. vi. ad xx.

N. 1. Peculiare habet, quod alvum quoq. nonnihil moveat.

N. 2. Affertur & Lapis Bezoar ex nova Hispania, sed Peruano aliquantulum vihor & debilior.

XIII. Capreolus, Capra.

Δογρας { Mas, Capreus, Niebeboef.
δός { Fœmina, Caprea, Niebegeiß.

Animal est Corpore cervum referens, cornua exigua alens, cervinis ferè similia, morib. timidum, lepidum, alacre, cursu velocissimum, visu æquè notu ac interdum pollens.

OFFICIN.

1. Caro. 2. Coagulum. 3. Iecur. 4. Fel. 5. Lien. 6. Stercus.

Vires.

1. Caro

1. Caro in cibo convenit Diarrhææ & Dysenterix.

2. Coagulum iisdem affectib. convenit (in vino potum).

3. Jecur oculorum aciem reficere creditur, (comestum, potum, extusq. suffumigatum, instillatum, &c. sanguinis hæmorrhagiam & præcipuè narium sistit (cinis insufflatus).

4. Fel maculas faciei abstergit, (illitum, oculorum albugines & nubeculas, aliosque affectus curat, (cum melle inditum) aurium tinnitus reprimat, (cum ol. rosar. instillatum) odontalgiam mitigat (simili modo).

5. Stercus Icterus solvit (potum).

N. In reliquarum partium viribus cum capris convenit, fortiores tamen easdem obtinet.

XIV. Castor.

Κάστωξ Fiber, animal est amphibium, aqua ac terra ambiens, vivens piscib. & fructib. corticibusque arborum. Viber.

OFFICIN. NAT.

1. Axungia. 2. Testiculi. qui Castorium vocantur. 3. Pellis.

Vires.

1. Axungia peculiariter nervoso generi ac utero convenit, adeoque morbo comitali, membris resolutis convulsis, apoplexiæ, &c.

1. Κάστωξ, Castorium, testiculi Castoris. Hi excisi beneque purgati in sese exiccantur, siccatiq. in loco umbroso suspensi asservantur. Durant citra corruptionem ad septennium.

N. Adulteratur iper Gummi Ammoniacum, quod cum Castoris sanguine Castorioque subactum in vesiculam conjicitur, exiccaturque.

2. Renes Castoris Vesica induntur ac siccantur: Fraudis autem hujus cognoscendæ gratiâ notentur distinctionis notæ.

1. Testiculi genuini ambo ex uno oriuntur principio.

2. Adulterini Testiculi majores ut plurimum existunt.

3. Genuini sunt gravis & ingrati odoris, validi, acris, mordacis & amari saporis, substantiæ fragilis. Fugientum porro nigrum & rancidum castorium.

Vires. Calf. 3. sicc. 2. attenuat, aperit, status discutit, nervos nervosque partes, adeoq. caput roborat, spirit. animales torpidos excitat, venenis resistit, sternutationem ciet, anodynum est, menses promovet. Hinc proficuum est in Lethargo, Apoplexia, Epilepsia, Paralysi, Vertigine artuum tremore, defluxionib. ad articulos, strangulatu uteri, dolore colico: idque usu tum externo, tum interno. Insuper tinnitus aurium ac difficultatem audiendi corrigit (auri inditum) dentiumq. dolori succurrit.

N. 1. In strangulatu uteri variis modis adhibetur, admoveatur naribus, subligatur axillis, inditur umbilico.

N. 2. Opii virulentiam corrigit.

3. Pellis opem fert Podagricis & Paralyticis (parata & induta).

PRÆPARATA.

1. *Oleum Castorei infusum*, vide *Dispens. Aug. & Norimb.*

2. *Ol. stillat.*

3. *Castorei q. v. dissolve in + aut macera in Vino, ejusvè spiritu, hinc destillat. Δ per Om vitream.*

N. 1. *Rectificacum aceto.*

N. 2. *Procedi itidem potest ut in destillatione Olei Philosophici, latera sed ignitos axungia imbibendo & destillando.*

3. *Electuarium Diacastoreum*, vide *Dispens.*

4. *Extractum fcl. c. cum V rectificato.*

N. *Alii extrahunt cum Acet. destill. quorursum abstracto reiterant V. Quercetanus adhibet aquam destillatam convenientem, v. gr. Melissa, Calendula, Poëonia, aut similes Antepilepticas & Cephalicas, maceratq. in B. M. (& 4. aut 5.) Pharmac. Rest. c. 25.*

Dosis à gr. v. ad xii.

XV. *Catus domesticus.*

Λ' λυγ G, Γαλιότης } Domesticus
Felis, Catus. } *Rake / Hausflake.*
Sylvestris } *wilde Rake.*

Animal est libidinosum, visu acutum.

OFFICIN. NATIVA.

1. *Axungia.* 2. *Sanguis.* 3. *Caput.* 4. *Stercus.* 5. *Pellis.* 6. *Secundina.*

1. *Axungia cati castrati, calfac. e-moll. discut. mirificè articulorum af-*

fectib. prodest.

N. *Præstat axungia cati sylvestris.*

2. *Sanguinis gut. 3. (ex venula sub canda aperta cati maris,) caducum penitus curant (epota) Schvvenckf. Quin & cati sanguinem, (ex incisa aure detractum) herpeti cum succellu vidi inunctum.*

3. *Caput cati nigri incineratum ad oculorum vitia, unguem, nubeculam, albuginem, &c. remedium præstantissimum esse, si quotidie ter insuffletur, scribit Mizald.*

N. *Venenum quod felibus adscribitur, in solo capite ac cerebro stabulatur, non reliquo corpore, utpote quod in cibum nonnullis venit.*

4. *Stercus (cum sinapi ana ex +. illud) alopecias curat & podagricos juvat.*

5. *Pellis gestatur ad calfaciendum ventriculum, articulosque contractos.*

6. *Secundinam de collo suspendunt ad oculorum affectus arcendos. Præferunt autem cati primipari, ejusque nigri.*

XVI. *Catus Zibethinus.*

Zibeth-Rake.

Animal est peregrinum, ad nostras oras tamen transportatum, à nonnullis oblectationis ergo ali cœpit.

OFFICIN. NAT.

Zibethum, (Civeta, Zibetta.) quod est

est ejus excrementum (*sensudor*) inter testiculos concretum vesica involutum, ex qua incisa Zibetum depromitur.

Vires. *Calidum, humidum est atque anodynum. Usus crebri in dolore colico, (inungitur umbilico,) in dolore ventris infantum, in strangulatu uteri applicatur vulva, vel cavernula umbilici.*

XVII. Cervus.

Mas, Cervus *Hirsch.*
 ♂ { *Fœm. Cerva Hin/Hindin.*
 ♀ { *Hinnulus.*

Animal est vivacissimum (ad annos 100.) cursu velocissimum, cornua quotannis mense Aprili deponens, coit mense Augusto & Septembri, circa diem Ægidii, parat mense Octavo.

OFFICIN. NAT.

1. Cornu. 2. Corium. 3. Os de corde. 4. Genitale. 5. Testiculi. 6. Sanguis. 7. Lachryma. 8. Medulla. 9. Serum. 10. Talus. 11. Astragalus. 12. Lapis.

Vires.

I. Cornu crudum resistit putredini, malignitatem corrigit, sudorem ciet, balsamum humanū corroborat. Hinc usus ejus proficuum in variolis, morbilis, febribus putridis & malignis, aliisque morbis ubi sudore opus est. *Incoqui potest decoctis, macerari in infusionibus, (quippe in substantia exhibitum, crudum ferè egeritur.*

N. Commendatur collectum intrà se-

stivitates Maria, i.e. inter 15. Augusti, & 8. Septembris.

PRÆPARATA.

Ex cornu.

1. *C. Custum, v. l. 2. c. 43.*

2. *C. C. preparatum, fit ex uto quod cum ∇ cordiali l. a. lavigatur.*

Vires. *Vi suâ siccante putredini resistit, fluxus alvi sedat, vermes necat, sudores ciet, Medicinaque est infantibus familiarissima.*

Dosis à ℥j. ad ʒj. & ultra.

3. *C. C. philosophicè calcinatum, vide l. 2. c. 43. Sudores ciet, morbis malignis confert.*

Dosis ad ʒß.

4. **Magisterium:** *Cornua raspata solvuntur in acet. destill. precipitantur per Ol. tart. vel ♂i edulcoranturq; ablutio- ne cum ∇. Hinc siccata servantur.*

N. 1. *Alii solvunt cum spir. sal. nitr. quo dein rursus abstracto, Magisterium in fundo relictum edulcorant. In abstractione à sp. sal. nitr. cautione opus est, ne sc. accensio, qua facile accidere alias potest, damnum pariat. Cautius ergò procedunt, qui solutionis ʒiv. affundunt ∇ fontan. mensur. 1. ac filtrant, filtratumque si opus sit instillando Ol. tart. precipitant.*

N. 2. *Alii solvunt cum ∇, precipitantque cum sp. ♂i ac edulcorant.*

N. 3. *Magisterium precipitatum cum Ol. tart. flavescit, è contra cum Ol. aliquo mineralis. E.g. ♂i evadit candidum.*

Nnn nnn

5. Gal.

5. *Galreda seu Gelatina.* Vide l. 2. c. 62.

6. *Liquor seu spiritus.* Vide l. 2. c. 70. & 81.

7. *Oleum v. l. 2. c. 70.*

N. *Veri olei C. C. descriptionem vide in Kesler.*

8. *Sal volatile l. 2. c. 70.*

Sunt qui Sal C. C. fixi ℥ij. cum V rectificati ℥j. & aliquot (12.) digerunt, atque dein V ad medietatem abstrahunt, residuumque servant. *Titulo Tinctura Salis CC.*

Dosis à gr. v. ad ℥℥.

Extractum C. C. fit superfundendo segmentis cornuum cervi aq. propriam & tincturam digestionem menstrua extrahendo.

9. *∇ è Typhis cervinis.* Hirsch. Rolben ∇.

R. *Cornua Cervi novella, sanguine adhuc succulenta, in frustula concide, destillaq. in MB aut VB vel per se, vel cum paucis vino generoso, donec omnis liquor extillarit.*

Vires Utilissima est in febribus ardentibus, malignis.

Dosis cochlear f. vel per se, vel cum appropriata aliqua ∇. *Hartm. in pract. Senn. inst.*

10. *Unguentum C. C. anodynum vid. lib. 2.*

11. *Corium.* Ex corio fit cingulum, quod mulierculæ utuntur ad inguina stringenda, uterinasque affectiones compefcendas.

Oscordis, Hirsch. Kreuslein / est ar-

teriarum in basi cordis concursus, qui cunctate & inprimis turgescencia tempore durior fit, & in os degenerat.) peculiariter cordi convenit, idq; à malignitate tucur, custodit partum & prægnantibus mirè conducit.

IV. *Genitale (Priapus):* diureticum est, Venerem stimulat, dysentericis colicq; dolore correptis auxiliatur. Datur tum tritum, tum de cocto in coctum, vel & aquam qua genitale ablutum est. exhibere convenit.

V. *Testiculi seci è vino poti, concubitu cum voluptate excitant.* Schwenckfeld.

VI. *Sanguis inassatus sartagine, dysenterias & cæliacor. profluvia sistit; est & efficax contra toxica; commendatur ad dolores coxendicis & lateris (cum oleo decoctus.*

PRÆPAR.

Esti ex sanguine cervino & hircino non minus ac ex sanguine humano eliciqueant Spiritus, Oleum, & simil. Inprimis tamen in usum Medicum accersitur.

Balsamus Antipodagricus paratus ad modum qui habetur de sanguine humano.

N. *E dictis animalibus si interiora viscera, videlicet pulmones, cor, atque hepar particulatim disselta una cum sanguine macerentur, nobilior eorum essentia simul proleclatur.*

Vires. In podagra maximi est solaminis. (illius,) insignis item ejus usus est in contracturis à quacunq; causa subortis,

ortis, quippe vi salis magnam resolvendi vim obtinet. *Gluckr. in Beg.*

VII. *Lachryma* s. sordes quæ in oculorum angulis reperiuntur, velut cera indurata, odoris aliquantulum gravis, tandem fragrantis (*lapis vulgo dicitur*) siccant, adstringunt, corroborant, sudorem cient, ideoque adversus venena morbosque contagiosos quàm summè celebrantur, ut vel cum Lapide Bezoar viribus certare dicitur.

Quin imò (ut scribit ad me Cl. D. D. Horstius) profunt lachrymæ quoque in difficultate partus, adeo ut earum vis nuper adhuc sit comperta in mortuo etiam foetu expellendo.

Dosis gr. 3. 4. vide *Casp. Bauh. l. de lap. Bezoar. c. 8. § 9.*

N *Lachrymarum harum* aliquot frustula colore obscure fusca, consistentia cerea, pilis immixtis referta, donec liberali mihi impertita est Illustrissima Saxonia Princeps, Sophia Eleonora, Conjux Illustrissimi ac Celsissimi Principis ac Domini, Dn. Georgii Hassia Landgravii, &c.

VIII *Medulla* ferè omnium laudatissima est, præstatque præ reliquis in ulceribus malignis, ut & in Tibiarum ulceribus. *Plin.*

IX. *Sevum* commendatur præ aliis in tumoribus molliendis, vulneribus astringendis; pernioles perfanat, dolores sedat.

PRÆPARATA.

Ol. stillat. sevi vel axungia fit, l. c. lib. 2. c. 70.

Vires. Emollit, lenit, summum mitigativum est in podagra, semel ac iterum de die illud.

X. *Talus* s. *Astragalus* utilis est Dysentericis.

XI. *Lapis* in corde, ventriculo, vel intestinis nonnunquam repertus, cum Lapide Bezoar viribus suis convenire dicitur. *Crato Epist. 160. Encel. de lap. l. 3. c. 49. C. Bauh. de lap. Bez. 11.* In primis verò lapis è vulva erutus phylacterium esse fertur prægnanti & perficere ut partum perferat.

N. 1. Optima omnia è cervo censentur, collecta ex cervo turgescente, quod sit circiter *Agidii Festum* initio Septembris.

N. 2. Cauda cervi venenata est.

XVIII. Cochlea.

κοχλὴς, κοχλία, Limax, Schnecken.

Cochlex } Testaceæ
Nudæ (sine testis).
Fluviatiles.

Præferuntur quæ in locis apricis & vinetis degunt, herbisque vivunt odoratis, collectæ ante ortum Solis vide *Forest. l. 16. § 8.*

N. Fluviatiles easdem quidem vires obtinent, sed rarioris usus sunt. Generantur ex terra limo; vivunt rore, plantisq; variis. Inimicantur coturnici ac ardea quibus in prædam & cibum veniunt. Antipathica sunt maximè Lacertis ac

Nnnnn 2 Simiis:

Similis: Nimirum, hæ cochlearum vel testarum solarum presentiam adeo formidant, ut sese contrahant, formidineque excrementa egerant.

OFFICIN. NAT.

1. *Cochlea integra.* 2. *Testa.* 3. *Pinguedo.* 4. *Mucus.*

Vires.

1. *Cochlea* refrigerant, incrassant, consolidant, leniunt, nervis conveniunt ac pulmonibus. Hinc usus præcipui interne ad tussim, phthisin, secretionem sanguinolentam, aliosque pulmonum affectus; hinc ad Epatis calorem, & colicum dolorem.

Extrinfecus maturant ac rumpunt anthraces, (*imposita tum sola, tum cum felle tauri,*) consolidant vulnera præcipue nervorum, ulcera sanant, (*in primis tibiar.*) inflammationes (*podagricas*) mitigant, ventrem hydropicor. hydrocelemque herniosorum detumescere faciunt (*cum testis trita & imposita*) hæmorrhagiam cohibent (*fronti applicata*) Spuma & cochleis sine ∇ igni apposita fistulas domare dicuntur.

3. *Testa trita* exhibentur calculosis, rimas manuum siccant & consolidant.

3. *Pinguedo* (*in elixato brodio, ubi id refrigerit, supernatans.*) oculorum rubedinis doloribusque medetur, defluxiones ad oculos intercipit (*fronti cum albo ovi imposita.*)

4. *Mucus salivofus* (*quem compuncta cochlea reddunt,*) emplasticus est,

ideoque glutinans, defluxionesque ad oculos intercipient (*in anacollematis.*)

PRÆPAR.

1. ∇ *stillat.* è carne mense Majoris Octob. per MB prolecta convenire dicitur atrophiam laborantibus. Epar nimirum corroborare statuitur.

Extrinfecus faciem fucat.

2. *Cinis cochlear.* Exiccat, incrassat, cutis rimas ac scabritiem exiccat, Synoviam, (*das Glied Wasser/*) fistit.

3. *Liquor limacum.*

Rubri limaces concissi misceantur cum pari pondere Sal. communis, concificenturque in manicam. Hipp. ut in cellâ defluant in liquorem, quo dolentes partes podagricæ illinuntur, & verrucæ scalpello prius abraasæ facili averruncantur.

S. Closs.

XIX. *Cuniculus.*

Κύνιλος, Künigle/ Küniglen.

Animalculum est leporini generis, timidum, sæcundum admodum & prolificum.

OFFICIN. NAT.

1. *Integerustus.* 2. *Axungia.* 3. *Cerebrum.*

Vires. *Cuniculus totus exustus* medetur Anginæ s. faucium inflammationibus cum cosso & folio illitus.

2. *Axungia* articulis & nervis induratis utilis est.

3. *Cerebrum* venenis resistere creditur, alioquin leporino correspondens.

XX. *Elephas.*

Ελέφας, Elephantus, Elephant/Helffant.

Animal est rarissimum, vivacissimum, placidum ac docile.

OFFICIN. NAT.

Soli dentes, Ebur vulgè dicti.

Vires.

Ebur refrigerat & siccat, moderatè, adstringit, incidit, viscera roborat, albas mulierum fluxiones sistit. Ictero convenit, lumbricos fugat, diuturnis obstructionibus confert, stomachi dolores & imbecillitatem abigit. Epilepsia medetur, melancholiam arcet, putredini ac venenis resistit. Adhibetur ejus Limatura in infusionibus, quin & pulvis in substantia exhibetur.

Dosis ʒß.

PRÆPAR.

1. *Ebur ustum* (spodium vocant, & ad differentiam spodii mineralis, spodium ex Ebone.

2. *Trochisci de spodio*, vide Dispens.

N. Sunt qui *Ebur* ad fecunditatem commendant, verum cum sit animal pauca proles, tardè pariens, (biennium sc. gravidum,) potius ad sterilitatem foetusque retentionem facere conjectratur, quàm ad conceptionem promovendam.

XXI. *Equus.*

ἵππος, Equus, Mas, Equæ fœmina, Pferd.

OFFICIN. NAT.

1. *Sanguis*. 2. *Coagulum*. 3. *Lac*. 4. *Stercus*. 5. *Lichenes*. 6. *Testes*. 7. *Pinguedo jubar*. 8. *Ungula*. 9. *Pili*. 10. *Saliva*. 11. *Dens*. 12. *Lapis*.

Vires. 1. *Sanguis* (malunt nonnulli equarum admixturam experiarum) admiscetur septicis ac causticis.

2. *Coagulum*, (*Hippacen* vocant,) privatim cæliacis, Dysentericisque convenit.

3. *Lac* utile censetur Epilepticis, Phthisicis, Tussientibus, Asthmaticis.

4. *Stercus* extrinsecus sanguinis eruptiones cohibet, (tàm crudum, quàm ustum,) foetum mortuum, ac secundinas expellit, (*in suffitu*.)

Internè propinatur in dolore colico, ac strangulatu uteri, & similiter in foetu mortuo & secundinis expellendis.

N. Præstat ex equo avena nutrito, & non castrato.

5. *Lichenes* (callosa excrementa in equorum cruribus nascentia, (laudantur peculiariter ad uterinas suffocationes, (*suffitu subitus facto*,) ut & ad morbum comitalem, & calculum; (*pulvis propinatus*).

PRÆPAR.

Extractum Lichenum fit ex lichenibus siccatis cum V, vel alio appropriato spiritu.

Dosis à gr. v. ad ʒß.

N. Hartman. Menstruum parat

Nnnnn 3

ex

ex Meliss. & Vini ana. lb. iij. qua per
 Om ex cineribus destillat super Succini
 & Gagatis Zij. Δ ē in fine forti, hinc
 Δ m ab 80° separatam adbibet.

6. Testes castrati ad secundinas pel-
 lendas remedium præsentissimum (pul-
 verisati.) Commendantur quoque in
 doloribus colicis.

6. Pinguedo jubati colli Ranschmalz.
 illinitur commodè articulis luxatis.

8. Ungula partus mortuos extur-
 bat (suffitu) pediculos fugat, (suffi-
 tu.

9. Pili sanguinis fluxum reprimunt.

10. Saliva spuma oris triduo pota,
 tussim sanat, fervorem faucium con-
 tundit.

N. Aqua frigida ex ore equi non ca-
 strati in præterfluente potantis elapsi, &
 subito vasculo collecta, prodest ad steri-
 litatem emundandam, (semel ac iterum
 pota) Hartm. in pr.

11. Dentes primùm nascentes, den-
 titionem facilitare dicuntur, (ap-
 pensu.) Dentes dealbant, (cinis affri-
 catus,

12. Lapis (Hippolithus) in ventri-
 culo aut intestinis equorum nonnullor-
 um repertus, uti Lapidi Bezoar, (Oc-
 cidentali,) figura & laminea structura
 non absimilis est, ita & vitibus eundem
 æmulari statuitur.

N. Historias lapidis hujusmodi, ovi
 magnitudine reperti, habet Iordanus tr.
 de peste, Phœnom. tr. 3. c. 9. Schwenck-
 feldius in Theriotroph. vide &c. Baub.
 tr. de Lap. Bez. c. 25. His subiungi me-

retur lapis ejusdem ferè magnitudinis,
 quem nostro hoc tempore præbuit mortuus
 equus, (ut audio Hispanicus,) non procul
 ab urbe hac nostra Francofurtensi disse-
 ctus; quem apud Henr. Wolrath. Comi-
 tem de Stolberg videre contigit. Cujus
 vires easdem cum Lap. Bez. occidentali
 experientiâ docuit.

XXII. Erinaceus.

Ex 80°, ein Igel / J. caninus.
 Hochel / Uillus.

Animal est terrestre, echinatum,
 Hyeme in cavernis arborum occulta-
 tur, vescens muribus, juglandib. malis,
 pyris, & simil.

OFFICIN. NAT.

1. Echinus ipse. 2. Iecur. 3. Axungia.
 4. Ventriculus.

Vires.

1. Subvenit (coctus vel incineratus
 & potus) involuntariè mingentibus,
 stomacho gratus est, alvumque & uri-
 nam movet. Forest. l. 21. 15.

Extinsecus illitus alopectæ subve-
 nit.

2. Iecur vel & corpus exiccatum
 atque cum Oxymelite sumptum, re-
 num vitii auxilio est, medetur Cache-
 xiæ, Hydropi, convulsionibus & Ele-
 phantiæ; viscerum fluxiones exiccat.
 Dioscor.

3. Axungia felicissimè herniis mede-
 tur. Hartm.

4. Ventriculi tunicam internam com-

commendant ad dolores colicos (assumpti.

XXIII. Homo.

Ανδρῶν & Μασ.
Μενησ. & Fœmina.

OFFICIN.

Sumuntur vel ex partibus corporis
viventis.

Quales sunt.

1. Capilli. 2. Ungues. 3. Saliva. 4. Aurium sordes. 5. Sudor. 6. Lac. 7. Menses. 8. Secundina. 9. Urina. 10. Stercus. 11. Semen. 12. Sanguis. 13. Calculi. 14. Membra-
na caput fœtus cingens.

N. De pediculis vide infra.

Vel ex partibus corporis demortui
seu Cadaveris.

Tales sunt.

1. Integrum Cadaver. s. Caro. 2. Cutis. 3. Pinguedo. 4. Offa. 5. Cranium. 6. Ufnea Crani. 7. Cerebrum. 8. Fel. 9. Cor.

I. Capilli commendantur ad capillorum productionem, (liquor inde destillatus & cum melle illitus) ad Ictericitiam, (pulvis propinatus) ad membra luxata, (cū adipe ovillo illitus cinis) ad hæmorrhagiam vulnerum.

N. Sunt qui ad quartanam capillos patientis, cum aliis in corpore dispersis pilis permixto, ovo imponunt duriter coquunt, & avibus deglutienda objiciunt, quæ ratione quartanam curatum iri volunt.

PRÆPAR.

Destillatum fit per se ex Oigne arena non admodum valido.

II. Ungues cient vomitum, Cinus

assumpti, tum in pulv. tum in infus.) a-
quas Hydropicor. ducere dicuntur (re-
secti à pedibus & manibus atque umbilico
alligati.

N. I. Sunt qui ad curandam febrim
segmenta e manibus & pedibus ovo inclu-
dunt avibusq; deportanda objiciunt, alij
eadem cera involunt, matutinoque tem-
pore ante Solis ortum janua affigunt alij
dorso cancri vivi alligant, cancrumq; flu-
enti committunt.

N. 2. Ad recuperandas vires abscissos
ungues & capillos cerasi radici incise im-
ponunt, vulnusque fimo cooperiunt.

PRÆPAR.

R. Rasur. vel resegment. pulveris. ʒj.
Vini generosi lb. i. macera, donec in
mucilaginem abierint. Hinc filtra &
ʒj. reserva.

Dosis à ʒj. ad ʒvj. vel ʒj.

III. Saliva jejuni hominis commen-
datur ad venenatos morsus serpentis,
canis rabidi, & simil.

IV. Aurium sordes (cerimen) colica
laborantib; præsentissimum perhiben-
tur Remed. (in potu si assumantur.

Extrinsecus medentur ictibus Scor-
pionum, conglutinant vulnera, fissuras
& scissuras cutis.

V. Sudor usus proficui dicitur, con-
tra scrophulas, si cum herba radiceque
verbasci mixtus folio involvatur, inque
cineribus calefactus imponatur.

VI. Lac refrigerat, lenit, maturat o-
culorum rubedini subvenit.

PRÆPARATA.

I. ∇ lactis & sa.

R. La-

℞. Lactis & O-i alb. an destilletur ut phlegma saltem prodeat, relictis acriorib. spiritib.

Vires. Oculorum rubedini, aliisq. inflammationib. mire confert.

2. Butyrum: Insigne est ophthalmicum.

VII. Sanguis menstruus, (Zenith. juvenacula) exiccatus commendatur intrinsecus ad calculum & Epilepsiam. Extrinsecus sopit dolores podagricos, (cum adipe bovinainunctus.) Conducere item dicitur in Peste, apostematibus carbunculisque (impositum linteum quod fuerit humectatum in \oplus vel ∇ rosar. menstruo illo sanguine impragnata.) Erysipelata extinguit, pustulas faciei abstergit.

N. 1. Commendatur qui prima vice erumpit.

N. 2. Ad immodicum menstruorum fluxum cohibendum, sunt qui pannum menstruo sanguine imbutum certo tempore Cerasi radici in cortice aperta induunt, incisuramq. iterum operiunt.

VIII. Secundina (vel hujus loco Umbilicus infantis) magni fit ad struinas gutturis tollendas, (calcinata & in ∇ abrotani quotidie exhibita pondere ʒb. idque ζ decrescente,) ad Epilepsiam & philtia compescenda; ad molam & foetum exterminandum, nec non ad animalia enecanda, etiam ea, quæ maleficio in homine extiterint. Hartm. ad nervos maternos commendat, alii ad dolorem colicum (gestatam loco amuloti.)

IX. Urina, calf. exiccata, resolvit, abstergit, discutit, mundificat, putredini resistit, ideoq. usus est præcipui intrinsecus, in obstructione Epatis, Lienis, Vesicæ biliaræ, Pestis præservatione, Hydrope, Ictero. Quin & Mariti urina hausta partum difficilem facilitare dicitur.

Extrinsecus siccata scabiem, resolvit tumores, mundificat vulnera etiam venenata, arcet gangrænam, solvit album, (in clysmate) abstergit furfures capitis, (cum Sal. nitr. mixta,) compescit febriles insultus, (pulsui applicata,) exulceratas aures sanat, (instillata pueri urina) oculorum rubedini subvenit, (instillata) artuum tremorem tollit, (lotione) uvulæ tumorem discutit, (gargaris.) Lienis dolores sedat (cum cinere cataplasmatifata.) Vide Hieronymum Reusnerum Synops. de remediis ab urina desumptis. Tabernemont. Waser. Eschsch.

PRÆPARATA.

1. Spiritus volatilis, Sal volatile.


℞. \square pueri, (ann. 12.) Vinum bibentis recentis, destilla per XX inferventi MB. Hinc cohoba super feces, prodibit \sim \square cum suo phlegmate mixtus, quem si libet dephlegma, & habebis spiritum. Hunc si ex phiola eleves, nancisceris sal volatile candidissimum.



Vires. Auxilii nobilissimi censetur in pellendis lapillis, (potus cum conveniente liquore, sed valde fœtus.

N. 1. Co-

N. 1. Celeberrimus est, ob tincturam ceruleam Smaragdi, cujus preparationi menstruum prabet. (cum phlegmate.)

N. 2. Libavius rectificat, imponitque podagricis, asthmaticis, calculosis, per syringam in vesicam immittit, (impregnatum tamen antea essentia saxifragor. v. gr. Crystall. lap. Lync. & simil.)


2. Alio  igneus.
Sal. volatilis.

R.  pueri V bibent. q. s. (mens. 30.) evaporet leni admodum Δ ad consistentiam ulque Syrupi. Residuum hoc reconde in phiola longissimi colli, & destilla aëre frigidiore, (ut scilicet in XX condensetur,) in Fib. vel arena & prodibit  in XX instar nivis sese elevans, frigore coagulabilis, sed leni calore fusibilis. Osvald.


N. 1. Hunc spiritum si purificato suo Sal. com. ex fecib. scilicet elix. viato conjunxeris, cohobisque aliquot volatilisaveris, menstruum habes insigne ad elicienda vitriola è metallis & præcipue è Ca.



N. 2. Eundem spiritum (Sal. com.) solutionibus & coagulationibus purificatum, si aliquamdiu (& p. 8.) in VB digerus, solvetur: Solutionem ergo si denuò cum V rectificatiss. maceraveris. (& p. 8. mensuri particeps es solvendo \odot idonei.


3. Spiritus per putrefactionem.

R.  hominis juvenis (annor. 11.) vinum bibentis quantitatem magnam

(mens. 30.) pone in sinum equinum vel MB. σ p. 40. ad putrescendum. Hinc decanta à fecib. ac destilla per XX, (vel per vesicam,) ex arena, idque donec omnis humiditas destillando abstracta sit. Humiditatem hanc cohoba aliquoties. (3.) à capite suo mortuo. Tandem destillatum in cucurbita oblongi colli, committe calori, ut alembicus semper frigidus maneat. Sic ascendit Spiritus instar Crystalli, nulla comitata humiditate. Crystallus rectifica solvendo in ∇ pluviali Qat. & ex phiola, ut prius Qando, idque sexies, semper novam ∇ pluv. stillatit. adhibendo. Hinc digere Crystallus in phiola Herm. cl. σ p. 15. lento Δ e, donec in liquorem limpidissimum abeant.

N. 1. Sennertus ab  dicto modo defecata, destillando elicit, saltem quartam aut sextam partem, eamque leni calore ex phiola oblongioris colli dicto modo sublimat. Vide Inst.

N. 2. Alii  m putrefactam destillant ex cucurbita, cujus orificium obturant charta triplici oleo imbuta, vel spongia similiter imbuta, qua  igneus tantum transeat.

N. 3.  quia facile destillando exastuat, cautè ignem adhiberi oportet.

N. 4. Sunt qui factoris corrigendi gratia (qui tamen & dicto modo aliquatenus correctus) V affundunt eumque rursus lento calore abstrahunt, idque aliquoties novum semper V affundendo. Verùm Sal. com. urine hac ratione correctum

ooo ooo

non

non Sal com. urina simplex, sed Magisterium potius, i. e. Sal. com. urina sale vini impragnatum dici meretur. Vide de his destillationibus Hartm. in pract. & Croll. Sennert. in Instit. Glucky. in Beguin. l. 3. c. 2. Kesh. l. c. 2. 4. c. 24. Becker. in Spagyria Microcosmica, &c. Tentzel. in Exegesi.

Vires. Insigne anodynum est in doloribus (sicum liquore conveniente affricatur.) referat quoque tartareas obstructions Viscerum ac Mesenterii, unde magnus ejus usus esse poterit in Scorbuto, Hypochondriaco, Cachexia, Ictericia flava ac nigra: atterit calculum renum & vesicae, doloresque inde ortos sopit, &c. Idem Sal si in Sp. dissolutus, ac iterum in arena destillatus fuerit, liquor prodit in Epilepsia efficacissimus. Idem spiritus optime purificatus, (scil. aliquoties in ∇ pluvia solvendo & destillando,) cumque ∇ anaticae unitus solvit \odot , unde \odot potabilis, vide ∇ microcosmicum.

4. ∇ \square Antepilepticus, ex \square & \odot i duplo digestis & destillatis. Vide lib. 2. de \odot .

N. Quercetanus designat. Rer. pluribus eundem describit, eademque opera elicit MB.

1. Phlegma Ophthalmicum (primum egrediens.
2. Antipodagricum (acrius 2. destillans.
3. Per Retortam spiritum glaciale m i. e. coagulabilem, quem maximopere deprecatur ad referendas obstructions Epatis, Lienis, ad promovendas urinas

& dissolvendum calculum, tum quoque ad extinguendas inflammationes & gangranas.

5. Magisterium \square .

2. \square putrefactam, (ut dictum,) & defecaram, destilla l. Δ ex MB, donec phlegma omne prodierit, tunc subsiste & rectifica spiritum ex phiolâ oblongi colli, sic acquires sal volatile, quod collige phlegmate rejecto. Residuum destilla ex arena & ascendet ulterius sal volatile: Ex ∇ elixivia sal fixum, idque coagula ad siccitatem, atque cum triplo argillæ mixtum, inque globulos redactum, (postquam globuli exiccati fuerint,) destilla per \odot m, (ut destillatur ∇ sal. com.) Spiritui huic affunde stillatim priorem illum \square ∇ m, vel sal volatile, donec cesset strepitus. Hinc da Δ m sublimationis in arena, & sublimabitur Sal \square elegantissimum, visuque jucundum.

Vires. Efficacius agit hoc sublimatum quam precedens, tartareamque totius corporis incidendo, per sudorem, urinam imò vel per alvum expellendo. Plurimos inde ortos affectus curat, vel saltem levat, quales sunt, Atrophia, &c. Praeservat itidem a doloribus calculi, (si singulis Mensibus ante novilunium assumatur.

Dosis gr. vii. viii. ix. x. in liquore convenienti.

Usus ejus quotidianus aliquamdiu continuari poterit.

6. *Oleum Ludi*, i.e. tartareæ materiæ quæ matula in hærescit, fit calcinando, per deliquium solvendo.

Vires. Insigne est ad resolvendum calculum.

Dosis ℥j.

X. *Stercus* (carbon humanum *Paracelso*, aliis *Sulph. Occidentale*,) emollit, maturat, anodynum est. Ea propter magni usus ad mitigandos dolores incantatione introductos, (*impositum*,) ad anthraces pestilenciales maturandos, ad phlegmonem, v.g. gutturis (anginam curandam, (*siccatum, eritum, & cum melle illitum*,) ad inflammationes vulnerum arcendas. Quin & intrinsecus à nonnullis adhibetur, in Angina, (*crematum & potui datum*,) in febribus ad paroxysmos profligandos, (*eodem modo propinatum*. Dof. ℥ij.) in Epilepsia, (*quam stercus primum Infantuli siccatum & pulverisatum & ad complures dies exhibitum, radicibus eveltere ajunt*.

PRÆPAR

1. ∇ *Stillatitia* fit una & eadem operâ cum oleo.

Vires. Mederi dicitur oculorum ungibus reliquisq. passionibus tunica annata, (*guttula una vel altera instillata*,) faciei conciliare colorem, pilos producere, ulcera corrosiva & fistulas curare, cicatricesq. manuum removere.

Internè prodesse ajunt comitialibus & hydropicis, lapidem querenum & vesicæ pellere, morsibusque canis rabi-

di, venenatorumque animalium subvenire.

2. *Oleum*.

℞. *Stercor. Juvenis*, (non pueri q. p. exiccetur in Aëre vel furno lento Δc , postea per XX destilla, Δe primum lento, sic prodibit phlegma, tandem cum aliis Spiritib. oleum. Utrumque per *MB* rectificetur.

Poterius Andegav. parat hoc modo.

℞. *Sterc. humanum* quant. magn. corrumpatur per se, ac convertatur in exigua quædam animalia, & hinc ferè in serem abeat. *Stercus* hoc ita præparatum destilla ex O , i. Δ blando, mox validiori, sic prodibit O & ∇ .

N. *Graveolentia* utriusque tollitur rectificationibus & cohobationibus repetitis.

Vires. Valet ad tineas capitis, erysipelas exulceratum, lichenes, impetigines (*illitum*) podagricis doloribus subvenit, cantrum curat & mortificat.

Internè Icterus solvit, *Libav. l. 2. Alchym. Poter. in Pharmacop.*

3. *Zibetta occidentalis* nihil est aliud, quam *stercus* mediante digestionem ad suaveolentiam redactum, qua *Zibettam* mentitur vid. *Agricol.*

XI. *Semen s. Sperma*, non modo comperimus per se à nonnullis ad Veneris scilicet ligaturam maleficam dissolvendam adhiberi, sed & *Mumiâ* magneticam inde fieri, qua amoris

Oooooo 2

moris

moris concilietur fervor. Quin & humunculum suum inde meditatur Paracelsus.

XII. Sanguis, (recens adhuc & calidè potus,) conferre dicitur ad Epilepsiam, si scil. potum motus excipiat vehementior, cursusque celerior ad sudoris usque prorupcionem, hæmorrhagiam quamcunque sedat, (epotus recens vel incineratus.) Quin & extrinsecus sanguinis eruptioni medetur, & præcipue narium hæmorrhagiæ. (cinis indutus vel & recens fronti illitus, ut inibi exiccesur.

N 1. Potio sanguinis summâ cautione opus habet, quippe assumentibus non modo truculentiam inducit, sed & Epilepsiam quandoque generasse compertum est.

N 2. Sanguis puerperis sanat scabiem volaticam, (recens cum secundina semel ac iterum illitus.) Hartm.

PRÆPARATA.

1. ∇ destillat. Fit eodem labore cum ∅∅.

Vires. Valet in Phthisicis & aridis (epota ad 3j. vel membris affricta,) fistulis purificandis & sanandis, ambustis refrigerandis.

N. Destillatur & ∇ è sang. & lactis human. à. commendaturque ad maculas cutis extirpandas. Hartm.

2. ∅∅ destillatum.

N. Sang. Juvenum (verno extracti,) quant. magna. Alcohol. Vini $\frac{1}{3}$ cucurbitis probè minutis, digere in F.E. & ∅ 40. dein destilla per XX, &

cinere, & prodit una cum ∇ ∅∅. Utrumque rectifica ∇ per MB. ∅ per ∅. è cineribus aliquoties (9. 10. Qando.

Vires. Maxime commendatur ad Epilepsiam radicitus tollendam, (si singulis diebus per mensem integrum sumatur ∅b. à Novilunio incipiendo & postmodum singulis Noviluniis semel per annum ∅j.) ad paralyin, apoplexiam, pulmonem exulceratum, pleuresin, Beguin.

N. Destillatio S. H. non unimodè instituta reperitur.

Nimirum:

Destillant alii S. Hm. recentem & adhuc calentem, idque modo duplici, per se scil. & sine additione rum quoque admixta aliquota parte ∇ rectificati.

Alii S. Hm. non recentem, sed vel exiccatum, vel digestum aliquam diu destillationi subjiciunt. Digestionem autem peragunt alii solius sanguinis (addito tantillo Sal. com. alii sang. cum ∇ rectific. confusi.)

Exhibet autem Anatomia Sanguinis
1. ∇ m & 2. m, i. e. ∇ m rectificatam. 3. ∅, i. e. Lignorem crassiorem. 4. Sal volatile. 5. Sal fixum. Verum nos sufficientiora damus.

3. Oleum rectificatum.

N. Sanguinem Juvenis sani, mense Majo venâ sectâ extractum, suscipe cucurbita, ut solum $\frac{1}{4}$. repleatur. Hinc clauso vase detineatur in calore mediocri, ut sanguine intumescente tota cucurbita impleatur. Hinc F. Qatio-

pi-

primumque exit ∇ (non magnæ astimationis, nisi quod amplius elaborata, nonnullis ad extrahendum Salinerviat.) Reliquum pessatur in cineribus per Ω m, juncturis optimè clausis: Destillatum refundatur super feces, fiatque cohobatio vice nonâ, ut color subsequatur rubinus.

N. Attendere oportet in destillatione, ne nimio Δ feces comburas, inque carbonem redigas; ideoque tantum ad siccitatem destilles.

Vires. Maximarum habetur virium ad refocillandos agrotos. Libav. Syntagm.

4. Balsamus Antipodagricus s. Oleum s. H. alcalisatum. Fit eodem modo.

R. S. H. adhuc calentis, Mens. i. putrefac. aliqu. σ (9.) dein destilla ex arenâ per gradus 1. lento Δ e, hinc 2. fortiori per Ω , & exibat ol. rubicundum & ferens, salè volatili ad spondilia colli adhærescente, & rectifica per colchotar ex cucurbita Δ arenæ aliquoties à recenti colchotare Qando: demùm solve in correcto hoc oleo sal & serva.

Vires. Mirandarum est virtutum in podagra, quotidiè bis ter vè sex diebus continuis inunctum; sistit dolores tumore simul & rubedine evanescente.

N. Similis energia est balsamus è sanguine hircino & cervino prolectus, in quibus tamen & viscera, pulmones scilicet cor & Epar addidisse expedis. Vide suprâ.

5. Spiritus Antepileptici.

R. S. H. dephlegmati & ter rectificati, lb. ij. infusi fl. lavendul. (in vino) lb. ij. M. & destilla per B. M. ad medietatem, idque repete tertiâ vice: dein adde ∇ rectific. ζ ij. & serva.

Vires. Valet ad curandam Apoplexiam, Paralyfin, ut & ad Asthma, &c.

N. Habet & Beguinus insuper S. H. Qu. Ess Biolychnium, Philtrum, Balsamum, ∇ m sanitatis, Arcana duo. Verùm cum proluxa horum descriptio. Authorque alias in omnium manibus versetur, illorum descriptione supersedeo.

6. Mumia vite alexiteria.

Est sanguis florentis & benevolentis hominis, lento calore exiccatus, spiritulimonum & Θ i spiritu imprægnatus, & in trochiscos cum pauca myrrha paratus.

Vires. Insignis est efficacia in curandis carbunculis.

Dosis ζ ss. in ∇ cinam. mane jejuno propinata. P. I. Fab. in Chirurg. c. 9.

7. Arcanum sanguinis humani.

P. I. Fabri vide Myrothec. c. 8. Bylich. de natura Spagyr. n. 66.

XIII. Calculus Tartarum s. calculum in omnibus partibus solvit, & expelli facit, ideoque omnibus obstructionibus subvenit.

[Pulv. exhibitus. Dosi ζ j.

000000 3

PRÆ.

PRÆPARATA.

1. Sal Crystallinum.

R. Calcul. optimè calcinatum (ut durities lapidis emolliatur,) coque in ∇ , & solvetur in ∇ m Citrinam. Hinc filtratura evaporata, manet Sal in fundo, quod si libet denuo calcina, & in ∇ fervente solve, & coagula reponere ad crystallisandum.

N. Calcinatio institui potest diversimodè: Alii calcinant cum Sal. nitr. 6. horis: Alii cum Sulph. & Sal. nitr. Alii cum duplo carbonum faginarum.

Sennertus calcinat calculum tritum Δ circulari, hinc reverberii, & tandem cum carbonibus faginis (in fornace sigulina. Inst. l. 5. p. 3. s. 3. c. 5.

2. Oleum f. Liquor, fit si Sal in aëre humido solvatur.

Dosis gr. vi. ad x.

N. Sennertus calcinat cum Sal. nitr. hinc Sal. com. cum ∇ exirahit, & ∇ separato, Sal reponit ad liquefcendum.

3. Essentia f. Elyxir.

R. Sal calculi Crystall. volatilisa cum ∇ , hinc abstraheleni calore ∇ , & remanet ϕ . Sennert. d. l.

Dosis à gr. v. ad x.

N. Si ita placuerit, calculum iisdem preparationibus cum aliis lapidibus subjicere poteris. Vide l. 2.

XIV. Membrana, quæ caput nonnullorum fœtum cingit, maximam vim habere dicitur adversus colicum dolorem.

EX CADAVERE f. HOMINE MORTUO.

1. Cadaver integrum Carovè, Officinis Mumia titulo venit.

Hæc resolvit sanguinem coagulum (assumpta Zij.) conferreque dicitur purgationi capitis, punctioni Lienis, tussi, inflationi corporis, mensibus obstructis, aliisque affectibus uterinis & sim.

Extrinsècus adhibetur vulneribus consolidandis.

N. Mumia communiter 4. denotat.

1. Mumiam Arabum, quæ est liquor concretus exudans in sepulchro è cadaveribus Aloë, Myrrha, Balsamoque conditis.

2. Egyptiorum, quæ est liquamen ex cadaveribus pissasphaltis conditis. Nimirum, hoc condiebantur cadavera vilioris sortis, adeoque, & ipsamet cadavera nonnunquam eo modo condita prostant.

3. Pissasphaltum factitium, i. e. mixtum pici bitumen, quod pro Mumia venditant.

4. Cadaver sub arena Solis æstu torrefactum. Fitque in Hammoniorum Regione quæ est inter Cyrenarum Regionem & Alexandriam, ubi arenarum Syrtes Ventor. turbine sublatur incautos viatores obruunt, unde horum cadavera à flagrante Solis æstu torrentur & excrefcunt.

His 5. & Mumia recentiorum addi poterit, quæ fit: Eligatur Cadaver hominis ruffi (quia in hoc sanguis habetur tenuior, adeoque & caro præstantior) integrum, recens, sine macula, 24. aut circiter annorum, morte violenta (non morbo) inter-

inter-

interemptum, per diem & noctem luminarium radiis, sereno tamen tempore irradiatum. Hujus carnes masculosas frustulatim conscinde, & consperge pulvere Myrrha & tanullo saltem Aloës, postea imbebe macerando aliquid & in V suspendatur per 8. 6. vel 10. ac iterum cum V imbibatur: tandem in aëre siccori, locoq; umbroso frusta suspensa siccescant, tunc assimilatur carni fumo durata, sine fœtore. Crollius.

N. Ex his jam recensitis Mumiarum generibus, etsi prioribus, si saltem è sanis corporibus haberi possunt, suas laudes non derogem, præcipue primo, quod tamen vix ad nos perferri credo: Attamen iis posteriora duo preferenda autumo, utpote in quibus metu sumus soluti, quem incutit Renodus. Mumiam Officinarum nihil aliud esse perhibens, quam expressum putridi cadaveris succum inspissatum, ideoque magno mortalium damno divendi.

PRÆPAR.

Vulgaria quæ Mumia Officinarum ingreditur passim occurrunt.

Suntq;

Pulvis ad casum, Athanasia magna Balsam. Petri de Ebano, Unguentum Sympathetic. Emplastr. Apostol. nigrum, Cerat. pro herniosis Laudan. Opiat. &c.

Insuper sunt minus vulgaria:

1. Tinctura s. Extractum Mumie Quercetan.

Fit ex Mumia vulgari, extrahendo cum V & Terebinth. an. iterumque

menstr. separando ad mellis consistentiam. Querc. Spagyric.

Vires. Alexipharmaca est, putredini que summopere resistit. Commendatur iidem ad morbos pectoris, Asthma, phthisin &c.

N. Feces remanentes admodum sunt anodyna.

2. Tinctura s. Extr. M.

Crollii.

Fit ex Mumia recentiorum dicta cum V aut Sp. Sambuci.

N. Ex hac facit Crollius Theriacam de Mumia: quæ ʒ. Tinctur. Mum. lb. ss. Theriac. Androm. ʒiv. Ol. Olivar. Mumiat. ʒij. Sal. com. Perlar. & Corall. Anna ʒij. Terra sigillat. ʒij. Moschi ʒj. Dig. per mensem.

Vires. Commendatur ad quævis venena & contagia, subvenit pesti præcavendo, ʒj. & curando, ʒ. i. vel ʒi ss.

N. In assumptis venenis exhiberi potest cum Ol. Amygdal. dul. ad Vomiturum:

3. Tinctura Alcolisata, s. Elyxir.

Mumie.

ʒ. Mumie, scil. carnis humanæ indurata, tenuiter incisa, affunde Sp. Terebinth. vaseque Hermet. clauso per mensem, ad putrescendum seponere. Expressioni vesica bubula exceptæ affundantur aliquot partes V rectificæ. Inde in XX cæco super cucurbitam juncturis optimè minutis adaptentur, ita ut cucurbita in frigidam Vm posita, arena, prunaque circa XX lento calore officium faciunt, cujus beneficio Liqueor. f. Q. E. in forma

ma perquam subtili cum Vper vesicam delabitur. Materia residua reverberanda & in Sal. com. sublimatione redigenda, demum cum Q. E. posteaquam illa à V per MB fuerit separata, circulationis medio unienda. Quibus peractis Qu. Ess. Mumiz cum Theriaca & Moscho amplius digeri, & ita in forma Elixirii reservari poterit. *Tentz. in Med. Diastat.*

Vires. Remedium est presentaneum cum ipsiusmet pestis, tum aliorum deteriorum.

N. Circumfertur & Tinctura Mumia & 4. suis Elementis à se invicem separatis denudò conjunctis, quam qui voluerit, videre poterit apud *Tenz. in Med. Diastat.*

4. Alia Tinctura seu Arcanum carnis humana.

1. Carni humanæ superfunditur V rectif. per ϕ (4.) decantato V, irroratur eadem.

2. Spir. Sal. communis, per vices ut magnam ejus quantitatem imbiberit, hinc exicca, habes carnem conditam summè proficuum.

3. Ex hac extrahe Tincturam cum Spiritu Vini, vi digestionis in summam fragrantiam redacto. Circulando defeca, ex fecibus calcinatis sale extrahe, idque depuratum Tincturæ admisce; & abstrahere. P. I. Fab. Myroth. c. 11.

5. Ol. Oliv. Mumat.

R. Mum. ante paratam, (indurata) scinde per minima, digereque cum Ol. Olivar. vase H. C. per mensem.

Hinc transfunde in cucurbitam vitr. atque in MB. exhalet Mercurius, donec nullus exeat fœtor, & Mumia tota dissoluta sit. Solutionem digere aliquamdiu ϕ 20. cum V, postea eundem abstrahere, & remanet ϕ rubicundum & odoriferum.

N. *Quercetanus recipit recentem.*

Vires. Omnes Balsamina naturalis habet proprietates, venenatis & pestilentibus affectibus conducit. *Quercetanus Spagyr.*

6. Ol. exaltatum.

ϕ hoc dicto modo paratum exaltari amplius potest, si cum V aliquamdiu digeratur, V iterum abstrahatur, idque aliquoties (3. 4.) repetatur.

Vires. Tinctura seu oleum hoc Mumiz exaltatum, tantâ dicitur pollere facultate vivificâ, ut nulla sit particula, quam ipsa non penetret, nullum ulcus, nullave corruptio quam non curet, si ipsius exhibeas bis quotidie per aliquot tempus gr. 4. 5. cum decocto convenienti Querc.

N. *Libavius carnibus recentibus incisis addit parum Sal. communis & sp. Te-rebinth. macerat vas. claus. colat & fœtorem aperto vase exhalare sinit, post destillat. per ϕ vel XX rectum, additoque moscho, & V digerit.*

7. Aqua Divina.

R. Totum Cadaver cum Ossibus Carnib. Viscerib. (perempti scil. morte vio-

violenta: (secetur in frustula minutissima, probeque subigantur omnes corporis partes, ne quid maneat incommixtum. Hinc destillabis vice secundâ.

Vires. *Sunt qui Aquam hanc Divinam magneticâ suâ virtute maximopere prædicant.*

Nimirum.

Guttulas aliquot Sanguinis, (sc. 3. vel 9.) ex Egro aliquo extracti, miscent cum aliquota parte, (3j.) dictæ ∇ æ, Δ ique apponunt, quod si sanguis & ∇ invicem misceantur, intra breve temporis spatium (hor. 24.) sanitatem promittunt, sin in commixta manserint, brevi mortem subsequuntur autumant. In defectu sanguinis similiter procedunt cum excrementis, scil. \square , stercore, sudore, sanie, & similibus. Quæ tamen majori Dosi adhibent,

II. *Cutis* commendatur in difficili partu & affectibus hystericis, (si venter ea ligetur) in aridura & contractura articular. (si chiroteca inde facta induantur.

III. *Pinguedo*, roborat, discutit, mulcet dolores, removet contracturas, cicatricum duritiem lenit, foveas post morbillos relictas explet.

PRÆPARATA.

Linimentum, misce axungiam cum spir. Θ -i extractione & reductione relinquatur aliquod viscidum.

Vires. *Penetrans est, usumque habet in ariduris.*

IV. *Ossa humana*, exsiccant, discutunt, astringunt, fluxus quoscunque sistunt, adeoque utilia sunt in Catarrho, fluxu mensium, Dysenteria, Lien-teria. Insuper articulos. dolores compe-
pescunt.

N. 1. *Usitatum est recentioribus purgantibus ea admiscere.*

N. 2. *Adhibentur & dentes à maxilla mortui evulsi, commendaturque ad morbos maleficio introductos (in suffitu,) & ad corrosos dentes evellendos, (si sapius illis tangatur,) Hartmannus in practica.*

PRÆPAR.

1. *Pulvis s. Cinis* fit l. c. calcinando in fornace figulina.

2. *Ossa præparata* fiunt l. c. cum ∇ conveniente lævigando.

3. *Magisterium* fieri item potest l. cit.

4. *Oleum* fit destillatione per Θ v. l. 2.

Vires. *Discutit, anodynum est, ideoque insigne antispodagricum.*

V. *Medulla ossium*; commendatur summè ad contracturas membrorum. zur Lähme der Glieder.

VI. *Cranium* ad capitis morbos conferre compertum est, & nominatim ad Epilepsiam, unde & varias passim compositiones Antepilepticas ingreditur.

Laudatur autem præcipuè Os triquetrum temporum seu peculiare Epilepsie specificum.

Ppp ppp

PRÆ-

PRÆPAR.

1. *Cranium calcinatum* fit l. c. in fornace figulina.

2. *Cran. preparatum* fit à calcinato cum ∇ antepileptica, v. g. flor. Tiliæ lavigato.

3. *Magisterium Crani* fit l. c. solvendo in spirit. aliquo acido, v. gr. sp. \mathcal{G} & præcipitando.

Dosis ad \mathcal{Dj} . vel $3\mathcal{ss}$.

4. *Magisterium compositum*, seu spiritus *Crani* essentificatus fit, si liquori acido, oleo ac sal. volatili, Sal quoque fixum ex ∇ duo extractum conjungatur, & postea simul per mensem philosoph. in cinere illa digerantur ac uniantur.

Vires. Antepilepticum est, cuius vires vulgariæ antepilepticorum facultates longè superant. Brendel.

5. *Oleum* fit destillando crania contusa per Retortam. Exit liquor \mathcal{G} Sal. com. volatile.

N. Officinis hoc vulgare est incorruptum, præstaret tamen cum ∇ rectificasse.

Dosis gr. iv. ad vi.

6. *Sal. com. volatile* una opera cum oleo acquiritur.

7. *Extractum* s. *Tinctura Crani*.

8. *Crania* 2. vel 3. grossè contusa, digere \mathcal{G} aliquot (14.) & cohoba cum spir. Juniper. vel Salviz ad emineant. digit. 4. & 5. affuso, macera sit phiolaongi colli optimè clausa \mathcal{V} \mathcal{G} (12. 13. 14.) Hinc exprime per torcularè perquam fortissimè, & exi-

bit liquor rubicundus oleosus. Cola & abstrahè in \mathcal{V} , ad consistentiam sapæ.

Vires. Extractum hoc digestum & perfectè depuratum, tanquam thesaurum pretiosissimum adversus Epilepsiam diligenter asservare fas est.

Dosis \mathcal{Dss} . ad \mathcal{Dj} . cum sua ∇ propria. *Quercetam. Pharmac. reser. cap. 26.*

8. Extractum seu Galreda Theophrasto.

9. *Limatur. Crani*, digere cum \mathcal{V} (salvato \mathcal{G} 15.) dein destilla per \mathcal{O} m (præmissa q; maceratione \mathcal{G} 15.) cohoba vice tertiâ: tandem destillatum circula, (\mathcal{G} 5. 6) & \mathcal{V} MB separato, Effentiam instar coaguli serva.

Dosis g. 5. 6. quotidie. *Quercetam. de Med. Spagyr. præp.*

VII. *Usnea Crani* (i. e. Muscus nascentis in crano interempti, aëri exposito, astringit validè.

Ulusque magni est in Hamorrhagia quacunque, v. gr. narium (inditus,

N. 1. Sunt qui *Usneam* in manibus retentam Hamorrhagiam quancunque incantamentis instar, suppressere tradunt.

N. 2. *Adnasellar* & aliis Ossibus aëre expositis *Usnea* quedam, quam vilio-rem quidam reputant, verum & hæc magnam vim adstringendi inesse, experientia docuit.

Ingredditur *Usnea Crani* compositi-
tionem

tionem unguenti Sympathetici s. Magnetici v. l. 2. c. 78.

VIII. Ex Cerebro fiunt.

1. Spiritus Cerebri humani. Aqua aurea distilla.

2. Cerebrum hominis juvenis (infra an. 24.) sani, violentâ morte perempti, cum omnibus membranis, arteriis, venulis & nervis, cum medulla spinali tota, conquassa & affunde aquarum Cephalicarum, (s. Tilia. Pæon. Beton. Ceras. nigr. Lavendul. Lil. Conval. imprimis Diaphoretici in acutis) q. s. ad eminent. dig. 4. vel s. relinquuntur aliquamdiu, postea per cohobias, gentur. Ex fecibus calcinatis elice Sal. quem deinceps cum aqua facta conjunge & totum curiosè serva.

Vires. Antepilepticum insigne reputatur.

Dosis à ʒj. ad ʒiv. Hartm. in pract.

N. Ex cerebro Alci insigne itidem Antepilepticum simili ratione parari poterit.

2. Oleum Cerebri.

Substantiæ Cerebri admisce nonnihil sal. commun. ac destilla per Alembicam vitream ex arena.

Vires. Insigne quoq. Antepilepticum est, caputque summè confortat.

N. Totâ ferè Cerebri substantia in Balneo Mariæ redigi poterit, hinc parum Salis expectandum.

3. Aqua Antepileptica.

2. Cerebri humani lb. iij. Aqu. Lil. Conval. Lavendul. primul. Ver. Vin. Malvat. an. lb. iij. stent infusa ʒ s. deinceps gentur per MB.

IX. Ex felle humano fit Extractum cum V, quod auri instillatum mirè surditati subvenit.

X. Cor, Epilepsiæ medetur. (siccatum & exhibitum.

Et hæc sunt, qui de Medicamentis ex homine depromptis compendii ratio scribere permisit, ulteriorem faraginem qui cupit, passim apud Aucthores inveniet. Peculiarem quoque inde conscripsit Tractatum Clarissimus Dn. D. Daniel Becker, Professor & Physicus Regiomontanus, qui primum in 12. postmodum superioribus annis in 4. sufficienter augmentatus prodit.

Lacertus.

Vid. Insectorum Classem.

XXIV. Lepus.

Λαγώς Hæse.

Animaculum est timidissimum ac fecundissimum, quoquo tempore cogens.

OFFICIN. NAT.

1. Cinis Leporinus. 2. Caput. 3. Oculus. 4. Sanguis. 5. Pulmo. 6. Cerebrum. 7. Cor. 8. Iecur. 9. Fel. 10. Renes. 11. Testiculi. 12. Venter. 13. Coagulum. 14. Testis. 15. Axungia. 16. Stercus. 17. Pili.

1. Cinis fit ex Lepore integro combusto (præstat qui Verno tempore captus,) vel expelle tota, ad nigredinem cinereumve colorem incinerata. Præstantissimum Medicamentum est in calculo.

Dosis ad ʒj. & ʒss. vel ʒj.

Ppp ppp 2

Alo-

Alopecii item & Pernionibus extrinsecus medetur.

N. *Laurenberg.* leporem non calcinat, sed animal decollat, collaque inditum exsiccat in clibano, pulv. exhibet.

2. Caput Alopecia subvenit, (cinis cum melle inunctus,) dentes dealbat, (cinis in dentifricio.)

3. Oculi *Leporini Martio* capti, valent ad partum difficilem, secundinas & molam propellendam, (siccati scilicet cum pipere sine ulla compressione, imposuique vertici ut pupilla verticem tangat.)

4. Sanguis illitus cutis vitia in facie, uti lentigines vitiliginemque sanat: assatus, Dysenterias & Caliacorum profluvia sistit, calculum comminuit.

5. Pulmo suspiriosos juvat, Epilepsiam curare dicitur, (muriā conditus & quotidie cum Myrrha comestus per mensem;) perniones sanat (imposui.)

6. Cerebrum gingivis infantum affricatum dentitionem faciliat, tremores artuum emendat (inassatum & mansum.)

7. Cor dicitur itidem Epilepsiam curare (simili modo qui pulmo adhibitus,) dolores uterinos arcere, (pulvis assumptus.) Quattanz peculiariter mederi, (in partes tres dissectum & pramissis universalibus initio. 3. Paroxysmorum, tertio a parte singulis vicibus propinatum.)

8. Jecur fluxum sedat alvi, jecinerosisque opem fert.

9. Fel Ophthalmicum & Otalgicum insigne exhibet.

10. Renes & Testiculi calculosis propinantur, (siccati:) conceptum juvant (à mensib. assumpti:) mictionem involuntariam corrigunt.

11. Testiculi Urinæ incontinentiam tollunt, Vesicæ morbis subveniunt, ad conceptionem faciunt, (pulverisati & assumpti.)

12. Uterus itidem conceptionem promovet (siccatu & à mensibus propinatus.)

13. Coagulum sanguinem concretum discutit, conceptionem promovet (post menstruas purgationes vulva cum butyro impositum,) potum v. partum enecat. Epilepsiam curat, &c.

N. Præstantissimum est quod eximitur antequam aliud quid, præter Lac maternum degustaverint.

14. Officulum Tali (der Hasensprung) commendatur ad arenulas, Colicam, Epilepsiam, partusque enixionem (pulverisatum & exhibitum.)

N. Idem de Veribus cauda affirmant.

15. Axungia extrinsecus applicata, maximè si vetusta sit, tantâ pollet attrahendi vi, ut vel spicula cuti infixæ eliciat; insuper abscessus rumpit, dolori dentium medetur, (pone aures posita.)

16. Stercus calculosis prodesse dicitur,

citur, (cinis exhibitus) Dysenteria convenit, (potum) ambustis medetur (simpositum).

17. Pili Linimentis sanguinem sistentib. miscentur.

XXV. Lupus.

Λύκος, Lupus, Wolff.

Animal est audax, rapax, vorax, cani non absimile; unde & canis sylvestris nonnullis Venatoribus audit.

OFFICIN. NAT.

1. Dentes. 2. Cor. 3. Hepar. 4. Intestina. 5. Axungia. 6. Ossa. 7. Stercus. 8. Pellis.

Vires.

1. Dentes argento inclusi infantulis familiares sunt, quib. gingivas scil. fricant; dentibusque erupturis patefcere faciunt: allegati pavores eorum prohibent.

2. Cor comitialib. prodesse fertur (costum & spiritum).

3. Epar Epatis vitiis confert, ideoque & Hydropicis ac Emaciatiss; nec non & tussientibus. (siccatum & exhibitum).

4. Intestina, imprimis ad colicos dantur dolores, quos itidem arcere dicunt circumligata: hoc item fertur de corio.

Dosis Intestin. arefactor. & pulverifactor. ʒj.

5. Axungia non vilioris virtutis est, quam canina: calf. digerit, articularib. morbis medetur, oculorum lippitudini confert, (sicca fricentur).

6. Ossa ad morbum intercostalem, ut & ad ictus puncturasque valent.

7. Stercus Colicis confert (exhibitum, (ʒj.) vel brachiis, cruribusve alligatum vinculo, ut nonnulli volunt, confecta ex lana ovina à lupo laniata, vel ex corio cervi. Vid. Forest.

8. Pellis lupi commendatur itidem ad dolores colicos mitigandos (facta inde stragula, vel cingulum cujus pili ventrem tangant.

PRÆPAR.

1. Oleum fit si Lupus in Oleo decoquatur.

Vires. Podagricos dolores mitigat.

2. Essentia Sanguinis Lupi, efficax ad dissolvendum sanguinem coagulatum Hartm. in pract.

XXVI. Lynx.

Λύκος, Lupus cervarius, Lynx / Thiegers Wolff.

OFFICIN.

1. Axungia. 2. Unguis.

Vires.

1. Axungia convenit articulis resolutis.

2. Unguis argento & auro includitur, gestaturque adversus morbum Comitialem & Spasmodicum, (loco amuleti).

N. Praefertur qui in dextro pede pro pollice est.

XXVII. Moschus s. Moschi.

Capreolus.

Dorcas Moschi, Gazella Indica. Bisam Thier.

Pppppp 3 Est

Est animal exoticum Caprea non multum abfimile, vulgare in Regno Cathai, Pegu, (Ditionis magno Cham subiecta) ut & alii volunt in Aegypto aliisque locis: colit alpes, nardis victitat, aliisque herbis odoriferis.

N. Transvehit quidem cepit in Italiam, verum circa emalumentum, nec enim Moschum exhibet, nec vitale diu superstitis est.

Moschus Visam.

Est excrementum seu sanies inclusa Vomica circa umbilicum. dum ♀ is æstro animal id percellitur, enata: videlicet Vomicam hanc dum dolet, ad lapides vel arborum truncos fricat, adeoque disrumpit, saniem inibi contentam effluere facit, lapidibusque adhaerescere, hinc calore Solis ulterius elaborata in moschum odoris suavissimi facessit.

N. Sunt qui ex Vomicâ abscissa, foliisque aliquantulum exposita Moschum colligunt, sed hic ut priore immaturior est, ita & bonitate vilior. Adulteratur variis modis, verum cui sincerus & verus non incognitus est, eidem ex odore & sapore, quin & ex pondere fraudum deprehendere non erit difficile. Nonnulli probant, an Moschus legitimus sit, hoc modo: Pondus libra examinatum in labelum humore perfusum immittunt, cum paulo post iterum aqua lance ponderant, quod si super feratur, sincerum & legitimum existimant: sin cedat, spurium & adulteratum.

Vires. Calfac. 2. sic. attenuat, di-

scutit, cordialis est, & alexipharmacus, hinc & cephalicus.

Ufus præcipui in omnibus affectionibus cordis, palpitatione (potus ac illicitus) Spiritus nimir. vitales fovet, suscitatur, recreat: Hinc in affectionibus capitis ac nervorum à frigore & crassiss humoribus oriundis, tum & in dolore colico, &c.

Externè detergit tenues oculorum albugines, & humiditas defluxiones exiccat, ad Venerem concitat, auditum imminutum restituit, (auribus inditus cum cottone.

Dosis gr. jv. v.

N. Uterum quia suavi suo odore alluit, mulieribus uteri ascensus obnoxii minus commodè exhibetur, contra v. majori cum utilitate pudendis ad retrahendum uterum illinitur.

PRÆPAR.

1. Spec. Diamosch. dulc. s. Vide
2. amar. Dispens.
3. Confectio Moschardina, s. Trochisci Moschardini v. l. 2.
4. Oleum Moschellinum, Moschellin. (compositum) v. D.

XXVIII. Mulus, Mula.

Ἰπποῦ & Μῆουλ. Esel.

Animal est vivacissimum, genitum ex equo & asino, ideoque sterile.

OFFICIN.

1. Ungula. 2. Urina. Stercus. 4. Cor.
5. Epar. &c.

Vires.

1. Ungula suffutimenes nimium
- Auen-

ra ani tollit. Cinis cum vino coctus & ap-
plicatus.

Mus araneus, μεγάλη, *Sorex* non-
nullis, *Spiz*, *Maus*.

Vires. Affectibus sedis, peculiari ex-
perimento est,ustus & illitus cum axun-
gia anserina.

Mus alpinus, Murmel Thier / Mur-
mentle.

Est animal alpium altissimarum In-
cola, magnitudine cuniculos ferè supe-
rans, hyeme integrâ dormitans.

OFFICIN.

Solus adeps commendatur ad genus
nervosum & articulos contractos, rigo-
dos &c.

Mus major ^{a1}as^u, ^uga^z, *Rattus*, *Rat*
te/*Rabe*.

N. Venenum in canda gestare dicitur.

Vires. Stercora murium majorum
novem numero deglutita, mulierculis
nonnullis singulare habentur experimen-
tum, quo mensibus obstructis succurrere
moliuntur. Plater.

XXX. *Ovis*.

Oic. *μαρκαρ* G.
 Ovis, *Schaaf* /
 Mas, *Aries, Hammel* /
 Vervex, i. e. *Aries,*
 castratus.
 Fœmina, *Ovis.*
 Agnus, vide *suprà.*

Ovis animal est mansuetum, timi-
dum, lupo inimicum.

N. Coirnstempus est à Majo ad Augustum.

OFFICIN. NAT.

1. Cerebrum. 2. Fel. 3. Oesophus.
4. La.

4. *Lana succida*, 5. *Sevum*, 6. *Pulmones*, 7. *Omentum*, 8. *Stercus*, 9. *Urina*, 10. *Vesica*, 11. *Caput* & *Pedes*, 12. *Pediculi*.

Vires.

1. *Cerebrum* arietis prodesse ajunt in somno immoderato arcendo in morbis Epidemiis, (fruxant cerebrum cumque pinguedine in placentam redigunt, addendo Cinam. Nucist. & hinc exhibent. Conradin. de Morb. Ungar. Facilitat dentitionem, (silitum cum melle.

2. *Fel* (lana susceptum, infantumq; umbilico impositum) solvit alvum, carcinoma exterius sanat (silitum) auribus purulentis auxilio est, (instillatum cum lacte muliebri.

3. *Oesopus* (succidarum lanarum pinguedo, vulgo Isopus humida dicta) conficitur hac ratione.

Lana succida è collo feminibus ac femoribus ovium, macerantur aliquot horas (6. 7. 8.) in aqua ferventi, hinc fervescunt iterum, agitanturque bacillo, donec totam pinguedinem in aquam deposuerint. Aqua hæc semotis lanis, magno impetu ligneâ rude agitur, aut ex alio in aliud vas effunditur, ut spumescat, sic sordes spumæ inhærescentes separari poterunt. Reiteretur hæc depuratio, donec nihil spumæ amplius extet, collecta pinguedo lavetur aqua pura, (alii malunt marinam) manibusque agitur, donec candida evadat, nec aquam amplius inficiat, adinotaque linguæ leviter

tantum adstringat. Et hæc omnia sub fervido Sole fieri convenit. Math. & Diosc.

Vires. Emollit, resolvit, calefacit, dolores sedat, luxatis, contusis, & simil. convenit.

Lana succida, Ἰζὺν ἔργον, schmutzige Schaafs Wolle / colligitur Ætate è collo feminibusq; eaque mollis & sudore referta.

Vires. Calfacit, emollit, lenit, convenit optimè contusis, luxatis, casis, & simil. (cum aceto, oleo, vino imposita.) Cremata vim habet galsac, siccantem, acrem, mordacem, discutientem: Ea propter confert humidis mollib. tumorib. ulcerib. inveteratis; excrescentias cohibet, ulcera ad cicatrices perducit, fistulas aureasq; suppuratas sanat.

5. *Sevum* datum ex vino rubro, sanguinem sistit, diarrhæam, dysenteriam, & tormina ventris curat (in clysmate.

6. *Pulmones*, (ut & aliorum animalium carnosa viscera) capiti inpositi dolores & æstum mitigant, ferocesque spiritus sopiunt.

Hinc usus præcipui in phrenitide, vigiliis, &c.

7. *Omentum* calidum colico medetur dolori (impositum.

8. *Stercus* vim habet refrigerandi, exiccandi, aperiendi, discutiendi.

Hinc maximi usus in aurigine, (sumptum cum petroselino, &c.

Extrinfecus convenit in tumore splenis, in thymis, clavis, verruca, tumorib.

moribus cutaneis, &c. Maximi itidem solaminis est in ambustis, (pulverisatum & inspersum.

9. *Urina* (nigræ vel rubræ ovis) sumpta, aquam inter cutem abigit; (idem facit & destillata.

Dosis ℥v. vi.

10. *Vesica*, (ut & capræ vesica,) cremata & exhibita, iis qui urinam inviti reddunt, succurrit.

11. *Caput & pedes*, vervecis in ∇ fluente optimè decocta, atrophix & contracturæ sub eniunt, (in balneo.

12. *Pediculi*, mira præstare dicuntur in arthritide vaga curanda. Exhibiti N. 9.

XXXI. *Ranunculus viridis.*

Ranunculus calamites (à calamis in quibus degit,) *Dryopetis Laub Frosch.*

Est genus Ranarum terrestrium, reliquis minus, colore viridissimum, amans dumeta & loca aspera.

OFFICIN.

1. *Ipsè Ranunculus.* 2. *Sanguis.*

Vires.

1. *Ranunculus sylvestris* convenit viribus cum rana aquatica, ejusque cinis vulneribus inspersus mirificè sanguinem cohibere dicitur, *Clariss. Dn. Arn. Weickhard. in Thesauro.*

2. *Sanguis* peculiariter pro Philtro commendatur.

XXXII. *Rhinoceros.*

Rhinoceros, Rhinocer.

Animal est magnitudine Taurum, forma aptum æmulans, cornu unicum in proboscide gerens, idque nigrum, fissile, cubitum longum, pyramidale, bubali cornu forma sua representans, solidum sine cavitate.

N. 1. *Tale nimir. videre licet apud viros rerum variorum curiosos, Cornelium ac Joannem Petraos, Materialistas hujus loci celeberrimos.*

N. 2. *Et cornu alterum pusillum in dorso gerere dicitur, quod ejusdem cum priore coloris, videm apud Petraos constat.*

Vires. Commendatur ad venena contagia, aliosq; affectus sudore opus habentibus, idcirco loco unicornu in hujus defectu esse poterit.

Datur in scobe pulverisata ad ℥ss. vel ℥j.

XXXIII. *Serpens.*

ὄφις, *Schlang.*

Animal est astutissimum, exuvias suas singulis annis bis exuens, Vere sc. & Autumno, Hyeme sub terra & præcipuè sub radicibus arborum, (Betulæ, Coryli,) sopitum quiescens, homini infensissimum.

N. 1. *Serpentis nomen generale est, multas serpentum species sub se comprehendens. Hujus autem loci vulgare serpentis genus intelligimus à Cæciliis, Viperris, &c. distinctum, quas damus infra.*

N. 2. *Præstant collecti initio Veris cum senectam deponunt, attamen non statim ab egressu è latebris hybernis.*

Qqq qqq OFFI-

OFFICIN.

1. Integri combusti, Caro Cor, Ossa,
2. Pinguedo. 3. Exuvia. 4. Fel.

Vires.

1. Integri combusti, (pulvis serpentini.) scil. caro cor, ossa ac epar, vim habent alexiteriam, sudoniferam, (non venenatam.

Ufusque præcipui sunt intrinsecus in omnibus morbis venenatis ac malignis, quales sunt pestis, febris petechialis, lepra & similes: Quinimò & phthificos Gallicove morbo laborantes, viperarum præcipuè usu juvari, ceu secretum venditat Cardanus. Si scil. caro cocta comedatur, jus bibatur, pinguedoque spinæ & juncturis illinatur. Nec est, quod usum serpentum internum adeo formides, exenteratam enim ac decoriatam carnem, abjectis tamen felle, cauda & interaneis, loco cibi asumere licet.

N. Caput abjicitur, quia maximè venenosum est, adeo ut dentibus solis vim suam malignam exerant. Cauda negligitur non quod venenata sit, sed quia ex ossibus tantummodo constet. Vesica fellea rejicitur, quia proxima est lacuna materia venenata, quæ inde duobus meatibus ad dentium vesicas, seu gingivas deferitur, in quibus scil. spirituosior ac efficacior illa fit, adeo ut si quis dentibus vipera etiam jam dudum interempta purgatur, veneno inficiatur, secus ac de felle constat, quo recenti canes moriuntur, siccato sine noxa vescuntur. Interanea non adhibentur, ab stercore vel ova adhaerentia, aliàs

samen his rejectis, sine noxa usui esse possunt.

N. 2. Si placuerit corda ac Epata seorsim servare, secundum nonnullos Thesaurum Medicum obtines pretiosissimum. Verùm me hercle, si quicquam peculiare à carne & ossibus, quantum vires attinet, tibi inde persuasum habeas, falleris. Falleris itidem, si (quod communis fert opinio,) deglutitione pulveris serpentini, (vel & cordium recenter extractorum atque adhuc sese moventium) ab ictibus serpentum tutum te imagineris. Experto crede.

2. Pinguendo emollit strumas, oculorum rubedini & maculis medetur, visum acuit, podagricos dolores mitigat.

3. Exuvia partum facilitate creduntur, (ventri vel lumbis alligata,) odontalgiamque (in gargarismis mitigare, impetigines curant, (pulverisata, vel incinerata & imposita;) alopecii medentur, ac pilos nasci faciunt (illita.

4. Fel Ictibus serpentum impositum, venenositatem in se allicit, idem & de capite imposito affirmat.

PRÆPARATA.

1. Pulvis.

Pulveres serpentum tot compositionum circumferuntur, ut Agria serè quisque peculiare sibi quippiam imaginetur. At quid opus est compositione, nec enim corrigi serpentes extenterati opus habent, nec stimulari, sat est fortis eorum vis, sat tanta

carne-

carnosa ac ossea substantia, (Cor, Epar, Lingua, Caro, Ossa, utpotè qua minimè venenata (integer utidem si comburatur, venenatam exhalat naturam, (mallem tamen caput rejecisse,) nihilominus tamen adscribam unum atque alterum.

Bezoarticum animale simplex.

1. R. Serpentem excoriatum, (rejectis anteraneis cauda ac capite) lava & exicca, hinc pulverisa, unà cum spinæ vertebrais, pulverem serva pro usu.

Dosis à ʒss. ad ʒj.

N. Exiccatio vel per se in aere peragi potest, vel in MB.

2. R. Serpentes vivos, non enteratos aut excoriatos,) conjice in ollam ac tege operculo, torreque ad igneum lentum, ut omnis pinguedo & humiditas consumatur, (absque combustionem tamen) postea redigantur in pulverem.

N. Prafero priorem, quippe metus ne venenosæ partes sufficienter exhalarint.

Ex hoc fit.

Bezoardicum animale compositum.

R. Pulv. serpentum, ʒij. Rad. Valerian. Angel. Pimpin. Herb. Rutæ ana ʒj. M. F. pulvis.

Dosis à ʒj. ad ʒij. vel ultrà.

N. 1. Solus pulvis colubrinus valet adversus araneas vivas & ☉ non verò ad pestem curandam experimento Unizeri lib. de peste p. 195.

N. 2. Ex carne ficcata extrahitur

Tinctura ad V aut quidem melius cum u Juniperi. Vide Quercetan. & Fab. Myrothec.

XXXIV. Sus.

Mas, Verres, Porcus, Eber/
Borch/ Borch/ (majalis, i. e.
porcus castratus.
Fœmina, Porca, Scrofa, Sau/
Porcellus, Fersel.

Animal est maximè pituitosum & humidum, multis morbis obnoxium, quales sunt, raucedo, angina, struina, febris grando.

N. Non datur animal, quod homini quantum interiora attinet, similis sit ipsa sue.

OFFICIN. NAT.

1. Fel. 2. Pulmo. 3. Pinguedo. 4. Ossa.
5. Talus. 6. Stercus. 7. Vesica.

Vires.

1. Fel suillum contra aurium ulcera, reliquaq; omnia magno successu adhiberi scribit Diosc. pilor. proventum impedit, (cum lardo suillo ana ac $\frac{1}{3}$ parte acerrimi & Ol. Amygd. ana digestum & illitum.

2. Pulmo mirificè prodest impositus attritui à calceamentis contracto.

3. Pinguedo (Adeps absolute dictus) calefacit minus, ideoque in unguenta refrigerantia infertur, inveteratos dolores lumborum & articulorum sedat,) inuncta cum cinere straminis fabacei aut calce.

Lardum coctum & circumligatum

Q99999 2 tum

tum ossium fracturas feliciter conglutinat.

N. 1. *Pinguedo* qua è sue veteri fuerit, vel qua sale condita, calidior ac efficacior est illa, qua tum è porcellis desumpta, tum insulsa fuerit. Sic & vetus axungia acrior est recenti.

N. 2. Sunt qui sola axungia verris, vice Sympathetici unguenti utuntur.

4. *Ossa*, ajunt ossa de collo suspensa quartana laborantibus esse auxilio, fides sit penes expertum.

5. *Talis os*, (*Astragalus*) commendatur ad fracturas ossium, ut & ad colli capitisque dolores (*ustum & exhibitum*).

6. *Stercus* (*succerda*) emollit, discutit, hinc prodest in prurigine, exanthematibus, clavis pedum, aliisque tuberculis duris, (*calide impositum*). Ictibus medetur animalium venenatorum (*cū coctum*) Hæmorrhagiam narium sistit, (*in Tritium & illitum*).

7. *Vesica* juvat eos, qui inviti lotium reddunt, (*cocta vel usta & exhibitā*) Eadem præstat pubi imposita. Urinam ciere fertur. Plin.

PRÆPARATA.

1. *Unguenta* ex pinguedine sunt varia.

E. gr.

Rosatum, pomatum, qua suis locis attigimus.

2. *Ad Atrophiam*.

Fit è sanguine è fibris repurgato atque cum herbis bechicis refrige-

rantibus & humectantibus in MB destillato.

XXXV. Talpa.

Ἀπάλαξ, Σπάλαξ, Mus terrenus, Maul-Wurff/Schâr-Maus/Molt-Wurff.

Animal est acutissimè auditus, hoc peculiare præ cæteris animalibus habens, quod non nisi sub terra vivere ac superstes esse possit.

OFFICIN.

1. *Talpa ipsa*. 2. *Cor*. 3. *Sanguis*.

Vires.

1. Cinis confert lepris, strumis ac fistulis, (*illitus cum albumine ovi aut melle*).

Intrinsècus cum cerevisia aut vino potus curat arthritidem vagam dictam, (*die lauffende Bahren/die lauffende Gicht*) & Scrophulas.

Dosis ʒß. quotidie assumenda.

2. *Cor*, Herniam sanat, (*siccatum, pulverisatum & exhibitum*, per dies 3. aut 4. scil. quotidie unum).

N. Præstat mense Majo collectum.

3. *Sanguis* recens illitus, capillis calvitiam decorat.

N. Vulgi opinio est, si quis talpam manu compresserit, ut moriatur, eum à febre eo ipso anno fore securum, quin & in Paroxysmo febrili manu retenta, insuleus reprimere censetur.

XXXVI. Taxus.

Μήλις, Meles, Taxus & Taxo, Dachs.

Duo-

Duorum est generum: Caninum quod pedes habet caninis similes, & porcinum, quod pedibus suis imitatur.

OFFICIN.

1. Integer incineratus. 2. Sanguis. 3. Adeps.

Vires.

1. *Taxus integer* incineratus cum succellu exhibetur pulmoniacis, sanguinem excreantibus.

2. Sanguis pulverisatus lepræ convenire dicitur, destillatusque pesti subvenire.

3. *Adeps* præcipuè Officinalis est, qui uti paulò crassior, ita & paulò calidior ac efficacior est suillo. Renum doloribus auxiliatur, à calculo subortis, (*innatus vel in Clymate adhibitus*), febrilem æstum mitigat, contracturis ac imbecillitatibus artuum succurrit, cum adipe vulpis cative sylvestris.

XXXVII. *Vipera*.

Ἐχίς vel ἔχιδνα, (Fœmina) Arabicè *Alphe*, Thirus, *Viper Matter / Matter / Otter / Otter / Heel Matter / Brand-Schlang*.

Est species serpentis viviparæ, serpentibus communib. venenosior, hyeme in scopulis sopita delitescens, vel & terra oblecta.

N 1. *Vipera* nomen nonnullis generale audit, omni que serpentum generi imponitur. In specie tamen hic sumitur pro eo, quod Italia *Marassi* nomine venit, licet adhuc controversetur, utrum *Vipera* Ita-

lica cum *viperis* à majoribus ad *Theriacam* expetitis eadem sint.

N. 2. *Viperis* solis peculiare esse volunt, vivum fœtum parere, unde & *Vipera*, quasi *Vivipara* dicta sunt, attamen & in serpente sat magno, quem in *Finlandia* secui, fœtus vivos deprehendi.

N. 3. Non tota *Vipera* venenata ac lethifera est, sed solum caput & fel, reliqua ut caro, epas, ossa veneno carent, vide supra de *Serpente*.

Præstant: 1. Fœmellæ, collectæ tempore Verno, postquam aliquamdiu à cavernis suis hybernis fuerint egressæ, victuque quadantenus refectæ.

2. Juvenulæ, (non effætæ, nec gravidæ,) quæ ablatis partibus auferendis, diu adhuc moventur, quæque degunt locis aridis & montanis.

Vires. Vide in *Serpentum descriptione*.

Nimirum:

Vires ibidem recensitas præ aliis serpentum generibus *Viperæ* excellenti gradu obtinent. Præter eas sunt qui *viperæ* caput ad anginam notham commendat (collo appensum).

PRÆPARATA.

2. *Oleum ex Viperis*.

R. *Viperar. nigrar. lb. iij. Ol. Sesamin. sextarium. j. ss.* in vase vitreato angusti oris probè obturati, ne vapor inde exhalet, incoquantur, donec caro ab ossibus decidat, dein cum refrixerint, reponantur. *Andernacus*.

Qqqqqq 3

N. Alii

N. Alii per descensum eliciunt ex Viperis sc. capite, cauda, &c. orbatis.

Vires. Cutim exierget & impetigines, aliaque id genus vicia sanat.

2. Sal Theriacum s. Theriacale, vide Dispens. Aug. & si placet Querc. in Phar. Res. Aetium & Galenum.

2. Trochisci de Viperis, v. Disp.

N. 1. Sunt qui Theriacam de Cacula, (Cacilia Blindschleich/) confecerunt, summoque cum successu tempore pestis ad sudorem eliciendum semel acriterum propinarunt. Gesn. de Serpent. Schwenckfeld. ex Placero.

N. 2. Fieri potest & vinum viperinum (i.e. in quo Vipera interfecta sunt,) ad Elephantiasin celebre (bibitum) Galen.

4. Pulverem alium egregium reperies in Pharmac. Poterii.

5. Essentiam Viperarum in Myroth. Fabri.

3. Alcohol Viperarum describit Burg. gr. in Biolychn.

Sal Viperarum volatile & Spiritus & Sal fixum & fixatum.

Vipera exsiccatæ, concisæ ac leviter contusæ unâ cum Epate & Corde, indantur in Om loricatam usque dum impleatur, Quia in vas recip. amplum gradatim. Exhibet phlegma & Spiritus, hinc sal volatile undique lateribus Recipientis, colloque Om adhaerens, tandem & fœtidum & crassum, quod charta separandum. Exemptum v. sal volatile purificetur in phiola satis longa cum amplo, si placet XX sublimando per arenam moderato Δ, ne aquositas

aliqua salem sequatur, quod aucto Δ contingere solet. Salis hujus partes sublimes reliquis sunt odoris penetrantioris, idcirco in XX optimè clauso custodiantur.

Medicamentum summè penetrans, putredinem arcens, in toto corpore obstructions referat, febres resolvit omnes, & quartanas, si hora 1. vel altera ante paroxysmum propinetur in liquore appropriato, qui acrimoniam ejus nonnihil obtundere, non tamen obstruere valeat, utpote in emulsion. sem. melon. vel amygd. d. addita portiuuncula ∇ a rosar. vel cinam. & sacch. alb.

Dosis g. 6. ad ℥℥.

Figitur eodem modo, quo sal volatile microcosini, nisi quod loco Sp. proprii ex sale fixo, (qui paucus est in viperis & ex ☉ elicitur) sumitur Spir. sal. com.

Vires. Sic fixatus medicamentum est immutabile totum corpus permeans, resolvit enim excrementa quacunq, eaq, abstergit instar saponis, ubicunq loco-rum adhaeserint non assimilata, ut facile & commodè à materia repellantur: vel per sudorem, insensibilem transpiratione, aut quod plerumq, fieri solet per ☐. propterea in melancholia quacunq, podagra, renum calculo & vesicae obstructionib. viscerum omnibus ac putredini praesentissimum est remedium. In deperditis virib. pertingit ad loca affecta, naturam confortat, adjuvat purgando se & resolvendo excrementa natura contraria.

Dosis ℥℥. ad ℥j.

Essen-

Essentia Viperarum.

R. Jecinora & corda Viperarum N.
100. exiccata & contusa cum V rectif.
♂ ♀ (3 vel 4.) digere, extrahe f. a. Jun-
ctis destillationibus adde (ad lbj. Ef-
fentia) Salis volat. 3j. fixi 3ss. Digere ut
optimè uniantur, adhuc ♂ uno atque
altero, & habebis summum quod à Vi-
peris separari potest medicamentum.

N. Usitatissima hac medicamenta sunt
in Italia, magnoque cum successu & agro-
rum applausu adhiberi dicuntur.

XXXVIII. Vitulus.

μόχ @, ἰταλ @, Vacca proles, Kalb.

OFFICIN. NAT.

1. Medulla. 2. Stercus.

Vires.

1. Medulla vitulina post cervinam
locum primum bonitatis obtinet, vim
habet indurata & scirrhusa corpora
emolliendi, sive musculis, sive tendini-
bus ipsis durities acciderit. Quin pessi
quoque inde confiunt, uterum emol-
lientes.

2. Stercus Erysipelati convenit, (re-
censillitum.)

PRÆPARATA.

▽ destill. pectoralis, v. l. 2.

XXXIX. Unicorn.

Μονοκεράς, Remena, Reem, & Reim.
Hebr. Alcherchedom. Arab. Unicorn-
nis, Einhorn.

Animale esse dicitur equo quoad cor-

pus non dissimile, ungulis fissis, cornu
in fronte gerens procerum.

N. Cujus regionis incolæ sit nondum
certum constat Alianus, montes esse
ait in intimis Regionibus India Or. asper-
rimos & feris refertos, ubi quæ apud nos
bestia domestica sunt, feras ajunt esse, ne
oves, canes, capras, &c. In iis Monocero-
rotem, quem vocant Cartazenon, nume-
rant, eamque magnitudine ad confirmata
ætatis equum accedere, jubaque predi-
tum, pilis fulvis esse, &c. Nicolaus Ve-
netus referente Andraa Baccio inveni-
ri eam scribit, in extremis Asia parti-
bus, in Provincia, appellata Macina.
Narrat Marcus Paulus Venetus, in qua-
dam Provincia India Occid. ea reperiri,
Regnumque Basina Provinciam eam ap-
pellat. Verum Andreas Baccius illorum
Monocerotem nihil aliud esse autumat,
quàm Rhinocerotem. Ludovicus Varto-
mannus in itinere suo Ethiopico veram
Monocerotis speciem descripsisse videtur,
cujus duo individua in Civitate Arabia
Mecha sibi visa asserit, cruribus inclusa,
quorum unum fuerit magnitudine equi
30. mensium: alterum magnitudine pulli
equini unius anni, unum cornu media
fronte gestantia, primum longitudine 3.
cubitum, alterum vero duorum: colore
praditum balio, capite cervino, cervice
non admodum procera, nec valde crinita,
cruribus macilentis, & tenuibus ungui-
bus, caprinorum in modum fissis, &c.
Et hæc animalia ab Ethiopia Rege ad
Sultannum Mecha Regem missa fuisse sub-
jungit.

OIII-

OFFICIN. NAT.

Cornu, (Unicornu) quod ab Ebo-
re distingui potest, fibris quas subtilio-
res exhibet, simul & solidius ac gra-
vius ferè est, in cæteris ebur emula-
tur.

Vires. Sudoriferum est, alexiphar-
macum ac cordiale. Hinc laudatur ad-
versus venena, morbos contagiosos, &c.
Proficuum quoque censetur in Epilepsia
infantum.

Dosis à gr. iv. ad ʒβ. etiam integrum
& ultra.

N. Andreas Baccius qui integrum de
Unicornu tractatum conscripsit, ejus
fragmenta annulis includere jubet, digi-
tisq; circumferre, vel de collo, loco amu-
leti, suspendere ut cutim tangat.

XL. Ursus.

Α'χις, Βάρ.

Animal est crudele, catarrhosum,
phlegmaticum, capite imbecillo, lum-
bis robustissimis, lascivum. Inimica-
tur equis, asinis, leonibus, dormit septi-
manas aliquot continuas.

OFFICIN.

1. Pinguedo. 2. Fel. 3. Oculus.

Vires.

1. Pinguedo calefacit, resolvit, emol-
lit, discutit, &c.

Ufus præcipui in alopecia (illita cum
mure combusto) medetur doloribus ar-
thriticis, parotidibus, (Shren. Webe)
& cetera ana in Empl. redacta.) ulcera
crurum tibiærumque sanat.

N. 1. In Herniaf. Enterocèle uterique
prolapsu, muliercularum vulgare reme-
dium (dorso s. ossi sacro illita).

N. 2. In usu externo pinguedinis hu-
jus observare expedit, quod pilis albedi-
nem conciliat.

2. Fel commendatur intrinsecus ad
morbum comitalem, ad asthma, &
icterum.

Extrinsecus ad ulcera cancrofa ac
serpentia (illitum.) ad odontalgiam,
oculorum hebetudinem, &c.

N. In Finlandia ubi ursorum datur
copia, vulgatum rusticus est, fel exicca-
tum instar Panacea exhibere, sudoreque
superveniente morbos quam plurimos
fuisse solutos audivi.

3. Oculus dexter effossus exiccatus &
infantibus appensus, terrorem quibus
in somnis vexantur arcere dicitur.

Sunt & qui ajunt, oculum urfi si-
nistro brachio alligatum, quartanam
fugare.

XLI. Vulpes.

Α'λώπηξ, Fuchs.

Est animal astutissimum, naturæ ca-
ninæ quodammodo particeps.

N. Vulpium genera tria in Suecia ac
Finlandia vulgaria comperi, nimirum
præter vulgares dantur ibidem nigra &
crucigera, linea scil. nigra, secundum lon-
gitudinem à capite ad caudam per dor-
sum decurrente.

OFFICIN.

1. Pinguedo. 2. Pulmo. 3. fœcra. 4. Fel.
5. Lien.

CLASSIS I. DE ANIMALIB.

313

5. Lien. 6. Pellis. 7. Sanguis. 8. Integra
Vulpes. 9. Stercus.

Vires.

1. *Pinguedo* auxilio est convulsioni-
bus, contracturis, tremotibus, &c. (*illis*
ea) aurium doloribus, vulneribus capi-
tis & alopeciis.

2. *Pulmo* consolidat, abstergit, hinc
valet ad vitia pulmonum & angustiam
pectus, (*exiccatus saltem & combu-*
stus).

3. *Jecur*, Hepaticis & Splenicis
confert, (*simili modo ut pulmo adhibi-*
tum).

4. *Fel*, Oculorum Pterygio succur-
rit (*illium*).

5. *Lien*, Lienis duritiei ac tumori me-
detur, (*compositus*).

6. *Pellis pilosa* membris refrigeratis
ac articuli morbo infestatis feliciter
imponitur.

7. *Sanguis arefactus* & tritus calculo
Renum & Vesicæ medetur: idem feli-
cius præstare perhibetur sanguis recens
potus ad *cyath. scil. vel & abdomini pubi,*
inguinibus ac renibus illitus.

8. *Vulpes integra*, vel *caro ejus com-*
busta, ad vitia pectoris commenda-
tur.

Vulpes in aqua vel oleo optimè co-
cta, nervinis affectibus, ideoque con-
tracturis ac doloribus articularum, mede-
tur (*si locus affectus eo lavetur*).

9. *Stercus* scabritiem cutis sanat (*cum*
illitum).

PRÆPARATA.

Ol. Vulpinum. v. Dispens.

Loch. de Pulmone Vulpis. v. Dispens.

Pulmo preparatus s. lotus & exicca-
tus.

CLASSIS II. DE AVIBUS.

XLII. Accipiter.

ἰεῖξ, Habich.

Volucris est rapax, vorax & audax,
visu forti prædita.

OFFICIN. NAT.

1. *Accipiter integer*. 2. *Adeps*. & 3.
Excrementa.

Vires.

1. *Integer* oculorum vitii succurrit,
(*in oleo coctus, oculoque inunctus*).

Idem sentiendum & 2. *de Adipe*:
super omnibus vitis cutis medetur,

(*oleum illud illitum*).

3. *Excrementa* calefactoria vi adeò
pollent, ut à Galeno ex foro Medico
eliminenter, nihilominus tamen sunt,
qui oculorum vitii arcendis adhibe-
ant, alii ad partum promovendum, (*ex-*
hibita vel insuffusa adhibita). (Hippocra-
tes & Plinius ad sterilitatem emendan-
dam propinant.

XLVIII. Alauda.

κρόκερ, Alauda, Cassita, Galerita,
Gerch.

Rrr rrr

Alauda

Alauda { cristata, hac prevalet.
non cristata.

OFFICIN. NAT.

1. Cor. integra ales & 2. Sanguis.
Vires.

1. Cor. (Alauda cristata) femori alligatum arcere colicum dolorem ajunt, idem quoque de Cordero recenti devorato perhibent, ut & de integra Alauda, (tossa vel una cum pennis incinerata, qua Dosi 3. sen cochl. 1. ac 2. per dies aliquot exhiberi poterit.

2. Sanguis recens ex aceto acri aut vino calido haustus, calculosis efficacissime subvenit.

XLIV. Alcedo.

Αλκυων, Halcyon, Eis. Vogel / Eis. fengart.

Avis est speciosa, passere paulo amplior, rostro longo, colore tum caeruleo, tum viridi, tum purpureo, juxta glaciem rivulorum degens.

OFFICIN.

Cor, quod siccatum & collo infantum appensum comitalem arcere volunt.

XLV. Anas.

Ηντα, Andt / Endt. Vogel / Endt.

Est { Domestica.
Sylvestris.

Culinaris potissimum est, gignit crassos, melancholicos & superfluos humores.

OFFICIN. NAT.

1. Anas viva. 2. Adeps. 3. Sanguis. 4. Fimus.

Vires.

1. Viva sedat dolores colicos, si ventri imponatur, parte deplumata.

2. Adeps calf. humect. moll. diger. resolvit. Eapropter eo utimur in dolore interno & externo, scil. laterum, artuum, in nervorum frigida intemperie, &c.

N. Adeps hic primas prae reliquis habet, & praecipue Anatis sylv.

3. Sanguis alexipharmacus est, & hinc in antidota nonnunquam ascitur.

4. Fimus morsui venenatorum animalium imponitur.

XLVI. Anser.

Χην, veterib. Ganza, Gans.

{ Domesticus.

Anser { Sylvestris, hic in Officinis praefertur.

Anser itidem culinaris maxime est, alimentum praebens excrementitium & melancholicum.

OFFICIN. NAT.

1. Pinguedo. 2. Sanguis. 3. Stercus. 4. Cuticula pedum.

Vires.

1. Pinguedo calore suillam superat, suaeque subtilitatis ratione promptius penetrat ac resolvit, ideoque recte per anum injicitur, ad obtundendam erosionem in alvo corporis sitam, alopecias capillis explet, rimis labiorum medetur, tinnitui aurium succurrit, (aurib. indita,) spasmus nervosque rigidos sanat. (pinguedo ex anseris, far-

ciso

cito carne catti, aliisque nervinis herbis, & affato collecta) alvum laxat, præcipuè infantum, umbilico inditum, ventrive impositum.

2. Sanguis Alexipharmacus habetur.

Dosis ad ʒij.

3. Stercus calfacit & siccatur vehementer, incidit, aperit menses, secundinam & urinas potenter movet.

Hinc maximè usus in morbo regio, Scorbuto, Hydrope, cum cochleari urina Capra vel Vituli destillata, continuarique potest ejus usus in dies aliquot (8.) Idem & tussi mederi perhibetur.

N. 1. Adeo calfacit ut & gramina, in qua deciderit, urat, unde & a Galeno inutile judicatur.

N. 2. Prasertur viridiusculum in prætis tempore Verno collectum, quod siccatum calore moderato & pulverisatum à ʒb. ad ʒj. exhiberi poterit.

Alii in potu recens exhibent, cum liquore conveniente transfusum.

Dosis ʒj. vel ʒij.

4. Cuticula pedum exiccata & pulverisata ob astringendi vim commendatur in profluvio mensium sistendo.

Dosis ʒb.

Extrinsècus cum successu pernioni imponitur.

N. Sunt & qui Medicamentis Antistericis admiscant.

XLVII. Ardea.

Εἰς δὲ ὁ Νεπερ/Νειγλ.

OFFICIN. NAT.

Pinguedas: Axungia.

Vires.

Pinguedinis hujus rarus usus est in Medicina, lepore tamen dicitur podagricos dolores, oculorumque nebulas discutere, & visum clarificare (illita.) Hinc & surdastris conferre (indita auribus.)

N. Prostat nihilominus in gratiam piscatorum, qui inde faciunt quo pisces alliciant.

Nimirum:

Pisces quia ardeam odio persequuntur, hujus odore concurrunt, ardeam cen hostem invasuri.

XLVIII. Ciconia.

Πέλαγος, Storch.

OFFICIN.

1. Ciconia ipsa. 2. Stercus. 3. Ventriculus. 4. Axungia. 5. Fel.

Vires.

1. Ciconia vim habet alexipharmacam insignem, adeo ut contra omnis generis venena & inprimis contra pestem præstantissima censeatur, (comesta vel cinis ejus assumptus,) insuper nervosis & articularibus affectibus succurrit.

2. Stercus si ex ∇ hauriatur comitialibus aliisque morbis capitis prodesse credunt. Crato.

3. Ventriculus exiccatus ac pulverisatus pro maximo secreto habetur in venenis.

Rrrrr 2

N.A.

N. Alii solam tunicam internam malunt.

4. Axungia podagricis & tremulis articulis utiliter illinitur.

5. Felad oculorum vitia commendatur.

PRÆPARATA.

1. ▽ Antepileptica.

Fit ex pullo Ciconiæ integro, i.e. depumato, & exenterato, atque in frusta dissecto, admixtis antepilepticis aliis ex MB. Quando.

2. Ol. stillatitium quod sit copiosum fundit.

3. Sal volatile quod itidem copiose in destillatione exhibet.

4. Arcanum Alexipharmacum de Ciconia, videl. 2. c. § 1.

XLIX. Columba.

Negisgā, gōc, Daube.

Avis est admodum fecunda, calidissima, cerealibus vivens.

Columba est { Domestica, Haus Daub/
Sylvestris, Turtur, Turtel/
Daub/ v. suo loco.

OFFICIN. NAT.

1. Columba tota. 2. Sanguis. 3. Tunica ventriculi. 4.

Vires.

1. Columba viva per medium dissecta, capitique dum sanguine adhuc calet, imposita; feroces humores mitigat, melancholicam tristitiam discutit.

Hinc convenientissimum Medicamen est in Phrenitide, Cephalagia

Melancholia, Podagra.

2. Sanguis tepens oculis instillatis, dolorem, lippitudinemque sedat, suffusiones sanguinemque discutit, vulnera recentia curat: Peculiariter cruorem à membranis cerebri erumpentem cohibet, podagricum dolorem mitigat.

N. 1. Praefertur sanguis columbi maris, idque sub ala dextra elicitum (ob naturam ejus calidioram).

N. 2. Succus sanguinolentus ex penarum calamis expressus sanguini substitui aptus est, praeferturque è pullis columbarum.

3. Tunica ventriculi exiccata & pulverifata commendatur in Dysenteria.

4. Fimus vehementer excalefacit, (ob nitrosam facultatem, qua maxime pollet,) ideoque urit, discutit, ruborem cutis sanguinem alliciendo excitat.

Hinc usus frequentis in Cataplasmatibus & Emplastris rubificantibus. Sic tritus & cribratus, cumque semine nasturcii impositus, facit ad affectus inveteratos.

Cujusmodi sunt:

Arthridites, Hemisrania, Vertigo, Cephalæa, dolores inveterati in lateribus, scapulis, cervice ac lumbis, dolores colici, affectus apoplectici, lethargici, & simil.

Sic strumas aliosque tumores discutit, (cum bordeacea farina & o mixtus & impositus) alopeciae succurrit

rit (illius,) Colicis confert, (in Clysteribus) defluxiones ad genua delabentes discutit, (cum sal. & o.)

Internè calculum atterit & urinam pellit.

[Dosis ℥j. ad ℥ij.]

L. Cornix.

κίχαξ. Kraxe.

Vires. Fimam in vino potum, dysenteriam sanare tradit Kyramides.

L1. Corvus.

κόραξ. Raab / Rappe.

OFFICIN.

1. Pulli. 2. Cerebrum. 3. Pinguedo & Sanguis. 4. Stercus.

Vires.

1. Pulli Corvor. incinerati commendantur ad comitalem morbum.

Dosis ℥j. singulis diebus 2. vel 3. exhibita.

Sic & cinis corvorum ad Podagram & Alphos commendatur.

2. Cerebrum commendatur itidem ad Epilepsiam.

3. Pinguedo ac Sanguis capillos reddit nigros, id quod & de ovib. affirmant.

4. Stercus Infantum tusum, doloremque dentium sedare ajunt, (de collo suspensum.

4. Ova sunt qui in Dysenteria exhibent. N. 1. ij.

Gabelshover.

L11. Coturnix.

ὄρνις, Wachtel.

N. Comesta Coturnix, noxia esse creditur spasmo obnoxia.

OFFICIN. NAT.

1. Pinguedo. & 2. Excrementa.

Vires.

1. Pinguedo oculis prodest maculas abstergendo.

2. Excrementa Coturnicum helleboro vescentium, (quod ipsis, ut quidam scribunt, in alimentum cedit,) singulari proprietate quadam conferre Epilepsia quidam volunt.

LIII. Cuculus.

κόκυξ. Gucker / Guckaug / Ruckug.

OFFICIN. NATIVA.

1. Cuculus. 2. ipse finis.

Vires.

1. Cuculus ustus commendatur ad calculum, ventriculi dolorem & humiditatem. Rondel.

Datur & utiliter febricitantibus paroxyismi tempore, medetur Epilepticis, &c.

2. Fimus morsum canis rabidi curat, (potus.

LIV. Ficedula.

Συράλις, Ficedula, à ficuum esu sic dicta; Germ. Schnepfe / Wüstling.

Vires. In cibo visum acnere dicitur.

LV. Gallus, Gallina.

Mas, ἀλεκτρω, Gallus, Han.
Est } Fœmina, ἀλεκτρω, Gallina,
Henne / Hun.

N. Gallus castratus Capo dici solet, seu Capus.

Rrrrr 3

OFFI-

OFFICINALIA NATIVA.

1. Gallina (sen Gallus) integra. 2. Cerebrum. 3. Tunica ventriculi. 4. Testiculi. 5. Fel. 6. Pinguedo. 7. Guttur. 8. Stercus. 9. Ova.

Vires.

1. Gallina dissecta (præferunt nigram) sanguine adhuc calente imponitur capiti in phrenitide, cephalalgia, &c. Morfibus itidem venenatorum animalium simili ratione mederi ajunt: anthracibus imposita venenum elicit, nec prætereundum, quod sanguinis eruptionem in vulneribus recentibus sistat.

1. Viva Gallina (Gallus) circa anum deplumata è bubonibus venenum extrahit, (imposita.

PRÆPARATA.

1. Gelus. decoctum Gelatinum Galline (veteris.) Fit ex carne Gallinæ in frusta concisæ, additisque pedibus vituli, vervecis, aut carne bovina per se in diplomate horas aliquot, (sex. sept.) vase clauso cocta & expressa.

N. Addi possunt aromata & cordiales prout libet.

Vires. Insigne est nutritivum & corroborativum.

2. Contusum, fit itidem ex carne Gallinacea, quæ coquitur, donec caro ab ossibus decidat; hinc contunditur unâ cum ossibus, fitque expressio cum vino miscenda, & pro libitu aromatizanda.

N. Gallinarum caro melior est quam Gallorum, nisi sint castrati, nigrarum

verò qua non pepererunt melior est & levior.

3. Ius Galli veteris: Gallus antiquus (annor. 2. 3. 4.) fatigetur optimè, donec lassitudine cadat: Hinc trucidetur, deplumetur, exenteretur, farciaturque medicamentis idoneis, coquaturque in aliquot mensuris aquæ, donec caro ab ossibus ferè decedat: Hinc coletur.

Vires. Ius illud per se vim habet molliendi, & ob nitrosas partes quibus decrepitum illud animal præditum est, quæque fatigatione illa exaltata sunt, virtute pollet incidendi, abstergendi, alvum cienti idq. multò magis, si in eo Medicamenta similium facultatum incoquantur. Hinc celeberrimum est in dolore colico (coctum cum purgantibus & discutientibus.) In tussi tartaroque pulmonum (cum bechicis elixum,) &c.

2. Cerebrum vim habet incrassandi, fluxusque compescendi.

E. gr.

Fluxum alvi, (in vino sumptum) gingivis ad dentitionem à mulieribus illinitur.

3. Tunica interior ventriculi extracta, siccata, (ad Solem,) & pulverisata, singularem vim habet tùm astringendi & corroborandi ventriculum, adeoque vomitum, & fluxum alvi compescendi, tùm & calculum comminuendi.

4. Testiculi deperditas in morbis veres mirificè restituere dicuntur, semen prolificum suppeditant, & Venereas vires

vires robora
bibus in
1. Felina
oculis conv
6. Pinguet
calfac, hum
inter anferi
rumque ac
nit labioru
culorum p
7. Gall
sumptum,
sub noctem
proprietate
luntatiam
conf. 11.
8. Sterc
aprum est,
caciis, pivi
no dolori e
mè ad dier
pressionem
N. Præ
fence albu
Dosis 5℔.
tius 4, vel
1℔. 6. 11.
E. gr.
aliæque
insperat
Luteu
exulcerat
centi, vel
in frigida
dis super
du. Har
9. Ova

vires roborant, (recenter usurpati,) febrilibus itidem medentur. (assumpti.)

5. Fel maculas cutis aufert, (illitum:) oculis convenit.

6. Pinguedo Gallinarum & Caponum calfac. humect. emoll. lenit, mediaque inter anserinam & suillam existit, harumque acrimoniam obtundit, convenit labiorum rimis, aurium dolorib, oculorum pustulis.

7. Guttur Galli ustum & non consumptum, sed tostum & exiccatum, sub noctem ante coenam exhibitum, proprietate sanat mictionem involuntariam nocturnam. Solenand. f. 4. conf. II.

8. Stercus omnia eadem præstare aptum est, quæ columbinum, sed inefficacius, privatim tamen colico & uterino dolori convenit. Valet itidem maxime ad icterum, calculum & urinæ suppressionem.

N. Præstantius habetur id, quod in stercore album est.

Dosis ʒss. manè ac vesperti & continuo 4. vel 5. exhibitum. Querc. Pharm. rest. c. 21.

Extrinfecus exiccat achores capitis, aliamque scabiem manantem (cinis) inspersus.

Luteum stercoreis consolidat Vesicæ exulcerationem, assatum in butyro recenti, vel oleo olivarum, atque coniectum in frigidam, ut sordes secedant, & liquor olei superxatet, in ductum penis injiciendus. Harum.

9. Ova Medicinæ exhibent testas,

membranulas, ovi albumen, vitellumque.

Testa vim habent Lithontripicam, tartareamque mucilaginem incidenti.

Membranula vim habent diaphoreticam intrinsecus & extrinsecus adhibita, (præputioque imponuntur infantum.

Albumen vim habet refrigerandi, adstringendi, agglutinandi.

Ulusque crebri est in oculor. rubedine, in conglutinatione vulnerum (cum bolo commun.) in fracturis, &c. Insevit & anacollematis.

N. Hippocrates exhibet febricitantibus albumina N. 3. aut 4. ad refrigerandum & egerendum.

Vitellum ovi vim habet anodynæ maturandi, digerendi, laxandi, proinde usus celeberrimi clysteribus immisceri, quin & cum salis tantillo mixtum infantum umbilico (in testa juglandis) imponi solet ad ciendam alvum.

PRÆPAR.

Paratur inde oleum quod crebri usus est in consolidatione vulnerum, rimar. in maturatione tumorum, &c. Videatur Dispens. Aug. & Norimb.

N. Fit inde potus puerperis nostratibus usitatissimus, vulgò Geiss dictus.

R. Vitel. ovi N. 2. vel 3. Aquæ. Mens. 1. Vini M. ½. (plus minus) coquantur optimè pro potu.

LVI. Grus.

Figur. G., ein Kran/Kranich.

Vipio,

Vipio, i.e. pullus Gruum.

OFFICIN. NAT.

1. *Grus integer*. 2. *Pinguedo*. 3. *Fel*.
4. *Caput, Oculi, Ventriculus*. 5. *Medulla tibia*.

Vires.

1. *Avis* hæc quia nervosa est, nervosis ac membranosis partibus peculiariter convenire statuitur.

Hinc usus ejus commendatur in doloribus colicis.

2. *Pinguedo* surditati auxilio est, (au-

ribus instillata,) Lienis duritiem, aliosque tumores tenitentes emollit (*cum* \times *scyllitico subacta*) rigori cervicis velocissimè succurrit.

N. *Ejusdem naturæ esse dicitur cujus anserina pinguedo*.

3. *Fel oculis* prodest.

4. *Caput, Oculi, Ventriculus*, pulverisatâ fistulis, cancris, & varicosis ulceribus insperguntur.

5. *Medulla tibia* inservit unguento Ophthalmico inde parando.

LVII. *Hirundo*.

$\chi\epsilon\lambda\iota\delta\omega\nu, \chi\epsilon\lambda\iota\delta\omega\nu,$
Schwalb/Schwalbin.

Domestica	Major cum macula rubra sub gut-
Hause Schwalb/	minor sine illa macula, (cure.)
Sylvestris	Riparia, Wasser-Schwalb.
	Muraria, Spitz-Schwalb.

Domesticæ in ædibus nidificant.

Ripariæ in ripis aquarum inhabitant, unde & aquaticæ dicuntur,

Murariæ nidos suos muris templorū seu parietibus aut rupibus appendunt.

N. *Prævalent Ripariæ*.

OFFICIN. NAT.

1. *Integra*. 2. *Cor*. 3. *Sanguis*. 4. *Lapilli*.
5. *Nidus*. 6. *Stercus*.

Vires.

1. *Integra* Epilepsiæ specificè subveniunt oculorum hebetudini, lipitudini, (*cinis cum melle illius*.) Anginæ ac Uvulæ inflammatæ medentur, (*comesta vel assumptus earum cinis*).

2. *Cor*, Epilepsiæ itidem conferre, memoriamq; roborare ajunt: alii con-

tra quartanam devorant.

3. *Sanguinem* peculiariter oculis conferre volunt, præferunt a. sub ala dextra extractum.

4. *Lapillus* in pullor. nonnullorum ventriculo, (rarò licet) invenitur. Chelidonius dictus, granilentis, vel pisi magnitudine. Hinc Epilepsiæ puerorum convenire volunt, (*brachio alligatum vel collo suspensum*).

N. Ferunt crescente \mathcal{C} hunc potissimum inveniri, atque in pullo primogeniti alii mense Augusto circiter plenilunium eximunt.

5. *Nidus* auxilio anginæ est (*extrinsecus impositus*;) oculorum rubedini medetur: i&ui viperino convenit, (*impositus*).

6. *Ster-*

8. *Stercus* calfacit impensè, discutit, acre est.

Ulus præcipui in moribus canis rabidi, (*intrinsecus & extrinsecus*), in doloribus colicis & nephriticis, (*propinatum*;) alvum irritat, (*subditum*).

PRÆPAR.

Aqua hirundinum fit usitatis ex Ripariis, v. *Dispens. Aug.*

LVIII. *Milvus*, *Milvus*.

Wey / *Weibe* / *Wutwe* / *Müttelweyh* / *Hüner-Dieb*.

Animal est è genere Accipitrium acuti visus, articularibus morbis obnoxius.

niger, robustus, hic usitatio-
rior.
Major } rufus propemodum, re-
galis dictus.
Est } Minor, rubeus, rother Weyh.

OFFICIN. NAT.

1. *Milvus incineratus*. 2. *Caput*. 3. *Epar*. 4. *Sanguis*. 5. *Fel*. 6. *Stercus*. 7. *Pinguedo*.

1. *Milvus incineratus* Podagræ, Epilepsiæque subvenire dicitur, (*exhibitus*).

Dosis ὁβ. ad ὁj.

2. Idem, de capite affirmant, ac Epate incineratis.

3. *Epar* insuper oculorum Medicamentis adhibetur.

4. *Sanguis* podagricos juvat, (*cum Urtica mixtus & impositus*).

5. *Fel Ocularis* additur.

6. *Stercus*, articulis cum succellâ imponitur.

7. *Pinguedo*, articularum doloribus illinitur.

PRÆPARATA.

Sunt qui *Milvum vivum* in F. Eq. 40. & macerandum sepeliunt, & ex vermibus, qui ex eo procreantur, unguentum ad dolores podagricos faciunt. *Aldrovand.*

LIX. *Motacilla*.

Passer aquaticus. *Bach* / *salba* / *Wüggel* / *Stelke* / *Quet* / *Stelke*. (*flava minor*).

Avis est circa fluentes præcipue degens, cauda tremula.

OFFICIN.

Ipsamet integra avis. Cujus vis mire prædicatur in atterendo calculo, (*pulvis potus*).

LX. *Noctua*.

Γλαυξ, *Nacht-Eule* / *Stein-Eule* / *Kauh*.

OFFICIN. NAT.

Caro. 2. *Fel*. 3. *Pinguedo*.

Vires.

1. *Caro* curat Paralyticos, (*Plinio*), Melancholicos, & sim. (*Rabbi Moys.*) Apostema Anginæ mirabiliter aperit & rumpit, (*cinis noctua integra, nec depumata in guttur immisus*).

2. *Fel*, ad maculas oculorum valet.

3. *Pinguedo*, aciem oculorum acuit.

LXI. *Olor*.

Künn / *Cygnus*, *Schwan*.

Sss sss

Avis

Avis est ad genus anserinum formâ & victu, ideoque & facultatibus accedens.

OFFICIN. NAT.

1. Pulli. 2. Adeps. 3. Pellis.

Vires.

1. Pulli *Cygnor.* in oleo cocti, additâ medullâ cervinâ, podagricis profunt.

2. Adeps emoll. lenit, atten. adeoq; utilis est hæmorrhoid. vulvat. duritiei; oculos purgat, cum vino lentigines cutis tollit.

3. Pellis, plumis tenerrimis oblita colicos juvat, & stomachi vitio laborantes.

LXII. Palumbus.

Πάσσα, Πάσσα, Palumbus, a, *Holke* Daube.

Convenit cum columba, exustaque plumâ Ictericos, reficere, calculosis, urinâque difficultatibus subvenire dicuntur.

LXIII. Parus.

Carbonarius major, *Kohl* Meise / *Spiegel* Meise. Caudatus, monticula, *Schwartz* Meise / *Berg* Meise.

Arzida Cæruleus montanus, *Meel* Meise. Fuscus, Palustris, Cinereus, *Kohl* Meise / *Alsch* meise. Ater, Caninus, Carbonarius minor, *Hunds* Meise. Cristatus, *Strauß* Meise. *Kotel* Meise.

Ex his præfertur reliquis, i. efficax.

que prædicatur adversus renum calculos & colicos cruciatus, (in cibo vel cinere exhibitus.

LXIV. Passer.

vulgaris.

Passer } *Sperling*.
Troglotites.

*Zaunschlupf*lein / *Zburn* König. *Schnee* König / *Zaun* König / *Mes* sel König / *Winter* König / *Maus* König.

N. Sunt qui à *Regulo* distinguant, eo- que paulo majorem esse velint, pennisque illis aureis, quas *Regulus* in capite alii *Passerem* hunc designant. Verum cum utriusq; vires conveniant, alter alterius vices subire non nequit.

Vires. *Passer troglotites* maximopere commendatur ad calculum atterendum & expellendum, siue integer evulsis pennis sale conditus crudè devoretur, siue incineratus assumatur.

Passer vulgaris, quia avis salacissima est, commendatur ad venerem, comestus, præcipuè cerebella.

Stercoris grana aliquot exhibentur infantulis ad ciendam alvum.

LXV. Pavo.

*Tau*is, Pavus, Avis medica, *Psato* / *Page*lum.

Avis est omnium reliquarum formosissima, vivacissima, (30. annos vivere potest,) unde & Balsamica vi vigorosa, adeo, ut caro ejus sine corruptione per se diu conservari queat.

OFFICIN. NAT.

1. Inte-

1. Integr. 2. Adeps. 3. Fel. 4. Stercus
5. Penna. 6. Ova.

Vires.

1. Jus pavonis pleuriticis specificè fertur prodesse, præcipuè si sit pingue.

2. Adeps, (cum succo rutæ & melle, colicos affectus optimè sanat.

3. Fel, oculorum hebetudini, fluxionibus, asperis item superciliis medetur.

4. Stercus, proprietate vertiginem & Epilepsiam sanat, (in dies multos exhibitum;) nimirum exiccatum & pulverisatum (3j.) macerantur per noctem in vino: Hinc tractum per linteam, exhibetur continuando à novilunio usq; ad plenilunium aut amplius, si opus sit. Crato miscet cum saccharo & exhibet.

5. Penna, adhibentur in suffitu, adversus uteri ascensum, *Quercetan. in Pharm. Res.*

6. Ova, exhibentur ad curandam arthritidem vagam dictam.

LXVI. Perdix.

Πέδιξ, πιδίνα, Rebhun/ Feldhun.

Avis est salacissima, vivacissima, (ad annos 16. vascens gemmis Coryli & betulæ, gramine & segete virente.

OFFICIN.

1. Caro. 2. Medulla. 3. Sanguis. 4. Lecur. 5. Fel. 6. Penna.

1. Caro comesta semen atque lac auget, Venerem excitat.

2. Medulla ut & Cerebrum propi-

natum, icteros juvare dicitur.

3. Fel, ad affectus oculorum præfertur aliis.

4. Sanguis oculis cruore suffusis & recentibus eorum vulneribus illinitur.

5. Lecur, siccatum ad ignem & pulverisatum, morbo regio resistit, singularisq; fertur antidotus contra febrem, si aliquoties in aqua millefolii assumatur. Crato.

6. Penna inserviunt suffocationi uterinæ (suffitus naribus admotus) doloribus colicis, aliisq; mitigandis, discutiendis, (fomentationis formula adhibita,) & hinc cum mentha ac abrotano in forma sacculi infantibus familiare remedium existunt, ad tormina ventris compescenda.

LXVIII. Pica.

Кітла, Угластер / Egester oder Uhel.

Vires. Avis hæc maximè commendatur ad oculorum obscuritatem, ruborem, dolorem (comesta vel incinerata, oculisque indita, vel quocunque modo apposita.

Convenit & Maniacis, Epilepticis, Melancholicis, (cinis exhibitus.

PRÆPAR.

Aqua Pica. Antepileptica. v.l.a.

LXVIII. Struthio.

Struthiocamelus, Strauß.

Avis est maxima, exotica, facultute chylica celebris.

N. Duos videre mihi contigit Londini Anglia, quibus facile fuit, objectam

Chirothecam coriaceam deglutire.

OFFICIN. NAT.

1. *Tunica Ventriculi.* 2. *Adeps.*

Vires.

1. *Tunica interior ventriculi ventriculum corroborat, calculosque dissolvit mirè.*

2. *Adeps nervosis partibus convenit, duritiem Lienis mollit, dolores nephricos mitigat, (inunctus.*

LXIX. *Turtur.*

Туртвр, *Turtel Daub.*

OFFICIN. NATIVA.

1. *Integer Turtur.* 2. *Adeps.*

Vires.

1. *Turtur viribus cum columba convenit, peculiariter tamen commendatur in dysenteria ac præcipuè in sistendo mensium profluvio, sive cinis combusti turturis, sive exinde extractum exhibeatur, (Dosis gr. 4. 6.) sive turtur depumatus & exenteratus insuta in ventre mastiche, (3j. aceto rosaceo, inter assandum asperso (huius loco,) assetur, postmodumq; in olla clausa exsiccetnr, atq; in pulverem convertatur, & cochl. j. singulis mane exhibeatur.*

2. *Pinguedo inter assandum collecta illinitur renibus ventri, pectori, inguinibus, &c. Vide Forest. lib. 28, observat. 10.*

N. Sunt è podagricis, qui sibi persuadent paroxysmos arceri, podagramque præcaveri, si in cubiculo turtures alant.

LXX. *Upupa.*

Έππο-ψ, *Widhopff.*

Avis est melancholica, spurcissima, victitans vermiculis in stercore reptantibus, Erucis, Scarabæis, &c.

OFFICIN. NAT.

1. *Caro.* 2. *Penna.*

Vires.

1. *Caro ejusque decoctum proprietate suâ colicos juvat, (assumpta) Avic. Fen. 16. tr. 4. c. 11.*

2. *Penna, dolores capitis demulcere dicuntur, (imposita.*

LXXI. *Vultur.*

Вѣдъ, *Geyer.*

Avis est pollens facultatibus animalibus ac præcipuè odoratu.

OFFICIN. NATIVA.

1. *Caro.* 2. *Pinguedo.* 3. *Cerebrum.* 4. *Fel.* 5. *Penna.* 6. *Fimus.*

Vires.

1. *Caro convenire judicatur affectibus capitis, Epilepsia, Hemisphæria, &c. simil. Decoctum cutis vitia sanare perhibetur.*

2. *Pinguedo, convenit nervis.*

3. *Cerebrum subvenit capitis imbecillitati, (illitum vel naribus inditum.*

4. *Fel, Epilepsiam arcere dicitur, (assumptum cum vino.*

5. *Penna, de pennis nugantur, si pedibus subdantur, quod partum potenter promoveant.*

6. *Fimus, nidore partum excutit.*

CLASSIS III. DE PISCIBUS.

LXXII. Anguilla.

Ἐχιδνα, Blat.

OFFICIN. NAT.

1. Pingued. 2. Caput. 3. Sanguis.

1. Pinguedo vulneraria est, capillos generat, (illita in alopecia:) auditum restituit, (instillata auri,) hæmorrhoides mitigat.

2. Caput anguillæ verrucis cutis mederi ajunt, sc. si caput sanguinolentum adhuc, quo verrucæ tactæ sunt, terra cooperiatur, ut putrescat.

3. Sanguis adhuc tepidus colicos domare dolores dicitur, cum vino assumptus.

N. Sunt, qui dicunt vinum, in quo Anguilla suffocata fuerint, abstemios reddere, (bibitum).

LXXIII. Barbo.

Τριζαν, Barbo, Barbe/Varine.

Piscis est culinæ satis laudabilis.

Officinis a, in usu non est, ova tamen à ruricolis nonnullis assumuntur, ad ciendum vomitum & alvum, quod sat violenter perficiunt.

LXXIV. Blatta Bizanzia.

ὄνυξ, Unguis odoratus.

Testa seu tegumentum est Conchylii, odore castoreum æmulans.

N. 1. Conchylium (Conchyla Indica) est species Conchar. oblongarum, qua in lucubus nardiferis nascens, nardis vivit,

unde & testa odorem castorei æmulum spirat.

N. 2. Sunt qui Conchylium & purpuram seu buccinam inter se confundunt, sed male: Illud enim est ex genere conchar. oblongar. hoc est genere rotundarum.

Vires. Unguis odoratus internè laxat alvum, splenem molliat, vitiososque humores discutit.

Externè excitat suffitu fœminas strangulatu uteri oppressas, comitialesque. In reliquis idem præstare poterit, quod aliæ concharum testæ, Vide Concha.

N. Blatta Dioscoridis sunt è genere vermium, nobisque incognita.

LXXV. Cancer.

Καρκίνος, Κάμπαρος, Astacus, Krebs.

OFFICIN. NAT.

1. Cancer integer, s. e. substantiæ edulis.

2. Oculi. 3. Putamen.

Vires.

1. Refrigerant Cancri, humectant, dolorem sedant, ferocientes spiritus fiunt.

Hinc usus præcipui in æstu, ac dolore capitis ac renum, (contusi ac cataplasmati,) in Angina (sit gargarisimus ex succo cancerorum, imò & internè succus exhiberi poterit.) In Atrophia (exhibetur internè succus cum ☐, vel succo Chelidonia, externè fieri potest.

Sssss 3

Em-

Emplast. ex cancris tussis, epate vitulino, atque Ol. Olivar. laurinoq; tela ac spicula è corporibus extrahunt; (triti & impositi. Valent & in igne persico ac ambustis.

2. *Oculi Canceri* (lapides Canceri) refrigerant, siccant, abstergunt, discutunt, calculum arterunt, tatarū & sanguinem coagulatum resolvunt.

Hinc usus magni in Nephritide, Pleuritide, Asthmate, dolore Colico, &c. sive crudi, tritique assumantur, sive usti & preparati, inserviunt itidem dentibus abstergendis.

3. *Putamen* (testa) easdem cum oculis dictis vires obtinet. Insuper scabiem puerorum ex falsis humoribus sanat, (oleo rosaceo per mixtum & illitum,) febrium intermittentium paroxysmos arcet.

N. Præstat putamen novellum tenuius, quo induuntur, postquam crassius deposuerint annuatim.

PRÆPARATA.

1. *Cinis cancerorum* (i.e. *Cancris combustis*,) exiccatorius est, proprietate pollet adversus morbum canisrabidi, (assumptus cum radic. *Gentian.*) Rimas pedum ac sedis verruculas & carcinomata cum melle lenit. Sunt & qui caneros combustos propinant in dysenteria.

N. Galenus hoc Medicamentigenus, quod ab *Æschione Empirico* didicisse consuevit, maximopere ad morsum rabidi canis commendat, *Æschionemque caneros vivos in patella arena usisse ait,*

donec in levorem facile redigi poterant; idque per ortum canis. *Oleum transeunt in &.*

Dosis cochlear parvum ad & 40. continuatum.

2. *Oculi canceri preparati*. F. l. c. lavigando, cum ∇, v. g. fœniculi.

3. *Mag. oculor.* & v. l. 2.

4. ∇ *cancror.* fit è cancris MB vel *Æ* destillatis.

Vires. Urinam pellit, calculum arterit, suum extinguit.

N. *Quercetanus* macerat caneros cum ∇ semper viri majoris per & m, hinc dat, ser cohobando, adhibetque inflammationibus, combustis, carcinomatibus, quibus maximè prodesse ait, inprimis si sale ex remanentia elixivatio imbuantr. *Pharm. Resl. c. 7.*

5. *Oleum seu Liquor Ocul.* & fit l. com. per deliq.

N. *Aliter.*

℞. Pulv. oc. & ℥iv. Q. itart. p. d. ℥vi. dig. in F. Eq. (& 15.) hinc coagula & extrahe ∇. Tandem abstrahere ∇ & remanet ∞.

Dosis. 4. ad 6. *Hartm. in pract.*

LXXVI. *Carpio vel Carpo.*

Κύριον, Carpus, Carpa, Karp/Karpff.

Piscis est notus, limo & mucovivens.

OFFICIN. NAT.

1. *Fel.* 2. *Axungia.* 3. *Lapis triangularis.* 4. *Lapilli oblongi.*

Vires.

1. *Fel oculor.* hebetudini & unbecula subvenit.

2. *Axun-*

2. *Arungia* nervorum affectibus calidis auxilio est.

3. *Lapillus Carpsionis* (triangularis in capite repertus, *Rarpffen Stein*/colicis doloribus calculosis, comitialibusq; conferre statuitur.

4. *Lapilli duo* supra oculos existentes, itidem ad Epilepsiam commendantur.

LXXVII. Cetus & Manati.

κῆτος, Cete, *Wall-Fisch*.

Cete nomen generaliter pisces vivos viviparos denotat; specialiter tamen pro maxima eorundem specie sumitur, quæ ob vastam suam magnitudinem ac conformationem quadrupes æmulatur.

OFFICIN. NAT.

Arungia quæ medetur scabiei, (illita.

N. Ex hoc animali sunt qui *sperma Ceti* Officinarum desumi volunt, sed male, v.l. 3. c. 31.

Alii *Ambra* ei acceptam referunt, sed iudem falso.

Manati.

Cetorum generibus annumerantur *Piscis Manati* dictus, à pedibus binis anterioribus, quos solum refert, nimirum hos manus. Hispani vocant, unde & piscem manatum, ac si diceret manibus præditum, vocaverunt. Belgæ ob similitudinem capitis, quo vaccam mentitur, *Vaccam marinam* (See-Ruh) appellant. Vid. Clus. Aldrovand. Monard. Gomar.

OFFICIN.

Lapis Manati. seu de Manati, vulgò *Lapis manatinæ* est lapis os seu crustaceum ex capite ejus exemptum, idque variforme, nonnunquam enim dentes refert, unde & nonnullis See-Ruh-Zahn/ i.e. dens *Vaccæ marinæ* audit, aliquando ossicula aurium mentiuntur, adeoq; ossa auditus dicuntur.

PRÆPAR.

1. Præparat. fit ex calcinato s. cremato.

N. Præstat irrorare aliqua aqua conveniente v.g. *Fœniculi*, &c.

Vires. Summè commendatur ad calculos renum & vesicæ comminuos, dolores nephriticos, ac colicos sedandos.

Dosis ʒj. & nlr. ð.

N. Sunt qui ad ʒj. ascendunt.

2. Magist. Fieri potest solvendo cum spiritu salis vel sal. nitri, ac præcipitando cum ∇.

LXXVII. Concha.

κῆλον, *Muscheln*.

Est genus piscium capite destitutum, testis (quas eodem nomine conchas vocant,) circumvallatum, sive duplex testa illa fit & complicatilis, sive simplex.

Ex harum genere sunt & *Margaritifera*, quas vide infra & l. 3. c. 7.

Varias sub se species complectitur, secundum figuram coloremque ut plurimum nomina nactas, vel & peculiari nomine insignitas.

Sic

Sic sunt.

Conchæ longæ Rhomboides, squamosæ, striatæ, echinatæ, corallinæ, leves, &c. Huc ostreæ, mater perlarum, blatta byzantia, Chamæ generum varior. &c. Umbilicus marinus, dentalium, entalium, purpura, conchylum.

N. 1. *Crescit Concha ac decrescit cum incremento & decremento Luna.*

N. 2. *Inter aquatilia nullum animal esse perhibetur, quod majori desiderio teneatur, vescendi carne humana quam hoc ipsum.*

OFFICIN. NAT.

1. Testa. 2. Caro. 3. Margarita, de quibus l. 3.

Vires.

1. Testæ conchar. vim habent exicandi, sudorem movendi, abstergendidi, &c.

Hinc usus earum internus præcipue est in febribus, quibus interveniente sudore medentur.

Externè conveniunt in dentifriciis absterforiis, in mariscis & condylomatibus ani reprimendis (*calx applicata*).

PRÆPARATA.

Adhibentur autem Conchæ, tum pulverisatæ solummodo, tum calcinatæ & pulverisatæ, vel & simul lege communis, cum ∇ card. bened. & sim. lavando præparatæ.

N. Nostratibus hoc nomen sibi communiter vendicat, genus conchar. oblongum, quod hisce in locis vulgarius reliquis invenitur.

Ex horum testis fit famosum illud Antefebre Crollianum.

Hoc modo:

Testis dictis affunde \ddagger , stet per noctem, tunc extrahit mucorem, quo abraso, calcina testas ad albedinem usque, pulveremque serva.

Vires. Ciet sudorem sat largiter, adeoque instante paroxysmo (præcipue tertiano,) exhibitus febres solvit, maxime si vice secunda vel tertia iteretur.

Dosis Diß. ad 3j.

N. Crollius exhibet in haustu cerevisiæ calidæ cum tantillo butyri.

2. Caro concharum, id est, substantia edulis, culinaris potissimum est, & in cibo quartanis convenire dicitur.

LXXIX. Dentalium & Entalium.

Dentalium est conchula parva, oblonga, exterius asperula, intus levissima, tubuli modo concava, alterâque partem rimam habens capini dentis instar acuminatam, unde & dentalium nominatur.

N. Non piscis, sed vermis oblongus, ac tenuis dentalii incola est; adnascitur saxi marini, conchis vè vetustis.

Entalium itidem testaceum quoddam est marinum, instar parvi cornu longiusculum, rectum & cavum, fortis striatum, intus lævè, rarò longitudinem digiti superans.

N. Vide.

N. Videtur esse *Dactylus* Plinij.

Vires. Utrumq; etsi in Medicina habetur, non nisi in unguento Citrino usitatum sit, attamen cum aliis testar. generib. ad similes affectus adhiberi posse verisimile est.

LXXX. *Halec.*

Mawic, Halecus, Harengus, Haring/Haring.

Piscis est Marinus Oceano Baltico, aliisque Germaniæ Oceanis familiaris.

OFFICIN. NAT.

1. *Vesicula.* (*Halecis anima dicta.*) 2. *Ipsum Halec* & 3. *Muria.*

Vires.

1. *Anima dicta* N. ix. exhibitæ urinam ciere dicuntur.

2. *Integrum Halec* salitum imponitur plantis pedum ad humores à capite derivandos, æstumq; febrilem domandum. Cinis exhibitur ad calculum atterendum, (*sit ut cancerorum.*)

3. *Muria*, (*Garum*) est brodium, quo Halec vel alius piscis fuerit conditum. Inservit Clysterib. in coxendicum dolore & Hydrope, mundificat ulcera fœtida, Gangrænam cohibet, strumas dissipat, ad anginas valet (*cum melle illitus.*)

LXXXI. *Huso Ichthio-*
colla.

Exossis, *Hausen.*

Genus piscis est è maximis (longit. 24. pedum, pondere nonnunquam ad lb. 400.) Cartilagineum, ossib. ex-

pers, (exceptis quæ in capite sunt, absque squamis, &c.)

Familiaris piscis est Danubio, nimirum ex Mari in Danubium desiderio aquar. dulcium ascendit.

OFFICIN. NATIVA.

Exhibet Officinis *Ichthyocollam* (*Arab. Alkanna Hausblasen/*) quæ glutinis genus est, colore album, ex illius corio, intestinis, ventriculo, pinnis & caudâ confectum.

Idque hoc modo.

Partes dictæ in frustula tenuissima sectæ macerantur, in ∇ calidæ q. s. hinc coquuntur lento Δ e ad consistentiam pulvis, malaxanturque antequam refrigerint in massam.

Vires. *Siccæ, explet, quadantenus mollit.*

Hinc Usus ejus est in Emplastris glutinantibus.

N. Adhibetur & ad gelanda jura, (*Galrey zu machen*) ex iisdem addito Saccharo cand. excoquitur etiam translucentum & flavum glutinum genus. (*Fischleim & Mundleim appellatum,*) quod in ore liquefactum ad chartas glutinandas adhibetur.

LXXXII. *Lucius.*

$\lambda\alpha\beta\gamma\alpha\zeta$, aliis $\lambda\upsilon\kappa\epsilon$, *Lupus,*

Hecht.

N. Sunt qui *Lucium* ac *Lupum* confundunt, quod etsi nominatenus concedi possit, cum utrumque piscis sit rapax, ne *Lupus* terrestris, attamen re ipsa distinguuntur.

Ttt ttt

Lupus

Lupus siquidem veterum, marinus piscis est, figuræ à Lucio aliena.

OFFICIN. NAT.

1. Fel. 2. Cor. 3. Mandibula. 4. Officulum cruciforme. 5. Axungia. 6. Ova. Vires.

1. Fel, Febrim arcere volunt (si assumatur N. 3.

Extrinscus inservit oculorum maculis, hebetudini, aliisque eorum affectibus.

2. Cor, adversus Februm paroxysmos devoratur.

N. Sunt qui Cor vivo Lucio exemptum devorare, luciumque corde orbum denuo in fluentem ∇ in conjicere iubent.

3. Mandibula exiccat, abstergit. Hinc datur in pleuritide seu specificum, confert itidem ut & reliqua capitis ossicula in calculo, fluore albo mulierum partu difficili.

Extrinscus sistit (cinis) synoviam, vulnera inveterata mundificat, hæmorrhoides exiccat.

4. Officulum cruciforme ex capite Lucii, commendatur quibusdam ad Epilepsiam (assumptum).

N. Periapton singulare quibusdam habetur adversus incantamenta.

5. Axungia vulgare Medicamentum est, illiniturque plantis pedum & pectusculis infantulorum, ad revelendos catarrhos & demulcendam tussim.

6. Ova vomitum ac alvum ciere apta sunt, unde & hujus gratia medi-

camenti à plebeis exhibentur.

PRÆPARATA.

∇ fellis destillata oculis subvenit.

LXXXIII. Mater Perlarum.

Macia Perlarum seu Margaritarum perlen Mutter.

Species est Concharum, à Margaritis nomen ducentium, quæ inibi frequentius, quam in reliquis inveniuntur.

Vires. Præter vires concharum communes (vide supra) sunt qui vim cordalem huic attribuunt, verum quo successu videant ipsimet.

Alii antifebrile ex eadem conficiunt, ad modum quem supra ex conchis oblongis dedimus.

LXXXIV. Mustela.

Σαύρα, Gobius fluviatilis, Mustela fluvi. Gesner. Altraup/ Altrup/ Trusche/ Quapp.

OFFICIN. NAT.

1. Epar. 2. Ventriculus. 3. Spina.

Vires.

1. Hepar in vitro suspensum calori- que expositum, in liquorem liquecit flavum, admodum utilem oculorum hebetudini ac nubeculis.

2. Ventriculus commendatur summè ad affectus uterinos, præcipuè autem fertur secundinas pellere, colicosque dolores abigere, (potus).

3. Spina pulverisata caducuum expugnare fertur.

LXXXV. *Ostrea.**Ostrea, Ofter, Muscheln.*

Sunt conchæ marinæ ex genere rotundarum.

Vires. *Ostrea* pestiferos bubones loco transferunt, & virus omne ad se trahunt: Sunt autem agglutinanda brachii parti, qua axillaris decurrit, videlicet si bubo in alis sit, sin vero inguen obsederit, lineamentis femoris quæ vena cruris describit. *Hollernus.*

N. *Testa concharum vicaria esse possunt.*

LXXXVI. *Perca.**Percus, perca, Bersich.*

Perca fluiat. (ad differentiam *Perce* marinæ, quæ piscis ab hoc differens est.

OFFICIN. NATIVA.

Lapides in capite reperti, juxta spinæ dorsi initium: Hi virib. conveniunt cum reliquis lapidib. testaceis, adhibenturque in calculo atterendo, renib. abstergendis.

Extrinfecus in dentificiis, vulnerib. exiccandis.

LXXXVII. *Rana aquatica.*

Batrach. } aquatica, hæc usualis.
Rana Frosch } terrestris.
 } amphibia.

Præfertur ex aquaticis, quæ in fluviis puris ac fontib. reperitur, eaque viridis.

Rubeta nimirum, & quæ in lacub.

habitat, damnatur ceu perniciofa.

Terrestris itidem cedit aquaticis, imo quæ maculatæ ex his sunt, venenatæ habentur.

N. *De Ranunculo viridi, vide*

Class. I.

OFFICIN. NAT.

1. *Ipsa Rana.* 2. *Cor.* 3. *Epar.* 4. *Fel.* 5. *Pinguedo.* 6. *Sperma Ranarum.*

Vires.

1. *Dioscoridi Rana ipsa* contra omnium serpentium venena pro Antidoto sunt, si ex sale & oleo, vel butyro edantur, jusque earum itidem sorbeatur. Valent & adversus inveteratos tendinum rigores.

Inducit etiam vini fastidium, si vinum in quo viva rana viridis suffocata est, propinetur: Viva Anthraci pestilenti imposita, donec moriatur, venenum elicit. Viva integra alligatur ad causonum æstus: articulor. & juncturar. dolores mitigat, ignesque sacros restinguit, (*viva scil. vel confusa imposita.*) *O-* dontalgiam sedat, (*cocta & in gargaris-*mo adhibita.

N. Si ventri torminoso adhibeatur, in ipsam vitium transire confestim fertur.

2. *Cor Ranarum* (maximè fluvialium) febricitantium Spinæ alligatum, febriles algores minuit. Sunt qui cordis regioni admoveant ad mitigandos causonum æstus & incendia. *Mizald.*

3. *Epar* exiccatum & pulverisatum

tum in februm quartanar. (& aliar.)
accessione cum succellu assumi, ajunt,
Crato exhibet in ▽ millesolis.

N. *Epata ranar. viridum in paludi-
bus degentium, seu peculiare specificum
ad Epilepsiam commendant.*

*Exhibere jubent sub conjunctione Lu-
minarium ☾ in ☽ existente. Petrus
Nosolog.*

4. *Fel, peculiariter oculis convenit,
quartanamque curare dicitur incinera-
tum & ad ꝑ℞. exhibitum.*

5. *Pinguedo aurib. indita dolorib.
medetur.*

6. *Sperma ranatum, (sperniola)
Froschleisch/ refrigerat, constipat, in-
crassat, dolores mitigat, manuum scabi-
em curat. (si mense Martio in colaven-
tur;) paronychia & herpes interficit,
erysipelati & ambustis, aliisque inflam-
mationib. succurrit, (impositum) Faci-
ei ruborem curat, fluxui mensium &
hæmorrhoidum medetur (vulvæ vel a-
no inditum.*

N. *Linteum hoc spermate aliquoties
madefactum & exsiccatum pro usu ser-
vant. Alij idem sperma in fictili recon-
dunt in terram, loco scil. aprico, quo in ▽
eum tempore convertitur.*

PRÆPARATA.

1. *Cinis inspersus sanguinem pro-
fluentem, (e. gr. vulnery, narium-
que) sistit. Uteri hæmorrhagias suffi-
tu reprimat, alopecii ex liquida pice
illinitur.*

*Internè gonorrhæam cohibet (as-
sumptus ꝑ℞.*

2. *Aqua stillatitia è Ranis.*

*Fit è Ranis vivis sub finem Martii, vel
initio Aprilis captis, per XX.*

3. *▽ stillat. ex spermate.*

*ꝑ℞. Fit per XX, è spermate collecto
Martio.*

N. *Sal addere solent.*

*Vires. Ex precedentibus parent, præ-
ter quas Vesica ab humorum acrimonia
exulcerata egregia medela est. Facit &
ad repellendum & sistendum sanguinis
profluvium & faciei ruborem, impetigi-
nes curat, erysipelati ac gangranis succur-
rit.*

4. *Oleum.*

*Fit coquendo ranas cum ☉ o com-
muni vel Rosæ.*

5. *Pulvis sperniola compositas.*

Vide lib. 2. in Pulveribus.

N. 1. *Ubi rana, spermaque earundem
aut limaces, lumbrici, cancri, & similia a-
nimalia veniunt Qanda, includenda esse
linteolo mundo & in medio cucurb. su-
spendenda, ut velint per vaporem stillent,
alias aqua putoris erunt participes. In lin-
teis autem remanebit pulvis animalium
istorum opt. preparatus, cui majoris cor-
rectionis ergo ▽ guttulas aliquot instilla-
bis & rursus exiccabis, vel cum eodem ▽
tincturam elicies.*

N. 2. *Fabricius de Gangr. pulv. dilan-
dat ad Ulcera maligna & inflammatio-
nes omnes compescendas.*

LXXXVIII. *Sepia.*

Ennia, Blackfisch/ Blackfittel.

OFFI-

OFFICIN. NAT.

1. *Os Sepia*. 2. *Humor ater*. 3. *Ova*.

Vires.

1. *Os Sepia*, γυντιον,) exiccat, abstergit, (*pulverisatum vel incineratum*,) maculis, nævis, scabiei humida medetur, oculis convenit, (*cum melle cinis indutus*,) gingivis tumidis subvenit, (*in densificius*) asthmaticis auxilio est; (*assumptus*.) Gonorrhæam sistit, calculos pellit, urinas movet (*pulvis assumpt.* 3j. *Dosi*.)

2. *Humor ater* (Dinte) intra vesiculam in corpore repertus, alvum movere dicitur, (*assumptus*.)

3. *Ova* renes & ureteres abstergunt, menses & urinam cient.

LXXXIX. *Sturio*.

Ἀκτιπένσις, Γαλαζίας, Gal. Aquipenser, Stora, ein Stör / Stür / Sturlein.

Piscis est dorso ac ventre echinatus, dulcesque salasque aquas colens, magnitudinis proceræ.

Vires.

Ossa Sturionis, dicti piscis commendatur in *Arthruide vaga*, exhibita) *Forest. lib. 20 observ. 12. in Epistola D. D. de Brahe.*

Ut & in Colicis doloribus discutien-

XC. *Testudo*.

Χελώνη λιμναία: Schildkrote.

Animal est ἀμφίβιον, è genere Testaceorum, scutum testaceum in dorso gerens.

OFFICIN. NAT.

1. *Crura*. 2. *Sanguis*. 3. *Fel*.

Vires.

1. *Crura* pro Periapto antipodagrico experientissimo adhibentur.

Videlicet.

Accipiat *Testudo* masculina (cognoscitur inter cætera ex caudæ discrimine, & leni sub interiore testa incisura, ubi Luna meximè fuerit diminuta, priusquam cum Sole conjungatur, amputentur vivæ crura omnia, ea confuta in sacculos ex pelle hœdina angustos alligentur membris patientibus, ita ut dextrum crus testudinis dextro cruri ægotanis respondeat, sinistrum sinistro. Item antierius crus dextrum brachio dextro applicetur sinistrum sinistro. *Solenand. sect. 1. consil. medic. 20. Schenckius in observ. Idem refert Bapt. Porta ex Rhasi & Constantino, libr. 4. Phytogn. cap. 4.*

2. *Sanguis* Testudinis marinæ & terrestris, in remediis internis pro antidoto datur ad 3ij.

Sanguis Testudinis terrestris ad Hecticam imperatur (*recens & crudus ad 3ij*) exiccatus ad Epilepsiam commendatur.

3. *Fel*, Oculis confert.

XCI. *Thymallus*.

Θάλασς, Aschia, Alsche.

OFFICIN. NAT.

Axungia.

Vires.

Oculorum maculas, ungues-
Ttttt 3 que

quæ abstergit, (Sole liquata & melle permixta,) maculas cutis tollit, foveas post variolas relictas explet, (*illita*).

XCII. *Tinca*.

Συγγρη, Tencha, Schleye.

Piscis est mucosus, excrementitius, amans aquas palustres, canosas, lutosas, vivens cano, generatur, tum ex traduce, tum sponte. Familiaritate lucio conjuncta est.

OFFICIN. NAT.

1. *Integer piscis*. 2. *Fel*. 3. *Lapillum*.

Vires.

1. *Integer piscis* dissectus imponitur pulvis. manuum pedumque plantis, ad mitigandum æstum febrilem, vel & ad divertendum venenum pestilentielle. Simili etiam modo adhiberi solet in dolore capitis ac articulorum. Vivæ tincæ (*una post alteram*)

umbilico ac epati impositæ, donec moriantur, Icterus curare dicuntur, luteum nimirum contrahunt colorem. Incineratam tincam, (præcipuè tegumentum) in fluore albo mulierum exhiberi vidi cum successu.

2. *Fel*, commendatur ad aurium affectus.

3. In capite gerit *Lapidem* ut *Carpio*, qui ad similes affectus exhiberi poterit, quo dictus *Carpionis lapis*.

XCIII. *Trutta*.

ῥέσσοφρος, Aurata, Variolus, Variola, Trutta, Sobre/Forelle.

Piscis est culinis creberrimus & laudabilis.

OFFICIN. NAT.

Pinguedo. Hæc illinitur utiliter mariscis & ani fissuris.

CLASSIS IV.

DE INSECTIS.

XCIV. *Apes*.

Μέλιτα, Apis, { Domestica huj⁹ loci.
Bienen/Bienen { Sylvestris fera, Humi
mel.

Apis insectum est mellificans, vivens, tum florum melligine, tum melle ex illa melligine confecto.

OFFICIN.

1. *Apis*. 2. *Mel*. 3. *Cera*. 4. *Propolis*.

1. *Apes* siccæ & contritæ inun-

ctis alopecii capillum restituunt.

II. *Mel*, eligendum est flavum pellucidum, odore ac sapore jucundum, consistentia, neque crassum, ac concretum, neque dilutum nimis, omni ex parte unitum seu continuum. Flavum succedit album, quod iidem, modo reliqua bonitatis signa defuerint, non contemnendum. Vitetur autem in mellis electione favus

favus araneorum texturis refertus. Omnib. porro praefertur Mel Virgineum dictum, id est, quod novellae apes conficiunt, colore ex flavo albicans.

Vires. Mel calidum ac siccum statuitur gr. 2. (albicans tamen minus calidum censetur, nutrit, abstergit, aperit, pulmonib. convenit, urinam cit; ruffi medetur, putredini resistit.

Extrinsecus oculorum caliginem discutit, aliisque eorum affectib. succurrit.

Cautio.

1. Mel quia facile bilefcit, Epati calidioribusque corporib. non adeo proficuum est.

2. Mel crudum alvum inflat, tussim lacescit, fastidium creat.

M. Mel Galeno succus est roris caelestis, ab Apibus collectus. Paracelsorefinosum, quid terra est, in vegetabile genus virtute plantarum ac influentiarum caelestium transplantatum, & hinc ab apibus collectum atque ulterius digestum. Vide Paracels. de Naturalibus.

Hinc variat quoque 1. pro varietate plantarum, quae ratione optimum censetur apum in rosetis, vel liliis; &c. degentium 2. diversum quoque Mel existit pro diversitate influentiarum. Sic Mel praestantissimum habetur, quod anno sereno ac salubri Vere ac Aestate confectum, Quercetano dicitur Ros vel Mannacelestis, atque inde sua aceta Philosophica preparat.

PRÆPAR.

I. Mel depuratum.

1. Mellis, q. v. affunde ∇ portionem, æqualem vel duplam, triplamvè, si valdè impurum fuerit, vel si alienae rei expers sit, sine additione, coque & desuma cochleari pertuso.

N. 1. Quod si hac ratione non satis depuratum foret, clarificari poterit cum albuminibus ovorum singulis ad singulas libras adhibitis, v. l. 1. c. 14.

N. 2. Conrad. Kunrath. dictam mellis depurationem improbat, quippe quae potiores ac meliores spiritus, quibus maxime impraegnatum est, in auream evanescent. Itaque hanc substituit.

2. Mel Virgineum nondum Δ commissum una cum favis, inde Manicæ Hippocraticæ, suspendeque in loco tepido Solis, vel in hypocausto vaporib. aqueis, (ut Balneatorum balnea calefieri solent,) calfacto ut perfluat Mel.

II. Mel destillatum.

Unde.

1. ∇ Mellis, Spiritus atque Oleum.
2. Mellis lb. 1. adde Sal. com. vel filicum mundor. contusor. arenæ vè Ziij . Zvi . (alii etiam addunt segmenta Ligni Juniperini.) destilla per Om gradatim, & exit ∇ alba, dein flava, cum O , ut & Spiritus, quæ aliquoties rectificentur.

Alii eliciunt primo ∇ in cucurbita ex MB. Remanenti in cucurbita melli addunt Arenam, vel filices calci-

calcinatos contusos, Qantq; per Δ m
 ∇ m flavam cum \odot o. Hæc digerunt a-
 liquoties, & aliquot (s. 6.) dein Qant,
 tandem \odot supernatans ab ∇ separant.
Senn. Quercet. Med. destillat.

Alij.

\mathcal{R} . Mel cum cera & favo, ponunt in
 finum ad putrefactionem per Δ m,
 finumque sæpius (dieb. ternis) mu-
 tant: Hinc Qant. 1. Exit ∇ alba (fa-
 ciei absterfioni dicata 2. ∇ flava, Of-
 wald.

N. 1. ∇ m hanc flavam esse menstru-
 um Franc. Anton. sunt qui putent, sed
 malè.

N. 2. Adduntur Arena, vel silices, vel
 vitrum, ut fervescant, ad quam Mel
 maximè proclive est, præcaveatur, id
 quod alij meditantur sacculos parvos Are-
 na refertos imponendo.

N. 3. Sunt qui ∇ m primo elicitam
 super novum Mel fundunt & rectificant.

Vires.

Utraque ∇ alba sil. & flava, suffu-
 siones & albugines oculorum sanat, capillis
 producendis confert. Inservit Tinctura
 Corallorum extrahenda.

Intrinsècus refert obstructions, pellit
 urinam, astringit calculum.

Oleum quod instar ∇ vita ardet, vi-
 res habet admirandas, præsertim si per
 & aliquot circuletur cum ∇ . Etenim
 separatim iterum illo ∇ , remanet \odot
 dulce & gratissimi saporis, vulneribus
 sclopetariis & phagedanicis ulcerib. plu-
 rimum conducent. Singulare quoque est

ad podagricos dolores sedandos. *Discutis*
maculas faciei cum \odot o Camphora.

2. *Oleum Mellis compo-
 situm.*

\mathcal{R} . Mell. lb. ij. \odot i calcinati, lb. i. ∇
 rectif. lb. ß. Tartar. lb. i. destilla per
 Δ m, primo extillat phlegma, dein
 ∇ : &c.

Vires.

*Lenit dolores podagricos, si locus affe-
 ctus eo illinatur.*

3. *Acetum mellis.*

\mathcal{R} . Mellis opt. p. i. ∇ fluv. p. viii.
 coq. ad medietatem, postea suspende
 in eodem semen Eruæ in petia, atque
 repone in loco calido vel Sole, donec
 deferbuerint. Fit paulatim ∇ acerrim-
 um, quod \mathcal{Q} etur.

Vires. Præter alios Usus solvit & sili-
 ces, reliquosq; lapides, etiam sine ulla præ-
 cedente calcinatione. *Hartman. in Croll.*
Senn. Inst.

4. *Tinctura mellis.*

Tincturam mellis *Beguinus* extrahit
 ex melle crudo cum arenis impastato,
 eamque exhibet Phthificis pro nutri-
 mento.

5. *Qu. Essentia mellis.*

1. \mathcal{R} . Mel cum favis, q. v. (lb. xv.) eli-
 ce ∇ per MB, qua prolecta relinquatur
 adhuc remanens materia in MB ferven-
 ti, & \odot (s).

2. Dein. 2. affunde ∇ atque extrahe
 f. a. tincturam, eamque decantatam
 purifica optimè per digestionem ac
 subsidentiam. Tandem destilla Tin-
 cturam per MB ad siccitatem, C destil-
 latum

CLASSIS IV. DE ANIMALIB.

37

latum dicitur elementum aëris, essentia illa remanens ignis.

3. Ex fecibus incineratis (proleto prius ☉ per descensum ☿ mve, si ita visum fuerit,) extrahē sal cum ∇ commun. more solito, idque purifica optimē, (dicitur elem. terræ.)

4. Coniunge jam omnia atque destilla ex Fib. per XX toties cohobando, donec omnia volatilia sint, ac XX transcenderint.

Sic habes Qu. E. Mellis.

Vires. Instar Panacea esse poterit.

Dosis gr. iij. 1v. v. &c. Med. destill.

6. Elixyr Mellis.

Clyffus.

7. Mel per Manicam Hipp. depuratum. Elice ∇m. ☉ ac sal. comm. Sal elicatum potato per vices aquā suā, dein ☉ donec omnia imbiberit & coagulum inde factum fuerit.

Vires. Eadem vires cum Qu. Ess. mellis possidet, Med. destill.

7. Sunt & varia Officinalia usualia, quæ mel tūm basin agnoscunt, ut Hydromelimum genera, tūm asservationis medium, ut Syrupi quā plurimi, &c.

III. Cera, Κηρ, Arabic. Hahama, Wachs. Medium quodammodo tenet calfacientium, refrigerantium, humectantium & desiccantium, ita tamen, ut ad caliditatem inclinet, partium quadantenus est crassarum & emplasticarum, ideoque digerit, maturat, &c.

N. Adeo usitata officinis est, ut vix emplastrum reperiatur, cuius non exhibeat consistentiam.

PRÆPAR.

Oleum cera v. l. 2. c. 70.

Vires. Diureticum est, daturque intrinsecus, dos. iij. 1v. v. gutt.

1. Oleum cera boni odoris & coloris.

Fit, si rectificetur super recentes ceræ particulas ∆ cinerum. Ex eo fit.

B. Balsamus vulnerarius.

Per macerationem menstrualem florum hyperic. & rad. consolid. major.

3. Magisterium cera.

Fit ex eā solutā in ∇, filtrataque, ut remaneat in chartā instar butyri, quod edulcoratum atq; ad 3j. propinatum valet eximie ad Dysenteriam.

IV. Propolis, Περόπιδις, σμύνιον, Dioscor. Cera virginea, Vorstop / Stop. Wachs / Bien. Harg / rudis est, & cerosā, crassaque materia seu Gluten in alveorum foribus repertum.

Eligenda flava, odorata, Stryacem vel Galbanum referens, in vehemēti ariditate mellis, & mastichis in modum ductilis.

Vires. Calf. 2. aut princip. 3. leviter abstergit, attrahit, aculeos & omnia infixa corporis extrahit, dura concoquit, dolores demulcet, ulcera desperata cicatrice obducit. In veteri tussi suffumigat.

XCV. Araneus.

Αράχνης, Αράχνη, Spinn.

Uuu uuu

Inse-

Insectum est venenatum, puncturis suis nocivum. Vartorum est generum promiscue usualium.

Est e. Araneus major coloris scil. varii, vel minor coloris nigri, &c. Distinguitur sexu, coitque Vere ac initio Aestatis, & aliquando Autumno & initio Hyemis, unde & eo temporis puncto magis noxius habetur. Vivit muscis quibus capiendis retia sua pandit.

OFFICIN. NAT.

1. Aranei, 2. Tela Araneor. (Aranea dicta.

Vires.

1. Araneus febriles paroxysmos accere dicitur, (pulsibus metacarpi, temporibusve impositus,) peculiariter tamen ad quartanam commendatur, (putamine avellana inclusus, colloque suspensus vel lacerto appensus.

2. Tela, constringit, conglutinat ideoque vulneraria est, sanguinem cohibens, inflammationem præcavens. Ad arcendos febriles motus non solum externè, sed & (satis audacter) internè à nonnullis adhibetur.

PRÆPAR.

Oleum aracearum simplex & compositum fieri potest ex infusione, ut oleum scorpionum.

Vires. Ingreditur Emplastrum febrilo.

XCVI. Aselli.

Ovis, Gal. Ovis, Dioscor. τίξος, Plin. Procelliones millepedæ, multi-

pedes, Eselgen / Schäffelein.

Nascuntur in locis humidis, cellis, & similibus sub lapidibus vasisque repletis, ad tactum sese contrahunt ac rotundant.

Vires. Tenuium partium sunt, digerunt, extenuant, absterunt, aperiunt, Hinc utilitatis peculiaris sunt in mucilagine tariæ resolvenda, calculoque ad mucilaginem reducendo, in obstructionibus viscerum aperiendis, adeoque in morbo regio in dolore nephritico, difficultate urina, in colica, appetituque ob ventriculi mucilaginem imminuto, in asthma, &c.

Extrinsè commendatur pulvis ad affectus oculorum, ad aurium dolores & anginam (cum melle illitus.

Virus impositus phagedenam perimit.

Dosis à ℥j. ad ʒj. in pulvere cum vino vel ∇ aliqua nephritica.

PRÆPARATA.

Alii lavant in vino ac exiccant, iterumque lavant ac siccant, hinc pulverisant ac imbibunt in ∇ u ∇.

Dosis gut. iv. v. vi. exhibent.

Alii contundunt cum vino, colant & exhibent. Nonnulli macerant solum in vino, colantque.

N. 1. Non facile ℥j. transcendendo, nec usum continuo, nimia quippe resolvendi vi incommoda non parva inferre possunt.

N. 2. Ut locus natalis saxosus indicat, ad calculum asellos facere. Ita indicant aptitudine & propensione sese

contrahendi & ad convulsiones forsitan non essent inutiles.

XCVII. Bombyx.

Bombyx { Domesticus, hujus loci.
Sylvestris.

Βόμβυξ, Βομβύλις, Vermis lanificus, Albert. Magn. Seiden. Wurm.

Vermis est texturam sericeam texens, oriturque tum sponte, tum ex ovis.

N. Miramur subit metamorphosin. Ex ovibus pusillis producit animalculum Eruca non absimile. Eruca hac mororum, ulmi, educata foliis augefcit indies, donec tumiditate resplendeat: hinc indita Theca, textura se cingit sericea, usque dum moriatur. Postmodum reviviscit papilionis instar pennas producens, coitumque interveniente triduo, (è quo masculus statim moritur,) ova parit femina, quam plurima, ac desiccat.

OFFICIN. NAT.

1. Bombyces integri. 2. Sericum, i. e. textura bombycina. 3. Felliculi sericei.

Vires.

1. Bombyces exsiccati & pulverisati insperguntur vertici capitis, ad arcendam vertiginem & convulsionem.

2. Bombycina textura, est caliditate & frigiditate temperata, (al. cal. r.) sicca r. corroborat, spiritus vitales, animales & naturales reficit.

PRÆPAR.

Utitur quandoque, quo siccior reddita lævigetur, quandoque decoctis admiscetur. Verum præstat cru-

dam & solummodo incisam adhibere.

Sunt & usualia, quorum compositionem subit: ut Confect. Alkerm. Diamosch. &c.

N. Infertur & in usum Medicum Sericum filum Kermesinum, id est, Cocco seu granis Kermes tinctum adhibeturque sanguini sistendo, vulneribusque obligandis, exiccandis, consueudis. Quin & à Plebeis ad Erysipelas adhibetur (circumligatum).

3. Folliculi sericei, (Bombycia, Seiden. Bälglein/) iisdem viribus cum textura præditi sunt.

N. Caveatur à folliculis alvi spurcitie fœdatis, vel in quibus adhuc Necydalus latitat mortuus, & vermibus exesus.

Bombyx Sylvestris est genus quoddam Erucarum viridium, simili metamorphosi, ut de Bombyce domestico dixi, mutabilium.

N. Hujus generis videre mihi contigit apud Celsissimum Principem Philippum Hassia Landgravium doctrina multifaria, linguis exoticis, ut & Hebræa, Astronomicisque observationibus propriis celeberrimum, qui papilionem variegatum lepidum visu ex Eruca viridi in capsula productum monstravit.

XCVIII. Cantharides.

OFFICIN. NAT.

Musca Hispanica, hujus loci.
Formicaria latior, Gold. & Kaiser/Meißhanffen.

Uuuuuu 2

pro-

Can-
tharis
Gold-
würm-
lein.

prolixior } Cornuta, gehörnte
brevior } Gold-Räfer.
Amethystina violacea, Weich-
braun.
Miniata, Friesen-Würmle.
Viridis } longiuscula.
} aurum lucens.
Nigricans, Schwarz-Räfer.
Castanei coloris.
Rotunda, Ofter-Rälblein.

Dicitur *Scarabaeus*, i. e. parvus *Scarabaeus*.
Spanische Mücke oder Fliege/
Gold-Würmlein.

Producuntur ex genere quodam
Vermiculorum Erucis non absimili-
um, qui nascuntur ex humore, foliis fra-
xini, populi, ligustri, triticique inhaeren-
tes.

Præstantiores censentur, quæ in fru-
mento seu pratis inveniuntur, versico-
lores, & quæ luteas in alis transversas li-
neas habent, corpore oblongo, crassæ,
recentes.

Perimuntur aceti acerrimi vapore,
qui dum fervet, exhalat. Hinc siccantur
& servantur per biennium.

Vires. Calida sunt & sicco sat valida,
adeoque corrosiva seu vesicatoria, diure-
tica, emmenagoga. Hinc usus creber-
rimus in vesicatoriis. Internus earum usus
rarissimus est, quippe inter venena vulgò
recensentur: vesicae nimirum urinariae
adeo infensa sunt, ut vel extrinsecus cuti
alligata eam exulcerent. Sunt nihilo-
minus audaculi, qui diureticis eas ad-
mifcent. Sunt & improba scorta, qua-

factum tenellum iis perimunt & extur-
bant.

N. 1. Recentiores alas, pedes & capita,
refecant, solo corpore servato.

N. 2. Galenus alas & pedes exhibet pro
antidoto veneni proprii.

N. 3. Oleum Cantharidum & cantha-
rellorum elicitur per V, prodestque ad
calculum.

XCIX. Cicada.

Térlie, Heuschrecke.

Insectum est Gryllis simile, valde stridulum, rore vivens.

N. Unum hoc animal, ex iis quæ vi-
vunt, est sine ore. Pro eo enim quiddam a-
culeatum habet, & hoc in pectore, quo ro-
rum lambit. In Italia vulgaris notitia est,
nostratibus incognita.

OFFICIN. NAT.

Cicada siccata.

Vires. Vivunt cicadis sicci ad colicos
affectus (cum paribus numero piperis gra-
nis scilicet .ij. v. vij).

Alii affas edendas iis offerunt quibus
affecta vesica est: Cinis insigniter calcu-
lum conterit.

C. Cicindela.

Καμπυγίς, Plin. Καμπυγίς, πυρδραππίς,
Arist. Lampyris alata, Aldrovand. Can-
tharis noctiluca, Nitedula, Noctiluca,
Johannis-Fliege.

Insectum est pennatum, in tenebris
ignis modo lucens:

Officinis ignotum est, nisi quod
Cardanus vim anodynæ ei tribuere
videa-

1. *Formica*. 2. *Ova*. 3. *Acervus*.

Vires.

1. *Formica* calfac. & siccant, Venerem proritant. Odor acidus mirè spiritus vitales reficit. *Formicæ* majores (*Herculanæ*) pforam, lepram & lentiginem sanare dicuntur, (adjecto sale exiguo tritæ & illitæ.

2. *Ova* ad aurium gravitatem faciunt, malas hirsutas pueris infricata corrigunt.

3. *Acervus*, (*Myrmecium*) calf. & siccant, nervosum genus roborat. Hinc usus celebris in paralyfi, arthritide, hystericeis affectibus, cachexia & simil. (lotione adhibitus.

PRÆPARATA.

1. *Oleum* ex infusione formicarum (præstantalatæ) in ϕ comm. ϕ 40.

Vires. Valet ad coitum.

2. ∇ stillat. *Magnanimitatis dicta*, v. l. 2. c. 37.

3. *Liquor* fit in clybano ad modum quo liquor lumbricorum.

Vires. Insigne est ophthalmicum suffusionis oculor. auxilium.

CIV. *Gryllus*.

$\Gamma\epsilon\upsilon\mu\alpha$, Domesticus.
Acheta, Agrestis, arvensis.

Insectum est alatum è genere locustar. cicadis simile, focorum, terrarum, vè aridar. incola, stridulo suo cantu sedulum, German. *Heimichen* / *Heim* / linge

Vires. Commendatur ad diëresin, (cinnis exhibitus), ad visus imbecillitatem (succus expressus instillatus) consillas lenit, (affricatus.

CV. *Hirudo*.

$\text{B}\rho\iota\mu\alpha$, Major equina.
Sanguis, { subfusca.
fuga { Mi- { subviridis.
nor { nigra.
{ variegata.

Insectum est palustre, instar Lumbrici oblongum, generatur ex putredine, Germ. *Saug. Tigel*.

Majoribus præferuntur minores, utpotè quæ minus nocivæ, & ex his, quæ lineis in dorso distinctæ. Majores novem equum sugendo interimere valent, unde equinæ dictæ.

Usus. Sanguinis exuctioni inserviunt, adeoque cum cucurbitulis conveniunt.

N. Antequam applicentur, servanda sunt, in ∇ pura, ut probè purgentur, hinc loco applicationis sale nitri fricato, sanguineque vel argilla inuncto applicanda. Cum amoveri vis, insperge parum salis, aut cineris, aut lini combusti.

CVI. *Lacertus*.

$\Sigma\alpha\upsilon\gamma\alpha$, Lacertus, Lacerta, $\text{E}\phi\gamma\chi\alpha$ / $\text{U}\delta\epsilon\gamma$ / $\text{J}\epsilon\chi\tau\alpha\chi\varsigma$ / *Moll*.

Insectum est quoad figuram norum, colore varians, bufonibus ac araneis inimicum.

N. La.

N. Lacertus si dissectus fuerit, pars utraque movetur aliquamdiu, & si concurrerint, coalescunt rursus. Sunt qui oculos, si effossi sint, renasci ajunt, id quod & de cauda si amputetur, Plinius affirmat. Degunt in cavernis terra, rudibus murorum aliisque locis asperis, vescuntur Cicadis, Cochleis, Gryllis, Apibus.

Lacertus est { Terrestis, de quo hic & minus venenatus.
Aquatilis, qui venenosus habetur, & rarioris usus.

N. Commendatur præ reliquis genus lacerti viride & magnum, verum cum in hisce regionibus minus usitatum id sit, lacertum communem hic describimus.

Vires. Elicit è corporibus spicula, vitra, &c. (sectus, vel cum sale tusus & impositus, imprimis v. caput,) capillos renasci facit, (cum adipe illita caro, vel cinis applicatus.) Ictui scorpionum succurrit. Commendatur itidem ad herniam infantum, (si decocto lacerti lavetur,) ad facilem evulsionem dentium, (pulvis aquatici lac affricatus.

N. Sunt qui ajunt lacerti exsiccati pulverem gingivis illitum facere ut sine difficultate, sine dolore, atq; sine instrumento dentes extrahi queant.

PRÆPAR.

Oleum infusum.

Fit ex infusione Lacertorum vivorum N. vij. in ol. commun. lbjss.

Vires. Commendatur ad faciei rubedinem emendandam (illitum.

dinem emendandam (illitum.

CVII. Locusta.

Ἀγρίε, Dioscorid. κόρυς, πἀγρυς, Hetschreck.

Insectum est ex pernicio quam infert, (herbas scil. & segetes mordendo, terramque tactu & saliva adurendo, nulli fermè regioni incognitum. Generantur Æstate ineunte ex foetura anni superioris, savo non absimili, scil. exin oriuntur vermiculi, speciem ovigerentes, inclusi prætenui terra ceu membranula, qua disjecta emergunt locustæ & evolant.

Sunt porro variæ, videlicet: sunt magnæ, parvæ & minimæ, (pennis carentes,) sunt virides, flavæ, nigricantes, variæ, &c.

Vires. Odoris suffitu urina difficultates juvant, præsertim quæ fœminas male habent. Dioscorid. Sunt qui appensas collo quartanam sanare ajunt.

CVIII. Lumbrici terreni.

Ἰσὶς ἄντρεα, Dioscor. Vermes terreni, Melloes, Paracelsus, Regen-Wurm/ Erd-Wurm/ Pyren.

Insectum est vulgaris notitiæ ex terra, tum generatum, tum sustentatum.

Præstant reliquis ii, quorum colum rubris annulis seu cingulis cingitur.

Vires. Sunt insigniter diuretici, dia-

diaphoretici, anodynî; discutunt, emolliunt, obstructions referant, lac augent, vulnera, nervosque praeisofos glutinant.

Usus praecipui sunt in apoplexia, spasmo (ex signatura) aliisque affectibus nervor. ac musculor. in ictero, (utroque) hydropi, vermiculatione infantum, dolore colico. Inprimis autem specificè profunt in arthridite illa scorbutica, quam vagam appellant, (die lauffende Sicht/ die Wahren/) adhiberi possunt intus & extus.

Intus exhibentur vel toti conquassati, recenterque v. g. cum vino trajecti per linteum, vel siccati & pulverisati.

Extus applicantur vivi & mortui, vivi impositi, donec moriantur, profunt panaritio, mortui in cataplasmatibus ferè adhibentur. Odontalgia convenire dicitur cinis, (caviati dentium inditus.) Podagricos dolores leniunt (pulvis cum farina calidè impositus.

PRÆPAR.

1. Aqua, fit in MB.
Hydropicis maximè proficua est.

2. Oleum coctum, vide
Dispens.

N. Ex O hoc datur cum ∇ raphani. Ol. quod urinam & sudores potenter pellit.

3. Lignor, fit in clibano.
Nimirum :

Lumbrici loti & per stupam purgati, induntur vitro angusti orificii. Hinc obturatur vitrum, massaeque panis inclusum committitur, (ut & reliqua massa) clibano, donec cum panibus eximatur. Post liquor filtratur & servatur pro usu interno & externo.

Dosis à ʒij. ad ʒß.

4. Pulvis, fit ex lumbricis in furno exiccatis.

CIX. Lumbrici intestinum.

Ελμινθες, ερμύλλαι, Lumbrici seu Vermes intestinum, Würm/Spulwürm.

Generantur ex cruditate intestinum.

Vires. Sunt qui pulverisatos exhibent ad lumbricos expellendos.

CX. Musca.

Μύια, Arist. Δάτλη, Fliege.

Muscarum genera varia quidem sunt, usuale tamen solùm vulgare est.

OFFICIN.

Musca seu potius capita eorum.

Vires. Alopecii subveniunt.

PRÆPARATA.

1. ∇ stillatitia, fit per se, vel cum mel-
le.

Vires;

Vires. Præterquam quod capillorum proventum promouet, prædicatur quoque ad oculorum affectus, (instillata.)

CXI. Pediculus.

Παῖς, Σάπας, Pedunculus, Laus.
Variarum itidem est specierum. E. quib. hujus loci humanus ille vulgaris pediculus.

Vires. Devorantur à rusticis contra Ictherum, simili modo adhibiti ad Aero-phiam nonnullis probantur. Urinam cient foramini penis impressi, quippe prouocant expultricem ad mingendum.

CXII. Ricinus.

Κρότων, κυναγις, Reduvius, Holzkbock/ Hundesflö/ Hundswurm.

Animalculum est lividum & fœdum, bobus, suibus, capris, ovibus, atque canibus infestissimum.

Vires. Ricini canini sanguis, Plinio teste psilothrum est, & ignes sacros restringit; admirandus quoque est ad im-petigines contumaces & feras, accuratè difficiles, (illius.) Amat. Lusitan. cur. 20. cent. 7.

CXIII. Salamandra.

Σαλαμανδρα μόλγη, Molch/ Moll/ Dlm.

Animal est quadrupes ex lacerto-rum genere, nigrum, luteis maculis respersum, incola locorum frigidorum & humidorum, fonticulorum-que limpidorum admodum amans,

adeoque nonnullis in terrestrem & a-quaticam distribuitur.

N. Venenatum est animal, natum morsu lacteam spumam virulentam con-ferens.

Vires. Salamandra erodit, exulce-rat; incinerata medetur felicissimè scro-phulis exulceratis (cinis inspersus.

N. Caveat à fumo venenato.

CXIV. Scarabæus.

Cornutus Schröter/ hic usualis
Pilularius Rostkäfer/ etiam hic
Medicinalis.

Unctuosus, cantarellus, Rad-den/ Schmalzkäfer/ Mey-wurm/ nec hic idoneus.

major, Mävenkäfer/
Ruti- { Kreuzkäfer.
lus. { minor Brachkäferlein.
Bufonius viridis Krottentkäfer.
hic venenatus.

Pistrinarius, Meelkäfer.

Cadaverum, Mistkäferlein.

Scarabæus cornutus, (bicornis. Lu-canus, cervus, cervus volans, Scara-belaphus Carden. Græc. Κάραλ &.) Gignitur partim ex lignis aridis, maxi-mè quercus aut roboris, partim ex coi-tu. Reperitur Majo & Æstate in sil-vis.

OFFICIN. NAT.

Ipsi Scarabæi, & cornua.

Vires. Scarabæi commendantur ad dolores & contracturas nervorum (ex signatura, qua tacti immobiles & con-

Xxx xxx tra-

tracti redduntur) ad febrem quartanam
(amuleti loco impositi.)

Cornua suspensa de collo infantum urina-
nam cohibere dicuntur.

PRÆPARATA.

Ol. Ex infusion. Scarabei.

Vires. Dolorem aurium discutit,
(instillatum.)

Scarabæus pilularius, (pilularis,
Solaris, stercorum, Κοκκιων, Hippoc.
Pferd Käfer/Mist Käfer/) nomen id
habet, quod è fimo (maximè equino)
ingentes pilas pedibus volutet, in qui-
bus parvos vermiculos fœturæ semina
recondere dicitur.

Vires. Commendatur maximopere
in procidentia oculi & ani, (pulvis asper-
sus,) in hamorrodib. cæcis dolorificis le-
niendis,) decoctus scil. in oleo lini ad
consumptionem animalculi, & calidè
impositus cum bombace.

N. Pulveris conficiendi modus opti-
mus est.

Mortificati in vitro clauso ad Solem
benè exiccantur, & F. Pulvis. Hartm.
in Praët.

Scarabæus unctuosus (quod ma-
nib. impositus pingui subflavoque li-
quore inficiat,) Majo & Junio juxta
vias & passim in silvis obrepit.

Vires. Cantharidum naturam imi-
tatur, urinam pellit & sanguinem, canis
rabidi morsum egregiè expugnat, varos
dictos. i.e. Arthruidem vagam, Antho-
re Wiero, curat, (exhibitus pulvis vel
conditura.

Extrinsècus expetitur à quibusdam
ejus liquor ad vulnera. Additur &
Emplastris in bubone & carbunculo
pestilentiali (ex signatura desumpto
indicio) permiscetur & antidotis, sic-
que inde Oleum ex infus. anim. vivo-
rum in Ol. comm. quod loco olei
scorpionum nonnulli adhibent.

CXV. Scincus.

Σκινκ, Scincus Marinus, Offici-
nis.

Animal est aquaticum, squamis luteis
vestitum, cæsi à capite ad caudam de-
currente linea insignitum, herbis odo-
riferis victitans.

OFFICIN. NAT.

1. Integri exiccati. 2. (raro) pin-
guedo.

Vires. Alexipharmacus est Scincus,
Veneremque accendit.

Pinguedo, simili virtute pollet.

Dosis Drach. j. Matthiolus commen-
dat, Rostrum & pedes eosque cum vino
propinat, hinc & carnes laterum com-
mendat.

PRÆPARATA.

Ingreditur antidota & præcipuè
Theriacam Andr. & Antidor. Mat-
thioli.

CXVI. Scorpio.

Σκorpion, Scorpium, Scorpion.

Animal est forma caneros æmulans
iis tamen minus.

Vires. Urinam ciens, calculoremum
ant

aut vesica impeditam, (vivi incinerati & exhibiti.)

Itibus propriis subveniunt, (triti & impositi.)

PRÆPARATA.

1. *Oleum Scorpion. simplex* ex infusione Scorpion. in Ol. Amygd. amar. vid. August.

N. Sunt qui propinant in colicis & calculosis doloribus.

2. *Ol. Scorpion. compos. Mes.* quod recipit insuper Aristoloch. Gentian. Cyper. & rad. capp. vid. August.

Vires. Usitatissimus est in Renum doloribus, urinaque obstructa (illinitur dorso vel pubi) medetur itibus venenatorum animalium, febrium paroxysmos arceat, (pulsibus vel dorso inunctum) aurium dolores mulcet.

3. *Ol. Scorpionum magnum, Matthiol.* vid. August.

Vires. Majorum est virium quam precedentia, Ususque eximis in morbis contagiosis præservandis & curandis, in venenatis moribus & simil. (inunctum cordi, arteriisque temporum, manuum, pedum,) dolores demulcet colicos & uteri, &c.

4. *Ol. Scorpionum sanguineum.*

R. Sem. hyperic. Unc. vi. infunde in vino malvat. per ♂ (3.) tum adde Terbinth. venet. Unc. iij. Ol. centum annor. (i. e. vetustiss.) Unc. vi. Croci

opt. Drach. j. Flor. hyperic. M. iv.

Omnia tumultentur in arena in boccia bene clausa per triduum: deinde liquor in aliam bocciam fortiter exprimatur, liquor per inclinationem decantetur, usque ad apparitionem olei. Oleo apparente vas elevabis, in eo videbis ol. rubrum sanguinis instar. In hoc oleo reponantur pro unaquaque libra scorpiones N. L. in MB. eousque relinquuntur, donec fiat perfecta fermentatio. Hinc per pannum exprimantur omnia, oleumque reservandum.

Vires. Summè nephriticos dolores lenit, extrinsecus applicatum.

N. Hoc est illud oleum nephrit. sanguineum magni Ducis, quod Pona describit, sed dosin non addit.

Ex communic. Dn. D. loh. Kieseri.

CXVII. Terebo.

Terebo, Holstwurum.

OFFICIN. NAT.

Caries, seu farina Terebinum.

Vires. Exiccat, unde ulceribus humidis & fluidis feliciter inspergitur, & hoc eodem titulo mulierculis nostratibus admodum familiaris est in excoriationibus Infantum exiccandis.

Xxxxxx 2

Et

Et hæc sunt quæ de Animalibus Medicamentosis
adducere compendii lex permisit, adeoque Pharmaco-
pœjam nostram Medico-Chymicam divino auxilio ad
finem perduximus : Huic sit Laus, Honor & Gloria,
in sempiterna Sæcula Sæculorum,

A M E N.



INDEX

C. 1. P
3. Res Med
4. Rerum M
1. Mo
2. Pitt
3. Ca
4. Ext
5. Salin
6. Infl
7. Prop
8. 4. Mater
9. 5. Temp
10. 6. Locu
11. Rerum pr
12. 2. Princ
13. 3. Effic
14. Extern
15. p
16. Facult
17. Instru
18. Formac
19. 4. Mater
20. 5. Temp

INDEX CAPITUM.

LIB. I.

DE

ISAGOGE.

- C. 1. **P**armacopœjæ Definitio ac distributio.
2. *Objectum.* Res Medicamentales nativæ.
3. Res Medicamentales præparatæ.
4. *Rerum Nativarum producendarum*
1. Modi.
5. 2. Principia Essentialia.
6. 3. Causa efficiens interna.
7. Extern. Qualitates primæ.
8. Salinæ Facultates.
9. Influentiæ stellarum.
10. Proprietates particulares.
11. 4. Materia.
12. 5. Tempus.
13. 6. Locus.
14. *Rerum præparandarum.* 1. Modi.
15. 2. Principia Chymica.
16. 3. Efficiens interna.
17. Extern. Qualitates primæ & præcipuè Calor.
18. Facult. Salinæ.
19. Instrumenta
20. Fornaces.
21. 4. Materia.
22. 5. Tempus
23. *Rer. colligendarum.* 1. Tempus intern.
24. Extern. Universalius secundum Qualitates primas.
25. Particularius secundum influentias.
26. 2. Modus.
27. *Rer. asservandarum* 1. Tempus.
28. 2. Locus.
29. 3. Adaptatio.
30. *Rerum Usurpandarum.* 1. Vires.
31. 2. Modus utendi.
32. 3. Formulæ.
33. 4. Dosis.
34. *Rer. Dignoscendarum* Signa: Inherentes Qualitates Sensiles & Figura.
35. Etas, Duratio & Sexus.
36. Antecedent.
37. Consequent.
38. Similitudo.
39. Investigatio; qualitatum manifestarum.
40. Occultarum.

LIB. II.

De

OFFICINA.

Xxxxxx 3

1. Of.

INDEX CAPITVM.

1. Officinæ definitio ac distributio.
2. *Simplicia. 1. Mineral. Terra.*
3. Aquæ
4. Lapides
5. Metalla
6. Salia
7. Sulphurea
8. 2. *Vegetab. Aromata*
9. Cortices
10. Flores
11. Folia s. Herbæ
12. Fructus
13. Fungi
14. Ligna & visca
15. Radices
16. Semina
17. Succi
18. Olea & Balsama
19. Resinæ
20. Gummi Resinæ
21. Gummi
22. 3. *Animal. integra.*
23. Partes carnosæ
24. Membranosæ
25. Cornua
26. Ossa
27. Crustacea s. Testacea
28. Lapilli
29. Lac & Serum
30. Fella
31. Medullæ
32. Pinguedines
33. Sanguis
34. Seva
35. Stercora & Urinæ
36. Ungues Ungule & Coagula
37. *Preparat. Aceta*
38. Aquæ destill.
39. Aq. mixtæ
40. Balsami odoriferi
41. Stillatitii
42. Boli
43. Calces
44. Cataplasmata
45. Clysteres
46. Condita
47. Confectiones
48. Conservæ
49. Decocta
50. Eclechma. Loch. Linctus
51. Electuaria
52. Elixiria
53. Emplastra
54. Emulsiones
55. Errhina
56. Epithemata
57. Extracta
58. Farinæ
59. Feculæ
60. Flores
61. Gargarismi. Diaclysmi Dentiffricia
62. Gelatinæ
63. Infusiones. Vina medicata
Clareta.
64. Julebi. Moreti
65. Lapides
66. Liquores
67. Magisteria
68. Masticatoria
69. Morfelli. Rotulæ
70. Olea stillatitia
71. Expressa.
72. Insolata, cocta, &c.

INDEX CAPITVM.

73. Pilulæ
74. Potiones
75. Poma Ambraë
76. Præparata
77. Pulveris species
78. Sacculi
79. Salia
80. Saponēs
81. Spiritus
82. Succi
83. Suppositoria, Pess.
84. Syrupi, Mella, Rob.
85. Tincturæ
86. Trochisci
87. Balsami inunctorii, Linimenta
Unguentia.

LIB. III.

De

MINERALOGIA.

1. Mineralogia
2. Terræ
3. Aquæ
4. Lapides in genere
5. Pretiosi. Gemmæ
6. Corallia
7. Margaritæ
8. Minus pretiosi
9. Metalla. 1. Aurum
10. Argentum
11. Ferrum
12. Cuprum
13. Plumbum
14. Stannum
15. Metallis finitima. Mercurius
16. Cinnabris

17. Antimonium
18. Metall. recrementa naturalia.
19. Artificialia
20. Salia in genere
21. Commune
22. Gemmæ & Sal cum, Indum.
23. Nitrum
24. Alumen
25. Ammoniacum
26. Vitriolum
27. Sulphurea: Arsenicum
28. Sulphur
29. Bitumen ac Ambra grysea,
30. Succinum
31. Sperma Ceti
32. Asphaltus, Naphtha, Petrolæum,
Ol. Terræ.
33. Carbo petræ & Gagates.

LIB. IV.

De

PHYTOLOGIA.

*Classis 1. de Alterantibus
primariis.*

1. Abies
2. Arorantum
3. Absynth. Vulg.
4. Pontic.
5. Acacia vera
6. Germanic.
7. Acerofa
8. Acetofella
9. Acorus verus
10. adulterinus
11. Adiantum
12. aureum

13. Agallo-

INDEX CAPITVM.

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 13. Agallochum | 49. Bardana major |
| 14. Ageratum | 50. minor |
| 15. Agnus castus | 51. Basilicum |
| 16. Agrimonia | 52. Behen album: rubrum |
| 17. Alchimilla | 53. Bellis |
| 18. Alkekengi | 54. Berberis |
| 19. Allium | 55. Beta |
| 20. Alſine | 56. Betonica |
| 21. Althæa | 57. Betula |
| 22. Amaranthus | 58. Bistorta |
| 23. Ammi | 59. Bombax |
| 24. Amomum | 60. Borrage |
| 25. Amygdalæ | 61. Branca ursina |
| 26. Anacardium | 62. Brassica |
| 27. Anagallis terreſtris | 63. Bugloſſa |
| 28. aquatica | 64. Buſſa paſtoris |
| 29. Anethum | 65. Buxus |
| 30. Angelica | 66. Calamus aromaticus |
| 31. Aniſum | 67. Calamintha |
| 32. Anſerina | 68. Calcatrippa |
| 33. Anthora | 69. Caltha |
| 34. Antirrhinum | 70. Cannabis |
| 35. Apium | 71. Cappares |
| 36. Aquilegia | 72. Caprifolium |
| 37. Ariſtologia longa & rot. | 73. Cardamomum |
| 38. Armoracia | 74. Cardiaca |
| 39. Arnica | 75. Carduus benedictus |
| 40. Artemiſia | 76. Carduus Mariæ |
| 41. Arum | 77. Carlina |
| 42. Aſpargus | 78. Carum |
| 43. Atriplex | 79. Caryophyllus hortenf. |
| 44. Avena | 80. Caryophilli |
| 45. Aurantia malus | 81. Caryophyllata |
| 46. Auricula muris | 82. Caſtanea |
| B. | 83. Centaurium minus |
| 47. Balani myreſpicæ | 84. Cepa |
| 48. Baſſamus | 85. Ceraſa |

INDEX CAPITVM.

86. Cærefolium
 87. Chamædrys
 88. Chamæpitys
 89. Chamomilla
 90. Chelidonium majus,
 91. minus
 92. Chermes
 93. Cheiri
 94. China
 95. Cicer
 96. Chichorem
 97. Cicuta
 98. Cinamomum
 99. Citrus
 100. Citrullus
 101. Cochlearia
 102. Columbrinum lignum
 103. Contrayerva
 104. Consolidamedia
 105. Corallina
 106. Coriandrum
 107. Cornus
 108. Corylus
 109. Costus
 110. Crocus
 111. Cucubæ
 112. Cucumer
 113. Cucurbita
 114. Cuminum
 115. Cupressus arbor
 116. Cupressus herbi
 117. Curcuma
 118. Cuscuta
 119. Cyanus
 120. Cyclamen
 121. Cynoglossa
 122. Cynosbatus

123. Cyperus
 124. Cydonia malus
 125. Daucus
 126. Dictamen creticus
 127. Dipsacus
 128. Doronicum
 129. Ebenus
 130. Ebulus
 131. Endivia
 132. Epatica nobilis
 133. Epatica stellata
 134. Equisetum
 135. Eruca
 136. Eringium
 137. Erysimum
 138. Eupatorium
 139. Eufragia
 140. Faba
 141. Fabaria
 142. Ficus
 143. Filipendula
 144. Filix
 145. Foeniculum
 146. Fœnum græcum
 147. Fragraria
 148. Fraxinus
 149. Fraxinella
 150. Fumaria
 151. Fumaria bulbosa
 152. Galanga
 153. Galega
 154. Gallium
 155. Genista
 156. Gentiana
 157. Geranium
 158. Glycyrrhiza
 159. Gramen

Yyy yyy

160. Gra-

INDEX CAPITVM.

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 160. Granata | 198. Malabathrum |
| 161. Guajacum | 199. Malva |
| 162. Hederaterrest. | 200. Malva arborea |
| 163. arborea | 201. Mandragoras |
| 164. Helenium | 202. Marrubium |
| 165. Herniaria | 203. Marum |
| 166. Hispidula | 204. Matricaria |
| 167. Hordeum | 205. Matrifylva |
| 168. Horminum | 206. Melilotus |
| 169. Hyoscyamus | 207. Melissa |
| 170. Hypericum | 208. Melo |
| 171. Hissopus | 209. Mentha |
| 172. Jacea | 210. M. Sarracenica |
| 173. Jasminum | 211. Mercurialis |
| 174. Imperatoria | 212. Mespilus |
| 175. Iris nostras | 213. Meum |
| 176. Florent. Illyric. | 214. Milium |
| 177. Juglans | 215. Milium Solis |
| 178. Jujuba | 216. Millefolium |
| 179. Juniperus | 217. Momordica |
| 180. Lactuca | 218. Morus |
| 181. Lagopus | 219. Moschata |
| 182. Lapathum | 220. Muscus |
| 183. Larix | 221. Muscus terrestris |
| 184. Laurus | 222. Myrtillus |
| 185. Lens palustris | 223. Myrthus |
| 186. Lentiscus | 224. Napus |
| 187. Levisticum | 225. Nasturtium aquaticum |
| 188. Lichen. | 226. hortense |
| 189. Ligustrum | 227. Nepeta |
| 190. Lilium | 228. Nephriticum lignum |
| 191. Lilium convallium | 229. Nicotiana |
| 192. Limonium | 230. Nigella |
| 193. Linaria | 231. Nummularia |
| 194. Linum | 232. Nymphæa |
| 195. Lotus | 233. Olea |
| 196. Lupulus | 234. Ononis |
| 197. Moiorana | |

INDEX CAPITVM.

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 235. Origanum | 272. Pyrus |
| 236. Palma | 273. Quercus |
| 237. Papaver sativum | 274. Quinquefolium |
| 238. erraticum | 275. Raphanus |
| 239. Parietaria | 276. marinus |
| 240. Paris herba | 277. Rapum |
| 241. Pastinaca | 278. Rhodia radix |
| 242. sylvestris | 279. lignum |
| 243. Perfol. | 280. Rhaponticum vulgare |
| 244. Persica malus | 281. verum |
| 245. Persicaria | 282. Rhus |
| 246. Petasites | 283. Ribes |
| 247. Petroselinum | 284. Rosa |
| 248. Montanum | 285. Rorella |
| 249. Macedonicum | 286. Rosmarinus |
| 250. Peucedanum | 287. Rubia |
| 251. Pimpinella | 288. Rubus |
| 252. Pinastr. | 289. Idæus |
| 253. Pinus | 290. Ruscus |
| 254. Piper | 291. Ruta hortensis |
| 255. Pistacia | 292. Muraria |
| 256. Plantago | 293. Sabina |
| 257. Pæonia | 294. Salix |
| 258. Polygonum | 295. Salvia |
| 259. Polygonatum | 296. Sambucus |
| 260. Pomus | 297. Sanguisorba |
| 261. Populus | 298. Sanicula |
| 262. Porram | 299. Santalum |
| 263. Portulaca | 300. Santonicum |
| 264. Primula veris | 301. Saponaria |
| 265. Prunella | 302. Sarsa parilla |
| 266. Prunus | 303. Sassafras |
| 267. Ptarmica | 304. Satureia |
| 268. Pulegium | 305. Satyrium |
| 269. Pulmonaria | 306. Saxifragia |
| 270. Pyrethrum | 307. Scabiosa |
| 271. Pyrola | 308. Schoenanthum |

Yyy yyy 2 309. Sco-

INDEX CAPITVM.

- 309. Scolopendrium verum,
- 310. Vulgare
- 311. Scordium
- 312. Scorzonera
- 313. Scrophularia
- 314. Seylla
- 315. Sebesten
- 316. Secale
- 317. Sedum
- 318. Senecium
- 319. Serpillum
- 320. Sesamum
- 321. Sefeli massiliot.
- 322. Officinarum
- 323. creticum
- 324. Sideritis
- 325. Siliqua
- 326. Sinapi
- 327. Sisarum
- 328. Solanum
- 328. Sorbus
- 329. Spica
- 330. Celtica
- 331. Indica
- 332. Spinachia
- 333. Staphisagria
- 334. Stoechas araba
- 335. citrina
- 336. Succisa
- 337. Symphytum
- 338. Tamariscus
- 339. Tanacetum
- 340. Taraxacum
- 341. Thlaspi
- 342. Teucrium
- 343. Thymus
- 344. Thymiania

- 345. Tilla
- 346. Tormentilla
- 347. Trichomanes
- 348. Trifolium
- 349. Triticum
- 350. Tussilago
- 351. Valeriana
- 352. Verbascum
- 353. Verbena
- 354. Vermicularis
- 355. Veronica
- 356. Victorialis
- 357. Vinca pervinca
- 358. Vincetoxium
- 359. Viola purpurea
- 360. Vitis
- 361. Virga aurea
- 362. aurea consolida
- 363. Ulmaria
- 364. Urtica
- 365. mortua
- 366. Zedoaria
- 367. Zinziber.

Classis secunda de Alterationibus secundariis.

- 368. Acetum
- 369. Gummi Ammoniacum
- 370. Anime
- 371. Arabicum
- 372. Asa fœtida
- 373. Balsamum verum
- 374. de Tolu
- 375. Indicum
- 376. Bdellium
- 377. Benzoin
- 378. Camphora

379. Gan-

379. Canca
380. Ca
381. Colop
382. Copal
383. Elemi
384. Fulig
385. Galba
386. Hypoc
387. Lacca
388. Ladan
389. Liquid
390. Lycini
391. Maltic
392. Myrrh
393. Omph
394. Opium
395. Opopa
396. Pissalp
397. Pix
398. Resin
399.
400. Saccha
401. Sagape
402. Sanguis
403. Sarcoc
404. Succol
405. Storax
406. Storax
407. Tacam
408. Tamaru
409. Thus
410. Tragac
411. Tubera
412. Vinum

Classis

INDEX CAPITVM.

- 379. Cancanum
- 380. Caranna
- 381. Colophonía
- 382. Copal
- 383. Elemi
- 384. Fuligo
- 385. Galbanum
- 386. Hypocystis
- 387. Lacca
- 388. Ladanum
- 389. Liquid.ambra
- 390. Lycinum
- 391. Mastiche
- 392. Myrrha
- 393. Omphacium
- 394. Opium
- 395. Opopanax
- 396. Pissaspalkos
- 397. Pix
- 398. Resina Terebinthina
- 399. Vulgaris í. Laticis
- 400. Saccharum
- 401. Sagapenum
- 402. Sanguis Draconis
- 403. Sarcocolla
- 404. Succolata
- 405. Storax calamita
- 406. Storax liquidus
- 407. Tacamahaca
- 408. Tartarus
- 409. Thus
- 410. Tragacantha
- 411. Tubera cervina
- 412. Vinum

Classis 3. de Purgantibus primariis.

- 412. Agaricus
- 413. Asarum
- 414. Bryonia
- 415. Carthamus
- 416. Cassia
- 417. Catapucia minor
- 418. Colocynthis
- 419. Ebulus
- 420. Elleborus niger
- 421. Elleborus albus
- 422. Epithymum
- 423. Esula
- 424. Frangula
- 425. Gratiola
- 426. Hermodactylus
- 427. Jalapa
- 428. Mechoacanna
- 429. Mezereum
- 430. Myrobalani
- 431. Polypodium
- 432. Pylidium
- 433. Rhabarbarum
- 434. Ricinus
- 335. Ricinus Americus
- 436. Senna
- 437. Staphisagria
- 438. Soldanella
- 439. Spina infectoria
- 440. Turpethum
- 441. Tamarindi

Classis 4. de Purgantibus secundariis.

- 442. Aloe
- 443. Elaterium
- 444. Euphorbium
- 445. Ghitta Iemou
- Yyyyyy 3
- 446. Man-

INDEX CAPITVM.

- 446. Manna
- 447. Opoponax
- 448. Scammonium

LIB. V.

1. *Classis de Animalibus perfectioribus.*

- 1. Agnus
- 2. Alce
- 3. Aper
- 4. Asinus
- 5. Bos. Taurus. Vacca
- 6. Bubalus
- 7. Bufo
- 8. Canis
- 9. Caper
- 10. Capra alpina
- 11. Capra. Cerva Orient.
Occident.
- 12.
- 13. Capreolus
- 14. Castor
- 15. Catus
- 16. Catus Zibetinus
- 17. Cervus
- 18. Cochlea
- 19. Cuniculus
- 20. Elephantus
- 21. Equus
- 22. Erinaceus
- 23. Homo
- 24. Lepus
- 25. Lupus
- 26. Lynx
- 27. Moschius
- 28. Mulus
- 29. Mus, Musaraneus: alpinus maj.
- 30. Ovis

- 31. Ranunculus viridis
- 32. Rhinoceros
- 33. Serpens
- 34. Sus
- 35. Talpa
- 36. Taxus
- 37. Vipera
- 38. Vitulus
- 39. Unicornu
- 40. Ursus
- 41. Vulpes

2. *Classis de Avibus.*

- 42. Accipiter
- 43. Alauda
- 44. Alcedo
- 45. Anas
- 46. Anser
- 47. Ardea
- 48. Ciconia
- 49. Columba
- 50. Cornix
- 51. Corvus
- 52. Coturnix
- 53. Cuculus
- 54. Ficedula
- 55. Gallus
- 56. Grus
- 57. Hirundo
- 58. Mylvus
- 59. Motacilla
- 60. Noctua
- 61. Olor
- 62. Palumbus
- 63. Parus
- 64. Passer. Passer trogloties
- 65. Pavo
- 66. Perdix

67. Pi-

67. Pica
68. Struthio
69. Turtur
70. Upupa
71. Vultur

3. *Classis de
Piscibus.*
72. Anguilla
73. Barbo
74. Blatta Bi
75. Cancer
76. Carpio
77. Cetus &
78. Concha
79. Dentalium
80. Halec
81. Huso
82. Lucius
83. Mater Pe
84. Mustela
85. Ostrea
86. Perca
87. Rana
88. Sepia
89. Sturio
90. Testudo
91. Tymallus
92. Tinca
93. Trutta

INDEX CAPITVM.

- 67. Pica
- 68. Struthio
- 69. Turtur
- 70. Upupa
- 71. Vultur

3. Classis de Piscibus.

- 72. Anguilla
- 73. Barbo
- 74. Blatta Bizantia
- 75. Cancer
- 76. Carpio
- 77. Cetus & Manati
- 78. Concha
- 79. Dentalium, Entalium
- 80. Halec
- 81. Huso
- 82. Lucius
- 83. Mater Perlarum
- 84. Mustela
- 85. Ostrea
- 86. Perca
- 87. Rana
- 88. Sepia
- 89. Sturio
- 90. Testudo
- 91. Tymallus
- 92. Tinca
- 93. Trutta

4. Classis de Insectis.

- 94. Apis
- 95. Araneus
- 96. Afelli
- 97. Bombyx
- 98. Cantharides
- 99. Cicada
- 100. Cicindula
- 101. Cimex
- 102. Eruca
- 103. Formica
- 104. Cryllus
- 105. Hirundo
- 106. Lacertus
- 107. Locusta
- 108. Lumbrici terr.
- 109. Intestinatorum
- 110. Musca.
- 111. Pediculus
- 112. Ricinus
- 113. Salamandra
- 114. Scarabæus sc. Pilularis Unctuosus.
- 115. Sericum
- 116. Scorpio
- 117. Teredo

Deutsche



Teutsche Register

Der Mineralien / Kräuter und Thier / darinn
 die erste Zahl das Buch / die ander das
 Blatt zeigt.



A	Al	f. 325	Angelickwurz	4.	16
	Alraup	f. 330	Angurin	4.	49.
	Abbiß Teufels Abbiß		Anis	4.	71
		4. 163	S. Anthoni Kraut	4.	131
	Ackerminck	4. 33	Apfelbaum	4.	128
Ackertwurz		4. 8	Apostem Kraut	4.	151
Alderminig		4. 10	Arabisch Gummi	4.	384
Alder		f. 342	Armenierstein	3.	346
Alderstein		3. 345	wolriechend Asand	4.	187
Algeley		4. 19	Asche (Fisch)	f.	333
Algermenig		4. 10	Aspen	4.	129
Algaster		f. 323	Asurblau	3.	352
Algest		4. 201	Atter / Otter	f.	309
Algstein		3. 510	Attich	4.	64. 235
Alabasterstein		3. 345	Azel	f.	323
Alantwurz		4. 80	Augentrost	4.	67
Alaun		3. 478	Wildurin	4.	425
Albkraut		4. 67		B.	
Albschoß		3. 353	Bachbung	4.	15
Alloe		4. 251	Bachstein	3.	356
Alraun		4. 98	Bachstelke	f.	321
Ambar		3. 509	Baldrian	4.	169
Almeiß		f. 341	Balsam	4.	101. 185. 186
Ammeisensamen		4. 13	Costen Balsam	4.	101
Gummi Ammoniac.		3. 182	Leber Balsam	4.	10
Wilder Ampfer		4. 90	Balsam Zippfel	4.	105
Andorn / weisser Andorn		4. 99	Balsam Zippfel	4.	105
Anot		f. 314			Wär

Teutsche Register.

Bär	5.	312	Bienbark	4.	337
Barbe/ Barine	5.	325	Bienfaug	4.	100
Bärwurk	4.	103	Bilsen	4.	82
Basillen	4.	26	Binetsch	4.	162
Bathengel	4.	42	Bingelfraut	4.	102
Groß Bathengel	4.	166	Birchbaum	4.	28
Wasser Bathenig	4.	153	Birnbaum	4.	134
Barack/ Borch	5.	307	Birntwein	4.	134
Baumöl	4.	115	Bisamthier	5.	301
Baumtoll	4.	29	Bisam	5.	302
Baurenseuff	4.	166	Bismünz	4.	162
Baurrosen	4.	98	Boborellen	4.	11
Beerenklau	4.	30	Bochspeterlein	4.	124
Beerlap	4.	108	Bonen	4.	68
Johanns Beerlein	4.	139	Blackfisch/ Blackfüttel	5.	333
Beerwurk	4.	30.103	Blasenstein	3.	348
Beyfuß	4.	20	Blattwurk	4.	167
Beinbruch	3.	355	Bley	3.	389
Beinholz	4.	93	Blindschleich	5.	310
Beintwell	3.355. 4.	163	Blutkraut	4.	128
Indianisch Beintwell	4.	111	Blutstein	3.	351
Benedictwurk/ Bened. Kraut	4.	39	Bockentwurk	4.	45
Benigrosen	4.	127	Bocksdorn	4.	224
Bergblau	3.	346	Bockshorn	4.	70
Bernstein	3.	510	Borretsch	4.	29
Bersich	5.	311	Brackendistel	4.	66
Bertram	4.	134	Brackenhaupt	4.	18
Bettlersläuse	4.	25	Brandlattich	4.	169
Betonien	4.	28	Brandschlag	5.	309
Weiß Betonien	4.	130	Brauntwurk	4.	154
Unser Frauen Bettestroh	4.	74	Brennkraut	4.	170
Bette Wangen	5.	341	Bromen/ Brombeer	4.	142
Bezoarstein	5.	277.278	Bruchstein	3.	355
Bibernel	4.	124	Bruchwurk	4.	10.121
Welsch Bibernel	4.	147	Brunellen	4.	131
Biberthier	5.	279	Brunnenkraut	4.	92
Bienen	5.	334	Brunnenkres	4.	10

333 333

Brust

Teutsche Register.

Brustbeerlein	4.	87. 155	Erythra	3.	349
Bubenkraut	4.	90	Eubeben	4.	55
Buchampffer v. Saurklee.			Eucumern	4.	56
Buchsbaum	4.	32			
Büffel	5.	272	D.		
Burzel/ Borzel	4.	130	Dachs	5.	308
Bymstein	3.	355	Dattelbaum	4.	116
			Datteln	4.	117
			Daube	5.	316
C.			Holzdaube	5.	322
Calament	4.	33	Daubenkraut	4.	171
Calmus	4.	8	Daubentropff/ Daubenkörbel	4.	72
Wolriechend Calmus	4.	32	Dengraß	4.	128
Camelshäw/ Camelstroh	4.	152	Dill.	4.	15
Canel	4.	47	BärenDill	4.	103
Cappern	4.	34	Wilder Dill		ibid.
Teutsch Cappern	4.	75	Weisser gemeiner Diptam	4.	72
Cardamomlein	4.	35	Cretisch Diptam	4.	62
Cardobenedict.	4.	36	Gefegnete Distel	4.	36
Carneol	3.	331	Radon Distel	4.	66
Cassien	4.	232	Vih-Distel	4.	37
Castanien	4.	39	Dollkraut	4.	82
Chamillen	4.	43	Donnerbart	4.	156
Chrysolith	3.	327	Donnerkraut/ Donnerbonnen	4.	69
Cypres (Kraut)	4.	57	DonnerReb	4.	79
Cypressbaum		ibid.	Dorant	4.	18
Citronenbaum	4.	48	Dosten	4.	116
Citrull/ Angurien	4.	49	WasserDosten	4.	67
Colmarkraut	4.	15	Drachenbl.	4.	215
Coloquint	4.	234	Drateln	1.	4
Corallen	3.	332	Dreysaltigkeitblum	4.	84
Corallenmoos	4.	51	Durchwachs	4.	121
Coriander		ibid.			
SchwarzCoriander	4.	113	E.		
Cornerbaum	4.	52	Ebenholz	4.	64
Costwurk	4.	53	Eber	5.	368. 307
Creukdorn	4.	249	Ebertwurk	4.	37
Creukläser	5.	345	Egelkraut	4.	114
Creukwurk	4.	156	Egester	5.	323
					Egochs

Teutsche Register.

Egock	5.	342	Eselgen	5.	338
Ehrenpreis	4.	172	Essig	4.	180
Ebisch	4.	12	NachtEule	5.	312
Eichbaum	4.	135	Eytersälbichen	2.	310
Einbeer	4.	119	S.		
Einhorn	5.	311			
Begraben Einhorn	3.	359	Fahrn / Fahrnkraut	4.	70
Eisen	3.	377	Faseln	4.	68
Eisenhart / Eisenfr. Eisenreich	4.	171	Faulbaum	4.	241
Eisvogel / Eisengart	5.	314	Feberkraut	4.	99
Elend	5.	267	Federtweiß	3.	346
Elephant	5.	285	Feigbonen	4.	68
Elephanten Laus	4.	14	Feigenbaum	4.	69
Endivien	4.	64	Feigwartwurk	4.	44
Endt	5.	314	Groß Feigwartwurk	4.	154
Engelsüß	4.	245	Feldhun	5.	323
Enkian	4.	75	Feldmagsam	4.	118
Ephew	4.	80	Fenchel	4.	70
Eppich	4.	80	Bären Fenchel	4.	103
Berg Eppich	4.	123	Sau Fenchel	4.	123
Garten Eppich	4.	122	Fönugræc	4.	70
Stein Eppich	4.	123	Ferberbaum	4.	138
Wasser Epich	4.	18	Ferberöthe / Ferbertwurk	4.	142
Erd	3.	316	Feuerstein	3.	356
Volus Erd / Sigill Erd	3.	317	Fichtenbaum	4.	3. 125
Erdapffel	4.	59	Filskraut	4.	58
Erdbeerkraut	4.	71	Truckner Fûrnis	4.	88
Erd Epheu	4.	79	Fischleim	5.	329
Erdgall	4.	40	Flachs	4.	95
Erdkraut	4.	73	Wilder Flachs		ibid.
Erdrauch	4.	72	Flachs Dotter	4.	157
Erndrosen	4.	98	Fleckenkraut	4.	74
Erdwachs	4.	208	Fliege	5.	344
Erdwurm	5.	343	Johannis Fliege	5.	340
Eschern / Eschbaum	4.	71	Spanische Fliege	5.	340
Eschertwurk	4.	72	Flöbkrant	4.	122. 133
Esel	5.	269	Floramor	4.	13
			Flusspulver	2.	269

~~~~~ u Flus

# Teutsche Register.

|                               |    |         |                                |    |         |
|-------------------------------|----|---------|--------------------------------|----|---------|
| Flußsteine                    | 5. | 356     | Gensel                         | 4. | 130     |
| Flußwasser                    | 2. | 137     | Genserich                      | 4. | 17      |
| Fore / Forelle                | 5. | 334     | Gulden Genserich / i. e. Sinaw |    |         |
| Forenholz                     | 4. | 125     | Gensl / Fenster                | 4. | 74      |
| Frankosenholz                 | 4. | 78      | Gentar                         | 3. | 510     |
| Fraundistel                   | 4. | 37      | Gertwurz v. Stadtwurz          |    |         |
| Frauenhaar                    | 4. | 8       | Gerste                         | 4. | 82      |
| Frauenmünz                    | 4. | 102     | Gichtkraut                     | 4. | 76      |
| Freiamkraut                   | 4. | 84      | Gichtrosen                     | 4. | 127     |
| Frisenwürmle                  | 5. | 340     | Gichtheil                      | 4. | 18      |
| Frischling                    | 5. | 268     | Giftwurz                       | 4. | 50      |
| Frosch                        | 5. | 331     | Gilgen                         | 4. | 93      |
| Froschleich                   | 5. | 332     | Blau Gilgen                    | 4. | 85      |
| Fuchs                         | 5. | 135     | Wasser Gilgen                  | 4. | 114     |
| Fünffblatt / Fünfffingerkraut | 4. | 135     | Gierlin / Görilin              | 4. | 159     |
| G.                            |    |         | Gietwurz / v. Stadtw.          |    |         |
| Galgan                        | 4. | 73      | Glasakraut                     | 4. | 119     |
| Wilder Galgan                 | 4. | 60      | Glet                           | 3. | 459     |
| Galmenstein                   | 3. | 348     | Gliedkraut                     | 4. | 158     |
| Galrey                        | 1. | 9       | Gold                           | 3. | 361     |
| Gamanderlein                  | 4. | 42      | Goldwürmlein                   | 4. | 340     |
| Gans                          | 5. | 314     | Goldwurz                       | 4. | 43      |
| Gansblümlein                  | 4. | 26      | Gottheil                       | 4. | 131     |
| Ganskraut                     | 4. | 74      | Gottes Gnad                    | 4. | 76      |
| Gauchheil                     | 4. | 15      | Granaten                       | 4. | 77      |
| Garbe                         | 4. | 105     | Granatstein                    | 3. | 328     |
| Gartenkress                   | 4. | 110     | Gras / Queckengras             | 4. | 128     |
| Gartenheil v. Stadtwurz       |    |         | Wegaras                        |    | ibid.   |
| Gartenpapeln                  | 4. | 98      | Grasblümlein                   | 4. | 38      |
| Geelsuchtwurz / Giltwurz      | 4. | 58      | Grensch / v. Genserich         |    |         |
| Geuer                         | 5. | 324     | Griechholz                     | 4. | 50. III |
| Geiserwurz                    | 4. | 134     | Griechstein                    | 3. | 329     |
| Geiß                          | 5. | 275     | Grimmentwasser                 | 2. | 137     |
| Geißblatt                     | 4. | 35. 177 | Grindkraut                     | 4. | 151     |
| Gelbwurz                      | 4. | 58      | Grindmagen                     | 4. | 18      |
| Gembs                         | 5. | 276     | Grindwurz                      | 4. | 90      |
| Gembswurz                     | 4. | 63      | Grundheil                      | 3. | 172     |
|                               |    |         | Grundreb                       |    |         |



# Teutsche Register.

|                        |    |     |                        |    |          |
|------------------------|----|-----|------------------------|----|----------|
| Grundreb / Grundman    | 4. | 97  | Heilwurk / Heigtwurk   | 5. | 57       |
| Gucker / Guckaug       | 5. | 317 | Heilig Holk            | 4. | 78       |
| Guckgastlee            | 4. | 7   | Heil. Geistwurk        | 4. | 16       |
| Gulden Günsel          | 4. | 59  | Heimichen / Heimling   | 5. | 342      |
| Gulden Wundkraut       | 4. | 176 | Herbstrosen            | 4. | 98       |
| Gundelreb              | 4. | 79  | Herzblümlein           | 4. | 65       |
| Gurtelkraut            | 4. | 108 | Herzfreud              |    | ibid.    |
|                        | h. |     | Herzgespan             | 4. | 34       |
| Haarstrang             | 4. | 123 | Herzgespansalb         | 2. | 307      |
| Habern                 | 4. | 22  | Herzwurk               | 4. | 103      |
| Habich                 | 5. | 313 | Heuschreck             | 5. | 340, 343 |
| Hagenbutte / Hainhecke | 4. | 60  | Hiacynth               | 3. | 328      |
| Halswasser             | 2. | 142 | Hirß                   | 4. | 104      |
| Hammel                 | 5. | 303 | Meerhirs               |    | ibid.    |
| Haan / Henne / Hun     | 5. | 317 | Himmelbrand            | 4. | 170      |
| Hanenfus               | 4. | 275 | Himmelgall             | 4. | 123      |
| Hankraut / Hanenkam    | 4. | 95  | Himmelschlüssel        | 4. | 131      |
| Hanff                  | 4. | 34  | Himmelschwertel        | 4. | 85       |
| Haring                 | 5. | 329 | Hin / Hindin           | 5. | 81       |
| Harnkraut              | 4. | 81  | Hindtbeer              | 4. | 142      |
| Hartriegel             | 4. | 93  | Hirsch                 | 5. | 281      |
| Hartzbaum              | 4. | 125 | Hirschkolben           | 5. | 282      |
| Hartzwurk              | 4. | 114 | Hirschkreuzlein        |    | ibid.    |
| Hase                   | 5. | 299 | Hirschmangolt          | 4. | 133      |
| Hasenpappel            | 4. | 97  | HirschPeterlein        | 4. | 123      |
| Hasensprung            | 5. | 300 | Hirschzung             | 4. | 152      |
| Haselstaude            | 4. | 52  | Hirtendasch ( Seckel ) | 4. | 31       |
| Haselwurk              | 4. | 231 | Höchel                 | 5. | 286      |
| Hausen / Hausblasen    | 5. | 329 | Holder / Hollunder     | 4. | 146      |
| Hauswurk               | 4. | 156 | Nider Holder           | 4. | 64       |
| Kleinhauswurk          | 4. | 172 | Hollwurk               | 4. | 19       |
| Hauheckel              | 4. | 116 | Falsche Hollwurk       | 4. | 73       |
| Hecht                  | 5. | 329 | Holkwurm               | 5. | 347      |
| Hederich               | 4. | 66  | Honigblum              | 4. | 100      |
| Heidenreich            | 4. | 20  | Hopffen                | 4. | 96       |
| Heidelbeer             | 4. | 509 | Hufflattich            | 4. | 169      |
| Heilgift               | 4. | 18  | Hund                   | 5. | 274      |

333333 iij

Hunds

# Teutsche Register.

Hundesfloh / Holzkbock  
Hundskopff v. Dorant  
Hundsjung  
Hünerbiß / Hünerdarm  
Hünerdieb  
Hünerkohl  
Hummel

J.

Jachtachs  
Je länger je lieber  
Jagel  
Jammen  
Indianisch Blat  
Ingber / Imber  
Teutsche Ingber  
Ingrün  
Isop / Ispen  
Johannisbrod  
Johannis Gürtel  
Johanniskraut  
Judenkirschen  
Judenpech  
Judenstein  
Jvenblat

K.

Käfer / Kadden  
Kalb  
Kalbsnaß v. Dorant.  
Kalkstein  
Kamschmalz  
Kamelsheu / Kamelsstroh  
Kampffer  
Karp  
Kartendistel  
Kastanien  
Kake  
Kagenfuß

5. 345 Ragenkraut  
4. 59 Rauh  
4. 12 Kernesdörffer  
5. 321 Kernwasser  
4. 156 Kerzenkraut  
5. 334 Unholdenkerzen  
Kellerschals  
Keschlamb  
Kießling / Kieselstein  
4. 42.84 Rinholz  
5. 286 Rirschen  
5. 334 Klapperstein  
4. 97 Klapperrosen  
4. 80 Klee / Gartenklee  
4. 21 Hasenklee / Hasenpüttlein  
4. 173 Honigkl. Steinkl. Edlerstein. 4. 100  
4. 84 Ragenklee  
4. 158 Saurklee  
4. 20.108 Kletten  
4. 83 Klingeltrüblein  
4. 11 Knabenkraut  
3. 514 Knoblauch  
3. 352 Lachen Knoblauch  
4. 100 Knodenkraut  
5. 345 Kobold  
5. 311 Kolkraut  
Römisch Kobl  
Königsblum  
KönigsKerze  
Korn  
Kornblum  
Kornrose  
Körbel  
Daubenkörbel  
Krafftwasser  
Kraye

Kraut.



# Teutsche Register.

|                                   |    |       |                           |    |        |
|-----------------------------------|----|-------|---------------------------|----|--------|
| Krametbaum                        | 4. | 88    | Leberfletten              | 4. | 10     |
| Kranich                           | 5. | 319   | Leindotter                | 4. | 157    |
| Krebs                             | 5. | 325   | Leinkraut                 | 4. | 95     |
| Kreid                             | 3. | 320   | Lendenkraut               | 4. | 90     |
| Kreuzwurz                         | 4. | 156   | Lerch                     | 5. | 313    |
| Kröte                             | 5. | 272   | Lerchenbaum/Lerchendannen | 4. | 90     |
| Krottenstein                      | 4. | 273   | Lerchenschwamm            | 4. | 230    |
| Schildkröte                       | 5. | 333   | Löwenfuß                  | 4. | 11.108 |
| Küchern                           | 4. | 45    | Liebstöckel               | 4. | 92     |
| Kuckuck                           | 5. | 317   | Lilien                    | 4. | 93     |
| Kub                               | 5. | 269   | Wasserlilien              | 4. | 114    |
| Kümmel/Kümmich                    | 4. | 57    | Limonien                  | 4. | 94     |
| Koskümmel                         | 4. | 157   | Lindenbaum                | 4. | 167    |
| Schwarz Kümmel                    | 4. | 114   | WasserLinden              | 4. | 91     |
| Feldkümmel. Matkii. Weißk.        | 4. | 37    | Löffelkraut               | 4. | 49     |
| Küngel/Künglen                    | 4. | 284   | Lorbeerbaum               | 4. | 91     |
| Künlein                           | 4. | 156   | Luchs                     | 5. | 301    |
| Künigundkraut                     | 4. | 67    | Luchsstein                | 3. | 353    |
| Kupfer                            | 3. | 385   | Lustwasser                | 4. | 135    |
| Kupferwasser                      | 3. | 385   | Lungenkraut               | 4. | 133    |
| Kürbs                             | 4. | 56    |                           |    |        |
|                                   | 2. |       |                           |    |        |
| Lachenknoblauch                   | 4. | 153   | Magistranz                | 4. | 85     |
| Lamb                              | 5. | 267   | Magnetstein               | 3. | 354    |
| Lasurstein                        | 3. | 352   | Magfamen                  | 4. | 117    |
| Lattich                           | 4. | 89    | Mandeln                   | 4. | 14     |
| Laubfrosch                        | 5. | 305   | Mangold                   | 4. | 27     |
| Lauch/Mesch/Schnittlauch          | 4. | 130   | Wilder Mangold            | 4. | 90.134 |
| Lavendel                          | 4. | 160   | Mannstreu                 | 4. | 66     |
| Laus                              | 5. | 345   | Unser FrauenMantel        | 4. | 11     |
| Läusekraut                        | 4. | 162   | Marcastib                 | 3. | 456    |
| Lauskrautsamen                    | 4. | 250   | Marmelstein               | 3. | 354    |
| Lebkraut                          | 4. | 74    | Mastixbaum                | 4. | 92     |
| Leberblümlein/EdelLeberkraut/Gul- |    |       | Mastich Gummi             | 3. | 199    |
| denLeberkraut                     | 4. | 65    | Maseran                   | 4. | 196    |
| Leberkraut/Steinleberkraut        | 4. | 65.92 | Maslieben                 | 4. | 26     |
| Sternleberkraut                   | 4. | 65    | Mariendblümlein           |    | ibid.  |
|                                   |    |       | Mariendistel              | 4. | 37     |
|                                   |    |       |                           |    | Marien |

117.

# Teutsche Register.

|                            |    |         |                             |       |         |
|----------------------------|----|---------|-----------------------------|-------|---------|
| Mariemünch                 | 4. | 102     | Münchskopff                 | 4.    | 165     |
| Maulbeerbaum               | 4. | 105     | Mundlein                    | 5.    | 329     |
| Maulfel                    | 5. | 302     | Mundholz                    | 4.    | 93      |
| Maulwurf                   | 5. | 308     | Münz                        | 4.    | 101     |
| Maurrauten                 | 4. | 114     | Krauß Münz                  | ibid. |         |
| Maus                       | 5. | 303     | Epismünz                    | 4.    | 191     |
| Schärmauß                  | 5. | 308     | Muscatus/ Muscatblüth       | 4.    | 106     |
| Mausdorn                   | 4. | 143     | Muscheln                    | 5.    | 327     |
| Mausohrlein                | 4. | 23      | Oster Muscheln              | 5.    | 331     |
| Meerzwibel                 | 4. | 154     | Murmeltier/ Murmentle       | 5.    | 303     |
| Megerkraut                 | 4. | 74      | Mutterkraut                 | 4.    | 99.100  |
| Meyenblümlein              | 4. | 94      | Mutterwurz                  | 4.    | 20.103  |
| Meieran/ Maieran/ re.      | 4. | 96      |                             |       |         |
| Meise                      | 5. | 322     | Nachtschatten               | 4.    | 159     |
| Meisterwurz                | 4. | 85      | Nagelkraut                  | 4.    | 23      |
| Meywurm                    | 5. | 345     | Nardenkraut                 | 4.    | 113     |
| Melissen                   | 4. | 100     | Celtische Narde             | 4.    | 161     |
| Melonen                    | 4. | 101     | Natter                      | 5.    | 309     |
| Melt/ Milte/ Molte         | 4. | 22      | Natterwurz                  | 4.    | 29      |
| Mengelwurz                 | 4. | 90      | Klein Natterwurz            | 4.    | 114     |
| Mensch                     | 5. | 27      | Nelken/ Mutternelken        | 4.    | 39      |
| Meter/ Metram/ Mutterkraut | 4. | 99      | Negelblümlein               | 4.    | 38      |
| Milchkraut                 | 4. | 152     | Negelweiln                  | 4.    | 45      |
| Myrrhen                    | 4. | 200     | Negelnkrafft                | 4.    | 122     |
| Myrtenbaum                 | 4. | 109     | Nesselbaum                  | 4.    | 103     |
| Mohrenkümmel               | 4. | 62      | Nessel                      | 4.    | 178     |
| Mohrenwurz                 | 4. | 120     | Nesselfönig                 | 5.    | 322     |
| Wassermorellen             | 4. | 18      | Neunheil                    | 4.    | 108     |
| Mol/ Molch                 | 5. | 342.345 | Nicht/ Graunicht/ Augēnicht | 3.    | 460     |
| Molwurf                    | 5. | 308     | Nießwurz                    | 4.    | 235.238 |
| Mon                        | 4. | 117     | Rußbaum/ Welsche Ruß        | 4.    | 86      |
| Moos                       | 4. | 107     |                             |       |         |
| Mooskraut                  | 4. | 92      | Schergeil                   | 3.    | 320     |
| Mottenkraut                | 4. | 162     | Sch                         | 5.    | 269     |
| Meermoos                   | 4. | 51      | Schsenzung                  | 4.    | 31      |
| Muskenkraut                | 4. | 122     | Sdermenig                   | 4.    | 10      |
| Muskenpulver               | 3. | 455     | Delbaum/ Olivenbaum         | 4.    | 115     |
|                            |    |         | Delma,                      |       |         |



# Teutsche Register.

|                               |                 |                          |        |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Delmagen / Delsamen           | 4. 117          | Pfersichbaum             | 4. 121 |
| Dln                           | 5. 543          | Pfingstrosen             | 4. 127 |
| Drant                         | 4. 18           | Pfrimmenkraut            | 4. 74  |
| Ostertälblein                 | 5. 340          | Pflaumen / Prunellen     | 4. 131 |
| Ostertucen                    | 4. 19           | Pimperniklein            | 4. 126 |
| Osternuscheln                 | 5. 331          | Pyren                    | 5. 343 |
| Ostrik                        | 4. 85           | Pödonien                 | 4. 127 |
| p.                            |                 | Poley                    | 4. 133 |
| Pappeln / RäßPappeln          | 4. 97           | Wildpoley                | 4. 156 |
| Pappelbaum / Populbaum        | 4. 127          | Pomeranckenbaum          | 4. 23  |
| Paradisholz                   | 4. 9            | Pstientkraut             | 4. 245 |
| Paradiskörner                 | 4. 35           | Pulseffig                | 2. 128 |
| Gelb Pastinack / weiß Pastin. | 4. 120          | Q.                       |        |
| Pech                          | 4. 208          | Quapp                    | 5. 330 |
| Peisselbeeren                 | 4. 27           | Queckengras              | 4. 67  |
| Perlen                        | 3. 42           | Quecksilber              | 3. 397 |
| PerlenMutter                  | 3. 330          | Queckstelze              | 5. 321 |
| Pestilenzwurk                 | 4. 122          | Quendel                  | 4. 156 |
| Peterlein                     | 4. 18. 122. 123 | Welscher Quendel         | 4. 166 |
| Bergpeterlein                 | 4. 123          | Quittenbaum              | 4. 61  |
| Hirschpeterlein               | 4. 123          | R.                       |        |
| Steinpeterlein                | 4. 123. 124     | Raab / Rapp              | 5. 317 |
| Petersilig                    | 4. 122          | Raden                    | 4. 113 |
| Wildpetersilig                | 4. 123          | Rake / Ratte             | 5. 303 |
| S. Peterskraut                | 4. 119          | Rattenpulver             | 3. 498 |
| S. Petersschlüssel            | 4. 131          | Raucken                  | 4. 66  |
| Pfaffenblatt                  | 4. 165          | Raup                     | 5. 241 |
| Pfaffenpint                   | 4. 21           | Rauten / Weinrauten      | 4. 143 |
| Pfannkuchenkraut              | 4. 102          | Steinrauten / Maurrauten | 4. 141 |
| Pfau / Pagelun                | 5. 322          | Wilderrauten v. Erdrauch |        |
| Pfeben                        | 4. 101          | Reittich                 | 4. 136 |
| Pfeffer                       | 4. 125          | Meerrettich              | ibid.  |
| Maurpfeffer                   | 4. 156. 172     | Wilder Meerrettich       | 4. 20  |
| Wasserpfeffer                 | 4. 122          | Rhabarbar                | 4. 246 |
| Pfennigkraut                  | 4. 114          | Weiß Rhabarbar           | 4. 242 |
| Pferd                         | 5. 285          | Rhapontic                | 4. 138 |
| Pferdschwanz                  | 4. 65           | Rebhun                   | 5. 323 |
|                               |                 | Raaa aaa                 | Regen  |

Deutsche Register.

|                           |         |     |                           |         |       |
|---------------------------|---------|-----|---------------------------|---------|-------|
| Negenturm                 | 5.      | 343 | Salben                    | 4.      | 145   |
| Nebbock / Nebgeiß         | 5.      | 275 | Salniac                   | 3.      | 480   |
| Nebgras                   | 4.      | 76  | Salpeter / Salmiter       | 3.      | 471   |
| Neyer / Neige             | 5.      | 315 | Salsa paria               | 4.      | 149   |
| Rheinblumen               | 4.      | 162 | Salz                      | 3.      | 464   |
| Rheinfern                 | 4.      | 165 | Sammetblum                | 4.      | 13    |
| Reintweiden               | 4.      | 93  | Sandel                    | 4.      | 148   |
| Reisselbeern              | 4.      | 27  | Sandstein                 | 3.      | 355   |
| Rhinocer                  | 5.      | 305 | Sannickel                 | 4.      | 148   |
| Rindsaugwurk              | 4.      | 8   | Saprbir                   | 3.      | 330   |
| Ringelblum                | 4.      | 34  | Sassafras                 | 4.      | 149   |
| Rittersporn               | 4.      | 33  | Saturey                   | 4.      | 150   |
| Rodeseerholz              | 4.      | 137 | SaugTigel                 | 5.      | 342   |
| Rogke                     | 4.      | 155 | Saurach / Sauerdorn       | 4.      | 27    |
| Rosen                     | 4.      | 139 | Sauerampffer              | 4.      | 7     |
| Widerosen / Feldrosen/2c. | 4.      | 60  | Saurklee                  | 4.      | 7     |
| Rosenwurk                 | 4.      | 137 | Sau / Wilde Sau           | 5.      | 268   |
| Rosinlein                 | 4.      | 176 | Saubon                    | 4.      | 82    |
| Rosshub                   | 4.      | 169 | Saubrodt                  | 4.      | 59    |
| Roskläfer                 | 5.      | 345 | Saukraut                  | 4.      | 159   |
| Rosmarin                  | 4.      | 141 | Sautwurk                  | 4.      | 154   |
| Rosschwanz                | 4.      | 65  | Scabiosen                 | 4.      | 151   |
| Rost                      | 4.      | 194 | Schaaf                    | 5. 367. | 303   |
| Rötelstein                | 3.      | 320 | Schaslein                 | 5.      | 338   |
| Rothe                     | 4.      | 142 | Schasgarbe / Schasrippe   | 4.      | 105   |
| Rothgünkel                | 4.      | 167 | Schasthenheu              | 4.      | 65    |
| Rothlauffkraut            | 4.      | 76  | Schmuckige Schaafstvolle  | 5.      | 304   |
| Pulver                    | 2.      | 269 | Scharlachbeer             | 4.      | 44    |
| Ruben                     | 4. 124. | 237 | Scharley                  | 4.      | 82    |
| Stectruben                | 4.      | 109 | Scheistwurk               | 4.      | 231   |
| Rubin                     | 3.      | 329 | Scheltwurk                | 4.      | 43    |
| Rubrechtskraut            | 4.      | 76  | Schierling                | 4.      | 47    |
| Ruhrwurk                  | 4.      | 467 | Schildkröte               | 5.      | 333   |
| S.                        |         |     | Schlackung / Schlafapffel | 4.      | 60    |
| Safftgrün                 | 4.      | 250 | Schlackkraut              | 4.      | 42.82 |
| Saffran                   | 4.      | 54  | Schlang                   | 5.      | 305   |
| Wildsaffran               | 4.      | 232 | Schlangenkraut            | 4.      | 114   |
|                           |         |     | Schlang                   |         |       |



# Teutsche Register.

|                       |    |         |                         |    |         |
|-----------------------|----|---------|-------------------------|----|---------|
| Schlangennord         | 4. | 153     | Serapinsafft            | 4. | 214     |
| Schleye               | 5. | 334     | Serpentinstein          | 3. | 354     |
| Schlehendorn          | 4. | 6       | Seselsamen              | 4. | 157.158 |
| Schlingenbaum         | 4. | 138     | Siebenbaum              | 4. | 144     |
| Schlüsselblumen       | 4. | 131     | Siebengezeit            | 4. | 95      |
| Schmeertwurz          | 4. | 163.231 | Siebenfarbblum          | 4. | 84      |
| Schnecken             | 5. | 283     | Siegtwurz               | 4. | 173     |
| Schneekönig           | 5. | 322     | Silber                  | 3. | 373     |
| Schnepffe             | 5. | 317     | Silberkraut             | 4. | 17      |
| Schorbockskraut       | 4. | 44      | Sinau                   | 4. | 11      |
| Schoßstein            | 3. | 353     | Singrün                 | 4. | 173     |
| Schröter              | 5. | 345     | Smaragd                 | 3. | 331     |
| Schwalb               | 5. | 320     | Sonnenthau              | 4. | 140     |
| Schwalbentwurz        | 4. | 43.173  | Sonnentwendel/Sonnenfr. | 4. | 46      |
| Schwammstein          | 3. | 357     | Spargen/ Sparschen      | 4. | 21      |
| Schwan                | 5. | 321     | Speckgilt               | 4. | 35      |
| Schwarzwurz           | 4. | 163     | Speichelfraut           | 4. | 162     |
| Schwebelwurz          | 4. | 123     | Speicheltwurz           | 4. | 134.199 |
| Schwefel              | 3. | 501     | Spererling              | 4. | 160     |
| Schwertel/ gelb Schw. | 4. | 8       | Sperwasser              | 3. | 452     |
| Schwindelkraut        | 4. | 63      | Sperberbaum             | 4. | 160     |
| Wasser                | 2. | 138     | Sperling                | 5. | 322     |
| Scorpion              | 5. | 138     | Spicanard               | 4. | 160.261 |
| Seckelkraut           | 4. | 31      | Spießglaß               | 3. | 421     |
| Seebium               | 4. | 114     | Spilling                | 4. | 131     |
| Seehuh                | 5. | 327     | Spinn                   | 5. | 337     |
| Seidenbälglein        | 5. | 339     | Spinat                  | 4. | 162     |
| Seidelbast            | 4. | 244     | Spizmauß                | 5. | 303     |
| Seidenwurm            | 5. | 339     | Springkörner            | 4. | 233     |
| Seiffenkraut          | 4. | 149     | Sprossen                | 1. | 3       |
| Senatblätter          | 4. | 248     | Spulwurm                | 5. | 344     |
| Senff                 | 4. | 159     | Stabwurz                | 4. | 3       |
| Wegsenff              | 4. | 66      | Stechakraut             | 4. | 162     |
| Baurenseuff           | 4. | 166     | Stechruben              | 4. | 109     |
| Weisser Senff         | 4. | 66      | Stein                   | 3. | 323     |
| Sengerkraut           | 4. | 150     | Steinbrech              | 4. | 151     |
| Sedenbaum             | 4. | 144     |                         |    |         |

# Teutsche Register.

Noth Steinbruch  
Steinbein  
Steindacht  
Stein Eule  
Stein Flachs  
Steinflechten  
Steinkohlen  
Steinmarck  
Steinöle  
Steinsalz  
Steinsamen  
Stendeltwurz  
Sternschopf  
Stickturz  
Stopwachs  
Stör  
Storch  
Strauß  
Streiffwurz  
Süßholz

T.

Taatsche  
Tag und Nacht  
Talc  
Tamarisken  
Tappenstein  
Tausendblatt  
Tausendguldenkraut  
Groß Tausendguldenkraut  
Tausend Körner  
Tausendschön  
Terband  
Terbintzin  
Teschelkraut  
Teuffelsabbiß  
Teuffelsklay  
Teuffelsdreck

4. 69  
3. 355  
3. 346  
5. 60  
3. 346  
4. 92  
3. 515  
1. 4  
3. 515  
3. 470  
4. 104  
4. 150  
1. 17  
4. 231  
5. 337  
5. 333  
5. 315  
5. 323  
4. 90  
4. 76

Zhanapffel  
Zhanenbaum  
Zbiegertwollf  
Zhimian  
Frembd Zhimian  
Zhymseid  
Zoback  
Zormentill  
Zragant  
Zrusche  
Zurbith  
Zurfeldaub

V.

Niolkraut / Violen  
Gelb Venelen  
Veyelreben  
Veyelwurz  
Venushaar  
Versich  
Vitriol  
Vnnütsorge  
Vogelkraut  
Vogelsnest  
Vogelleim  
Vorstoß

W.

Wachs  
Wachtel  
Waldmeister  
Waldstrob  
Walfisch  
Walroth  
Waldwinde  
Walfstein  
Waltwurz  
Wandläuse / Wanzen  
Wasser

4. 3  
ibid.  
5. 301  
4. 166  
4. 162  
4. 239  
4. 111  
4. 167  
4. 224  
5. 330  
4. 250  
4. 324

4. 174  
4. 45  
4. 85  
4. 85.186  
4. 8.144  
4. 27  
3. 483  
4. 84  
4. 12.15  
4. 120  
4. 135  
5. 337

5. 337  
5. 37  
4. 65  
4. 74  
4. 327  
3. 513  
4. 35  
3. 355  
4. 163  
5. 341  
3. 321  
Wasser.

Wasserburg  
Wassermerck  
Wachholz  
Wadern  
Wadrit /  
Wadrich  
Wadstob  
Wadwart  
Wadische  
Waden  
Wage / W  
Wein  
Weinstock  
Weinstein  
Weintraut  
Weinrauch  
Weistlen  
Weistwurz  
Weise  
Wermuth  
Wederhoff  
Widerodt  
Guldenwider  
Widderwein  
Werminden  
Wintergrün  
Winterkorn  
Winterrosen  
Wismuth  
Welf  
Welfbeere  
Welfmilch  
Welfmuth



# Teutsche Register.

|                         |             |                             |             |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Wasserbungen            | 4. 15       | Wolberlein                  | 4. 20       |
| Wassermereck            | 4. 18       | Wulstkraut                  | 4. 170      |
| Wachholder / Weckholder | 4. 88       | Wunderbaum                  | 4. 247      |
| Wegdorn                 | 4. 249      | Wundkraut                   | 4. 69. 176  |
| Wegtritt / Weggras      | 4. 128      | Heiligwundkraut             | 4. III      |
| Wegerich                | 3. 126      | Heidnischwundkraut          | 4. 176. 177 |
| Wegstrob                | 4. 74       | Indianischwundkraut         | 4. III      |
| Wegwart                 | 4. 46       | Wurmkraut                   | 4. 148. 165 |
| Weidasche               | 3. 478      | Wurmsamen                   | 4. 148      |
| Weiden                  | 4. 144      | Wüstling                    | 5. 317      |
| Weihe / Witwe           | 5. 321      | Wüterich                    | 4. 47       |
| Wein                    | 4. 225      |                             | 5.          |
| Weinstock / Weinreb     | 4. 175      | Zahntwurz                   | 4. 134      |
| Weinstein               | 4. 218      | Zapffholz                   | 4. 241      |
| Weinrauten              | 4. 143      | Zaungilg                    | 4. 35       |
| Weyrauch                | 4. 223      | Zaunkönig / Zaunschlepplein | 5. 322      |
| Weißbley                | 3. 394      | Zaunrübe                    | 4. 231      |
| Weißwurz                | 4. 128      | Zeitlosen                   | 4. 26       |
| Weize                   | 4. 168      | Zeltenpflaster              | 3. 348      |
| Wermuth                 | 4. 4. 5     | Zibeth-Rake                 | 5. 28       |
| Widhopff                | 5. 324      | Zidwansamen                 | 4. 148      |
| Widertodt               | 4. 168      | Ziegenbock / Ziege          | 5. 275      |
| Guldentwidertodt        | 4. 9        | Ziefer Erbsen v. Küchern    |             |
| Wildschwein             | 5. 268      | Ziegeuner Kraut             | 4. 82       |
| Meertwinden             | 4. 249      | Zimmetrind                  | 4. 47       |
| Wintergrün              | 4. 102. 134 | Zin                         | 3. 394      |
| Winterkönig             | 5. 322      | Zinnober                    | 3. 419      |
| Winterrosen             | 4. 98       | Zirnet                      | 4. 157      |
| Wismuth                 | 3. 456      | Zittwar                     | 4. 179      |
| Wolff                   | 4. 321      | Zucker                      | 4. 212      |
| Wolfsbeer               | 4. 119      | Zuckertwurz                 | 4. 159      |
| Wolfsmilch              | 4. 239      | Zweygen                     | 4. 131      |
| Wolgemuth               | 4. 116      | Zwibel / Zwisel             | 4. 40       |



# INDEX RERUM.

*In quo numerus prior Librum, posterior  
paginam denotat.*



|                        |       |        |                                   |             |     |
|------------------------|-------|--------|-----------------------------------|-------------|-----|
| Bies                   | 4.    | 3      | Acidum Sp. Tartari                | 4.          | 219 |
| Abiga                  | 4.    | 42     | Acini                             | 1.          | 2   |
| Abrotanum              | 4.    | 3      | Aconitum monococcon (salutiferum) | 4.          | 119 |
| fœmina                 | 4.    | 57     | Patalianches                      | 4.          | 119 |
| Abſynthium             | 4.    | 4      | Salutiferum                       | 4.          | 18  |
| Marinum                | 4.    | 57     | Acorus verus                      | 4.          | 8   |
| Ponticum               | 4.    | 5      | Officinarum                       | 4.          | 8   |
| Acacia vera            | 4.    | 6      | Adulterinus                       | 4. 8. falſa | 48  |
| Germanorum             | 4.    | 6      | Paluſtris                         | 4.          | 8   |
| Acanthus Arabum        | 4.    | 6      | Acorum legitimum                  | 4.          | 8   |
| Vulgaris               | 4.    | 30     | Actio variat vires medicamentorum | 1.          | 83  |
| Acanthum               | 4.    | 35     | Adeps                             | 1.          | 2   |
| Acetoſa                | 4.    | 7      | Adiantum                          | 4.          | 8   |
| Acetoſella             | 4.    | 7      | foliis coriandri                  | 4.          | 8   |
| Acheta v. Gryllus      |       |        | aureum                            | 4.          | 9   |
| Achillea               | 4.    | 105    | candidum, album                   | 4.          | 144 |
| Acetum                 | 1. 2. | 4. 180 | nigrum                            | 4.          | 8   |
| Acer. deſtillata       |       | 4. 181 | rubrum v. Trichomanes             |             |     |
| Acerorum hiſtoria      | 2.    | 126    | Lugdunenſe                        | 4.          | 8   |
| Acerum Agreſtinum      | 2.    | 126    | Æluropus                          | 4.          | 81  |
| Alexicacum             | 2.    | 127    | Aes i. e. cuprum                  | 3.          | 385 |
| Bezoardicum            |       | ibid.  | Adiantum cand.                    | 4.          | 144 |
| Confortans             | 2.    | 128    | Ætas creſcentium                  | 1.          | 84  |
| Prophylacticum         |       | ibid.  | Ærugo                             | 3.          | 385 |
| Rutaceum com.          |       | ibid.  | Agallochum                        | 4.          | 9   |
| Philoloſophicum Querc. | 2.    | 207    | Agaricus com.                     | 4.          | 230 |
| Acipenſer v. Sturio    |       |        | Agens mutat vires                 | 1.          | 85  |
| Accipiter              | 5.    | 313    |                                   |             |     |
| Aceti hiſtoria         | 2.    | 126    |                                   |             |     |

Ageratum  
Agnus  
Agnus cal  
Agreſta v.  
Agumoni  
Sylv

Ajuga  
Alaſttri  
Alabaſt  
Alauda  
Alebras v.  
Alcedo  
Alces  
Alchimilla  
Alcohol  
Alifina  
Alkanna e.  
Alkekingi  
Alletuja  
Allium  
alpin

Alœ  
Alnus nigra  
Alſine  
Althor. v.  
Althæa  
Alum. us. v.  
Aluminis hi  
Alumen ſea  
plum  
Satur

Alyſina  
Amalgama  
Amalgamo  
Amaracus  
Amaracchi



# INDEX RERUM.

|                                    |          |                                    |        |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|
| Ageratum                           | 4. 10    | luteus v. stœch. citrina           | 3. 167 |
| Agnus                              | 5. 267   | Ambragrysea                        | 3. 509 |
| Agnus castus                       | 4. 10    | Ambubeja                           | 4. 46  |
| Agrestis v. omphacium              |          | Amianthus lapis                    | 3. 346 |
| Agrimonia                          | 4. 10    | Ammi verum, Amios                  | 4. 13  |
| Sylvestris                         | 4. 17    | Ammiofelinum                       | ibid.  |
| Ajuga                              | 4. 42    | Ammoniacum gummi                   | 4. 182 |
| Alabastris                         | 1. 2     | Ammoniacy salis historia           | 3. 480 |
| Alabastrites                       | 3. 345   | Amomum                             | 4. 13  |
| Alauda                             | 5. 313   | Amygdala                           | 4. 13  |
| Alebras v. staphisagria.           |          | Anacardium                         | 4. 14  |
| Alecedo                            | 5. 314   | Anacolle mata                      | 2. 166 |
| Alces                              | 5. 267   | Anehusa Alcibiadion                | 4. 31  |
| Alchimilla                         | 4. 11    | Anagallis terrestris 4. 14. aquat. | 4. 15  |
| Alcohol                            | 1. 6     | Analogia rerum                     | 1. 18  |
| Alisma                             | 4. 102   | Anas                               | 5. 314 |
| Alkanna c. Ichthiocolla            |          | Androsaces                         | 4. 57  |
| Alkekingi                          | 4. 11    | Androsenum minus                   | 4. 83  |
| Alleluja                           | 4. 7     | Anethum                            | 4. 15  |
| Allium                             | 4. 12    | Angelica                           | 4. 16  |
| alpinum, anguinum montanum         |          | Angelicus pulvis                   | 3. 32  |
| v. victorialis.                    |          | Angelica pilula                    | 2. 160 |
| Aloë                               | 4. 251   | Anguilla                           | 5. 325 |
| Alnus nigra v. frangula            |          | Anguria                            | 4. 49  |
| Alſine                             | 4. 12    | Anisum                             | 4. 17  |
| Alhut. v. Ammoniacum Gummi         |          | Animalia integra officinalia       | 2. 117 |
| Alhæza                             | 4. 12    | Anime Gummi                        | 4. 183 |
| Alum. us. v. Symphytum.            |          | Anonis                             | 4. 116 |
| Aluminis historia                  | 3. 477   | Anser                              | 5. 314 |
| Alumen scajolæ v. Lapis specularis |          | Anserina                           | 4. 17  |
| plumosum                           | 3. 346   | Anthemis                           | 4. 43  |
| Saturni                            | 3. 459   | Anthora                            | 4. 18  |
| Alyſma                             | 4. 20    | Anthrax                            | 3. 16  |
| Amalgama                           | 1. 6     | Antithora                          | 4. 10  |
| Amalgamotio auri                   | 3. 364   | Antidorus <i>Ἀντιδότης</i>         | 5. 451 |
| Amaracus                           | 4. 97-99 | Isochryſos                         | 3. 450 |
| Amaranthus                         | 4. 13    | Lyſipyrætus                        | 3. 449 |
|                                    |          | Panæ-                              |        |

# INDEX RERUM.

|                    |                 |                                      |                 |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| Panæretos          | 3. 436          | Aper                                 | 5. 268.         |
| Panchrestos        | 3. 450          | Apes                                 | 5. 334.         |
| Pantagogos         | 4. 447          | Apialtrum                            | 4. 100.         |
| Polychrestos       | 3. 438          | Apri radix                           | 4. 37.          |
| Soterios           | 3. 451          | Aphroselenites                       | 3. 326.         |
| Zoiphilos          | 3. 449          | Aries signum cœleste                 | 1. 29.          |
| Antirrhinum        | 4. 18.          | Aries                                | 5. 303.         |
| Antimonii historia | 3. 421.         | Apium                                | 4. 18.          |
| Acetum             | 3. 434.         | horrense Selinum                     | 4. 122.         |
| Arcanum Basil.     | 3. 448.         | montanum                             | 4. 123.         |
| Balsamus           | 3. 439.         | Apophlegmatismus                     | 1. 6.           |
| Butyrum            | 3. 409.         | Aquæ quadantenus facit ad generatio- |                 |
| Cerusa             | 3. 429.         | nem                                  | 1. 39.          |
| Diaphoretica       | 3. 427.         | Aquæ nativæ                          | 2. 97. 3. 321.  |
| Flores             | 3. 431. & seq.  | Aquæ destillatæ                      | 2. 128. seqq.   |
| Flores correcti    | 3. 433.         | Aqua Anhaltina                       | 4. 134.         |
| fixi               | 3. 427. 434.    | Antipodagrica                        | 2. 154.         |
| Tartarifati        | 3. 418.         | Aperitiva                            | ibid.           |
| Manna sen Tinctura | 3. 444.         | Apoplecticæ                          | 2. 135.         |
| Magisterium        | 3. 437.         | Asthmatica                           | ibid.           |
| Mercurius          | 3. 454.         | ad Atrophiam                         | 5. 308.         |
| Oleum              | 3. 435.         | Aurea                                | 5. 299.         |
| ex vitro Bal.      | 3. 445.         | Benedicta                            | 3. 453.         |
| Præcipitat.        | 3. 430.         | Bezoardica                           | 2. 156.         |
| Reguli             | 3. 318. & seq.  | Carbunculi                           | ibid.           |
| Rubeum             | 3. 430.         | Carminativa                          | 2. 137.         |
| Sal                | 3. 454.         | ad desiccandos catharos              | ibid.           |
| Spiritus           | 3. 439. 440.    | Caustica                             | 2. 154. 3. 476. |
| Succinum           | 3. 405.         | Cephalica aromatica                  | 2. 138.         |
| Sulphura           | 3. 441. & seq.  | Cephalica vel Epileptica             | ibid.           |
| Syrupus            | 3. 453.         | è cervorum typhis                    | 5. 282.         |
| Tincturæ           | 3. 443. & seqq. | Communitatis ophtalmica              |                 |
| Vinum Hippocratic. | 3. 123.         |                                      | 2. 138.         |
| Vitra              | 3. 422.         | Cordialis Hercul. Saxon. calid.      |                 |
| Vitra correctæ     | 3. 424.         |                                      | 2. 139.         |
| Anthophylli        | 4. 38.          | frigida                              | 2. ibid.        |
| Aparine            | 4. 65.          | Cordialis restaurans                 | 2. 140.         |
|                    |                 | Confin-                              |                 |

Colmetica  
Colmetica  
Colmetica  
Damafeena  
Anti-aylen  
Dura  
Diuretica è  
Diuretica S.  
Epileptica  
Febrifuga  
Fons  
ad Gutturis  
Antihæctica  
Hysterica C  
M  
Imperialis co  
Lavendule c  
Magnanimit  
Marcalite  
Maris  
Minerales  
Nephritica  
Ophtalmica  
Pectoralis  
Petarum  
Philosophor.  
Pitarum com  
Regia  
Sive compo  
Sphitrea ad o  
Sarcocorbuter  
Sarcopalmica  
Sarcimi Sulph  
Suffusioner  
Temperata B  
Ternacalis  
Contra



# INDEX RERUM.

|                       |                      |                                |            |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| Cosmetica             | ibid.                | De tribus                      | 1. 150     |
| Cosmetica             | ibid.                | Tristantis                     | 2. 150     |
| Cosmetica s. myrrhata | 1. 141               | Vitæ mulierum                  | 2. 150     |
| Damascena odorifera   | 2. 141               | Vitæ mulier. camphor.          | 2. 151     |
| Anti-dysenterica      | 2. 141               | Viridis                        | 2. 353     |
| Divina                | 5. 296               | Vitæ Tartarifata               | 2. 206     |
| Diuretica è nucleis   | 2. 141               | Virtutum                       | 2. 151     |
| Diuretica S. Cloff.   | 2. 142               | Vomitiva Æsculapii             | 2. 152     |
| Epileptica            | 3. 439. 5. 299       | Plateri                        | 2. 151     |
| Febrifuga             | 1. 142               | Aquarius                       | 1. 32      |
| Fortis                | 3. 476               | Aquileia                       | 4. 19      |
| ad Gutturis affectus  | 2. 142               | alba                           | 3. 410     |
| Antihectica           | 2. 143               | cœlestis                       | 3. 486     |
| Hysterica Croll.      | 2. 143               | Aquilegia                      | 4. 19      |
| Martini               | 2. 144               | Aquipenser v. Sturio           |            |
| Imperialis correcta   | 2. 144               | Araneus, a                     | 5. 337     |
| Lavendulæ comp.       | 2. 145               | Arangia, Arantia, Arantia mala | 4. 23      |
| Magnanimitatis        | 2. 145               | Arcanum Chamæactes             | 2. 235     |
| Marcafita             | 3. 457               | Corallinum                     | 3. 408     |
| Martis                | 3. 380               | Duplicatum                     | 3. 474     |
| Minerales             | 3. 323               | Perlarum                       | 3. 344     |
| Nephritica            | 2. 146               | Arbor foetida v. Frangula.     |            |
| Ophthalmica           | 2. 152. 3. 11. 4. 46 | Arcium                         | 4. 25      |
| Pectoralis            | 2. 146. 147          | Ardea                          | 5. 315     |
| Perlarum              | 2. 153               | Argentaria                     | 4. 17      |
| Philosophor.          | 2. 246               | Argenti historia               | 3. 373     |
| Picarum composita     | 2. 147               | Aries v. Ovis.                 |            |
| Regia                 | 3. 477               | Arilli                         | 1. 2       |
| Salviæ compos.        | 2. 148               | Aristolochia                   | 4. 19      |
| Saphirea ad oculos    | 2. 153               | rotunda                        | 4. 73      |
| Antiscorbutica        | 2. 148               | Armenus lapis                  | 3. 346     |
| Antispasmodica        | ibid.                | Armoniacum v. Ammoniacum.      |            |
| Stimmi Sulphurea      | 3. 440               | Armoracia                      | 4. 20. 136 |
| ad suffusionem        | 2. 152               | Arnabi veterum v. Zedoaria.    |            |
| Temperata Basil.      | 2. 207               | Aromata officinalia            | 2. 100     |
| Theriacalis           | 2. 150               | Arnica                         | 4. 20      |
| Contra Terrorem       | 2. 149               |                                |            |

Bbb bbb b

Arfeni

# INDEX RERUM.

|                                  |    |         |                             |    |         |
|----------------------------------|----|---------|-----------------------------|----|---------|
| Arfenici historia                | 3. | 497     | Auripigmentum               | 3. | 498     |
| Artemisia                        | 4. | 20.98   | Auri historia               | 3. | 361     |
| tenuifolia v. Tanacetum.         |    |         | Aurum diaphoreticum         | 3. | 364.368 |
| Arthanita                        | 4. | 58      | potabile                    | 3. | 366     |
| Arthetica                        | 4. | 42      | Sclöpetans                  | 3. | 364     |
| Arthriticum Gesneri              | 4. | 131     | Spiritualisatum             | 3. | 365     |
| Arum                             | 4. | 21      | Vitæ                        | 3. | 369.404 |
| Afa (Afia) fœtida                | 4. | 184     | Axungia Solis               | 3. | 318.    |
| dulcis v. Benzoin.               |    |         | Lunæ                        | 3. | 316     |
| Afarum                           | 4. | 231     | Aizoon v. Sedum.            |    |         |
| Asclepias v. Vincetoxicum.       |    |         | Azoth, Azock                | 3. | 397     |
| Ascyron                          | 4. | 83      | B.                          |    |         |
| Aschia piscis v. Thymallus.      |    |         | Baccharis Germania          | 4. | 25      |
| Aselli                           | 5. | 338     | Baculi pro fornace          | 2. | 300     |
| Asinus                           | 5. | 269     | fumales                     | 2. | 300     |
| Asphaltos                        | 3. | 514     | pectorales                  | 2. | 299     |
| Aphalathus                       | 4. | 20.137. | Balanus myrepica            | 4. | 24      |
| Asparagus                        | 4. | 21      | Balaustia                   | 4. | 77      |
| Asperula                         | 4. | 65      | Balsamum (herba)            | 4. | 24      |
| Asplenium, nium v. Scolopendrum. |    |         | Balsamina                   | 4. | 105     |
| Astacus v. Cancer.               |    |         | Balsamita                   | 4. | 101     |
| Aster atticus                    | 4. | 66      | minor                       | 4. | 10      |
| Astragalus                       | 5. | 308     | Balsami æquivoca            | 1. | 6       |
| Astrum ♀ ii                      | 3. | 416     | Balsamorum nativorum series | 2. | 115     |
| Astrurium, Astringia             | 4. | 85      | inunctorium series          |    |         |
| Ætas medicamentorum              | 1. | 82      |                             | 2. | 301     |
| Ætites                           | 3. | 29      | odoriferorum series         | 2. | 155     |
| Athanasia v. Tanacetum.          |    |         | stillationum series         |    |         |
| Atriplex                         | 4. | 22      |                             | 2. | 156     |
| Attractylis                      | 4. | 36      | Balsamorum corpus           | 2. | 156     |
| Atturtilon v. Sefeli Cretic.     |    |         | Balsamus Arthriticus        | 2. | 159     |
| Avellana                         | 4. | 52      | Apoplecticus                | 2. | 156     |
| Avena                            | 4. | 22      | Balsamina                   | 2. | 302     |
| Avis medica                      | 5. | 322     | Bezoardicus                 | 2. | 156     |
| Aurata v. Truta.                 |    |         | Hispania                    | 2. | 303     |
| Aureum malum                     | 4. | 23      | Hypetici                    | 2. | 303     |
| Auricula muris                   | 4. | 23      | Indic. Peruv.               | 4. | 108     |
|                                  |    |         | Mira-                       |    |         |

Mirabiles  
Moeris  
Nervinus  
Anti-Parali  
Anti-Podag  
Reguli  
Salsgemm  
Fi  
Aris  
Terrarum  
Tolutanus  
Saponis  
Simplex  
Verus, Egly  
Syrac.  
Wiz  
Vomerat  
Uterinus  
Bapifecula  
Barbacaprin  
Baabo  
Bardana  
Basilicum  
Basilum &  
Barrachius v.  
Barrachites  
Bdellium  
Becabung  
Bechium v.  
Belemutesla  
Bellerogiv. A  
Bellis  
Bellon.  
Belen-albu  
Belen-Pavum  
Belenan. v. V



# INDEX RERUM.

|                                   |                      |      |                                  |                 |     |
|-----------------------------------|----------------------|------|----------------------------------|-----------------|-----|
| Mirabiles                         | 2.                   | 303  | Benzoin, Belzoinum, Benivinum,   | 4.              | 187 |
| Mneme-cephalicus                  | 2.                   | 160  | Berberis                         | 4.              | 27  |
| Nervinus                          | 2.                   | 159  | Berula                           | 4.              | 15  |
| Anti-Paraliticus                  | 2.                   | 159  | Bestia magna                     | 5.              | 267 |
| Anti-Podagricus                   | 5.                   | 297  | Beta                             | 4.              | 27  |
| Reguli                            | 3.                   | 447  | Betonica                         | 4.              | 28  |
| Salis gemmæ                       | 3.                   | 471  | altilis coronaria                | 4.              | 38  |
| Si                                | 2.                   | 305  | Betula                           | 4.              | 28  |
| Δtis                              | 3.                   | 507  | Lap. Bezoar occidentalis         | 5.              | 278 |
| ✠                                 |                      |      | orientalis                       | 5.              | 277 |
| Terrarum                          | 3.                   | 317  | Bezoardicum animale              | 5.              | 307 |
| Tolutanus                         | 4.                   | 485  | Bezoardica mineralia simplicia & |                 |     |
| ♀                                 | 3.                   | 387  | composita                        | 3. 411. & seqq. |     |
| Saponis                           | 2.                   | 161  | Bibinella, Bimpinella            | 4.              | 124 |
| Simplex                           | 2.                   | 156  | Bicornis v. Scarabæus            |                 |     |
| Verus. Ægyptiacus de Mecha        |                      |      | Biolychnium                      | 5.              | 293 |
| Syriac.                           | 4.                   | 185  | Bifinalva                        | 4.              | 12  |
| Vitæ                              | 2. 157. 3. 444. 507. |      | Bismuthum                        | 3.              | 356 |
| Vulnerarius                       | 2. 304. 305. 439     |      | Bistorta                         | 4.              | 29  |
| Uterinus                          | 2.                   | 304  | Birumen                          | 3.              | 509 |
| Baptifecula                       | 4.                   | 58   | Blatta Bizantia                  | 5.              | 325 |
| Barba caprina v. Ulmaria.         |                      |      | Bolus terra ejusque historia     | 3.              | 319 |
| Baabo                             | 5.                   | 225. | Boli (medicamenta)               | 2.              | 162 |
| Bardana                           | 4.                   | 25.  | Bolanides, i.e. Myrrha.          |                 |     |
| Basilicum                         | 4.                   | 26   | Bombax                           | 4.              | 29  |
| Basium ♂ & ♀                      | 3.                   | 382  | Bombyx                           | 5.              | 339 |
| Batrachus v. Rana aquatica.       |                      |      | Boona                            | 4.              | 68  |
| Batrachites                       | 5.                   | 273  | Borrax (Sal.)                    | 2.              | 280 |
| Bdellium                          | 4.                   | 187  | Borax, i.e. Bufonites            | 5.              | 273 |
| Becabungæ                         | 4.                   | 15   | Borrago                          | 4.              | 29. |
| Bechium v. Tusfilago.             |                      |      | Bos                              | 5.              | 269 |
| Belemnites lapis v. lyncetis lap. |                      |      | Botritis                         | 3.              | 458 |
| Belleregi v. Myrobalani.          |                      |      | Branca leonis                    | 4.              | 11  |
| Bellis                            | 4.                   | 26   | Branca Ursina                    | 4.              | 30  |
| Bellon.                           | 4.                   | 68   | Brassica                         | 4.              | 30  |
| Behen - album & rubrum            | 4.                   | 26   | Brassica marina v. Soldanella.   |                 |     |
| Ben-Parvum                        | 4.                   | 24   | Bbbbbbb z                        |                 |     |
| Beneran. v. Verbena.              |                      |      | Bru-                             |                 |     |

# INDEX RERUM.

|                                |    |          |                              |    |             |
|--------------------------------|----|----------|------------------------------|----|-------------|
| Bruchus                        | 5. | 341      | Cammarus v. Cancer           |    |             |
| Brunella                       | 4. | 131      | Camphora                     | 4. | 169         |
| Bruscus, um                    | 4. | 143      | Camphoræ ol. talcatum        | 4. | 83          |
| Bryonia                        | 4. | 431      | Canapus                      | 4. | 34          |
| Bubelus                        | 5. | 272      | Cancamum                     | 4. | 192         |
| Buccinum i. e. Purpura         |    |          | Cancer signum cœleste        | 1. | 30          |
| Bufo                           | 5. | 272      | Canceri herba                | 4. | 81          |
| Bufonites lapis                | 5. | ibid.    | Cancer animal                | 5. | 325         |
| Buglossa                       | 4. | 31       | Candelæ fumales              | 2. | 300         |
| urbana                         | 4. | 29       | Candelæ regis v. Verbascum.  |    |             |
| Bugula                         | 4. | 51       | Canicularis herba            | 4. | 81          |
| Bunias                         | 4. | 109      | Canis                        | 5. | 74          |
| Bursa pastoris                 | 4. | 31       | Canna fistula v. casia.      |    |             |
| Butyrum Antimonii              | 3. | 409      | Cannabis                     | 4. | 34          |
| Butyrum viride v. Ung. viride. |    |          | Cannabina aquatica           | 4. | 67          |
| Buxus                          | 4. | 32       | Cantharis noctiluca          | 5. | 340         |
| C.                             |    |          | Cantharides                  | 5. | 339         |
| Cachymia                       | 3. | 456      | Cantharus v. Scarabæus.      |    |             |
| Cadmia                         | 3. | 458      | Caper, Capra                 | 5. | 275. & seq. |
| Cæcula, cæcilia                | 5. | 310      | alpina                       | 5. | 276         |
| Cafur v. Camphora.             |    |          | Capillamenta                 | 1. | 2           |
| Calaminaris lapis              | 3. | 348      | Capreoli                     | 1. | 2           |
| Calendula                      | 4. | 34       | Capreolus animal             | 5. | 278         |
| Calafur                        | 4. | 38       | Capricerva                   | 5. | 577. 278    |
| Calamintha                     | 4. | 33. 111. | Capricornus sign. cœlest.    | 1. | 32          |
| Calamiris                      | 3. | 458      | Caprifolium                  | 4. | 35. 65      |
| Calamus aromaticus             | 4. | 8. 32    | Capnos                       | 4. | 73          |
| Calcatrippa                    | 2. | 33       | Capnites                     | 3. | 458         |
| Chalcitis                      | 3. | 455      | Capillus ♀                   | 4. | 8. 144      |
| Calces & Calcinationes quomodo |    |          | Capparis                     | 4. | 34          |
|                                | 2. | 163      | Caput monachi v. Taraxacum.  |    |             |
| Calculus humanus               | 3. | 148      | Caput mortuum                | 1. | 7           |
| Calor                          | 1. | 22       | Carabe                       | 3. | 510         |
| Caloris gradus                 | 1. | 48       | Caranna                      | 4. | 192         |
| Caltha                         | 4. | 31       | Carbo Petre                  | 3. | 515         |
| Calix                          | 1. | 2        | Carbon humanum               | 5. | 291         |
| Calx viva                      | 3. | 347      | Carbunc. historia vel rubini | 3. | 16          |
|                                |    |          | Carda-                       |    |             |



# INDEX RERUM.

|                                  |    |       |                                  |              |       |
|----------------------------------|----|-------|----------------------------------|--------------|-------|
| Cardamomum                       | 4. | 35    | Cataplasma contra cruorem        | 2.           | 165   |
| Cardel v. Sinapi                 |    |       | Antifebrile                      | 2.           | 166   |
| Cardopatium                      | 4. | 37    | Laxativum                        | 2.           | 165   |
| Cardiaca                         | 4. | 36    | de nido hirundinis               | 2.           | 165   |
| Carduus benedictus               | 4. | 36    | Resolutivum                      | 2.           | 164   |
| fullonum                         | 4. | 63    | Rubificans                       | 2.           | 49    |
| Lacteus, Leucographus, Dod.      |    |       | Vesicatorium                     | 2.           | 49    |
| Mariae, Marianus                 | 4. | 36.37 | Caraputia minor                  | 4.           | 233   |
| Veneris                          | 4. | 63    | major v. Ricinus                 |              |       |
| Panis seu pacis                  | 4. | 37    | Catechu                          | 3.           | 516   |
| Carlina                          | 4. | ibid. | Cattaria                         | 4.           | 111   |
| Cerneolus                        | 3. | 331   | Catus                            | 4.           | 280   |
| Carnosarum partium offic. series | 2. |       | Catus Zibetinus                  | 5.           | ibid. |
|                                  |    | 218   | Caulis                           | 4.           | 30    |
| Caro                             | 1. | 2     | Cauterium                        | 1. 7. 2. 231 |       |
| Caros                            | 4. | 36    | Cementatio auri                  | 3.           | 362   |
| Carota                           | 4. | 28    | Centaurium                       | 4.           | 40    |
| Carotides                        | 4. | 116   | majus                            | 4.           | 137   |
| Carpedium 4.55 (Valeriana)       |    | 169   | Centum capita                    | 4.           | 66    |
| Carpio, Carpus, Carpa.           | 5. | 326   | Centumorbis                      | 4.           | 114   |
| Carpobalsamum                    | 4. | 24    | Centumnodia                      | 4.           | 128   |
| Carthamus                        | 4. | 232   | Cepæ                             | 4.           | 40    |
| Carub. Carnub. v. Siliqua.       |    |       | Cera                             | 5.           | 337   |
| Carum, Carvi, Careum             | 4. | 37    | Cerasa                           | 4.           | 41    |
| Caryophyllata                    | 4. | 39    | Cerata, Cerota                   | 2.           | 139   |
| Caryophylli Aromatici            | 4. | 38    | Cerata, Ceratonia v. Siliquæ.    |              |       |
| Caryophyllus hortensis           | 4. | 38    | Ceratites v. Unicornu fossile.   |              |       |
| Cassamum verum Cord.             | 4. | 24    | Cerebrum                         | 5.           | 297   |
| Cassia folium                    | 4. | 97    | Cerefolium                       | 4.           | 41    |
| Cassia arom. v. Cinam.           |    |       | Cremen                           | 5.           | 287   |
| Cassia fistula nigra             | 4. | 232   | Cerusa                           | 3.           | 391   |
| Cassutha, Cassuta                | 4. | 58    | ♀ ij.                            | 3.           | 249   |
| Castanea                         | 4. | 39    | Ceryus, Cerva                    | 5.           | 281   |
| Castor, Castorium                | 4. | 279   | Cervi spina v. Spina infectoria. |              |       |
| Castrangula                      | 4. | 154   | Cervus volans v. Scarabæus.      |              |       |
| Cataplasmatum historia           | 2. | 164   | Ceterach v. Scolopendrium.       |              |       |
|                                  |    |       | Cerus, te                        | 5.           | 326   |
|                                  |    |       | Bbbbbbb                          |              | Camo- |

# INDEX RERUM.

|                        |       |      |                                  |        |     |
|------------------------|-------|------|----------------------------------|--------|-----|
| Camomilla, Chamomilla  | 4.    | 43   | Citrus                           | 4.     | 48  |
| Chalcitis              | 3.    | 455  | Citrullus                        | 4.     | 49  |
| Chalta alpina          | 4.    | 20   | Claretum                         | 1.     | 7   |
| Chalybis preparatio    | 3.    | 377  | Claretum & ale laxativum         | 2.     | 228 |
| Chamæcissus            | 4.    | 79   | Clematis Indica                  | 4.     | 50  |
| Chamæcyparissus        | 4.    | 57   | daphonides v. yinca.             |        |     |
| Chamædrys              | 4.    | 42   | Climia, Chlimia                  | 3.     | 458 |
| assurgens v. Teucrium. |       |      | Clyffus                          | 3.     | 440 |
| Chamæpitys             | 4.    | 42   | Clysterium historia              | 2.     | 167 |
| Chamæleon              | 4.    | 36   | Cnicus                           | 4.36.  | 232 |
| Chamælea               | 4.    | 243  | Coagulorum histor.               | 2.     | 125 |
| Charophyllum           | 4.    | 41   | Cobaltum                         | 3.     | 455 |
| Chelidonium majus      | 4.    | 43   | Coccum gnidium                   | 4.     | 243 |
| minus                  |       | 4.44 | Coccum infectorium               | 4.     | 44  |
| Chelonites lap.        | 5.    | 273  | Cochlea                          | 5.     | 285 |
| Chelapa v. Jalapa.     |       |      | Cochlearia                       | 4.     | 49  |
| Chermes                | 4.    | 44   | Colligendorum nativorum mod.     | 1.     | 67  |
| Cheiri                 | 4.    | 45   | Colchicum alb. v. Hermodactylus. |        |     |
| China, Chinna          | 4.    | 45   | Collymus lap.                    | 3.     | 343 |
| Chrysanthemum          | 4.20. | 34   | Collyria                         | 1.7.2. | 298 |
| Chrysolithos           | 3.    | 327  | Collyrium Bruni                  | 2.     | 52  |
| Chrystallus ex aceto   | 4.    | 182  | Viride                           | 2.     | 153 |
| Cicada                 | 5.    | 340  | Colocynthis                      | 4.     | 234 |
| Cicendula              | 5.    | 340  | Colophonia                       | 4.     | 193 |
| Cicer                  | 4.    | 45   | Colorum differentia              | 1.     | 83  |
| Ciconia                | 5.    | 315  | Colubrina                        | 4.     | 29  |
| Cichorium, cicorea     | 4.46. | 64   | Columba                          | 5.     | 316 |
| Cicuta, cicutaria      | 4.    | 47   | Coma aurea v. Stæchas citr.      |        |     |
| Cimex                  | 5.    | 341  | Concentus Hippocratis            | 3.     | 313 |
| Cinamomum              | 4.    | 47   | Condit. histor.                  | 2.     | 168 |
| Cinis clavellatus      | 4.    | 230  | Concha                           | 5.     | 327 |
| Cinnabaris historia    | 3.    | 419  | Conchylitum differt à Purpura    | 5.     | 325 |
| Officinarum            | 3.    | 409  | Confectionum histor.             | 2.     | 170 |
| & ii                   | 3.    | 434  | Confectio moschardina            | 2.     | 171 |
| Circæa                 | 4.    | 13   | Consolida major v. symphytum.    |        |     |
| Cirsium Italiæ         | 4.    | 31   | media                            | 4.     | 51  |
| Citrægo                | 4.    | 100  | minor, minima                    | 4.     | 131 |
|                        |       |      | Rega-                            |        |     |



# INDEX RERUM.

|                                  |    |              |                                  |          |             |
|----------------------------------|----|--------------|----------------------------------|----------|-------------|
| Regalis                          | 4. | 33           | Crepitus Lupi                    | 4.       | 225         |
| rubra v. Tormentilla.            |    |              | Crespinus                        | 4.       | 27          |
| Saracenica v. Virga aurea.       |    |              | Cresso                           | 4.       | 110         |
| Conservarum histor.              | 2. | 172          | Creta                            | 3.       | 320         |
| Contrayerva                      | 4. | 59           | Crocus                           | 1. 8. 4. | 54          |
| Copal.                           | 4. | 193          | ♂                                | 3.       | 377. & seq. |
| Corallina                        | 4. | 51           | metallorum                       | 3.       | 425         |
| Coralliorum historia             | 3. | 332. & seqq. | ♀.                               | 3.       | 385         |
| solutio                          | 3. | 334          | S. Crucis herba                  | 4.       | 111         |
| Corpus principium Essentiale     | 1. | 19           | Crustaceorum offic. series       | 2.       | 119         |
| Coriandrum                       | 4. | 51           | Crytallum minerale saccharatū    | 3.       | 473         |
| Cornelus v. Carneolus.           |    |              | Crytalli lapid. historia         | 3.       | 349         |
| Cornix, Corvus                   | 5. | 317          | Crytalli purgantes               | 3.       | 353         |
| Cornus                           | 4. | 52           | Cubebæ                           | 5.       | 55          |
| Cornum officinalium series       | 2. | 118          | Cucumis, er.                     | 4.       | 49. 56      |
| Corona terræ                     | 4. | 79           | asininus, agrestis v. Elaterium. |          |             |
| Corylus                          | 4. | 52           | Cuculus                          | 5.       | 317         |
| Corticum officinal. series       | 2. | 101          | Cucuphæ                          | 2.       | 277         |
| Costus amarus dulcis comagenius. |    |              | Cucurbita                        | 4.       | 56          |
|                                  | 4. | 53           | Cuminum                          | 4.       | 57          |
| hortorum                         | 4. | 102          | nigrum                           | 4.       | 113         |
| minor                            | 4. | 10           | pratense                         | 4.       | 57          |
| niger                            | 4. | 15           | Æthiopicum                       | 4.       | 13          |
| Coron                            | 4. | 29           | Cuniculus                        | 5.       | 284         |
| Coturnix                         | 5. | 317          | Cunila bubula Plinii             | 4.       | 116         |
| Cotyledon                        | 4. | 69           | Cupressus (arbor)                | 4.       | 57          |
| Cranii historia                  | 5. | 297          | Cupressus (herba)                | 4.       | 57          |
| Calcinat.                        | }  | ibidem       | Cupri historia                   | 3.       | 385         |
| Extractum                        |    |              | Curcuma                          | 4.       | 58          |
| Magister.                        |    |              | Cuscuta                          | 4.       | ibid.       |
| Sal.                             |    |              | Cyanus                           | 4.       | 58          |
| Crassula                         | 4. | 69           | Cyclamen, Cyclaminus             | 4.       | 59          |
| Creatio quid                     | 1. | 15           | Cydonia malus                    | 4.       | 61          |
| Cremor Crytalli                  | 3. | 351          | Cygnus                           | 5.       | 321         |
| Saturni                          | 3. | 392          | Cyma                             | 1.       | 3           |
| Silicis                          | 3. | 356          | Cyminum                          | 4.       | 57          |
| Talci                            | 3. | 359          | Cynoglossum                      | 4.       | 57          |
|                                  |    |              | Cynor-                           |          |             |

# INDEX RERUM.

|                                 |    |       |                                    |           |
|---------------------------------|----|-------|------------------------------------|-----------|
| Cynorrhodos Cynosbatos          | 4. | 59.60 | apophlegmatizans                   | ibid.     |
| Cyparissus                      | 4. | 57    | odontalgicum                       | 2. 24     |
| Cyperus                         | 4. | 60    | refrigerans                        | ibid.     |
| Babylonic.                      | 4. | 72    | Diagtydium, Diacrydium             | 4. 252    |
| Indicus                         | 4. | 58    | Diamarenatum                       | 4. 40     |
| Cyprinus v. Carpio              |    |       | Diapensia v. Sanicula              | 1. 48     |
| Cysteolithos v. Lap. spongiae   |    |       | Diaphoreticum in peracutis         | 2. 150    |
| Cytinus                         | 4. | 76    | Dictamnus alb.                     | 4. 72     |
| D.                              |    |       | Creticus                           | 4. 62     |
| Dactyliscum                     | 4. | 116   | Diphryges                          | 3. 459    |
| Dactyli                         | 4. | 117   | Dipsacus                           | 4. 63     |
| Indici v. Tamarindi             |    |       | Herb. Doria v. Consol. Sarracenia. |           |
| Dact. Idæus v. Lapis lycnis     |    |       | Doronicum                          | 4. 63     |
| Damafricanum                    | 4. | 20    | Austriacum                         | 4. 93     |
| Daphnoides v. mezereum.         |    |       | Doses medicamentorum               | 1. 80     |
| Daucus, Daucum, Daucium         | 4. | 62    | Draco mitigatus, i.e. ♂ dulcis     |           |
| creticus                        | 4. | 103   | Sylvestris                         | 4. 132    |
| cretensis verus                 | 4. | 60    | Dracunculus major                  | 4. 429    |
| Officin. vulgaris               | 4. | 110   | Pratenf.                           | 4. 132    |
| Decoctum historia               | 2. | 173   | Dropaces                           | 2. 201    |
| Decoctum alterans               | 2. | 175   | Dryopetis                          | 5. 305    |
| Decoctum Antimoniale            | 3. | 175   | Dudaim                             | 4. 98     |
| Decoctum Epaticum Epatis vituli | 2. |       |                                    |           |
|                                 |    | 175   | E.                                 |           |
| hystericum, majale, purgans     | 2. |       | Ebenus                             | 4. 436    |
|                                 |    | 176   | Ebulus                             | 4. 64 235 |
| Laxativum                       | 2. | 311   | Ebur v. Elephas,                   |           |
| Splenis bovis                   | 2. | 176   | Ebur fossile v. Unicornu fossile.  |           |
| Delphinum                       | 4. | 33    | Echinus                            | 1. 3      |
| Dens Caballinus                 | 4. | 82    | Echinus animal v. Erinaceus.       |           |
| Dens Leonis v. Taraxac.         |    |       | Echium                             | 4. 31     |
| Dentalium                       | 5. | 328   | Eclegmatum histor.                 | 2. 177    |
| Dentifricia                     | 2. | 224   | Elaphoboscum                       | 4. 120    |
| Diaclysmata                     | 2. | ibid. | Elaphoselinum                      | 4. 123    |
| Diaclyisma ad gingivas          | 2. | 224   | Elaterium                          | 4. 253    |
| ad faucium inflammationem       | 2. |       | Elatine                            | 4. 79     |
|                                 |    | 225   | Eleagnon                           | 4. 10     |
|                                 |    |       | Electuarius histor.                | 2. 168    |
|                                 |    |       | Electua-                           |           |



# INDEX RERUM.

|                          |       |     |                                |       |          |
|--------------------------|-------|-----|--------------------------------|-------|----------|
| Electuarium Pseudo-acori | 2.    | 180 | Nephriticum                    | 2.    | 189      |
| Alexipharmacum           | 2.    | 180 | Pestilential                   | 2.    | 189      |
| de Ciconia               | 2.    | 181 | Proprietat.                    | 2.    | 189      |
| de Allio                 | ibid. |     | Syncopticum                    | 2.    | 190      |
| Antimonial.              | 2.    | 186 | Uterinum                       | 2.    | 190      |
| Diafarum                 | 2.    | 186 | Vitæ Querc. majus              | 2.    | 191      |
| Camphoratum              | 2.    | 182 | minus                          | 2.    | 192      |
| Chalybeatum              | 2.    | 182 | Elleborus alb. & niger         | 4.    | 235, 238 |
| Corroborans              | ibid. |     | Elminthes v. Lumbric. terrest. |       |          |
| Cordiale                 | 2.    | 183 | Embrocha                       | 1.    | 9        |
| De Croco                 | 2.    | 183 | Empetrum                       | 4.    | 81, 144  |
| Diaphoreticum            | 2.    | 183 | Emplastrorum histor.           | 2.    | 193      |
| Hystericum               | 2.    | 184 | Antipodagricum                 | 3.    | 354      |
| Nucum                    | 2.    | 184 | Arthriticum                    | 2.    | 194      |
| Orvietanum               | 2.    | 184 | Cephalicum                     | 2.    | 195      |
| Contra Phthisin          | 2.    | 185 | Diaphoreticum                  | 2.    | 195      |
| Regum                    | ibid. |     | Febrifugum                     | 2.    | 195      |
| Podagricum               | 2.    | 185 | ad Fontinellas                 | 2.    | 196      |
| Scorbuticum              | ibid. |     | Gummatum                       | 2.    | 196      |
| Purgans                  | 2.    | 186 | ad Herniam                     | 2.    | 196      |
| de Tamarindis            | 2.    | 186 | Magneticum                     | ibid. |          |
| Elemi. v. Gummi          | 4.    | 193 | Mundificatum                   | 2.    | 197      |
| Elemium v. Enula.        |       |     | Oppodeldoch                    | 2.    | 197      |
| Eleo saccharum           | 1.    | 8   | Saturninum                     | 2.    | 198      |
| Eleoselinum              | 4.    | 18  | ad Scyrrhos                    | 2.    | 109      |
| Elephas, Elephantis      | 5.    | 285 | Splenetic.                     | 2.    | 199      |
| Elixirium histor.        | 2.    | 187 | Sticticum                      | 2.    | 199      |
| Elix. alliatum           | 2.    | 187 | Diasulphur.                    | 2.    | 200      |
| antepilept.              | 2.    | 188 | Stomachicū de Tacamah.         | 2.    | 201      |
| Camphoræ                 | 2.    | 188 | ad Tophos & gumm.              | 2.    | 201      |
| Citri                    | 2.    | 187 | Vesicatorium                   | ibid. |          |
| Crytalli                 | 3.    | 350 | Emulsionum histor.             | 2.    | 202      |
| Epilepticum              | 2.    | 188 | Emulsio nephro catartica       | 2.    | 203      |
| Juniper.                 | 4.    | 89  | ad acrimoniam                  | ibid. |          |
| Lazuli                   | 3.    | 353 | expulsiva                      | ibid. |          |
| Ludi                     | 3.    | 349 | refrigerans                    | ibid. |          |
| Mumiæ                    | 5.    | 294 | Endivia                        | 4.    | 64       |
|                          |       |     | Ccc ccc c                      |       | Enta-    |

# INDEX RERUM.

|                                |    |              |  |  |                       |    |           |  |
|--------------------------------|----|--------------|--|--|-----------------------|----|-----------|--|
| Entalium v. Dentalium.         |    |              |  |  | Cornuum               | 2. | 211       |  |
| Enula                          | 4. | 80           |  |  | Fellis                | 2. | 211       |  |
| Epatica, alba, aurea, nobilis  | 4. | 65           |  |  | Florum                | 2. | 208       |  |
| stellata, stellaria            | 4. | 65           |  |  | Fructuum              | 2. | 209       |  |
| Ephemerum                      | 4. | 93           |  |  | Geminarum             | 3. | 327       |  |
| Epithematum histor.            | 2. | 205          |  |  | Gummatum              | 2. | 211       |  |
| Epithema Cordiale              |    | ibid.        |  |  | Herbarum              | 2. | 208       |  |
| Eparicum                       | 2. | 205          |  |  | Lignorum & Cortic.    | 2. | 210       |  |
| Febrile                        | 2. | 205          |  |  | Ossium                | 2. | 211       |  |
| Epithymum                      | 4. | 239          |  |  | Radicum               | 2. | 209       |  |
| Equus, Equa                    | 5. | 285          |  |  | Resinarum             | 2. | 210       |  |
| Equicervus                     | 5. | 267          |  |  | Stercorum             | 2. | 211       |  |
| Equisetum, cauda equina        | 4. | 65           |  |  | Hinc                  |    |           |  |
| Erinaceus                      | 5. | 286          |  |  | Agallochi             | 4. | 10        |  |
| Errhima                        | 2. | 203          |  |  | Benedictum            | 2. | 210       |  |
| Eruca (herba)                  | 4. | 65           |  |  | Bezoarticum Querc.    | 2. | 212       |  |
| Eruca (animal)                 | 5. | 341          |  |  | Catholica             | 2. | 220. 221  |  |
| Eryngium                       | 4. | 66           |  |  | Chalybeatum           | 2. | 213       |  |
| Erysimum                       | 4. | 66           |  |  | Esulæ                 | 4. | 240       |  |
| Esula                          | 4. | 239          |  |  | Fellis humani         | 5. | 299       |  |
| Essentia                       | 1. | 9            |  |  | Hystericum            | 2. | 213. 214  |  |
| Essentia seu Elix. Crystalli   | 3. | 351          |  |  | Liquida               | 2. | 212       |  |
| Corallorum                     | 3. | 337          |  |  | Marcastæ              | 3. | 457       |  |
| Gemmarum                       | 3. | 326          |  |  | Mechoac.              | 4. | 243       |  |
| L. Lazuli                      | 3. | 353          |  |  | Nasale                | 2. | 204       |  |
| Perlarum                       | 3. | 344          |  |  | Opii                  | 4. | 202       |  |
| Saphiri                        | 3. | 330          |  |  | Panchymagoga          | 2. | 221. seq. |  |
| Sulphuris                      | 3. | 509          |  |  | Pestilentielle        | 2. | 214       |  |
| Theriaceæ                      | 2. | 215          |  |  | Pulmonum              | 2. | 215       |  |
| Eufragia, Euphragia, sia       | 4. | 67           |  |  | Pulverisand.          | 2. | 212       |  |
| Eupatorium                     | 4. | 10. 67       |  |  | Purgantia             | 2. | 220       |  |
| Euphorbium                     | 4. | 254          |  |  | Satyrii               | 2. | 215       |  |
| Exollis (piscis)               | 5. | 329          |  |  | Theriaceæ             | 2. | 215       |  |
| Experientia indicat vires med. | 1. | 86           |  |  | Viscosa               | 2. | 215       |  |
| Extractorum histor.            | 2. | 285. & seqq. |  |  | Uterinum              | 2. | 219       |  |
| Extracta Aromaticum            | 2. | 210          |  |  | Faba.                 |    |           |  |
| Carnis                         | 2. | 210          |  |  | F.                    | 4. | 68        |  |
|                                |    |              |  |  | Faba inversa, Fabaria | 4. | 69        |  |
|                                |    |              |  |  | Suilla                |    |           |  |



# INDEX RERUM.

|                                     |    |        |
|-------------------------------------|----|--------|
| Suilla                              | 4. | 82     |
| Facultates ad crescent. requisitæ   | 1. | 21     |
| Farfara, Farfarella v. Tussilago.   |    |        |
| Farina                              | 2. | 222    |
| Farrago                             | 4. | 155    |
| Febrifuga                           | 4. | 40     |
| Antefribile Crollii                 | 5. | 328    |
| Fecularum histor.                   | 2. | 123    |
| Felis                               | 5. | 230    |
| Fel terræ                           | 4. | 40     |
| Fella officinilia                   | 2. | 121    |
| Ferri histor.                       | 3. | 377    |
| Fiber                               | 5. | 279    |
| Fibræ                               | 1. | 3      |
| Ficaria, Ferraria                   | 4. | 44.154 |
| Ficedula                            | 5. | 317    |
| Ficus                               | 4. | 69     |
| Figura rei quid?                    | 1. | 83     |
| Filipendula                         | 4. | 69     |
| Filix                               | 4. | 70     |
| Filicula capillaris v. Trichomanes. |    |        |
| Fistici                             | 4. | 126    |
| Flos amoris                         | 4. | 13     |
| Frumenti                            | 4. | 59     |
| Regius                              | 4. | 33     |
| Trinitatis v. Jacea.                |    |        |
| Flores Chymicorum                   | 2. | 223    |
| Officinales                         | 2. | 102    |
| Flores Benzoin                      | 4. | 188    |
| Corallorum                          | 3. | 340    |
| Perlurum                            | 3. | 345    |
| Jovis                               | 3. | 369.   |
| Martis                              | 3. | 383    |
| ♂ ii                                | 3. | 407    |
| Solis                               | 3. | 469    |
| Solis                               | 3. | 372    |

|                                                       |      |         |
|-------------------------------------------------------|------|---------|
| Sulphuris                                             | 3.   | 502     |
| Veneris                                               | 3.   | 386.388 |
| Fœniculum                                             | 4.   | 70      |
| Porcinum                                              | 4.   | 113     |
| Fœnugræcum                                            | 4.   | 70      |
| Fœnum Chamælorum v. Scænanthum.                       |      |         |
| Folia seu herbæ officinal.                            | 2.   | 103     |
| Folium Indum v. Malabathr.                            | 4.   | 97      |
| Folliculus                                            | 1.   | 3       |
| Formæ principium extinguitur morte violenta non perit | 5.1. | 2.      |
| Formica                                               | 5.   | 341     |
| Formulæ medicamentorum                                | 1.   | 77      |
| Fornacum histor.                                      | 1.   | 51      |
| Fraga                                                 | 4.   | 71      |
| Fragaria                                              | 4.   | 71      |
| Fragula                                               | 4.   | 71      |
| Frangula                                              | 4.   | 241     |
| Fraxinella                                            | 4.   | 72      |
| Fraxinus                                              | 4.   | 71      |
| Fructus officinales                                   | 2.   | 107     |
| Frutex                                                | 1.   | 3       |
| Fuga Demonum                                          | 4.   | 83      |
| Fuligo                                                | 4.   | 194     |
| Fumaria                                               | 4.   | 72      |
| Fumaria bulbosa                                       | 4.   | 73      |
| Fumus terræ                                           | 4.   | 72      |
| Fungi officialis                                      | 2.   | 108     |

## G.

|             |    |     |
|-------------|----|-----|
| Gagates     | 3. | 514 |
| Galanga     | 4. | 73  |
| Galbanum    | 4. | 195 |
| Galega      | 4. | 74  |
| Galeopsis   | 4. | 154 |
| Galerita    | 5. | 313 |
| Gallium     | 4. | 74  |
| Gallitricam | 4. | 82  |

Cccccc 2

Gallus

# INDEX RERUM.

|                                    |            |         |                                        |    |     |
|------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------|----|-----|
| Gallus, Gallina                    | 5.         | 317     | Grus                                   | 5. | 319 |
| Galiopsis v. utrica mortua         | 4.         | 178     | Gryllus                                | 5. | 342 |
| Galreda                            | 1.         | 9       | Gaujacum, Gaujacan                     | 4. | 78  |
| Gattaria herba                     | 4.         | 111     | Gummi-resinæ officinales               | 4. | 116 |
| Gargarismorum histor.              | 2.         | 224     | Gummata officinalia                    | 2. | 117 |
| Gelsemium                          | 4.         | 85      | Gutta Gramandra, v. Ghitta Jemou.      |    |     |
| Gemmarum histor. & præp. videlicet |            |         | Gummi, Gotta, de Peru v. Ghitta Jemou. |    |     |
| Sal. Magist. Liq. & Tinct.         | 3.         | 326     | Gummi Ammoniacum                       | 4. | 182 |
| Gemini                             | 1.         | 30      | Animæ                                  | 4. | 183 |
| Generatio quid                     | 1.         | 15      | Arabic.                                | 4. | 184 |
| Generatio analogica                | 1.         | 17      | Joviale                                | 3. | 396 |
| Geniculum                          | 1.         | 3       | H.                                     |    |     |
| Genista                            | 4.         | 74      | Hæmatites lapis                        | 3. | 351 |
| Gentiana                           | 4.         | 75      | Hager, Hagiæ lapis                     | 3. | 346 |
| Geranium                           | 4.         | 75      | Halcyon v. Alcedo.                     |    |     |
| Ghitta Jemou                       | 4.         | 552     | Halec                                  | 5. | 329 |
| Gialappa v. Jalapa.                |            |         | Halicacabus v. Alkekengi               | 4. | 11  |
| Gigiber v. Zingiber.               |            |         | Handel, Handhal v. Colocynthis.        |    |     |
| Gingydium                          | 4.         | 41      | Harengus                               | 5. | 329 |
| Gladiolus caruleus                 | 4.         | 86      | Hast v. Thymus.                        |    |     |
| Luteus                             | 4.         | 7       | Hedera arborea                         | 4. | 80  |
| Glycyrrhiza                        | 4.         | 76      | terrestris                             | 4. | 79  |
| Glans Unguentaria                  | 4.         | 24      | Helenium                               | 4. | 80  |
| Gobius                             | 5.         | 330     | Helenium comagen.                      | 4. | 53  |
| Gossypium                          | 4.         | 29      | Helleborus v. Elleborus.               |    |     |
| Gramen                             | 4.         | 76      | Helleborastrum v. Elleb. niger.        |    |     |
| Granatus (lapis)                   | 3.         | 328     | Helleborine v. ibidem.                 |    |     |
| Granata malus                      | 4.         | 77      | Helxine                                | 4. | 119 |
| Granum & coccus baphica            | Gr. Tinct. |         | Hepatica saxatilis                     | 4. | 92  |
|                                    | 4.         | 44      | Hepaticum trifolium                    | 4. | 64  |
| Granum Ben.                        | 4.         | 24      | Vide & Epaticam.                       |    |     |
| Regium v. Cataputia.               |            |         | Heptaphyllon v. Tormentilla.           |    |     |
| Grana Paradyfi v. Cardamomum.      |            |         | Heraclea v. Sideritis.                 |    |     |
| Tiglia, Tilli, v. Ricinus Amer.    |            |         | Herbæ officinales                      | 2. | 103 |
| Gratia Dei                         | 4.         | 76, 241 | Herba benedicta                        | 4. | 39  |
| Gratiola                           | 4.         | 241     | Cancri                                 | 4. | 81  |
| Grossularia                        | 4.         | 138     | Cani-                                  |    |     |



# INDEX RERUM.

|                              |             |         |                                     |                 |      |
|------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------|-----------------|------|
| Canicularis                  | 4.          | 82      | Peruvianus                          | 4.              | 112  |
| S. Crucis                    | 4.          | 111     | Hypericum                           | 4.              | 83   |
| Equinalis                    | 4.          | 65      | Hypocistis                          | 4.              | 196  |
| Julia                        | 4.          | 10      | Hystopus                            | 4.              | 48   |
| Kunigundis                   | 4.          | 67      | Agrestis v. Thymbra.                |                 | 150  |
| Muralis                      | 4.          | 119     | Huso (piscis)                       | 5.              | 329  |
| Paralyfis                    | 4.          | 130     | I.                                  |                 |      |
| Paris                        | 4.          | 119     | Jabona                              | 4.              | 98   |
| Pedicularis v. Staphisagria. |             |         | Jacea 484. nigra                    | 4.              | 163  |
| Perforata                    | 4.          | 83      | Jalapa, pium                        | 4.              | 242  |
| Regia                        | 4.          | 20      | Ibiscus                             | 4.              | 12   |
| Ruberti                      | 4.          | 76      | Ichthiocola                         | 5.              | 329  |
| Trinitatis v. Jacea.         |             |         | Ignis s. vita Principium essentiale |                 |      |
| Turca Lob.                   | 4.          | 81      |                                     | 1.              | 19   |
| Hercules Bovii               | 3.          | 404     | Illex coccifera                     | 4.              | 44   |
| Hermodactylus                | 4.          | 241     | Imperatoria                         | 4.              | 85   |
| Herniaria                    | 4.          | 81      | Jasminum Jesminum, Josminum         |                 |      |
| Hieracium                    | 4.          | 46. 165 |                                     | 4.              | 85   |
| Hinnulus v. Cervus           |             |         | Illecebra                           | 4.              | 172  |
| Hippacen                     | 5.          | 285     | Influentia stellarum                | 1. 24. 25. seq. |      |
| Hippolithus                  | 4.          | 286     | Infusionum historia                 | 2.              | 226  |
| Hippofelinum                 | 4.          | 92      | Infusio cholephlegmagoga            | 2.              | 227  |
| Hippuris                     | 4.          | 65      | Inguinalis                          | 4.              | 66   |
| Hircus v. Capra.             |             |         | Injectiones penis                   | 2.              | 168  |
| Hirudo                       | 5.          | 342     | Instrumenta pharmacopœtica          | 1.              | 49   |
| Hirundo                      | 5.          | 320     | Intybus                             | 4.              | 46   |
| Hirundinaria                 | 4. 43. 114. | 173     | Sativa                              | 4.              | 64   |
| Hispidula                    | 4.          | 81      | Agrest.                             | 4.              | 46   |
| Hædus                        | 5.          | 276     | Jovis barba v. Sedu.                |                 |      |
| Hæmonitis v. Scolopendr.     |             |         | Iringus                             | 4.              | 66   |
| Homo                         | 5.          | 287     | Irio                                | 4.              | 66   |
| Hordeum                      | 4.          | 82      | Iris (gemma)                        | 3.              | 349  |
| Horminum                     | 4.          | 82      | Iris carulea Germ.                  | 4.              | 85   |
| Hyacinthus                   | 5.          | 328     | Illyrica, Florent.                  | 4.              | 86   |
| Hydrargyros                  | 3.          | 397     | Palustris                           | 4.              | 8    |
| Hydropiper                   | 4.          | 122     | Isopushumida                        | 5.              | 304  |
| Hyosciamus                   | 4.          | 82      | Iya arthetica                       | 4.              | 42   |
|                              |             |         | Ccccccc 1                           |                 | Juba |

# INDEX RERUM.

|                                 |    |     |                                   |            |
|---------------------------------|----|-----|-----------------------------------|------------|
| Juba                            | 1. | 3   | Hortense v. Spinachia.            | 161        |
| Juglans                         | 4. | 86  | Lapides nativi                    | 2. 98      |
| Jujubæ                          | 4. | 87  | Lapides officinales               | 1. 120     |
| Juleborum histor.               | 2. | 229 | minus pretiosi                    | 3. 345     |
| Julus                           | 1. | 4   | Lapides medicamentales præparati. |            |
| Juncus odoratus v. Schænanthū   | 1. | 52  |                                   | 2. 230     |
| Juniperus                       | 4. | 88  | Lapis corrosivus                  | 2. 231     |
| Jupiter planera                 | 1. | 27  | Salutis                           | ibid.      |
| Jupiter i. e. Stannum           | 3. | 394 | Magnes arsenicalis                | ibid.      |
| Diaphoreticus                   | 3. | 395 | Mirabilis                         | 2. 232     |
| Jusquiamus                      | 4. | 82  | Lapidum histor.                   | 3. 343     |
| K.                              |    |     | Lapis aquilæ                      | 3. 345     |
| Kermes                          | 4. | 44  | Armenus                           | 3. 346     |
| Keyri                           | 4. | 45  | Ceruleus, Cyanos i. e. L. Laz.    |            |
| Kici v. Ricinus                 |    |     | Calaminaris                       | 3. 348     |
| Herb. S. Kunigundis             | 4. | 66  | Calcarius                         | 3. 347     |
| L.                              |    |     | Corrosivus                        | 4. 231     |
| Labdanum v. Ladanum             |    |     | Fossilis i. e. Specularis.        |            |
| Labrum Veneris                  | 4. | 63  | Heracleus, Hercules v. magn.      |            |
| Lac ejusque serum               | 2. | 202 | Ignis Basil.                      | 3. 451     |
| Lac amygdalarum                 | 2. | 201 | Judaicus                          | 3. 352     |
| Saturni                         | 3. | 390 | Lazuli                            | 3. ibid.   |
| Sulphuris                       | 3. | 504 | Lyncis                            | 3. 353     |
| Virginis                        | 2. | 154 | Lyncurius Veterum                 | 4. 354     |
| Lacca                           | 4. | 196 | Magnes arsenicalis                | 2. 231     |
| Lacertus                        | 5. | 342 | Medicamentosi.                    | 2. 231 232 |
| Lacryma                         | 1. | 4   | Mirabilis                         | 2. 232     |
| Lactuca                         | 4. | 89  | Nephriticus                       | 3. 329     |
| Ladanum                         | 4. | 197 | Ossifragus                        | 3. 355     |
| Lagena Lupi                     | 4. | 20  | Prasinus i. e. Smaragd.           | 3. 331     |
| Lagopus                         | 4. | 90  | Prunellæ                          | 3. 473     |
| Laminum labeo v. urtica mortua. |    |     | Rebus                             | 2. 232     |
| Lampyris alata                  | 5. | 340 | Sabulosus i. e. Ossifragus.       |            |
| Lanaria v. Verbascum.           |    |     | Salutis                           | 1. 231 232 |
| Lanugo                          | 1. | 4   | Specularis                        | 3. 356     |
| Lanugo perlata                  | 3. | 407 | Spongiæ                           | 3. 357     |
| Lapathum                        | 4. | 90  | Syriacus v. Judaicus              |            |

Vege-



# INDEX RERUM.

|                            |            |          |                                   |    |        |
|----------------------------|------------|----------|-----------------------------------|----|--------|
| Vegetabilis                | 2.         | 230      | Ligustum                          | 4. | 92.157 |
| Lappa                      | 4.         | 25       | Ligustrum                         | 4. | 93     |
| Larix                      | 4.         | 90       | Lilium                            | 4. | 93     |
| Lasericum v. Asa foetida.  |            |          | Convallium                        | 4. | 94     |
| Lasercitium Germa.         | 4.         | 85.92    | Paracelsi                         | 3. | 448    |
| Lathyrus v. Cataputia.     |            |          | inter Spinas                      | 4. | 35     |
| Lavendula v. Spica         | 4.         | 160      | Limax v. Cochlea                  | 5. | 285    |
| Laudanum facile            | 2.         | 184      | Limensium Centauroides v. Gratio. |    |        |
| Male                       | 2. 224. 3. | 369. 408 | Limonia mala                      | 4. | 94     |
| opiatum v. in opio.        | 4.         | 203      | Limonium v. pyrola.               |    |        |
| Laver                      | 4.         | 15       | Linaria                           | 4. | 95     |
| Odoratum                   | 4.         | 110      | Linctus                           | 2. | 177    |
| Laurus                     | 4.         | 91       | Lingua canina                     | 4. | 59     |
| Laureola v. Mezereum.      |            |          | Cervina v. Scolopendrium          |    |        |
| Laxativum minerale         | 3.         | 411      |                                   |    | 149    |
| Ledum v. Ladanum.          |            |          | Linimentorum histor.              | 2. | 301    |
| Lens palustris, Lenticula  | 4.         | 91       | Linimentum de amiantho            | 2. | 306    |
| Lentiscus                  | 4.         | 91       | Saturni                           | 2. | 305    |
| Leo signum caeleste        | 1.         | 13       | dentificium                       | 2. | 306    |
| Lepus                      | 2.         | 299      | Errhinum                          | 2. | 206    |
| Leucanthemum               | 4.         | 43       | Linum                             | 4. | 95     |
| Leucojum                   | 4.         | 45       | Liquidambra                       | 4. | 198    |
| Levisticum                 | 4.         | 92       | Liquiritia                        | 4. | 76     |
| Libanotis                  | 4.         | 141      | Liquores                          | 2. | 233    |
| Libra signum caeleste      | 1.         | 31       | Lithontripticus                   |    | ibid.  |
| Libysticum                 | 4.         | 92       | ad Ulcera                         |    | ibid.  |
| Linaria v. Urtica mortua   | 4.         | 178      | Lithargyrium                      | 3. | 459    |
| Lichen petraeus, saxatilis | 4.         | 92       | Lithospermum                      | 4. | 104    |
| Lichenes equeorum          | 5.         | 285      | Loch                              | 2. | 177    |
| Ligna officinalia          | 2.         | 209      | Loch de Cassia pro clyst.         | 2. | 177    |
| Lignum Aloes               | 4.         | 9        | Loch passulatum                   | 2. | 178    |
| Colubrinum serpentarium    |            |          | Loculamenta                       | 1. | 4      |
|                            | 4.         | 50       | Locusta                           | 5. | 343    |
| Guajacum, Sanctum          | 4.         | 78       | Locus asservandorum medicamento-  |    |        |
| Indum                      | 4.         | 78       | rum                               | 1. | 70     |
| Nephriticum                | 4.         | 111      | generandorum medic.               | 1. | 37     |
| Santalum                   | 4.         | 148      | Pharmacopœticus                   | 1. | 53     |
|                            |            |          | Locus                             |    |        |

# INDEX RERUM.

|                               |    |     |                         |        |
|-------------------------------|----|-----|-------------------------|--------|
| Locus variat vires            | 1. | 85  | Butyraceum              | ibid.  |
| Locus urbana                  | 4. | 100 | Brytalli                | 3. 350 |
| Hortensis                     | 4. | 95  | Plumaceum               | ibid.  |
| Lozongæ                       | 1. | 10  | Gemmarum                | 3. 326 |
| Lucanus v. Scarabæus          |    |     | Granati                 | 3. 328 |
| Lucius                        | 5. | 329 | Jovis                   | 3. 395 |
| Ludus, i. e. calculus humanus |    |     | Lap. armen.             | 3. 346 |
| Ludi oleum                    | 5. | 294 | Calaminaris             | 3. 348 |
| Lujula                        | 4. | 7   | Judaici                 | 3. 352 |
| Lumbrici terreni              | 5. | 343 | Lazuli                  | 3. 353 |
| Intestinalium                 | 5. | 344 | Lithargyrii             | 3. 459 |
| Lumen Naturæ                  | 1. | 18  | Martis                  | 3. 383 |
| Luna, i. e. Argentum.         |    |     | Marcastæ                | 3. 456 |
| Luna planeta                  | 1. | 28  | Perlarum                | 3. 343 |
| Luna potabilis                | 3. | 375 | Saturni                 | 3. 390 |
| Lupinis                       | 4. | 67  | Solis Basil.            | 3. 372 |
| Lupus chymicis est ☿          | 3. | 421 | Succini                 | 3. 512 |
| Lupus animal                  | 5. | 301 | Talci                   | 3. 359 |
| Lupus piscis v. Lucius.       |    |     | Terrarum                | 3. 316 |
| Lupulus                       | 4. | 96  | Terræ sigillatæ         | 3. 318 |
| Luteum                        | 4. | 74  | Tartari                 | 4. 212 |
| Lux Essentialis               | 1. | 20  | Urinæ                   | 5. 290 |
| Lybisticum                    | 4. | 91  | Magistrantia            | 4. 87  |
| Lychnis                       | 4. | 59  | Magnes                  | 3. 354 |
| Lycium                        | 4. | 198 | Arsenicalis             | 2. 231 |
| Lycopodium                    | 4. | 108 | Magnesia Hi, i. e. ☿    | 3. 421 |
| Lycopus                       | 4. | 35  | Majorana                | 4. 96  |
| Lynx                          | 5. | 301 | Mala                    | 4. 128 |
| M.                            |    |     | Aurantia                | 4. 23  |
| Marca perlarum                | 5. | 330 | Citria, medica, Assyria | 4. 48  |
| Macrocosmi nutritio           | 1. | 16  | Cotena                  | 4. 60  |
| Macerveterum                  | 4. | 106 | Punica                  | 4. 77  |
| Magisteriorum histor.         | 2. | 234 | Persica                 | 4. 121 |
| Magisterium Aluminis          | 3. | 479 | Malabathrum             | 4. 97  |
| Boli                          | 3. | 320 | Malaguetta              | 4. 35  |
| Chalybis                      | 3. | 379 | Malicorium              | 4. 78  |
| Corallorum                    | 3. | 336 | Malva                   | 4. 97  |

Arbo-



# INDEX RERUM.

|                                |    |             |                                  |    |            |
|--------------------------------|----|-------------|----------------------------------|----|------------|
| Arborea, hortulana, maj. rosea | 4. | 96          | Medullæ Officinales              | 2. | 122        |
| Palustris                      | 4. | 13          | Mel                              | 5. | 334        |
| Malvaviscus                    | 4. | 12          | Arundinaceum cannæ v. Sacch.     |    |            |
| Manati                         | 5. | 327         | Melanthium                       | 4. | 113        |
| Mandragora                     | 4. | 98          | Melasperrum                      | 4. | 113        |
| Manna                          | 4. | 256         | Meses v. Taxus.                  |    |            |
| Cœlestis Quercetani            | 2. | 155         | Melloes Larac. v. Lumbric. terr. |    |            |
| ♂                              | 3. | 382         | Mellochites lapis                | 3. | 346        |
| ♀ ii, i.e. ♂ dulcis solaris    | 3. | 408         | Melilotus                        | 4. | 100        |
| Hi                             | 3. | 392         | Mella officinalia                | 2. | 287. 290   |
| ⊙                              | 3. | 371         | Melissa, melissophyllum          | 4. | 36. 100    |
| ♀                              | 3. | 408         | Melo                             | 4. | 100        |
| Marathrum                      | 4. | 69          | Membranosa partes officinales    | 2. | 118        |
| Marcalita                      | 3. | 456         | Men. Siracost. v. Maana.         |    |            |
| Marga                          | 5. | 320         | Menstrua                         | 2. | 205        |
| Margaritarum histor.           | 3. | 342         | Menstruum universal.             | 2. | 207        |
| Marinelata quid?               | 2. | 126         | Mentha                           | 4. | 101        |
| Marmor                         | 3. | 354         | Corymbifera                      | 4. | 102        |
| Marsi. e. Ferrum               |    |             | Felina non odorifera             | 4. | 111        |
| Mars Planeta                   | 1. | 28          | Saracenica corymb. maj. Græc.    |    |            |
| Marum                          | 4. | 99          | Romana S. Mariæ                  | 4. | 102        |
| Marrubium                      | 4. | 36. 99      | Sativa                           | 4. | 33         |
| Masticatoria                   | 2. | 235         | Mercurialis                      | 4. | 102        |
| Mastiche                       | 4. | 199         | Mercurii Planeta                 | 1. | 29         |
| Mater herbarum                 | 4. | 20          | Mercurii histor.                 | 3. | 397        |
| Perlarum                       | 5. | 330         | Mercurius dulcis                 | 3. | 486        |
| Materia Nativ.                 | 1. | 33          | Mercurius præcipitatus           | 3. | 399. seqq. |
| Materia medicatorum            | 1. | 52          | sublimatus                       | 3. | 406        |
| Matricaria                     | 4. | 99          | Mercurius Jovis                  | 3. | 397        |
| Matrifylva                     | 4. | 35. 65. 100 | Hi                               | 3. | 393        |
| Mechoacanna                    | 2. | 242         | ⊙is                              | 3. | 373        |
| Myra v. Jalapa.                |    |             | Vitæ                             | 3. | 480        |
| Meconium v. Opium              |    |             | Mercurii Liquor                  | 3. | 417        |
| Medesufium v. Ulmaria.         |    |             | Sal                              | 3. | 418        |
| Medulla                        | 1. | 4           | Spiritus s. oleum                | 3. | 414        |
| Medulla Solis                  | 3. | 8           | Sulphur                          | 3. | 416        |
|                                |    |             | Tincturæ                         | 3. | 416        |
|                                |    |             | Ddd ddd d                        |    | Mespi-     |

# INDEX RERUM.

|                                 |    |     |                             |                |
|---------------------------------|----|-----|-----------------------------|----------------|
| Mespilus                        | 4. | 103 | Pectorales                  | ibid.          |
| Metalla                         | 2. | 99  | de Diagydio                 | 2. ibid.       |
| Metallorum historia             | 3. | 360 | de Mechoaca                 | ibid.          |
| Rex                             | 3. | 362 | Morsus Gallinæ              | 4. 12          |
| Semen                           | 3. | 361 | Diaboli v. Succisa.         |                |
| Metallica Excrementa            | 2. | 99  | Moschata                    | 4. 106         |
| Meteora unde                    | 1. | 117 | Moschius, Moschi capreolus  | 5. 301         |
| Metopium v. Ammoniac. vel Galb. |    |     | Moschocation. Moschocarydon |                |
| Metrenchyta                     | 2. | 167 |                             | 4. 106         |
| Meum                            | 4. | 103 | Moracilla                   | 5. 321         |
| Mezereum                        | 4. | 243 | Muria                       | 4. 143. 5. 329 |
| Milium                          | 4. | 104 | Mucharum rosar.             | 4. 140         |
| Solis                           | 4. | 104 | Mus                         | 5. 303         |
| Millefolium                     | 4. | 104 | alpinis                     | ibid.          |
| Millegrana                      | 4. | 81  | major                       | ibid.          |
| Milleguetta                     | 4. | 31  | Terrenus v. Talpa.          |                |
| Millemorb.                      | 4. | 154 | Multipedes                  | 5. 338         |
| Millepedæ                       | 5. | 338 | Mulus                       | 5. 302         |
| Melopepo                        | 4. | 100 | Mumia                       | 5. 294         |
| Milvus                          | 5. | 321 | Mundi regna tria            | 3. 1           |
| Milzadella v. urtica mortua     | 4. | 178 | H. Muralis                  | 4. 119         |
| Minera                          | 1. | 4   | Musca                       | 5. 344         |
| Mineralium historia             | 3. | 313 | Hispanica                   | 5. 344         |
| Materia                         | 1. | 17  | Muscata                     | 4. 106         |
| Minæ Galeni v. Anime.           |    |     | Muscus                      | 1. 4           |
| Minium                          | 2. | 389 | Muscus arboreus             | 4. 107         |
| Dioscoridis                     | 3. | 90  | Capillaris                  | 4. 9           |
| Mity                            | 3. | 455 | Marinus                     | 4. 9           |
| Modus utendi                    | 1. | 777 | Pulmonar.                   | 4. 133         |
| Molga v. Salamandra.            |    |     | Saxatilis                   | 4. 91          |
| Molybdæna                       | 3. | 460 | Terrestris                  | 4. 108         |
| Momordica                       | 4. | 105 | Mustela                     | 5. 330         |
| Moretus                         | 2. | 229 | Myrica v. Tamariscus.       |                |
| Morochtus                       | 3. | 355 | Myrmecium v. Formica.       |                |
| Morus nigra, celsa              | 4. | 105 | Myrobolani                  | 4. 244         |
| Morselli                        | 2. | 236 | Myrrha                      | 4. 200         |
| de Citro                        | 2. | 237 | Trogloditica v. Benzoin.    |                |

Myrtus

Myrtus  
Myrtac  
Myrtillus  
Myza, Myz

Napus  
Napellus M  
Naphtha  
Nardus Ch  
Nardus v. S  
Nasalia  
Nasaphu  
Nasturtium  
ho  
Nativa rep

Hu

M  
Nativa iun

Natura inter

Nemur

Nepeta

Monta

Nephriticus

Nerantia ma

Nicotiana

Nigella N. R

Nodula

Northulor

Norum Cora

Cry

Fixu

Pe



# INDEX RERUM.

Myrtus 4. 109  
Myrtacantha 4. 143  
Myrtillus 4. 108  
Myxæ, Myxaria v. Sebesten.  
N.

Napus 4. 109  
Napellus Moyfes 4. 18  
Naphtha 3. 514  
Nardus Chalta 4. 20  
Nardus v. Spic. Spic. Celtica, Indica.  
Nasalia 2. 251

Nascaphum v. Thymiaa.  
Nasturtium aquaticum 4. 110  
hortense 4. 110

Nativa representantia partes hominis  
1. 86  
Humores in hom. animalia  
bruta 1. 87  
Morbos 88

Nativa sunt 3 vel Macrocosm.  
Vegetab.  
Animal.

2. 93  
Natura internum efficiens 2. 20  
Nenufar 4. 114  
Nepeta 4. 111  
Montana 4. 33  
Nephriticus lapis 3. 329  
Nerantia mala 4. 22  
Nicotiana 4. 114  
Nigella N. Romana odora 4. 113  
Nitedula 5. 340  
Nitri histor. 3. 471  
Nitrum Corallatum 3. 474  
Crystallifatum 3. 472  
Fixum 3. 473  
Perlaturum 3. ibid.

Saturni satum 3. 474  
Vitriolatum 3. 474  
Nitri Tinctura 3. 477  
Nix Diaphoretica 3. 442  
Noctiluca 5. 340  
Noctua 5. 321  
Nodulus 2. 230  
Nodosa foetida 4. 154  
Nomen indicat vites 1. 86  
Nox & dies Orphei 1. 15  
Nux aromatica 4. 106

Juglans 4. 86  
Myristica seu Unguentaria  
4. 106  
Regia 4. 86  
Nustica 4. 106  
Nummularia 4. 114  
Nutritio 1. 16. 17  
Nutrimentum 1. 34  
Nymphæa 4. 114

O.  
Objectum nat. vix plane exuit 1. 85  
Ochra 3. 320  
Ocymum 4. 26  
Ocymastrum 4. 154  
Odorum differentia 1. 82  
Oenanthe 4. 69  
Oesypus 5. 304  
Officina 2. 96  
Olea, Oleaster 4. 115  
Olea cocta 2. 243  
destillata officinalia 2. 238  
Expressa officinalia 2. 242  
Infusa officinalia 2. 243  
Febrifugum 2. 244  
Hyperici 2. 245. 246  
Antipestilentialia 2. 248  
D d d d d d d 2 Pur-

# INDEX RERUM.

|                        |    |          |                                |    |       |
|------------------------|----|----------|--------------------------------|----|-------|
| Purgans                | 2. | 249      | virid. aris                    | 3. | 388   |
| Terræ strig.           | 3. | 312      | Olor                           | 4. | 121   |
| nativa officinalis     | 2. | 115      | Onitis                         | 4. | 116   |
| Oleum Benzoin          | 4. | 189      | Omphacium                      | 4. | 191   |
| Camphoræ               | 4. | 190      | Ononis                         | 4. | 116   |
| Cerebri                | 5. | 299      | Onyx i. e. Alabastrites        | 3. | 345   |
| Corallorum             | 3. | 337      | Onyx i. e. blatta byzantia.    |    |       |
| CrySTALLI i. e. Liquor | 3. | 349      | Ophioscoridon v. Victorialis.  |    |       |
| Gemmarum               | 3. | 326      | Ophites Lap.                   | 3. | 354   |
| Hercleinum             | 4. | 53. 78   | Ophthalmica Cordis             | 4. | 67    |
| Jovis                  | 3. | 396      | Opiatum                        | 1. | 12    |
| Lap. Judaici           | 3. | 352. 353 | Opium                          | 4. | 201   |
| Lazuli                 | 3. | ibid.    | Opobalsamum v. Balsamum verum. |    |       |
| Ludi                   | 3. | 349      | Opoponax                       | 4. | 208   |
| Lithargyrii            | 3. | 459      | Orchis v. Satyrium             | 4. | 150   |
| Myrrha                 | 4. | 201      | Oreoselinum                    | 4. | 122   |
| Marasitæ               | 3. | 456      | Origanum                       | 4. | 116   |
| Mastich.               | 4. | 199      | Orminum                        | 4. | 82    |
| Lupinum                | 5. | 301      | Orvala                         | 4. | ibid. |
| Mumiatum               | 5. | 296      | Ossa officinalia               | 1. | 119   |
| Ovorum                 | 5. | 319      | Ostiocolla                     | 3. | 355   |
| Omphacynum             | 4. | 264      | Ostracis                       | 3. | 458   |
| ♂                      | 3. | 380      | Ostrea                         | 5. | 331   |
| ♂                      | 3. | 391      | Ostrites v. Ostiocolla.        |    |       |
| Philosophorum          | 4. | 115      | Osyris                         | 4. | 95    |
| Salis                  | 3. | 465. 470 | Ovis                           | 5. | 303   |
| Sanguinis              | 5. | 292      | Ostrutium, Ostricium           | 4. | 85    |
| Saphiri                | 3. | 330      | Ova                            | 5. | 319   |
| Silicis                | 3. | 356      | Oxalis                         | 4. | 7     |
| Sulphuris              | 3. | 505      | Oxyacantha                     | 4. | 27    |
| Talci                  | 3. | 358      | Oxylapathum                    | 4. | 90    |
| Tartari                | 4. | 120      | Oxyrrhodynon                   | 1. | 12    |
| Templinum              | 4. | 125      | Oxys, Oxytriphillon            | 4. | 7     |
| Terræ                  | 3. | 515      | Oxyfaccharum Vomitivum         | 1. | 295   |
| è Vipetis              | 5. | 309      |                                |    |       |
| Vitrioli ♂ ris         | 3. | 836      |                                |    |       |

P.

Palma, palm. major 4. 116  
Sylve-



# INDEX RERUM.

|                                     |    |            |                                      |     |         |
|-------------------------------------|----|------------|--------------------------------------|-----|---------|
| Sylvestris v. Tamarindi.            |    | Perfoliata | 4.                                   | 120 |         |
| Palimpissa v. Pix                   | 4. | 209        | H. Perforata                         | 4.  | 82      |
| Paludapium                          | 4. | 18         | Periamma, Periapton                  | 1.  | 12      |
| Palumbus                            | 5. | 322        | Periclymenum, Perfoliatum            | 4.  | 35      |
| Palus sanctus                       | 4. | 78         | Perlæ v. Margaritæ.                  |     |         |
| Panacæa ♂ ii                        | 3. | 400. 409   | Perfica malus                        | 4.  | 121     |
| Nitri                               | 3. | 474        | Perficaria                           | 4.  | 121     |
| Sulphuris ♂ ii                      | 3. | 443        | Personata                            | 4.  | 25      |
| Pancratium v. Scylla.               |    |            | Pes Cati                             | 4.  | 81      |
| Pandaleum                           | 1. | 12         | Leonis                               | 4.  | 11. 108 |
| Panis porcinus                      | 4. | 58         | Leporinus                            | 4.  | 89      |
| Papaver Sativ.                      | 4. | 117        | Lupi                                 | 4.  | 180     |
| Papaver erratic.                    | 4. | 118        | Peffuria, Pessi                      | 2.  | 286     |
| Herba Papav. Senecio.               |    |            | Petasites                            | 4.  | 122     |
| H. Paralysis                        | 4. | 130        | Petroleum                            | 3.  | 514     |
| H. Paris                            | 4. | 119        | Petroselinum, Petr. Vulgare Hortense |     |         |
| Parietaria                          | 4. | ibid.      | Macedonicum                          | 4.  | 123     |
| Parix, Parus                        | 5. | 322        | Montanum                             | 4.  | ibid.   |
| Paronychia                          | 4. | 144        | Petum                                | 4.  | 111     |
| Partes carnosæ officinales          | 2. | 118        | Peucedanum                           | 4.  | 123     |
| Membranosæ offic.                   | 2. | 118        | Pharmacopœia                         | 1.  | 1       |
| Parrhenium                          | 4. | 43. 165    | Phaseolus                            | 4.  | 68      |
| Passer, passer troglotites          | 5. | 322        | Phlegma                              | 1.  | 12      |
| Aquaticus v. Motacilla              | 5. | 321        | Phu v. Valeriana.                    |     |         |
| Passulæ, Passulæ Corinthiæ v. Vitis | 4. | 176        | Phyllirea                            | 4.  | 93. 167 |
| Pastinaca sativa                    | 4. | 119        | Phyllitis v. Scolopendria.           |     |         |
| Sylvestris, erratica                | 4. | 120        | Phyllon arrhenogonon                 | 4.  | 102     |
| Pavo, Pavus                         | 5. | 322        | Phytologia                           | 4.  | 1       |
| Pediculus                           | 5. | 345        | Pica                                 | 5.  | 323     |
| Pentaphyllum                        | 4. | 135        | Pilosella                            | 4.  | 23      |
| Pepo                                | 4. | 100        | Montana hispidula                    | 4.  | 81      |
| Pera pastoris                       | 4. | 31         | Pilularum historia                   | 2.  | 249     |
| Perca                               | 5. | 331        | Pilulæ alterantes offic.             | 2.  | 251     |
| Perdicium                           | 4. | 119        | Purgantes offic.                     | 2.  | 252     |
| Perdis                              | 5. | 323        | Angelicæ Francof.                    | 2.  | 260     |
|                                     |    |            | Dddddd                               | 3   | de      |

# INDEX RERUM.

|                                    |             |     |                              |       |             |
|------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-------|-------------|
| de Ammoniaco                       | 2.          | 252 | Pissasphaltum                | 2.    | 208. f. 294 |
| Arthriticæ                         | 2.          | 253 | Pisselæon                    | 4.    | 209         |
| Æiales                             | 2.          | 254 | Pistacia, Phistacea          | 4.    | 126         |
| Benedictæ                          | 2.          | 253 | Pistolochia                  | 4.    | 73          |
| Cholagogæ de Centaur.              | 2. ib.      |     | Pix                          | 4.    | 208         |
| Diaphoreticæ                       | 2.          | 251 | Pix græca v. Colophonia.     |       |             |
| Diureticæ                          | 2.          | 251 | Placitis                     | 5.    | 458         |
| Antiepilepticæ                     | ibid.       |     | Planetarum fortitudinis      | 1.    | 57          |
| de Esula                           | 2.          | 254 | Influentia                   | 1.    | 24          |
| de Euphorbio                       | 2. ibid.    |     | Planta                       | 1. 4. | 45          |
| Febriles                           | 2. 251. 254 |     | Plantaleonis                 | 4.    | 11          |
| Gummosæ                            | 2.          | 255 | Plantago                     | 4.    | 126         |
| Hydropicæ Bontii                   | 2.          | 255 | alpina                       | 4.    | 20          |
| Hystericæ                          | 2.          | 311 | Plumbago                     | 3.    | 460         |
| Iliacæ                             | 2.          | 256 | Plumbi historia              | 3.    | 389         |
| de Ladano                          | 2.          | 256 | ♀. us                        | 3.    | 391         |
| Marcocostinæ                       | 2.          | 256 | Sal                          | 3.    | 387         |
| Matticales                         |             |     | Olea                         | 3.    | 391         |
| Narcoticæ Plater.                  | 2.          | 252 | Plumbum ustum                | 3.    | 389         |
| Panchymagogæ Q.                    | 2.          | 257 | Pœonia                       | 4.    | 127         |
| Pestilentiales                     | 2.          | 257 | Polygonum                    | 4.    | 128         |
| Antipodagricæ                      | 2.          | 258 | Minus                        | 4.    | 81          |
| Polychrestæ                        | 2.          | 258 | Polygonatum                  | 4.    | 128         |
| de Sagapeno                        | 2. ibid.    |     | Polypodium                   | 4.    | 245         |
| de Styrace                         | 2.          | 252 | Polium                       | 4.    | 57          |
| de Succino Crat.                   | 2.          | 259 | Polytrichum aureum           | 4.    | 9           |
| Tartareæ                           | 2. 259, 260 |     | Vulgo v. Trichomanes.        |       |             |
| ad Tusum                           | 2.          | 252 | Poma ambræ                   | 2.    | 262         |
| Pimpinella                         | 4.          | 124 | Pomum mirabile hierosolymit. | 4.    | 105         |
| Italia, Sangultaria v. Sanguiforba |             | 147 | Pompholyx                    | 3.    | 460         |
| Romana v. Sefeli Cretic.           |             |     | Pomus                        | 4.    | 128         |
| Pinastr                            | 4.          | 125 | Populus                      | 4.    | 229         |
| Pinus, Pineæ                       | 4.          | 125 | Porcelliones                 | 5.    | 338         |
| Pinguedinis officinal.             | 2.          | 112 | Porcus v. Sus                |       |             |
| Piper                              | 4.          | 125 | Porrum, Porr. commune, &c.   | 4.    | 130         |
| Pisces sign. cœlest.               | 1.          | 32  | Portulaca, Porcellana        | 4.    | 130. 172    |
|                                    |             |     | Potentilla                   | 4.    | 17          |
|                                    |             |     | Potio-                       |       |             |



# INDEX RERUM.

|                                    |    |        |                                |    |       |
|------------------------------------|----|--------|--------------------------------|----|-------|
| Potiones                           | 2. | 261    | Psidium                        | 4. | 78    |
| Potio purgans                      | 2. | 261    | Psyllium                       | 4. | 245   |
| sudorifera                         |    | ibid.  | Psarmica                       | 4. | 132   |
| vulneraria                         | 2. | 262    | Pulegium                       | 4. | 133   |
| Præparationum modi & nomina        | 1. | 40     | Pulicaria                      | 4. | 122   |
| Præparata officinalia in specie    | 2. | 264    | Pulmonaria                     | 4. | 133   |
| Præparat. Bolus                    | 3. | 320    | Pulpa                          | 1. | 5     |
| Corall.                            | 3. | 335    | Pulveres alterantes officinal. | 2. | 265   |
| Crystallus                         | 3. | 350    | Purgantes officinal.           | 2. | 274   |
| Gemmæ                              | 3. | 324    | Pulvis Alexiterius             | 2. | 267   |
| Hæmatices                          | 3. | 352    | Angelicus, Algeroth            | 3. | 410   |
| Lap. Armenus                       | 3. | 346    | Artheticus Parac.              | 2. | 274   |
| Judaicus                           | 3. | 352    | Bezoarticus                    | 2. | 268   |
| Lazuli                             | 3. | 353    | Cachecticus Querc.             | 2. | 268   |
| Ostiocolla                         | 3. | 355    | Catharticus pro ossibus        | 2. | 268   |
| Perlæ                              | 3. | 342    | Cholagogus                     | 2. | 274   |
| Rubinus                            | 3. | 330    | Corallor. Vitriolatus          | 3. | 335   |
| Saphirus                           | 3. | ibid.  | Cornachinus                    | 2. | 274   |
| Sardus                             | 3. | 331    | de Cypero odoriferus           | 2. | 269   |
| Succinum                           | 3. | 511    | ad defluxiones                 | 2. | 269   |
| Terra sigillata                    | 3. | 318    | Dentifricius                   | 2. | 269   |
| <i>Plura vide lib. 2. cap. 76.</i> |    |        | Dysentericus Croll.            | 2. | 269   |
| Primula veris                      | 4. | 26.130 | Anti Epilepticus               | 2. | 270   |
| Principia rerum essentialia        | 1. | 18     | Febrilis                       | 2. | ibid. |
| artificialia & chymica             | 1. | 45     | Melanagogus                    | 2. | 274   |
| cognitiones                        | 1. | 18     | Panchymagogus                  | 2. | ibid. |
| Productiones nativæ                | 1. | 15     | Passavanticus                  | 2. | 275   |
| earum causa interna                | 1. | 20     | Phlegmagogus Querc.            | 2. | ibid. |
| externa                            | 1. | 21     | Sperniolæ                      | 2. | 272   |
| Propolis                           | 5. | 337    | Sternutatorius                 | 2. | 275   |
| Proprietates faciunt ad cresc.     | 1. | 39     | Stomachicus                    | 2. | 272   |
| Prunus, pruna                      | 4. | 131    | Trithemii                      | 2. | 272   |
| Prunus sylvestr.                   | 4. | 6      | Pumex                          | 3. | 355   |
| Pruneola                           | 4. | 131    | Punica mala                    | 4. | 75    |
| Prunella                           | 4. | 131    | Purpurea                       | 5. | 328   |
| Prunella cærulea                   | 4. | 51     | Pyrethrum                      | 4. | 134   |
| Psidium                            | 4. | 11     | Pseudopyrethrum                | 4. | 134   |
|                                    |    |        | Pyrites                        |    |       |

# INDEX RERUM.

|                                  |    |           |                            |                |     |
|----------------------------------|----|-----------|----------------------------|----------------|-----|
| Pyrites v. Silex.                |    |           | Reduvius v. Ricinus.       |                |     |
| Pyrolæ                           | 4. | 134.      | H. Regia                   | 4.             | 20  |
| Pyrus                            | 4. | 134       | Regina prati               | 4.             | 177 |
| Q.                               |    |           | Regulus                    | 3. 429. seqq.  |     |
| Qualitates primæ sunt productivæ |    |           | Regulus avis               | 5.             | 322 |
|                                  | 1. | 22        | Remena, Reem, i. e. Alces. |                |     |
| Tactiles                         | 1. | 83        | Resinæ officinales         | 2.             | 115 |
| Faciunt ad præparanda med.       |    |           | Resina Laricea             | 4.             | 210 |
|                                  | 1. | 47        | Terebinthi                 | 4.             | 209 |
| Elementales                      | 1. | 47        | Res macrocosmicæ           | 3.             | 314 |
| Qualitatum primarum investigatio |    |           | Res secundariæ             | 1. 17. 34      |     |
|                                  | 1. | 90        | Resta bovis                | 4.             | 116 |
| secundarum investigatio          |    |           | Rah                        | 4. 137. 138    |     |
|                                  | 1. | 93        | Rhaponticum                | 4.             | 137 |
| occultar. investig.              | 1. | 94        | Rhabarb.                   | 4.             | 246 |
| Quercus                          | 4. | 135       | Rhamnus                    | 4.             | 249 |
| Quercula calamandrina            | 4. | 42        | Rhinoceros                 | 5.             | 305 |
| Quabebe                          | 4. | 55        | Rhodium lignum             | 4.             | 137 |
| Quinquefolium                    | 4. | 135       | Rhodia radix               | 4.             | 137 |
| R.                               |    |           | Rhus                       | 4.             | 138 |
| Radices officinales              | 2. | 109       | Rheum                      | 4.             | 238 |
| Radicula magna                   | 4. | 136       | Rhæa                       | 4.             | 118 |
| Alexipharmacayerva               | 4. | 50        | Rhinoceros                 | 5.             | 305 |
| Radix Bezoardica                 | 4. | 50        | Ribes, Ribesium            | 4.             | 138 |
| China                            | 4. | 45        | Ricinus                    | 5. 345. 4. 274 |     |
| Cava                             | 4. | 73        | Risigallum                 | 3.             | 498 |
| Rosea                            | 4. | 137       | Rob. simplicia officinal.  | 2.             | 287 |
| Rana                             | 5. | 331       | Composita                  | 2.             | 290 |
| Ranunculus viridis               | 5. | 305       | Rorella                    | 4.             | 140 |
| Raphanus                         | 4. | 136       | Ros                        | 3.             | 322 |
| Marinus Rusticanus               | 4. | 136       | Rosa                       | 4.             | 139 |
| Sylvestris                       | 4. | 20        | Rosa canina                | 4.             | 60  |
| Rapistrum                        | 4. | ibid.     | Rosmarinus                 | 4.             | 141 |
| Rapum                            | 4. | 109. 137. | Ros folis                  | 4.             | 140 |
| Raxach v. Ammoniac Gumm.         |    |           | Rotulæ                     | 2.             | 237 |
| Rapunculus borrenf. v. Sisatrum. |    |           | infantiles laxar           | 2.             | 238 |
| Raved. v. Rhabarbar.             |    |           | pectorales                 | ibid.          |     |
|                                  |    |           | H. Ru-                     |                |     |

H. Roberti  
Rubia tinctoria  
Rubinus  
Rubinus  
Arien  
Sulph  
Rubrica  
Robus vulg  
Idaus  
Roculama  
Rumex  
Acutus  
Rupicapra  
Ruscus, um  
Ruta, ruta  
Capr  
Mura  
Sabina  
Saccharum  
Saccharum  
Saccharum  
Saccharum  
Sacculi  
Sacculus Sto  
Cordia  
Neph  
Sagapenum  
Sagittarius  
Salamandra  
Salia officinal  
Artifici  
Salum histor  
Sal Alkali  
Alemb  
Anatro  
Borraz  
Cache



# INDEX RERUM.

|                      |    |       |                                         |         |          |
|----------------------|----|-------|-----------------------------------------|---------|----------|
| H. Ruberti           | 4. | 75    | Commune                                 | 3.      | 464      |
| Rubia tinct.         | 4. | 141   | Corallorum                              | 3.      | 335      |
| Rubinus              | 3. | 329   | Cryſtall.                               | 3.      | 350      |
| Rubinus ꝯ ij ꝯ ialis | 3. | 447   | Foſſile ſ. Gemmæ                        | 3.      | 470      |
| Arſenici Diaphor.    | 3. | 499   | Jovis.                                  | 3. 345. | 397      |
| Sulphuris            | 3. | 507   | Indum                                   |         | ibid.    |
| Rubrica              | 3. | 320   | Lithargyrii                             | 3.      | 459      |
| Rubus vulgaris       | 4. | 142   | Ludi                                    | 3.      | 348      |
| Idæus                | 4. | 142   | Lunæ                                    | 3.      | 376      |
| Rucula marina        | 4. | 66    | Martis                                  | 3.      | 383      |
| Rumex                | 4. | 7     | Nitri, Petræ                            | 3.      | 471      |
| Acutus               | 4. | 90    | Sal Perlarum                            | 3.      | 342      |
| Rupicapra            | 5. | 276   | Philophorum                             | 2.      | 273      |
| Rufcus, um,          | 4. | 143   | Sacerdotale                             |         | ibid.    |
| Ruta, ruta hortenſis | 4. | ibid. | Saccharinum                             | 3.      | 382      |
| Capraria             | 4. | 74    | Saturni                                 | 3. 389. | 391. 394 |
| Muraria              | 4. | 144   | Sulphuris                               | 3.      | 508      |
|                      | S. |       | Tartari                                 | 4.      | 221      |
| Sabina               | 4. | 144   | Viperar.                                | 5.      | 310      |
| Saccharum            | 4. | 212   | Solis                                   | 3.      | 372      |
| Saccharum Aluminis   | 3. | 479   | Veneris                                 | 3.      | 387      |
| Saccharum Saturni    | 3. | 389   | Salinæ facultates faciunt ad generatio- |         |          |
| Sacculi              | 2. | 276   | nem                                     | 1.      | 23       |
| Sacculus Stomachalis | 2. | ibid. | ad præparationem                        | 1.      | 49       |
| Cordialis            |    | ibid. | Saliunca v. Spica celtica               |         |          |
| Nephriticus          |    | ibid. | Salix                                   | 4.      | 144      |
| Sagapenum            | 4. | 214   | Salix Amerina                           | 4.      | 10       |
| Sagittarius          | 1. | 32    | Salfa parilla                           | 4.      | 149      |
| Salamandra           | 5. | 345   | Salvara                                 | 4.      | 140      |
| Salia officinalia    | 2. | 100   | Salvia                                  | 4.      | 145      |
| Artificialia         | 2. | 277   | Salvia vitæ                             | 4.      | 144      |
| Salium historia      | 3. | 461   | Sambucus                                | 4.      | 146      |
| Sal Alkali           | 2. | 279   | Humilis                                 | 4.      | 64       |
| Alembrot             | 2. | ibid. | Sampſuchus                              | 4.      | 97       |
| Anatron              | 2. | ibid. | Sanamunda                               | 4.      | 39       |
| Borrax               | 2. | 280   | Sana ſancta                             | 4.      | 111      |
| Cachecticum          | 3. | 475   | Sandaracha                              | 3.      | 498      |
|                      |    |       | Eee eee e                               |         | Sau.     |

# INDEX RERUM.

|                                 |    |         |                                   |    |       |
|---------------------------------|----|---------|-----------------------------------|----|-------|
| Sanguines officinales           | 2. | 123     | Sclarea                           | 4. | 82    |
| Sanguinaria v. polygonum        |    |         | Scolopendria vulgaris             | 4. | 152   |
| Sanguis dracon.                 | 4. | 215     | Verum                             | 4. | 152   |
| Sanguisorba                     | 4. | 147     | Scordium                          | 4. | 153   |
| Sanicula                        | 4. | 148     | Scorpius signum cœleste           | 1. | 31    |
| Santalum                        | 4. | ibid.   | Scorzorena                        | 4. | ibid. |
| Santolina altera                | 4. | 57      | Scrofa v. Sus                     |    |       |
| Santonicum                      | 4. | 148     | Scrophularia                      | 4. | 154   |
| Minus                           | 4. | 57      | Scrophularia minor                | 4. | 44    |
| Sapo odoratus, Moschatus        | 2. | 280     | Scylla                            | 4. | 54    |
| ad impetigines                  | 2. | 280     | Sebesten                          | 4. | ibid. |
| Saponaria                       | 4. | 149     | Secale, Secla                     | 4. | 155   |
| Saporum differentia             | 1. | 82      | Sedum                             | 4. | ibid. |
| Sapphirus                       | 3. | 330     | Minus & minimum v. Vermicularis   |    |       |
| Sarcocolla                      | 4. | 215     | Seli                              | 4. | 157   |
| Sardus                          | 3. | 331     | Semen & quasi Semen               | 1. | 34-35 |
| Sarsa parilla                   | 4. | 149     | Semen Cinæ, sanctum, zedoariæ fe- |    |       |
| Sassafras                       | 4. | ibid.   | mentina                           | 4. | 48    |
| Satureia                        | 4. | 150     | Semina officinalia                | 2. | 112   |
| Saturni Balsam. & Liniment.     | 2. | 305     | Sempervivum v. Sedum.             |    |       |
| Saturnus planeta                | 1. | 27      | Minus v. Vermicularis.            |    |       |
| Satyrium                        | 4. | 150     | Senecium                          | 4. | 156   |
| Savina                          | 4. | 144     | Senna                             | 4. | 148   |
| Saxifraga                       | 4. | 144.151 | Sentis                            | 4. | 142   |
| Lutea                           | 4. | 190     | Sepia                             | 5. | 332   |
| Major, minor                    | 4. | 124     | Serapinum v. Sagapenum            |    |       |
| Rubra                           | 4. | 11.68   | Seris                             | 4. | 46.64 |
| Scabiosa                        | 4. | 151     | Serpens                           | 5. | 305   |
| Scammonium                      | 4. | 259     | Serpentaria                       | 4. | 14    |
| Scarabæus, Scarabelaphus        | 5. | 345     | Serpentaria femina & colubrina    | 4. | 29    |
| Scarabæolus parvus v. Cantharis | 5. | 339     | Serpatinus lapis v. Ophites       |    |       |
| Scariola Arabum                 | 4. | 65      | Serpent. mas                      | 4. | 29    |
| Scarlatum                       | 4. | 44      | Serpentinum v. Victoralis         | 4. | 175   |
| Schinos v. Lentiscus            |    |         | Serpillum                         | 4. | 157   |
| Scincus                         | 5. | 346     | Serpillum hortenſe v. Thymus.     |    |       |
| Scœnanthum                      | 4. | 152     | Serum lactis                      | 2. | 120   |
| Scorpio                         | 5. | 346     |                                   |    | Sefa- |



# INDEX RERUM.

|                                     |           |          |                               |                  |          |
|-------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|------------------|----------|
| Sesamum                             | 4.        | 157      | Sparadrapus                   | 1.               | 13       |
| Seseli officinarum Italia.          | 4.        | 157      | Species officinales           | 2.               | 265      |
| Greticum                            | 4.        | 103. 158 | Cephalicæ                     | 2.               | 273      |
| Massilioticum                       | 4.        | 157      | Cicubebæ                      | 2.               | ibid.    |
| Seva officinalia                    | 1.        | 124      | pro Cucupha                   | 2.               | 276      |
| Sexus variat vires                  | 1.        | 84       | Specularis Lapis              | 3.               | 356      |
| Sideritis, Sidrichis                | 4.        | 158      | Sperma Ceti                   | 3.               | 513      |
| Sigillum Salomonis                  | 4.        | 128      | Spica Sp. Nardus Germanic.    | 4.               | 160      |
| Signorum classes                    | 1.        | 82       | Spica Nard. Offic. Indica     | 4.               | 161      |
| Siler montanum                      | 4.        | 157      | Celtica                       | 4.               | 161      |
| Silex                               | 3.        | 356      | Spina acida                   | 4.               | 27       |
| Siligo Spica mutica v. Triticum vel |           |          | Spina infectoria, Cervi.      | 4.               | 249      |
| Secale                              |           |          | Hirci                         | 4.               | 224      |
| Siliqua                             | 4.        | 158      | Spinachia                     | 4.               | 161      |
| artacula                            | 4.        | 19       | Spiritus principum Essentiale | 1.               | 19       |
| Silybum                             | 4.        | 37       | Spiritus parandi modus        | 2.               | 281      |
| Similitudo indicat vires            | 1.        | 87       | Spiritus Antapoplecticus      | 2.               | 283. 390 |
| Sinapi                              | 4.        | 159      | Aceti                         | 4.               | 182      |
| Agreste                             | 4.        | 20       | Aluminis                      | 3.               | 479      |
| Synapismus                          | 1. 13. 2. | 166      | Aq. pluvial.                  | 3.               | 323      |
| Sion Cratevæ, majus                 | 4.        | 110      | Calcis                        | 3.               | 347      |
| Sisarum, Sifer                      | 4.        | 159      | Corallorum                    | 3.               | 340      |
| Sium aquaticum                      | 4.        | 15       | Lunaris                       | 3.               | 377      |
| Smaragdus                           | 3.        | 331      | Nephriticus                   | 2.               | 284      |
| Smilax aspera                       | 4.        | 149      | Nitri                         | 3.               | 475      |
| Smyrnum                             | 4.        | 16. 92   | Perlatus                      | 3.               | 345      |
| Solan Halicacab. vesicar.           | 4.        | 11       | Salis                         | 3.               | 465      |
| Hortense                            | 4.        | 85       | Salis gemmæ                   | 3.               | 471      |
| Tetraphyllon                        | 4.        | 119      | Sulphuris                     | 3.               | 505      |
| Solanum, Solatrum                   | 4.        | 159      | Minerales                     | 2.               | 283      |
| Soldanella                          | 4.        | 249      | Terræ                         | 3. 317. 318. 319 |          |
| Soli. e. aurum                      |           |          | Vegetabiles                   | 2.               | 281      |
| Sol planeta                         | 1.        | 25       | Vini                          | 2.               | 206      |
| Solidago v. Symphytum               |           |          | Spodium                       | 3.               | 463      |
| Solsequium                          | 4.        | 16       | Spondylium                    | 4.               | 30       |
| Sonorum differentia                 | 1.        | 83       | Spongia Cynosbati             | 4.               | 100      |
| Sorbus                              | 4.        | 160      | Spongites Lapis Spongiæ       | 3.               | 357      |
| Sory                                | 3.        | 456      | Eeeeeee 2                     |                  |          |
|                                     |           |          | Squilla                       |                  |          |

# INDEX RERUM.

|                                  |    |             |                               |          |
|----------------------------------|----|-------------|-------------------------------|----------|
| Squilla                          | 4. | 154         | Antepilepticus                | 2. ibid. |
| Squinanthum                      | 4. | 152         | de Artemisia                  | ibidem   |
| Stannum                          | 3. | 394         | Cardiacus                     | 2. 292   |
| Staphilinus                      | 4. | 120         | Corallorum                    | 3. 341   |
| Staphisagria                     | 4. | 162. 250    | de Eryfimo                    | 2. 292   |
| Stœchas, Stichas arab.           | 4. | 162         | Antihecticus                  | 2. ibid. |
| Citrina                          | 4. | 162         | Helleboratus                  | 2. 294   |
| Stercora officinalia             | 2. | 124         | Holagogus                     | 2. 295   |
| Stramen camelor.                 | 4. | 149         | Imperatoris i. e. Rob. cydon. |          |
| Stratiotes millefolia            | 4. | 104         | Nicotianæ                     | 2. 293   |
| Struthio                         | 5. | 325         | de Hispidula, de pede cati    |          |
| Strumaria                        | 4. | 25          |                               | 2. 294   |
| Struthium                        | 4. | 85          | de Testudinib.                | 2. ibid. |
| Strychnos v. Solanum             |    |             | Vomitivus                     | 2. 295   |
| Stumel v. Spica indica           |    |             | Sylmbrum aquatic. Cardamine.  |          |
| Sturio                           | 5. | 333         |                               | 4. 110   |
| Stymma.                          | 1. | 14          | T.                            |          |
| Styrax, Storax calamit.          | 4. | 216         | Tabacca                       | 4. 111   |
| Styrax liquidus                  | 4. | 217         | Tabinaria                     | 4. 95    |
| Succi officinales                | 2. | 114         | Tacamahaca                    | 4. 217   |
| modus fiendi.                    | 2. | 284         | Talcum                        | 3. 357   |
| Succinum                         | 3. | 510         | Talpa                         | 5. 308   |
| Succisa                          | 4. | 163         | Tamalapatra                   | 4. 97    |
| Succolata                        | 4. | 216         | Tamarindi                     | 4. 251   |
| Sudar. Suttur, v. Saccharum      |    |             | Tamariscus                    | 4. 164   |
| Sulphurea officinalia            | 2. | 100         | Tanacetum                     | 4. 165   |
| Sulphur ejusque histor.          | 3. | 501         | Album                         | 4. 132   |
| Sumach                           | 4. | 138         | Taphusius lapis               | 3. 345   |
| Suppositoria                     | 2. | 286         | Tarentina                     | 4. 109   |
| Sus                              | 5. | 286. 307    | Tarsa v. Tamariscus           |          |
| Sylphii lacryma i. e. Ala fatida |    |             | Tartarus                      | 4. 218   |
| Symphtrum                        | 4. | 163         | Tartarum Philosophicum        | 3. 322   |
| Medium                           | 4. | 51          | Taurum                        | 4. 9     |
| Petræum                          | 4. | 131. 177    | Taurus signum cœleste.        | 1. 30    |
| Syrius pulvis                    | 4. | 260         | Taurus                        | 4. 269   |
| Syrupi                           | 2. | 287. & seq. | Taraxacum                     | 5. 165   |
| Syrupus f. Anisi                 | 2. | 291         | Taxus                         | 5. 308   |
|                                  |    |             | Tele-                         |          |



# INDEX RERUM.

Telephium v. Fabaria

Tempus asservandorum medicam.

1. 67. seq.

Colligendorum nativ. 1. 53

& seq.

variat vires 1. 85

obf. in producendis med.

1. 25. 36. seq.

Tenche v. Tinca

Terebinthina v. Resina

Terebinthus Indica

4. 126

Terdina v. Valerina

Teredo

5. 347

Terengibil. Terniabin, Trugibin, v.

Manna

Terra facit ad generationem

1. 37

Terræ officinales

2. 97

Terrarum historia

3. 315

Terra argillacea sigillat.

3. 317

Japponica

3. 320. 516

Labacensis

3. 318

Melitea

3. 317

Merita

4. 58

Strigenfis

3. 317

Testudo

5. 333

Tetrahit

4. 155

Teucrium

4. 166

Tragi v. Veronica

Thanasia v. Tanacetum

Therenabin v. Manna

Theriaca cœlestis

2. 1218

Theriaca de Mumia

5. 295

Theriace Essentia

2. 215

Thimelæa

4. 244

Thirus

5. 309

Thlaspi

4. 166

Thus

4. 223

Judæorum, Thus, Cortex v.

Thymiana

Thymallus

3. 333

Thymbra

4. 150

Thymiama. ana 4. 166. v. & Ammo-

niac.

Thymus

6. 166

Tilia

4. 167

Tinca

5. 334

Tineararia v. Stœchas citrina

Tinctura

2. 14

Tincturæ usitatores

2. 296

Tincturæ Aristoloch. rot.

2. 157

Cathartica

2. 297

Corallor

3. 337. & seqq.

Diaphoretica correct.

2. 297

Gemmarum

3. 326

Jovis

3. 397

Lithargyrii

3. 460

Lunæ

3. 375

Martis

3. 381

Perlarum

3. 344

Salis

3. 470

Sapphiri

3. 330

Saturni

3. 392

Smaragd.

3. 341

Solis f. auri

3. 366. seq.

Sulphuris

3. 508

Talci

3. 359

Veneris

3. 386

Tithymalus

4. 239

Tobacum

4. 111

Topasius

3. 327

Tordylium v. Sefeli Creticum

Tormentilla

4. 167

Tornabona

4. 111

Eeeeeee ;

Tra-

# INDEX RERUM.

|                       |    |          |                               |       |              |
|-----------------------|----|----------|-------------------------------|-------|--------------|
| Tragacantha           | 4. | 224      | Variolus. v. Trutta.          |       |              |
| Tragium primum        | 4. | 72       | Venus i. e. Cuprum            | 3.    | 385          |
| Tragea fortis         | 2. | 270      | Venus planeta                 | 1.    | 28           |
| Grossa                | 3. | 271      | Veratrum nigr.                | 4.    | 235          |
| Hepatica              |    | ibid.    | Verbascum                     | 4.    | 179          |
| Hysterica             |    | ibid.    | Verb. odoratum                | 4.    | 138          |
| Antinephritic.        |    | ibid.    | Verbena, scemina v. Erysimom. |       |              |
| Tragoselinum          | 4. | 124      | Mas                           | 4.    | 171          |
| Trichomanes           | 4. | 168      | Vermes terrestres v. Lumbrici |       |              |
| Trifolium             | 4. | 168      | Vermiculus Dipfaci v. Dipfac. |       |              |
| Acetosum              | 4. | 7        | Vermicularis                  | 4.    | 172          |
| Aureum, Magnum nobile |    |          | Vernix                        | 4.    | 88           |
|                       | 4. | 65       | Veronica                      | 4.    | 173          |
| Fragiferum            | 4. | 71       | Vervex                        | 5.    | 303          |
| Lentrinum             | 4. | 90       | Verres v. Sus                 |       |              |
| Odoratum              | 4. | 95. 100  | Verres sylvaticus v. Aper     |       |              |
| Tripolis              | 3. | 320      | Vesicatorium                  | 2.    | 166          |
| Trinitas herb.        | 4. | 65       | Veronica                      | 4.    | 28. 39       |
| Trislagio, Trixago    | 4. | 42       | Victorialis                   | 4.    | 173          |
| Triticum              | 4. | 168      | Vinca pervinca                | 4.    | 173          |
| Trochisci usitatiores | 2. | 297      | Vincetoxicum                  | 4.    | 173          |
| Alexiterii            | 2. | 299      | Vina i. e. Succu liquidi      | 2.    | 284          |
| Pro fumo              | 2. | ibid.    | Vini historia                 | 4.    | 225. & seqq. |
| Moschardini           | 2. | ibid.    | Vini medicata                 | 2.    | 227          |
| Prophylactici         | 2. | ibid.    | Arthriticum                   |       |              |
| Trutta piscis         | 5. | 334      | Cephalico Spleneticum         | ibid. |              |
| Tubera Cervina        | 4. | 225      | Matricale                     |       |              |
| Tunica                | 4. | 38       | Purgans                       | 2.    | 228          |
| Turio                 | 1. | 5        | Sanctum                       | 2.    | ibid.        |
| Turpethum             | 4. | 250      | Viola agrestis                | 4.    | 149          |
| Turtur                | 5. | 323      | Lutea                         | 4.    | 45           |
| Tussilago             | 4. | 169      | Flammea                       | 4.    | 84           |
| Tutia                 | 3. | 459. 460 | Purpurea, martia, nigra       | 4.    | 174          |
|                       | V. |          | Tricolor, Trinitatis          | 4.    | 84           |
| Vacca                 | 5. | 269      | Vipera                        | 5.    | 309          |
| Vaccina               | 4. | 108      | Viperaria v. Scrozonera       | 4.    | 153          |
| Valeriana             | 4. | 169      | Vipio v. Grus                 |       |              |

Vires



# INDEX RERUM.

Vires secundum alphabetum 1. 72

Virga aurea 4. 176. 177

Pastoris 4. 63

Virgo signum cœleste 1. 31

Viride æris 3. 85

Viscum 1. 5

Visca officinalia 2. 109

Vita Essentialis est principium rerum 1. 19

Vitex 4. 10

Vitis alba v. Bryonia

Idæa 4. 108

Vinifera 4. 175

Vitraria 4. 119

Vitrioli historia 3. 483

Flores 3. 493

Magister 3. 496

Olea 3. 492

Ros 3. 485

Sal 3. 494

Spiritus 3. 486

Sulphur 3. 493

Terra 3. 493

Tincturæ s. Essentiæ 3. 495

*Plura ex Oo vide dicto capite.*

Vitriolum & is ejusque destillatio 3. 378. 381

Vitrum & ii Care 3. 405

Vitulus 5. 311

Ulmaria 4. 177

Umbellæ 1. 5

Umbilicus terræ 4. 59

Unguenta officinalia 2. 301

Unguentum, Anodynum podagr. 2. 306

Butyraceum nervale 2. 307

Cardiacum 2. 307

Cordiale 2. 308

Lithargyr. 3. 468

Nercoricum 2. 308

Ophthalmicum 2. ibid.

ad perniones 2. ibid.

contra scabiem 2. 309

Somniferum 2. ibid.

Spleneticum ibid.

Sympatheticum 2. 309

Terebinthinæ 2. 310

Potabile 2. 310

Ungues & Ungulæ officinal. 2. 125

Unguis odoratus 5. 325

Ungula caballina v. Tussilago.

Unicornis 5. 311

Volucrum majus 4. 35

Unicornus solare 3. 371

Fossile 3. 359

Upupa 5. 324

Urceolaris 4. 119

Ursus 5. 512

Urinæ officinal. 2. 124

Urinæ historia 5. 288

Urtica 4. 177

Mortua, lactea 4. 178

Ufnea 4. 107

Cranii 5. 298

Usurpatio 1. 73

Uvæ, Uvæ Passæ v. Vitis 4. 176

Uva versa, Vulpina 4. 119

Ursi 4. 138

Vulpes 5. 312

Vultur 5. 324

Xylaloes

# INDEX RERUM.

|                 |    |     |                                  |    |     |
|-----------------|----|-----|----------------------------------|----|-----|
| X.              |    |     | Zarfa parilla                    | 4. | 149 |
| Xylaloes        | 4. | 9   | Zeduar, Zeduar, Zudar, Zurumbet, | 4. | 167 |
| Xanthium        | 4. | 25  | Zerumbet                         | 4. | 176 |
| Xenechton       |    | 112 | Zibebæ i. e. Uvæ passæ           | 4. | 180 |
| Xilon           | 4. | 29  | Zingiber, Zinziber               | 4. | 87  |
| Yerva radix.    | 4. | 502 | Zopissa v. Pix.                  | 4. | 209 |
| Z.              |    |     |                                  |    |     |
| Zaibar, Zibach. | 3. | 397 |                                  |    |     |

## FINIS.





149  
number,  
167  
176  
188  
87  
189

APPENDIX  
PHARMACORUM IN  
SCHRÖDERI  
PHARMACOPOEIA  
OMISSORUM.

---

U L M Æ  
Apud Viduam JOANNIS GÖRLINI,  
1669.

## Aspalathus.

**A**spalathum lignum, Græcis dicitur *ἀσπλάθω*, aliis, manu ducen-  
te *Bauhino Incomparabili*, Erysi sce-  
ptrum, *Pinac. p. 329*. Variâ tradunt de  
hoc ligno *Dioscor. l. i. c. 19.* atque *Plinius*  
*l. 22. c. 24. & l. 24. c. 13.* *Prosper Alpin.*  
*Egyptiis* vocari scribit *Aspalathum*  
*Darssabian p. 127. de Medit. Egypt.* il-  
ludq; vidit & eruit copiosissimū prope  
*Fraschya* portū, *p. 57. de Plant. Egypt.*

Florum *Aspalathi* magna est suavi-  
tas, ipsa Planta frutex est densis ramis,  
spinis albis, duris horridis cortice cau-  
dicis albo, ad trium cubitorum & plus  
altitudinem in altum assurgens. Ipse  
floris, ut dixi, suavissimi sunt odoris,  
parvique & multi, teste *Alpin. pag. 57.*  
*de Plant. Egypt.*

Usus hujus Ligni est in *Trochiscis*,  
*Hedychrois*, ad confectionem *Theriac-*  
*ca* adornandam, non tantum apud  
nos ad *Andromachi* intensionem, sed &  
ad mentem & mores *Egyptiorum*.

*Egyptiis* enim *Trochisci Hedychroi*,  
alindaracorum dicti, parantur ex *Dar-*  
*ssabian*, cortice radicum *aspalathi*, non  
minus ut *Andromachi* quoque illo in-  
grediente tument. Ingrediuntur, in-  
quam, ligna *Aspalathi*, trochiscos *He-*  
*dychroos* & in *Egypto* & in his oris,  
quanquam quo ad coetera discrimen

quoddam sit, ut ex seq. videre est. *Tro-*  
*chisci Hedychroi* *Egyptiorum* com-  
ponuntur ex *Darssabian* *aspalatho*,  
*Cassabelderiva* eakamo atomatico,  
*Idum balassam* *Xilobalssamo*, *Chest-*  
*mur Costo*, *Affaro* *afaro*, *Mu* *Mei* *rad.*  
*Achaovan* *Maro*, *Mastich*, *Eecaharcher*  
*flor*, *Squinant*, *Ravendi* *Rhabarbaro*,  
*Selica* *Cassia*, *Darssini* *Cinamomo*,  
*Sambul* *endi* *spica Indica*, *Sadegendi*  
*fol. Ind.* *Mur Myrrha*, *Zaffaran* *Cro-*  
*ci*, *M.* cum vino gran. & opobals. *Gale-*  
*nus* *Trochiscos Hedychroos* componit  
ex *Maro*, *afaro*, *amarato*, *aspalatho*,  
*Schennanto*, *Calamo aromatico*, *Phu* *pon-*  
*tico*, *Xylobalssamo*, *Opobalssamo*, *Cina-*  
*momo*, *Costo*, *Myrrha*, *Folio*, *Nard*, *In-*  
*dic*, *Croco*, *Cassia*, *Amom.* *Mastich*, vin.  
q. s. & ol. *caryophyll.*

In defectu autem Ligni *Aspalathi*  
hic *Augustani* substituunt non *Myrepsi*  
*Meum*, sed *Santalum citrinum* *p. 398.*  
*Dispensator.* aut ipsum Lignum *Aloes*,  
uti *Egyptios* *Aspalatho* carentes her-  
bam quandam substituere scribit *Al-*  
*pinus* *pag. 137.* quæ sit hyperici species,  
feminis nigri subrubescens, picem  
redolentis. *Renodens* in confectione  
trochiscorum *Hedychroorum*, defi-  
ciente ligno *Aspalatho* sumit cum *Au-*  
*gustanis* *Santal.* *Citrinum*, quod diver-  
si, diversa sentiant & scribant de *Aspa-*  
*lato*



## APPENDIX.

lato teste *Laur. Catelan*. Maître Apotecaire de Montpellier in discursu Gallico des ingrediens de la Theriaque pag. 133. *Olaus Wormius* *lignum Aspalathum* exponit in Museo diversum ab enumerato ligno Aspalatho Bauhini, quilegatur.

### Alliaria.

*Alliaria Knoblauchsraut* / *Leichel Saffraut* / ita dicitur quod ejus folia digitis comminuta allium seu porrum sectivum cum nasturtio redolent, *Bauhin. Pin.* 110. Quidam *Thlaspi-  
dium* secundum *Cratææ*, alii *alethorolophon* *Plinii* l. 25. c. 5. putant. Olim a quibusdam pro scordio habita alliaria, ut proinde Theriacæ immiscuerint pro scordio ipso, quod tamen refutat & improbat *Greg. Horstius* de confect. & dispens. Theriac. Tom. 2. oper. Med. Eleganter de hac alliaria scribit *Clar. Simon Pauli* p. 189. quadrip. botan. excitatus à *Fabricio Hildano* cent. 2. obs. 94. pag. 171. habere alliariam singularem vim & proprietatem qua putredini adversatur, ideoque ait, ulcera putrida & sordida abstergit ac mundificat, minori tamen cum efficacia quam verum scordium &c. sed pergit; quæris forsan cur ita sim sollicitus de Alliaria cum Scordium multo sit præstantius. Causa est quod scordium in multis regionibus minimè crescat neque nisi siccum & ut plurimum obsoletum haberi possit, cum Alliaria ubique locorum prodeat. Sed quia in exsiccata herba parum facultatis & virium re-

manere expertus sum, idcirco ipsam in fine Aprilis & incunte Majo colligere soleo, & postquam per diem unum in umbra exsiccata fuerit, minutim incido contundoque in mortario, & prælo succum exprimo, &c. quem sive simplicem sive inspissatam unguentis & cataplasmatibus indo, ad gangrænam aliaque ulcera putrida sordida ac maligna.

*Alliaria* autem secundum *Matthiolum* p. 559. calefacit & exiccat, crassos humores attenuat & incidit. semen uteri strangulatum tollit exterius admodum.

### Arabicum Gummi.

Gummi Arabicum officinarum Galeno *Thebaicum*, nonnullis *Babylonicum* dicitur, exponente *Renodeo* pag. 263. Arbusculam, ex qua promanat *Di scorides* *Acaciam* *Theophrastus* l. 4. c. 4. & *Plin.* l. 24. c. 12. Spinam, *Arabs* *Achachie* nominat, ejusque duas *Di scorides* species constituit. Prior recta assurgens virgulta profert lignosa, spinis exertis & duris hinc inde stipata; folia longa, quasi ex multis foliolis coherentia composita, flores albidos odoros, siliquas breves, planas, lupinorum more; semen glabrum & splendens. Male depictam hujus iconem à *Matthiolo* profertur *Renodeus*. Nec enim folia, nec flores, nec siliquæ respondent. *Jacobus Sylvius* quoque hallucinatur hanc ad rem libro de simpl.

Altera *Acacia* in *Cappadocia* &

A 2

Ponto

Ponto provenit, priore minor, tenerior, humilior, folia habens rutæ & virgultæ quibusdam aculeis spinosa. Ex hac succus quidam educitur, qui arbusculæ nomen retinens, *Acacia* dicitur ob cuius raritatem substitui solet succus *gl-vestris pruni*, quam *Dodoneus* Germanicam *Acaciam* nominat. Ex illa profuit *Gummi Arabicum* dictum, quod laudatur vitri modo pellucidum, sincerum in vermiculorum speciem contractum.

Ingreditur multas compositiones hoc *Gummi Arabicum*, quia efficaciter inspissat & refrigerat: hinc ocularibus medicamentis & arteriacis commode miscetur, cutis meatus obstruit & procidentes oculos reprimat. *Gregor. Horstius* commendat in alvi fluxibus cum tragac. & cera albo mixtum.

#### Botrys.

Germ. *Botrystraut* / *Tranben-traut* / *Kroetten-traut* / *Lungen-traut*. referente Clarissimo D. D. *Simone Pauli*, Botrys seu botrys ambrosioides vulgaris Bauhini. Sunt ex recentioribus nonnulli vestigia *Diosc.* & *P. Egnetæ* sequenti qui ad thoracis mala & in specie orthopnæam valde botrym commendant, inter quos *Matthiolus*, *Lobel.* *Camerarius* primi sunt: quorum ille propria experientia usum botryos. comm. in *Diosc.* lib. 3. c. 13. pag. 620. hic vero in observ. stirpium p. 113. Authoritate *Zigeri Colbergiers*, apud Antwerpenses olim experientissimi *Medici* fretus, miris laudibus effert.

Tetrius vero in horto suo pag. 29. testatur, in Misnia confieri ex ea cum melle electuarium ad pulmonis vitia. Herbam botrym inter alias olentes in condiendis Magnatum cadaveribus locum habuisse, etiamnum recordor. Grato enim est odore, calidoque & sicca secundo excessu, ut facile à putredine præservet; quare non incassum *Dioscoridis* suavis vestibus interspergitur aut implicatur ne tinctis exedantur. Agerius in Tragum observavit, aquam illius destillatam lenire dolores post partum qui valde exercere, ceu in quæstionem datas puerperas solet. Quâ deficiente commendandus est usus *Zedoariæ* radices 3℔. pondere in vino propinanda.

#### Cocculæ.

Cocculæ, Cocculi, Cocci Orientales, *Fisch oder Dostförner* / racematim pediculis hærentes, hederæ corymborum modo ex Alexandria ad feruntur. Contra pediculos nullum præstantius remedium pronūciat *Bauhinus* pag. 511. *Pinac.* *Codronchius* peculiari libello usum & virtutem Coccularum exponit. Quidam solani manaci, quidam Tithymali, quidam Clematidis fructum putant. Dicuntur alias *bacca Levantica*, *bacca orientales*, *bacca cotula elephantina*, *Cuculus Indicus*. Contra podagram has cocculas commendat *Riverius*, dum & Baccarum harum orientalium, quas Galli vocant *coques de levant*, & myrtæ ana 1℔℔. miscetque cum aceto forti pro cataplasmate,



## APPENDIX.

plasmate, pag. 342. *Bacca piscatoria* dicuntur, quod illarum ope piscatio instituitur, de qua *Paulus Zachias* quæstion. Med. leg. pag. 432. ubi in genere de *Piscatione Medica* disserit doctè & eleganter ex *Plutarcho*, *Cælio Rhodigino*, *Avicenna*, *Bruerino*, *Plinio*, *Ruellens* hoc pulchrè confirmat pag. 474.

Damarum Pilæ.

*Pila damarum* referendæ sunt ad p. 276. ubi de *Damarum*, seu *Rupicaprarum*, *Caprarum Alpinarum* sanguine, sevo, hepate, bile, stercore, lapide agitur. *Pila* autem *Damarum*, *Ægagropila* alias dicta pulchrè & fuse explicatur à *D. Welschio* singulari tractatu doctissimo. Oriuntur in ventriculi primo aut secundo loculo, quem venatores capsum aut bursulam dicunt. Cornigeris enim & ruminantibus animalibus quadrifidus ventriculus est vel ipso teste *Aristotel.* l. 3. part. anim. c. 14. quem dispescit *Severin.* pag. 303. part. 4. *Zootom.* *Democr.* in peram, ollulam, conclave cellulatum & ventriculum propriè sic dictum. Non autem in omnibus rupicapris pilæ reperiuntur, sed saltem in nonnullis, ubi vis coagulans exsuperat. Ortum trahere putant quidam has pilas à comesto *Doronico*, cui addit *Welschius* Scabiosam montanum, Asterem montanum luteum radicum odoratarum, Chamandrin marem, Veronicam Alpinam, Saxifragam albam petræam, Caryophyllutam Alpinam, Teucrium alpinum, lotum odoratam, pimpinel-

lam majorem, daucum montanum Carlinam, Imperatoriam, ledum Alpinum, vitemque idæam &c. *Ægagropili*, aut *Ægagropilæ* calidæ sunt & siccæ, aperiunt, rarefaciunt, leviter adstringunt, attenuant & extergunt, ac proinde sunt diureticæ, hidroticæ, sudoriferæ fœcundantes, alexi pharmacæ. Usus illarum est in febrib. simpl. & malignis, capitis defectu & doloribus, affectibusque aliis comatosiis, quæ omnia fusius exposita lege apud *Welschium*.

Lac Lunæ.

*Lac lunare*, vel *lac luna* describit *Conr. Gesnerus* de figur. lapid. pag. 50. quod in altissimorum quorundam montium Helveticorum speluncis reperiatur, ut *Storchornij* in ditione *Bernensium*, & *Fracti* sive *Pilatini Lucernentium*: De quo repetam, ait *Gesnerus*, hic ea ferè verba quæ in *Fracti* montis Descriptione nostra ante annos sedecim posui, mutatis nonnullis & additis: In spelunca quadam per summum montem fornici adhærens nascitur substantia quædam fungosa, friabilis, alba, levissima: quam fungum petræum dixeris vel *Agaricum saxatile*: tam similis hujus est facies. Incolæ *Monmilch* appellant, id est, *Lac lunæ*, à substantia alba & spumosa, ex qua concretus videtur hic lapis, si lapidis nomen meretur. Aquæ mixtus, albo lactis colore eam inficit. Inspidum est. Siccatur sine morbo. Nulla in eo asperitas, & totum cum saliva mani-

# APPENDIX.

6  
 dentis liquefcit, præfertim quod melius fuerit. nam & crassius asperiusque reperitur, immaturius nimirum & crudius: quod odore etiam caret. Concoctum autem & perfectum, ut asperitatem admittit, ita albius colore & pondere levius, & suaviter odoratum redditur. Videtur autem naturam Holosteis dictis lapidibus qui in terra arenosa in Palatinatu effodiuntur proximam habere: & lapidi quem ego ab odore Cydonitem nomino. Superstitiose quidam adversus quemcumque morbum ægroti. cuiusvis, propter quem expresso ipsius nomine è spelunca petatur salutare esse putant. Lucernæ in Pharmacopolio venire solet. Pollinem ejus chirurgi ulceribus deficcandis inspergunt. Sunt qui nutricibus ad augendam lactis copiam, pollinis hujus drachmam exhibeant, è jure ni fallor (potest autem commodius ex lacte amygdalarum cui imixtus hic pollen aliquot horis fuerit, colato propinari, cum paucis saccharo & aqua fœniculi) ajunt autem mammillas evidenter hoc auxilio turgere & repleti lacte. Præterea à docto quodam Viro nuper proditum invenio, Lac Lunæ in profusio sanguinis utiliter dari tanquam somniferum, idque sibi experimento constare. Quod ad nomen priscum ego aut ipsum Morochthum veterum esse aliquando putavi: aut easdem certe illi facultates obtinere, sed amicus quidam rerum fossilium omnium cognitione clarus, Margæ friabilis genus esse mavult.

Geranium Moschatum.

Geranii Stordenschnabel/Ruperts. traut multæ species enumerantur à Botanicis, uti videre est in Pinace Bauhini. ortæque sunt circa hanc plantam varix difficultates, Ruellii, Hermolai, Brasavoli, quas exponit Matthiæolus. pag. 566. Omnibus tamen, volente Pauli, eadem ferè virtus nidita creditur, illud quod Robertianum dicitur, numero quintum apud Bauhinum potissimum expetitur, ut eo ad mammarum scissuras, pudendorumque ulcera extergenda utamur, quod tamè præter abstergendi vim, etiam siccandi facultatem possidet, ita ut mox ea consolidare valeat. Guilielmus Fabricius Hildanus aquam stillatitiam Geranii commendat ad Cancrum tollendum. Jacobus Cornutus in histor. herb. Canad. describit Geranium triste Canadense, quod noctu solum odorem spargat, ut nostræ hesperides Nachtrivolen. Influxum illucis solis adeo aspernari videntur, ut integro die odorem negent, cum Lunæ accessu gratissimo odore moschato, quasi thure libent, qui odor intempesta quoque nocte, ad auroram usque perseverat, statimque solis præsentia evanescit. Nostrum Geranium Moschatum, quod ingreditur Unguentum Martiatum Tabernamontanus p. 121. statim. 5. exponit, refertque ad 1. Dioscoridis, herba moschata, acus moschata, alias dictum.

Tribuli Aquatici.

Tribulus Aquaticus, Wasserhus/Strachel.



*Stachelnuss / Spignuss / τριβόλ* & *εὐ-  
φράσιον* ad differentiam Tribuli Terre-  
stris appellatur, qua de re vid. *Dioscori-  
des* l. 4. c. 14. & *Theophrastus* l. 6. c. 5. de  
historia Plantarum: *Ruellius* putat Tri-  
bulum aculeatum *Theophrasti* eam  
esse plantam, quam *Hetrusci* vulgo vo-  
cant *Cacatrippola*, sed hunc hanc ad-  
rem refutat *Matthioli*. Quoad vires  
*Galenus* lib. 7. de med. simpl. statuit  
Tribulos aquaticos constitui ex hu-  
mida essentia modicè frigida, sicca-  
que adstringente, & hinc usum eorum  
esse contra phlegmonarum generatio-  
nès & influxus. Ingressiuntur Tribu-  
li Aquatici *Unguentum Aegrippae* ejus  
compositionem pulchrè exponit *An-  
tonius de Sgobbis* in Theatro Pharmac.  
pag. 492. Venetiis nuper excuso. Tri-  
bulus autem Aquaticus foliis provenit  
notante *Matthiolo* p. 627. latis, subro-  
tundis, crassiss, & averfa partè maculo-  
sis, nervosisque & per ambitum ferra-  
tis, prælongis & crassiss pediculis niten-  
tibus; caulem edit crassum pinguem-  
que sed in summitate longe vegetio-  
rem, quam ab radice. Radix illi lon-  
ga, comantibus spicaceis capillamen-  
tis. Fructum profert nigrum casta-  
neæ magnitudine, triplicè armatum  
mucrone, unde illi nomen, cortice  
membranoso, & alba nitus medulla,  
gustu castaneis haut absimili, vulgus  
aquaticas castaneas vocat, ac non secus  
ac castaneis eo in cibo utitur. Quin  
etiam quibusdam in locis è siccis tribu-  
lis in farinam reductis, per annonæ ino-

piam agrestis plebecula panem parare  
solet, perinde ac ex castaneis parantur  
ab aliis. Sunt etiam qui eisdem tri-  
bulos sub cineribus affatos pro gratis  
bellariis edant. Ex his porro qui per-  
egre proficiscuntur, verticillos faciunt,  
quibus suas preces enumerent, colloq-  
gestent, ut majorem per se ferant reli-  
gionum, ne dicam hypocrisis. *Confir-  
mat* hoc *Amatus Lusitanus* *Comment.*  
in *Dioscor.* Cl. *Simon Pauli* mitris Je-  
suiticis tribulos aquaticos comparat  
p. 507. quadrip. Botan.

Gallæ.

*Galla* secundum *Renodam* p. 261.  
velut pilulæ quædam salebrosæ, ac spu-  
rii fructus, qui præter legitimos in  
glandiferis arboribus, noctu fere  
erumpunt, Sole de Geminis exeunte;  
quo fervidiore existente, tabescunt,  
nec justam magnitudinem adipiscun-  
tur, in Bohemia & Hispania nascuntur  
uberis, in quercubus multis, quarum  
truncis & ramis etiam tenuibus, absque  
pediculis ut plurimum adnatæ cohære-  
scunt.

Gallarum genera multa traduntur  
inter quas duæ potissimum & ad medi-  
camenta quædam paranda & ad coria-  
densanda accommodantur, una Om-  
phacitis dicta, quæ parva est, rugosâ,  
nodosa, solida, nullo foramine pervia;  
altera plana, levis, flaccescens, interna  
parte laxior & major, & perforata, ex  
cujus videlicet foramine quoddam  
exiit insectum, seu musca, vermiculus,  
ut con-

ut contingere solet, aut aliud simile animalculum.

Ex quercubus Hemeris & Robur præstantiores semper gallas eructant. *Hemeris* autem ea esse quercus creditur, quam nonnulli Mydion nominant, cui caudex in orbem comatur, contorquetur & multis ramorum alis consurgens glandes, præter gallas, gerit non insuaves.

Robur Latinis Quercus, *Theophrasto* & dicta gallarum feracissima est quarum ubertatem ætate præter glandes suppeditat, nec non alias pilulas exiguas foliis mediis sine pediculo adhærescentes, ut in nostratibus querculus videmus. In summa, quercus non tantum glandes & ramos germanos promit, sed adulterina multa, viscum, gallas, poma, fungos, & multos alios pseudofructus.

Gallæ refrigerant ad recessum usque secundum, resiccant ad tertium & potenter astringunt. partes laxiores contrahunt, imbecillas roborant, fluxiones cohibent, atque efficaciter ad astringenda aut siccanda, quæ opus sunt, usurpantur, inquit *Dioscor. c. 147. lib. 1. Confer Ruellium de natur. Stirp. l. 1. c. 83. p. 165.*

#### Thee.

Herba *Thee* Japonis dicitur T'chia, Chinenfibus *Thee*, cujus notitiam (verba sunt *Tulpii* pag. 400. obs. medic. l. 4.) ab illis, qui cum summo imperio illic præfuere, mihi communicatam, equidem lubens posteritati tra-

dam. Sunt itaque huic herbæ ut folia oblonga acuminata, & in ambitu crenata; sic radices fibrosæ ac in minimas particulas dispersæ: crescitq; nō tantum in China, ac Japonia, verum etiam in Chiam. at eo discrimine quod Chinenfis folia sint ex nigro viridia, Japonensis verò colore dilutiore, ac sapore gratiore. unde quoque fit, quod Japonensium T'chia longe pluris etiam æstimetur, quam Chinenfium Thee; veniatque non rara una ipsius libra, centum argenti libris.

Quippe creditur hic passim nihil hac herba salubrius, cum ad vitam in extremam senectutem, prorogandam; tum ad impedienda quæcumque fanitatis in commoda. neque ipsam solum corpora reddere vegeta, atque arcere calculi dolores, quibus hic neminem dicunt obnoxium, verum etiam tollere dolorem capitis, gravedinem, lippitudinem, destillationem, spiritus difficultatem, ventriculi imbecillitatem intestinorum tormina, lassitudinem ac somnum quem tam evidenter compefcit, ut sorbitionem hujus decocti assumentes, videas interdum integras noctes interdum lucubrando consumere ac sine ulla molestia evincere, inexpugnabilem cæteroquin dormiendi necessitatem. calefacit enim modicè, & astringendo ventriculi osculum, refrænât coërcetque usque eo vaporum ad somnum conciliandum necessariorum ascensum: ut nihil impedimenti offeratur illis, qui scribendo



aut meditando satagunt noctes transigere.

Videtur autem hæc planta non longè cognita fuisse Chinenſibus, neque admodum diu in uſu. deſunt enim iſtis avita, quibus eam deſignent, nomina; ſive hieroglyphici illi characteres (quales ferme ſunt omnes Chinenſium literæ) quibus exprimant iſtius naturam.

Differuntque etiam inter ſe haud parum diſcrepantes hæ nationes circa utendi rationem: permixcentibus Japoniis pulverem huius plantæ in lapide Ophitide contritum aquæ calidæ; Chinenſibus verò iſtam plantam cum paucis ſalis ſacharivæ granis ex liquore aliquo decoquentibus. quod decoctum deinde calefactum officioſiſſimè propinant cum convivis invitatis, tum quibuſcunque honoris cauſa iſtos ſalutatum venientibus. idque ea animorum inclinatione ut Principes etiam viri, non detrectent, quin potius honorari ducant, ſuis manibus hanc herbam vel amicis decoquere, vel alioquin ei miſcendæ temperandæve operam ſuâ impendere. exſtructis propterea in palatiorum ſuorum interioribus, conclavibus ac focolis ex pretioſiſſimis lapidibus lignisve iſti operi ſpeciatiſſimè dicatis. in quibus etiam curioſè aſſervantur ollæ, tripodes, infundibula, calices, cochlearia aliaque perpolita huius culinæ instrumenta, quæ aliquot aureorum millibus redempta, ac ſericis integumentis involuta intimis ſolummodo

amicis oſtendunt, neque minori habent loco, quam apud nos ad amantes, gemmas, ac baccata ſummi pretii monilia. uti videre eſt apud *Joannem Maſſaum* rerum Indicarum lib. VI. & XII. & *Ludovicum Almeydam* ſelect. epiſt. lib. IV. & *Petrum Jarricum* tom. II. lib. II. cap. XVII. & *Matthæum Ricciū* de Chriſtian. exped. apud *Sinna* lib. I. cap. VII. *Aloſium Frois* in relat. Japonic. *Jacobum Bontium* dialog. VII. Medic. Ind. *Joannem Linſcotum* cap. XXVI. quibus addendus *Tulpius* ignotus adhuc, *Nicolaus Trigantius* ſtr. de regno Chin. c. 3. pag. 34. *Alexander de Rhodes* in Gallico tractatu de China pag. 25. *Olearius* in Perſ. Itiner. pag. 599. *Mandeslo* c. 11. p. 42. *Bernh. Varenius* c. 23. pag. 161. *Neuhof* pag. 37. 438.

Vires inſuſi herbæ Thee tres potiſſimum enumerantur, quod caput levet & ſervet à ſomno immune, vaporesque reprimat, ventriculum roboret, renesque calculo & arenis purget. Clariffimus *Simon Pauli* hanc herbam Thee putat eſſe Myrtum Brabanticam, Dodonei Chamæleagnum, Germanis Poſt dictum. Quo ad uſum vero herbæ Thee in *Schröderi* p. m. M. ſcriptis ſequens Conſilium in gratiam Magnatis cujuſdam olim exaratum, reperitur eſt: quod *Lector* æqui bonique conſulat.

Gebrauch des Ost-Indi-  
schen Kräutleins Thee oder  
Chia genandt.

**W**Orzu gemeltes Kräutlein in Me-  
dicina dienlich / wird auß vori-  
gem (priora hæc non habentur) gnug-  
sam eingenommen seyn / nemlich kurtz  
zu widerholen / ist seine Eigenschafft  
die Dünste zu discutiren / und zu zer-  
theilen / dannenhero es in allen Zufäl-  
len / so auß den Dünsten entstehen  
mögen / nützlich kan gebraucht wer-  
den / es sey præservando & Curando.  
Als in specie in Catarrhis , und dan-  
nenhero entstehenden Haupt- und  
Brust-Kranckheiten / Augenflüssen/  
Schwermuth des Haupts / Schwin-  
del/ Engbrüstigkeit/ Herzklopfen/ &c.  
Wie auch im untern Leibe zu schwä-  
chen Magen und Undauligkeiten. In  
den Gliedern dienet es zu derselben  
Schwachheiten/ als Podagra, nicht  
weniger wird es ad Calculum gerüh-  
met / zumahlen die Chinesen welche  
es sehr gebrauchen/ solchen Kranckhei-  
ten der Glieder und Nieren befreuet  
seyn sollen. Insonderheit gebraucht  
man es zur Verhütung der Truncken-  
heit/ so mans vorm Trunck einnimbt/  
oder aber die auß dem Trincken ent-  
standene Crapulam zu zertheilen / so  
mans nach der Trunckenheit gebrau-  
chet. So man auch begehret den  
Schlaff abzuhalten / und zu wachen/  
wird dieses Kräutlein sehr gebraucht  
und gerühmet. In Summa hält

man darvor daß es die Kräfte des  
Menschen stärke/ und die Zufälle / so  
demselben auß böser Luft und sonst  
entstehen können / verhüten / wie es  
dann alhier deshalb von etlichen  
dieses Orts subskribirenden Abgesandten  
Morgens gebraucht wird.

1. Der in India gemeiner Gebrauch  
ist / daß sie solches Kräutlein in gelin-  
der Wärme gedörret / in Wasser sie-  
den / zum Geschmack nur wenig Zu-  
cker darzu thun / und also warm einge-  
schlorpfen / und kan man auff einmahl  
nehmen / des Kräutleins ein halb  
Quintl. des Wassers so viel man auff  
einmahl trincken will / zuckers nach  
Belieben / daferne mans aber gebrau-  
chen will / die Crapulam , oder sonst ei-  
ne angestoffene Kranckheit zu discuti-  
ren / mag man das Kräutlein / biß ein  
halb Quintl. fieden.

2. Die Japonenses gebrauchen sich  
vielmehr des gepulverisirten Kräut-  
lein in warm Wasser / oder in ihrem  
Getränk eingenommen / und mag  
solches geschehen von ein viertel Quen-  
tins / præservando , oder einem halben  
Quentins / oder ein ganz Quentins  
Curando.

3. Kan mans süßlicher brauchen in  
destillata. Nemlich / nehme man des  
Kräutlein zu zwey Unke / gieße drüber  
firnen Wein / oder nach Belieben ein  
destillirt Wasser / als Melissentwasser /  
oder aber ein ander Wasser / so zu dem  
Affect appropriirt / dazu mans ge-  
brauchen will / als zum Calculo die

Aquam



# A P P E N D I X.

11

Aquam Fragorum vel Petroselin, zum Haupt die Aquam Ceraforum vel Majoranz / ein Maß / und thue nach Belieben ein Loth Zimmet darzu / laß es einen oder zween Tag stehen / und distillir es darnach per Balneum Mariæ, biß auff ein halb Maß / davon trincke man Morgens ein oder zwey Löffel voll.

4. Mag mans auch füglich gebrauchen in infusione. Nämlich / man nehme deß Kräutleins anderthalb Unß / gieße obgemelte liquores, oder aber Vinum Malvaticum, das vierte theil einer Maß darüber / und trincke davon Morgens 2. 3. oder 4. Löffel voll. Da man auch wegen angenehmen Geschmacks dazu wenig Zimmet und Zucker vermischen wolte / stehet zu belieben.

5. Da mans zu den Glieder Krankheiten / oder zum Calculo, wie auch zur Beförderung der digestion oder Chylolis gebrauchen wolte / könte man Cremorem Tartari in Aqua appropriata vel fontana, so viel man kan zergehen lassen / und solch vom Tartaro imprägnirtes Wasser zur Infusion gebrauchen / und hat man zu merken / daß zur Beförderung der Chylolis solch Infusum oder auch destillatum am füglichsten bald ins Essen oder im Anfang deß Essens gebraucht wird.

6. Da man mehr Belieben zu einer Conserva hätte: so stosse man das Kräutlein gröblich / zerlasse guten Zucker in einem appropriirten Wasser /

siede es ein / biß es wie ein Syrup wird / und vermische das grobe Pulver damit / wie eine Pattberg / zu solchem kan man nehmen ungefehr so schwer deß Kräutleins / so schwer auch oder ander halb mahl so viel Zuckers / und nimbt man davon ein / wie eine kleine welsche Nuß groß.

7. Kan mans auch in Morselfen bringen / mit Zucker in bequemen Wasser zerlassen / welches den Apotekern bekandt.

8. Könnte zwar davon auch ein Extractum mit dem Spiritu Vini oder auch mit oberzehlten mit dem Tartaro imprägnirtes Wasser gemacht werden / weilen aber in der inspissation solches Extracti das Spirituosische oder Volatilische Theil / darin die beste Krafft bestehet / weg rauchet / achte solches nicht rathsam / es sey dann daß in solcher inspissation per destillatorium der Spirituosische Liquor auffgefangen / und folgendes das Extractum gar gelind inspissirt werde / alsdann mans beyde gebrauchen kan / nemlich das Extractum kan man zu Pillen brauchen / und biß auff 7. 8. oder 10. gr. schwer Morgens einnehmen.

Deß Lignoris dosis ist / wie oben vom destillato erwehnet. Auß diesem Fundament erhellet auch / daß man in decoctione deß Kräutleins gemacht sam verfahren müsse / damit die beste Krafft nicht weg rauche.

Die Zeit zu gebrauchen / außgenommen obige Casus, ist / daß Morgens

nüchtern / da die Kraft desto besser in den Leib penetriren kan / und ob zwar solches täglich ohne Schaden geschehen könne / jedoch aber / weiln durch oftmahligen continuirtem Gebrauch / die Natur sich daran gewehnete / und also gleichsam ein nutriment würde / auch also keine Medicinalische Wirkung würckete / achte besser / daß es nur wochentlich zwey oder drey mahl iterirt werde / es sey dann / daß die böse Lustt es erforderte / oder sonst nöthig were.

Schließlich muß auch hinzusehen / daß der Schlaf als eine Ersekung der Spirituum ein notwendiges requiritum zur Erhaltung des Menschlichen Lebens und der Kräfte / derohalben der Gebrauch solches Krauts auch darnach zu dirigiren.

Hab dieses auff Begehren aufsehen und Erinnern sollen / darneben Medico praesenti heimstellende / da solches pro te nata mit andern / sive simplicibus, sive compositis zuvermischen und zugebrauchen nöthig.

Wünsche also Gottes Seegen und Gedeihen / daß der Gebrauch zu annehmlicher beständiger Gesundheit gereichen möge.

#### Coffi.

Olim Africa fuit novitatis studiosa, nunc Germania, non contenta usu tabaci & aliorum exoticorum, sorbitionem potus Coffi prolixè usurpans. Ex fatis Boni correctis & assatis pulverem struant, & ex illo nigram tinctu-

ram per aquam ferventissimam extractam, pauxillo sachari edulcoratam calidam sorbillando bibunt. Fufius hanc rem exposuit pronuper D. Laurentius Straussius in disputatione respondente Francisci Peters Gissæ habitæ, quam hic inferere commodum visum est.

#### Laurentius Straussius de Coffi.

##### CUM DEO.

Quaquam Fabarum usus, & esus prohibitus olim fuerit à Pythagora; quod flores lituris suis nigris signaturam referant lugubrem, & animas mortuorum, quæ in iis habitent: ab aliis autem etiamnum interdicatur, quod existiment, sensus exinde hebetari, & insomnia turbulenta excitari; quia tamen ipsæ fabæ & alimentum & medicamentum præbent secundum atque innoxium, nullam operam aut oleum me perditurum fido, si de fabis in publicam cathedram aliquid profiteram.

II. Non autem in præsentiarum agere animus est de Fabis nostratibus, fatis aut sylvestribus: Nec de Phaseolis nostris aut Lupinis, quorum tamen omnium frequens usus esse solet, partim in culina, partim in Pharmacopolio, cum ad externos & internos morbos eradicandos frequenter iis Clarissimi Medici & Chirurghi uti soleant, in hydropo, v. gr. calculo, retentione urinae,



urinæ, dysenteria, lienteria, sugillationibus, & aliis affectibus p.n. Nec etiam de *Faba Egyptiaca* Dioscoridis, p. 228. quam Crocodili oculis timentes fugiunt, teste *Plinio* p. 234. Nec de *Phaseolo Paludani Gareti* Cacao ( è quo Chocolate paratur ) simili, *Coles* alias dicto apud *Clusium* p. 64. aut *Fabis purgantibus Cartaginensibus* Manard. pag. 335. aut *Ferdinandi Lupezii* de Castagneda l. 7. cap. 78. in Insula D. Thomæ nascentibus; hac vice exponetur *Faba Arabica Bon*, è qua potus resultat, *Coava* dictus, quo olim jam *Egyptii & Arabes*, atq; nunc hac tempestate novitatis avidi *Angli, Galli, Germani*, spreto *Tabaco & Thee*, frequenter uti solent.

III. De hac faba *Bon*, seculo post natum Salvatorem nostrum, nono, primus, quod ego quidem sciam, sub nomine *Bunchi* memoriz aliquid reliquit *Abubetri Arazi* filius *Zacharia Mahometus, Rases*, communiter *Rasis*, dictus, Medicus Clarissimus Arabs, qui multos libros scripsit elegantissimos, X. quidem ad Regem Mansorem, & alios doctissimos XV. Hic *inquam*, primus exposuit, quid *Bunchum* sit. Ait enim pag. 74. calidum esse & siccum, quod stomacho congruum existens, mali sudoris odorem atque psilotri incidat & auferat. vide l. 3. ad Mans. pag. alleg. 74.

IV. Post *Rhasin, Abuhali, Alhasen Ebenhali, Ebenfina*, communiter *Avicenna* dictus libr. 2. tract. 2. pag. 281. *Bon* sub nomine *Bunchum* explicat, *Bunchum* quid est, (querit?) Resp. Est res

delata de *lamen*. Quidam autem dixerunt, quod est ex radicibus anigailen: quum movetur & cadit. *Electio*, melius est Citrinum, & leve boni odoris, Album verò & grave est malum. Natura est calidum & siccum in primo, secundum quosdam est frigidum in primo. *Operationes & Proprietates*. Confortat membra. *Decoratio*. Mundificat cutem & exiccat humiditates, quæ sunt sub ea; & facit odorem corporis bonum, & abscondit odorem psilotri. *Membra Nutrimenti*. Est bonum stomacho. Huc etiam aliis quadrare videntur, quæ *Avicenna* tradit de *Meisse*. pag. 359. loc. cit. & lib. 1. fen. 3. dict. 2. cap. p. 194. sed differunt *Bon* & *Meisse*.

V. Penitus autem fabam *Bon* & potum inde confectum describit *Prosper Alpin*. libr. de Med. Egypt. & de Plant. Egypt. *Egyptiis inquit* pag. 118. in usu frequentissimo est semen *Bon* ex quo decoctum parant. Huic omnes non secus ac nostri in publicis tabernis vinorum potationibus operam dant. De eoque singulis diebus sæpè admodum calenti interdium, sed maximè mane jejuno stomacho large bibere consueverunt, siquidem ipso ventriculo calefieri roborariq; apud eos compertum sit, non minusque etiam viscerum obstructions tolli, quotidie experiantur. Mulieribus ad evocandos menses presentaneum est remedium, apud eosque in usu est frequentissimo, quibus diminutè fluentibus ejus decocti probè calentis multum eporant, paulatim modi-

cum forbitantes. Sic enim in usu est apud omnes, ut paulatim ipsum deglutiant. *Capite verò quarto* inferius pag. nimirum 122. fufius hanc rem persequitur *Alpinus*. In frequentissimo usu, ait, ibi est decoctum *Chaoua* appellatum, quod ex quibusdam seminibus nigris fabas imitantibus parare consueverunt. Duobusque modis ab ipsis parari solet, horum enim alii decoctum faciunt ex seminum nuper dictorum, tunicis seu folliculis, & alii ex eorundem seminum substantia, quod ex folliculis paratur, efficacius, quam ex seminum substantia elaboratum: prædictum semen hoc *Bon* vocant, arboremque ipsum ferentem vidi in quodam Turcæ Bei Viridario ex Arabia delatum, quæ Evonomo maximè similis erat.

Illius verò decocti facultas est frigida & sicca, quo ad primas qualitates temperata, cui etiam mista est caliditas quando illa semina duplici substantia constant, altera crassa, & terrea, quæ coquunt & roborant, altera calida in tenui substantia fundata, frigidaque modice prævalent, qua calefaciunt, abstergunt, obstructaque aperiunt. Horum decoctum, cichorei decocto gustu proximum est, quod tamen ipso valentius obstructa liberat. Cum ego animadvertissem mulieres, quibus cœperint fluere menses, ad eos adjuvandos, de eo calidiori semper paulatim multum sorbillare, apud illasque omnes ad juvandam eam va-

cuationem in usu esse frequentissimo, cœpi, illa perdoctus experientia, in omnibus illo uti, quibus aliquam ob causam eorum purgatio menstrua destitisset; quod quidem felicissimè multis evenisse vidi, exindeque didici, hoc genus remedii pro evocandis menstruis ab uteri obstructis venis esse præstantissimum post universalem tamen corporis vacuationem, mane jejuno stomacho istud decoctum assumptum efficacissimè menses provocat, temporeque quo multis jam vehementibus doloribus minutæ difficulter exeunt, eis præsentaneo est auxilio. Parant autem illi hoc decoctum sumentes nucleorum illorum seminum à folliculis mundatorum libram unam & mediam, eaque parum igne torrefaciunt, contostaque bulliunt, in aquæ lib. viginti, aliis sumentibus nucleis prædictos torrefactos ac minutim cōfractos per diem infusos in aquam manere atque alia nulla præcedente infusione eos bulliunt ad consumptionem medietatis, percolatumque decoctum ad usum servant in fictilibus vasis undique clausis: Eodem itidem modo parant decoctum ex seminum folliculis, in minori tamen quantitate sumptis, pro quo parando accipiunt alii prædictorum folliculorum sex uncias atque alii novem, in librisque viginti aquæ fontis ad consumptionem medietatis ipsam coquentes. Hoc decoctum stomacho summopere conducit, idque valdè calidum & effervescentes, jejuno stomacho

macho  
ciatim  
tem vino  
nostrorum  
dolere ob  
cocto dele  
Ipsam fa  
Egrot. h  
tem vidi,  
Turcæ, cu  
qua semin  
Ban appell  
decoctum  
loco ipsi p  
cis canopo  
Hæc semin  
ur. Arb  
Evonomo  
men folia  
bat viridi  
usus et illor  
tillimus, ad  
coctum, q  
tur, alias a  
Usantur  
dum venerit  
vandamque  
minis ad  
structiones  
lienisque fri  
tionibus, si  
ctum multo  
etiam utero  
tur; ipsum  
ationesque



macho paulatim sorbentes potant ad ciathi mensuam, & eo amplius: ut autem vino in ænopolis sive tabernis nostrorum multi ebrietati dediti indulgere observantur, sic illi *Coava* decocto delectantur eique indulgent.

Ipsam fabam *Bon* describit in Plant. Ægypt. historia pag. 26. seqq. Arborem vidi, inquit, in Viridario Halybei Turcæ, cujus Iconē nunc spectabis, ex qua semina illa ibi vulgatissima *Bon* & *Ban* appellata, producuntur: ex his omnes tum Ægyptii tum Arabes parant decoctum vulgatissimum, quod vini loco ipsi potant, venditurque in publicis ænopolis, non secus quam apud nos vinum. Illiq; ipsum vocant *Coava*. Hæc semina ex felici Arabia asportantur. Arbor quam me inspexisse dixi, *Evonomo* similis observata est, sed tamen folia crassiora durioraque habebat viridiora perpetuoque virentia; usus est illorum seminum omnibus notissimus, ad parandum jam dictum decoctum, quod quo pacto ab iis paratur, alias à me dictum est.

Utuntur ejus decocto ad roborandum ventriculum frigidiorē, adjuvandamque concoctionem, & non minus ad auferendas à visceribus obstructions, in tumoribusque hepatis lienisque frigidis & antiquis obstructionibus, feliciori jam successu decoctum multos dies experiuntur. Quod etiam uterum maximè respicere videtur; ipsum enim & calefacit, obstructionsque ab eo auferit, sic enim in fa-

miliari usu est, apud omnes Ægyptias Arabesque mulieres, ut semper dum fluunt menses, ipsorum vacationem, hujus decocti ferventis multum paulatim sorbillantes, adjuvent, ad promovendos etiam in quibus suppressi sunt; usus hujus decocti purgato corpore multis diebus utilissimus est. Avicenna de his seminibus meminit, similesque vel eosdem usus de seminibus memoriæ prodidit, ipsumque semen calidum in tertio & siccum in secundo gradu constituit, quod tamen verum non videtur, quando semen sapore dulcescat, cum paucō amaro, nullamque acrimoniam præferat: Nilominus ipsum obstructionibus viscerum, frigidisque humoribus hepatis vel lienis multum conferre docuit.

VI. *Veslingius* ulterius hæc profequitur in Obsery. pag. 22. ut & *Bauhin.* in Pinace pag. 428. *Olaus Wormius* in Musæo pag. 189. *Olearius* Itin. Persic. pag. 422. & ante hos *Léonh. Rauvvolf.* in Itin. pag. 102. Pronuper verò mentionem quoque facit *Möllenbroc* p. 117. de Arthr. Vaga Scorbui.

VII. *Bon* itaque fructus est arboris, corporis perfectè mixti organici, anima vegetativâ præditi. Arborea enim & reliquæ Plantæ, frutices, nempe, suffrutices, & herba (tot sunt earum differentia) Corpora dicuntur perfectè mixta animata, ad discrimen inanimatorum & imperfectè mixtorum corporum naturalium. Vivunt autem plantæ, sed non sunt animalia, nec sentiunt,

aut dormiunt. Sola anima vegetativa pollent, specie tamen inter se differunt, sed in tantum, in quantum metalla, ut unum sapè in aliud possit transire. Non enim plane negamus *Chrysopæiam*.

VIII. Dicuntur autem *vegetabilia* Corpora naturalia *mixta*, ad differentiam Corporum naturalium *simplicium*, ex quibus nempe mixta componuntur juxta *Aristotelem*, & in quæ ultimo desinunt, uti ante hunc exposuit *Hippocrates* de nat. hum. l. 17. & 12. & 13. ex qua tamen descriptione numerus *Simplicium* quaternarius non tam facile emergit, ut exinde Dn. D. *Joh. Dan. Horstius*, Phil. & Medic. Excellentissimus, hujus Academiæ Professor Med. Prim. per multos annos, & nunc Collegii Medici Francofurtensis Senior & Archiater Hassiacus meritissimus, in elegantissima sua *Physica Hippocratea elementa principalia* duo p. 25. asserat *Aquam & Terram*, & duo minus principalia aut potius ligamina *Ignem æstimet & Aerem*. Et hinc in dubium vocant quidam tria principia *Chimica* *Sal, Sulphur, Mercurium*, tum quod non omnia corpora mixta in illa tria possint reduci: tum quod plura corpora mixta in plura, quam in illa tria resolvantur. Hoc probare nituntur, quod in tria liquida *plegma, spiritum, oleum*; & duo sicca principia, *sal fixum & volatile* v. gr. C. C. Tartarus, Succinum, Urina & multa alia reducuntur: Illud verò, quod nullus Chemicorum etiam Adeptorum probaverit,

se in *Sal, Sulphur & Mercurium*, tanquam prima principia, Aurum unquam v. gr. Talcumve redegeisse. Quid nos statuamus de numero principiorum corporum naturalium, in conflictu exponemus.

IX. Quomodo autem paretur *potus Coffi*, nunc exponendum penitius: Superius quidem mentio facta est, sed non ita specialis. Fabæ *Bon a*. fructus arboris depictæ A. assantur in depicto ferreo Instrumento lic. B. per quod, fabis illis excorticatis b. repletum, & operculo C. tectum, transire possit veru, quo illud ad ignem agitur, donec assæ sint contentæ fabæ. Pulvis ita tostus in aquam ferventem projicitur, liquorque inde tinctus calidè jejuno stomacho cum pauxillo sacchari sorbitalatur. Francofurti, ubi in usum Medicum primus illum potum induxit, & aliquot ægris cum successu propinavit Dn. D. *Horstius*, supra laudatus, in libra una aquæ ferventissimæ infundunt duas drachmas aut tres pulveris tostæ.

X. Virtutes hujus *Potus Coffi* superius in genere expolitæ sunt, in specie verò *Arabs* quidam Medicus *Oxonii* in Anglia edita descriptione, apud *Henricum Halle* 1656. sequentia enarrat. Fructus *Bon* (ait) colligitur in mense *Ab*, fructus est instar fabæ (a), quæ enucleata dividitur in duas partes. (bb) Flores ejus sunt albicantes. Calida est hæc faba in primo gradu, & sicca in secundo, quoad corticem. Nucleus verò temperatus planè est & modicè ac amicè



m, tan-  
um un-  
Quid  
mipo-  
acomi-  
parem  
peant  
da et, la  
m a trum  
in depic  
t quod, fi-  
etum, &  
g possit  
tur, done  
vis na co  
opitur, li-  
de pema  
na, torbil-  
etum me  
induxit, &  
pina d  
us, in lora  
infundunt  
eristoli,  
Coffi supe-  
in specie  
s Oxonii in  
qua Henri-  
a enarra  
t in men  
(a), que  
arece. b)  
Calida est  
siccamie-  
cluso vero  
non a  
amco



amicè exiccans. Ipse potus utilis est in catarrhis, de stillationibus pectus occupantibus, suppressione mensium & urinæ, ebullitione sanguinis, & debilitate virium. Et tale encomium hic potus nactus quoque est in *Dania* & *Suecia*, ibidem nunc Magnatibus etiam familiaris.

XI. *Lutetia Parisiorum* jam modo in multis tabernis publicis potum *Coffe* vendunt, cum seq. elogio.

*Lestres-Excellentes Vertus*

De la Meure Appelle'e Coffe.

**C**offe est une Meure, qui croist dans les deserts d'Arabie seulement, d'où elle est transportée dans toutes les dominions du grand Seigneur, qui estant beuë desseiche toutes humeurs froides & humides, chasse les vents, fortifie le foye, soulage les Hydriques par sa qualité purifiante, souveraine pareillement contre la galle, & corruption de sang, raffraichit le cœur, & le battement vital d'iceluy, soulage ceux qui ont des douleurs d'estomach, & qui ont manque d'appetit: est bonne pareillement pour les indispositions du cerveau, froides humides & pesantes: la fumée qui en sort, est bonne contre les defluctions des yeux, & bruit dans les oreilles: souveraine aussi par la courte halaine: pour rhumes qui attaquent le poulmon, & douleurs de rate: pour les vers, soulagement eztraordinaire, apres avoir trop

beu où mangé, rien de meilleur pour ceux qui mangent beaucoup de fruit.

L'usage journalier pour quelque temps, fera voir les effets cy dessus, à ceux qui indisposez, s'en serviront de temps en temps.

Ladite Boisson, & plusieurs autres, se vendent à l'enseigne du grand Turc, au bout d'une longue allée, dans une salle basse, rue des boucheries, au faux bourg saint Germain.

Prodesse nempé contra flatus, debilitatem hepatis, hydropem, bilis abundantiam, sanguinis corruptionem, cordis debilitatem, stomachi dolorem, anorexiam, cerebri debilitatem, defluxiones ad pulmonem, oculorum & aurium, dolorem lienis, &c.

XII. Inter alios potus, ait *Ran-vvolffius* superius allegatus, Turcæ utuntur potu quem magni æstiment, & *Chaube* dicunt, quique colore atramentum æmulatur, & admodum conveniens in affectibus præprimis ventriculi: solent liquorem hunc tempore matutino publicis etiam in locis sine omni nausea assumere, ex scutellis argillaceis, & procellinis, sæpius labra admovent, parce tament bibunt, ordinem sedentes in circulo observantes; compositionem hujus liquoris ingrediuntur fructus quidam *Buncho* ab incolis dicti, exterius magnitudine & colore Baccas lauri æquantes, duabus tenuissimis tunicis induti, secundum illo-



illorum relationem, ex *India* allati, quoniam hi exigui sunt pretii, & intus duo grana flavi coloris, diversis in duabus capsulis inclusa tenent, insuper etiam viribus, nomine, colore *Banchar* Avicennæ & *Banca Rasis* Alman, in torum similis est; hosc esse itatuo, tamdiu, donec à Viris doctissimis meliora perdoctus fuero, hic potus illis admodum familiaris est, quapropter etiam multi illorum in hospitiiis publicis vendentium & mercatorum de fructibus mercaturam facientium in Batzar inveniuntur. Insuper illum adeo salubrem esse probantur nos vinum absynthites vel alia vina medicata.

XIII. Amstelrødami *Iohan. Ainsworth* multis elogiis hoc anno hunc potum vendit, quod humidum radicale conserve, ventriculum roborat, oculorum morbos tollat, doloribus capitis medeatur, catarrhos solvat, paralysi, podagræ, hydropisi, & scorbuto resistat, calculum frangat, prægnantibus profit, &c.

XIV. Excellentiss. verò *D. Simon Pauls* Potum *Coffi* plane damnat in *Comm. de abusu Tabaci & Herba Thee* pag. 3. quod corpora & animos effeminet; non quidem quod hic potus adeo refrigeret, sed quod sulphure proprio instat *Tabaci* & *Agnicasti* calculum & sensim exiccet, pag. 46. Ast loquitur & scribit de *abusu* Clarissimus Vir, aliàs *Rhabarbarum*, *China*, *Sassafras*, & *Santalum* quoque, aliaque medicamenta extra *Europam* nata, in exi-

lium forent ableganda. Abusum potus *Coffi* & nos non minus improbamus, quam abusum *vini*. Usus verò retinemus, cum compertum habeamus, multos a potu *Coffi* modicè & debite, manè nempe jejuno stomacho cum pauxillo sacchari sumpto, benè habere, & feliciter experiri, potum illum stomacho prodesse, catarrhos sistere, totumque corpus roborare. Concludimus itaque cum *Veslingii* Præstantissimieffatæ, *Europæis* hoc medicamentum non esse inutile aut noxium, quo ipso huic dissertationi impositus esto hac vice finis.

#### Umbilicus Marinus.

*Umbilicus Marinus*, referente *Angelmo Boetio* l. 2. de gemm. & lapid. cap. 177. *umbilici humani* similitudinem & magnitudinem habet, unde nomen obtinuit *umbilicus Veneris*, & Germanicè etiam *Weerbonel* ac si dicas *fabam marina*, vocatur. Videtur diligenter intuenti conchæ esse rudimentum aut concha compressa, spiras enim habet in *Cyrum* actas colore rubello & albo hinc inde distinguuntur, inferior pars plana est ac nigrior paulo superiori ac si rubedini umbræ color admixtus esset, aliquando purpurascit vel albicat.

Reperitur in limacis orificio dum se hyeme occludit ac ostioli vel operculi loco est, ut in vulgaribus limacibus, crusta quædam alba. Exterior pars ea est quæ extuberat. *Limax vulgaris* huic minor est ac *umbilicum marinum* ferentibus similis, nisi quod concha

umbilici marini crassa & durissima sit ac exteriorem partem habeat quasi creta obductam, interioremque margaritarum instar splendentem ut quis margaritifera conjiciat. *Cretenses* hunc lapidem non umbilicum sed oculum marinum vocant, ac oculis gestatum prodesse autumant. A Veneri nomen habet, quod puellis gratiam conciliare, illas amabiles, pulchras, virisque optatas reddere, illarumque morbos abigere credatur. Insuper gestatus Amuleti loco præcavere ab Erisipelate traditur. Narrat *Baccius* sanguinem unde quaque fluentem mirifice sistere & præsentaneum afferre auxilium, si ex parte ejus plana & aversa, cum saliva hominis fronti applicetur. Id quod semel atque iterum *Patavius* se observasse tradit, in vetula quæ per scalas in caput decidit, & plurimum sanguinis per os & nares præsertim verò ex vulnere capiti inflicto profudit, qui cum variis remediis resisti non posset, adhibito lapide, mox fuisse cohibitum, non sine admiratione. Ob id ait idem author à Gallis secreti loco mulieribus, nimio mensium fluore laborantibus, in pulverem tenuissimum redactum, cum aqua appropriata vel conserva aliqua utilissime exhiberi. Illos quoque qui sanguinem per intervalla rejiciunt, & expuunt, manifestum ab eo percipere auxilium, si pulverem ejus cum pari portione cornu cervi ussi, vel corallorum rubeorum præparatorum in ovo sorbili sumptum

rint. De herba *Umbilico Marino* dicta vide *Tabernæmont.* pag. 494.

#### Umbilicus Veneris.

*Cymbalum*, *Acerabulum*, *Umbilicus Veneris* *volundæ*, *Nabeltraut* secundum *Galenum* humidæ naturæ est & frigida, saporis acerbi & amari, unde refrigerat adstringit, & mundificat. *Dioscorides* commendat radices & folia contra calculum, quod illum frangant & expellant. *Hydropicis* quoque folia profunt. Externè sistunt fluxiones *Erysipelatodes*, tumoresque calidos & biliosos, strumas item & membra refrigerata sanant. Conjugatur *Dodonæus*, *Tabernæmontanus*, *Bauhinus*. Quo ad usum *Cotyledonis* seu *Umbilici Veneris* cautelas nota *Clarissimi Pauli* pag. 278. quadrip. botan.

#### Os sepia.

*Os sepia* candidum os est, superiori parte durum ac leve: inferiori autem fungosa quadam medulla repletum, fuscus descriptum à *Matthiolo* pag. 242. Usus ejus est nonnullis externus in unguentis validè detergentibus.

#### Crap Serberth.

Massa rubea compacta duplex ad nos ferrur, una ex *Silesia* altera ex *Bavaria*, melior priori. Utuntur autem tinctores potissimum hac materia in quorum gratiam magna copia advehitur. Præter hunc usum vero vulgus cum successu pulverem hujus *Crap* assumit ad sanguinem ab ictu aut casu coagulatum dissolvendum, in haustu cere-



cerevisiæ calidæ ad drachmam unam & alteram, vid. p. sup. 4. 141. Dicunt hac massa radicum rubia tinctorum contusarum, Hispanos Chocalatam tingere.

Pila Marina.

Pila marina Meerballen differunt à spongiis marinis Meerschwämmen / pila autem marina alias dicitur Alcyonium, Sphæra thalassia, Pala marina. Vid. Bauhin. in Pinace p. 368. Tabernemont. p. 196. part. 2. & ante hos Diosc. l. 5. cap. 94. qui quinq; genera alcyonii allegat. De ortu conjung. Plin. l. 32. c. 8. Alcyoniâ autem omnia, referente Galen. l. 1. i. simpl. med. detergunt ac digerunt, qualitatem habentia acrem & calidam facultatem, verum aliud alio non parum plus minusq; &c. Conjung. Matthiol. p. 870.

Matalista.

Radix hæc à Batavis ad nos missa cum elogio, ut æquet virtute Jalappam, seu Mechoacam nigram ad drachmam unam exhibita. Sed nec periculum hic factum, nec in usu est. Quo ad externam figuram bryoniam æmulatur aut mechoacam, potius tamen albam quam nigram, magisque villosa est quam utraque Mechoaca.

China Chinæ.

De China Luis Veneræ rizotomo, superius actum lib. 4. Chinam Paraqueti pronuper Batavi acceperunt ad cientes vomitus. China vero China dicta, febrifugum est medicamentum Peru-

vianum hac tempestate maximè usuale ad drachmam unam & duas. Quidam Cassiam caryophyllatam vendunt pro China Chinæ, sed fallunt & falluntur. Vera China China caryophyllos nec olet, nec sapit. Est nempe cortex non absimilis cortici junioris quercus, saporis amari & paulum ingrati. Dosis communis, ut dictum, pulveris China China ad fugandas febres drachma una ad duas, instante paroxysmo sumenda, cum aqua Card. ben. fum. aut alia febrifuga.

De China China, alias Pulvere Indico, Americano, Peruviano, Iesuitico, de Lugo, (quod 1650. ex Peruviano Regno primum à Iesuitis Romam fuerit delatus) Kinkinna, Palo de Calenturas, Cortice febrifugo dicta, scripserunt Iohannes Iacobus Chisletius, Dionysius Lonquet in horto Paris. Rolandus Sturmius, Melippus, Conigius, Gaudentius Brunacius, Wolffgangus Hæferus, Willis, Rolfinccius. Arbor hujus China China teste Chisletio pag. 7. & Gaudentio Brunacio Romano pag 14. Gannanaperide incolis dicitur, multumque differt à Cassia Caryophyllata, ut videre est ex Pisonis descriptione, quâ proficitur Corticem Cassie Caryophyllata saporem reddere cinamomi cum caryophyll. prædominio, qui sapor in China China sincera non reperitur.

Ipsa China China calida & sicca est, vim habens aperiendi, discutiendi, attenuandi, resolvendi, putredinem arcendi, roborandi.

C 3

Ufus

Ufus est in debellandis febribus intermittentibus, & hic quoque *Frangula* satis frequens, quod non careat optato successu. *Corticis China* *China* drachma dua, secundum *Gaudium Brunacium* pag. 17. tunduntur subtiliter, ac per setaceum trajiciuntur. Tribus inde horis ante paroxysmum maceratur pulvis in vini albi meracioris cyatho, dumque frigus febrile seu rigor irrepere incipit, in eo levi, ac primo accessione principio vinum, & pulvis praebeatur, & aeger se in lecto pannis coopertus componit. Alii sumunt pulverem *Chinae* *Chinae* in substantia, dilutum tamen praefert *Conigius*. Essentiam describit *Rolsinccius* aliamque *Seurimus*. Potest etiam parari inde *Spiritus*, extractum & oleum. Nos hic utimur plerunque pulvere ad drachmam unam cum successu felici.

Quoad operandi modum *China* *China* febres tollit nec sensibilibus, nec insensibilibus, sed per vim praecipitantem febrile fermentum. Causa enim, volente *Sennerto* l. 2. de febr. p. 255. febris est fermentum aliquod peculiare, quod quamdiu non praecipitatur medicamentis idoneis, tamdiu febris praesens manet in corpore.

Quoad *Chinam* *China* sequentia notanda dat *Willis* pag. 154. de febr. *Primum*, quod hoc Pharmacum intus sumptum, in sanguinis massam vim suam & energiam praecipue exercet, quippe viscera non omnino irritat, neque excretionem quamvis, aut molestiam illis in-

fert, insuper dummodo sanguini virtus ejus communicetur, *Nervus* *vis* *vis* *vis* non omnino exeritur, quare non semper paroxysmus proximè secuturus, at secundus aut tertius deinceps ab eodem assumpto praecavetur: atque ob hanc rationem quo citius cruorem afficiat, usitatum est ut una cum pulvere, liquor eodem valde impraegnatus propinetur sic enim in sanguinis massam, ejus particulae facilius convehuntur. *Secundo*, *Corticis* istius virtus sanguini impressa aliquandiu in eodem manet, idque brevius aut diutius juxta quod major aut minor medicamenti portio intus sumitur; etenim particulae ejus cruore confusae, cum ipso diu circulantur, & quo plures adsunt, eo magis massam ejus afficiunt, & effectum diuturniorem producant. Nam licet alimenta & alia quaedam ingesta in quantum a calore nativo statim subiguntur quicquid habent vir vim intra paucas horas exerunt; hac deinde assimilata, aut foras excreta cessant; tamen pharmaca nonnulla, intus admissa quia non facile perdomentur, nec irritatione citata illico foras eliminantur, per plures dies valde activa praestant atque sanguinem & succos, in hoc aut illo fermentationis ritu, dudum retinent, hoc observare licet de medicamentis quibuldam item de venenis & plerisque alexiteriis, quorum unica exhibitio per plures dies, eademque iterata longiori tempore, solet corpora nostra afficere, usitatum enim est a medicamen-

tis ca-



tis catharticis, si quando per vomitum aut sedes minus operantur, post plures hebdomadas pustulas & exanthemata exterius erumpere: quin etiam si à toxico epoto mors evitetur, diu admodum in sanguine & succis virulentiam delitescere; nemo est qui nesciat: Pariter etiam hic pulvis, & fortassis alia quam plurima intus assumpta, in spiritus & humores, quantumvis sopita videantur, etiam num agere perseverant.

*Tertiò*, licet medicamentum istud immediate in sanguinem & humores agat, tamen dyscrasiam febrilem in iis sitam haud radicitus tollit: quam cito enim ejus vis absumitur, & particula omnes à mixtione sanguinis avolarunt, affectus pro tempore solum suppressus, denuò emergit, & solito more accessiones repetit: quatenus verò natura hoc cessationis spatio, fortiore evaserit, ideo post recidivam, paroxysmi (uti prius) sed die tertio & quarto juxta primum morbi typum redire solent.

*Quartò*, Annotetur quod hoc remedium non quemadmodum vulgari febrifuga sanguinem figendo aut etiam fundendo accessiones febriles sistit; tunc enim paroxysmus semper ingruens, & non secundus aut tertius postea secuturus caveretur.

Quibus juxta positis, ut corollarii vice, de ipso operandi modo de quo hoc pharmacum agere videatur, quædam subnectamus; dicimus verisimile esse, quod cum particula ab eodem ingesto procedentes sanguini permiscen-

tur, ipsum in novam quandam fermentationem compellant, qua dum cruori particula continuo agitantur, ne materiam excrementitiam congerant, aut turgescencias febriles ineant, omnino inhibentur, quemadmodum enim post morsum canis rabidi aut ictus venenatorum animalium, ipse sanguis & succus nervosus diu venenatur, ne tamen magnas anomalias statim concipiant, alexiteria propinata eorum liquores in alia fermentatione detinendo prohibent, quorum usus si tam diu continetur donec corpuscula virulenta penitus avolarunt à labe isthac contracta nullum horrendum symptoma timeatur. Sin prius absutnantur remedia nimis parca exhibiti vires, illico repullulat venenum, & virus pristinum explo-di visum denuò in actum deducitur: non absimili ritu quando sanguis diathesi vitiosam nactus, succum alibilem pervertit, eumque ad plenitudinem congestum, quo rectius expellat, turgescencias febriles concipit, cortex iste Peruvianus tritus & exhibitus, particularum commercio, sanguinem licet dyscrasia affectum, fermentatione nova concitata, adeo exagitat alteratque ut succum alibilem aliquatenus coquat, ejusque recrementa continuo evaporet, ut in paroxysmi materiem, non uti prius congerantur: Cum verò è sanguinis consortio, hujus remedii particula penitus exhalarunt totaque virtus absorpta fuerit mala sanguinis diathesis prius contracta denuò emergit,

git, ideoque paroxysmi febriles solito more redeunt: forsan aliquando accidit, ut dum usu istius pulveris, accessiones supprimuntur, propter mutatam anni tempestatem, aut alius remedii ope, aut naturæ ipsius nisu, ista dyscrasia sanguinis sensim emendetur, adeoque febris demum sponte dispareat, hoc tamē non nisi raro contigisse novi, quoniā æquali fere certitudine, qua ab isto pulvere paroxysmos febriles supprimi, eosdem postea redire expectes.

Quod attinet ad qualitates sensibiles quibus hic cortex insignitur, constat ipsum amaritudine cum stipticitate quadam pollere, ut gustu indice similem ferè saporem referat, qualis in ple-  
risque alexipharmacis uti sunt radix gentianæ, serpentariæ, cōtrayervæ, &c. reperiri solet: quæ enim sunt actu amara in supprimendis fermentorum præternaturalium viribus, maxima virtute pollent; quinimo *radix gentiane*, (ad quam refert Chinam Chinæ D. *Glaus* & *Hæferus*) quæ optimè hanc corticem simulat, olim pro curatione fe-

brium quartanarum celeberrimi era-  
usus. Nunc autem licet hic pulvis Peruvianus sit unicum adhuc repertum febris quartanæ alexiterion, quod nimirum ipsius aliarumque febrium intermittentium paroxysmos (licet solum pro tempore) inhibet: attamen dubitandum non est, quin alia in rerum natura extent medicamina, quæ sunt æque febrifuga, atque sperandum erit, ut novi hujus inventi exemplo ducti, ad explorandas herbarum virtutes adhuc ignotas excitemur: ita dum singularum tentamini insistimus, & Medicinæ rationali Empirica adjungitur proculdubio quartanæ aliorumque Herculeorum morborum curationes felicius procedent: quod eo libentius sæculo huic, aut saltem posteris spondeo; cum manu ducente corticis istius analogia, medicamentum ad profligandas febres non contemnendi usus ipse non ita pridem varia percurrrens, ad invenerim, quod etiam pauperioribus quibusque succedanei vice, bono cum successu propinare soleo.

## INDEX.

|                       |        |                            |    |
|-----------------------|--------|----------------------------|----|
| <i>Asphaltum</i>      | pag. 1 | <i>Geranium moschatum.</i> | 6  |
| <i>Alliaria.</i>      | 2      | <i>Galle.</i>              | 7  |
| <i>Arabicum Gummi</i> | 3      | <i>Matalista.</i>          | 21 |
| <i>Botrys</i>         | 4      | <i>Oi sepiæ.</i>           | 20 |
| <i>China China</i>    | 21     | <i>Pila marina.</i>        | 21 |
| <i>Coccula.</i>       | 4      | <i>Tribuli Aquatilis.</i>  | 6  |
| <i>Coffi.</i>         | 12     | <i>Umbilicus marinus.</i>  | 19 |
| <i>Crap.</i>          | 21     | <i>Umbilicus Veneris.</i>  | 20 |
| <i>Damatum pila.</i>  | 5      |                            |    |

FINIS.



# INDEX MORBORUM ET REMEDIORUM.

**A.**  
**A** Bortus Fol. sanguiforb. 4.147  
Rad. bistort. 4.29  
Musc. Ufn. 4.108  
Anim. cerv. oscord. 5.282  
Aq. contr. Terr. 2.149  
Vin. muret. 2.229  
Bals. embr.

**Abstergent. Fol. aur. mur.** 4.24  
betul. 4.28  
chelidon. 4.43  
cuscut. 4.58  
dictamn. 4.62  
endiv. 4.64  
Filipend. 4.69  
hormin. 4.82  
hysop. 4.84  
Jacc. 4.85  
loti. 4.96  
marrub. 4.99  
menth. farac. 4.102  
mercurial. 4.103  
nasturt. hort. 4.110  
Origan. 4.116  
pimpinell. 4.124

prunell. 4. 4.131  
salv. 4.145  
scab. 4.151  
scord. 4.153  
siderit. 4.158  
Tarax. 4.165  
Thlasp. 4.166  
Urtic. 4.178  
Flor. Genist. 4.75  
hormin. 4.82  
loti. 4.96  
prunell. 4.131  
salv. 4.145  
scab. 4.151  
stach. 4.162  
Rad. Anthos. 4.18  
Cepa. 4.40  
chelid. maj. 4.43  
cyclam. 4.59  
dipsac. 4.63  
filip. 4.69  
fum. bulb. 4.73  
helen. 4.80  
onon. 4.116  
pimpin. 4.124  
a raphan.

# INDEX MORBORUM

|                            |       |             |       |
|----------------------------|-------|-------------|-------|
| raphan.                    | 4.136 | alchimill.  | 4.11  |
| scyll.                     | 4.154 | anagall.    | 4.11  |
| Tarax.                     | 4.165 | anferin.    | 4.17  |
| urtic.                     | 4.178 | aur.mur.    | 4.24  |
| Cort.mor.                  | 4.105 | burf.past.  | 4.31  |
| popul.alb.                 | 4.129 | calcatrip.  | 4.33  |
| Sem.Endiv.                 | 4.64  | calthæ.     | 4.34  |
| genist.                    | 4.75  | cuscut.     | 4.58  |
| hord.                      | 4.82  | equiser.    | 4.66  |
| melon.                     | 4.101 | euphrag.    | 4.67  |
| nap.                       | 4.109 | lagop.      | 4.90  |
| petros.mac.                | 4.123 | lignstr.    | 4.93  |
| raphan.                    | 4.136 | millefol.   | 4.105 |
| thlasp.                    | 4.166 | mynt.       | 4.109 |
| urtic.                     | 4.178 | Oleæ.       | 4.115 |
| Musc.lichen.               | 4.92  | origan.     | 4.116 |
| Fruct.Cicer.               | 4.46  | polig.      | 4.128 |
| nucl.persic.               | 4.121 | pyrol.      | 4.134 |
| Lign.Colubr.               | 4.50  | querc.      | 4.135 |
| Resin.Lar.                 | 4.210 | quinquefol. | 4.135 |
| Anim.Can.ster.             | 5.274 | silic.      | 4.145 |
| Capr.fer.                  | 5.275 | sanic.      | 4.148 |
| sterc.                     | 5.276 | scolopendr. | 4.152 |
| Hom.urin.                  | 5.288 | fedi.       | 4.156 |
| Viper.spir.                | 5.310 | fiderit.    | 4.158 |
| Vulp.pulm.                 | 5.313 | verben.     | 4.171 |
| Gall.ver.                  | 5.318 | virg.aur.   | 4.176 |
| Cancr.ocul.                | 5.326 | ulmar.      | 4.177 |
| Conch.Test.                | 5.328 | Flor.acac.  | 4.6   |
| Lucij.mand.                | 5.330 | amaranth.   | 4.13  |
| sepiæ os.                  | 5.333 | calcatrip.  | 4.33  |
| Thymall.az.                | 5.334 | calthæ.     | 4.34  |
| Apum mel.                  | 5.334 | Cynosbat.   | 4.60  |
| Cer.                       | 5.337 | levist.     | 4.92  |
| Asell.                     | 5.338 | rof.        | 4.139 |
| Adstringent. Fol. Absynth. | 4.4   | schænanth.  | 4.152 |
| acac.                      | 4.6   | virg.aur.   | 4.176 |
| agrimon.                   | 4.11  | Rad.acor.   | 4.8   |
|                            |       | bardan.     |       |



# ET REMEDIORUM.

|       |                         |       |                      |         |
|-------|-------------------------|-------|----------------------|---------|
| 4.11  | bardan.                 | 4.25  | verben.              | 4.171   |
| 4.11  | bistort.                | 4.29  | Rad. peucedan.       | 4.124   |
| 4.17  | Caryophill.             | 4.39  | Resin. Ladan.        | 4.197   |
| 4.24  | fum.bulb.               | 4.73  | Anim. Cat. sterc.    | 5.280   |
| 4.31  | rhapont.                | 4.38  | Capr. sterc.         | 5.284   |
| 4.33  | rhuis.                  | 4.138 | Echin.               | 5.286   |
| 4.34  | sifar.                  | 4.158 | Hom. cap.            | 5.287   |
| 4.38  | spic. ind.              | 4.161 | hom. sterc. dist.    | 5.291   |
| 4.46  | Tamar.                  | 4.164 | Lep. cin.            | 5.300   |
| 4.61  | Torment.                | 4.167 | caput.               | 5.300   |
| 4.90  | Cortic. abiet.          | 4.3   | Mulx. ung.           | 5.303   |
| 4.93  | acac.                   | 4.6   | mul.                 | 5.303   |
| 4.101 | sicc.                   | 4.145 | Mur. sterc.          | 5.303   |
| 4.103 | Tamar.                  | 164   | serpent. exuv.       | 5.306   |
| 4.111 | Sem. coriandr.          | 4.52  | Talp. sang.          | 5.308   |
| 4.116 | Musc. corall.           | 4.51  | Urs. ping.           | 5.312   |
| 4.118 | musc.                   | 4.106 | Vulp. ping.          | 5.313   |
| 4.133 | Lign. cupress.          | 4.56  | anser. ping.         | 5.314   |
| 4.133 | Lachr. sang. drac.      | 4.214 | Columb. sim.         | 5.316   |
| 4.133 | sarcocoll.              | 4.215 | anguill. ping.       | 5.325   |
| 4.133 | Bals. Indic.            | 4.186 | ranar. cin.          | 5.333   |
| 4.145 | Resin. myrrh.           | 4.200 | Apes.                | 5.334   |
| 4.148 | Thur.                   | 4.223 | Lacert.              | 5.343   |
| 4.151 | Gumm. anim.             | 4.184 | Muscx.               | 5.344   |
| 4.156 | Succ. hypocist.         | 4.196 | Ambusta, Fol. Fabar. | 4.69    |
| 4.158 | aloes.                  | 4.252 | nicot.               | 4.112   |
| 4.171 | Acet.                   | 4.180 | Thil.                | 4.167   |
| 4.176 | Anim. Cerv. lachr.      | 5.283 | Rad. Cep.            | 4.40    |
| 4.177 | Ebur.                   | 5.285 | fili                 | 4.70    |
| 4.177 | Hom. off.               | 5.197 | lil. alb.            | 4.94    |
| 4.177 | usnea.                  | 5.298 | porr.                | 4.130   |
| 4.177 | Anser. ped. cut.        | 5.315 | Cort. popul. alb.    | 4.129   |
| 4.177 | Galli.                  | 5.318 | Sem. Cydon.          | 4.61    |
| 4.177 | gallin. alb. ov.        | 5.319 | Fruct. pom. momord.  | 4.105   |
| 4.177 | Alopecia, Fol. abrotan. | 4.3   | Anim. Vaccin. sterc. | 5.270   |
| 4.177 | adianth.                | 4.9   | hom. sang.           | 5.292   |
| 4.177 | petrosel.               | 4.122 | lepor. sterc.        | 5.301   |
| 4.177 | rut. mar.               | 4.144 | ovis lana.           | 5.304   |
| 4.177 |                         |       | a 2                  | ster. c |

# INDEX MORBORUM

|                         |       |                |       |
|-------------------------|-------|----------------|-------|
| sterc.                  | 5.305 | calamenth.     | 4.33  |
| Ranar sperm.            | 5.332 | calthæ.        | 4.34  |
| iniment.de B.           | 2.306 | card.ben.      | 4.36  |
| Angina. Fol. scab.      | 4.151 | cichor.        | 4.46  |
| sedi.                   | 4.156 | cochlear.      | 4.49  |
| verben.                 | 4.171 | dictam.        | 4.62  |
| Fl. scab.               | 4.151 | endiv.         | 4.64  |
| succif.                 | 4.163 | eryng.         | 4.66  |
| Rad. succif.            | 4.163 | erysim.        | 4.66  |
| Resin. myrrh.           | 4.200 | eupator.       | 4.67  |
| Anim. Agni lana.        | 5.267 | euphrag.       | 4.67  |
| Canin. sterc.           | 5.274 | fenic.         | 4.70  |
| Cunicul.                | 5.284 | hyfop.         | 4.84  |
| Equi saliv.             | 5.286 | levist.        | 4.92  |
| Hom. sterc.             | 5.291 | marrub.        | 4.99  |
| Viper. cap.             | 5.309 | menth. sarac.  | 4.102 |
| hirund.                 | 5.320 | nasturt. ∇.    | 4.110 |
| nidus.                  | 5.320 | nasturt. hort. | 4.110 |
| Noctuaæ caro.           | 5.321 | nepetæ.        | 4.111 |
| Cancr.                  | 5.329 | origan.        | 4.116 |
| halec. muria.           | 5.329 | petrosel.      | 4.122 |
| afelli                  | 5.338 | pimpinell.     | 4.124 |
| Ani procidentia.        |       | porr.          | 4.130 |
| Fol. Chelid.            | 4.44  | puleg.         | 4.133 |
| Fl. verben.             | 4.171 | sapon.         | 4.149 |
| Fruct. bacc. myrr.      | 4.109 | atureia.       | 4.150 |
| Anim. trut. ping.       | 5.334 | serpill.       | 4.156 |
| Spir. sulph.            | 3.506 | Tarax.         | 4.165 |
| Aperient. Fol. abrotan. | 4.4   | Veron.         | 4.172 |
| absynth.                | 4.4   | urtic.         | 4.178 |
| acetos.                 | 4.7   | Flor. beton.   | 4.28  |
| adanth.                 | 4.8   | calth.         | 4.34  |
| agrimon.                | 4.11  | cent. min.     | 4.40  |
| aquileg.                | 4.12  | cichor.        | 4.46  |
| aristol.                | 4.19  | croc.          | 4.54  |
| beton.                  | 4.28  | genist.        | 4.75  |
| betul.                  | 4.28  | stach.         | 4.162 |
| branc. ursin.           | 4.30  | citr.          | 4.163 |
|                         |       | Radic.         |       |



# ET REMEDIORUM.

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Radic. acori.   | 4.8   |
| allij.          | 4.12  |
| angel.          | 4.16  |
| anthos.         | 4.18  |
| apii.           | 4.18  |
| aristol.        | 4.19  |
| armorac.        | 4.20  |
| Cepæ.           | 4.40  |
| Cichor.         | 4.46  |
| Cost.           | 4.54  |
| curcum.         | 4.58  |
| cyclam.         | 4.59  |
| cyper.          | 4.61  |
| filic.          | 4.70  |
| fraxinell.      | 4.72  |
| galang.         | 4.73  |
| gentian.        | 4.75  |
| gramin.         | 4.77  |
| helen.          | 4.80  |
| imperat.        | 4.85  |
| levist.         | 4.92  |
| lil.alb.        | 4.93  |
| mei.            | 4.104 |
| petafit.        | 4.122 |
| petrosel.       | 4.122 |
| pencedan.       | 4.123 |
| pimpinell.      | 4.124 |
| porri.          | 4.130 |
| raphan.         | 4.136 |
| rub.            | 4.142 |
| rusc.           | 4.143 |
| sefel.          | 4.158 |
| Tamar.          | 4.164 |
| Tarax.          | 4.165 |
| valer.          | 4.170 |
| urtic.          | 4.178 |
| Zinzib.         | 4.180 |
| Cortic. Cappar. | 4.34  |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Cinnam.             | 4.48  |
| Tamar.              | 4.164 |
| Sem.ammi ver.       | 4.13  |
| apii.               | 4.18  |
| card. ben.          | 4.36  |
| mar.                | 4.37  |
| dauc.               | 4.63  |
| endiv.              | 4.64  |
| erysim.             | 4.66  |
| genist.             | 4.75  |
| hord.               | 4.82  |
| levist.             | 4.92  |
| melon.              | 4.101 |
| napi.               | 4.110 |
| nasturt.            | 4.110 |
| nigell.             | 4.113 |
| petrosel.           | 4.122 |
| maced.              | 4.123 |
| pimpinell.          | 4.124 |
| porr.               | 4.130 |
| raphan.             | 4.136 |
| sefel.              | 4.158 |
| urtic.              | 4.178 |
| Fruct. Amygd. amar. | 4.14  |
| piper.              | 4.126 |
| pistac.             | 4.126 |
| Lign. fantal.       | 4.148 |
| sassafras.          | 4.160 |
| Tamar.              | 4.164 |
| Resin. Ladan.       | 4.197 |
| myrrh.              | 4.200 |
| Gumm. Animæ.        | 4.184 |
| Laccæ.              | 4.196 |
| mastich.            | 4.199 |
| sagapen.            | 4.114 |
| Anim. Canis. sterc. | 5.274 |
| Capr. ser.          | 5.275 |
| sterc.              | 5.276 |
| Castor              |       |

# INDEX MORBORUM

|                         |       |                               |       |
|-------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Castor. test.           | 5.279 | Epilept.                      | 2.138 |
| Ovi sterc.              | 5.304 | lavend.comp.                  | 2.145 |
| Anser. sterc.           | 5.315 | Bals.apoplect.                | 2.156 |
| Apum mel.               | 5.334 | vit.                          | 2.157 |
| Aselli.                 | 5.338 | Elix. syncopt.                | 2.190 |
| Spir. Terebinth.        | 4.211 | vit. querc.                   | 2.191 |
| Apoplexia. Fol. Meliss. | 4.100 | Empl. Cephal.                 | 2.195 |
| prim. ver.              | 4.131 | Odorif. Croll.                | 2.263 |
| rorismar.               | 4.414 | Pulv. dent. Cyper.            | 2.269 |
| Fl. Caryophill.         | 4.38  | sternut.                      | 2.275 |
| Croci                   | 4.55  | Spir. antapopl.               | 2.283 |
| lil. convall.           | 4.94  | aurum potab.                  | 3.368 |
| prim. ver.              | 4.131 | ꝑ. Croci.                     | 3.412 |
| stæch.                  | 4.162 | Ol. ꝑ. ij.                    | 3.417 |
| Thil.                   | 4.167 | Ol. Antimon.                  | 3.436 |
| Rad. acor.              | 4.8   | Antid. querc.                 | 3.449 |
| alli.                   | 4.12  | Spir. fug. *ci                | 3.482 |
| imperat.                | 4.85  | mogist. Vitriol.              | 3.496 |
| helleb.                 | 4.236 | Spir. antepilept.             | 5.293 |
| Sem. Cubeb.             | 4.56  | Vini.                         | 4.226 |
| eruc.                   | 4.66  | Appetit. Imminut. Fol. Satur. | 4.150 |
| Fruct. Cardam.          | 4.36  | Thymi.                        | 4.166 |
| Ceras. dulc.            | 4.41  | Fl. rosat.                    | 4.139 |
| Colocynth.              | 4.234 | Rad. Sifar.                   | 4.159 |
| Lign. aloes.            | 4.9   | Zinzib.                       | 4.180 |
| Gumm. succin.           | 3.511 | Sem. sinapi.                  | 4.153 |
| Anim. Castor. ax.       | 5.279 | Fruct. berber.                | 4.27  |
| testic.                 | 5.279 | Oliv.                         | 4.115 |
| Hom sang. ☉             | 5.292 | Uvæ immat.                    | 4.175 |
| Columb. sterc.          | 5.316 | Bals. ver.                    | 4.185 |
| lumbr. terr.            | 5.344 | Gumm. Mastich.                | 4.199 |
| Miner. Corall.          | 3.341 | Anim. aselli                  | 5.338 |
| & Marin. Lap. lazul.    | 3.352 | Miner. Sal. Comm.             | 3.464 |
| argent.                 | 3.373 | Elix. propr.                  | 2.190 |
| ambra.                  | 3.511 | Tinct. ex reg. ☿.             | 3.447 |
| Aq. anhaltin.           | 2.134 | Arcan. ꝑ. ij. Basil.          | 3.449 |
| Apopl. Croll.           | 2.135 | ☉. Cach. chalyb.              | 3.475 |
| sennert.                | 2.135 | ☿. li.                        | 3.488 |
|                         |       | Infus.                        |       |



# ET REMEDIORUM.

|                                                            |       |                       |       |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Infus. Vitr. ꝯ ij.                                         | 3.452 | bryon.                | 4.231 |
| Apostemata. Fol. Scab.                                     | 4.151 | hermodat.             | 4.232 |
| Fl. Scab.                                                  | 4.151 | Mechoac.              | 4.242 |
| Rad. Cepæ.                                                 | 4.40  | Turpeth.              | 4.250 |
| Lachr. Bdell.                                              | 4.187 | Cortic. cappar.       | 4.34  |
| Anim. Asin. ungul.                                         | 5.269 | ebul.                 | 4.235 |
| Canis sterc.                                               | 5.274 | Fruct. fecal.         | 4.155 |
| sang. menstr.                                              | 5.288 | Tritic.               | 4.168 |
| Noct. Caro.                                                | 5.321 | Spin. infect.         | 4.249 |
| Antim. diaph.                                              | 3.427 | Lign. Guajac.         | 4.78  |
| Flor. antim.                                               | 3.428 | Bals. Tolut.          | 4.185 |
| Tinctur. ex ꝯ io. rub. f.                                  | 3.448 | indic.                | 4.186 |
| Antid. $\pi\alpha\rho\chi\epsilon\gamma\varsigma$ ④.       | 3.450 | Resin. Tereb.         | 4.210 |
| Antid. $\iota\sigma\epsilon\chi\epsilon\gamma\varsigma$ ④. | 3.450 | Tacamah.              | 4.217 |
| Sal. ꝯ ij.                                                 | 3.454 | Gumm. ammon           | 4.182 |
| Arthritis. Fol. Atripi.                                    | 4.22  | Anim. asin. lac.      | 5.269 |
| Chamædr.                                                   | 4.42  | urin.                 | 5.269 |
| Chamæpyth.                                                 | 4.42  | Bovis adeps.          | 5.270 |
| Ebuli.                                                     | 4.64  | Vacc. sterc.          | 5.270 |
| Filipend.                                                  | 4.69  | Bov. $\nabla$ . sang. | 5.271 |
| gramin.                                                    | 4.77  | Canis axung.          | 5.274 |
| hyosciam.                                                  | 4.82  | hirc. sebum.          | 5.275 |
| prim. ver.                                                 | 4.131 | Castor. pell.         | 5.279 |
| puleg.                                                     | 4.133 | Cati axung.           | 5.280 |
| quinque fol.                                               | 4.135 | sterc.                | 5.280 |
| scord.                                                     | 4.153 | Cervi sang.           | 5.282 |
| Thymi.                                                     | 4.166 | ol.                   | 5.283 |
| Verben.                                                    | 4.171 | Cochleæ.              | 5.284 |
| Fl. Cent.                                                  | 4.40  | Limac.                | 5.284 |
| matric.                                                    | 4.99  | hom. sang. m.         | 5.288 |
| prim. ver.                                                 | 4.131 | urin. præp.           | 5.289 |
| Rad. bardan.                                               | 4.25  | stercus præp.         | 5.291 |
| Chin.                                                      | 4.45  | ossa.                 | 5.297 |
| fumar. bulb.                                               | 4.73  | ⑧.                    | 5.297 |
| imperat.                                                   | 4.85  | Lupi axung.           | 5.301 |
| rhapont.                                                   | 4.138 | ol.                   | 5.301 |
| sarsaparill.                                               | 4.149 | Mur. alp. adeps.      | 5.303 |
| asar.                                                      | 4.231 | Ovis. Caput           | 5.305 |
|                                                            |       | pedes.                |       |

# INDEX MORBORUM

|                 |       |                           |       |
|-----------------|-------|---------------------------|-------|
| pedes.          | 5.305 | Bals.antiarthr.           | 2.159 |
| Serpent.ping.   | 5.306 | sapon.                    | 2.159 |
| Talp.cinis.     | 5.308 | El.podagr. S. Cloff.      |       |
| Viper.spir.     | 5.310 | Empl. arthr.              | 2.194 |
| Urs.pingued.    | 5.312 | Vin. arthr.               | 2.227 |
| Vulp.coct.      | 5.313 | Pil.arthr.D.Sch.          | 2.253 |
| Anat. adeps.    | 5.314 | antipod.Doring.           | 2.258 |
| ardez ping.     | 5.315 | Potio sudor.              | 2.262 |
| Cicon.          | 5.315 | Pulv.spern.comp.          | 2.272 |
| axung.          | 5.316 | Arther.Parac.             | 2.274 |
| Columba.        | 5.316 | Ung.anod.C.C.             | 2.306 |
| sang.           | 5.316 | anod.inpodagr.            | 2.307 |
| simus.          | 5.316 | ℞.præcip.                 | 3.400 |
| Corvi cin.      | 5.317 | ℞.rub.                    | 3.408 |
| Milvus.         | 5.321 | ℞.vit.                    | 3.410 |
| sang.           | 5.321 | Tinctur.croc.             | 3.412 |
| sterc.          | 5.321 | Bezoar.Sol. Crollii       | 3.413 |
| ping.           | 5.321 | Tinctur.℞.                | 3.416 |
| Cygnus.         | 5.322 | Liq.℞.præcip.             | 3.417 |
| Pavon.ov.       | 5.323 | Croc.met.                 | 3.426 |
| Turtur.ping.    | 5.324 | ℞.ex reg. ℞ ij.           | 3.439 |
| Sturion.off.    | 5.333 | Tinct. Vitr. ℞ ij.        | 3.446 |
| Testud.cruv.    | 5.333 | Elix.Solar ℞ ij.          | 3.449 |
| Apuminel.       | 5.336 | Tinct.ex Spir.sulph ℞ ij. | 3.450 |
| Formic. acerv.  | 5.342 | ▽.ben.                    | 3.453 |
| lumbric.terr.   | 5.344 | Sal. ℞ ij.                | 3.454 |
| scarrab.        | 5.346 | Balsam.                   | 3.460 |
| Min. Lap. calc. | 3.348 | ℞. ☉.                     | 3.466 |
| Chrystall.      | 3.349 | Extr. Sal.                | 3.470 |
| Ophites.        | 3.355 | ℞. Vitr. mell.            | 3.460 |
| Sal. Comm.      | 3.454 | ☉ Gagat.                  | 3.516 |
| Spir.terr.alc.  | 3.318 | ol.avell.expr.            | 4.53  |
| Salperlar.      | 3.343 | ol.eben.                  | 4.63  |
| Spir.perlar.    | 3.345 | Extr.opii                 | 4.202 |
| ol.Terr.        | 3.515 | Laudan.opii.              | 2.204 |
| Extr.Euphorb.   | 4.255 | Pil. de Tereb.            | 4.211 |
| Aq.anhalt.      | 2.13  | Bals.antipod.             | 5.293 |
| antipodagr.     | 2.154 | Spir.Tart.                | 4.220 |
|                 |       | phil.                     |       |



# ET REMEDIORUM.

|                    |        |                              |           |
|--------------------|--------|------------------------------|-----------|
| phil.              | 4. 221 | Laccæ.                       | 4. 196    |
| Asth- Fol. hyssop. | 4. 84  | sagapen.                     | 4. 214    |
| ma. levistic.      | 4. 92  | Anim. Eq. lac.               | 5. 285    |
| origan.            | 4. 116 | hom. urin. præp.             | 5. 289    |
| petrosel.          | 4. 112 | mum. Tinct.                  | 5. 295    |
| pimpinell.         | 4. 124 | ursi fel.                    | 5. 312    |
| rut. mur.          | 4. 414 | vulp. pulm.                  | 5. 313    |
| sabin.             | 4. 144 | cancr. ocul.                 | 5. 326    |
| sapon.             | 4. 149 | sepiæ os.                    | 5. 333    |
| satureiæ.          | 4. 150 | Min. Sulphur.                | 5. 501    |
| scab.              | 4. 151 | Aq. asthmat.                 | 2. 135    |
| Thym.              | 4. 166 | Elix. vit. querc.            | 2. 191    |
| tussilag.          | 4. 169 | Spir. antapopl.              | 2. 283    |
| Flor. Caprif.      | 4. 135 | Syr. nicot.                  | 2. 293    |
| Croci.             | 4. 55  | Sal Bi.                      | 3. 390    |
| Scab.              | 4. 151 | Tinctur. ex vitr. & ij.      | 3. 445    |
| Rad. Ari.          | 4. 21  | Bals. reg.                   | 3. 448    |
| Bardan.            | 4. 25  | Tinct. ex Sp. sulph. reg. ꝑ. | 3. 451    |
| helen.             | 4. 81  | ℞. B. satum.                 | 3. 474    |
| ireos. fl.         | 4. 86  | Fl. Sp. sulph. Sach.         | 3. 503    |
| levist.            | 4. 92  | Lac. Sulph.                  | 3. 405    |
| petasit.           | 4. 112 | Spir. sulph.                 | 3. 406    |
| petrosel.          | 4. 122 | Ol. Sulph. ver. S. CC.       | 3. 507    |
| pimpinell.         | 4. 124 | ▽. fl. lil. alb.             | 4. 94     |
| Tussil.            | 4. 169 | Syr. de nicot.               | 4. 113    |
| Valer.             | 4. 170 | Lach. de scyll.              | 4. 154    |
| bryon.             | 4. 231 | Spir. antepil.               | 5. 293    |
| Turpeth.           | 4. 250 | Atte- Fol. adianth.          | 4. 8      |
| Sem. bombac.       | 4. 29  | nuant. aristol.              | 4. 19     |
| levist.            | 4. 92  | beton.                       | 4. 28     |
| petros.            | 4. 122 | betul.                       | 4. 28     |
| urtic.             | 4. 178 | calamenth.                   | 4. 33     |
| Musc. pulm. arb.   | 4. 133 | cardiac.                     | 4. 36     |
| Bals. ver.         | 4. 185 | card. ben.                   | 4. 37     |
| Tolut.             | 4. 185 | chelid. maj.                 | 4. 43     |
| indic.             | 4. 186 | dictamn.                     | 4. 62     |
| Resin. Benzoin.    | 4. 188 | erysim.                      | 4. 66     |
| Gum. Galban.       | 4. 195 | cupar.                       | 4. 67     |
|                    |        | b                            | filipend. |

# INDEX MORBORUM

|                   |       |                     |       |
|-------------------|-------|---------------------|-------|
| filipend.         | 4.69  | gentian.            | 4.75  |
| fumar.            | 4.72  | imperat.            | 4.85  |
| hormin.           | 4.82  | mei.                | 4.104 |
| hyfop.            | 4.84  | onon.               | 4.115 |
| mafor.            | 4.96  | petasit.            | 4.122 |
| marrub.           | 4.99  | petrosel.           | 4.122 |
| matric.           | 4.99  | peucedan.           | 4.123 |
| menth. farac.     | 4.102 | pimpinell.          | 4.124 |
| nast. ▽.          | 4.110 | porri.              | 4.130 |
| hort.             | 4.110 | pyrethri.           | 4.134 |
| nepet.            | 4.111 | raphan.             | 4.136 |
| pimpin.           | 4.124 | marin.              | 4.136 |
| porri.            | 4.130 | rusc.               | 4.143 |
| puleg.            | 4.133 | scyll.              | 4.154 |
| rut.              | 4.143 | spic. ind.          | 4.161 |
| sabin.            | 4.144 | valer.              | 4.170 |
| sapon.            | 4.149 | vincetox.           | 4.134 |
| satireja.         | 4.150 | Zinzib.             | 4.180 |
| scabios.          | 4.151 | Sem. anisi.         | 4.17  |
| scolopendr.       | 4.152 | card. ben.          | 4.36  |
| scordii.          | 4.153 | cari.               | 4.37  |
| serpill.          | 4.156 | cumin.              | 4.57  |
| Thymi.            | 4.166 | erysim.             | 4.66  |
| Flor. beton.      | 4.28  | major.              | 4.96  |
| cheyri.           | 4.45  | napi.               | 4.109 |
| eupat.            | 4.67  | nasturt. hort.      | 4.110 |
| fumar.            | 4.72  | nigell.             | 4.113 |
| hormin.           | 4.82  | petrosel mac.       | 4.123 |
| scab.             | 4.151 | pimpinell.          | 4.124 |
| stech.            | 4.162 | porri.              | 4.130 |
| Rad. acor. adult. | 4.8   | raphan.             | 4.136 |
| angel.            | 4.16  | sem. sinop.         | 4.159 |
| anthos.           | 4.18  | Cort. Tamarisc.     | 4.164 |
| aristol.          | 4.19  | Fruet. amygd. amar. | 4.14  |
| armorac.          | 4.20  | cardam.             | 4.36  |
| cost.             | 4.54  | cubeb.              | 4.56  |
| curcum.           | 4.58  | piper.              | 4.126 |
| filipend.         | 4.69  | pistac.             | 4.126 |
|                   |       | Lign.               |       |



# ET REMEDIORUM.

|                           |       |                                  |       |
|---------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Lign. assafras.           | 4.160 | Fl. ros.                         | 4.139 |
| tamar.                    | 4.164 | Rad. porr.                       | 4.130 |
| Bals. Tolut.              | 4.185 | Sem. porr.                       | 4.130 |
| Tereb.                    | 4.211 | Anim. bovis fel.                 | 5.270 |
| Resin. benzoin.           | 4.188 | urin.                            | 5.270 |
| ladan.                    | 4.197 | Canis axung.                     | 5.274 |
| myrrh.                    | 4.200 | Capræ fel.                       | 5.279 |
| Gumm. ammon.              | 4.182 | Cast. test.                      | 5.279 |
| animæ.                    | 4.184 | hom. urin.                       | 5.288 |
| sagapen.                  | 4.114 | Ariet. fel.                      | 5.304 |
| Anim. Castor. test.       | 5.279 | vulp. ping.                      | 5.313 |
| mosch.                    | 5.302 | suis fel.                        | 5.307 |
| Cygni adeps.              | 5.322 | anser. ping.                     | 5.314 |
| Spir. Tereb.              | 4.211 | gall. ping.                      | 5.319 |
| Acer.                     | 4.180 | ranar. ping.                     | 5.332 |
| Atrophia. Fol. alaines.   | 4.12  | tineæ fel.                       | 5.334 |
| portulac.                 | 4.130 | aselli.                          | 5.338 |
| Rad. levist.              | 4.92  |                                  |       |
| Sem. anisi.               | 4.17  | <b>B</b> ubones. vid. Pestis.    |       |
| Fruct. amygd. dulc.       | 4.14  |                                  |       |
| pin.                      | 4.126 | <b>C</b> achexia. Fol. petrosel. | 4.122 |
| pistac.                   | 4.126 | Rad. ari.                        | 4.21  |
| Musc. Lichen.             | 4.92  | chinæ.                           | 4.45  |
| Anim. Coch. Aq. still.    | 5.284 | curcum.                          | 4.58  |
| hom. urin.                | 5.290 | petrosel.                        | 4.122 |
| lup. Epar.                | 5.301 | Sem. petrosel.                   | 4.122 |
| Ovis. cap.                | 5.395 | Fruct. spin. infect.             | 4.249 |
| ped.                      | 5.305 | Anim. echin. jecur.              | 5.286 |
| suis sang.                | 5.308 | hom. urin.                       | 5.290 |
| cancr.                    | 5.325 | acerv. form.                     | 5.342 |
| Aq. antihæct.             | 2.143 | Min. Chalybs.                    | 3.379 |
| magnanim.                 | 2.143 | Elix. vit. querc.                | 2.191 |
| Morsul pect.              | 2.236 | Pisul. de Ammoniac.              | 2.253 |
| Syr. antihæct.            | 2.292 | Cent. quer.                      | 2.253 |
| de ped. cat.              | 2.294 | Euphorb. querc.                  | 2.255 |
| testud.                   | 2.294 | Gummof. S. Cl.                   | 2.255 |
| Aurium. aff. Fol. hyssop. | 4.84  | Pulv. cach. querc.               | 2.268 |
| porr.                     | 4.130 | Trajea. hep. querc.              | 2.271 |
|                           |       | b 2                              | Pulv  |

# INDEX MORBORUM

|                              |       |                  |       |
|------------------------------|-------|------------------|-------|
| Pulv. stom. querc.           | 2.272 | sesel. mass.     | 4.158 |
| Antim. diaphor.              | 3.427 | sifar.           | 4.159 |
| Tinct. ex vitr. & ij.        | 3.445 | Cort. fraxin.    | 4.71  |
| ex reg. &.                   | 3.447 | Sem. bardan.     | 4.25  |
| Sal cach. chalyb.            | 3.475 | cerefol.         | 4.42  |
| Magist. Oli                  | 3.496 | fraxin.          | 4.72  |
| & Spir. sulph. aur.          | 3.507 | milii. sol.      | 4.104 |
| Tinct. ebul.                 | 4.64  | nast. Aq.        | 4.110 |
| Crist. Spir. Tart.           | 4.220 | pastin.          | 4.120 |
| Calcul. ren. vid. Nephritis. |       | petros.          | 4.122 |
| Calcul. Fol. alth.           | 4.12  | mont.            | 4.123 |
| resic. anagall. Aq.          | 4.15  | raphan.          | 4.136 |
| cerefol.                     | 4.42  | sinap.           | 4.159 |
| herniar.                     | 4.81  | vincetox.        | 4.174 |
| malv.                        | 4.98  | Musc. terr.      | 4.108 |
| pariet.                      | 4.119 | Spong. Cynosb.   | 4.60  |
| petrosel.                    | 4.122 | Fruct. alkekeng. | 4.11  |
| puleg.                       | 4.133 | Ceras.           | 4.41  |
| quinquefol.                  | 4.135 | limon.           | 4.94  |
| rut. mur.                    | 4.144 | mespil. off.     | 4.103 |
| saxifrag.                    | 4.151 | nucl. persic.    | 4.121 |
| scolopendr.                  | 4.152 | Lachr. bdell.    | 4.187 |
| tanacet.                     | 4.165 | Resin. tereb.    | 4.210 |
| verben.                      | 4.171 | Gumm. ammon.     | 4.182 |
| virg. aur.                   | 4.176 | Anim. apr. urin. | 5.268 |
| urtic.                       | 4.178 | asin. lac.       | 5.269 |
| Flor. cynosbat.              | 4.60  | bovis lap.       | 5.270 |
| Tanaceat.                    | 4.165 | hircin sang.     | 5.275 |
| virg. aur.                   | 4.176 | capr. sterc.     | 5.276 |
| Rad. allii                   | 4.12  | bezoar. lap.     | 5.278 |
| armor.                       | 4.20  | Cochl. test.     | 5.284 |
| bardan.                      | 4.25  | eq. lichen.      | 5.285 |
| syclam.                      | 4.59  | sang. menst.     | 5.288 |
| onon.                        | 4.116 | hom. urin.       | 5.289 |
| petros.                      | 4.122 | lep. cinis.      | 5.299 |
| mont.                        | 4.123 | lep. sang.       | 5.300 |
| peucedan.                    | 4.124 | lep. sterc.      | 5.300 |
| raphan. mar.                 | 4.136 | muris sterc.     | 5.303 |
|                              |       | taxi             |       |



# ET REMEDIORUM.

|                    |       |                      |       |
|--------------------|-------|----------------------|-------|
| taxi adeps.        | 5.309 | hyperic. Rab.        | 2.245 |
| vulp. sang.        | 5.313 | pil. diuret.         | 2.251 |
| alaud. sang.       | 5.314 | Tragea. anteneph.    | 2.272 |
| columb. fumus.     | 5.317 | pulv. stom. querc.   | 2.272 |
| cuculus            | 5.317 | liquor. ꝑ ij præcip. | 3.417 |
| gall. tunic.       | 5.318 | ☞ ex reg. ꝑ ij.      | 3.439 |
| gall. sterc.       | 5.319 | Spir. Sal.           | 3.464 |
| gall. test.        | 5.319 | ☉. ☉-lat.            | 4.478 |
| pass.              | 5.321 | ☞. alum. dulc.       | 3.479 |
| palumb.            | 5.322 | ☞. ☉-li dulc.        | 3.488 |
| struthion. tunic.  | 5.324 | ☞ antepilept. Basil. | 3.491 |
| cancror. ocul.     | 5.326 | magister. ☉-li       | 3.496 |
| ol. p.             | 5.326 | succ. betul.         | 4.28  |
| carpion. lap.      | 5.327 | Sal. fabar.          | 4.58  |
| manat. lap.        | 5.327 | ▽. vitis.            | 4.175 |
| halec. cin.        | 5.329 | ☞ terebinth.         | 4.211 |
| lucii mand.        | 5.330 | Pil. tereb.          | 4.211 |
| perca. lap.        | 5.331 | Sal. Tart. volat.    | 4.223 |
| sepiæ os           | 5.333 | Cale- Fol. abrotan.  | 4.4   |
| apum mel.          | 5.335 | facient. absynth.    | 4.4   |
| afelli.            | 5.338 | pont.                | 4.5   |
| cicindel.          | 5.341 | agerati.             | 4.10  |
| scorpio.           | 5.347 | agrimon.             | 4.11  |
| Min. lap. calcar.  | 3.347 | alth.                | 4.12  |
| calcul. hom.       | 3.348 | anagall.             | 4.15  |
| crystallus.        | 3.349 | aquat.               | 4.15  |
| lap. judaic.       | 3.352 | anethi.              | 4.16  |
| lyncis.            | 3.354 | aquileg.             | 4.19  |
| ophites.           | 3.355 | aristol.             | 4.19  |
| silex.             | 3.356 | arnic.               | 4.20  |
| lap. spong.        | 357   | artemis.             | 4.20  |
| Nitrum.            |       | ari.                 | 4.21  |
| Aq. diur. enuch.   | 2.141 | auric. mur.          | 4.24  |
| S. Cloff.          | 2.142 | beton.               | 4.28  |
| nephrit.           | 2.146 | betul.               | 4.28  |
| Elix. nephrit.     | 2.189 | borrag.              | 4.29  |
| Liq. lithontripr.  | 2.233 | branc. urs.          | 4.30  |
| Ol. febris. strob. | 2.244 | brassic.             | 4.30  |
|                    |       | b 3                  | cala- |

# INDEX MORBORUM

|              |       |               |       |
|--------------|-------|---------------|-------|
| calamenth.   | 4.32  | perfic.       | 4.122 |
| cardiac.     | 4.36  | petrosel.     | 4.122 |
| cerefol.     | 4.42  | pimpinell.    | 4.124 |
| chamædr.     | 4.42  | porri.        | 4.130 |
| chamæpyth.   | 4.42  | portulac.     | 4.130 |
| chelidon.    | 4.43  | prim.ver.     | 4.131 |
| cochlear.    | 4.49  | prunell.      | 4.131 |
| cuscut.      | 4.58  | puleg.        | 4.133 |
| dictamn.     | 4.62  | ros solis.    | 4.140 |
| ebul.        | 4.64  | rorismar.     | 4.141 |
| epat. nob.   | 4.65  | rutæ.         | 4.143 |
| erysim.      | 4.66  | sabin.        | 4.144 |
| eupator.     | 4.67  | salv.         | 4.145 |
| euphrag.     | 4.67  | sanic.        | 4.148 |
| filipend.    | 4.69  | saponis.      | 4.149 |
| fœnic.       | 4.70  | satirejæ.     | 4.150 |
| gallij.      | 4.74  | saxifrag.     | 4.151 |
| heder.       | 4.79  | scabiol.      | 4.151 |
| arbor.       | 4.80  | scolopendr.   | 4.152 |
| hysop.       | 4.84  | scordii.      | 4.153 |
| Jaceæ.       | 4.84  | serpil.       | 4.156 |
| laur.        | 4.91  | tanacet.      | 4.165 |
| levist.      | 4.92  | thlasp.       | 4.166 |
| linar.       | 4.05  | Teucr.        | 4.166 |
| major.       | 4.69  | thymi.        | 4.166 |
| marrub.      | 4.99  | verbasc.      | 4.171 |
| matric.      | 4.99  | verben.       | 4.171 |
| meliss.      | 4.100 | vermic.       | 4.172 |
| menth.       | 4.102 | veron.        | 4.172 |
| faracen.     | 4.102 | virg.aur.     | 4.176 |
| mercurial.   | 4.103 | urtic.        | 4.177 |
| nasturt. aq. | 4.110 | mort.         | 4.179 |
| hort.        | 4.110 | epyth.        | 4.239 |
| nepet.       | 4.111 | foldanell.    | 4.249 |
| nicot.       | 4.111 | Flor. agerat. | 4.10  |
| origan.      | 4.116 | aquileg.      | 4.19  |
| pastin.      | 4.120 | bellid.       | 4.26  |
| perfol.      | 4.121 | beton.        | 4.28  |
|              |       | borrag.       |       |



# ET REMEDIORUM.

|              |       |             |       |
|--------------|-------|-------------|-------|
| bofrag.      | 4.29  | armorac.    | 4.20  |
| calthæ.      | 4.34  | asparag.    | 4.23  |
| caprifol.    | 4.35  | bardan.     | 4.25  |
| caryophill.  | 4.38  | betæ.       | 4.28  |
| cent.min.    | 4.40  | calam.arom. | 4.32  |
| chamom.      | 4.43  | carlin.     | 4.37  |
| cheyri.      | 4.45  | caryophill. | 4.39  |
| croci.       | 4.54  | cepx.       | 4.40  |
| ebul.        | 4.64  | chelidon.   | 4.43  |
| epat.nob.    | 4.65  | contragerr. | 4.50  |
| epat.        | 4.67  | costi.      | 4.54  |
| genist.      | 4.75  | curcum.     | 4.58  |
| hyperic.     | 4.83  | cyclam.     | 4.59  |
| lil.alb.     | 4.93  | cyper.      | 4.60  |
| lil.convall. | 4.94  | doron.      | 4.63  |
| lupul.       | 4.95  | filipend.   | 4.69  |
| malv.arb.    | 4.98  | fili.       | 4.70  |
| melilot.     | 4.109 | fraxinell.  | 4.72  |
| prim.ver.    | 4.131 | fum.bulb.   | 4.73  |
| prunell.     | 4.131 | galang.     | 4.73  |
| salv.        | 4.145 | gentian.    | 4.75  |
| scabios.     | 4.151 | helen.      | 4.80  |
| schænanth.   | 4.152 | imperat.    | 4.85  |
| spicæ.       | 4.160 | ireos.n.    | 4.86  |
| stæchad.     | 4.162 | levistic.   | 4.92  |
| citri.       | 4.163 | mei.        | 4.104 |
| succif.      | 4.163 | mori.       | 4.105 |
| Tanacet.     | 4.165 | ononid.     | 4.116 |
| thiliæ.      | 4.167 | petasit.    | 4.122 |
| verbasc.     | 4.171 | petrosel.   | 4.122 |
| veron.       | 4.172 | mont.       | 4.123 |
| virg.aur.    | 4.175 | peucedan.   | 4.123 |
| Rad. acori.  | 4.8   | pimpinell.  | 4.124 |
| allij.       | 4.12  | pæon.       | 4.127 |
| alth.        | 4.12  | porri.      | 4.130 |
| angel.       | 4.26  | ptarmic.    | 4.135 |
| anthos.      | 4.18  | pyrethri.   | 4.134 |
| aristol.     | 4.19  | raphan.     | 4.136 |
|              |       | marin.      |       |

# INDEX MORBORUM

|                  |       |               |       |
|------------------|-------|---------------|-------|
| marin.           | 4.136 | card. ben.    | 4.36  |
| rhapont. ver.    | 4.138 | card. mar.    | 4.27  |
| rub.             | 4.141 | cari.         | 4.38  |
| rusc.            | 4.143 | cerefol.      | 4.42  |
| sarsaparill.     | 4.149 | coriandr.     | 4.52  |
| satyrj.          | 4.150 | cumin.        | 4.56  |
| schænanth.       | 4.152 | dauc.         | 4.64  |
| scorzoner.       | 4.153 | eruc.         | 4.66  |
| scropul.         | 4.154 | erysim.       | 4.66  |
| succis.          | 4.163 | foenugræc.    | 4.70  |
| tamar.           | 4.164 | genist.       | 4.75  |
| valer.           | 4.170 | levist.       | 4.92  |
| verbasc.         | 4.171 | milii Sol.    | 4.105 |
| victor.          | 4.173 | napi.         | 4.109 |
| urtic.           | 4.178 | nast. hort.   | 4.110 |
| mechoac.         | 4.242 | nigell.       | 4.114 |
| turpeth.         | 4.250 | pastinac.     | 4.120 |
| scyll.           | 4.154 | pastin. sylv. | 4.120 |
| sesel.           | 4.158 | petros.       | 4.122 |
| sisar.           | 4.159 | mont.         | 4.123 |
| vincetox.        | 4.174 | maced.        | 4.123 |
| Zedoar.          | 4.179 | porri.        | 4.130 |
| asari.           | 4.230 | portulac.     | 4.130 |
| Cort. betulæ.    | 4.28  | raphan.       | 4.136 |
| cappar.          | 4.34  | rapi.         | 137   |
| cinnam.          | 4.48  | santonie.     | 4.148 |
| ebul.            | 4.64  | spic. celt.   | 4.161 |
| assaf.           | 4.150 | indic.        | 4.161 |
| tamar.           | 4.164 | sesam.        | 4.156 |
| staphisagr.      | 4.250 | sesel.        | 4.157 |
| Sem. agni casti. | 4.10  | mass.         | 158   |
| ammi ver.        | 4.13  | cret.         | 4.158 |
| anethi.          | 4.16  | sinapi.       | 4.159 |
| anisi.           | 4.17  | thlasp.       | 4.166 |
| apii.            | 4.18  | cataput.      | 4.233 |
| aquileg.         | 4.19  | ricin.        | 4.246 |
| asparag.         | 4.22  | Fung. agaric. | 4.230 |
| cannab.          | 4.34  | betul.        | 4.28  |
|                  |       | Lanugo.       |       |



# ET REMEDIORUM.

|                     |       |                     |         |
|---------------------|-------|---------------------|---------|
| Lanugo. bombac.     | 4.29  | laric.              | 4.210   |
| Fruct. amygd. amar. | 4.14  | styr. calam.        | 4.216   |
| anacard.            | 4.14  | tacamachac.         | 4.217   |
| cardam.             | 4.36  | thur.               | 4.223   |
| chermes.            | 4.44  | Gumm. ammoniac.     | 4.182   |
| cicer.              | 4.46  | animæ.              | 4.184   |
| cubeb.              | 4.56  | arabic.             | 4.184   |
| cupress.            | 4.57  | elemi.              | 4.194   |
| juglan.             | 4.87  | galban.             | 4.195   |
| jujub.              | 4.87  | Laccæ.              | 4.196   |
| bacc. Juniper.      | 4.88  | ladan.              | 4.197   |
| laur.               | 4.91  | mastich.            | 4.199   |
| moschat.            | 4.106 | opopan.             | 4.208   |
| dactyl.             | 4.117 | pissasphalt.        | 4.208   |
| nucl. persic.       | 4.121 | picis.              | 4.209   |
| pinear.             | 4.126 | sagapen.            | 4.214   |
| pistac.             | 4.126 | Juniper.            | 4.88    |
| pom. dulc.          | 4.129 | Succ. aloes.        | 4.252   |
| Lign. agalloch.     | 4.9   | Anim. Vaccæ caseus. | 5.271   |
| colubr.             | 4.50  | capr. sterc.        | 5.276   |
| cupress.            | 4.57  | castor.             | 5.279   |
| guajac.             | 4.78  | cati axung.         | 5.280   |
| Juniper.            | 4.88  | Zibeth.             | 5.281   |
| nephrit.            | 4.111 | hom. urin.          | 5.288   |
| rhod.               | 4.137 | lupi axung.         | 5.301   |
| tamar.              | 4.164 | mosch.              | 5.302   |
| Lachr. alâ fetida.  | 4.104 | ariet. œsyp.        | 5.304   |
| bdellii.            | 4.187 | ovis lana.          | 5.304   |
| ladan.              | 4.196 | ursi ping.          | 5.312   |
| opii.               | 4.202 | anat. ping.         | 5.314   |
| sarcocoll.          | 4.215 | anser. sterc.       | 5.315   |
| Bals. Tolut.        | 4.185 | columb. simus.      | 5.316   |
| indic.              | 4.186 | gall. ping.         | 5.319   |
| tereb.              | 4.211 | hirund. sterc.      | 5.321   |
| Resin. benzoin.     | 4.188 | apum mel.           | 5.334   |
| colophon.           | 4.193 | cera.               | 5.337   |
| liquid. ambr.       | 4.178 | cantharid.          | 5.340   |
| myrrh.              | 4.200 | formic.             | 5.342   |
|                     |       |                     | accerv. |

# INDEX MORBORUM

|                             |       |                           |       |
|-----------------------------|-------|---------------------------|-------|
| acerv.                      | 5.342 | Fructus cardam.           | 4.96  |
| Spir. terebinth.            | 4.211 | bacc. Juniper.            | 4.88  |
| vini.                       | 4.226 | Lign. aloes.              |       |
| Cancer. Fol. erysim.        | 4.66  | Mercurius vitæ.           | 3.410 |
| gallii.                     | 4.74  | bezoar. lunar.            | 3.413 |
| geranii.                    | 4.76  | ☉. ex terra ☉ li.         | 3.492 |
| pimpinell.                  | 4.124 | Cardialgia infantum.      |       |
| Rad. bardan.                | 4.25  | Fol. cardiac.             | 4.36  |
| pimpinell.                  | 4.124 | unguent. cardiac. F.F.    | 2.308 |
| ellebor.                    | 4.236 | Catarrhi. Fol. cynogloss. | 4.51  |
| Anim. Bezoar.               | 5.278 | Jasmin.                   | 4.84  |
| hom. sterc.                 | 5.291 | nicot.                    | 4.112 |
| ursi fel.                   | 5.312 | quinq. fol.               | 4.135 |
| Gruis cap.                  | 5.320 | rorismar.                 | 4.141 |
| cancer. flav.               | 5.325 | salvia.                   | 4.145 |
| Min. plumbum.               | 3.389 | sanguis sorb.             | 4.147 |
| Liquor. ad ulcer.           | 2.232 | Fl. eupator.              | 4.67  |
| Pil. Tarr. querc.           | 2.259 | jasmin.                   | 4.84  |
| Sach. saturn.               | 3.390 | salv.                     | 4.145 |
| Ol. saturn.                 | 3.391 | spic.                     | 4.160 |
| Salis. ℥.                   | 3.395 | stach. citr.              | 4.163 |
| cristal. Jovis.             | 3.396 | viol.                     | 4.174 |
| ☉. Solaris.                 | 3.403 | Rad. bistort.             | 4.29  |
| ☉. ☿ rubeus.                | 3.408 | caryophill.               | 4.39  |
| ☉. ♀ ni. dulc. diaph.       | 3.415 | imperator.                | 4.85  |
| liquor. ☿. præcip.          | 3.417 | met.                      | 4.104 |
| ☉. ♂. sach. querc.          | 3.436 | peucedan.                 | 4.124 |
| Spod. Græcor.               | 3.461 | sarsaparill.              | 4.142 |
| Ol. anodyn.                 | 3.501 | sesel. mass.              | 4.148 |
| ☉. fuligin.                 | 4.194 | tormentill.               | 4.167 |
| Capitis Fol. aristol. long. | 4.19  | valer.                    | 4.170 |
| affect. rotund.             | 4.19  | mechoac.                  | 4.242 |
| Beton.                      | 4.28  | Sem. milii.               | 4.104 |
| majoran.                    | 4.26  | nigell.                   | 4.113 |
| Fl. caryophill.             | 4.38  | sesel. mass.              | 4.158 |
| Rad. caryophill.            | 4.39  | cret.                     | 4.158 |
| Cortic. cinnam.             | 4.48  | Fruct. sebest.            | 4.154 |
| Sem. majoran.               | 4.96  | Lign. guajac.             | 4.78  |
|                             |       | santal.                   |       |



# ET REMEDIORUM.

|                           |       |                               |       |
|---------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Santal.                   | 4.148 | Ol. Sp. sulph. ver. S. Cloff. | 3.507 |
| salicifras.               | 4.150 | Cepha. Fol. gramin.           | 4.77  |
| Lachr. sang. drac.        | 4.114 | lalgia. millefol.             | 4.104 |
| Resin. benzoin.           | 4.188 | terpill.                      | 4.156 |
| ladan.                    | 4.197 | verben.                       | 4.171 |
| styrac.                   | 4.216 | Fl. caryophill. hort.         | 4.38  |
| tacamahac.                | 4.217 | rosar.                        | 4.139 |
| rhur.                     | 4.223 | Rad. caryophill.              | 4.39  |
| Gumm. animæ.              | 4.184 | peucedan.                     | 4.124 |
| succin.                   | 3.511 | rhod.                         | 4.137 |
| Anim. cast. test.         | 5.279 | valer.                        | 4.170 |
| hom. ossa.                | 5.297 | Cort. cinnam.                 | 4.43  |
| lucii pisc. ar.           | 5.330 | Sem. nigell.                  | 4.113 |
| Min. catechu.             | 3.516 | majoran.                      | 4.96  |
| Aq. carbunc.              | 2.316 | Lign. santal.                 | 4.148 |
| epilept.                  | 2.138 | aloes.                        |       |
| desic. catarrh.           | 2.137 | Balsam. tolut.                | 4.185 |
| decoct. & D. Horneck.     | 2.175 | Fruct. ceras. dulc.           | 4.41  |
| Looch. pass.              | 2.178 | persic.                       | 3.121 |
| Empl. cephal.             | 2.195 | Gumm. pissasphalt.            | 4.208 |
| errhin. montan.           | 2.203 | sagapen.                      | 4.114 |
| extract. nasal. D. Spin.  | 2.204 | Anim. ovis.                   | 5.304 |
| panchym. Crollii.         | 2.221 | suum tal. os.                 | 5.303 |
| Vin Med. ceph. splen.     | 2.227 | ciconiæ stercus.              | 5.315 |
| Pil. ad tussim.           | 2.252 | columb. viv.                  | 5.316 |
| de animoniac. q.          | 2.253 | simus.                        | 5.316 |
| Arthrit. D. Schöff.       | 2.253 | gallina.                      | 5.318 |
| de succin. Crat.          | 2.259 | upupæ penn.                   | 5.324 |
| Pulv. contra deflux.      | 2.269 | canceri.                      | 5.325 |
| Spec. cephal.             | 2.273 | halec.                        | 5.329 |
| Sal. Jovis.               | 3.397 | Min. ophites.                 | 3.355 |
| & præc. per. & Sp. sulph. | 3.400 | Sal. commun.                  | 3.464 |
| aurum vit.                | 3.405 | Aq. Carbunc.                  | 2.136 |
| Q. chalyb. cach.          | 3.475 | cephal. arom.                 | 2.138 |
| Q. alb. vomit.            | 3.484 | damasc. odor.                 | 2.141 |
| vitriol. dulc.            | 3.488 | imperial.                     | 2.144 |
| Flor. Sp. sulph. vitriol. | 3.502 | magnanim.                     | 2.146 |
| lac. sulphur.             | 3.504 | picar. compos.                | 2.148 |
|                           |       | c 2                           | salv. |

4.96  
4.88

4.10  
4.11  
4.12

4.13  
4.14  
4.15

4.16  
4.17  
4.18

4.19  
4.20  
4.21

4.22  
4.23  
4.24

4.25  
4.26  
4.27

4.28  
4.29  
4.30

4.31  
4.32  
4.33

4.34  
4.35  
4.36

4.37  
4.38  
4.39

# INDEX MORBORUM

|                      |        |                      |        |
|----------------------|--------|----------------------|--------|
| salv. compol. F.F.   | 2. 148 | dauc.                | 4. 62  |
| Bals. apoplect.      | 2. 156 | fenic.               | 4. 70  |
| Epith. in febr. mal. | 2. 205 | pimpinell.           | 4. 124 |
| vin. medic. cephal.  | 2. 227 | sesami.              | 4. 157 |
| Pil. Iliac. rhas.    | 2. 256 | Fruct. bacc. laur.   | 4. 91  |
| marocost. Minder.    | 2. 256 | piper.               | 4. 126 |
| de succin. crat.     | 2. 259 | Resin.               | 4. 200 |
| Sal. sacerdot.       | 2. 273 | Anim. vaccin. sterc. | 5. 270 |
| unguent. narcot.     | 3. 309 | canis integ.         | 5. 274 |
| phlegma Oli acid.    | 3. 486 | canin. sterc.        | 5. 274 |
| Aq. hord gr.         | 4. 82  | hirc. oment.         | 5. 276 |
| Cho- Fol. acetos.    | 4. 7   | bezoar. lap.         | 5. 278 |
| lera. fenecii.       | 4. 156 | castor. test.        | 5. 279 |
| Lap. crystall.       | 3. 349 | Zibeth.              | 5. 281 |
| Colic. Fol. cerefol. | 4. 42  | cerv. priap.         | 5. 282 |
| ca. philipend.       | 4. 69  | equor. sterc.        | 5. 285 |
| heder.               | 4. 79  | eq. test.            | 5. 286 |
| jasmin.              | 4. 84  | echin. ventr.        | 5. 286 |
| malv.                | 4. 98  | hom. aur. ford.      | 5. 287 |
| menth.               | 4. 102 | secund.              | 5. 288 |
| rutæ.                | 4. 143 | membr.               | 5. 294 |
| veron.               | 4. 173 | lep. offic. tali.    | 5. 300 |
| Flor. chammill.      | 4. 43  | hup. intest.         | 5. 301 |
| jasmin.              | 4. 84  | stercus.             | 5. 301 |
| sambuc.              | 4. 146 | pellis.              | 5. 301 |
| Rad. acori.          | 4. 8   | ovis oment.          | 5. 304 |
| allii.               | 4. 12  | alaud. cor.          | 5. 314 |
| cyperi.              | 4. 61  | columb. fim.         | 5. 316 |
| eryngii.             | 4. 66  | galk. jus            | 5. 318 |
| Zedoar.              | 4. 179 | sterc.               | 5. 319 |
| Cort. aurant.        | 4. 23  | grus integ.          | 5. 320 |
| costic.              | 4. 54  | hirund. sterc.       | 5. 321 |
| imperat.             | 4. 85  | cygni pell.          | 5. 322 |
| nuck. jugl.          | 4. 87  | parus.               | 5. 322 |
| Sem. ammi ver.       | 4. 13  | pavon. adeps.        | 5. 323 |
| avenæ.               | 4. 22  | perdic. pena.        | 5. 323 |
| cari.                | 4. 37  | upupæ caro.          | 5. 324 |
| cumini.              | 4. 57  | anguill. sang.       | 5. 325 |
|                      |        | cancer.              |        |



# ET REMEDIORUM.

|       |                            |       |                       |        |
|-------|----------------------------|-------|-----------------------|--------|
| 4.62  | cancr. ocul.               | 5.326 | auric. mur.           | 4.24   |
| 4.70  | carpion. lap.              | 5.327 | burf. pastor.         | 4.31   |
| 124   | manat. lap.                | 5.327 | Sem. milii.           | 4.104  |
| 4.77  | sturion. off.              | 5.333 | tritic.               | 4.168  |
| 4.91  | afelli.                    | 5.338 | Fruct. mespil.        | 4.103  |
| 4.106 | cicada.                    | 5.340 | mal. persic. ex sicc. | 4.121  |
| 4.100 | lumbric. terr.             | 5.344 | Gumm. tragac.         | 4.224  |
| 5.170 | scorp.                     | 5.347 | Anim. hircus.         | 5.275  |
| 5.174 | Min. ophites.              | 3.355 | ranar. sp.            | 5.332  |
| 5.174 | sal. comm.                 | 3.464 | Con- Fol. millefol.   | 4.105  |
| 5.176 | fossil.                    | 3.470 | tra- Bals tolut.      | 4.185  |
| 5.178 | gagates.                   | 3.515 | etur. indic.          | 4.186  |
| 5.179 | Sperm. cer.                | 3.514 | Gumm. juniper.        | 4.88   |
| 5.181 | Aq. carminat.              | 2.137 | animæ.                | 4.184  |
| 5.183 | ol. hyperic. comp.         | 2.248 | Anim. catipell.       | 5.280  |
| 5.185 | pil. de euphorb. q.        | 2.254 | cerv. sang.           | 5.282  |
| 5.186 | lliac. Rhaf.               | 2.256 | hom. cut.             | 5.297  |
| 5.186 | odorif. Crollii.           | 2.262 | ping.                 | 5.297  |
| 5.187 | Trajea antenephre.         | 2.272 | mur. alp.             | 5.303  |
| 5.188 | Sal sacerdotat.            | 2.273 | ovis.                 | 5.305  |
| 5.194 | unguent. C. C. anodyn.     | 2.306 | taxi adeps.           | 5.309  |
| 5.300 | decoct. laxat. D. Spin.    | 2.311 | vulp. ping.           | 5.313  |
| 5.301 | Sal. ♀.                    | 3.388 | in ol. coct.          | 5.313  |
| 5.301 | ♀. solar.                  | 3.403 | scarab.               | 5.345  |
| 5.301 | croc. metallor.            | 3.426 | Θ. chalyb. cach.      | 3.475  |
| 5.304 | clyff.                     | 3.440 | ⊖ li diaphor.         | 3.490  |
| 5.314 | arcan. ♂ ij. Basil.        | 3.448 | bals. e cat.          | 5.274  |
| 5.316 | antid. Πάρυξενς Θ.         | 3.450 | ol. elemi.            | 4.194  |
| 5.318 | Tinct. ex Sp. sulph. ♂ ij. | 3.451 | Cor- Fol. rorismarin. | 4.141  |
| 5.319 | Spir. Nitr.                | 3.476 | dialia. violar.       | 4.174  |
| 5.320 | Spir. acid. *              | 3.482 | Flor. borrag.         | 4.30   |
| 5.321 | lac. Sp. sulph.            | 3.504 | bugloss.              | 4.31   |
| 5.321 | Aq. Sp. sulph.             | 3.506 | calthæ.               | 4.34   |
| 5.322 | Ol. sulph. ver.            | 3.507 | caryophill. hort.     | 4.38   |
| 5.323 | Ol. lini.                  | 4.95  | cheiri.               | 4.45   |
| 5.323 | nucl. persic.              | 4.121 | rosar.                | 4.134  |
| 5.324 | Sp. Tart.                  | 4.220 | viol.                 | 4.174  |
| 5.324 | Consti- Fol. anserin.      | 4.17  | Rad. angel.           | 4.16   |
| 5.324 | pant.                      |       | c 3                   | caryo- |

# INDEX MORBORUM

|                       |       |                            |       |
|-----------------------|-------|----------------------------|-------|
| charyophill.          | 4.39  | bugloss.                   | 4.31  |
| fraxinell.            | 4.72  | succ. ros. ☉               | 4.141 |
| Cortic. cinnam.       | 4.48  | Cordis palpit.             |       |
| Fruct. ceras.         | 4.41  | Flor. caryophill.          | 4.38  |
| chermes.              |       | Rad. doron.                | 4.63  |
| granat.               | 4.77  | vincetox.                  | 4.174 |
| pom. dule.            | 4.129 | Fruct. mosch.              | 4.106 |
| rub. Id.              | 4.142 | Lign. santal.              | 4.148 |
| Lign. aloes.          | 4.9   | Resin. ladan.              | 4.196 |
| Anim. Mosch.          | 5.302 | Anim. bezoar. lap.         | 5.278 |
| unicorn.              | 5.302 | mosch.                     | 5.302 |
| perl.                 | 5.330 | Min. granatus.             | 3.328 |
| Min. hyacinth.        | 3.328 | imaragdus.                 | 3.332 |
| saphirus.             | 3.330 | Saccul. cordial.           | 2.276 |
| corallia.             | 3.333 | ☉. comp. corall.           | 3.466 |
| margar.               | 3.342 | ▽. still. ex fl. caprifol. | 4.35  |
| unicorn. foss.        | 3.360 | Syr. de pom. simpl.        | 4.129 |
| ambra.                | 3.510 | Crapulam discut.           |       |
| Sal perlar.           | 3.343 | Fol. absynth.              |       |
| Aq. cord. herc. sax.  | 2.139 | brassii.                   |       |
| D. Spin.              | 2.140 | Fruct. amygd. amar.        |       |
| damausc. odor.        | 2.141 | Cruor ex casu.             |       |
| magnanim.             | 2.146 | cataplasma contr. cruor.   | 2.165 |
| perlar.               | 2.153 | Cutis. Fol. fabar.         | 4.69  |
| Bals. vit.            | 2.157 | mac. Farin. fabar.         | 4     |
| Elect. cord.          | 2.183 | Aq. fabar.                 | 4.68  |
| elixir. citr.         | 2.187 |                            |       |
| Epithem. cord.        | 2.204 | D.                         |       |
| mosc. citr.           | 2.236 | Dentium dolor.             |       |
| odorif. Crollit.      | 2.262 | Fol. anserin.              | 4.17  |
| Pulv. de Cyper. odor. | 2.269 | graminis.                  | 4.77  |
| Syr. cardiac.         | 2.292 | millefol.                  | 4.105 |
| unguent. Cord. Weik.  | 2.308 | mor.                       | 4.106 |
| ebur. ust.            | 3.462 | nicot.                     | 4.112 |
| ☉. pralat.            | 3.473 | pimpinell.                 | 4.124 |
| corall.               | 3.474 | puleg.                     | 4.133 |
| Magist. succ. dulc.   | 3.512 | querc.                     | 4.135 |
| ▽. borrag.            | 4.30  | ros. solis.                | 4.141 |
|                       |       | salvia.                    |       |



# ET REMEDIORUM.

|                      |       |                      |       |
|----------------------|-------|----------------------|-------|
| salvia.              |       | lep. cap.            | 5.300 |
| verben.              | 4.171 | conch. test          | 5.328 |
| Flor. caryophill.    | 4.38  | perc. lap.           | 5.331 |
| aromat.              | 4.39  | Lap. pumex.          | 3.355 |
| Rad. asparag.        | 4.22  | silic.               | 3.356 |
| imperator.           | 4.85  | corall.              | 3.333 |
| onon.                | 4.116 | Pulv. dentifric.     | 2.269 |
| pimpinell.           | 4.124 | Den- Anim. Can. den. | 5.274 |
| prim. ver.           | 4.131 | titio. equor. dent.  | 5.286 |
| pyrethri.            | 4.134 | Lepor. cerebr.       | 5.300 |
| Sem. hyosciam.       | 4.83  | Lupi dent.           | 5.301 |
| Fruct. bacc. laur.   | 4.91  | lup. axung.          | 5.301 |
| piper.               | 4.126 | arietis dentit.      | 5.304 |
| Resin. benzoin.      | 4.188 | galli cerebr.        | 5.318 |
| ladan.               | 4.197 | Diar- Fol. acacia.   | 4.6   |
| tacamachaac.         | 4.217 | rhæa. anserin.       | 4.17  |
| Gummi rhuis.         | 4.138 | auric. mur.          | 4.24  |
| Anim. capræ fel.     | 5.279 | burf. pastor.        | 4.32  |
| castor. test.        | 5.279 | hispidula.           | 4.81  |
| lep. axung.          | 5.300 | numul.               | 4.114 |
| serp. exuv.          | 5.306 | oleæ.                | 4.115 |
| urfi fel.            | 5.302 | pinastr.             | 4.125 |
| corvor. sterc.       | 5.317 | polygon.             | 4.128 |
| lumbr. terr.         | 5.344 | scelopendr.          | 4.152 |
| Min. sal. comm.      | 3.464 | symphyt.             | 4.163 |
| Aq. niv.             | 3.322 | vineæ.               | 4.173 |
| Diacnism. odontalg.  | 2.224 | virg. aur.           | 4.176 |
| liniment. dentifric. | 2.306 | ulmar.               | 4.177 |
| sach. alum.          | 3.479 | Flor. amaranthi.     | 4.12  |
| ⊖ li                 | 3.488 | cynogloss.           | 4.59  |
| Ol. buxi.            | 4.32  | balauft.             | 4.77  |
| Ol. coryl.           | 4.53  | virg. aur.           | 4.176 |
| guajac.              | 4.78  | Rad. Cynogloss.      | 4.59  |
| echart. comb.        | 4.95  | acori adul.          | 4.8   |
| camphor.             | 4.191 | symphyt.             | 4.163 |
| Dentium nigred.      |       | torment.             | 4.167 |
| Gumm. mastich.       | 4.199 | Rhabarb.             | 4.126 |
| Anim. Eq. dent.      | 5.286 | Cort. acac.          | 4.6   |
|                      |       | pinastr.             |       |

# INDEX MORBORUM

|                    |       |                      |       |
|--------------------|-------|----------------------|-------|
| pinastr.           | 4.126 | Farin. fabar.        | 4.58  |
| Sem. milii.        | 4.104 | Dige- Fol. basilic.  | 4.26  |
| papav. sat.        | 117   | rent. loti.          | 4.96  |
| Fruct. acaciæ.     | 4.6   | majoran.             | 4.96  |
| berberis.          | 4.27  | rut. mur.            | 4.144 |
| castaneæ.          | 4.39  | Flor. chamom.        | 4.43  |
| cornus.            | 4.52  | Croci.               | 4.64  |
| avellan.           | 4.53  | lil. alb.            | 4.93  |
| cupress.           | 4.57  | loti.                | 4.96  |
| mala cydon.        | 4.61  | Rad. bardan.         | 4.25  |
| granat.            | 4.77  | curcum.              | 4.58  |
| mespil.            | 4.103 | lil. arbor.          | 4.93  |
| mor. immatur.      | 4.106 | scrophul.            | 4.154 |
| moschat.           | 4.106 | Sem. basilic.        | 4.26  |
| Sorb.              | 4.160 | cumin.               | 4.56  |
| uvæ immat.         | 4.175 | hord.                | 4.82  |
| Musc. usneæ.       | 4.106 | lini.                | 4.95  |
| Succ. hypocist.    | 4.196 | majoran.             | 4.96  |
| Gumm. Mastich.     | 4.199 | napi.                | 4.109 |
| Anim. Vaccin. lac. | 5.271 | Fruct. oliv.         | 4.115 |
| hirc. pell.        | 5.276 | Lachr. bdellii.      | 4.187 |
| rupi capræ jec.    | 5.276 | Resin. tacamachac.   | 4.217 |
| capr. caro.        | 5.279 | Gumm. ammon.         | 4.182 |
| coagul.            | 5.279 | Elemi.               | 4.194 |
| C. Custi.          | 5.281 | opop.                | 4.208 |
| Lep. jecur.        | 5.300 | pic.                 | 4.209 |
| ovis lana.         | 5.304 | Anim. Vacca butyr.   | 5.271 |
| gall. cerebr.      | 5.318 | capr. sterc.         | 5.276 |
| galli tunic.       | 5.318 | anat. ping.          | 5.814 |
| Min. Terra sigill. | 3.318 | Gall. vitel. ov.     | 5.319 |
| Bolus.             | 3.319 | cera. temp.          | 5.337 |
| Smaragdus præp.    | 3.332 | Discu- Fol. abrotan. | 4.4   |
| Corall.            | 3.333 | tient. anethi.       | 4.16  |
| Chry stallus.      | 3.349 | artemis.             | 4.20  |
| Aq. antidyfenter.  | 2.142 | beton.               | 4.23  |
| Pulv. dysfenter.   | 2.269 | calamenth.           | 4.33  |
| Ol. martial.       | 3.380 | calth.               | 4.34  |
| Tinct. ♂.          | 3.459 | cardiac.             | 4.36  |
|                    |       | card.                |       |



# INDEX MORBORUM

|                   |       |                       |          |
|-------------------|-------|-----------------------|----------|
| card. ben.        | 4.36  | petros. mont.         | 4.123    |
| cerefol.          | 4.42  | schœnant.             | 4.152    |
| ebul.             | 4.64  | scyllæ.               | 4.154    |
| fœnic.            | 4.70  | sesel. Mass.          | 4.158    |
| galeg.            | 4.74  | Zedoar.               | 4.179    |
| Jacca.            | 4.85  | Cort. cinnam.         | 4.48     |
| menth. farac.     | 4.102 | ebul.                 | 4.64     |
| rub.              | 4.143 | Sem. agni cast.       | 4.10     |
| rut.              | 4.143 | ammi ver.             | 4.13     |
| rut. mur.         | 4.144 | anethi.               | 4.16     |
| sabin.            | 4.144 | anisi                 | 4.17     |
| satureiæ.         | 4.150 | asparag.              | 4.22     |
| senecii.          | 4.156 | card. ben.            | 4.36     |
| Tanac.            | 4.165 | cari.                 | 4.37     |
| Thymi.            | 4.166 | cerefol.              | 4.42     |
| verbasc.          | 4.171 | cicer.                | 4.46     |
| Flor. beton.      | 4.28  | fœnu græc.            | 4.70     |
| calth.            | 4.34  | petros. mont.         | 4.123    |
| caryophill. arom. | 4.38  | sesel. Mass.          | 4.158    |
| cheyri.           | 4.45  | tritic.               | 4.168    |
| ebul.             | 4.64  | Fruct. balan. myreps. | 4.24     |
| lupul.            | 4.96  | cardamom.             | 4.36     |
| melilot.          | 4.100 | cubeb.                | 4.56     |
| sambuc.           | 4.147 | bacc. Juniper.        | 4.88     |
| tanac.            | 4.165 | Lign. sassafras.      | 4.160    |
| thil.             | 4.167 | Visc. querc.          | 4.135    |
| verbasc.          | 4.171 | Lachr. bdellii.       | 4.187    |
| Rad. allij.       | 4.12  | Resin. Myrrh.         | 4.200    |
| alch.             | 4.12  | Gumm. Juniper.        | 4.88     |
| ari.              | 4.21  | animæ.                | 4.184    |
| asphrag.          | 4.22  | opop.                 | 4.208    |
| caryophill.       | 4.39  | pic.                  | 209      |
| cost.             | 4.54  | Bals. indic.          | 4.186    |
| curcum.           | 4.58  | Anim. Aq. fl. omnium. | 5.271    |
| doron.            | 4.63  | canin. sterc.         | 5.274    |
| eryng.            | 4.66  | castor. test.         | 5.279    |
| helen.            | 4.80  | cari axung.           | 5.280    |
| onon.             | 4.116 | hom. urin.            | 5.288    |
|                   |       | d                     | pingued. |

# INDEX MORBORUM

|                  |       |                   |       |
|------------------|-------|-------------------|-------|
| pingued.         | 5.297 | urtic.morr.       | 4.179 |
| ossa.            | 5.297 | Flor.amaranth.    | 4.13  |
| Mosch.           | 5.302 | balauft.          | 4.77  |
| ovi sterc.       | 5.304 | ligustr.          | 4.93  |
| suum sterc.      | 5.308 | rosar.            | 4.139 |
| urfi ping.       | 5.312 | virg.aur.         | 4.176 |
| ardeæ ping.      | 5.315 | urtic. mort.      | 4.179 |
| columb. fim.     | 5.316 | Rad. rhapont.     | 4.138 |
| hirund. sterc.   | 5.321 | tormentill.       | 4.167 |
| perdic. penn.    | 5.323 | Rhabarb.          | 4.246 |
| cancr. ocul.     | 5.326 | Cort. acac.       | 4.6   |
| sturion. off.    | 5.333 | pinastr.          | 4.125 |
| apum mel.        | 5.336 | Sem. Psyllii.     | 4.246 |
| aselli.          | 5.338 | Fruct. acac.      | 4.6   |
| lumbric.         | 5.344 | berber.           | 4.27  |
| Dysen-Fol. acac. | 4.6   | castan.           | 4.39  |
| teria. anser.    | 4.17  | corn.             | 4.52  |
| auric. mur.      | 4.24  | cupress.          | 4.57  |
| burf. pastor.    | 4.32  | cydon.            | 4.61  |
| fabar.           | 4.69  | gtanat.           |       |
| hispidulæ.       | 4.81  | mespil.           | 4.103 |
| lagopi.          | 4.90  | mor. immatur.     | 4.106 |
| ligustr.         | 4.93  | moschat.          | 4.106 |
| millefol.        | 4.104 | bacc. myrt.       | 4.109 |
| myrt.            | 4.109 | rhiz.             | 4.139 |
| numul.           | 4.114 | rub.              | 4.142 |
| oleæ.            | 4.115 | forb.             | 4.160 |
| pinastr.         | 4.125 | Musc. musc. usn.  | 4.108 |
| plantag.         | 4.127 | pulmon. arb.      | 4.133 |
| polygon.         | 4.128 | Resin. ladan.     | 4.197 |
| querc.           | 4.135 | myrrh.            | 4.200 |
| quinquefol.      | 4.135 | thur.             | 4.223 |
| rhuis.           | 4.138 | Gumm. arab.       | 4.184 |
| sanguisorb.      | 4.147 | mastich.          | 4.199 |
| verben.          | 4.171 | tragac.           | 4.224 |
| vitis.           | 4.175 | Succ. hypocist.   | 4.196 |
| virg. aur.       | 4.176 | Anim. bovis sang. | 5.270 |
| ulmar.           | 4.177 | vaccin. lac.      | 5.271 |
|                  |       | boyis             |       |



# ET REMEDIORUM.

|                    |       |                       |       |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|
| bovis priap.       | 5.251 | Sal. fach. ☉.         | 3.382 |
| canin sterc.       | 5.274 | ☉ lytharg.            | 3.459 |
| hircin. sang.      | 5.275 | Extr. rad. pom.       | 4.129 |
| bezoar. lap.       | 5.278 | Laud. op.             | 4.204 |
| capr. caro.        | 5.279 | E.                    |       |
| coagul.            | 5.279 | E Molliunt.           |       |
| cervi priapus.     | 5.282 | Fol. alth.            | 4.12  |
| sang.              | 5.282 | branc. ursin.         | 4.31  |
| talus.             | 5.283 | hyoscyam.             | 4.82  |
| equi coagul.       | 5.285 | laur.                 | 4.91  |
| hom. off.          | 5.297 | malv.                 | 4.98  |
| lep. sang.         | 5.300 | ☿ ial.                | 4.103 |
| sterc.             | 5.301 | pariet.               | 4.118 |
| mula sterc.        | 5.303 | verbasc.              | 4.171 |
| ovis lana.         | 5.304 | viol.                 | 4.174 |
| columb. tun. vent. | 5.316 | urtic.                | 4.178 |
| cornic. fim.       | 5.317 | Flor. chamom.         | 4.43  |
| corvor. ov.        | 5.317 | croc.                 | 4.54  |
| turtur.            | 5.324 | melilot.              | 4.100 |
| cancr. cin.        | 5.326 | sambuc.               | 4.147 |
| cera.              | 5.331 | verbasc.              | 4.171 |
| Min. Terr. sigill. | 3.318 | Rad. alth.            | 4.12  |
| bolus.             | 3.319 | bryon.                | 4.31  |
| saphirus.          | 3.330 | hyosciam.             | 4.82  |
| sardius lap.       | 3.331 | lil. albor.           | 4.93  |
| smaragdus.         | 3.331 | verbasc.              | 4.171 |
| præpar.            | 3.332 | urtic.                | 4.178 |
| corall.            | 3.333 | Cort. madrag.         | 4.98  |
| chrystallus.       | 3.349 | Sem. scœnogr.         | 4.70  |
| hæmatit.           | 3.351 | hord.                 | 4.82  |
| magnes.            | 3.354 | hyosciam.             | 4.82  |
| unicorn. foss.     | 3.360 | lini.                 | 4.95  |
| Ferrum. }          |       | tritit.               | 4.168 |
| chalybs. }         | 3.377 | urtic.                | 4.178 |
| Aq. antidysent.    | 2.142 | Fruct. balan. myreps. | 4.24  |
| ol. hyperic. comp. | 2.246 | cicer.                | 4.46  |
| pulv. dysent.      | 2.269 | bacc. laur.           | 4.91  |
| ol. martial. rubr. | 3.380 | prun.                 | 4.132 |
|                    |       | d 2                   | sebe- |

# INDEX MORBORUM

|                          |       |                |       |
|--------------------------|-------|----------------|-------|
| sebesten.                | 4.154 | aquileg.       | 4.19  |
| Visc. querc.             | 4.135 | aristol.       | 4.19  |
| Resin. ladan.            | 4.197 | calamenth.     | 4.33  |
| liquid. ambr.            | 4.198 | chelidon. maj. | 4.43  |
| laric.                   | 4.210 | cichor.        | 4.46  |
| styr. cal.               | 4.216 | consol.        | 4.51  |
| Tacamahac.               | 4.218 | cupress.       | 4.54  |
| Gumm. Ammon.             | 4.182 | cuscut.        | 4.58  |
| Elemi.                   | 4.194 | epat. nob.     | 4.65  |
| galban.                  | 4.195 | graminis.      | 4.77  |
| mastich.                 | 4.199 | levist.        | 4.92  |
| opop.                    | 4.208 | linar.         | 4.95  |
| pic.                     | 4.209 | marrub.        | 4.99  |
| Anim. bovis axung.       | 5.270 | menth.         | 4.102 |
| vacc. butyr.             | 5.271 | nast. aq.      | 4.110 |
| cat. axung.              | 5.280 | origan.        | 4.116 |
| cervi ol.                | 5.283 | petrosel.      | 4.122 |
| hom. sterc.              | 5.261 | pimpinell.     | 4.124 |
| Ovis æsyp.               | 5.304 | quinquefol.    | 4.135 |
| lana.                    | 5.304 | rorismarin.    | 4.141 |
| suum. sterc.             | 5.308 | scordii.       | 4.153 |
| vitul. sterc.            | 5.311 | verben.        | 4.171 |
| ursi ping.               | 5.312 | Flor. cent.    | 4.40  |
| anatis adeps.            | 5.314 | genist.        | 4.74  |
| galli ping.              | 5.319 | lupul.         | 4.96  |
| jus.                     | 5.318 | pæon.          | 4.127 |
| gruis ping.              | 5.320 | schænanth.     | 4.152 |
| cygni adeps.             | 5.322 | stæch. citr.   | 4.163 |
| unguis odoratus.         | 5.325 | Rad. acori.    | 4.8   |
| Ichtyocolla.             | 5.329 | asparag.       | 4.22  |
| lumbric. terr.           | 5.344 | cichor.        | 4.46  |
| Empyema.                 |       | eryngii.       | 4.66  |
| Ol. Sp. sulph. S. Closs. | 3.507 | gentian.       | 4.75  |
| Epa- Fol. absynth.       | 4.4   | levist.        | 4.92  |
| tis ob- pont.            | 4.5   | onon.          | 4.116 |
| struct. acetos.          | 4.7   | petrosel.      | 4.122 |
| adianthi.                | 4.8   | pimpinell.     | 4.124 |
| agerati.                 | 4.10  | pæon.          | 4.127 |
|                          |       | rhapont.       |       |



# ET REMEDIORUM.

|                        |           |                       |       |
|------------------------|-----------|-----------------------|-------|
| rhapont.               | 4.138     | Tinct. ex vitr. § ij. | 3.445 |
| rub.                   | 4.142     | Tinct. ex fl. § ij.   | 3.448 |
| rusc.                  | 4.143     | ☉. ☉ is.              | 3.466 |
| sefel.                 | 4.158     | Lap. prunell.         | 4.473 |
| valer.                 | 4.170     | Spir. ☉ li volat.     | 3.486 |
| polyp.                 | 4.245     | Spir. ☉ li.           | 3.488 |
| Cort. Mori.            | 4.165     | ▽. aperiens Penot.    | 3.489 |
| Sem. card. ben.        | 4.37      | ☉ ☉ li.               | 4.464 |
| genist.                | 4.74      | Epatis Fol. acetos.   | 4.7   |
| pastin. sylv.          | 4.120     | inflam. cichor.       | 4.46  |
| petrosel.              | 4.122     | matio. endiv.         | 4.64  |
| raphan.                | 4.136     | epat. stell.          | 4.65  |
| sefel. Mass.           | 4.158     | spinach.              | 4.162 |
| Fruct. amygd. amar.    | 4.14      | Rad. cichor.          | 4.46  |
| nucl. persic.          | 4.121     | Fruct. berber.        | 4.26  |
| pistac.                | 4.126     | coni abiet.           | 4.3   |
| Lign. nephrit.         | 4.111     | Sap. Corall.          | 3.333 |
| santal.                | 4.148     | Epithem. epat.        | 2.205 |
| Musc. lichen.          | 4.92      | Epa- Lap. Saphyr.     | 3.330 |
| Gumm. ammon.           | 4.182     | is flux. Corall.      | 3.333 |
| Bals. ver.             | 4.185     | Tragea hepat.         | 2.271 |
| indic.                 | 4.186     | Bezoard. martial.     | 3.414 |
| Anim. hom. urin.       | 5.288     | Extr. rad. pom.       | 4.129 |
| Min. stannum.          | 3.394     | Laudan op.            | 4.204 |
| Nitrum.                | 3.472     | Epi- Fol. Galeg.      | 4.74  |
| Sp. Tart.              | 4.218     | lephia. loti.         | 4.96  |
| Aq. aperit.            | 2.134     | meliss.               | 4.100 |
| pectoral. L. Horn.     | 2.46      | ros. ☉                | 4.141 |
| Extr. chalyb.          | 2.213     | rorismar.             | 4.141 |
| Vin. medic. splen.     | 2.227     | rut.                  | 4.143 |
| Pilul. de cent. querc. | 2.253     | Flor. caryophill.     | 4.38  |
| Pilul. Sp. Tart.       | 2.259.260 | lil. convall.         | 4.94  |
| Tragea hepat. querc.   | 2.271     | loti.                 | 4.96  |
| spec. diacubebear.     | 3.273     | pæon.                 | 4.127 |
| Ol. Martial. alb.      | 3.380     | succif.               | 4.163 |
| Bezoard. Zale          | 3.414     | thil.                 | 4.167 |
| §. diaphor.            | 3.427     | Rad. fraxinell.       | 4.72  |
| Clyffus.               | 3.440     | pæon.                 | 4.127 |
|                        |           | d 3                   | scor- |

4.29  
19  
4  
4.3  
4.4  
4.5  
4.6  
4.7  
4.8  
4.9  
4.10  
4.11  
4.12  
4.13  
4.14  
4.15  
4.16  
4.17  
4.18  
4.19  
4.20  
4.21  
4.22  
4.23  
4.24  
4.25  
4.26  
4.27  
4.28  
4.29  
4.30  
4.31  
4.32  
4.33  
4.34  
4.35  
4.36  
4.37  
4.38  
4.39  
4.40  
4.41  
4.42  
4.43  
4.44  
4.45  
4.46  
4.47  
4.48  
4.49  
4.50  
4.51  
4.52  
4.53  
4.54  
4.55  
4.56  
4.57  
4.58  
4.59  
4.60  
4.61  
4.62  
4.63  
4.64  
4.65  
4.66  
4.67  
4.68  
4.69  
4.70  
4.71  
4.72  
4.73  
4.74  
4.75  
4.76  
4.77  
4.78  
4.79  
4.80  
4.81  
4.82  
4.83  
4.84  
4.85  
4.86  
4.87  
4.88  
4.89  
4.90  
4.91  
4.92  
4.93  
4.94  
4.95  
4.96  
4.97  
4.98  
4.99  
5.00

# INDEX MORBORUM

|                     |       |                   |       |
|---------------------|-------|-------------------|-------|
| scorzoner.          | 4.153 | cor.              | 5.300 |
| sefel. mass.        | 4.158 | ossa tali.        | 5.300 |
| succis.             | 4.163 | coagul.           | 5.300 |
| ellebr.             | 4.236 | Lup. cor.         | 5.301 |
| Sem. pæon.          | 4.127 | Lync. ungu.       | 5.301 |
| sefel. mass.        | 4.158 | Unicorn.          | 5.312 |
| Fruct. ceras. dulc. | 4.41  | Ursi fel.         | 5.312 |
| colocynth.          | 4.234 | alced. cor.       | 5.314 |
| Visc. querc.        | 4.135 | cicon. sterc.     | 5.315 |
| sambuc.             | 4.146 | corvor. pull.     | 5.317 |
| Gumm. Lacc.         | 4.196 | coturnic. excrem. | 5.317 |
| sagapen.            | 4.114 | cuculus.          | 5.317 |
| Anim. Agni fel.     | 5.267 | hirundo.          | 5.320 |
| alc. ungu.          | 5.267 | lap.              | 5.320 |
| asin. ungu.         | 5.269 | cor.              | 5.320 |
| tauri corn.         | 5.270 | milvus.           | 5.321 |
| ossa.               | 5.271 | pavon. sterc.     | 5.323 |
| catuli fel.         | 5.274 | pica.             | 5.323 |
| capri corn.         | 5.275 | vultur. cor.      | 5.324 |
| Bezoar. lap.        | 5.278 | fel.              | 5.324 |
| castor. axung.      | 5.279 | carpion. lup.     | 5.327 |
| castor. test.       | 5.279 | Luc. pisc.        | 5.230 |
| ebur.               | 5.285 | ranar. epar.      | 5.332 |
| equi lac.           | 5.285 | testud. sang.     | 5.333 |
| lichenes.           | 5.285 | bombyc.           | 5.339 |
| hom. sang. menstr.  | 5.288 | Min. Chrysolith.  | 3.328 |
| secundin.           | 5.288 | & Lap. corall.    | 3.333 |
| urin. præp.         | 5.290 | armen.            | 3.346 |
| stercus.            | 5.291 | Lazul.            | 3.353 |
| sang.               | 5.292 | specular.         |       |
| ol.                 | 5.292 | Unicorn. foss.    | 3.360 |
| off. ol.            | 5.297 | argent.           | 3.373 |
| cran. magist.       | 5.298 | cinnabar.         | 3.419 |
| extr.               | 5.298 | antimon.          | 3.422 |
| cerebr. spir.       | 5.299 | Sp. sulph.        | 3.501 |
| ol.                 | 2.299 | ambr.             | 3.510 |
| cor.                | 5.299 | succin.           | 3.511 |
| Lep. pulm.          | 5.300 | Aq. anhalt.       | 2.134 |
|                     |       | Epilept.          |       |



# ET REMEDIORUM.

|                             |       |                             |       |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Epilept.                    | 2.138 | guajac.                     | 4.78  |
| picar. compos.              | 2.148 | Extr. ebaccis Juniper.      | 4.88  |
| vomit. Æsculap.             | 2.152 | Laudan. op.                 | 4.204 |
| Elixir. antepilept.         | 2.188 | Spir. antepilept.           | 5.293 |
| epilept. D. Fr.             | 2.188 | Aq. antepilept.             | 5.299 |
| Crollii.                    | 2.188 | 5. Essent. vini.            | 4.226 |
| Crat.                       | 2.189 | Erysi- Fol. anagall. aquat. | 4.15  |
| vit. querc.                 | 2.191 | pel. pariet.                | 4.119 |
| Empl. cephal.               | 2.195 | fabin.                      | 4.144 |
| rotul. infant. lax.         | 2.238 | solan.                      | 4.159 |
| Pilul. antepilept.          | 2.251 | Flor. sambuc.               | 4.146 |
| odorif. Crollii.            | 2.263 | Cort. ebul.                 | 4.64  |
| syr. antepilept.            | 2.291 | mandrag.                    | 4.98  |
| Sal. lunæ.                  | 3.377 | Fruct. fecal.               | 4.155 |
| Spir. ♀.                    | 3.386 | sacc. solan.                | 4.157 |
| Tinct. ♀.                   | 387   | tritic.                     | 4.168 |
| Sal. ♀.                     | 3.397 | Resin. Myrrh.               | 4.200 |
| Manna Mercur.               | 3.408 | Anim. sang. menstr.         | 5.288 |
| Tinct. ♂ ij.                | 3.416 | hom. sterc. præp.           | 5.291 |
| Crocus metallor.            | 3.426 | vitul. sterc.               | 5.311 |
| cinnabr. ♂ ij.              | 3.434 | ranar. sperm.               | 5.332 |
| ol. ♂ ij. querc.            | 3.436 | sal.                        | 5.332 |
| ol. ♂ ij. sach. Basil.      |       | Lap. medicament.            | 2.231 |
| ▽. antepilept. querc.       | 3.439 | Pulv. contra deflux.        | 2.269 |
| Antid. ζωήφιλ. querc.       | 3.449 | Sperniol. compos. Crollii.  | 2.272 |
| Aq. bened.                  | 3.452 |                             |       |
| ☞ fugac. *ci                | 3.482 | Bezoard lunar.              | 3.413 |
| ☉ alb. vomit.               | 3.484 | Excrefcencias reprimunt.    |       |
| phlegma ☉ li acid.          | 3.486 | Anim. ovis lana.            | 5.304 |
| ☞ ☉ li volat.               | 3.486 | Min. Ochra.                 | 3.320 |
| phil.                       | 3.489 | Antimon.                    | 3.422 |
| antepilept. 3.490. 491. 492 |       | Ol. ♂ ij. mellitum.         | 3.438 |
| Sal. ☉ li.                  | 3.494 | Alum. ust.                  | 3.479 |
| Magist. ☉ li.               | 3.496 | Exomphal. infant. curat.    |       |
| ol. Gagat.                  | 3.416 | Vaccæ caseus.               | 5.271 |
| Buxi.                       | 4.32  | Exter- Fol. abrotan.        | 4.4   |
| Extract. Bux.               | 4.32  | gunt. absynth. pont.        | 4.5   |
| ol. Coryl.                  | 4.53  | adianth.                    | 4.8   |
|                             |       | agrimon.                    |       |

# ET REMEDIORUM.

|                     |       |
|---------------------|-------|
| agrimon.            | 4.11  |
| alchimill.          | 4.11  |
| anagall.            | 4.15  |
| beton.              | 4.28  |
| calamenth.          | 4.33  |
| geran.              | 4.75  |
| pariet.             | 4.119 |
| petrosel.           | 4.122 |
| Flor. beton.        | 4.28  |
| cent. min.          | 4.40  |
| Rad. bardan.        | 4.25  |
| petrosel.           | 4.122 |
| polygonat.          | 4.127 |
| Cort. cappar.       | 4.34  |
| Fruct. amygd. amar. | 4.14  |
| fabar.              | 4.68  |
| jubub.              | 4.87  |
| Sem. petrosel.      | 4.122 |
| Succ. aloes.        | 4.252 |

F.

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>F</b> Ebr. in genere. |       |
| Fol. absynth.            | 4.4   |
| acetos.                  | 4.7   |
| arnic.                   | 4.20  |
| chamædr.                 | 4.42  |
| cichor.                  | 4.46  |
| malv.                    | 4.98  |
| plantag.                 | 4.127 |
| portulac.                | 4.130 |
| quinquefol.              | 4.135 |
| rut.                     | 4.143 |
| tarax.                   | 4.165 |
| vermic.                  | 4.172 |
| Flor. cent.              | 4.40  |
| nymph.                   | 4.114 |
| papa. err.               | 4.118 |
| ros.                     | 4.139 |
| viol.                    | 4.174 |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Rad. cichor.                  | 4.46  |
| gentian.                      | 4.75  |
| nymph.                        | 4.114 |
| rhapont. ver.                 | 4.38  |
| tarax.                        | 4.165 |
| Sem. raphan.                  | 4.136 |
| Fruct. auran.                 | 4.23  |
| bacc. heder.                  | 4.80  |
| limon.                        | 4.94  |
| myrtil.                       | 4.109 |
| pom. acid.                    | 4.129 |
| Musc. Lichen.                 | 4.92  |
| Gumm. Gith.                   | 4.256 |
| Bals. ver.                    | 4.185 |
| indic.                        | 4.186 |
| Nitrum.                       | 3.472 |
| Anim. bufo.                   | 5.272 |
| hom. urin.                    | 5.288 |
| sterc.                        | 5.291 |
| Talpa.                        | 5.308 |
| cuculus.                      | 5.317 |
| gall. test.                   | 5.319 |
| gall. alb. ov.                | 5.319 |
| perdic. jecur.                | 5.323 |
| cancr. putam.                 | 5.326 |
| conch. test. intern.          | 5.328 |
| præpar.                       | 5.328 |
| halec.                        | 5.329 |
| lucij fel.                    | 5.330 |
| cor.                          | 5.330 |
| perl.                         | 5.330 |
| ranar. cor.                   | 5.331 |
| Scorpio.                      | 5.347 |
| Tart. vitriol.                | 4.222 |
| Mercur. præcip. præpar. Spir. | 3.400 |
| fulph.                        | 3.400 |
| ♀. rectificat.                | 3.402 |
| ♀. vit.                       | 3.410 |
| Bezoard.                      |       |



# ET REMEDIORUM.

|                             |       |                                 |       |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Bezoard. solar. Crollii.    | 3.413 | rhib.                           | 4.139 |
| Vitrum ꝯ ij hyacinth.       | 3.422 | sebest.                         | 4.154 |
| crocus metall.              | 3.426 | uvæ.                            | 4.175 |
| Tinct. ex vitr. ꝯ ij.       | 3.445 | Sem. cucum.                     | 4.36  |
| ▽. benedict.                | 3.453 | cucurb.                         | 4.57  |
| Sal. ꝯ ij.                  | 3.454 | melon.                          | 4.101 |
| Extr. sal.                  | 3.470 | Anim. vacc. sterc.              | 5.270 |
| Nitr. prælat.               | 3.473 | rupi capr. lap.                 | 5.271 |
| corall.                     | 3.474 | bezoar. lap.                    | 5.278 |
| Θ. cach. chalyb.            | 3.475 | cervi corn.                     | 5.281 |
| alum. dulc.                 | 3.479 | cerv. typh.                     | 5.282 |
| Vitriol alb. vom.           | 3.483 | ranar. cor.                     | 5.331 |
| Spir. Θ li phil.            | 3.489 | tinea.                          | 5.334 |
| Aq. sulph.                  | 3.506 | Tinct. ♀.                       | 3.387 |
| Tinct. Sp. sulph. S. Cloff. | 3.508 | Spir. Θ li volat.               | 3.486 |
| ol. costin.                 | 4.54  | Conserv. acetos.                | 4.7   |
| Syr. de pom. simpl.         | 4.129 | Syr. acetos.                    |       |
| rob. sambuc.                | 4.146 | ▽. acetos.                      |       |
| Aq. febrifug.               | 4.142 | Conserv. acetosell.             | 4.8   |
| Empl. febrifug.             | 4.196 | Syr. acetosell.                 |       |
| Emulsio refrig.             | 2.203 | ▽. acetosell                    |       |
| Pilul. febril.              | 2.251 | ▽. hord.                        | 4.82  |
| de cent. querc.             | 2.254 | Febr. Lign. colubrin.           | 4.50  |
| febril. hart.               | 2.254 | inter- Pilul. febrif. D Schöff. | 2.285 |
| Pulv. febr.                 | 2.270 | mit- Tinct. ♀.                  | 3.387 |
| oxyfach. vomit.             | 2.291 | tent. sublim. dulc. Talc.       | 3.407 |
| ꝯ. præcipit.                | 3.399 | Flor. ꝯ ij regul. ♂             |       |
| Febr. Fol. acetos.          | 4.7   | ac. ♀. imprægnat.               | 3.432 |
| contin. acetosell.          | 4.7   | ex reg. ꝯ ij.                   | 3.439 |
| anserin.                    | 4.17  | extr. marcasit.                 | 3.457 |
| cichor.                     | 4.46  | Nitr. Θ lat.                    | 3.474 |
| endiviæ.                    | 4.64  | coagul. Θ li.                   | 3.485 |
| geran.                      | 4.76  | Febr. Fol. acetos.              | 4.7   |
| fedi.                       | 4.156 | malign. scordii.                | 4.153 |
| Flor. nymph.                |       | Sem. napi.                      | 4.103 |
| Rad. cichor.                | 4.46  | Resin. camphor.                 | 4.190 |
| Fruct. Ceras acid.          | 4.41  | Min. Terr. sigill.              | 3.318 |
| granat.                     | 4.77  | & Lap. Saphirus.                | 3.330 |
|                             |       | c                               | Sina- |

4.46  
4.75  
4.14  
4.78  
4.84  
4.86  
4.88  
4.90  
4.92  
4.94  
4.96  
4.98  
5.00  
5.02  
5.04  
5.06  
5.08  
5.10  
5.12  
5.14  
5.16  
5.18  
5.20  
5.22  
5.24  
5.26  
5.28  
5.30  
5.32  
5.34  
5.36  
5.38  
5.40  
5.42  
5.44  
5.46  
5.48  
5.50  
5.52  
5.54  
5.56  
5.58  
5.60  
5.62  
5.64  
5.66  
5.68  
5.70  
5.72  
5.74  
5.76  
5.78  
5.80  
5.82  
5.84  
5.86  
5.88  
5.90  
5.92  
5.94  
5.96  
5.98  
6.00  
6.02  
6.04  
6.06  
6.08  
6.10  
6.12  
6.14  
6.16  
6.18  
6.20  
6.22  
6.24  
6.26  
6.28  
6.30  
6.32  
6.34  
6.36  
6.38  
6.40  
6.42  
6.44  
6.46  
6.48  
6.50  
6.52  
6.54  
6.56  
6.58  
6.60  
6.62  
6.64  
6.66  
6.68  
6.70  
6.72  
6.74  
6.76  
6.78  
6.80  
6.82  
6.84  
6.86  
6.88  
6.90  
6.92  
6.94  
6.96  
6.98  
7.00  
7.02  
7.04  
7.06  
7.08  
7.10  
7.12  
7.14  
7.16  
7.18  
7.20  
7.22  
7.24  
7.26  
7.28  
7.30  
7.32  
7.34  
7.36  
7.38  
7.40  
7.42  
7.44  
7.46  
7.48  
7.50  
7.52  
7.54  
7.56  
7.58  
7.60  
7.62  
7.64  
7.66  
7.68  
7.70  
7.72  
7.74  
7.76  
7.78  
7.80  
7.82  
7.84  
7.86  
7.88  
7.90  
7.92  
7.94  
7.96  
7.98  
8.00  
8.02  
8.04  
8.06  
8.08  
8.10  
8.12  
8.14  
8.16  
8.18  
8.20  
8.22  
8.24  
8.26  
8.28  
8.30  
8.32  
8.34  
8.36  
8.38  
8.40  
8.42  
8.44  
8.46  
8.48  
8.50  
8.52  
8.54  
8.56  
8.58  
8.60  
8.62  
8.64  
8.66  
8.68  
8.70  
8.72  
8.74  
8.76  
8.78  
8.80  
8.82  
8.84  
8.86  
8.88  
8.90  
8.92  
8.94  
8.96  
8.98  
9.00  
9.02  
9.04  
9.06  
9.08  
9.10  
9.12  
9.14  
9.16  
9.18  
9.20  
9.22  
9.24  
9.26  
9.28  
9.30  
9.32  
9.34  
9.36  
9.38  
9.40  
9.42  
9.44  
9.46  
9.48  
9.50  
9.52  
9.54  
9.56  
9.58  
9.60  
9.62  
9.64  
9.66  
9.68  
9.70  
9.72  
9.74  
9.76  
9.78  
9.80  
9.82  
9.84  
9.86  
9.88  
9.90  
9.92  
9.94  
9.96  
9.98  
10.00  
10.02  
10.04  
10.06  
10.08  
10.10  
10.12  
10.14  
10.16  
10.18  
10.20  
10.22  
10.24  
10.26  
10.28  
10.30  
10.32  
10.34  
10.36  
10.38  
10.40  
10.42  
10.44  
10.46  
10.48  
10.50  
10.52  
10.54  
10.56  
10.58  
10.60  
10.62  
10.64  
10.66  
10.68  
10.70  
10.72  
10.74  
10.76  
10.78  
10.80  
10.82  
10.84  
10.86  
10.88  
10.90  
10.92  
10.94  
10.96  
10.98  
11.00  
11.02  
11.04  
11.06  
11.08  
11.10  
11.12  
11.14  
11.16  
11.18  
11.20  
11.22  
11.24  
11.26  
11.28  
11.30  
11.32  
11.34  
11.36  
11.38  
11.40  
11.42  
11.44  
11.46  
11.48  
11.50  
11.52  
11.54  
11.56  
11.58  
12.00  
12.02  
12.04  
12.06  
12.08  
12.10  
12.12  
12.14  
12.16  
12.18  
12.20  
12.22  
12.24  
12.26  
12.28  
12.30  
12.32  
12.34  
12.36  
12.38  
12.40  
12.42  
12.44  
12.46  
12.48  
12.50  
12.52  
12.54  
12.56  
12.58  
13.00  
13.02  
13.04  
13.06  
13.08  
13.10  
13.12  
13.14  
13.16  
13.18  
13.20  
13.22  
13.24  
13.26  
13.28  
13.30  
13.32  
13.34  
13.36  
13.38  
13.40  
13.42  
13.44  
13.46  
13.48  
13.50  
13.52  
13.54  
13.56  
13.58  
14.00  
14.02  
14.04  
14.06  
14.08  
14.10  
14.12  
14.14  
14.16  
14.18  
14.20  
14.22  
14.24  
14.26  
14.28  
14.30  
14.32  
14.34  
14.36  
14.38  
14.40  
14.42  
14.44  
14.46  
14.48  
14.50  
14.52  
14.54  
14.56  
14.58  
15.00  
15.02  
15.04  
15.06  
15.08  
15.10  
15.12  
15.14  
15.16  
15.18  
15.20  
15.22  
15.24  
15.26  
15.28  
15.30  
15.32  
15.34  
15.36  
15.38  
15.40  
15.42  
15.44  
15.46  
15.48  
15.50  
15.52  
15.54  
15.56  
15.58  
16.00  
16.02  
16.04  
16.06  
16.08  
16.10  
16.12  
16.14  
16.16  
16.18  
16.20  
16.22  
16.24  
16.26  
16.28  
16.30  
16.32  
16.34  
16.36  
16.38  
16.40  
16.42  
16.44  
16.46  
16.48  
16.50  
16.52  
16.54  
16.56  
16.58  
17.00  
17.02  
17.04  
17.06  
17.08  
17.10  
17.12  
17.14  
17.16  
17.18  
17.20  
17.22  
17.24  
17.26  
17.28  
17.30  
17.32  
17.34  
17.36  
17.38  
17.40  
17.42  
17.44  
17.46  
17.48  
17.50  
17.52  
17.54  
17.56  
17.58  
18.00  
18.02  
18.04  
18.06  
18.08  
18.10  
18.12  
18.14  
18.16  
18.18  
18.20  
18.22  
18.24  
18.26  
18.28  
18.30  
18.32  
18.34  
18.36  
18.38  
18.40  
18.42  
18.44  
18.46  
18.48  
18.50  
18.52  
18.54  
18.56  
18.58  
19.00  
19.02  
19.04  
19.06  
19.08  
19.10  
19.12  
19.14  
19.16  
19.18  
19.20  
19.22  
19.24  
19.26  
19.28  
19.30  
19.32  
19.34  
19.36  
19.38  
19.40  
19.42  
19.44  
19.46  
19.48  
19.50  
19.52  
19.54  
19.56  
19.58  
20.00  
20.02  
20.04  
20.06  
20.08  
20.10  
20.12  
20.14  
20.16  
20.18  
20.20  
20.22  
20.24  
20.26  
20.28  
20.30  
20.32  
20.34  
20.36  
20.38  
20.40  
20.42  
20.44  
20.46  
20.48  
20.50  
20.52  
20.54  
20.56  
20.58  
21.00  
21.02  
21.04  
21.06  
21.08  
21.10  
21.12  
21.14  
21.16  
21.18  
21.20  
21.22  
21.24  
21.26  
21.28  
21.30  
21.32  
21.34  
21.36  
21.38  
21.40  
21.42  
21.44  
21.46  
21.48  
21.50  
21.52  
21.54  
21.56  
21.58  
22.00  
22.02  
22.04  
22.06  
22.08  
22.10  
22.12  
22.14  
22.16  
22.18  
22.20  
22.22  
22.24  
22.26  
22.28  
22.30  
22.32  
22.34  
22.36  
22.38  
22.40  
22.42  
22.44  
22.46  
22.48  
22.50  
22.52  
22.54  
22.56  
22.58  
23.00  
23.02  
23.04  
23.06  
23.08  
23.10  
23.12  
23.14  
23.16  
23.18  
23.20  
23.22  
23.24  
23.26  
23.28  
23.30  
23.32  
23.34  
23.36  
23.38  
23.40  
23.42  
23.44  
23.46  
23.48  
23.50  
23.52  
23.54  
23.56  
23.58  
24.00  
24.02  
24.04  
24.06  
24.08  
24.10  
24.12  
24.14  
24.16  
24.18  
24.20  
24.22  
24.24  
24.26  
24.28  
24.30  
24.32  
24.34  
24.36  
24.38  
24.40  
24.42  
24.44  
24.46  
24.48  
24.50  
24.52  
24.54  
24.56  
24.58  
25.00  
25.02  
25.04  
25.06  
25.08  
25.10  
25.12  
25.14  
25.16  
25.18  
25.20  
25.22  
25.24  
25.26  
25.28  
25.30  
25.32  
25.34  
25.36  
25.38  
25.40  
25.42  
25.44  
25.46  
25.48  
25.50  
25.52  
25.54  
25.56  
25.58  
26.00  
26.02  
26.04  
26.06  
26.08  
26.10  
26.12  
26.14  
26.16  
26.18  
26.20  
26.22  
26.24  
26.26  
26.28  
26.30  
26.32  
26.34  
26.36  
26.38  
26.40  
26.42  
26.44  
26.46  
26.48  
26.50  
26.52  
26.54  
26.56  
26.58  
27.00  
27.02  
27.04  
27.06  
27.08  
27.10  
27.12  
27.14  
27.16  
27.18  
27.20  
27.22  
27.24  
27.26  
27.28  
27.30  
27.32  
27.34  
27.36  
27.38  
27.40  
27.42  
27.44  
27.46  
27.48  
27.50  
27.52  
27.54  
27.56  
27.58  
28.00  
28.02  
28.04  
28.06  
28.08  
28.10  
28.12  
28.14  
28.16  
28.18  
28.20  
28.22  
28.24  
28.26  
28.28  
28.30  
28.32  
28.34  
28.36  
28.38  
28.40  
28.42  
28.44  
28.46  
28.48  
28.50  
28.52  
28.54  
28.56  
28.58  
29.00  
29.02  
29.04  
29.06  
29.08  
29.10  
29.12  
29.14  
29.16  
29.18  
29.20  
29.22  
29.24  
29.26  
29.28  
29.30  
29.32  
29.34  
29.36  
29.38  
29.40  
29.42  
29.44  
29.46  
29.48  
29.50  
29.52  
29.54  
29.56  
29.58  
30.00  
30.02  
30.04  
30.06  
30.08  
30.10  
30.12  
30.14  
30.16  
30.18  
30.20  
30.22  
30.24  
30.26  
30.28  
30.30  
30.32  
30.34  
30.36  
30.38  
30.40  
30.42  
30.44  
30.46  
30.48  
30.50  
30.52  
30.54  
30.56  
30.58  
31.00  
31.02  
31.04  
31.06  
31.08  
31.10  
31.12  
31.14  
31.16  
31.18  
31.20  
31.22  
31.24  
31.26  
31.28  
31.30  
31.32  
31.34  
31.36  
31.38  
31.40  
31.42  
31.44  
31.46  
31.48  
31.50  
31.52  
31.54  
31.56  
31.58  
32.00  
32.02  
32.04  
32.06  
32.08  
32.10  
32.12  
32.14  
32.16  
32.18  
32.20  
32.22  
32.24  
32.26  
32.28  
32.30  
32.32  
32.34  
32.36  
32.38  
32.40  
32.42  
32.44  
32.46  
32.48  
32.50  
32.52  
32.54  
32.56  
32.58  
33.00  
33.02  
33.04  
33.06  
33.08  
33.10  
33.12  
33.14  
33.16  
33.18  
33.20  
33.22  
33.24  
33.26  
33.28  
33.30  
33.32  
33.34  
33.36  
33.38  
33.40  
33.42  
33.44  
33.46  
33.48  
33.50  
33.52  
33.54  
33.56  
33.58  
34.00  
34.02  
34.04  
34.06  
34.08  
34.10  
34.12  
34.14  
34.16  
34.18  
34.20  
34.22  
34.24  
34.26  
34.28  
34.30  
34.32  
34.34  
34.36  
34.38  
34.40  
34.42  
34.44  
34.46  
34.48  
34.50  
34.52  
34.54  
34.56  
34.58  
35.00  
35.02  
35.04  
35.06  
35.08  
35.10  
35.12  
35.14  
35.16  
35.18  
35.20  
35.22  
35.24  
35.26  
35.28  
35.30  
35.32  
35.34  
35.36  
35.38  
35.40  
35.42  
35.44  
35.46  
35.48  
35.50  
35.52  
35.54  
35.56  
35.58  
36.00  
36.02  
36.04  
36.06  
36.08  
36.10  
36.12  
36.14  
36.16  
36.18  
36.20  
36.22  
36.24  
36.26  
36.28  
36.30  
36.32  
36.34  
36.36  
36.38  
36.40  
36.42  
36.44  
36.46  
36.48  
36.50  
36.52  
36.54  
36.56  
36.58  
37.00  
37.02  
37.04  
37.06  
37.08  
37.10  
37.12  
37.14  
37.16  
37.18  
37.20  
37.22  
37.24  
37.26  
37.28  
37.30  
37.32  
37.34  
37.36  
37.38  
37.40  
37.42  
37.44  
37.46  
37.48  
37.50  
37.52  
37.54  
37.56  
37.58  
38.00  
38.02  
38.04  
38.06  
38.08  
38.10  
38.12  
38.14  
38.16  
38.18  
38.20  
38.22  
38.24  
38.26  
38.28  
38.30  
38.32  
38.34  
38.36  
38.38  
38.40  
38.42  
38.44  
38.46  
38.48  
38.50  
38.52  
38.54  
38.56  
38.58  
39.00  
39.02  
39.04  
39.06  
39.08  
39.10  
39.12  
39.14  
39.16  
39.18  
39.20  
39.22  
39.24  
39.26  
39.28  
39.30  
39.32  
39.34  
39.36  
39.38  
39.40  
39.42  
39.44  
39.46  
39.48  
39.50  
39.52  
39.54  
39.56  
39.58  
40.00  
40.02  
40.04  
40.06  
40.08  
40.10  
40.12  
40.14  
40.16  
40.18  
40.20  
40.22  
40.24  
40.26  
40.28  
40.30  
40.32  
40.34  
40.36  
40.38  
40.40  
40.42  
40.44  
40.46  
40.48  
40.50  
40.52  
40.54  
40.56  
40.58  
41.00  
41.02  
41.04  
41.06  
41.08  
41.10  
41.12  
41.14  
41.16  
41.18  
41.20  
41.22  
41.24  
41.26  
41.28  
41.30  
41.32  
41.34  
41.36  
41.38  
41.40  
41.42  
41.44  
41.46  
41.48  
41.50  
41.52  
41.54  
41.56  
41.58  
42.00  
42.02  
42.04  
42.06  
42.08  
42.10  
42.12  
42.14  
42.16  
42.18  
42.20  
42.22  
42.24  
42.26  
42.28  
42.30  
42.32  
42.34  
42.36  
42.38  
42.40  
42.42  
42.44  
42.46  
42.48  
42.50  
42.52  
42.54  
42.56  
42.58  
43.00  
43.02  
43.04  
43.06  
43.08  
43.10  
43.12  
43.14  
43.16  
43.18  
43.20  
43.22  
43.24  
43.26  
43.28  
43.30  
43.32  
43.34  
43.36  
43.38  
43.40  
43.42  
43.44  
43.46  
43.48  
43.50  
43.52  
43.54  
43.56  
43.58  
44.00  
44.02  
44.04  
44.06  
44.08  
44.10  
44.12  
44.14  
44.16  
44.18  
44.20  
44.22  
44.24  
44.26  
44.28  
44.30  
44.32  
44.34  
44.36  
44.38  
44.40  
44.42  
44.44  
44.46  
44.48  
44.50  
44.52  
44.54  
44.56  
44.58  
45.00  
45.02  
45.04  
45.06  
45.08  
45.10  
45.12  
45.14  
45.16  
45.18  
45.20  
45.22  
45.24  
45.26  
45.28  
45.30  
45.32  
45.34  
45.36  
45.38  
45.40  
45.42  
45.44  
45.46  
45.48  
45.50  
45.52  
45.54  
45.56  
45.58  
46.00  
46.02  
46.04  
46.06  
46.08  
46.10  
46.12  
46.14  
46.16  
46.18  
46.20  
46.22  
46.24  
46.26  
46.28  
46.30  
46.32  
46.34  
46.36  
46.38  
46.40  
46.42  
46.44  
46.46  
46.48  
46.50  
46.52  
46.54  
46.56  
46.58  
47.00  
47.02  
47.04  
47.06  
47.08  
47.10  
47.12  
47.14  
47.16  
47.18  
47.20  
47.22  
47.24  
47.26  
47.28  
47.30  
47.32  
47.34  
47.36  
47.38  
47.40  
47.42  
47.44  
47.46  
47.48  
47.50  
47.52  
47.54  
47.56  
47.58  
48.00  
48.02  
48.04  
48.06  
48.08  
48.10  
48.12  
48.14  
48.16  
48.18  
48.20  
48.22  
48.24  
48.26  
48.28  
48.30  
48.32  
48.34  
48.36  
48.38  
48.40  
48.42  
48.44  
48.46  
48.48  
48.50  
48.52  
48.54  
48.56  
48.58  
49.00  
49.02  
49.04  
49.06  
49.08  
49.10  
49.12  
49.14  
49.16  
49.18  
49.20  
49.22  
49.24  
49.26  
49.28  
49.30  
49.32  
49.34  
49.36  
49.38  
49.40  
49.42  
49.44  
49.46  
49.48  
49.50  
49.52  
49.54  
49.56  
49.58  
50.00  
50.02  
50.04  
50.06  
50.08  
50.10  
50.12  
50.14  
50.16  
50.18  
50.20  
50.22  
50.24  
50.26  
50.28  
50.30  
50.32  
50.34  
50.36  
50.38  
50.40  
50.42  
50.44  
50.46  
50.48  
50.50  
50.52  
50.54  
50.56  
50.58  
51.00  
51.02  
51.04  
51.06  
51.08  
51.10  
51.12  
51.14  
51.16  
51.18  
51.20  
51.22  
51.24  
51.26  
51.28  
51.30  
51.32  
51.34  
51.36  
51.38  
51.40  
51.42  
51.44  
51.46  
51.48  
51.50  
51.52  
51.54  
51.56  
51.58  
52.00  
52.02  
52.04  
52

# INDEX MORBORUM

|                       |       |                            |       |
|-----------------------|-------|----------------------------|-------|
| Smaragdus.            | 3.331 | scarab.                    | 5.345 |
| corall.               | 3.333 | Min. Lap. lazul.           | 3.352 |
| Sp. sulph.            | 3.501 | & Lap. ophites.            | 3.355 |
| Ol. Terr.             | 3.319 | Sal ammoniac.              | 3.480 |
| ♂. diaphor.           | 3.427 | Pil. de Ammoniac. querc.   | 2.243 |
| Extr. Bezoar. quera.  | 2.213 | de Euphorb. querc.         | 2.254 |
| Potio sudor f.        | 2.261 | febr. ad quartan. fennert. | 2.254 |
| oxyfach. vomitio.     | 2.295 | gummos S. Cloff.           | 2.255 |
| ⊙ potab. compos.      | 3.369 | desagapen. querc.          | 2.258 |
| Spir. ♀ ni sudor.     | 3.391 | Sp. Tart. querc.           | 2.259 |
| Nitrum Antimon. alb.  | 3.423 | Pulv. stomach. querc.      | 2.272 |
| acerum ♂ ij.          | 3.435 | Tinct. ♂ i.                | 3.362 |
| antid. bysipyretos.   | 3.449 | ♀. salar.                  | 3.403 |
| cryst. ⊕ comm. dulc.  | 3.468 | Hereul. Bovii.             | 3.404 |
| Spir. Nitri           | 3.476 | Flor. ♂ ij regul.          | 3.433 |
| Sal. ⊕ li             | 3.494 | Ol. ♂ ij sach.             | 3.435 |
| Febr. Fol. card. ben. | 4.37  | butyr. ♂ ij.               | 3.438 |
| quartan. ros. fol.    | 4.141 | — ex reg ♂ ij.             | 3.439 |
| scelopendr.           | 4.152 | Elix. ⊕ ♂ ij.              | 3.449 |
| Rad. pyrethri.        | 4.134 | Febr. Rad. valer.          | 4.170 |
| asari.                | 4.231 | quo- Sem. milii fol.       | 4.104 |
| elleb.                | 4.236 | tidian. nigell.            | 4.113 |
| Sem. nigell.          | 4.113 | sinapi.                    | 4.159 |
| sinapi.               | 4.159 | Anim. asini sang.          | 5.267 |
| Lign. colubrin.       | 4.50  | caprin fel.                | 5.276 |
| Resin. myrrh.         | 4.200 | Mercur. argent.            | 3.408 |
| Anim. hom. capill.    | 5.387 | Febr. Fol. polygon.        | 4.128 |
| Lep. cor.             | 5.300 | Tertian. verben.           | 4.171 |
| suum off.             | 5.308 | Rad. asar.                 | 4.231 |
| viperæ sal.           | 5.310 | Lign. colubrin.            | 4.50  |
| urfi. ocul.           | 5.312 | Lap. ophites.              | 3.355 |
| hirund. cor.          | 5.320 | Butyr. ♂ ij.               | 3.438 |
| conchar. caro.        | 5.328 | Elix. ⊕ ♂ ij.              | 3.449 |
| ranar. hepar.         | 5.332 | Cryst. ♂ ij.               | 3.454 |
| ranar. fel.           | 5.332 | Flor. ⊕ Nitri.             | 3.475 |
| araneæ.               | 5.338 | Crist. alum.               | 3.479 |
| cimex.                | 5.341 | decoct. milii.             | 4.104 |
| locust.               | 5.343 | Ol.                        |       |



# ET REMEDIORUM.

|                             |       |                     |       |
|-----------------------------|-------|---------------------|-------|
| Ol. piper.                  | 4.126 | Anim. asin. ungul.  | 5.269 |
| Fistul. Rad. fumar. bulb.   | 4.73  | Eq. sterc.          | 5.285 |
| Anim. hom. sterc.           | 5.291 | ungul.              | 5.286 |
| fang.                       | 5.292 | Ol. guajac.         | 4.78  |
| ovis lana.                  | 5.304 | Quint. essent. vin. | 4.226 |
| talpæ cinis.                | 5.306 | Frige. Fol. acac.   | 4.6   |
| gru. cap. ocul. & ventr.    | 5.320 | da sunt. acetos.    | 4.7   |
| Empl. mundif.               | 2.197 | alsin.              | 4.12  |
| Ol. hyperic. comp.          | 2.246 | anserin.            | 4.17  |
| ℞. in — Oli sol.            | 3.407 | burf. pastor.       | 4.31  |
| Liquor. ℞ ij præcip.        | 3.417 | chelidon. min.      | 4.44  |
| Liquor. ex scor. reg. ℞ ij. | 3.441 | cichor.             | 4.46  |
| Lichargyr. thereb.          | 3.460 | cicur.              | 4.47  |
| — . — . compos.             | 3.466 | endiv.              | 4.64  |
| ℞. — anodyn.                | 3.500 | equiset.            | 4.65  |
| Fla- Fol. tanacet.          | 4.165 | fabar.              | 4.69  |
| rus. Rad. spic. celt.       | 4.161 | fragar.             | 4.72  |
| indic.                      | 4.161 | hyoscyami.          | 4.82  |
| Sem. petr.                  | 4.122 | lactuc.             | 4.89  |
| mont.                       | 4.123 | lent. pallustr.     | 4.91  |
| sesel.                      | 4.157 | ligustri.           | 4.93  |
| Resin. Tacamahac.           | 4.217 | numular.            | 4.114 |
| Fœ- Fol. anagall. Aq.       | 4.15  | nymphæ.             | 4.114 |
| tum artemis.                | 4.20  | Oleæ.               | 4.115 |
| mort. calamenth.            | 4.33  | parietar.           | 4.119 |
| expell. levist.             | 4.92  | paris.              | 4.119 |
| nast. hort.                 | 4.110 | pinastr.            | 4.125 |
| nepet.                      | 4.110 | plantag.            | 4.127 |
| Sabin.                      | 4.144 | polygan.            | 4.128 |
| Flor. spic.                 | 4.160 | pulmonar.           | 4.124 |
| Rad. angel.                 | 4.16  | pyrolæ.             | 4.134 |
| cyclam.                     | 4.59  | pyr.                | 4.134 |
| levist.                     | 4.92  | querc.              | 4.135 |
| bryon.                      | 4.231 | rhuis.              | 4.138 |
| Sem. levist.                | 4.92  | rut. mur.           | 4.144 |
| nast. hort.                 | 4.110 | falic.              | 4.145 |
| Lachr. bdellii.             | 4.110 | sanguisorb.         | 4.147 |
|                             |       | Scolopendr.         | 4.152 |
|                             |       | e 2                 | ledi  |

# INDEX MORBORUM

|                |       |                    |       |
|----------------|-------|--------------------|-------|
| fedi.          | 4.156 | nymph.             | 4.114 |
| feneccion.     | 4.156 | papav. sat.        | 4.117 |
| folan.         | 4.159 | rhuis.             | 4.138 |
| spinach.       | 4.162 | Fruct. alkekengi.  | 4.11  |
| Taraxac.       | 4.166 | berber.            | 4.27  |
| vincetox.      | 4.173 | ceras. acid.       | 4.41  |
| violar.        | 4.174 | corn.              | 4.52  |
| ulmar.         | 4.177 | cydon.             | 4.61  |
| Flor. acac.    | 4.6   | fabar.             | 4.68  |
| amaranth.      | 4.13  | fragar.            | 4.71  |
| cichor.        | 4.46  | melon.             | 4.101 |
| cyani.         | 4.48  | mespil.            | 4.103 |
| cynogloss.     | 4.59  | mor.               | 4.106 |
| ligustri.      | 4.93  | bacc. myrt.        | 4.109 |
| nymphææ.       | 4.114 | paris.             | 4.119 |
| papav. err.    | 4.118 | pom. acid.         | 4.129 |
| violar.        | 4.174 | prun.              | 4.132 |
| Rad. bistort.  | 4.29  | rhib.              | 4.139 |
| chelidon. min. | 4.44  | rub.               | 4.142 |
| cichor.        | 4.46  | forb.              | 4.160 |
| cicutæ.        | 4.47  | tamarind.          | 4.251 |
| graminis.      | 4.77  | Musc. corall.      | 51    |
| hyoscyami.     | 4.82  | lichen.            | 4.92  |
| nymphææ.       | 4.414 | pulmon.            | 4.133 |
| taraxac.       | 4.165 | terrest.           | 4.108 |
| Cort. acac.    | 4.6   | Lign. fantal.      | 4.148 |
| mandrag.       | 4.98  | Lachr. sang. drac. | 4.114 |
| pinast.        | 4.125 | Gumm. Tragac.      | 4.224 |
| citru.         | 4.48  | Succ. hypocist.    | 4.196 |
| Sem. cucum.    | 4.56  | omphac.            | 4.201 |
| cucurb.        | 4.56  | Anim. Coch.        | 5.284 |
| cydon.         | 4.61  | ebur.              | 5.285 |
| endiv.         | 4.64  | hom. lac.          | 5.287 |
| hord.          | 4.82  | ovis sterc.        | 5.304 |
| hyosciam.      | 4.82  | suill ping.        | 5.307 |
| lactuc.        | 4.89  | gall. ov. alb.     | 5.319 |
| melon.         | 4.101 | cancer.            | 5.325 |
| milii.         | 4.108 | cancror. ocul.     | 5.326 |
|                |       | ranar.             |       |



# ET REMEDIORUM.

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| ranar. sperm.           | 5.332 |
| Furfu-Fol. nast.        | 4.110 |
| res cu-Anim. can. urin. | 5.274 |
| rant. hom. urin.        | 5.288 |
| mur. sterc.             | 5.303 |

**G** An-

|                  |       |
|------------------|-------|
| græ- Fol. urtic. | 4.178 |
| na. Sem. urtic.  | 4.178 |
| Resin. myrrh.    | 4.200 |
| Anim. hom. urin. | 5.288 |
| halec. muria.    | 5.329 |
| ranar. cinis.    | 5.332 |
| sal.             | 5.332 |
| Sal. ammion.     | 3.480 |
| ol. ſij mellit.  | 3.437 |
| camphor.         | 4.191 |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Gin- Fol. anserin. | 4.17  |
| giv. aur. mur.     | 4.24  |
| putred. chelidon.  | 4.44  |
| cochlear.          | 4.49  |
| ligustr.           | 4.39  |
| prunell.           | 4.131 |
| quinquefol.        | 4.135 |
| vermic.            | 4.172 |
| vinc.              | 4.173 |
| virg. aur.         | 4.176 |

|                |       |
|----------------|-------|
| Flor. balaust. | 4.77  |
| ligustr.       | 4.93  |
| malv. arbor.   | 4.98  |
| prunell.       | 4.131 |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Sem. aquileg.      | 4.19  |
| Rad. asparag.      | 4.22  |
| fumar. bulb.       | 4.73  |
| Fruet. granat.     | 4.77  |
| Musc. usn.         | 4.108 |
| Lachr. sang. drac. | 4.115 |
| Gumm. Laccæ.       |       |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Anim. asin. lac.        | 5.269     |
| sepiæ os.               | 5.333     |
| Alumen.                 | 3.478     |
| Diaclysmad gingiv.      | 2.224.225 |
| Go- Fol. cynogloss.     | 4.5       |
| nor- millefol.          | 4.104     |
| rhæa. plantag.          | 4.127     |
| querc.                  | 4.135     |
| Rad. nymph.             | 4.114     |
| Sem. agnicast.          | 4.110     |
| cannabis.               | 4.34      |
| lactuc.                 | 4.89      |
| Fruet. granat.          | 4.77      |
| Musc. lichen.           | 4.92      |
| Resin. Tereb.           | 4.210     |
| laric.                  | 4.210     |
| Anim. sepiæ os.         | 5.333     |
| Min. Corall.            | 3.333     |
| & Lap. unicorn. foss.   | 3.360     |
| chalybs.                | 3.378     |
| Mercur.                 | 3.398     |
| succin.                 | 3.511     |
| Tinct. ex scoris cærul. | 3.382     |
| Mercur. præcip. virid.  | 3.405     |
| Gra- Resin. styr. cal.  | 4.216     |
| vedo. Aq. Epilept.      | 2.138     |

H.

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>H</b> Æmorrhagia. |       |
| Fol. auric. mur.     | 4.24  |
| burf. pastor.        | 4.32  |
| equiset.             | 4.66  |
| gallii.              | 4.74  |
| hispidul.            | 4.81  |
| millefol.            | 4.104 |
| polygon.             | 4.128 |
| quinquefol.          | 4.135 |
| salic.               | 4.145 |
| sanguisorb.          | 4.47  |

e 3

vincæ.

# INDEX MORBORUM

|                      |       |                         |       |
|----------------------|-------|-------------------------|-------|
| vinca.               | 4.173 | rubrica.                | 3.320 |
| vitis.               | 4.175 | saphirus.               | 3.330 |
| Flor. balauft.       | 4.77  | sardiuslap.             | 3.331 |
| papav. err.          | 4.215 | smaragdus.              | 3.331 |
| Rad. bistorta.       | 4.29  | Hamatites.              | 3.351 |
| Cort. granat.        | 4.77  | Magues.                 | 3.355 |
| Sem. nigell.         | 4.113 | Unicorn. foss.          | 3.360 |
| chil.                | 4.167 | Anacollemma frontal.    | 2.266 |
| urtic.               | 4.178 | Pulv. spern. comp.      | 2.272 |
| Fruct. rub.          | 4.142 | Epithem. epat.          | 2.205 |
| Fung. querc.         | 4.135 | Laudan. op.             | 4.204 |
| Musc. Lichen.        | 4.92  | Hæ- Fol. anserin.       | 4.17  |
| usneæ.               | 4.108 | mor- chamædr.           | 4.42  |
| pulm. arbor.         | 4.133 | rhoides. chelidon. min. | 4.44  |
| Lachr. sang. dracon. | 4.114 | philipend.              | 4.69  |
| sarcocoll.           | 4.215 | lagopi.                 | 4.90  |
| Anim. Apri sterc.    | 5.268 | linar.                  | 4.95  |
| asini sterc.         | 5.269 | loti.                   | 4.96  |
| bovis sang.          | 5.270 | millefol.               | 4.104 |
| bufo.                | 5.272 | porti.                  | 4.130 |
| hircin. sebum.       | 5.275 | quinquefol.             | 4.135 |
| pellis.              | 5.276 | rhuis.                  | 4.138 |
| capri jecur.         | 5.279 | sanguisorb.             | 4.147 |
| cervi sanguis.       | 5.282 | scab.                   | 4.151 |
| cochleæ.             | 5.284 | verbasc.                | 4.171 |
| eq. sterc.           | 5.285 | vinc.                   | 4.173 |
| pili.                | 5.286 | Flor. loti.             | 4.96  |
| hom. capill.         | 5.287 | scabios.                | 4.151 |
| sanguis.             | 5.292 | verbasc.                | 4.171 |
| usnea.               | 5.298 | Rad. Cepæ.              | 4.40  |
| ovis lana.           | 5.304 | onon.                   | 4.116 |
| Lep. pili.           | 5.301 | porti.                  | 4.130 |
| gallin.              | 5.318 | verbasc.                | 4.171 |
| ranunc. sylv.        | 5.305 | Cort. granat.           | 4.77  |
| Ranar. clinis.       | 5.332 | Fruct. pom. momordic.   | 4.104 |
| sal.                 | 5.332 | Sem. Cydon.             | 4.61  |
| suum sterc.          | 5.345 | Fung. betulæ.           | 4.28  |
| Min. Bolus.          | 3.319 | Succ. aloes.            | 4.252 |
|                      |       | Anim.                   |       |



# ET REMEDIORUM.

|                         |       |                     |       |
|-------------------------|-------|---------------------|-------|
| Anim. cygni adeps.      | 5.322 | ebuli.              | 4.64  |
| anguill. ping.          | 5.325 | epat. Nob.          | 4.65  |
| Lucii mand.             | 5.330 | Fabar.              | 4.69  |
| ranar. sperm.           | 5.332 | herniar.            | 4.81  |
| scarrabæi.              | 5.346 | hispidul.           | 4.81  |
| Min. saphirus.          | 3.330 | lagopi.             | 4.90  |
| unicorn foss.           | 3.360 | millefol.           | 4.105 |
| Bals. balsam.           | 2.302 | numul.              | 4.114 |
| Sal fach. ♂.            | 3.382 | perfol.             | 4.211 |
| Ol. nucl. persic.       | 4.121 | quinquefol.         | 4.135 |
| He- Fol. alfin.         | 4.12  | rut. mur.           | 4.144 |
| Etica. portulac.        | 4.130 | sanic.              | 4.148 |
| Rad. levistic.          | 4.92  | siderit.            | 4.158 |
| Fruct. amygd. dulc.     | 4.14  | symphyt.            | 4.163 |
| pin.                    | 4.126 | Flor. balauft.      | 4.77  |
| pistac.                 | 4.126 | Rad. ari.           | 4.21  |
| Musc. Lichen.           | 4.92  | onon.               | 4.116 |
| Anim. Apr. sang.        | 5.268 | rhapont.            | 4.138 |
| asin. urin.             | 5.269 | symph.              | 4.163 |
| caprin. lac.            | 5.275 | valer.              | 4.170 |
| Gallin. decoct.         | 5.318 | Sem. perfoliat.     | 4.121 |
| testud. sang.           | 5.333 | Fruct. pom. momord. | 4.105 |
| pedic.                  | 5.345 | Lachr. bdellii.     | 4.187 |
| Aq. antihect.           | 2.342 | Anim. cochleæ.      | 5.284 |
| magnanim.               |       | Echin. jecur.       | 5.286 |
| Morsul. pect.           | 2.236 | Talp. cor.          | 5.308 |
| Syr. antihect. Riverii. | 2.292 | Lacert.             | 5.343 |
| de pede cat.            | 2.294 | Empl. ad Hern.      | 2.196 |
| testudin.               | 2.294 | ⚥. ♂. dulc.         | 3.467 |
| Hemi- Fol. rut.         | 4.143 | Bals. ♂. Gemm.      | 3.471 |
| crania. Rad. pyrethri.  | 4.134 | Ol. lot.            | 4.96  |
| Fruct. colocynth.       | 4.234 | Hy- Fol. betulæ.    | 4.28  |
| Anim. Columb. fim.      | 5.316 | drops. card. mariæ. | 4.37  |
| Vultur. caro.           | 5.324 | chamædr.            | 4.42  |
| Pil. Iliac. Rhaf.       | 2.256 | linar.              | 4.95  |
| Pulv. stom. querc.      | 2.272 | loti.               | 4.96  |
| Her- Fol. auric. mur.   | 4.24  | puleg.              | 4.133 |
| nia. consolid.          | 4.51  | Tanacet.            | 4.165 |
|                         |       | gratiol.            |       |

# INDEX MORBORUM

|                      |       |                              |       |
|----------------------|-------|------------------------------|-------|
| gratiol.             | 4.241 | sterc.                       | 5.291 |
| soldanell.           | 4.249 | Lup.epar.                    | 5.301 |
| Flor. Cyani.         | 4.58  | Anser. sterc.                | 5.315 |
| loti.                | 4.96  | halec. muria.                | 5.329 |
| matric.              | 4.99  | lumbric.terr.                | 5.344 |
| tanacet.             | 4.65  | Decoct. hepat.               | 2.176 |
| Rad. Chin.           | 4.45  | Elect. diaphor. Plat.        | 2.184 |
| costi.               | 4.54  | Ol. hyperic. comp.           | 2.246 |
| curcum.              | 4.58  | purgans comp.                | 2.249 |
| cyper.               | 4.61  | Pilul. de Euphorb. querc.    | 2.254 |
| gentian.             | 4.75  | guminos S. Cloff.            | 2.255 |
| ireos.               | 4.86  | hydrop. Buntii.              | 2.256 |
| rubiz.               | 4.142 | Tragea Epat. querc.          | 2.271 |
| sambuc.              | 4.146 | Sal. sachar. ♂.              | 3.382 |
| vincetox.            | 4.174 | ♀ præcip. præp. ♂ Sp. sulph. | 3.400 |
| asari.               | 4.231 |                              |       |
| bryon.               | 4.232 | ♀. ☉ lar.                    | 3.403 |
| Mechoac.             | 4.232 | Aurum vit.                   | 3.405 |
| turpeth.             | 4.250 | ♀. ☿ rubeus.                 | 3.408 |
| Cort. ebul.          | 4.235 | ♀. vit.                      | 3.410 |
| frang.               | 4.241 | Bezoard. ☉ Crollii.          | 3.413 |
| Sem. cumin.          | 4.57  | Vitr. antimonial.            | 3.423 |
| Fruct. spin. infect. | 4.249 | ♂. diaphor.                  | 3.427 |
| Lign. guajac.        | 4.77  | Sal Lunæ.                    | 3.377 |
| Gumm. Lacc.          | 4.196 | ♂. ☉ sach. sennert.          | 3.435 |
| sagapen.             | 4.114 | Tinct. ex vitr. ♂ ij.        | 3.445 |
| Gith.                | 4.256 | reg. ♂.                      | 3.447 |
| Bals. Tol.           | 4.185 | fi. ♂ ij.                    | 3.448 |
| Anim. Vaccin. sterc. | 5.270 | Elix. ☉ ♂ ij.                | 3.449 |
| bufon. pulv.         | 5.272 | Extr. marcas.                | 3.457 |
| sal. ex calcin. buf. | 5.272 | ☿ ☉ is.                      | 3.466 |
| bufon. ol.           | 5.273 | compos.                      | 3.466 |
| canin. sterc.        | 5.274 | dulc.                        | 3.467 |
| capr. sterc.         | 5.276 | Cryst. ☉. com. dulc.         | 3.468 |
| cochleæ.             | 5.284 | Extr. Sal.                   | 3.470 |
| Echin. axung.        | 5.286 | ▽. aperiens. Penot.          | 3.489 |
| hom. ungues.         | 5.287 | ☿. ☉ li diaphor.             | 3.490 |
| urin.                | 5.288 | Essent. Sp. sulph. ☉ li.     | 3.495 |
|                      |       | Magist.                      |       |



# ET REMEDIORUM.

|                                |           |                      |       |
|--------------------------------|-----------|----------------------|-------|
| Magist. Oli.                   | 3.496     | Tinct. Bi.           | 3.392 |
| Tinct. ebul.                   | 4.64      | — Oli phil.          | 3.489 |
| Farin. fabar.                  | 4.66      | Hu. Fol. alfin.      | 4.12  |
| Spir. Tart.                    | 4.220     | mecl. anagall.       | 4.15  |
| Tinct. Sp. Tart.               | 4.222     | atriplic.            | 4.22  |
| Hypochondriacum malum.         |           | basilic.             | 4.26  |
| Fol. chamædr.                  | 4.42      | borrag.              | 4.29  |
| chelidon. min.                 | 4.44      | bugloss.             | 4.30  |
| cochlear.                      | 4.49      | chelid. min.         | 4.44  |
| epyth.                         | 4.329     | fabar.               | 4.69  |
| Flor. borrag.                  | 4.30      | lent. palust.        | 4.91  |
| bugloss.                       | 4.31      | malv.                | 4.98  |
| lupul.                         | 4.96      | nymph.               | 4.114 |
| stzech.                        | 4.162     | pariet.              | 4.119 |
| Rad. Polypod.                  | 4.245     | Spinach.             | 4.161 |
| Cort. Cappar.                  | 4.34      | viol.                | 4.174 |
| Sem. sinapi.                   | 4.159     | Flor. borrag.        | 4.29  |
| Anim. hom. urin.               | 5.290     | lil. alb.            | 4.93  |
| Succ. ophac.                   | 4.201     | malv. arbor.         | 4.98  |
| Tartar.                        | 4.218     | nymph.               | 4.114 |
| Aq. splen. F.F.                | 2.149     | Rad. borrag.         | 4.29  |
| Elix. propriet.                | 2.189     | chelid. min.         | 4.44  |
| Pilul. Marocost. Mind.         | 2.256     | liquir.              | 4.76  |
| Spir. tartar.                  | 2.259.260 | satyriz.             | 4.150 |
| Tinct. chalyb.                 | 3.381     | scorzon.             | 4.158 |
| Magist. ♂.                     | 3.383     | Sem. basilic.        | 4.26  |
| Spir. hni sudor.               | 3.391     | cydon.               | 4.61  |
| Crocus metall.                 | 3.426     | papav. sat.          | 4.117 |
| ♂ ij diaphor.                  | 3.427     | sesami.              | 4.156 |
| Clyssus.                       | 3.440     | Fruct. berber.       | 4.27  |
| Tinct. ex vitro. ♂ ij.         | 3.445     | ficus.               | 4.69  |
| regi ♂.                        | 3.447     | fraga.               | 4.71  |
| Arcan. ♂ ij. Bas.              | 3.449     | melon.               | 4.101 |
| ▽. bened.                      | 3.453     | nucl. persic.        | 4.121 |
| Cryst. ♂ ij.                   | 3.454     | pistac.              | 4.126 |
| Tinct. Sp. tart.               | 4.222     | prun.                | 4.132 |
| Liquor. splen.                 | 4.223     | Sebesten.            | 4.154 |
| (pro sale communi sume nitrū.) |           | Resin. Liquid. ambr. | 4.198 |
|                                |           | f                    | Gumm  |

# INDEX MORBORUM

|                    |       |                         |       |
|--------------------|-------|-------------------------|-------|
| Gumm. Anim.        | 4.184 | rubia.                  | 4.142 |
| arabic.            | 4.184 | spic. indic.            | 4.161 |
| tragac.            | 4.224 | Tamar.                  | 4.164 |
| Anim. anat. adeps. | 5.314 | asar.                   | 4.231 |
| gall. ping.        | 5.318 | rhabarb.                | 4.246 |
| cancr.             | 5.325 | Cort. Tamar.            | 4.164 |
| I.                 |       | Sem. Canab.             | 4.34  |
| I Cte-             |       | napi.                   | 4.109 |
| Irus. Fol.         |       | petrosel.               | 4.122 |
| abrotan.           | 4.4   | valer.                  | 4.170 |
| aquileg.           | 4.19  | urtic.                  | 4.178 |
| card. mar.         | 4.37  | Fruct. alkekengi.       | 4.11  |
| chelidon. maj.     | 4.43  | Lign. tamar.            | 4.164 |
| min.               | 4.44  | Gumm. Laccæ.            | 4.196 |
| consolid.          | 4.51  | Musc. Lichen.           | 4.92  |
| cuscut.            | 4.58  | usp.                    | 4.108 |
| epat. stellat.     | 4.65  | Anim. asin. sang.       | 5.269 |
| fumar.             | 4.72  | bovis lap.              | 5.270 |
| heder.             | 4.79  | canis caput.            | 5.274 |
| herniar.           | 4.81  | capr. sterc.            | 5.276 |
| levist.            | 4.92  | Bezoar. lap.            | 5.279 |
| linar.             | 4.93  | ebur.                   | 5.285 |
| petrosel.          | 4.122 | hom. capill.            | 5.287 |
| puleg.             | 4.133 | urin.                   | 5.288 |
| scolopendr.        | 4.152 | sterc.                  | 5.291 |
| senecii.           | 4.156 | ursi fel.               | 5.312 |
| verben.            | 4.171 | anser. sterc.           | 5.315 |
| gratiol.           | 4.241 | gall. sterc.            | 5.319 |
| origan.            | 4.116 | palumb.                 | 5.322 |
| quinquefol.        | 4.135 | perdic.                 | 5.323 |
| rorismarin.        | 4.141 | jecur.                  | 5.323 |
| rut. mur.          | 4.144 | Pilul. gummos S. Cloff. | 2.255 |
| Rad. chin.         | 4.45  | Tragea Epat. querc.     | 2.271 |
| curcum.            | 4.58  | Tinct. ex vitr. § ij.   | 3.445 |
| cyclam.            | 4.59  | Elix. Solare § ij.      |       |
| eryngii.           | 4.66  | ☾ ☉ is.                 | 3.466 |
| fumar. bulb.       | 4.73  | ☾ ☉ com. dulc. comp     | 3.467 |
| levist.            | 4.92  | ☾ ☉ li diaph.           | 3.490 |
| onon.              | 4.116 | Crist.                  |       |



# ET REMEDIORUM.

|     |                            |       |                         |       |
|-----|----------------------------|-------|-------------------------|-------|
| 142 | Crist. Sp. Tart.           | 4.220 | perd. caro.             | 5.323 |
| 161 | Iliaca Pilul. Iliac. Rhaf. | 2.256 | formic.                 | 5.342 |
| 164 | passio.                    |       | oleum.                  | 5.342 |
| 166 | Impe- Fol. scab.           | 4.151 | Extr. satyr. comp.      | 2.215 |
| 166 | tigines. Fl. caprifol.     | 4.35  | Ol. sesami.             | 4.157 |
| 166 | scabios.                   | 4.151 | Θ. Comm.                | 3.464 |
| 166 | Rad. Ireos. n.             | 4.86  | Essent. Sp. sulph. Oli. | 3.495 |
| 166 | elleb.                     | 4.237 | Inci- Fol. abrotan.     | 4.4   |
| 166 | Fruet. balan. Myreps.      | 4.24  | dentia. absynth.        | 4.5   |
| 166 | Resin. Thur.               | 4.223 | ari.                    | 4.21  |
| 166 | Anim. hom. sterc.          | 5.291 | Jaceæ.                  | 4.85  |
| 166 | serp. exuv.                | 5.366 | levist.                 | 4.92  |
| 166 | viper. ol.                 | 5.310 | ligustr.                | 4.93  |
| 166 | ranar. sal.                | 5.332 | matric.                 | 4.99  |
| 166 | Sapo ad impetigin.         | 2.272 | porr.                   | 4.130 |
| 166 | fach. H ni.                | 3.390 | rut.                    | 4.143 |
| 166 | sal Gij.                   | 3.418 | sabin.                  | 4.144 |
| 166 | magist. marcas.            | 3.456 | scordii.                | 4.153 |
| 166 | ol. laur.                  | 4.91  | tanacet.                | 4.165 |
| 166 | pin.                       | 4.125 | thymi.                  | 4.166 |
| 166 | succ. popul.               | 4.129 | veron.                  | 4.173 |
| 166 | Spir. Tart.                | 4.220 | urtic.                  | 4.178 |
| 166 | Impo- Fol. matric.         | 4.99  | Flor. ligustr.          | 4.93  |
| 166 | tentia Flor. matric.       | 4.99  | stach. citr.            | 4.163 |
| 166 | Ven. Rad. satyrii.         | 4.150 | tanacet.                | 4.165 |
| 166 | Sem. bombac.               | 4.29  | Rad. allii.             | 4.12  |
| 166 | eruc.                      | 4.66  | cepr.                   | 4.40  |
| 166 | pastin. sylv.              | 4.120 | cyclam.                 | 4.59  |
| 166 | Fruet. Pin.                | 4.125 | galang.                 | 4.73  |
| 166 | chocol.                    | 4.216 | levist.                 | 4.92  |
| 166 | Fung. tuber. Cerv.         | 4.225 | porri.                  | 4.130 |
| 166 | Anim. apri test.           | 5.268 | pyrethri.               | 4.134 |
| 166 | bovis priapus.             | 5.271 | raphan mar.             | 4.136 |
| 166 | cervi priapus              | 5.282 | rusc.                   | 4.143 |
| 166 | testic.                    | 5.282 | scrophul.               | 4.154 |
| 166 | Mosch.                     | 5.302 | scyll.                  | 4.154 |
| 166 | gall. test.                | 5.318 | urtic.                  | 4.178 |
| 166 | passer.                    | 5.322 | Zedoar.                 | 4.179 |
|     |                            |       | f 2                     | Zin-  |

# INDEX MORBORUM

|                       |       |                        |       |
|-----------------------|-------|------------------------|-------|
| Zinzib.               | 4.186 | In- Fol. lent palustr. | 4.91  |
| Cort. cappar.         | 4.34  | flam- ligustr.         | 4.93  |
| Sem. ammi ver.        | 4.13  | matio. tussil.         | 4.169 |
| card. mar.            | 4.37  | Flor. ligustr.         | 4.93  |
| dauc.                 | 4.62  | Cort. ebul.            | 4.64  |
| levist.               | 4.92  | Anim. agni pulm.       | 5.267 |
| napi.                 | 4.109 | vaccin. sterc.         | 5.270 |
| porri.                | 4.130 | ranar. sperm.          | 5.332 |
| fess. Mass.           | 4.158 | ol.                    | 5.332 |
| synapi.               | 4.159 | araneat. tela.         | 5.338 |
| urtic.                | 4.178 | Lap. Saphirus.         | 3.330 |
| Fruct. bacc. Juniper. | 4.88  | Linim. de H.           | 2.306 |
| piper.                | 4.126 | ♀. in ~ ♂ li fol.      | 3.406 |
| Resin. benzoin.       | 4.188 | Balsam.                | 3.460 |
| Lachr. asæ fatid.     | 4.184 | Inte- Fol. equiset.    | 4.66  |
| Anim. capr. serum.    | 5.275 | stin. Anim. Vacca lac. | 5.271 |
| ebur.                 | 5.285 | laxio. tinc.           | 5.334 |
| anser. sterc.         | 5.315 | afelli.                | 5.338 |
| gall. vet. jus.       | 5.318 | lumbric. terr.         | 5.344 |
|                       |       | pedic.                 | 5.345 |
| Incras- Fol. acac.    | 4.6   | ⊖. Lithargyr.          | 3.459 |
| lantia. alchimill.    | 4.11  | Ischias. Fol. fenec.   | 4.156 |
| plantag.              | 4.127 | thlasph.               | 4.166 |
| sedl.                 | 4.156 | Cort. popul. alb.      | 4.129 |
| Flor. acac.           | 4.6   | Sem. thlasph.          | 4.166 |
| cynogloss.            | 4.59  | Anim. cervi sang.      | 5.282 |
| Cort. acac.           | 4.6   | columb. sim.           | 5.316 |
| Sem. tritic.          | 4.165 | halec. mur.            | 5.329 |
| Fruct. fabar.         | 4.64  | Bals. antiparal.       | 2.159 |
| Musc. corall.         | 4.51  | Empl. diaph.           | 2.195 |
| Gumm. Tragac.         | 4.124 | Bals. ecatul.          | 5.174 |
| Anim. Cochleæ.        | 5.284 |                        |       |
| cinis.                | 5.284 | <b>L</b> Abior. rimæ.  |       |
| gall. cerebr.         | 5.318 | Anim. bov. adeps.      | 5.270 |
| ranar. sperm.         | 5.332 | hom. urin.             | 5.228 |
| Incu- Flor. pæon.     | 4.127 | Lac. Fol. cucurb.      | 4.57  |
| bus. Rad. pæon.       | 4.127 | immi- geranii.         | 4.76  |
| Sem. pæon.            | 4.127 | nuent. petrosel.       | 4.122 |
|                       |       | Lac.                   |       |



# ET REMEDIORUM.

|      |                    |       |                         |       |
|------|--------------------|-------|-------------------------|-------|
| 4.91 | Lac. coagulat.     |       | Gumm. ammon.            | 4.182 |
| 4.93 | Anim. agni cogul.  | 5.267 | Anim. asini lac.        | 5.269 |
| 4.99 | Lac. Fol. fœnic.   | 4.70  | tauri fel.              | 5.270 |
| 4.99 | præ-               |       | unce. butyr.            | 5.271 |
| 4.99 | bent. lactuc.      | 4.89  | capr. fer.              | 5.275 |
| 4.99 | origan.            | 4.116 | echinus.                | 5.286 |
| 4.99 | pimpinell.         | 4.124 | hom. urin.              | 5.288 |
| 4.99 | vinc.              | 4.173 | mur. sterc.             | 5.303 |
| 4.99 | Flor. amaranth.    | 4.12  | ariet. fel.             | 5.304 |
| 4.99 | Rad. pimpinell.    | 4.124 | viper. spir.            | 5.310 |
| 4.99 | Sem. anethi.       | 4.16  | anser. ping.            | 5.314 |
| 4.99 | anisi.             | 4.17  | galli vet. jus.         | 3.318 |
| 4.99 | cari.              | 4.37  | vitell. ovi.            | 5.319 |
| 4.99 | fœnic.             | 4.70  | hirund. sterc.          | 5.321 |
| 4.99 | lactuc.            | 4.89  | Pass. sterc.            | 5.322 |
| 4.99 | nigell.            | 4.113 | barbo.                  | 5.325 |
| 4.99 | sesel. mass.       | 4.158 | unguis. odor.           | 5.325 |
| 4.99 | Anim. bovis ungul. | 5.270 | lucil. ova.             | 5.330 |
| 4.99 | lumbr. terr.       | 5.344 | sepia humorater.        | 5.333 |
| 4.99 | Lap. Crystall.     | 3.349 | Sal. comm.              | 3.464 |
| 4.99 | Laxan-Fol. Malv.   | 4.98  | fossil.                 | 3.470 |
| 4.99 | tia. Q. ial.       | 4.103 | Spir. Tart.             | 4.219 |
| 4.99 | sambuc.            | 4.146 | Lenti-Rad. ireos flor.  | 4.86  |
| 4.99 | spinach.           | 4.162 | gines. Anim. lep. sang. | 5.300 |
| 4.99 | viol.              | 4.174 | formic.                 | 5.342 |
| 4.99 | urtic.             | 4.178 | Ol. laur.               | 4.91  |
| 4.99 | Flor. viol.        | 4.174 | Lepra. Rad. bardan.     | 4.25  |
| 4.99 | Rad. alth.         | 4.12  | Turpeth.                | 4.250 |
| 4.99 | betæ.              | 4.28  | Elleb.                  | 4.236 |
| 4.99 | Cort. mori.        | 4.105 | Anim. Echin. jecur.     | 5.286 |
| 4.99 | Fruct. Olivæ.      | 4.115 | serpens.                | 5.306 |
| 4.99 | mal. persic. rec.  | 4.12  | talp. cinis.            | 5.308 |
| 4.99 | poin. dulc.        | 4.129 | taxi sang.              | 5.309 |
| 4.99 | prun.              | 4.132 | viperin. vin.           | 5.310 |
| 4.99 | pyr. dulc.         | 4.134 | formic.                 | 5.342 |
| 4.99 | sebesten.          | 4.156 | Cataplasim. res. F.     | 2.164 |
| 4.99 | uvæ matur.         | 4.176 | Pil. Sp. Tart. querc.   | 2.259 |
| 4.99 | Resin. latic.      | 4.120 | Q. argent.              | 3.408 |
| 4.99 | styr. cal.         | 4.216 |                         |       |
| 4.99 | Lachr. sach.       | 4.214 |                         |       |

# INDEX MORBORUM

|                         |       |                                  |       |
|-------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| ☉ ☿ ij sach. querc.     | 3.436 | Cort. fraxin.                    | 4.71  |
| Tinct. ex ☿. cred.      | 3.445 | Sem. nast. hort.                 | 4.110 |
| ex fl. ☿ ij.            | 3.448 | Lign. nephrit.                   | 4.111 |
| Antid. ζωήριον ☿ querc. | 3.449 | Bals. indic.                     | 4.186 |
| Antid. Πάρχης ☿.        | 3.450 | Tol.                             | 4.185 |
| Tinct. ex ☿ ☿ ij.       | 3.451 | Lachr. asæ fetid.                | 4.184 |
| Le- Fol. rorismar.      | 4.141 | Gumm. ammon.                     | 4.182 |
| thar- Flor. spic.       | 4.161 | sagapen.                         | 4.114 |
| gus. stach.             | 4.162 | Anim. bovis splen.               | 5.270 |
| Rad. helleb.            | 4.237 | capr. stercus.                   | 5.276 |
| Sem. sinapi.            | 4.158 | gruis ping.                      | 5.320 |
| Anim. cat. test.        | 5.279 | ovis sterc.                      | 5.304 |
| columb. sim.            | 5.316 | unguis odorat.                   | 5.235 |
| Lap. ophit.             | 3.355 | vulp. lien.                      | 5.313 |
| succin.                 | 3.511 | struth. adeps.                   | 5.324 |
| Aq. anhaltin.           | 2.134 | Pilul. de Ammoniac. querc. 2.255 |       |
| Libidinem exting.       |       | Lienis Fol. absynth.             | 4.4   |
| Fol. salic.             | 4.145 | obstru- adianth.                 | 4.8   |
| verben.                 | 4.171 | ctio. aquil.                     | 4.19  |
| Resin. camphor.         | 4.190 | chelid. maj.                     | 4.43  |
| Sal Hni ver.            | 3.394 | cuscut.                          | 4.58  |
| Liche- Fol. nicot.      | 4.112 | epat. nob.                       | 4.65  |
| nes. Musc. Lichen.      | 4.92  | fragar.                          | 4.71  |
| Anim. hom. sterc.       | 5.291 | fumar.                           | 4.72  |
| fulphur.                | 3.501 | graminis.                        | 4.77  |
| ▽. l. pathi.            | 4.90  | levist.                          | 4.92  |
| ol. è chart. comb.      | 4.96  | marthub.                         | 4.99  |
| Lien- Rad. Zedoar.      | 4.179 | nast. aq.                        | 4.110 |
| teria. Anim. hom. ossa. | 5.297 | petrosel.                        | 4.122 |
| Succ. hypocist.         | 4.196 | quinquefol.                      | 4.135 |
| Min. chalybs.           | 3.78  | scolopendr.                      | 4.152 |
| Farin. fabar.           | 4.68  | scordii.                         | 4.153 |
| Extr. rad pom.          | 4.129 | verben.                          | 4.171 |
| Laudan. op.             | 4.204 | veron.                           | 4.173 |
| Lienis Fol. nast. hort. | 4.110 | Flor. caprifol.                  | 4.34  |
| duri- scolopendr.       | 4.152 | cent.                            | 4.40  |
| ties. Rad. bardan.      | 4.25  | genist.                          | 4.75  |
| cicut.                  | 4.47  | lupul.                           | 4.96  |
|                         |       | roris-                           |       |



# ET REMEDIORUM.

|                        |           |                         |       |
|------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| rorismar.              | 4.141     | Sp. sulph.              | 3.380 |
| rut. mur.              | 4.144     | Sal. sach. ☞.           | 3.382 |
| schænanth.             | 4.152     | flor. ☞.                | 3.383 |
| stæch. citrin.         | 4.163     | Tinct. hi.              | 3.392 |
| Rad. Acori.            | 4.8       | Bezoar. solar. Crollii. | 3.413 |
| asparag.               | 4.22      | Tinct. Sp. Tart.        | 4.222 |
| eryngii.               | 4.66      | Bezoard. ☞ ial.         | 3.413 |
| filic.                 | 4.70      | ☞. diaphor.             | 3.427 |
| gentian.               | 4.75      | Clyffus.                | 3.440 |
| helenii.               | 4.81      | Tinct. ex vitr. ☞ ij.   | 3.445 |
| levist.                | 4.92      | fl. ☞ ij.               | 3.448 |
| petrosel.              | 4.122     | ☞ ☞ is:                 | 4.66  |
| rhapont. ver.          | 4.138     | Terr. foliat.           | 3.475 |
| rubix.                 | 4.142     | ☞. alum. dulc.          | 3.479 |
| schænanth.             | 4.152     | ☞. ☞ li volat.          | 3.486 |
| tamar.                 | 4.164     | ☞. ☞ li phil.           | 3.489 |
| polypod.               | 4.245     | ☞. oper. Penoti.        | 3.489 |
| Cort. mori.            | 4.105     | ☞. ☞ li.                | 3.498 |
| tamar.                 | 4.164     | Extr. splen. Taur.      | 5.271 |
| Sem. genist.           | 4.74      | Lues Fol. pimpinell.    | 4.124 |
| pastin. sylv.          | 4.120     | venec- sapon.           | 4.148 |
| raphan.                | 4.136     | rea. Flor. succis.      | 4.169 |
| Fruct. amygd. amar.    | 4.14      | Rad. chin.              | 4.45  |
| Lign. Tamar.           | 4.164     | pimpinell.              | 4.124 |
| Gumm. ammon.           | 4.182     | sarsaparill.            | 4.149 |
| Lacc.                  | 4.196     | scabios.                | 4.152 |
| Sp. Tart. depur.       | 4.218     | fuscis.                 | 4.163 |
| Aq. aperit.            | 2.134     | tormentill.             | 4.166 |
| decoct. splen. bov.    | 2.177     | mechoac.                | 4.242 |
| El. scorb.             | 2.136     | turpeth.                | 4.251 |
| Empl. splen. de cicut. | 2.199     | Fruct. colocynth.       | 4.234 |
| Extr. chalyb.          | 2.213     | Lign. guajac.           | 4.78  |
| Vin. Med. Ceph. splen. | 2.227     | sassafrass.             | 4.150 |
| Pil. de Ammon. querc.  | 2.253     | Anim. serpens.          | 5.304 |
| Marocost. Minderer.    | 2.256     | Min. Mercurius.         | 3.398 |
| Tartar.                | 2.259.260 | Cinnabaris              | 3.419 |
| Unguent. splen.        | 2.309     | Vin. sanct.             | 2.228 |
| ol. Martial. alb.      | 3.380     | Liquor. ad ulcer.       | 2.233 |
|                        |           | Pil.                    |       |

# INDEX MORBORUM

|                                    |       |                         |       |
|------------------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Pil. Tartar. querc.                | 2.257 | gramin.                 | 4.77  |
| Perlæ præp. spir. guajac.          | 3.344 | hyperic.                | 4.83  |
| Spir. H ni sudor.                  | 3.391 | portulac.               | 4.130 |
| Mercur. præcip.                    | 3.399 | senec.                  | 4.156 |
| mercur. præcip. per ol. Sp. sulph. | 3.400 | tanacet.                | 4.165 |
|                                    | 3.400 | gratiol.                | 4.241 |
| Mercur. solar.                     | 3.403 | Flor. caryophill. hort. | 4.38  |
| Hercul. Bovii.                     | 3.404 | cent. min.              | 4.40  |
| aurum vit.                         | 2.405 | hyper.                  | 4.83  |
| Mercur. in ☿ li sol.               | 3.407 | stæch. citr.            | 4.163 |
| ☿ = rubeus.                        | 3.408 | tanacet.                | 4.85  |
| Manna mercuril.                    | 3.408 | Rad. allij.             | 4.12  |
| Mercurius vit.                     | 3.410 | cepe.                   | 4.40  |
| Bezoar. ☉ Crollii.                 | 3.413 | fraxinell.              | 4.72  |
| ☿. f. ☉ ☿ ij rubr.                 | 3.415 | gentian.                | 4.75  |
| ol. fragrans.                      | 3.416 | Sem. portul.            | 4.130 |
| ol. ☿ ij saccharat.                | 3.416 | fanton.                 | 4.148 |
| Tinct. ☿ ij.                       | 3.416 | Fruet. pom. Citr.       | 4.89  |
| Liquor. ☿ ij præcip.               | 3.417 | nucl. persic.           | 4.121 |
| Sal. ☿ ij.                         | 3.418 | Lign. colubrin.         | 4.50  |
| ☿. diaphor.                        | 3.427 | Musc. corall.           | 4.51  |
| Pl. ☿ ij.                          | 3.428 | Resin. myrrh.           | 4.200 |
| Panaceæ Sp. sulph. ☿ ij. ver.      | 3.444 | Succ. aloes             | 4.252 |
|                                    | 444   | Anim. C. C. ust.        | 5.281 |
| Tinct. ex vitr. ☿ ij.              | 3.445 | bezoar. lap.            | 5.278 |
| fol.                               | 3.446 | ebur.                   | 5.285 |
| Tinct. ex ☿ io rub. fix.           | 3.448 | lumbr. terr.            | 5.344 |
| Antid. Nervæ ☿.                    | 3.450 | intest.                 | 5.244 |
| Sal. ☿ ij.                         | 3.454 | Rotul. infant. lax.     | 3.238 |
| ☿. chal. cach.                     | 3.475 | Ol. hyper. comp.        | 2.245 |
| ☿ li phil.                         | 3.489 | Ellenbete.              | 2.248 |
| decoct. guajac.                    | 4.78  | Pilul. febr. D. Schôff. | 2.255 |
| Spir. tereb.                       | 4.211 | Nix diaphor. ☿ ij.      | 3.442 |
| Spir. Tarr.                        | 4.220 | ☿. ☿. com. dulc. comp.  | 3.467 |
| Lum- Fol. abrotan.                 | 4.4   | ☿. alb. vomit.          | 3.484 |
| brici.                             | 4.4   | unguent. aurant.        | 4.23  |
|                                    | 4.58  | Extr. buxi.             | 4.32  |
| cupress.                           | 4.58  |                         | Syr.  |
| galeg.                             | 4.74  |                         |       |



# ET REMEDIORUM.

|                                  |       |                         |       |
|----------------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Syr. fl. persic.                 | 4.121 | Gumm. Elemi.            | 4.194 |
| Vitriol.                         | 3.483 | Resin. Liquid. ambr.    | 4.198 |
| ♀. præcipitat.                   | 3.399 | myrrh.                  | 4.200 |
| Hercul Bovij.                    | 3.404 | tacamahac.              | 4.217 |
| Luxa- Anim. bovis axung. ex ung. | 5.270 | Anim. hircin. sang.     | 5.275 |
| tio.                             | 270   | hom. sterē.             | 5.291 |
| Eq. ping.                        | 5.286 | gall. vitel. ov.        | 5.319 |
| hom. capill.                     | 5.287 | cera. temper.           | 5.337 |
| ovis æsypus.                     | 5.304 | Melan-Fol. meliss.      | 4.100 |
| lana.                            | 5.304 | cholia. verben.         | 4.171 |
| M.                               |       | epyth.                  | 4.239 |
| <b>M</b> Ammarum durities.       |       | Rad. scorzon.           | 4.153 |
| Fol. matric.                     | 4.99  | Anim. asini sang.       | 5.269 |
| menth.                           | 4.102 | capr. serum.            | 5.272 |
| polygon.                         | 4.128 | bezoar lap.             | 5.278 |
| Flor. matric.                    | 4.99  | ebur.                   | 5.285 |
| Mammarum inflammatio.            |       | viper. spir.            | 5.310 |
| Bals. bals.                      | 2.302 | anast. viv.             | 5.314 |
| Unguent. ad perniones.           | 2.308 | columba.                | 5.316 |
| Mammarum scissur.                |       | noctux cato.            | 5.321 |
| Fol. Geranii.                    | 4.76  | pica.                   | 5.323 |
| Sem. Cydon.                      | 4.61  | Lap. chrysolith.        | 3.328 |
| Anim. cochl. test.               | 5.276 | granatus.               | 3.328 |
| Ma- Anim. hirc. oment.           | 5.276 | rubin.                  | 3.329 |
| nia. pica.                       | 5.323 | saphirus.               | 3.330 |
| Lap. armen.                      | 3.346 | Smaragdus. præp.        | 3.332 |
| Elix. vit. querc.                | 2.191 | armen.                  | 3.346 |
| Pil. Sp. Tart querc.             | 2.259 | Aq. hyster.             | 2.144 |
| Tinct. Bi.                       | 3.392 | imperial.               | 2.144 |
| Basilii.                         | 3.337 | Pulv. stomach. querc.   | 2.259 |
| magist. ☉ li.                    | 3.496 | Pilul. Sp. tart. querc. | 2.272 |
| Ol. gagat.                       | 3.516 | Tinct. Corall. Basilii. | 3.337 |
| Matu- Fol. malv.                 | 4.98  | Saturn.                 | 3.392 |
| rantia. pariet.                  | 4.119 | Sal. ver. ☿.            | 3.397 |
| Sem. lini.                       | 4.95  | Croc. metall.           | 3.426 |
| tritice.                         | 4.168 | Flor. ♂ regul.          | 3.432 |
| Fruct. pineæ.                    | 4.125 | ☉. ☊ lar.               | 3.474 |
| Lachr. sarcocoll.                | 4.215 | coagul. ☉ li.           | 3.485 |
|                                  |       | Elix.                   |       |

# INDEX MORBORUM

|                           |       |                                |       |
|---------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Elix. querc.              | 2.191 | Fruct. acac.                   | 4.6   |
| Memoriae imbecill.        |       | castan.                        | 4.39  |
| Fol. eufrag.              | 4.67  | mor. immat.                    | 4.106 |
| Fruct. anacardij.         | 4.14  | rub.                           | 4.142 |
| Anim. hirund. cor.        | 5.320 | forb.                          | 4.160 |
| formic.                   | 5.341 | Musc. pulm. arb.               | 4.133 |
| Lap. Chrysolith.          | 3.328 | Resin. tacamahac.              | 4.217 |
| Aq. magnanim.             | 2.146 | Lachr. Bdellii.                | 4.187 |
| Bals. Cephal.             | 2.161 | Anim. bovis sang.              | 5.270 |
| Pilul. pestilent. compos. | 2.258 | bufo.                          | 5.272 |
| Pulv. trithemii.          | 2.272 | sang. menstr.                  | 5.288 |
| Men- Fol. acac.           | 4.6   | mul. axung.                    | 5.303 |
| fium alchimill.           | 4.11  | sterc.                         | 5.303 |
| fluxus, anserin.          | 4.17  | anser. cut. ped.               | 5.315 |
| auric. mur.               | 4.24  | turtur.                        | 5.324 |
| burf. pastor.             | 4.32  | ranar. sperm.                  | 5.332 |
| hispidul.                 | 4.81  | Lap. bol.                      | 3.319 |
| millefol.                 | 4.105 | Corall.                        | 3.333 |
| olea.                     | 4.115 | Chrystall.                     | 3.249 |
| pinastr.                  | 4.125 | Hæmatit.                       | 3.351 |
| plantag.                  | 4.126 | magnes.                        | 3.355 |
| polygon.                  | 4.128 | fuccin.                        | 3.511 |
| querc.                    | 4.135 | Succ. hypocist.                | 4.196 |
| rhuis.                    | 4.138 | Pulv. Dysenter. Crollii.       | 2.269 |
| fenec.                    | 4.156 | Sperniol. comp. Crollii.       | 2.272 |
| vine.                     | 4.173 | Ol. Tinct. 67. ex scor. carul. | 3.382 |
| ulmar.                    | 4.177 | Sal. fach.                     | 3.382 |
| Flor. amaranth.           | 4.13  | Men- Fol. adianth.             | 4.8   |
| cynosbat.                 | 4.60  | fium anagall. aq.              | 4.15  |
| balauft.                  | 4.77  | obstruct. aquileg.             | 4.17  |
| malv. arbor.              | 4.98  | aristol.                       | 4.19  |
| papav. err.               | 4.118 | artemis.                       | 4.20  |
| Rad. acor. adult.         | 4.8   | basilic.                       | 4.26  |
| bistort.                  | 4.29  | calamenth.                     | 4.33  |
| rhapont.                  | 4.138 | cardiac.                       | 4.36  |
| Zedoar.                   | 4.179 | chamædr.                       | 4.42  |
| Cort. acac.               | 4.6   | dictamn.                       | 4.62  |
| pinastr.                  | 4.125 | Jacea.                         | 4.62  |
|                           |       | levist.                        |       |



# ET REMEDIORUM.

|               |       |                 |          |
|---------------|-------|-----------------|----------|
| levist.       | 4.92  | cepa.           | 4.40     |
| majoran.      | 4.97  | curcum.         | 4.58     |
| marrub. alb.  | 4.99  | cyclam.         | 4.59     |
| matric.       | 4.99  | cyper.          | 4.61     |
| meliss.       | 4.100 | eryngij.        | 4.66     |
| menth. sarac. | 4.102 | filic.          | 4.70     |
| ꝯial.         | 4.103 | fumar. bulb.    | 4.73     |
| nast. Aq.     | 4.110 | galang.         | 4.73     |
| nast. hort.   | 4.110 | ireos flor.     | 4.86     |
| petrosel.     | 4.122 | levist.         | 4.92     |
| pimpinell.    | 4.124 | mei.            | 4.104    |
| puleg.        | 4.133 | onon.           | 4.116    |
| rorismar.     | 4.141 | petros.         | 4.122    |
| sapon.        | 4.149 | pimpin.         | 4.124    |
| satureia.     | 4.150 | pæon.           | 4.127    |
| saxifrag.     | 4.155 | raphan. mar.    | 4.136    |
| scolopendr.   | 4.152 | rhapont.        | 4.138    |
| sabin.        | 4.144 | rubia.          | 4.142    |
| serpill.      | 4.156 | rusc.           | 4.143    |
| tanacet.      | 4.165 | scorzon.        | 4.127    |
| thlaspi.      | 4.166 | valer.          | 4.170    |
| thilia.       | 4.167 | vincetox.       | 4.170    |
| Flor. calthæ. | 4.34  | elleb.          | 4.237    |
| cent.         | 4.40  | bryon.          | 4.231    |
| chamom.       | 4.43  | Cort. cinnam.   | 4.48     |
| cheri.        | 4.45  | cost.           | 4.54     |
| croci.        | 4.55  | Sem. agni cost. | 4.10     |
| eupat.        | 4.67  | ammi ver.       | 4.12     |
| lupul.        | 4.96  | apii.           | 4.16     |
| matric.       | 4.99  | dauc.           | 4.62     |
| schænant.     | 4.152 | levist.         | 4.92     |
| spic.         | 4.160 | pastinac.       | 4.120    |
| stæch.        | 4.162 | petros.         | 4.122    |
| citr.         | 4.163 | macedon.        | 4.123    |
| tanacet.      | 4.165 | raphan.         | 4.136    |
| Rad. acori.   | 4.8   | sesel.          | 4.157    |
| angelic.      | 4.16  | Mass.           | 4.158    |
| apii.         | 4.18  | Cret.           | 4.158    |
|               |       | g 2             | thlaspi. |

# INDEX MORBORUM

|                           |       |                          |           |
|---------------------------|-------|--------------------------|-----------|
| thlasp.                   | 4.66  | nucl. persic.            | 4.121     |
| Fruct. bacc. Juniper.     | 4.88  | Anim. hom. urin. præp.   | 5.290     |
| laur.                     | 4.91  | Min. Nitrum.             | 2.472     |
| Fung. agar.               | 4.230 | Aq. aperit.              | 2.134     |
| Gumm. ammon.              | 4.182 | Extr. chalyb.            | 2.213     |
| elem.                     | 4.194 | Pilul. marocost. Mind.   | 2.256     |
| galban.                   | 4.195 | Spir. Tart.              | 2.259 260 |
| lacc.                     | 4.196 | Ol. martial. alb.        | 3.380     |
| Succ. elater.             | 4.253 | Fl. martis.              | 3.383     |
| Anim. asin. lac.          | 5.269 | ♂. diaphor.              | 2.327     |
| taur. splen.              | 5.270 | Clyffus.                 | 3.440     |
| bezoar. lap.              | 5.278 | Lap. prunell.            | 3.473     |
| cast. test.               | 5.279 | terr. fol.               | 3.475     |
| Zibeth.                   | 5.281 | ☉. li.                   | 3.488     |
| hom. cadav.               | 5.294 | phil.                    | 3.489     |
| mur. maj. sterc.          | 5.303 | ▽. aper. Penor.          | 3.489     |
| sepiæ. ova.               | 5.333 | Syr. fl. persic.         | 4.121     |
| Pilul. matric. D. Schöff. | 2.257 | Spir. Tart. phil.        | 4.221     |
| Borrax.                   | 2.280 | Sinct. Sp. Tart.         | 4.222     |
| Syr. de Artem. Fern.      | 2.304 | liquor. splen.           | 4.223     |
| Pilul. hyster. Horst.     | 2.312 | Mix- Fol. millefol.      | 4.104     |
| Ol. martial. alb.         | 3.380 | tiocru- plantag.         | 4.127     |
| Tinct. chalyb.            | 3.381 | enta. burs. past.        | 4.32      |
| ☉. ♀.                     | 3.388 | Mola. Sem. pastin. sylv. | 4.120     |
| ♂. diaphor.               | 3.427 | Anim. hom. secund.       | 5.288     |
| Clyffus.                  | 3.440 | lep. ocul.               | 5.300     |
| Tinct. ex vitr. ♂ij.      | 3.445 | Mor- Fol. Galeg.         | 4.74      |
| ex fl. ♂ij.               | 3.448 | billi. urtic.            | 4.178     |
| sambuc.                   | 4.147 | Sem. aquileg.            | 4.19      |
| Liquor. splen.            | 4.223 | napi.                    | 4.109     |
| Extr. splen. Taur.        | 5.271 | naft. hort.              | 4.110     |
| Mefenterii obstructio.    |       | rap.                     | 4.137     |
| Fol. fumar.               | 4.72  | Rad. contragerv.         | 4.51      |
| Flor. genift.             | 4.74  | polygonat.               | 4.128     |
| Rad. rhapont.             | 4.138 | Fruct. cherm.            | 4.44      |
| polypod.                  | 4.245 | Ficus.                   | 4.69      |
| Sem. genift.              | 4.74  | Gumm. Lacc.              | 4.196     |
| Fruct. amygd. amar.       | 4.14  | Anim. C. C.              | 5.281     |
|                           |       | hom.                     |           |



# ET REMEDIORUM.

|                           |       |                          |       |
|---------------------------|-------|--------------------------|-------|
| hom. ping.                | 5.297 | bacc. laur.              | 4.91  |
| thymall. axung.           | 5.334 | Lign. colubrin.          | 4.50  |
| Lap. saphirus.            | 3.330 | Anim. coagul. agni.      | 5.267 |
| Emulsio expul.            | 2.203 | vaccin. sterc.           | 5.270 |
| Tinct. ex vitr. § ij.     | 3.445 | canin. sang.             | 5.274 |
| ⊙ terr. stragoniens.      | 3.319 | pil.                     | 5.274 |
| scarlatus panis cherm.    | 4.44  | hom. saliv.              | 5.287 |
| Mor- Anim. bufon. ol.     | 5.273 | sterc.                   | 5.291 |
| phæa. Balf. vit. Basil.   | 3.444 | lup. ossa.               | 5.301 |
| Tinct. ex fl. § ij.       | 3.448 | mus.                     | 5.303 |
| Antid. ζωφισλ & querc.    | 3.445 | ferp. fel.               | 5.306 |
| Antid. Πενυχενς &         | 3.450 | suum sterc.              | 5.308 |
| Tinct. ex §. § ij. cum ⊙. | 3.451 | anat. fim.               | 5.314 |
| Litharg. thereb.          | 3.460 | cuculi fim.              | 5.317 |
| Mor- Fol. abrotan.        | 4.4   | gallina.                 | 5.318 |
| sus ve- anagall.          | 4.15  | hirund. nidus.           | 5.320 |
| nenat. dictamn.           | 4.63  | sterc.                   | 5.321 |
| fraxini.                  | 4.71  | cancr. cinis.            | 5.326 |
| galeg.                    | 4.74  | lacertus.                | 5.343 |
| millefol.                 | 4.105 | scorpio.                 | 5.347 |
| porri.                    | 4.130 | Min. terr. sigill.       | 3.318 |
| prim. ver.                | 4.131 | smaragdus.               | 3.331 |
| rut.                      | 4.143 | Sp. sulph.               | 3.501 |
| vincetox.                 | 4.174 | Balsam. vulner.          | 2.305 |
| Flor. cent. min.          | 4.40  | ⊙ ⊙. anodyn.             | 3.500 |
| prim. ver.                | 4.131 |                          |       |
| Rad. angel.               | 4.16  | <b>N</b> E-Fol. adianth. | 4.8   |
| doron.                    | 4.63  | phritis. alth.           | 4.12  |
| gentian.                  | 4.75  | anagall. Aq.             | 4.15  |
| imperat.                  | 4.45  | chelid. maj              | 4.43  |
| porri.                    | 4.130 | cupress.                 | 4.58  |
| rhapont.                  | 4.138 | filipend.                | 4.69  |
| scorzon.                  | 4.153 | graminis.                | 4.77  |
| vincetox.                 | 4.174 | heder.                   | 4.79  |
| Zedoar.                   | 4.179 | herniar.                 | 4.81  |
| Sem. nigell.              | 4.113 | malv.                    | 4.98  |
| porri.                    | 4.130 | matric.                  | 4.99  |
| Fruct. nucl. avell.       | 4.53  | petrosel.                | 4.122 |
|                           |       | g 3                      | pim-  |

# INDEX MORBORUM

|                  |       |                             |       |
|------------------|-------|-----------------------------|-------|
| pimpinell.       | 4.124 | rhod.                       | 4.137 |
| rut. mur.        | 4.144 | Resin. terebinth.           | 4.210 |
| saxifr.          | 4.151 | Gumm. tragac.               | 4.224 |
| tanacet.         | 4.165 | Anim. asin. urin.           | 5.209 |
| virg. aur.       | 4.176 | vaccin. lac.                | 5.271 |
| urtic.           | 4.178 | echin. jecur.               | 5.286 |
| Flor. acac.      | 4.6   | hom. urin. præc.            | 5.290 |
| cynosbat.        | 4.60  | sterc.                      | 5.291 |
| tanacet.         | 4.165 | lep. offic.                 | 5.300 |
| Rad. armorac.    | 4.20  | mur. sterc.                 | 5.303 |
| asparag.         | 4.22  | taxi adeps.                 | 5.309 |
| costi.           | 4.54  | viperæ spir.                | 5.310 |
| helenii.         | 4.81  | vulp. sang.                 | 5.313 |
| petrosel.        | 4.122 | hirund. sterc.              | 5.321 |
| mont.            | 4.123 | parus.                      | 5.322 |
| peucedan.        | 4.124 | struth. adeps.              | 5.324 |
| pimpinell.       | 4.124 | cancr.                      | 5.325 |
| schænanth.       | 4.162 | cancr. ocul.                | 5.326 |
| sesel. mass.     | 4.158 | manat. lap.                 | 5.331 |
| spic. Indic.     | 4.161 | sepiæ ova.                  | 5.333 |
| Cort. fraxin.    | 4.71  | manat. lap.                 | 5.327 |
| Sem. anisi.      | 4.17  | aselli.                     | 5.337 |
| asparag.         | 4.22  | scorpio.                    | 5.346 |
| cicer.           | 4.46  | Lap. nephritic.             | 3.329 |
| citri.           | 4.48  | Judaic.                     | 3.352 |
| cucum.           | 4.56  | ophit.                      | 3.355 |
| milii.           | 4.104 | spong.                      | 3.357 |
| sol.             | 4.104 | Nitrum.                     | 3.472 |
| petrosel.        | 4.122 | Aq. diuret. enucl.          | 2.141 |
| mont.            | 4.123 | S. Cloff.                   | 2.142 |
| viol.            | 4.174 | Nephrit.                    | 2.146 |
| Fruct. alkekeng. | 4.11  | Elix. Nephrit.              | 2.189 |
| amygd. amar.     | 4.14  | Ol. strobil. febrif.        | 2.244 |
| fraga.           | 4.71  | Tragea antenephrit.         | 2.272 |
| jujub.           | 4.87  | Sacculus nephrit.           | 2.276 |
| bacc. Juniper.   | 4.88  | Spir. nephrit.              | 2.284 |
| nucl. persic.    | 4.121 | unguent. anodyn. in podagr. | 2.    |
| Lign. nephrit.   | 4.111 |                             | 307   |
|                  |       |                             | cx    |



# ET REMEDIORUM.

|            |                       |       |                     |           |
|------------|-----------------------|-------|---------------------|-----------|
| 4.137      | ☿. ex reg. ♂ ij.      | 3.439 | mustel.hepar.       | 5.330     |
| 4.210      | ☉. chalyb.cach.       | 3.475 | Min.Saphir.         | 3.330     |
| 4.224      | ▽. vitriol.           | 3.485 | corall.             | 3.333     |
| 5.109      | ☉. ☉. li.             | 3.494 | Succin.             | 3.511     |
| 5.111      | Syr. fl. acac.        | 4.6   | Aq. Ophthalm.       | 2.138.139 |
| 5.118      | ol. amygd. dule.      | 4.14  | ophthalm.           | 2.152.153 |
| 5.130      | Succ. betul.          | 4.28  | Anacolem.frontal.   | 2.116     |
| 5.131      | Elix. Juniper.        | 4.88  | unguent. Ophthalm.  | 2.308     |
| 5.100      | Ol. nucl. mosch.      | 4.106 | Spod. Græc.         | 3.461     |
| 5.103      | oliv.                 | 4.115 | Aq. ophthalm.cich.  | 4.46      |
| 5.139      | elemi.                | 4.194 | Oculor. exulcerat.  |           |
| 5.110      | Spir. rereb.          | 4.211 | Rad. chelidon.      | 4.45      |
| 5.113      | Ner- Flor. cheyri.    | 4.45  | Antim.              | 3.422     |
| 5.121      | vos Fruct. cherm.     | 4.44  | Ocu- Fol. graminis. | 4.77      |
| 5.122      | con- Sapomoschat.     | 2.280 | lor.in- polygon.    | 4.128     |
| 5.114      | for- Balsam. bals.    | 2.302 | flamma- quinquefol. | 4.135     |
| 5.115      | tant. hispan.         | 2.303 | tio. verben.        | 4.171     |
| 5.116      | Unguent. butyr. Nerv. | 2.307 | Flor. Cyani.        | 4.59      |
| 5.131      |                       |       | ros.                | 4.139     |
| 5.133      | O.                    |       | Sem. Cydon.         | 4.61      |
| 5.127      |                       |       | tritice.            | 4.168     |
| 5.137      | O Culor. vitia.       |       | Fruct. myrt.        | 4.109     |
| 5.146      | Fol. euphrag.         | 4.67  | Resin. thuf.        | 4.223     |
| 5.129      | foenic.               | 4.70  | Gumm. tragac.       | 4.224     |
| 5.132      | tarax.                | 4.165 | Anim. cochl. ping.  | 5.284     |
| 5.135      | verben.               | 4.171 | hom. sudor.         | 5.287     |
| 5.137      | Flor. Cyani.          | 4.59  | lac.                | 5.288     |
| 5.172      | Rad. mandrag.         | 4.98  | butyr.              | 5.288     |
| 2.141      | tarax.                | 4.165 | urin.               | 5.288     |
| 2.142      | valer.                | 4.170 | sterc.              | 5.291     |
| 2.146      | Fruct. pom. dulc.     | 4.129 | Serp. ping.         | 5.306     |
| 2.159      | Spong. sambuc.        | 4.146 | Gall. ov. alb.      | 5.319     |
| 2.244      | Lachr. sarcocoll.     | 4.215 | hirund. nidus.      | 5.320     |
| 2.272      | Bals. Tolut.          | 4.185 | perdic. sang.       | 5.323     |
| 2.276      | Gumm. cancam.         | 4.192 | Sach. h.            | 3.390     |
| 2.284      | Anim. vacc. butyr.    | 5.271 | ▽. hord gram.       | 4.82      |
| podagr. 2. | ursi fel.             | 5.312 | Succ. ros. ☉.       | 4.141     |
| 307        | carpon. fel.          | 5.326 | ▽. vitis.           | 4.175     |
| 4.137      | lucii fel.            | 5.330 | Oculor.             |           |

# INDEX MORBORUM

|                             |       |                         |       |
|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Oculor. destillatio.        |       | Rad. Cyperi.            | 4.61  |
| Fol. gramin.                | 4.77  | imperat.                | 4.85  |
| Flor. Cyani.                | 4.59  | schænanth.              | 4.152 |
| Sal. Zis.                   | 3.397 | Fruct. moschat.         | 4.106 |
| Ocul. Lap. Hæmatit.         | 3.351 | Resin.                  | 4.200 |
| Iachr. Unicorn. foss.       | 3.360 | Offi- Fol. symph.       | 4.163 |
| Ocu- Fol. millefol.         | 4.105 | um Rad. symph.          | 4.163 |
| Ior. Θ. Comm.               | 3.454 | fra- Fruct. bacc. myrt. | 4.109 |
| pteryg. Anim. asini. ungul. | 5.269 | aur. Bals. Tolut.       | 4.185 |
| vulp. fel.                  | 5.313 | Fossil.                 | 3.355 |
| Ocu- Anim. lup. axung.      | 5.301 | Anim. Lardum.           | 5.308 |
| Ior. lip- columb. sang.     | 5.316 | suum. tal.              | 5.308 |
| pitudo. hirundo.            | 5.320 | gall. ov. alb.          | 5.319 |
| Ocul. Fol. euphrag.         | 4.67  | P.                      |       |
| fussus. Anim. columb. sang. | 5.316 | A- Fol. melyss.         | 4.100 |
| Ocul. Θ. Lithargyr.         | 3.460 | rallysis. quinquefol.   | 4.135 |
| Ocul. Fol. hyssop.          | 4.84  | rorismar.               | 4.141 |
| fugill. Sem. fœnu græc.     | 4.70  | salv.                   | 4.145 |
| Oede-Rad. Chin.             | 4.45  | Flor. lil. convall.     | 4.94  |
| matâ. Bals. Tol.            | 4.185 | salv.                   | 4.145 |
| Alumen.                     | 3.478 | spic.                   | 4.160 |
| Oris Fol. ligustr.          | 4.93  | stach.                  | 4.162 |
| exul- Flor. ligustr.        | 4.93  | Rad. chinæ.             | 4.45  |
| cera- ros.                  | 4.139 | cost.                   | 4.54  |
| tio. Sem. aquileg.          | 4.17  | imperat.                | 4.85  |
| Fruct. mor.                 | 4.106 | pyrethri.               | 4.134 |
| Lign. rhod.                 | 4.137 | Fruct. Ceras. dulc.     | 4.41  |
| Anim. anser. ping.          | 5.314 | bacc. laur.             | 4.91  |
| gall. ping.                 | 5.319 | Gumm. animæ.            | 4.148 |
| Diaclysm. refriger.         | 2.224 | sagapen.                | 4.114 |
| Oris Fol. salv.             | 4.145 | Bals. Tolut.            | 4.185 |
| Aph- Flor. salv.            | 4.145 | Anim. asini. urin.      | 5.269 |
| ta. Fruct. rub.             | 4.142 | castor. axung.          | 5.279 |
| Lign. thil.                 | 4.167 | test.                   | 5.279 |
| Spir. alum. dulc.           | 3.479 | pell.                   | 5.279 |
| Oris Fol. rorismar.         | 4.141 | hom. sang. ☉            | 5.292 |
| Sator. Flor. schænanth.     | 4.152 | lync. axung.            | 5.301 |
|                             |       | noct. caro,             | 5.321 |
|                             |       | formic.                 |       |



# ET REMEDIORUM.

|       |                         |       |                                 |        |
|-------|-------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| 4.61  | Formic. acerv.          | 5.342 | bacc. laur.                     | 4.91   |
| 4.85  | Aq. anhaltin.           | 2.134 | Visc. silic.                    | 4.145  |
| 4.152 | carbunc.                | 2.136 | Gumm. Galban.                   | 4.195  |
| 4.166 | imperial.corr.          | 2.144 | Resin. myrrh.                   | 4.200  |
| 4.169 | lavend.comp.            | 2.145 | Tuber. Cerv.                    | 4.225  |
| 4.169 | salv.comp.              | 2.148 | Anim. Bezoar.                   | 5.278  |
| 4.169 | Bals. apoplect.         | 2.156 | cerv. lachr.                    | 5.283  |
| 4.169 | nervin.                 | 2.159 | lap.                            | 5.283  |
| 4.183 | antiparal.              | 2.159 | hom. secund.                    | 5.288  |
| 3.351 | Elix. vit. querc.       | 2.191 | cut.                            | 5.297  |
| 5.308 | Vin. sanct.             | 2.228 | lep. ocul.                      | 5.300  |
| 5.308 | Spir. anteaopl.         | 2.284 | serp. exuv.                     | 5.306  |
| 5.319 | ☉ potab.                | 3.368 | accip. excrem.                  | 5.313  |
| 4.100 | Tinct. Croc.            | 3.412 | vult. fimus.                    | 5.324  |
| 4.135 | Antid. zinzib. & querc. | 3.449 | lucii mandib.                   | 5.330  |
| 4.141 | ☉. cachet. chalyb.      | 3.475 | Lap. Aetites.                   | 3.345  |
| 4.145 | Magist. Oli.            | 3.496 | Aq. imperial. cor.              | 2.144  |
| 4.94  | ☉. gagat.               | 3.516 | Borraz.                         | 2.280  |
| 4.145 | Ol. Eben.               | 4.63  | ▽. destill. ex fl. caprifol.    | 4.35   |
| 4.145 | Elem.                   | 4.194 | Pedi- Anim. Eq. ungul.          | 5.286  |
| 4.160 | Spir. antepilept.       | 5.293 | culi. Min. Mercurius.           | 3.398  |
| 4.162 | Sp. Tart.               | 4.220 | Pedum clavi. Anim. Mul. urina.  | 5.303  |
| 4.45  | Extr. Euphorb.          | 4.255 | Penis Fol. millefol.            | 4.105  |
| 4.54  | Partus Fol. cardiac.    | 4.36  | tumor. vid. luem Vener.         |        |
| 4.85  | difficil. dictamn.      | 4.63  | Peri- Fol. pimpinell.           | 4.124  |
| 4.134 | epat. stell.            | 4.65  | pnev- Rad. pimpinell.           | 4.124  |
| 4.41  | hyperic.                | 4.83  | mo- Sem. urtic.                 | 4.178  |
| 4.91  | ros. ☉                  | 4.141 | nia. Min. Nitrum.               | 3.472  |
| 4.148 | verben.                 | 4.171 | Tinct. ex Sp. sulph. reg. & is. | 3.451  |
| 4.114 | Flor. calth.            | 4.34  | Perni- Rad. Cepæ.               | 4.40   |
| 4.185 | caryophill.             | 4.38  | ones. Anim. cerv. serum.        | 5.283  |
| 5.269 | Croc.                   | 4.55  | lep. cinis.                     | 5.300  |
| 5.279 | hyperic.                | 4.83  | pulmo.                          | 5.300  |
| 5.279 | Jasmin.                 | 4.85  | anser. cutic. ped.              | 5.315  |
| 5.279 | Corr. Cinnamom.         | 4.48  | Ung. ad perniones.              |        |
| 5.292 | Sem. Milii. sol.        | 4.104 | Pestis. Fol. Galeg.             | 4.74   |
| 5.301 | Fruct. Cherm.           | 4.44  | millefol.                       | 4.105  |
| 5.321 | ficus.                  | 4.69  | h                               | nicot. |

4.61  
4.85  
4.152  
4.166  
4.169  
4.169  
4.169  
4.183  
3.351  
5.308  
5.308  
5.319  
4.100  
4.135  
4.141  
4.145  
4.94  
4.145  
4.160  
4.162  
4.45  
4.54  
4.85  
4.134  
4.41  
4.91  
4.148  
4.114  
4.185  
5.269  
5.279  
5.279  
5.279  
5.292  
5.301  
5.321  
formic.

# INDEX MORBORUM

|                         |       |                          |       |
|-------------------------|-------|--------------------------|-------|
| nicot.                  | 4.112 | lap.                     | 5.272 |
| pimpinell.              | 4.124 | capr. Corn.              | 5.275 |
| rof. ☉.                 | 4.141 | rupi-capr. lap.          | 5.276 |
| rutæ.                   | 4.143 | Bezoar. lap.             | 5.278 |
| scab.                   | 4.151 | C.C. uft.                | 5.281 |
| scordii.                | 4.153 | Cervi lachrym.           | 5.283 |
| veron.                  | 4.173 | fang. menft.             | 5.288 |
| Flor. caryophyll. arom. | 4.39  | hom. urin.               | 5.288 |
| croci.                  | 4.55  | mumia Tinct.             | 5.295 |
| scab.                   | 4.151 | ol.                      | 5.296 |
| succif.                 | 4.163 | ariet. cerebr.           | 5.304 |
| Rad. allii.             | 4.12  | rhinocer.                | 5.305 |
| angel.                  | 4.16  | Serpens.                 | 5.306 |
| anthos.                 | 4.18  | taxi fang.               | 5.309 |
| cepa.                   | 4.40  | cacul. theriac.          | 5.310 |
| contrayervæ.            | 4.51  | ciconia.                 | 5.315 |
| fraxinell.              | 4.72  | rinca.                   | 5.334 |
| gentian.                | 4.75  | Lap. Terr. figill.       | 3.318 |
| helenii.                | 4.81  | & chryfolith.            | 3.328 |
| petasit.                | 4.122 | Min. hyacinth.           | 2.328 |
| petrosel. mont.         | 4.123 | rubinus.                 | 3.329 |
| pimpinell.              | 4.124 | saphirus.                | 3.330 |
| icorzon.                | 4.153 | smaragdus.               | 3.331 |
| succif.                 | 4.163 | corall.                  | 3.333 |
| tormentill.             | 4.167 | margar.                  | 3.342 |
| valer.                  | 4.170 | perlar.                  | 3.343 |
| vincetox.               | 4.174 | ophites.                 | 3.355 |
| Sem. napi.              | 4.109 | Mercur.                  | 3.398 |
| petrosel.               | 4.123 | Sp. sulph.               | 3.501 |
| Resin. camphor.         | 4.190 | Ambr.                    | 3.510 |
| Gumm. Lacc.             | 4.196 | Aq. bezoart.             | 2.136 |
| Fruct. Pom. Citr.       | 4.48  | theriacal.               | 2.150 |
| Juglan.                 | 4.87  | El. alexipharm. D. Spin. | 2.180 |
| bacc. Juniper.          | 4.88  | orvietan.                | 2.184 |
| paris.                  | 4.119 | nucum.                   | 2.184 |
| Anim. bovis Corn.       | 5.270 | Elix. alliat.            | 2.187 |
| ungul.                  | 5.270 | citr.                    | 2.187 |
| bufo.                   | 5.272 | camphor.                 | 2.188 |
|                         |       | antepi-                  |       |



# ET REMEDIORUM.

|                                |       |                             |       |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| antepilept. crar.              | 2.189 | Θ. alb. vomit.              | 3.484 |
| Empl. magnet.                  | 2.196 | ~. Θ li diaph.              | 3.490 |
| Extr. Bezoard. querc.          | 2.213 | subin. arsen. diaph.        | 3.499 |
| Pestilent.                     | 2.214 | Fl. Sp. sulph Θ lati.       | 3.502 |
| Tichonis de Brahe.             | 2.215 | ~ Sp. sulph.                | 3.506 |
| Theriac. bened. querc.         | 2.219 | ∇. Sp sulph.                | 3.506 |
| Lap. arsen.                    | 2.281 | ⊙. Sp. sulph. aur.          | 3.507 |
| ol. hyper. comp.               | 2.248 | Bals. Sp sulph. tereb.      | 3.507 |
| antipestilent. Barr. Bona-     |       | Tinct. Sp. sulph. S. Cloff. | 3.508 |
| curfij.                        | 2.248 | Extr. ex Bacc. Juniper.     | 4.88  |
| Pilul. pestilent. comp.        | 2.258 | Essent. camphor.            | 4.192 |
| odorif. Crollii.               | 2.262 | Quint. Essent. vini.        | 4.226 |
| trochisch. alexiter.           | 2.299 | Spir. Man.                  | 4.258 |
| prophilact.                    | 2.300 | Pestis Fol. paris.          | 4.119 |
| Tinct. Talc.                   | 3.359 | bubon. pimpinell.           | 4.124 |
| aurum diaphor. comp.           | 3.369 | & anthrac. rut.             | 4.143 |
| Spir. sudorif. Hi.             | 3.391 | Flor. succif.               | 4.163 |
| ℞. pricip. per ⊙ Sp. sulph.    | 3.    | Rad. petasit.               | 4.122 |
|                                | 400   | pimpinell.                  | 4.124 |
| ℞. rectific.                   | 3.402 | succif.                     | 4.163 |
| Hercul. Bovij.                 | 3.404 | valer.                      | 4.170 |
| Aurum vit. Hartmanni.          | 3.404 | Fruet. ficus.               | 4.69  |
| ℞. vit.                        | 3.410 | Anim. capr. sterc.          | 5.276 |
| Bezoard. miner.                | 3.411 | cochlea.                    | 5.284 |
| solar. Crollii.                | 3.413 | hom. sang. menst.           | 5.288 |
| Vitrum ℞ ij.                   |       | sterc.                      | 5.291 |
| hyacinth.                      | 3.422 | mumia.                      | 5.293 |
| Croc. Metall.                  | 3.426 | gallin.                     | 5.318 |
| ⊙. ℞. sach. querc.             | 3.436 | ostrea.                     | 5.331 |
| Panacæa. Sp. sulph. ℞ ij. ver. | 3.444 | Ol. Sp. sulph linat.        | 3.506 |
| Tinct. ex vitr. ℞ ij. ⊙.       | 3.446 | Sp. Tart. rub.              | 3.507 |
| Antid. ζωφιλ. querc.           | 3.449 | Galban.                     | 4.195 |
| Isochrystos.                   | 3.450 | Phre-Sem. cucum.            | 4.56  |
| Tinct. ex ℞. ℞ ij. cum ⊙.      | 3.451 | nitis. cucurb.              | 4.57  |
| ∇. benedict.                   | 3.453 | Anim. bufo.                 | 5.272 |
| ~ Θ. dulc.                     | 3.467 | ovis pulm.                  | 5.304 |
| Cryst. Θ. com. dulc.           | 3.468 | columba.                    | 5.316 |
| Extr. Θ.                       | 3.470 | gallina.                    | 5.318 |
|                                |       | h 2                         | Lap   |

# INDEX MORBORUM

|                       |       |                    |       |
|-----------------------|-------|--------------------|-------|
| Lap. sinaragdu. præp. | 3.332 | Musc. pulm. arbor. | 4.133 |
| Laudan. op.           | 4.204 | Sem. anisi.        | 4.17  |
| Phthi- Fol. adianth.  | 4.8   | bombac.            | 4.29  |
| sis. alfin.           | 4.12  | erysimi.           | 4.66  |
| arist.                | 4.19  | fœnic.             | 4.70  |
| basil.                | 4.25  | lini.              | 4.95  |
| erysim.               | 4.66  | melon.             | 4.101 |
| filipend.             | 4.69  | nast. hort.        | 4.110 |
| fœnic.                | 4.70  | nigell.            | 4.113 |
| heder.                | 4.79  | papav. sat.        | 4.117 |
| hispid.               | 4.81  | Fruct. ficus.      | 4.69  |
| hyssop.               | 4.84  | jujub.             | 4.87  |
| jaceæ.                | 4.84  | pinæ.              | 4.125 |
| malv.                 | 4.98  | pistac.            | 4.126 |
| marrub.               | 4.99  | Resin. benzoin.    | 4.188 |
| nast. hort.           | 4.110 | terebinth.         | 4.210 |
| numul.                | 4.114 | Gumm. ammon.       | 4.182 |
| pimpinell.            | 4.124 | lacc.              | 4.166 |
| porri.                | 4.130 | Bals. ver.         | 4.185 |
| prunell.              | 4.131 | tolut.             | 4.185 |
| pulmon.               | 4.134 | indic.             | 4.186 |
| quinquefol.           | 4.135 | Anim. afin. lac.   | 5.269 |
| ros. ☉.               | 4.140 | canin axung.       | 5.275 |
| sangui sorb.          | 4.147 | rup. capr. ser.    | 5.277 |
| fymph.                | 4.163 | cochleæ.           | 5.288 |
| veron.                | 4.173 | equi lac.          | 5.285 |
| Flor. papav. err.     | 4.118 | hom. sang. dest.   | 5.292 |
| rosar.                | 4.139 | ☉.                 | 5.292 |
| stach.                | 4.136 | mumiæ Tinct.       | 5.291 |
| viol.                 | 4.149 | serpens.           | 5.306 |
| Rad. fœnic.           | 4.70  | taxus.             | 5.309 |
| glycyrrhic.           | 4.76  | gall. vet. jus.    | 5.318 |
| ircos flor.           | 4.86  | apum. mel.         | 5.334 |
| peuced.               | 4.124 | Min. Ophites.      | 3.355 |
| pimpinell.            | 4.124 | Sp. sulph.         | 3.501 |
| porr.                 | 4.130 | Aq. Asthmat.       | 2.315 |
| pyrethri.             | 4.134 | antihect.          | 2.143 |
| fymphit.              | 4.163 | pect. Horneck.     | 2.146 |
|                       |       | Elect.             |       |



# ET REMEDIORUM.

|                              |       |                           |       |
|------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Elect. contr. Phthif.        | 2.185 | lini.                     | 4.95  |
| Extr. pulm.                  | 2.215 | pastin.                   | 4.120 |
| rot pector.                  | 2.238 | fylv.                     | 4.120 |
| Syr. de Erysim. Lob.         | 2.292 | urtic.                    | 4.178 |
| pedecat.                     | 2.294 | Fruet. jujub.             | 4.87  |
| testudin.                    | 2.294 | pom. dulc.                | 4.129 |
| Unguent. virid. potab.       | 2.311 | Gumm. sagapen.            | 4.114 |
| ∇. Hi.                       | 3.392 | Resin. myrrh.             | 4.200 |
| Tinct. Hi.                   | 3.392 | Anim. apri dens.          | 5.268 |
| ex vitr. § ij.               | 3.445 | hom. sang. ☉.             | 5.292 |
| Bals. reg. § ij.             | 3.448 | lup. off.                 | 5.301 |
| Tinct. ex Sp. sulph. reg. ℥. | 3.441 | pavo.                     | 5.323 |
| rub. arsen. diaph.           | 3.499 | cancr. ocul.              | 5.326 |
| Fl. Sp. sulph. ☉ li.         | 3.502 | lucii mand.               | 5.330 |
| fach.                        | 3.503 | Lap. lyncis.              | 3.354 |
| Lac. Sp. sulph.              | 3.504 | ophites.                  | 3.355 |
| Sp. sulph.                   | 3.506 | Nitrum.                   | 3.472 |
| Bals. Sp. sulph. Tereb.      | 3.507 | Emulsio refrig.           | 2.203 |
| Tinct. Sp. sulph. S. Oloff.  | 3.508 | Spir. anteaoplect.        | 2.203 |
| Syr. nicot.                  | 4.112 | Crocus metall.            | 3.426 |
| ol. oliv.                    | 4.115 | Tinct. ex vitr. § ij.     | 3.445 |
| Pica. Fol. vitis.            | 4.174 | Sp. sulph. reg. ℥.        | 3.451 |
| Fruet. granat.               | 4.77  | Infus. vitr. § ij.        | 3.452 |
| Pleu- Fol. alth.             | 4.12  | ∇. benedict.              | 3.453 |
| ritis.                       |       | Cryst. § ij.              | 3.454 |
| brassic.                     | 4.30  | ☉.                        | 3.476 |
| card. ben.                   | 4.37  | Magist. succ. dulc.       | 3.512 |
| loti.                        | 4.96  | Syr. fl. acac.            | 4.6   |
| rut.                         | 4.143 | ol. lin.                  | 4.25  |
| rut. mur.                    | 4.144 | sesam.                    | 4.157 |
| Flor. acac.                  | 4.6   | Poly-Succ. inspiss. nast. | 4.110 |
| jasmín.                      | 4.84  | pus. Mors. purg.          | 2.236 |
| loti.                        | 4.66  | Pur- Fol. agerat.         | 4.10  |
| papav. err.                  | 4.118 | gantia. betæ.             | 4.27  |
| viol.                        | 4.174 | Flor. acac.               | 4.6   |
| Rad. valer.                  | 4.170 | bellid.                   | 4.26  |
| Sem. card. mar.              | 4.37  | Fruet. balan. Myrep.      | 4.24  |
| cucum.                       | 4.56  | bacc. hed.                | 4.80  |
| fraxin.                      | 4.72  | h 2                       | Succ. |

# ET REMEDIORUM.

|                                    |           |                            |       |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|-------|
| Succ. aloes.                       | 4.252     | Succ. scammon.             | 4.258 |
| Min. Antimon.                      | 3.422     | Mors. de diagrid.          | 2.237 |
| ℞. præcip.                         | 3.401.402 | Pilul. Sp. Tart. querc.    | 2.259 |
| Aurum vit. Cloff.                  | 3.405     | Pot. purg.                 | 2.261 |
| ℞. dulc. vulg.                     | 3.406     | Pulv. passavant.           | 2.275 |
| subl. dulc. Talc.                  | 3.407     | Syr. helleb. querc.        | 2.294 |
| Mercur. ☿ rub.                     | 3.408     | Pur- Fol. Epyth.           | 4.239 |
| panacæa. ℞ ij                      | 3.409     | gant. Rad. helleb.         | 4.236 |
| ℞. vit.                            | 3.410     | Me- Fruct. Myrob. nigr.    | 4.245 |
| Correct.                           | 3.411     | lan- Lap. armen.           | 3.346 |
| Cinnab. præcip. Hartman.           | 3.420     | chol. Vin. Clar. lax.      | 2.228 |
| ☿ li purgans.                      | 3.425     | Pil. Arthrit. Schôff.      | 2.253 |
| Crocus. ℞ ij. regul.               | 3.427     | potio purg.                | 2.261 |
| ℞. rub. fix.                       | 3.430     | Syr. holagogus.            | 2.295 |
| fl. ℞. fix.                        | 3.434     | Pur- Fol. Sem. Cataput.    | 4.233 |
| ☿ ℞ ij. sach. querc.               | 3.436     | gant Fung. agar.           | 4.230 |
| Spir. sulphur. ex Minerv. ℞ ij. 3. | 441       | phleg- Mors. de Mechoac.   | 2.237 |
| Tinct. ex vitr. ℞ ij. ☉            | 3.446     | ma. Pulv. phlegmagog salæ. | 2.273 |
| ℞ io calcin.                       | 3.448     | Syr. helleb. min querc.    | 2.294 |
| fl. ℞ ij.                          | 3.448     | Purg. Fol. sen.            | 4.248 |
| ol. ℞ ij.                          | 3.450     | pituit. Flor. cent.        | 4.40  |
| Sp. sulph. ℞ ij.                   | 3.451     | Rad. asar.                 | 4.230 |
| Crystal. ℞ ij.                     | 3.454     | bryon.                     | 4.231 |
| Extr. marcas.                      | 3.457     | hermodact.                 | 4.242 |
| Cryst. ☉. Nitr.                    |           | mechoac.                   | 4.242 |
| Syr. fl. acac.                     | 4.6       | polypod.                   | 4.245 |
| Pur- Fol. gratiol.                 | 4.241     | turpeth.                   | 4.250 |
| gant. Flor. cent.                  | 4.40      | Cort. esul.                | 4.239 |
| bilem. Rad. asar.                  | 4.230     | Sem. cartham.              | 4.232 |
| polypod.                           | 4.245     | ricin.                     | 4.247 |
| rhabarb.                           | 4.246     | Fruct. Myr. bellyr.        | 4.245 |
| Sem. cataput.                      | 4.233     | colocynth.                 | 4.234 |
| psylli.                            | 4.246     | spin. infect.              | 4.249 |
| ricin.                             | 4.247     | Vin. clar. lax.            | 2.228 |
| Fruct. spin. infect.               | 4.249     | Pilul. arthrit. D. Schôff. | 2.213 |
| ramarind.                          | 4.251     | Potio purg.                | 2.261 |
| myrob. citr.                       | 4.245     | Pulv. sternut. Ruland.     | 2.275 |
|                                    |           | Ol. ebul.                  | 4.235 |
|                                    |           | Serum                      |       |



# INDEX MORBORUM

4.258  
 2.237  
 2.259  
 2.261  
 2.275  
 2.294  
 4.199  
 4.116  
 4.115  
 3.146  
 2.128  
 2.153  
 2.261  
 2.295  
 4.253  
 4.250  
 2.237  
 2.273  
 2.294  
 4.148  
 4.40  
 4.239  
 4.251  
 4.242  
 4.142  
 4.245  
 4.250  
 4.259  
 4.252  
 4.247  
 4.245  
 4.234  
 4.249  
 2.228  
 2.213  
 2.261  
 2.275  
 4.255  
 Serum

Serum Fol. epyth. 4.239  
 purg. gratiol. 4.241  
 Rad. asar. 4.231  
 Jalapp. 4.242  
 Mechoac. 4.242  
 Cort. Esul. 4.239  
 frang. 4.241  
 Sem. Cataput. 4.233  
 Fruct. spin. infect. 4.249  
 Fung. agar. 4.230  
 Gumm. Gith. 4.256  
 Elater. 4.253  
 Euphorb. 4.254  
 Manna. 5.257  
 scammon. 4.258

**R** Au-Fol. malv. 4.98  
 cedo. spinach. 4.162  
 verben. 4.171  
 Flor. viol. 4.174  
 Rad. liquirit. 4.76  
 rap. 4.137  
 Sem. papav. sat. 4.117  
 Fruct. dactyl. 4.117  
 Lachr. sach. 4.214  
 Resin. Myrrh. 4.200  
 styr. cal. 4.216  
 Gumm. arab. 4.184  
 tragac. 4.224  
 Mann. 4.257  
 Syr. de Erysim. Lobelii. 2.292  
 Bacul. pect. 2.300

Re- Fol. equiset. 4.66  
 num Fruct. pineæ. 4.125  
 ulce- Anim. asin. lac. 4.269  
 ra. Oo. 5 ij. diaph. dulc. 3.415  
 Liquor. 5 ij. præcip. 3.417

Refol. Fol. basilic. 4.26  
 ventia. betul. 4.28  
 laur. 4.91  
 Flor. sambuc. 4.147  
 Rad. acori adult. 4.8  
 armorac. 4.20  
 ari. 4.21  
 Sem. basil. 4.26  
 cumin. 4.56  
 Fruct. bacc. laur. 4.91  
 Resin. ambr. liq. 4.198  
 tacamahac. 4.217  
 Gumm. ammon. 4.182  
 animæ. 4.184  
 elemi. 4.194  
 galban. 4.195  
 Anim. vacc. butyr. 5.271  
 hom. urin. 5.288  
 ovis æsypus. 5.304  
 viper. spir. 5.310  
 urst ping. 5.312  
 anat. adeps. 5.314  
 anser. ping. 5.314  
 Rha- Fol. Dipfac. 4.63  
 gades. Anim. canis. cap. 5.274  
 Rugæ Lap. specular. 3.356  
 faciei. Talcum. 3.357  
 Ruct. Infusio vitr. 5 ij. 3.452

**S** Anguin. coagulat. solvunt. 4.20  
 Fol. Arnica. 4.42  
 cerefol. 4.83  
 hyperic. 4.131  
 prunell. 4.83  
 Flor. hyperic. 4.131  
 prunell. 4.163  
 stæch. citr. 4.163  
 succis. Rad.

# INDEX MORBORUM

|                        |       |                         |       |
|------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Rad. caryoph.          | 4.39  | scrophul.               | 4.151 |
| fumar. bulb.           | 4.73  | Tamar.                  | 4.164 |
| Rhapont.               | 4.188 | ellebor.                | 4.236 |
| rubia.                 | 4.142 | alb.                    | 4.237 |
| succif.                | 4.163 | Turb.                   | 4.230 |
| Fruct. alkekengi.      | 4.11  | Cort. Tamarisc.         | 4.164 |
| Lign. Phil.            | 4.167 | Sem. avena.             | 4.22  |
| Anim. Canin. axung.    | 5.174 | Musc. lichen.           | 4.92  |
| hircin. sang.          | 5.275 | Fruct. Balan. Myreps.   | 4.24  |
| hom. cadaver.          | 5.294 | juglans.                | 4.87  |
| lepor. coag.           | 5.390 | rubr.                   | 4.164 |
| lup. essent. sang.     | 5.301 | colocynth.              | 4.234 |
| cancr. oculi.          | 5.376 | Lign. Tamar.            | 4.164 |
| Min. terr. Japon.      | 3.320 | Gumm. Gith.             | 4.256 |
| Sperm. Ceti.           | 3.514 | Anim. asini urina.      | 5.269 |
| Antid. sochryfos.      | 3.450 | canin. axung.           | 5.274 |
| ▽. benedict.           | 3.453 | hom. urina.             | 5.288 |
| ⊖. li. Tart. satus.    | 3.489 | hom. sang.              | 5.292 |
| Spir. vin.             | 4.226 | serpens.                | 5.306 |
| Sea- Fol. Arist. long. | 4.19  | vulp. sterc.            | 5.313 |
| bies. Berula.          | 4.28  | gall. sterc.            | 5.319 |
| chamaedr.              | 4.42  | cancr. putam.           | 5.326 |
| cuscuta.               | 4.58  | ceti axung.             | 5.327 |
| fumar.                 | 4.72  | ranar. sperm.           | 5.332 |
| gallii.                | 4.74  | sepiæ os.               | 5.333 |
| lapathi.               | 4.90  | Min. sal. comm.         | 3.464 |
| lentis.                | 4.91  | amianthy.               | 3.346 |
| nasturt. hort.         | 4.110 | Mercurius.              | 3.398 |
| sabin.                 | 4.144 | cinnabr.                | 3.419 |
| scabios.               | 4.151 | Decoct. ♂ ial. D. Horn. | 2.175 |
| veronic.               | 4.173 | unguent. contr. scab.   | 2.209 |
| epythym.               | 4.239 | Lap. medicament.        | 2.231 |
| Flor. scabios.         | 4.151 | Spir. terræ alcalis.    | 3.318 |
| Rad. allii.            | 4.12  | Merc. præc. Sp. sulph.  | 3.400 |
| fumar. bulb.           | 4.73  | ♂ in ⊖ li. sol.         | 3.407 |
| helenii.               | 4.81  | ♂ argent.               | 3.408 |
| imperat.               | 4.85  | ♂ = rubeus.             | 3.408 |
| polygonat.             | 4.128 | Ol. fragrans.           | 3.416 |
|                        |       | Sal.                    |       |



# ET REMEDIORUM.

|       |                              |       |                          |           |
|-------|------------------------------|-------|--------------------------|-----------|
| 4.157 | Sal. ꝑ ij.                   | 3.418 | Spir.                    | 4.226     |
| 164   | ꝑ diaphor.                   | 3.427 | Schir-Rad.Chinæ.         | 4.45      |
| 336   | Diaph. regulin.              | 3.429 | rhus. Balf. Tereb.       | 4.211     |
| 37    | Balf. vitæ basilii.          | 3.444 | Sacch. saturn.           | 3.390     |
| 41    | Tinct. ex vitr. ꝑ ij.        | 3.445 | Anim. Bovis adeps.       | 5.270     |
| 410   | ∇. vitriol.                  | 4.487 | Scro- Balf. Tolutan.     | 4.185     |
| 411   | ∇. vitriol.                  | 3.488 | phul. Anim. Bezoar. lap. | 5.278     |
| 491   | ∇. li Sp. Tart.              | 3.489 | hom. sudor.              | 5.287     |
| 494   | ∇. Sp. Tart.                 | 4.220 | ov. sterc.               | 5.304     |
| 48    | Magist. marcasit.            | 3.456 | Cristall. ꝑ.             | 3.396     |
| 4.164 | ⊖ Sp. Tart.                  | 4.221 | Antid. Naryxens. Ⓞ.      | 3.450     |
| 4234  | Scor- Fol. anagall. aq.      | 4.15  | Antid. Isochryfos.       | 3.45      |
| 4.164 | butus. chamædr.              | 4.42  | Secun- Fol. artemis.     | 4.20      |
| 4.256 | chelidon.                    | 4.44  | din. pel- levist.        | 4.92      |
| 5.269 | cochlear.                    | 4.49  | lunt. meliss.            | 4.100     |
| 5.274 | fumar.                       | 4.72  | Flor. cheir.             |           |
| 5.288 | nasturt. aquat.              | 4.110 | Rad. fum. bulb.          | 4.73      |
| 5.291 | nasturt. hort.               | 4.110 | levist.                  | 4.92      |
| 5.306 | nummul.                      | 4.114 | Sem. levist.             | 4.92      |
| 5.313 | portulac.                    | 4.130 | Anim. Equi testes        | 5.286     |
| 5.319 | vermic.                      | 4.172 | lep. oculi.              | 5.300     |
| 5.326 | soldanell.                   | 4.249 | anser. sterc.            | 5.315     |
| 5.327 | Flor. Centaur.               | 4.40  | mustel. ventric.         | 5.330     |
| 5.332 | Rad. raphan. marin.          | 4.136 | cimex.                   | 5.345     |
| 5.333 | polypod.                     | 4.245 | Ser- Lap. medicament.    | 2.231.232 |
| 3.464 | Anim. hom. urina.            | 5.290 | pigi- Liquor. aduicer.   | 2.232     |
| 3.346 | • anser. sterc.              | 5.315 | nes. Ⓞ Ⓞ. anodyn         | 3.500     |
| 3.398 | Sem. aquileg.                | 4.19  | ⊖. Sp. Tart.             | 4.222     |
| 3.419 | ∇. antiscorbut.              | 2.148 | Siccan-Fol. abrotan.     | 4.4       |
| 2.173 | Elect. scorbut.              | 2.186 | tia. absynth.            | 4.4       |
| 2.209 | Diaclysm. antiscor. S. Clof. | 2.225 | pontic.                  | 4.5       |
| 2.231 | Tinct. ex flor. ꝑ ij.        | 3.448 | acaciæ.                  | 4.6       |
| 3.318 | Nitrum ⊖ latum.              | 3.474 | acetosæ.                 | 4.7       |
| 3.400 | ⊖. chalyb. cach.             | 3.475 | adianthi.                | 4.8       |
| 3.407 | Crist. alum.                 | 3.479 | agerat.                  | 4.10      |
| 3.408 | Tinct. Sp. sulph. S. Clof.   | 3.508 | agrimon.                 | 4.11      |
| 3.408 | ∇. Sp. Tart.                 | 4.220 | alth.                    | 4.12      |
| 3.416 | Tinct. Spir. Tart.           | 4.222 | anagall.                 | 4.15      |
| Sal.  |                              |       | i                        | aneth.    |

# INDEX MORBORUM

|               |      |               |       |
|---------------|------|---------------|-------|
| aneth.        | 4.16 | hormin.       | 4.82  |
| anserin.      | 4.17 | hyofcyam.     | 4.82  |
| aquileg.      | 4.19 | hyperic.      | 4.83  |
| aristoloch.   | 3.19 | hyfop.        | 4.84  |
| arnic.        | 4.20 | Jaceæ.        | 4.84  |
| arthemif.     | 4.20 | lactuca.      | 4.89  |
| ari.          | 4.21 | lagopi.       | 4.90  |
| auric. mur.   | 4.24 | laur.         | 4.91  |
| beton.        | 4.28 | levift.       | 4.92  |
| betul.        | 4.28 | liguft.       | 4.93  |
| branc. urf.   | 4.30 | linar.        | 4.95  |
| brassic.      | 4.30 | lot.          | 4.96  |
| burf. paf.    | 4.31 | majoran.      | 4.96  |
| calcatripp.   | 4.33 | marrub.       | 4.99  |
| calamenth.    | 4.33 | meliff.       | 4.100 |
| cardiac.      | 4.36 | menth.        | 4.102 |
| chamædr.      | 4.42 | menth. farac. | 4.102 |
| chamepyth.    | 4.42 | mercur.       | 4.103 |
| cerefol.      | 4.42 | millefol.     | 4.105 |
| chelidon.     | 4.43 | myrr.         | 4.109 |
| cichor.       | 4.46 | nafurt. aq.   | 4.110 |
| cochlear.     | 4.49 | nafurt. hort. | 4.110 |
| cuscut.       | 4.58 | neperæ.       | 4.111 |
| Dictamn.      | 4.62 | nicot.        | 4.112 |
| ebul.         | 4.62 | nummul.       | 4.114 |
| endiv.        | 4.64 | oleæ.         | 4.114 |
| hepat. Nobil. | 4.65 | organ.        | 4.116 |
| equifet.      | 4.65 | paftinac.     | 4.120 |
| eryfim.       | 4.66 | perfoliat.    | 4.121 |
| cupat.        | 4.67 | perfic.       | 4.122 |
| euphrag.      | 4.67 | petrof.       | 4.122 |
| filipend.     | 4.69 | mont.         | 4.123 |
| fœnic.        | 4.70 | pimpinell.    | 4.124 |
| fragar.       | 4.71 | pinafr.       | 4.125 |
| fraxin.       | 4.71 | plantag.      | 4.126 |
| geran.        | 4.76 | polygoni.     | 4.128 |
| heder.        | 4.79 | porri.        | 4.130 |
| hed. arbor.   | 4.80 | portu-        |       |



# ET REMEDIORUM.

|             |       |
|-------------|-------|
| portulac.   | 4.130 |
| prim. ver.  | 4.131 |
| prunell.    | 4.131 |
| puleg.      | 4.133 |
| pulm.       | 4.134 |
| pyrol.      | 4.134 |
| querc.      | 4.135 |
| rhuis.      | 4.138 |
| ros. ☉.     | 4.140 |
| rosmarin.   | 4.141 |
| rutæ.       | 4.143 |
| rutæ. mur.  | 4.144 |
| sabin.      | 4.144 |
| salic.      | 4.145 |
| salvia.     | 4.145 |
| sanguisorb. | 4.147 |
| sanic.      | 4.148 |
| saponis.    | 4.149 |
| satureja.   | 4.150 |
| saxifrag.   | 4.151 |
| scabios.    | 4.151 |
| scolopendr. | 4.152 |
| scordii.    | 4.153 |
| serpill.    | 4.156 |
| siliq.      | 4.158 |
| tanacet.    | 4.165 |
| tarax.      | 4.165 |
| thlasp.     | 4.166 |
| teucris.    | 4.166 |
| thymi.      | 4.166 |
| verbasc.    | 4.171 |
| verben.     | 4.171 |
| vermic.     | 4.172 |
| veron.      | 4.172 |
| vinc.       | 4.174 |
| virg. aur.  | 4.176 |
| ulmar.      | 4.177 |
| urtic.      | 4.178 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| mortua.          | 4.179 |
| Epythym.         | 4.239 |
| foldanell.       | 4.249 |
| Flor. Agerat.    | 4.10  |
| amaranth.        | 4.10  |
| aquileg.         | 4.19  |
| bellid.          | 4.26  |
| beton.           | 4.28  |
| calthæ.          | 4.34  |
| capr. fol.       | 4.35  |
| caryophill.      | 4.38  |
| centaur. min.    | 4.40  |
| chamomill.       | 4.43  |
| cheyri.          | 4.45  |
| cichor.          | 4.46  |
| croc.            | 4.54  |
| cyan.            | 4.58  |
| cynogloss.       | 4.59  |
| ebul.            | 4.64  |
| epat. Nob.       | 4.65  |
| eupat.           | 4.67  |
| genist.          | 4.75  |
| hormin.          | 4.82  |
| hyperic.         | 4.85  |
| lilior. convall. | 4.94  |
| ligust.          | 4.93  |
| loti.            | 4.96  |
| lupul.           | 4.96  |
| matric.          | 4.99  |
| prim. ver.       | 4.131 |
| prunell.         | 4.131 |
| salvia.          | 4.145 |
| scabios.         | 4.150 |
| spic.            | 4.160 |
| stach.           | 4.162 |
| citr.            | 4.163 |
| succis.          | 4.164 |
| tanacet.         | 4.165 |
| thil.            |       |

# INDEX MORBORUM

|                |       |                |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| Thil.          | 4.166 | levist.        | 4.92  |
| verbasc.       | 4.171 | mei.           | 4.104 |
| veron.         | 4.172 | mori.          | 4.105 |
| virg.aur.      | 4.176 | nymph.         | 4.114 |
| Rad. acori.    | 4.8   | ononyd.        | 4.116 |
| adult.         | 4.8   | petasit.       | 4.122 |
| alii.          | 4.12  | petroselin.    | 4.122 |
| angel.         | 4.16  | peucedan.      | 4.123 |
| anthor.        | 4.18  | pimpinell.     | 4.124 |
| apii.          | 4.18  | peonia.        | 4.127 |
| aristoloch.    | 4.19  | porri.         | 4.130 |
| armorac.       | 4.20  | ptarmic.       | 4.132 |
| asparag.       | 4.22  | pyrethr.       | 4.134 |
| bardan.        | 4.25  | raphan.        | 4.163 |
| minor.         | 4.25  | marin.         | 4.136 |
| betæ.          | 4.28  | rhapont.       | 4.138 |
| bistorta.      | 4.29  | rubia.         | 4.142 |
| calam. aromat. | 4.32  | rusc.          | 4.143 |
| carlin.        | 4.37  | scyllæ.        | 4.154 |
| caryophilata.  | 4.39  | sesel. Mass.   | 4.158 |
| cepæ.          | 4.40  | spica celtic.  | 4.161 |
| chelidon.      | 43    | indic.         | 4.161 |
| eichor.        | 46    | fuccif.        | 4.163 |
| cost.          | 4.54  | tamarisc.      | 4.164 |
| cuccum.        | 4.58  | tarax.         | 4.165 |
| cyclam.        | 4.59  | tormentil.     | 4.167 |
| cyper.         | 4.61  | valerian.      | 4.170 |
| doron.         | 4.63  | verbasc.       | 4.171 |
| filipend.      | 4.69  | victor.        | 4.173 |
| filic.         | 4.70  | vincetox.      | 4.174 |
| fraxinell.     | 4.72  | urtic.         | 4.178 |
| fum. bulb.     | 4.73  | Zedoar.        | 4.179 |
| galang.        | 4.73  | asar.          | 4.230 |
| gentian.       | 4.75  | Mechoac.       | 4.242 |
| gramin.        | 4.77  | Cort. abietis. | 4.3   |
| helen.         | 4.80  | cappar.        | 4.34  |
| hyosciami.     | 4.82  | cinnam.        | 4.48  |
| ireos.         | 4.86  | ebul.          | 4.64  |
|                |       | fraxin.        |       |



# ET REMEDIORUM.

|         |                  |       |                  |       |
|---------|------------------|-------|------------------|-------|
| 4.92    | fraxin.          | 4.71  | macedon.         | 4.123 |
| 4.104   | mandragor.       | 4.98  | porri.           | 4.130 |
| 4.105   | pinastr.         | 4.125 | portulac.        | 4.130 |
| 4.104   | sassafras.       | 4.150 | raphan.          | 4.136 |
| 4.116   | tamarisc.        | 4.164 | rapi.            | 4.137 |
| 4.122   | Sem. agni casti. | 4.10  | rhuis.           | 4.138 |
| 4.122   | ammi. ver.       | 4.13  | santonie.        | 4.148 |
| 4.133   | aneth.           | 4.16  | sesel.           | 4.157 |
| 4.124   | apii.            | 4.18  | Maff.            | 4.158 |
| 4.127   | aquileg.         | 4.19  | Cretic.          | 4.158 |
| 4.130   | asparag.         | 4.22  | finap.           | 4.159 |
| 4.132   | cannabis.        | 4.35  | thlasph.         | 4.166 |
| 4.134   | card. bened.     | 4.36  | urtic.           | 4.178 |
| 4.163   | card. mar.       | 4.36  | cataput.         | 4.233 |
| 4.136   | cari.            | 4.37  | ricin.           | 4.247 |
| 4.138   | cerefol.         | 4.42  | Musc. corall.    | 4.51  |
| 4.142   | coriandr.        | 4.52  | lichen.          | 4.92  |
| 4.143   | cumin.           | 4.56  | terrest.         | 4.108 |
| 4.154   | dauc.            | 4.62  | pulm.            | 4.133 |
| 4.158   | endiv.           | 4.64  | Fung. agaric.    | 4.230 |
| 4.161   | eruc.            | 4.66  | Fruct. alkekeng. | 4.11  |
| 4.161   | erysim.          | 4.66  | amygd. amar.     | 4.14  |
| 4.163   | genist.          | 4.75  | anacard.         | 4.14  |
| 4.164   | hordei.          | 4.82  | cardam.          | 4.16  |
| 4.169   | hyosciam.        | 4.82  | ceras. acid.     | 4.41  |
| 4.167   | lactuc.          | 4.89  | chermes.         | 4.44  |
| 4.170   | levist.          | 4.92  | cicer.           | 4.46  |
| 4.171   | majoran.         | 4.96  | corn.            | 4.52  |
| 4.173   | mili.            | 4.104 | cubeb.           | 4.56  |
| 4.174   | mili $\odot$ .   | 4.104 | cupress.         | 4.57  |
| 4.178   | napi.            | 4.109 | cydon.           | 4.61  |
| 4.179   | nasturt. hort.   | 4.110 | fabar.           | 4.68  |
| 4.230   | nigell.          | 4.113 | juglan.          | 4.87  |
| 4.242   | nymph.           | 4.114 | bacc. Juniper.   | 4.88  |
| 4.3     | pastinac.        | 4.120 | pom. momort.     | 4.105 |
| 4.34    | pastinac. sylv.  | 4.120 | laur.            | 4.91  |
| 4.48    | perfoliat.       | 4.121 | mesp.            | 4.103 |
| 4.64    | petrosel.        | 4.122 | mosc.            | 4.106 |
| fraxin. |                  |       |                  | mor.  |

# INDEX MORBORUM

|                   |       |                       |       |
|-------------------|-------|-----------------------|-------|
| mor.              | 4.106 | Succ. Acetum.         | 4.180 |
| bacc. myrtill.    | 4.109 | hypocist.             | 196   |
| bacc. myrt.       | 4.109 | omphac.               | 4.201 |
| paris.            | 4.119 | aloes.                | 4.252 |
| nucl. pers.       | 4.121 | Anim. canin. sterc.   | 5.274 |
| piper.            | 4.126 | capr. sterc.          | 5.276 |
| rhib.             | 4.139 | castor. test.         | 5.276 |
| rub.              | 4.143 | Zibeth.               | 5.281 |
| forb.             | 4.160 | cervor. lachr.        | 5.283 |
| Lanug. Bombac.    | 4.29  | cochl. cinis.         | 5.284 |
| Lign. Agallochum. | 4.9   | ebur.                 | 5.285 |
| colubrin.         | 4.50  | hom. urin.            | 5.288 |
| cupress.          | 4.57  | hom. off.             | 5.297 |
| guajac.           | 4.78  | mosch.                | 5.302 |
| Juniper.          | 4.88  | anser. sterc.         | 5.315 |
| nephrit.          | 4.111 | cancr. ocul.          | 5.326 |
| rhodii.           | 4.137 | cancr. cinis.         | 5.326 |
| santal.           | 4.148 | conch. testæ.         | 5.328 |
| tamarisc.         | 4.164 | lucii mandib.         | 5.330 |
| Lachr. bdellii.   | 4.187 | ichthyocola.          | 5.329 |
| sang. dracon.     | 4.114 | sepiæ os.             | 5.333 |
| sarcocoll.        | 4.215 | apum mel.             | 5.334 |
| Bals. Tolut.      | 4.185 | cantharides.          | 5.340 |
| indicum.          | 4.186 | formic.               | 5.342 |
| Resin. Benzoin.   | 4.187 | acervus.              | 5.342 |
| carann.           | 4.192 | teredo.               | 5.347 |
| colophon.         | 4.193 | Spir. terebint.       | 4.211 |
| ladan.            | 4.197 | Spir. vini.           | 4.226 |
| myrrh.            | 4.200 | Sin- Fol. menth.      | 4.102 |
| styrac. cal.      | 4.216 | gul- Sem. aneth.      | 4.16  |
| tacamahac.        | 4.217 | tus, coriandr.        | 4.52  |
| Thur.             | 4.223 | dauci.                | 4.62  |
| Gumm. Juniper.    | 4.88  | pastinac.             | 4.120 |
| Ammoniac.         | 4.182 | Fruct. cydon.         | 4.61  |
| Galban.           | 4.195 | Unguent. butyr. Nerv. | 2.307 |
| mastich.          | 4.199 | Solis Fol. lagopi.    | 4.90  |
| Pissasphalt.      | 4.208 | ardor. fabar.         | 4.68  |
| sagapen.          | 4.214 | ▽. flor. fabar.       | 4.68  |
|                   |       | Spasmus.              |       |



# ET REMEDIORUM.

|                             |                       |       |                      |       |
|-----------------------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|
| Spaf- mus.                  | Fol. serpill.         | 4.156 | plantag.             | 4.127 |
|                             | Flor. spic.           | 4.160 | pulmon.              | 4.134 |
|                             | Rad. fefel. Mass.     | 4.158 | quinquefol.          | 4.135 |
|                             | Sem. fefel. Mass.     | 4.158 | scolopendr.          | 4.152 |
|                             | Resin. tacamahac.     | 4.217 | senecii.             | 4.156 |
|                             | Gumm. sagapen.        | 4.114 | serpil.              | 4.156 |
|                             | Anim. alc. nerv.      | 5.268 | vinc.                | 4.173 |
|                             | bubul. corn. & ung.   | 5.272 | vitis.               | 4.175 |
|                             | lync. unguis.         | 5.301 | virg.                | 4.176 |
|                             | anser. ping.          | 5.314 | ulmar.               | 4.177 |
|                             | lumbic.               | 3.44  | Flor. Amaranthi.     | 4.13  |
|                             | Min. hyacinthus.      | 3.328 | papav. err.          | 4.118 |
|                             | ∇. antispasim.        | 2.134 | verbasc.             | 4.171 |
|                             | ⊙. Gagatis.           | 3.516 | virg. aureæ.         | 4.176 |
|                             | ⊙. lauri.             | 4.91  | Rad. bardan.         | 4.25  |
|                             | extract. euphorb.     | 5.255 | hyosciam.            | 4.82  |
|                             | Unguent. butyr. nerv. | 2.30  | rhapont.             | 4.138 |
| Spicula ex corpore trahunt. |                       |       | verbasc.             | 4.171 |
|                             | Fol. dictamn. cret.   | 4.63  | Fruct. Castanea.     | 4.39  |
|                             | Rad. fraxinell.       | 4.72  | cupress.             | 4.57  |
|                             | Fung. cynosbat.       | 4.60  | mor. immatur.        | 4.106 |
|                             | Gumm. Ammon.          | 4.118 | bacc. myrt.          | 4.109 |
|                             | sagapen.              | 4.114 | Resin. Thur.         | 4.223 |
|                             | Anim. lep. axung.     | 5.300 | Gumm. Mastich.       | 4.199 |
|                             | Mus.                  | 5.303 | Anim. Apriadepts.    | 5.168 |
|                             | cancr.                | 5.326 | cochleæ.             | 5.284 |
|                             | cera temper.          | 5.337 | taxus.               | 5.309 |
|                             | lacertus.             | 5.343 | Min. bolus.          | 3.319 |
| Spu- rum                    | Fol. anserin.         | 4.17  | rubric.              | 3.320 |
| fan-                        | buræ pastor.          | 4.32  | granatus.            | 3.328 |
| guinis.                     | chamædr.              | 4.42  | saphirus.            | 3.330 |
|                             | graminis.             | 4.77  | hæmatites.           | 3.351 |
|                             | hispidulæ.            | 4.81  | magnes.              | 3.354 |
|                             | lagopi.               | 4.90  | Oleum hyperic.       | 2.246 |
|                             | marrub.               | 4.99  | Steri- Fol. Nepetæ.  | 4.111 |
|                             | millefol.             | 4.104 | litas. Rad. satyrii. | 4.15  |
|                             | myrr.                 | 4.109 | Lign. sassafras.     | 4.150 |
|                             | nummul.               | 4.114 | Anim. Equus.         | 5.286 |
|                             |                       |       | Accip.               |       |

4.126  
196  
4.101  
4.112  
5.174  
5.276  
5.276  
5.281  
5.283  
5.284  
5.285  
5.288  
5.297  
5.302  
5.315  
5.326  
5.326  
5.328  
5.330  
5.339  
5.333  
5.334  
5.340  
5.342  
5.342  
5.347  
4.111  
4.126  
4.102  
4.16  
4.52  
4.62  
4.120  
4.61  
2.307  
4.90  
4.68  
4.68  
Spasmus.

# INDEX MORBORUM

|                         |       |                            |       |
|-------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Accip. excrem.          | 5.313 | sambuc.                    | 4.146 |
| Essent. Sp. sulph. Oli. | 3.459 | scabios.                   | 4.151 |
| Stran- Fol. Pariet.     | 4.119 | Rad. angelic.              | 4.16  |
| guria. pimpinell.       | 4.124 | carlinz.                   | 4.37  |
| Rad. petros. mont.      | 4.123 | sarsaparill.               | 4.149 |
| pimpinell.              | 4.124 | valerian.                  | 4.170 |
| Cort. popul. alb.       | 4.129 | Corr. sambuc.              | 4.146 |
| Sem. pastinac. sylv.    | 4.120 | Sem. milij.                | 4.104 |
| petros. mont.           | 4.123 | Fruct. pom. citrin.        | 4.48  |
| pimpinell.              | 4.124 | Lign. sassafrass.          | 4.160 |
| sesel. cret.            | 4.158 | Lachr. bdell.              | 4.187 |
| Anim. hircin. seyum.    | 5.275 | Gumm. Lacc.                | 4.196 |
| Spir. Tereb.            | 4.211 | Anim. asin. sanguis.       | 5.296 |
| Stru- Fol. perfol.      | 4.121 | capr. lapill.              | 5.275 |
| mas. rut. mar.          | 4.144 | bezoar. lapis.             | 5.278 |
| vermic.                 | 4.172 | cervi corn.                | 5.281 |
| Rad. bardan. min.       | 4.25  | C. C. usti.                | 5.281 |
| cyclam.                 | 4.59  | cerv. lachrym.             | 5.283 |
| scrophul.               | 4.154 | hom. urin.                 | 5.290 |
| verben.                 | 4.171 | rhinoceros.                | 5.305 |
| Cort. mandragor.        | 4.98  | unicornu.                  | 5.312 |
| Sem. perfol.            | 4.121 | gall. membr.               | 5.319 |
| Anim. apri fel.         | 5.268 | conch. testæ præp.         | 5.328 |
| anfini ungula.          | 5.269 | lumbr. terren.             | 5.344 |
| hom. secund.            | 5.288 | Min. terr. sigill.         | 3.318 |
| serp. ping.             | 5.306 | sol. scolopetans.          | 3.364 |
| talpæ cinis.            | 5.308 | sulphur.                   | 3.501 |
| columb. fim.            | 5.316 | Acetum.                    | 4.180 |
| halec. muria.           | 5.329 | Pulvis Bezoart. cum præp.  | 2.268 |
| Min. Lap. spong.        | 3.357 | sine præp.                 | 2.268 |
| Sudor. Fol. absynth.    | 4.4   | Tinct. Croci.              | 3.412 |
| arnicæ.                 | 4.20  | Bezoar. Zalc.              | 3.314 |
| card. bened.            | 4.36  | Spir. f. ♂ ij. alb. diaph. | 3.315 |
| Jaceæ.                  | 4.84  | rub.                       | 4.15  |
| veron.                  | 4.173 | Cinnab. præcip. Hartm.     | 3.419 |
| ulmar.                  | 4.177 | Vitrum Antim. hyacinth.    | 3.422 |
| Flor. calthæ.           | 4.34  | vit. ♂. diaphor.           | 3.424 |
| ebuli.                  | 4.64  | ♂. diaph. vulg.            | 3.427 |
|                         |       | ceruss.                    |       |



# INDEX MORBORUM

|                            |       |                           |       |
|----------------------------|-------|---------------------------|-------|
| ceruss. ♂ij. solat.        | 3.430 | Fruct. Granat.            | 4.77  |
| præcip. ♂. diaph.          | 3.431 | Lign. Aloes.              | 4.9   |
| flor. ♂ij. diaph.          | 3.434 | santal.                   | 4.148 |
| Nix diaph ♂ij.             | 3.443 | Anim. Bezoar.             | 3.278 |
| Tinct. ♂ij.                | 3.446 | Min. smaragdus præp.      | 3.332 |
| Tinct. ex vitæ. ♂ij.       | 3.446 | ▽. Herc. saxon.           | 2.139 |
| Tinct. ex Sp. sulph. ♂ij.  | 3.450 | ▽. cordial. D. Sp.        | 2.140 |
| Tinct. ex Sp. sulph.       | 3.451 | Bals. apoplect.           | 2.156 |
| cryst. ⊙. comm. dulc.      | 3.469 | vitæ.                     | 2.157 |
| cryst. ⊙. nitr.            | 3.474 | Elix. vitæ quercet.       | 2.191 |
| Tinct. nitr.               | 3.447 | Epith. cord.              | 2.204 |
| cryst. alum.               | 3.479 | odorif. Croll.            | 2.262 |
| acidus *.                  | 3.482 | syrup. cardiac.           | 2.292 |
| ⊙. li dulc.                | 3.491 | Ebur ust.                 | 3.461 |
| Magist. succin. dulc.      | 3.512 | magister. ⊙. li.          | 3.496 |
| ▽. flor. aurant.           |       | syrup. de pom. simpl.     | 4.129 |
| extract. Bux.              | 4.31  |                           |       |
| rob. sambuc.               | 4.146 | <b>T</b> Em-Fol. adianth. | 4.8   |
| cryst. Bezoin.             | 4.189 | perata. alchimil.         | 4.18  |
| Spir. Tart.                | 4.220 | calcatripp.               | 4.33  |
| ▽. de tribus.              | 2.150 | geran.                    | 4.76  |
| Diaph. Bejuin.             | 3.396 | loti.                     | 4.66  |
| ♀ præcipitatus.            | 3.399 | quinquefol.               | 3.135 |
| ♀ solaris.                 | 3.404 | rut. mur.                 | 4.144 |
| Aurum vitæ Closs.          | 3.405 | symphyt.                  | 4.163 |
| Bezoart. miner.            | 3.411 | tussil.                   | 4.169 |
| Sur- Anim. hom. fel.       | 3.299 | Flor. calca trip.         | 4.33  |
| ditas. ardeæ ping.         | 3.305 | loti.                     | 4.96  |
| gruis ping.                | 3.320 | ros.                      | 4.139 |
| anguil. ping.              | 3.325 | Rad. liquir.              | 4.76  |
| formic. ova.               | 3.342 | lapath.                   | 4.90  |
| Syn- Fol. meliss.          | 4.100 | polygonat.                | 4.128 |
| cope. Flor. caryoph. hort. | 4.30  | rhod.                     | 4.137 |
| aromat.                    | 4.39  | rhapont.                  | 4.138 |
| croci.                     | 4.55  | symphyt.                  | 4.163 |
| lilior. convall.           | 4.49  | Fruct. amygd. dulc.       | 4.14  |
| Rad. petasit.              | 4.122 | pinæ.                     | 4.125 |
| vincetox.                  | 4.174 | sebesten.                 | 4.154 |
| Cort. Cinam.               | 4.48  | secal.                    | 4.155 |
|                            |       | <b>K</b>                  | Sem.  |

# INDEX MORBORUM

|                            |       |                         |       |
|----------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Sem. lapathi.              | 4.90  | Sperma Ceti.            | 3.514 |
| lini.                      | 4.95  | Fossil. Ophites.        | 3.355 |
| Acetum.                    | 4.180 | sal fossile.            | 3.470 |
| Manna.                     | 4.257 | Ol. amygd. dulc.        | 4.14  |
| Tenes. Anim. bovis adeps.  | 5.270 | conserv. calcatrip.     | 4.33  |
| mus. vaccin. lac.          | 5.271 | ol. nucis mosch.        | 4.106 |
| Terro. Anim. asin. pellis. | 5.269 | ol. oliv.               | 4.115 |
| res. lup. dent.            | 5.301 | Pilul. pestilent.       | 2.258 |
| urfi ocul.                 | 5.312 | Tre. Fol. hyperic.      | 4.83  |
| Min. Tinct. Corall.        | 3.339 | mor. sal.               | 4.145 |
| ∇. contr. terror.          | 2.149 | Flor. hyperic.          | 4.83  |
| Timo. Min. chrysolit.      | 3.328 | sal.                    | 4.145 |
| res. rubin.                | 3.329 | Anim. bovis medull.     | 5.270 |
| Tinea Rad. carlinæ.        | 4.37  | cast. test.             | 5.279 |
| pueror. Zedoar.            | 4.179 | hom. urin.              | 5.288 |
| Cort. mori.                | 4.105 | vulp. ping.             | 5.313 |
| Fruct. bacc. myrt.         | 4.109 | ∇. anhaltin.            | 2.134 |
| Anim. hom. sterc. præp.    | 5.291 | Tinct. Croci.           | 3.412 |
| Linim. 5 compol.           | 2.406 | Tu. Fol. arist.         | 4.19  |
| 80. laurin.                | 4.91  | mo. Anim. canis caput.  | 5.274 |
| ⊙ Sp. Tart.                | 4.222 | res. cerv. fevum.       | 5.283 |
| Tor. Fol. abrot.           | 4.4   | hom. urina.             | 5.288 |
| mina. absynth.             | 4.5   | gru. ping.              | 5.320 |
| pont.                      | 4.5   | Foss. Mercurius.        | 3.398 |
| aquileg.                   | 4.19  | Tartar.                 | 3.501 |
| puleg.                     | 4.133 | Bals. Tolut.            | 4.185 |
| tanacet.                   | 4.163 | Tussis. Fol. calamenth. | 4.33  |
| verben.                    | 4.171 | erysimi.                | 4.66  |
| Flor. Jasmin.              | 4.85  | hyfop.                  | 4.84  |
| spic.                      | 4.160 | malv.                   | 4.98  |
| tanacet.                   | 4.165 | numul.                  | 4.114 |
| verbasc.                   | 4.171 | origani.                | 4.116 |
| Rad. ireos florent.        | 4.86  | patietar.               | 4.119 |
| mei.                       | 4.104 | petrosel.               | 4.122 |
| Cort. aurant.              | 4.23  | pimpinell.              | 4.124 |
| Sem. pastinc.              | 4.120 | quinquefol.             | 4.135 |
| Anim. ovis lana.           | 5.304 | rut. mur.               | 4.144 |
| perdic. penni.             | 5.323 | scabios.                | 4.151 |
| rana ipsa.                 | 5.331 | filiq.                  |       |



# ET REMEDIORUM.

|        |                           |       |                                      |
|--------|---------------------------|-------|--------------------------------------|
| 3.514  | filig.                    | 4.158 | Vaynillas fol. LX.                   |
| 3.335  | thymi.                    | 4.166 | Achate ꝑij.                          |
| 3.470  | tussil.                   | 4.169 | Maiz ꝑij.                            |
| 4.14   | verben.                   | 4.171 | Cinam. ꝑij.                          |
| 4.143  | Flor. caprifol.           | 4.35  | Yamaicæ ꝑv.                          |
| 4.106  | eupator.                  | 4.67  | Piperis longi ꝑij.                   |
| 4.115  | Jasmin.                   | 4.84  | Sachari. q. f.                       |
| 2.258  | scabios.                  | 4.151 | Chocolate Indorum.                   |
| 4.83   | verbasc.                  | 4.171 | ꝑ. Gravor. Caccac num. X.            |
| 4.145  | viol.                     | 4.174 | (seu Nuc. Ind.)                      |
| 4.83   | Caul. levist.             | 4.92  | Fruct. Capficorum seu                |
| 4.145  | Rad. allii.               | 4.12  | Chiles num. XX.                      |
| 4.145  | liquirit.                 | 4.76  | Maiz ꝑij. seu frum. Ind.             |
| 5.270  | helerii.                  | 4.81  | Anis ꝑij.                            |
| 5.279  | ireos flor.               | 4.86  | Herb. Mecacuchil. Mij                |
| 5.288  | petrosel.                 | 4.122 | (milii sol maj.)                     |
| 5.313  | peuced.                   | 4.124 | Orefulas num. XX.                    |
| 2.134  | pimpinell.                | 4.124 | (fruct. herb. Merach.)               |
| 3.412  | tussil.                   | 4.169 | Cinamom. ꝑiv.                        |
| 4.19   | Sem. bombac.              | 4.29  | Pip. nig. ꝑij.                       |
| 4.274  | cannab.                   | 4.34  | Sach. ꝑiv.                           |
| 5.283  | dauci.                    | 4.62  | Succ rad. Achiotte ꝑij. M.           |
| 5.288  | lini.                     | 4.95  | F massa.                             |
| 5.320  | melon.                    | 4.101 | ꝑ. Hujus mass. & sach. fin. 2. ꝑij.  |
| 3.398  | papav. sativ.             | 4.117 | aq. font. ꝑvij. Bulliant & conti-    |
| 3.501  | past. sylv.               | 4.120 | nuè moveantur donec in su-           |
| 4.185  | petrosel.                 | 4.122 | perficie spuma subtilis cum          |
| 4.33   | sesel. Mass.              | 4.158 | pinguedine appareat (in vase         |
| 4.66   | urtic.                    | 4.178 | stanneo vel vitreato) Remov.         |
| 4.84   | Fruct. Nucl. avellan.     | 4.53  | ab igne & è cortice nucis Indi-      |
| 4.98   | ficus.                    | 4.69  | cæ bibatur quam calidissime.         |
| 4.114  | granat. dulc.             | 4.77  | Cachunde Regibus Chinenfibus &       |
| 4.116  | jujubæ.                   | 4.87  | Indisorientalibus æstinata.          |
| 4.119  | pinæ.                     | 4.125 | ꝑ. Terræ Cimolix aut alterius optim. |
| 4.122  | uvæ pass.                 | 4.176 | ꝑij.                                 |
| 4.124  | chocal.                   | 4.216 | Ambari ꝑij.                          |
| 4.135  | Chocolate Imperatori com- |       | Mosch. & Gallix aa. ꝑij.             |
| 4.144  | municata.                 |       | Calamb. optim. (agalloch.) ꝑx.       |
| 4.151  | ꝑ. Cacao ꝑ XXXVII,        |       | k 2 Margar.                          |
| filig. |                           |       |                                      |

# ET REMEDIORUM.

|                                                   |       |                           |       |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Margar. præp. lbij.                               |       | Mumia.                    | 5.294 |
| Pubin. smaragd. Granator.                         |       | lup. hepar.               | 5.301 |
| Hyacinth. præp. a. 3iv.                           |       | mus.                      | 5.303 |
| Sanct. citr. lbij. rubr. lbiv.                    |       | anser. sterc.             | 5.315 |
| Mastich. calam. arom. Galanus                     |       | corvor. sterc.            | 5.317 |
| Cinam. Rhab. & Aloes lot. cum                     |       | gall. ver. jus.           | 5.318 |
| succ. ros. Myrob. Ind. Cheb. Bell.                |       | apum mel.                 | 5.335 |
| Absinth. corall. rub. bol. arm. a. 3ij            |       | cera temp.                | 5.337 |
| fol. auri 3j. Lap. Bezoart. 3xx.                  |       | Fossil. Sp. Tart.         | 3.501 |
| seric. ust. 3viij. Ebor. ust. lbijss.             |       | Sperma Ceti.              | 3.514 |
| <b>Pulverisanda pulveris tenuiss. &amp; irror</b> |       | Looch passular.           | 2.178 |
| Balsami orientalis, vini odoriferi                |       | Pil. de styrac.           | 2.252 |
| & ∇. cinanom. guttulis justilla-                  |       | ad tussin.                | 2.252 |
| ris: siccentur ad umbram & cum                    |       | Syrup. de Nicot.          | 2.294 |
| sachar. f. q.                                     |       | Bacul. pector.            | 2.300 |
| addit. Gumm. Tragacanth. &                        |       | Bals. reg. 3ij.           | 3.448 |
| Arabici mucilagine omnia mala-                    |       | Infus. vitr. 3ij.         | 2.452 |
| centur. fiat massa tenacissima &                  |       | flor. Sp. sulph. ① li.    | 3.502 |
| rubicundissima: ex hac forment.                   |       | lac. Sp sulph.            | 3.504 |
| varia figuræ, quare particula te-                 |       | Syrup. flor. acac.        | 4.6   |
| neantur in ore.                                   |       | ∇. flor. lil. alb.        | 4.94  |
| Gumm. Arabici.                                    | 4.184 | Ol. sesami.               | 4.157 |
| galbani.                                          | 4.195 | Spir. tereb.              | 4.211 |
| mastich.                                          | 4.199 | Manna.                    | 4.257 |
| sagapen.                                          | 4.114 |                           |       |
| Tragac.                                           | 4.224 | <b>V</b> A-Coni abietis.  | 4.3   |
| <b>Resin. Benzoin.</b>                            | 4.188 | rices. cataplasma. resol. | 2.162 |
| ladani.                                           | 4.197 | Vene- Fol. antirrhin.     | 4.18  |
| myrrh.                                            | 4.200 | ficia. sideritis.         | 4.158 |
| terebinth.                                        | 4.210 | Rad. scyll.               | 4.154 |
| styr. cal.                                        | 4.216 | Sem. petros. maced.       | 4.123 |
| thur.                                             | 4.223 | Anim. Can. sang.          | 5.274 |
| Musc. pulm. arbor.                                | 4.133 | hom. sterc. præcip.       | 5.291 |
| Lachr. sachar.                                    | 4.214 | hom. ossa.                | 5.297 |
| Bals. Tolut.                                      | 4.285 | Lucius piscis.            | 5.330 |
| Anim. cochlea.                                    | 5.284 | Fossil. Amianth.          | 3.346 |
| Eq. lac.                                          | 5.285 | Mercurius.                | 3.398 |
| Eq. saliva.                                       | 5.286 | Venenū. Fol. abrotani.    | 4.4   |
|                                                   |       | aristol.                  |       |



# ET REMEDIORUM.

|          |                    |       |                            |       |
|----------|--------------------|-------|----------------------------|-------|
| 5.294    | aristol.           | 4.19  | unicornu.                  | 5.312 |
| 5.301    | card.bened.        | 4.37  | anat. sang.                | 5.314 |
| 5.303    | levist.            | 4.92  | anser. sang.               | 5.315 |
| 5.315    | ruta.              | 4.143 | ciconla.                   | 5.315 |
| 5.317    | Flor. stach.       | 4.162 | cicon.vent. exsicc.        | 5.315 |
| 5.318    | Rad. angelic.      | 4.16  | rana ipsa.                 | 5.331 |
| 5.335    | anthora.           | 4.18  | Tinca.                     | 5.334 |
| 5.337    | carlin.            | 4.37  | scinci.                    | 5.346 |
| 3.501    | chelidon.          | 4.43  | Fossil. Terra sigill.      | 3.318 |
| 3.514    | contrayervæ.       | 4.50  | granatus.                  | 3.328 |
| 2.178    | Doronic.           | 4.63  | rubin.                     | 3.329 |
| 2.252    | fraxinell.         | 4.72  | saphirus.                  | 3.330 |
| 2.252    | imperat.           | 4.85  | marg.                      | 3.342 |
| 2.294    | levist.            | 4.92  | sal perlat.                | 3.343 |
| 2.300    | menth. sarac.      | 102   | ophites.                   | 3.355 |
| 3.448    | torment.           | 4.167 | sal comm.                  | 3.464 |
| 2.452    | Sem. levist.       | 4.92  | sulphur.                   | 3.501 |
| 3.502    | napi.              | 4.109 | El. alexipharm. de Cicon.  | 2.181 |
| 3.504    | Fruct. pom. citr.  | 4.48  | Extract. quercet. bezoar.  | 2.213 |
| 4.6      | nuckavellan.       | 4.53  | Theriac. bened. quercet.   | 2.219 |
| 4.94     | figus.             | 4.69  | Ol. hyper. comp. Rabenh.   | 2.245 |
| 4.157    | baccæ paris.       | 119   | ol. hyper. compos. Ellenb. | 2.247 |
| 4.222    | Refin. Camphor.    | 4.190 | Oxylachar. vomit.          | 2.297 |
| 4.257    | Anim. agni coagul. | 5.267 | Aurum potab.               | 3.360 |
|          | bufo.              | 5.272 | ꝯ præcip. per ꝯ Sp sulph.  | 3.400 |
| 4.3      | lapis bufon.       | 5.272 | Tinct. ex ꝯ io crudo.      | 3.445 |
| 2.162    | hircin. sang.      | 5.275 | Arsenic. dulc.             | 3.499 |
| 4.118    | rupi capr. lapis.  | 5.277 | Extract. ex bacc. Juniper. | 4.88  |
| 4.158    | bezoar. lapis.     | 5.278 | Ven- Fol. filiq.           | 4.158 |
| 4.154    | cervi lachrym.     | 5.282 | tricoli Succ. omphac.      | 4.201 |
| 4.123    | castor. test.      | 5.279 | ardon. Foss. Creta.        | 3.320 |
| 5.274    | cunicul. cerebr.   | 5.284 | Conserv. calcatripp.       | 4.33  |
| 5.291    | ebur.              | 5.285 | Ventriculi cruditas.       |       |
| 5.297    | hom. urina.        | 5.288 | Fol. absynth.              | 4.4   |
| 5.330    | mumiæ tinct.       | 5.293 | melissæ.                   | 4.100 |
| 3.346    | mumiæ. ꝯ.          | 5.296 | saturajæ.                  | 4.150 |
| 3.398    | mosch.             | 5.302 | Flor. caryophyll. arom.    | 4.39  |
| 4.4      | rhinoceros.        | 5.305 | Jasmin.                    | 4.85  |
| aristol. |                    |       | k 3                        | Rad.  |

# INDEX MORBORUM

|                          |       |                              |       |
|--------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Radic. cyperi.           | 4.61  | inofchat.                    | 4.106 |
| galangæ.                 | 4.73  | pipet.                       | 4.126 |
| imperat.                 | 4.85  | piftac.                      | 4.126 |
| fefel. maff.             | 4.158 | pom. dulc.                   | 4.129 |
| zedoar.                  | 4.179 | chocol.                      | 4.216 |
| Sem. fefel. maff.        | 4.158 | Balf. verus.                 | 4.185 |
| Fruct. lauri.            | 4.91  | Indicus.                     | 4.186 |
| cydon.                   | 4.61  | Refin. ladan.                | 4.197 |
| Balf. Tolut.             | 4.185 | tacamahac.                   | 4.217 |
| indic.                   | 4.186 | Gumm. maffich.               | 4.199 |
| Θ. commun.               | 3.464 | Anim. Ebur.                  | 5.285 |
| Pil. febrif. D. Schöff.  | 2.255 | echinus.                     | 5.286 |
| peftil. compof.          | 2.258 | cygn. pell.                  | 5.322 |
| Θ. facerdotale.          | 2.273 | fruth. tunica.               | 5.274 |
| Fl. Θ. ammoniac.         | 3.480 | Foffil. Corallia.            | 3.333 |
| Ventriculi imbecillitas. |       | Aq. anhaltin.                | 2.134 |
| Fol. fœnicul.            | 4.70  | afthmat.                     | 2.135 |
| hyffop.                  | 4.84  | cephal.                      | 2.138 |
| levift.                  | 4.92  | imperial. corv.              | 2.144 |
| menth.                   | 4.102 | Elect. pseudo acari stomach. | 2.180 |
| pimpinell.               | 4.124 |                              |       |
| rut.                     | 4.143 | Elixir. propr.               | 2.190 |
| Rad. acori.              | 4.8   | vitz quercet.                | 2.191 |
| cofti.                   | 4.54  | Emplaft. stomach. de Taca.   | 2.201 |
| gentian.                 | 4.75  |                              |       |
| levift.                  | 4.92  | Tragea groff.                | 2.271 |
| pimpinell.               | 4.124 | Pulv. stomach. querc.        | 2.272 |
| fchænanth.               | 4.152 | Sal. philofoph.              | 2.273 |
| spica celtic.            | 4.161 | Saccul. stomach.             | 2.276 |
| Indic.                   | 4.161 | Sal. ♀.                      | 3.388 |
| Zinziber.                | 4.180 | Arcan. ♂ ij. Bafil.          | 3.449 |
| Cort. Cinnam.            | 4.48  | Aq. benedict.                | 3.453 |
| Sem. anifi.              | 4.17  | Cryftall. fal. comm. dulc.   | 3.468 |
| coriandr.                | 4.51  | Θ li philof.                 | 3.489 |
| levift.                  | 4.92  | Ventriculi inflatio.         |       |
| Fruct. berber.           | 4.27  | Flor. fchænanth.             | 4.152 |
| cardamom.                | 4.36  | Rad. Galangæ.                | 4.73  |
| ceras. acid.             | 4.41  | mei.                         | 4.104 |
|                          |       | fchæ-                        |       |



# ET REMEDIORUM.

|       |       |                 |       |                          |       |
|-------|-------|-----------------|-------|--------------------------|-------|
| 4.106 |       |                 |       |                          |       |
| 4.126 |       | schænanth.      | 4.152 | Sem. Cari.               | 4.37  |
| 4.126 |       | sefel. Mass.    | 4.158 | cumini.                  | 4.57  |
| 4.129 |       | spic. Indic.    | 4.161 | Fruct. Granat.           | 4.77  |
| 4.16  |       | Sem. Ammi veri. | 4.12  | cochol.                  | 4.216 |
| 4.16  |       | sefel. Mass.    | 4.158 | colocynth.               | 4.234 |
| 4.134 |       | Fruct. Oliv.    | 4.115 | Gumm. Galban.            | 4.195 |
| 4.157 |       | Bals. Tolut.    | 4.185 | Succinum.                | 3.511 |
| 4.217 |       | Indic.          | 4.186 | Anim. Rup. cap. sang.    | 5.276 |
| 4.199 |       | Aq. carminativ. | 2.137 | bezoar. lap.             | 5.278 |
| 5.181 | Ver-  | Rad. Dipfaci.   | 4.63  | cast. test.              | 5.297 |
| 5.286 | rucæ. | Cort. pinastr.  | 4.125 | columb. fim.             | 5.316 |
| 5.322 |       | filic.          | 4.145 | pav. sterc.              | 5.323 |
| 5.274 | Anim. | asin. urin.     | 5.269 | bombyces.                | 5.333 |
| 3.333 |       | canin. sterc.   | 5.274 | Aq. anhaltin.            | 2.134 |
| 2.134 |       | canis. urina.   | 5.274 | epilept.                 | 2.138 |
| 2.135 |       | limac.          | 5.284 | cephal. arom.            | 2.138 |
| 2.138 |       | mur. sterc.     | 5.303 | Elix. antepilept.        | 2.188 |
| 2.144 |       | ovis sterc.     | 5.304 | vitæ querc.              | 2.191 |
| 2.144 |       | anguillæ caput. | 5.325 | Empl. cephal.            | 2.195 |
| 180   |       | cancer. cinis.  | 5.326 | Pulv. stomach. quercet.  | 2.272 |
| 2.190 |       | Ol. pineæ.      | 4.125 | Sal. 2.                  | 3.397 |
| 2.191 |       | Succ. popul.    | 4.129 | Cinnab. 8 ij.            | 3.434 |
| 2.191 |       | Fol. meliss.    | 4.100 | Magister. Oli.           | 3.496 |
| 201   | Vet-  | menth.          | 4.102 | Vesica-Anim. Cantharid.  | 5.340 |
| 2.271 | tigo. | puleg.          | 4.133 | torium. Emplastr. vesic. | 2.201 |
| 2.272 |       | ror. marin.     | 4.141 | Vesicæ Fol. equiset.     | 4.66  |
| 2.273 |       | salv.           | 4.145 | ulcera. lagopi.          | 4.90  |
| 2.276 |       | serpill.        | 4.146 | Rad. cyperi.             | 4.61  |
| 3.388 | Flor. | lil. convall.   | 4.94  | liquirit.                | 4.67  |
| 3.449 |       | matricar.       | 4.99  | Anim. Gall. sterc.       | 5.319 |
| 3.453 |       | salv.           | 4.145 | ranar. sal.              | 5.332 |
| 3.468 |       | stach.          | 4.162 | 8. præcip. per 7. ovor.  | 3.401 |
| 3.489 |       | Thil.           | 4.167 | Ol. 8 ij. diaph. dulc.   | 3.415 |
| 4.152 | Rad.  | cyperi.         | 4.61  | Ol. 8 ij. sacharat.      | 3.416 |
| 4.73  |       | Doronic.        | 4.63  | Vigi- Fol. atripl.       | 4.22  |
| 4.104 |       | galangæ.        | 4.73  | liæ. cerefol.            | 4.42  |
| 4.104 |       | scorzonæ.       | 4.158 | cynogloss.               | 4.59  |
| 4.104 |       | Elleb.          | 4.236 | nicot.                   | 4.112 |
|       |       |                 |       | serpill.                 |       |

# INDEX MORBORUM

|                         |       |                               |        |
|-------------------------|-------|-------------------------------|--------|
| serpill.                | 4.156 | gryllus.                      | 5.342  |
| vitis.                  | 4.175 | Aq. ophthalm.                 | 2.138  |
| Flor. croci.            | 4.55  | Pil. pestil. comp.            | 2.258  |
| nymph.                  | 4.114 | Ulcera callosa.               |        |
| Sem. Anethi.            | 4.16  | Empl. Saturn. Closs.          | 2.198  |
| hyosciami.              | 4.82  | Ulcera fetida & sordida.      |        |
| lactuc.                 | 4.89  | Flor. caprifol.               | 4.34   |
| papav. sat.             | 4.117 | Lign. Rhod.                   | 4.137  |
| Cort. mandragor.        | 4.98  | Resin. Thur.                  | 4.223  |
| Lachr. Opij.            | 4.202 | Sal. Zis.                     | 3.395  |
| Elect. diaph. Plat.     | 2.184 | Ulcera interna ex contusione. |        |
| Epith. in febr. malign. | 2.205 | Ol. hyper. comp.              | 2.246  |
| Pilul. narcot. Plat.    | 2.252 | Sach. Hi.                     | 3.390  |
| Unguent. Narcot.        | 2.308 | Ol. Sp. sulph. ver. Closs.    | 3.507  |
| somnif.                 | 2.309 | Ulcera inveterata.            |        |
| sal. cachect. chalib.   | 3.475 | Fol. Paris.                   | 4.119  |
| Extr. O-li narcot.      | 3.495 | plantag.                      | 4.127  |
| Unguent. aurant.        | 4.23  | Rad. peuced.                  | 4.124  |
| Ol. ex Buxo.            | 4.32  | valer.                        | 4.170  |
| Ol. nuc. mosch.         | 4.106 | Anim. bufon. O.               | 5.273  |
| Unguent. popul.         | 4.130 | canin. sterc.                 | 5.274  |
| Visus Flor. satur. jx.  | 4.150 | canis. urin.                  | 5.274  |
| hebe. Rad. sesel.       | 4.158 | cervi medulla.                | 5.283  |
| rudo. Sem. sesel. mass. | 4.158 | ovis lana.                    | 5.304  |
| Anim. capr. jecur.      | 5.279 | halec. muria.                 | 5.329  |
| cati caput.             | 5.280 | lucii mand.                   | 5.330  |
| serp. ping.             | 5.306 | ranar. O.                     | 5.332  |
| ardea ping.             | 5.315 | Exempl. stipt. Crollii.       | 2.200  |
| ficedulæ.               | 5.315 | Liquor. O. ij. præcip.        | 3.417  |
| Gall. fel.              | 5.319 | Diaphor. regulin.             | 3.429  |
| Gru. medull.            | 5.320 | Bals. O. ij.                  | 3.439  |
| hirundo.                | 5.320 | Lethargyr. thereb.            | 3.460  |
| milv. epar.             | 5.321 | Ulcera maligna.               |        |
| noct. ping.             | 5.321 | Fol. quinquefol.              | 4.135  |
| pavon. fel.             | 5.328 | Fossil. Plumbum.              | 3.389  |
| perdic. fel.            | 5.323 | Empl. saturn. Closs.          | 2.198  |
| ranar. fel.             | 5.337 | sacharum, Hi.                 | 3.390  |
| formic. O.              | 5.347 |                               | O. Hi. |



# INDEX MORBORUM

|                           |       |                              |       |
|---------------------------|-------|------------------------------|-------|
| ⊙ Bi. Balsam.             | 3.391 | Fruct. balang. myreps.       | 4.84  |
| ⊙ prācip per ⊙ Sp. sulph. | 3.400 | bacc. heder.                 | 4.87  |
| ⊙ Olati.                  | 3.403 | juglan.                      | 4.80  |
| ⊙ in ~ O-li sol.          | 3.407 | bacc. polygonat.             | 4.128 |
| ⊙ = rubeus.               | 3.408 | Anim. hom. unguis.           | 5.287 |
| ⊙ vitæ.                   | 3.410 | barbo.                       | 5.325 |
| ⊙ ij diaph. dulc.         | 3.415 | lucii ova.                   | 5.350 |
| Liquor. ij prācipit.      | 3.417 | Fossil. Antimon.             | 4.422 |
| ⊙. ij.                    | 3.454 | vitriol.                     | 3.483 |
| Spod. Græc.               | 3.461 | Dropac.                      | 2.201 |
| ⊙. ⊙ anodyn.              | 3.500 | ♂. rub. fixum.               | 3.430 |
| Ol. fefami.               | 4.157 | Flor. ij reg.                | 3.432 |
| Vomitum curant.           |       | ⊙ ij. sachar. quercet.       | 3.436 |
| Fol. absynth. pont.       | 4.5   | Butyr. ij.                   | 3.436 |
| menthæ.                   | 4.102 | Ol. ij.                      | 3.438 |
| fenecii.                  | 4.156 | Sp. sulph. ex minerva ij.    | 3.441 |
| vitis.                    | 4.175 | Sp. sulph. ex scor. reg. ij. | 3.444 |
| Flor. rosar.              | 4.175 | Infus. ij. crud.             | 3.452 |
| schænanth.                | 4.152 | vitri. ij.                   | 3.452 |
| Rad. bistortæ.            | 4.29  | Vitriol. alb. vomit.         | 3.484 |
| schænanth.                | 4.152 | ⊙ lum emetic.                | 3.484 |
| tormentil.                | 4.167 | Ol. oliv.                    | 4.115 |
| zedoar.                   | 4.179 | Urinæ Fol. abrotani.         | 4.4   |
| Sem. anethi.              | 4.16  | diffi- adianthi.             | 4.8   |
| Fruct. cydon.             | 4.61  | cultas. agerati.             | 4.10  |
| mespil.                   | 4.103 | aquileg.                     | 4.19  |
| moschat.                  | 4.106 | arnicæ.                      | 4.20  |
| bacc. myrr.               | 4.109 | calamenth.                   | 4.33  |
| Lign. fantalin.           | 4.148 | cardiacæ.                    | 4.36  |
| Gumm. mastich.            | 4.199 | herniariæ.                   | 4.81  |
| Anim. Gall. tunica.       | 5.318 | lagopi.                      | 4.90  |
| Succ. hypocist.           | 4.196 | linar.                       | 4.95  |
| Vomitum excitant.         |       | loti.                        | 4.96  |
| Fol. arnicæ.              | 4.20  | millefol.                    | 4.105 |
| nicot.                    | 4.112 | fabin.                       | 4.144 |
| vermic.                   | 4.172 | scolopendr.                  | 4.153 |
| Rad. raph. marin.         | 4.136 | serpill.                     | 4.156 |
| Sem. anethi.              | 4.16  | Thil.                        | 4.167 |
|                           |       |                              | Flor. |

# INDEX MORBORUM

|                  |       |                       |       |
|------------------|-------|-----------------------|-------|
| Flor. chamomill. | 4.43  | Fung. agar.           | 4.230 |
| loti.            | 4.96  | Fruct. baccæ Juniper. | 4.89  |
| lupul.           | 4.96  | jujub.                | 4.87  |
| schænanth.       | 4.152 | lauri.                | 4.91  |
| spic.            | 4.160 | sebesten.             | 4.154 |
| stæch.           | 4.162 | Lachr. bdell.         | 4.189 |
| citr.            | 4.163 | Lign. nephrit.        | 4.111 |
| Aad. allii.      | 4.12  | Gumm. Elemi.          | 4.194 |
| apii.            | 4.16  | galbani.              | 4.195 |
| ari.             | 4.21  | lagapen.              | 4.114 |
| asparag.         | 4.22  | Bals. Indic.          | 4.186 |
| carlin.          | 4.37  | Resin. Laric.         | 4.210 |
| cepæ.            | 4.40  | Anim. bufo.           | 5.272 |
| costi.           | 4.54  | capr. sterc.          | 5.276 |
| cyperi.          | 4.61  | capr. mentum.         | 5.276 |
| eryngii.         | 4.66  | echinus.              | 5.286 |
| glycirrhiz.      | 4.76  | suum vesicæ.          | 5.308 |
| ononyd.          | 4.116 | anser. sterc.         | 5.315 |
| pyrethri.        | 4.134 | columb. simus.        | 5.316 |
| rubia.           | 4.142 | gall. sterc.          | 5.319 |
| rusc.            | 4.143 | palumb.               | 5.322 |
| schænanth.       | 4.157 | cancr. ☉ præcip.      | 5.326 |
| spic. Celt.      | 4.161 | halec. vesic.         | 5.329 |
| indic.           | 4.161 | sepiæ os.             | 5.333 |
| valer.           | 4.170 | sepiæ ova.            | 5.333 |
| Sem. Amni veri.  | 4.13  | apum mel.             | 5.334 |
| apii.            | 4.18  | aselli.               | 5.338 |
| asparag.         | 4.22  | cimex.                | 5.341 |
| dauci.           | 4.62  | locustæ.              | 5.343 |
| melon.           | 4.101 | pedicul.              | 5.345 |
| cerefol.         | 4.41  | scarabæus.            | 5.346 |
| mili.            | 4.104 | scorpio.              | 5.346 |
| napi.            | 4.109 | Min. lapis Judaicus.  | 3.352 |
| petrosel. maced. | 4.123 | ☉. comm.              | 3.464 |
| porri.           | 4.130 | Sp. Tart.             | 4.218 |
| raphan.          | 4.136 | Aq. diuret. enucl.    | 2.141 |
| sefel.           | 4.157 | Crist. ☉ Nitri.       | 3.474 |
| Cret.            | 4.158 | Spir. ☉ armoniac.     | 3.481 |
|                  |       | ∇. ☉ li.              |       |



# ET REMEDIORUM.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.130<br>4.89<br>4.7<br>4.11<br>4.189<br>4.111<br>4.194<br>4.195<br>4.114<br>4.186<br>4.110<br>5.272<br>5.276<br>5.276<br>5.286<br>5.308<br>5.315<br>5.316<br>5.319<br>5.322<br>5.326<br>5.329<br>5.333<br>5.333<br>5.334<br>5.338<br>5.341<br>5.343<br>5.343<br>5.346<br>5.346<br>3.352<br>3.464<br>4.118<br>2.141<br>3.474<br>3.481<br>V. li. | 3.485<br>3.307<br>4.67<br>4.220<br>4.222<br>Urinæ incontinentia.<br>Fruct. cypress.<br>Anim. cinisbuson.<br>hircin. vesic.<br>echinus.<br>lep. ren. & test.<br>mus.<br>ovis vesic. crem.<br>suum vesic.<br>gall. guttur.<br>scarbæi cornua.<br>Uteri affectus.<br>Fol. Abrotani.<br>cypress.<br>Jasmin.<br>nicot.<br>Rad. Doron.<br>Cort. cinnam.<br>Sem. Avenæ.<br>Min. stannum.<br>Aq. hysteric.<br>Elixir. prop.<br>Uteri fluxus albus.<br>Fol. Filipend.<br>lagopi.<br>puleg.<br>ror. marin.<br>urtic. mortuæ.<br>Flor. Cynosbat.<br>urtic. mort.<br>Rad. polygonat.<br>Tamar.<br>Cort. Tamar. | 3.485<br>3.307<br>4.67<br>4.220<br>4.222<br>4.37<br>5.272<br>5.276<br>5.286<br>5.300<br>5.303<br>5.305<br>5.308<br>5.319<br>5.346<br>4.4<br>4.58<br>4.85<br>4.112<br>4.63<br>4.48<br>4.22<br>3.395<br>2.144<br>2.189<br>4.69<br>4.90<br>4.133<br>4.141<br>4.179<br>4.60<br>4.179<br>4.128<br>4.164<br>4.264 | Fruct. Avellan. putan.<br>Lign. Tamar.<br>Anim. Ebur.<br>lucij mandib.<br>tinca.<br>Min. Corall.<br>amianth.<br>unicornu foss.<br>succin.<br>Tragea hyster. quera.<br>Uteri procidentia.<br>Fruct. bacc. myrr.<br>Anim. vaccin. sterc.<br>mustel. venter.<br>Uteri suffocatio.<br>Rad. angelic.<br>fraxinell.<br>gentian.<br>Sem. dauc.<br>Fruct. Cardamom.<br>Lachr. Asa fœtid.<br>Resin. camphor.<br>ladan.<br>liquid. ambr.<br>myrrh.<br>tacamahac.<br>Anim. Eq. lichenes.<br>hom. cutis.<br>pavon. pennæ.<br>formic. acervus.<br>perdic. penn.<br>Min. stannum.<br>sulphur.<br>succinum.<br>Aq. hysteric. M.M.<br>trifantis.<br>vit. mulier.<br>Bals. vitæ. | 4.53<br>4.162<br>5.285<br>5.330<br>5.334<br>3.333<br>3.346<br>3.360<br>3.511<br>2.271<br>4.109<br>5.270<br>5.330<br>4.16<br>4.72<br>4.75<br>4.62<br>4.36<br>4.184<br>4.190<br>4.197<br>4.198<br>4.200<br>4.217<br>5.285<br>5.297<br>5.297<br>5.342<br>5.223<br>3.395<br>3.501<br>3.511<br>2.144<br>2.150<br>2.151<br>2.157<br>deco- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# INDEX MORBORUM

|                            |       |                |       |
|----------------------------|-------|----------------|-------|
| decoctum hysteric.         | 2.176 | pariet.        | 4.119 |
| decoct. splen. bovis.      | 2.177 | pastinac.      | 4.120 |
| Elect. hysteric.           | 2.184 | perfol.        | 4.121 |
| Elixir. hysteric.          | 2.188 | persic.        | 4.122 |
| uterin.                    | 2.190 | pimpinell.     | 4.124 |
| vitz quercet.              | 2.191 | plantag.       | 4.126 |
| Extract. chalyb.           | 2.213 | polygon.       | 4.128 |
| hysteric.                  | 2.213 | prunell.       | 4.131 |
| matrical.                  | 2.214 | pyrol.         | 4.134 |
| uter. Mynsicht.            | 2.219 | quinquefol.    | 4.135 |
| Pil. gummos. S. Cloff.     | 2.255 | ros. ☉.        | 4.141 |
| matric. D. Schöff.         | 2.257 | sang. sorbill. | 4.147 |
| Sp. Tartar.                | 2.260 | sanicul.       | 4.148 |
| Tragea hysteric. querc.    | 2.271 | scolopendr.    | 4.152 |
| Bals. uterin.              | 2.301 | scordij.       | 4.153 |
| Pil. hyst. D. G. Horst.    | 2.312 | symp.          | 4.163 |
| Sal ♀.                     | 3.388 | tanacet.       | 4.165 |
| Sal ♂.                     | 3.395 | tarax.         | 4.165 |
| ♂. diaph.                  | 3.427 | verben.        | 4.171 |
| Arcan. ♂. j. Basil.        | 3.449 | veron.         | 4.172 |
| Ol. Sp. sulph. ver. Cloff. | 3.507 | vinc.          | 4.173 |
| Ol. Gagatis.               | 3.516 | virg. aur.     | 4.176 |
| Vul- Fol. agrimon.         | 4.26  | ulmar.         | 4.177 |
| nera- brassic.             | 4.30  | Flor. bellid.  | 4.27  |
| nia. calcatripp.           | 4.33  | calcatripp.    | 4.33  |
| consolid.                  | 4.51  | centaur. min.  | 4.40  |
| equiseti.                  | 4.65  | hyperic.       | 4.83  |
| euphrag.                   | 4.67  | loti.          | 4.131 |
| fabar.                     | 4.69  | prunell.       | 4.163 |
| heder. terrestr.           | 4.79  | succif.        | 4.165 |
| hyperic.                   | 4.82  | tanacet.       | 4.165 |
| Jaccar.                    | 4.85  | veron.         | 4.172 |
| levist.                    | 4.92  | virg. aur.     | 4.176 |
| loti.                      | 4.96  | Rad. gentian.  | 4.75  |
| millefol.                  | 4.104 | levist.        | 4.92  |
| nicot.                     | 4.112 | pimpinell.     | 4.124 |
| numul.                     | 4.114 | rhapont.       | 4.138 |
|                            |       | rubiz.         |       |



# ET REMEDIORUM.

|       |                           |       |                                     |        |
|-------|---------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| 4.119 | rubia.                    | 4.143 | Flor. caprifol.                     | 4.38   |
| 4.120 | symphyt.                  | 4.163 | Succ. caprifol.                     | 4.35   |
| 4.121 | Tarax.                    | 4.165 | Vulnera cicatricem induent.         |        |
| 4.122 | Torment.                  | 4.167 | Anim. lep. renes.                   | 5.300  |
| 4.124 | Sem. pastinac.            | 4.120 | asin. adeps.                        | 5.269  |
| 4.126 | perfoliat.                | 4.121 | Flor. ex Terr. Oli.                 | 3.493  |
| 4.128 | Fruct. pom. momord.       | 4.105 | Vulnera consolidanda.               |        |
| 4.131 | oliv.                     | 4.115 | Fol. Burs. past.                    | 4.32   |
| 4.134 | Lachr. Afa fetid.         | 4.184 | calcatripp.                         | 4.33   |
| 4.135 | sarcocoll.                | 4.215 | hyperic.                            | 4.83   |
| 4.141 | Lign. fraxin.             | 4.71  | senic.                              | 4.148  |
| 4.147 | Gumm. Elemi.              | 4.194 | Flor. hyperic.                      | 4.83   |
| 4.148 | pic.                      | 4.209 | Anim. agn. off. inciner.            | 5.267  |
| 4.152 | Bals. Tolut.              | 4.185 | cervi sebum.                        | 5.283  |
| 4.153 | Indic.                    | 4.186 | hom. cadav.                         | 5.294  |
| 4.163 | Terebinth.                | 4.215 | Vulnera inveterata.                 |        |
| 4.165 | Resin. Carana.            | 4.192 | Fol. nicot.                         | 4.112  |
| 4.165 | copul.                    | 4.193 | pimpinell.                          | 4.124  |
| 4.171 | Succ. Aloes.              | 4.252 | plantag.                            | 4.127  |
| 4.172 | Anim. Canin. axung.       | 5.274 | Rad. bardan.                        | 4.25   |
| 4.173 | cochleæ.                  | 5.284 | fumar. bulb.                        | 4.73   |
| 4.176 | hom. aur. fordes.         | 5.287 | pimpinell.                          | 4.124  |
| 4.177 | vulp. ping.               | 5.313 | Resin. Myrrh.                       | 4.200  |
| 4.177 | columb. sang.             | 5.316 | Aq. caustic. F. F.                  | 2.154  |
| 4.183 | gall. ov. alb.            | 5.319 | Lapis medicament.                   | 2.231  |
| 4.183 | gall. vitell. ov. præpar. | 5.319 | Liquor aduicer.                     | 2.233  |
| 4.183 |                           |       | Bals. § ij.                         | 3.439  |
| 4.183 | anguill ping.             | 5.326 | Pulv. Tinct. § ij.                  | 3.445  |
| 4.183 | perca lapilli.            | 5.331 | Bals. Tereb.                        | 4.214  |
| 4.183 | apum mel.                 | 5.335 | Vulnera pectoris.                   |        |
| 4.183 | cera temperata.           | 5.337 | Potio vulnerar.                     | 2.262  |
| 4.183 | araneæ. tela.             | 5.338 | Vulnera punctim ac caesum conficta. |        |
| 4.183 | lumbr. terr.              | 5.344 | Empl. Oppo deldoch. Paracel.        |        |
| 4.183 | Min. Creta.               | 3.320 |                                     | 2.198  |
| 4.183 | Ol. Benzoin.              | 4.180 | Bals. Hispan.                       | 2.303  |
| 4.183 | Vulnera capitis.          |       | vulnerar.                           | 2.304  |
| 4.183 | Fol. Botonic.             | 4.28  | Flor. Antimon.                      | 3.432  |
| 4.183 |                           |       | l 3                                 | Vulne- |

# INDEX MORBOR. ET REMED.

## Vulnera recentia.

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Fol. Card. bened.     | 4.36  |
| Empl. stict. Crollij. | 2.200 |
| Bals. vuln. samar.    | 2.305 |
| Pulv. Tinct. § ij.    | 3.445 |

## Vulnera sordida mundificat.

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Fol. arist. long. | 4.19  |
| geran.            | 4.76  |
| hyperic.          | 4.83  |
| Flor. hyperic.    | 4.83  |
| Elixir. propr.    | 2.189 |
| Liquor ad ulceræ. | 2.233 |
| Tinct. Q.         | 3.386 |
| ☉. Ebeni.         | 4.63  |

## Vulnera venerata ac fistulosa.

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Min. Terr. sigill.         | 3.316 |
| Empl. mordific.            | 2.197 |
| Ol. hyperic. compos.       | 2.246 |
| Ol. hyper. compos. Ellenb. | 2.248 |
| Sal Zis.                   | 3.395 |
| Liquor. § ij præcip.       | 3.407 |

## Uvulæ inflammatio.

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Flor. schænanth.    | 4.152 |
| Rad. schænanth.     | 4.152 |
| Gumm. opop.         | 4.208 |
| Anim. hom. urina.   | 5.288 |
| hirundo.            | 5.320 |
| Aq. ad guttur, aff. | 2.142 |

F I N I S.





E D.

fa.

3.316

2.197

1.146

lenb. 1.248

3.395

3.407

4.152

4.152

4.208

5.288

5.320

2.142









